

# Kapitola 1

## Úvod

Stručný obsah kapitoly.

- Induktivní definice a důkaz indukci.  $\mathcal{F}$ -uzávěr a  $\mathcal{F}$ -odvození.
- Notace a signatury, struktury pro signaturu.
- Obor designátorů  $\underline{D}(S)$ ; tvrzení o jednoznačnosti, o výskytech, o substituci.
- Hodnota designátoru ve struktuře. Konstrukce rekurzí.

## 1.1 Základní pojmy

### 1.1.1. Sekvence. $n$ -ární funkce a relace.

Sekvence je konečná posloupnost; predikát  $\text{Seq}(x)$  nechť značí „ $x$  je sekvence“. Sekvenci lze v teorii množin případně v nějakém jejím fragmentu definovat takto:

$$\text{Seq}(x) \Leftrightarrow x \text{ je funkce, jejíž definiční obor je nějaké přirozené číslo.} \quad (1.1)$$

Základní pojmy o sekvencích jsou: unární parciální funkce „délka sekvence“  $x$ , binární parciální funkce „ $y$ -tý člen (prvek) sekvence  $x$ “, „konkatenace sekvencí  $x$  a  $y$ “, „konkatenace sekvence  $x$  sekvencí“, binární predikce „sekvence  $x$  je počátkem sekvence  $y$ “ a konstanta „prázdná sekvence“. Značíme je po řadě symboly

$$\text{lh}(x), \quad (x)_y, \quad x \smallfrown y, \quad \sqcup(x), \quad x \leq y, \quad \emptyset.$$

Místo  $(x)_y$  se píše také, nevede-li to k nedorozumění, symbol

$$x_y.$$

Místo sekvence délky  $n$  můžeme říkat  $n$ -sekvence.  $n$ -sekvenci  $x$  značíme jako

$$\langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle,$$

kde  $x_i = (x)_i$ . Značíme ji též  $\overline{x}$ ; pruh graficky zdůrazňuje, že jde o sekvenci.

V teorii množin se definují  $n$ -tice (uspořádané) tak, že uspořádaná dvojice  $(x, y)$  je  $\{\{x\}, \{x, y\}\}$  a  $(n+1)$ -tice s  $n \geq 2$  jsou právě tvaru  $(u, y)$ , kde  $u$  je nějaká  $n$ -tice. Dále 0-tice je jen  $\emptyset$ , 1-tice jsou právě tvaru  $\{x\}$ . (Metodicky se nejprve zavede pojem uspořádané dvojice, pomocí něj pojem relace a funkce a pomocí funkcí a pojmu přirozeného čísla pak sekvence jako v (1.1).)

Je vzájemně jednoznačná korespondence  $'$  (funkce) mezi všemi sekvencemi a ticemi taková, že,  $\emptyset' = \emptyset$  a  $\langle x \rangle' = \{x\}$  a pro  $n \geq 2$  a  $(n+1)$ -sekvenci  $s$  tvaru  $t \smallfrown \langle y \rangle$  je  $s' = (t', y)$ . Pomocí  $'$   $n$ -sekvence a  $n$ -tice přirozeně ztotožňujeme.

Symbol  $z^n$  značí množinu všech  $n$ -tic s členy v  $z$ ; můžeme díky ztotožnění  $n$ -sekvencí a  $n$ -tic psát místo  $z^n$  také  ${}^nz$ , neboť, symbol  ${}^xy$  značí množinu všech funkcí  $z$   $x$  do  $y$ . Často se ztotožňuje  $z^1$  se  $z$ . Je dále  $z^0 = \{\emptyset\}$  ( $= {}^0z$ ). Množinu všech sekvencí s hodnotami v  $z$  značíme  $z^*$ ; tedy  $z^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} z^n$ .

Symbol  $f : x \rightarrow y$  značí, že  $f$  je funkce s definičním oborem  $\text{dom}(f) = x$  a oborem hodnot  $\text{rng}(f) \subseteq y$ ; je to funkce  $z$   $x$  do  $y$ . Pro  $a \in \text{dom}(f)$  je  $f(a)$  hodnota  $f$  v  $a$ . Pro  $n \geq 1$  o funkci  $f$  resp. relaci  $r$  říkáme, že je  $n$ -ární, je-li

$\text{dom}(f)$  množina  $n$ -tic resp.  $r$  je množina  $n$ -tic. Když  $f$  je  $n$ -ární a  $\langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle \in \text{dom}(f)$ , píšeme  $f(a_0, \dots, a_{n-1})$  místo  $f(\langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle)$ . Když  $r$  je  $n$ -ární, píšeme také  $r(x_0, \dots, x_{n-1})$  místo  $\langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle \in r$ . Funkce  $f$  je nulární, když  $\text{dom}(f) = \{\emptyset\}$ . Funkce  $f : x^n \rightarrow x$  je  $n$ -ární operace (též funkce) na  $x$ . Množina  $r \subseteq x^n$  s  $n > 0$  je  $n$ -ární relace na (též v)  $x$ . Pro funkce  $f, g$  je  $fg = \{\langle x, f(g(x)) \rangle; x \in \text{dom}(g), g(x) \in \text{dom}(f) \}$ .

$x \times y = \{(a, b); a \in x, b \in y\}$  je kartézský součin  $x$  a  $y$ . Díky ztotožnění  $n$ -sekvencí a  $n$ -tic můžeme psát  $x \times y = \{\langle a, b \rangle; a \in x, b \in y\}$  a  $z^n \times y = \{s \cup b; s \in z^n, b \in y\}$ .

### Induktivní definice

Nechť  $F$  je  $n$ -ární funkce a  $X$  množina.  $F$ -konkluze  $X$  je množina  $F[X^n]$ ; značíme ji  $F[X]$ .  $F[X]$  je tvořená právě prvky  $F(x_1, \dots, x_n)$  s  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \in X^n \cap \text{dom}(F)$ .

#### 1.1.2. $\mathcal{F}$ -uzávěr a odvození. Induktivní definice.

1. Buď  $\mathcal{F}$  množina funkcí konečných četností,  $X$  množina.

$\mathcal{F}$ -konkluze  $X$  je množina  $\bigcup \{F[X]; F \in \mathcal{F}\}$ ; značíme ji  $\mathcal{F}[X]$ . Tedy v  $\mathcal{F}[X]$  jsou právě prvky  $F(x_1, \dots, x_n)$  s  $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \in X^n \cap \text{dom}(F)$ ,  $F \in \mathcal{F}$ .

$X$  je  $\mathcal{F}$ -uzavřená, když obsahuje svou  $\mathcal{F}$ -konkluzi, tj. když  $\mathcal{F}[X] \subseteq X$ .  $\mathcal{F}$ -uzávěr  $X$  je nejmenší  $\mathcal{F}$ -uzavřená nadmnožina  $X$ ;  $\mathcal{F}$ -uzávěr  $X$  značíme  $\mathcal{F}\langle X \rangle$ .

2.  $\mathcal{F}$ -odvození z  $X$  je sekvence  $s$ , přičemž pro každé  $i < \text{lh}(s)$  je  $s_i \in X$  nebo existuje  $F$  z  $\mathcal{F}$  a  $i_0, \dots, i_{n-1} < i$  tak, že  $n$  je četnost  $F$  a  $s_i = F(s_{i_0}, \dots, s_{i_{n-1}})$ ; říká se pak, že  $s$  je  $\mathcal{F}$ -odvození z  $X$  prvku  $y = (s)_{\text{lh}(s)-1}$ . Prvek je  $\mathcal{F}$ -odvozený z  $X$ , existuje-li jeho  $\mathcal{F}$ -odvození z  $X$ .

3. Induktivní definice množiny  $Y$  je seznam pravidel

- každý prvek z  $X$  je v  $Y$ ,
- pro funkci  $F$  z  $\mathcal{F}$ , její četnost  $n$  a  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle$  z  $Y^n$  je  $F(y_1, \dots, y_n)$  v  $Y$ , (1.2)  
jakmile  $F \in \mathcal{F}$  a  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle \in \text{dom}(F)$ .

O nejmenší množině  $Y$  vyhovující těmto pravidlům říkáme, že to je *množina definovaná indukčními definicemi s pravidly* (1.2); je to ovšem množina  $\mathcal{F}\langle X \rangle$ .

Důkaz indukce na objektech z  $\mathcal{F}\langle X \rangle$  prokazující, že každý prvek z  $\mathcal{F}\langle X \rangle$  má vlastnost  $V$ , je schema

- každý prvek z  $X$  má vlastnost  $V$ ,
  - když každé  $y_1, \dots, y_n$  z  $\mathcal{F}\langle X \rangle$  má vlastnost  $V$ , má  $F(y_1, \dots, y_n)$  vlastnost  $V$ ,  
jakmile  $F \in \mathcal{F}$  a  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle \in \text{dom}(F)$ .
- (1.3)

Druhá položka z (1.3) je *schéma indukčních kroků*, „každé  $y_1, \dots, y_n$  má vlastnost  $V$ , jakmile  $\langle y_1, \dots, y_n \rangle \in \text{dom}(F)$ “ je *indukční předpoklad* indukčního kroku pro  $F$ .

Pokud  $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \cup \{F_x; x \in X\}$ , kde  $F_x = \{\langle \emptyset, x \rangle\}$  je nulární, v (1.2) lze vynechat první řádek a ve druhém psát  $\mathcal{F}'$  místo  $\mathcal{F}$ . Obdobně je tomu v (1.3).

TVRZENÍ 1.1.3. Buď  $\mathcal{F}$  množina funkcí konečných četností,  $X$  množina. Pak

- 1)  $\mathcal{F}\langle X \rangle = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ , kde  $X_0 = X$  a  $X_{n+1} = X_n \cup \mathcal{F}[X_n]$ .
- 2)  $\mathcal{F}\langle X \rangle = \{y; y \text{ je } \mathcal{F}\text{-odvozený z } X\}$ .
- 3) Platí-li (1.3), má každý prvek z  $\mathcal{F}\langle X \rangle$  vlastnost  $V$ .
- 4)  $X' \subseteq X \Rightarrow \mathcal{F}\langle X' \rangle \subseteq \mathcal{F}\langle X \rangle$ ,  $X \subseteq \mathcal{F}\langle X \rangle = \mathcal{F}(\mathcal{F}\langle X \rangle)$ .

Důkaz. 1) plyne snadno.

2) Inkluze  $\supseteq$ . Je-li s nějaké  $\mathcal{F}$ -odvození z  $X$ , je jeho poslední člen v  $\mathcal{F}\langle X \rangle$ ; to plyne ihned indukci dle délky s užitím  $\mathcal{F}$ -uzavřenosti  $\mathcal{F}\langle X \rangle$ . Odtud plyne dokazovaná inkluze.

Inkluze  $\subseteq$ . Indukcí plyne pro každé  $n$ : každé  $y \in X_n$  je prvek  $\mathcal{F}$ -odvozený z  $X$ . Pro  $n = 0$  to je jasné a indukční krok plyne takto: buď  $y = F(z_1, \dots, z_n) \in X_{n+1}$  s  $z_1, \dots, z_n \in X_n$  a  $s_i$  je  $\mathcal{F}$ -odvození z  $X$  prvku  $z_i$  pro  $i = 1, \dots, n$ . Pak  $s_1 \cup \dots \cup s_n \cup y$  je hledané odvození. Jelikož  $\mathcal{F}(X) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n$ , dokazovaná inkluze  $\subseteq$  platí.

3) Indukcí snadno plyne pro každé  $n$ : každé  $y \in X_n$  má vlastnost  $V$ .

4) Inkluze jsou zřejmé a poslední rovnost plyne z  $\mathcal{F}$ -uzavřenosti  $\mathcal{F}(X)$ .  $\square$

## 1.2 Signatury a struktury

### 1.2.1. Notace a signatura.

1. *Obecná notace* je dvojice  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$ , kde  $\emptyset \notin \mathcal{S}$ ,  $Ar_{\mathcal{S}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{N}$ ; značíme ji stručně  $\underline{\mathcal{S}}$  nebo jen  $\mathcal{S}$ . Dále  $S \in \mathcal{S}$  je *symbol*  $\underline{S}$ ,  $Ar_{\mathcal{S}}(S)$  je *četnost*  $S$ ,  $Ar_{\mathcal{S}}[\mathcal{S}]$  je *množina četností*  $\underline{\mathcal{S}}$ . Když  $Ar_{\mathcal{S}}(S) = 0$ , říkáme, že  $S$  je *konstantní symbol*; značíme jej často písmenem  $c, c', c_i, d, d', d_i$  apod. Obecná notace  $\emptyset$  se nazývá *prázdná*; ztotožňujeme ji s  $\emptyset$ .

*Notace* je obecná notace  $\underline{\mathcal{S}}$ , obsahující alespoň jeden konstantní symbol; tedy  $0 \in Ar_{\mathcal{S}}[\mathcal{S}]$ .

2. *Signatura* je  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $\mathcal{R}$  je obecná notace s  $0 \notin Ar_{\mathcal{R}}[\mathcal{R}]$ ,  $\mathcal{F}$  je obecná notace a  $\mathcal{R} \cap \mathcal{F} = \emptyset$ . Jsou-li  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  prázdné, je to *prázdná signatura*; ztotožňujeme ji s  $\emptyset$ . Prvky z  $\mathcal{R}$  resp.  $\mathcal{F}$  jsou *relační* resp. *funkční symboly* uvažované signatury. Je-li symbol  $= v \in \mathcal{R}$ , značí binární predikátový symbol rovnosti. Signatura  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  je *relační* resp. *funkční*, když  $\mathcal{F}$  je prázdná resp.  $\mathcal{R}$  je prázdná; zapisujeme ji jako  $\underline{\mathcal{R}}$  resp.  $\underline{\mathcal{F}}$ . Notaci chápeme jako funkční signaturu.

Je-li  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  obecná notace a  $\mathcal{S} = \{S_0, \dots, S_{m-1}\}$ , zapisujeme ji také jako

$$\langle S_0, \dots, S_{m-1} \rangle, \quad S_0 \text{ je } k_0\text{-ární}, \dots, S_{m-1} \text{ je } k_{m-1}\text{-ární},$$

kde  $k_i = Ar_{\mathcal{S}}(S_i)$ . Je-li  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  signatura,  $\mathcal{R} = \{R_0, \dots, R_{m-1}\}$ ,  $\mathcal{F} = \{F_0, \dots, F_{n-1}\}$ , zapisujeme ji jako

$$\langle R_0, \dots, R_{m-1}, F_0, \dots, F_{n-1} \rangle,$$

$R_0$  je  $k_0$ -ární,  $\dots$ ,  $R_{m-1}$  je  $k_{m-1}$ -ární,  $F_0$  je  $l_0$ -ární,  $\dots$ ,  $F_{n-1}$  je  $l_{n-1}$ -ární,

kde  $k_i = Ar_{\mathcal{R}}(R_i)$ ,  $l_j = Ar_{\mathcal{F}}(F_j)$ .

Jsou-li četnosti patrné z kontextu, nemusíme je uvádět.

### 1.2.2. Struktura, podstruktura a generovaná podstruktura.

1. *Struktura* je trojice  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , kde  $A$  je neprázdná množina,  $\mathcal{R}$  je soubor relací na  $A$  konečných kladných četností,  $\mathcal{F}$  je soubor operací na  $A$  konečných četností. Říkáme také, že prvky z  $\mathcal{R}$  resp.  $\mathcal{F}$  jsou *relace* resp. *funkce* (z)  $\mathcal{A}$ . Nulární funkce struktury  $\mathcal{A}$  se nazývá *konstanta*; je tvaru  $\{\langle \emptyset, c \rangle\}$  s jistým  $c \in A$ ; ztotožňujeme ji s  $c$ . Dále říkáme, že  $A$  je *univerzum*  $\mathcal{A}$ . Struktura  $\mathcal{A}$  je *čistě relační* resp. *funkční* (též *algebraická*), je-li  $\mathcal{F} = \emptyset$  resp.  $\mathcal{R} = \emptyset$ . Někdy píšeme  $\underline{\mathcal{A}}$  místo  $\mathcal{A}$ . Je-li  $\mathcal{R}$  tvaru  $\langle R_0, \dots, R_{k-1} \rangle$  a  $\mathcal{F}$  tvaru  $\langle F_0, \dots, F_{l-1} \rangle$ , zapisujeme  $\mathcal{A}$  též jako

$$\langle A, R_0, \dots, R_{k-1}, F_0, \dots, F_{l-1} \rangle.$$

*Velikost* čili *kardinalita*  $\mathcal{A}$  je velikost (kardinalita) jejího univerza; značíme ji

$$\|\mathcal{A}\|.$$

2. *Podstruktura* struktury  $\mathcal{A}$  je struktura  $\mathcal{B} = \langle B, \mathcal{R}', \mathcal{F}' \rangle$ , kde:

a)  $B \subseteq A$ .

b) Relace z  $\mathcal{R}'$  jsou právě tvaru  $R \cap B^m$  s  $R \in \mathcal{R}$  a  $m$  rovným četnosti  $R$ .

c) Funkce z  $\mathcal{F}'$  je právě tvaru  $F \cap (B^n \times B)$  s  $F \in \mathcal{F}$  a  $n$  rovným četnosti  $F$ .

Speciálně je  $B$  uzavřeno na všechny funkce struktury  $\mathcal{A}$  a tedy také každá konstanta struktury  $\mathcal{A}$  patří do  $B$ .

3. Buď navíc  $X \subseteq A$ . *Množina generovaná v  $\mathcal{A}$  z  $X$*  je nejmenší podmnožina  $A$  obsahující  $X$  a uzavřená na každou funkci z  $\mathcal{F}$ ; značíme ji  $\overline{X}^{\mathcal{A}}$ . Je-li  $\overline{X}^{\mathcal{A}} \neq \emptyset$ , je to

univerzum nejmenší podstruktury struktury  $\mathcal{A}$ ; značíme ji  $\mathcal{A}\langle X \rangle$  a říkáme, že to je *podstruktura generovaná  $X$* .

Když  $\mathcal{F}$  obsahuje konstantu  $c$ , je  $c \in \overline{X}^A$ . Když  $\mathcal{F} = \emptyset$ , tak  $\overline{X}^A = X$ .

### 1.2.3. Realizace signatury.

*Realizace signatury*  $\langle \underline{\mathcal{R}}, \underline{\mathcal{F}} \rangle$  je struktura  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$ , kde:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^A &= \langle R'_R; R \in \mathcal{R} \rangle; & R'_R &\subseteq A^{Ar(R)} \text{ je realizace } R \text{ v } \mathcal{A} \text{ a značíme ji } R^A. \\ & & \text{Přitom } =^A &\text{ je } \{ \langle a, a \rangle; a \in A \}, \text{ tj. identita na } A. \\ \mathcal{F}^A &= \langle F'_F; F \in \mathcal{F} \rangle; & F'_F &: A^{Ar(F)} \rightarrow A \text{ je realizace } F \text{ v } \mathcal{A} \text{ a značíme ji } F^A. \end{aligned}$$

Říkáme také, že  $\mathcal{A}$  je  $\langle \underline{\mathcal{R}}, \underline{\mathcal{F}} \rangle$ -*struktura*, též *struktura pro*  $\langle \underline{\mathcal{R}}, \underline{\mathcal{F}} \rangle$  a také, že to je (*sémantická*) *interpretace* uvažované signatury. ' je formálně zobrazení  $\mathcal{R}$  na  $\mathcal{R}^A$  a  $\mathcal{F}$  na  $\mathcal{F}^A$ .

### 1.2.4. Izomorfismus struktur.

Buďte  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$ ,  $\mathcal{B} = \langle B, \mathcal{R}^B, \mathcal{F}^B \rangle$  dvě  $\langle \underline{\mathcal{R}}, \underline{\mathcal{F}} \rangle$ -struktury. Zobrazení  $h : A \rightarrow B$  je *izomorfismus* struktur  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$ , když

- $h$  je prosté a na  $B$ ,
- pro  $R \in \mathcal{R}$ ,  $n$  rovno četnosti  $R$  a  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in A^n$  je
$$R^A(a_1, \dots, a_n) \Leftrightarrow R^B(h(a_1), \dots, h(a_n)),$$
- pro  $F \in \mathcal{F}$ ,  $n$  rovno četnosti  $F$  a  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in A^n$  je
$$h(F^A(a_1, \dots, a_n)) = F^B(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

Píšeme pak  $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$  (*via*  $h$ ). Speciálně pro konstantní symbol  $c$  z  $\mathcal{F}$  je  $h(c^A) = c^B$ .

## 1.3 Designátory

### 1.3.1. Aplikace notace.

Buď  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  obecná notace,  $X$  množina konečných sekvencí.

1. *Aplikační doména*  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  na  $X$  je množina  $Ad(\mathcal{S}, X) = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} (\{S\} \times X^{Ar_{\mathcal{S}}(S)})$ . Její prvky jsou tedy právě tvaru  $\langle S, s \rangle$ , kde  $S \in \mathcal{S}$ ,  $s \in X^{Ar_{\mathcal{S}}(S)}$ .

2. *Aplikace*  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  na  $X$  je funkce  $Ap_{\mathcal{S}, X}$  definovaná na  $Ad(\mathcal{S}, X)$  taková, že pro každé  $S \in \mathcal{S}$  a  $s \in X^{Ar_{\mathcal{S}}(S)}$  je

$$Ap_{\mathcal{S}, X}(S, s) = \langle S \rangle \cup \sqcup(s). \quad (1.4)$$

Její obor hodnot se nazývá *množina výrazů aplikace*  $Ap_{\mathcal{S}, X}$  na  $X$ . Pro  $s \in X^{Ar_{\mathcal{S}}(S)}$  tvaru  $\langle s_0, \dots, s_{n-1} \rangle$  značíme  $Ap_{\mathcal{S}, X}(S, s)$  jako

$$S(s_0, \dots, s_{n-1}) \text{ nebo také } (s_0 S s_1), \text{ když } n = 2. \quad (1.5)$$

Prvý výraz v (1.5) je *prefixní* a druhý *infixní* zápis výrazu  $Ap_{\mathcal{S}, X}$ .

Pro nulární  $S$  platí  $Ap_{\mathcal{S}, X}(S, \emptyset) = \langle S \rangle = S()$ ; místo  $S()$  píšeme často jen  $S$ , nevede-li to k nedorozumění. Když  $\mathcal{S}$  je prázdné, je  $Ap_{\mathcal{S}, X}$  prázdná funkce a obor takové aplikace je prázdný.

3. Je-li  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  notace, říkáme, že  $Ap_{\mathcal{S}, *}$  je *aplikace*  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$ ; značíme ji

$$Ap_{\mathcal{S}}.$$

Platí pak  $\text{rng}(Ap_{\mathcal{S}}) \subseteq \mathcal{S}^*$ , tj. množina výrazů aplikace  $Ap_{\mathcal{S}}$  je podmnožina  $\mathcal{S}^*$ .

POZNÁMKA. Buď  $\mathcal{S} = \{F, F(c), c\}$ ,  $F$  unární,  $F(c), c$  konstantní. Pak zkrácení designátoru  $F(c)()$  na  $F(c)$  vede k nedorozumění, neboť  $F(c)$  je  $Ap_{\mathcal{S}}(F, \langle c \rangle)$ .

### 1.3.2. Designátory.

Buď  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  notace.

1. *Obor výrazů* notace  $\langle \mathcal{S}, Ar_{\mathcal{S}} \rangle$  je struktura  $\underline{\mathcal{D}}^*(\mathcal{S})$  tvaru  $\langle \mathcal{S}^*, \mathcal{S}^\circ \rangle$ , kde  $\mathcal{S}^\circ$  je soubor  $\langle \mathcal{S}^\circ; S \in \mathcal{S} \rangle$  funkcí takových, že

$$S^\circ : (\mathcal{S}^*)^{Ars(S)} \rightarrow \mathcal{S}^* \text{ splňuje } S^\circ(s) = Ap_S(S, s) \text{ pro } s \in (\mathcal{S}^*)^{Ars(S)}. \quad (1.6)$$

Tedy  $\underline{D}^*(\mathcal{S})$  je  $\langle \mathcal{S}, Ars \rangle$ -struktura, kde  $\langle \mathcal{S}, Ars \rangle$  představuje funkční signaturu.

2. *Obor designátorů* notace  $\langle \mathcal{S}, Ars \rangle$  je podstruktura  $\underline{D}(\mathcal{S})$  struktury  $\underline{D}^*(\mathcal{S})$ , generovaná prázdnou množinou; její univerzum  $D(\mathcal{S})$  je množina designátorů uvažované signatury.  $D(\mathcal{S})$  je tedy nejmenší podmnožina  $\mathcal{S}^*$  obsahující každé  $\langle S \rangle$  pro  $S \in \mathcal{S}$  nulární, která je uzavřená na všechny  $S^\circ$  s  $S \in \mathcal{S}$  nenulárním. Speciálně je  $D(\mathcal{S})$  definováno zřejmou induktivní definicí:

Pro  $S \in \mathcal{S}$  a sekvenci  $s$  designátorů délky  $Ars(S)$  je  $\langle S \rangle \sqcup (s)$  designátor.

Připomeme, že sekvence  $x$  je *podsekvence* sekvence  $y$ , existují-li sekvence  $y_0, y_1$  tak, že platí  $y_0 \sqcup x \sqcup y_1 = y$ ; říkáme pak také, že  $x$  má *výskyt* v  $y$ . *Poddesignátor* nějakého designátoru  $\eta$  je designátor mající výskyt v  $\eta$ .

Mluvíme-li o designátorech a není výslovně uvedena příslušná notace, chápeme ji jako  $\langle \mathcal{S}, Ars \rangle$ . Designátory často značíme  $\eta, \eta', \eta_0, \eta_1, \dots$ .

**TVRZENÍ 1.3.3.** (O jednoznačnosti designátorů.) *Každý designátor je jednoznačně tvaru  $Ap_S(S, s)$  pro jisté  $S \in \mathcal{S}$  a jisté  $s \in D(\mathcal{S})^{Ars(S)}$ .*

*Čili  $Ap_S$  je prosté zobrazení množiny  $Ad(\mathcal{S}, D(\mathcal{S}))$  na  $D(\mathcal{S})$ .*

**Důkaz.** Je třeba dokázat jen jednoznačnost výrazu  $\langle S \rangle \sqcup (s)$  pro  $S \in \mathcal{S}$  a  $s \in D(\mathcal{S})^{Ars(S)}$ . Buď  $\langle S \rangle \sqcup (s)$  rovno  $\langle S \rangle \sqcup (s')$  pro jisté  $s' \in D(\mathcal{S})^{Ars(S)}$ ; máme dokázat  $s = s'$ . Když  $s \neq s'$ , tak pro nejmenší  $i$  s  $(s)_i \neq (s')_i$  je  $(s)_i < (s')_i$  nebo  $(s')_i < (s)_i$ . To je ve sporu s 1.3.4.  $\square$

**LEMMA 1.3.4.** *Buďte  $\langle \eta_1, \dots, \eta_n \rangle, \langle \eta'_1, \dots, \eta'_n \rangle$  sekvence designátorů takové, že  $\sqcup(\langle \eta_1, \dots, \eta_n \rangle) \leq \sqcup(\langle \eta'_1, \dots, \eta'_n \rangle)$ . Pak  $\eta_i = \eta'_i$  pro  $i = 1, \dots, n$ .*

*Speciálně pro designátory  $\eta \leq \eta'$  je  $\eta = \eta'$ .*

**Důkaz.** Indukcí dle délky  $\sqcup(\langle \eta_1, \dots, \eta_n \rangle)$ . Buď  $\eta_1 = \langle S \rangle \sqcup (\langle \hat{\eta}_1, \dots, \hat{\eta}_k \rangle)$  s nějakým  $S \in \mathcal{S}$  a designátory  $\hat{\eta}_1, \dots, \hat{\eta}_k$ ;  $\eta'_1$  nutně začíná  $S$ , tedy  $\eta'_1 = \langle S \rangle \sqcup (\langle \hat{\eta}'_1, \dots, \hat{\eta}'_k \rangle)$  s nějakými designátory  $\hat{\eta}'_1, \dots, \hat{\eta}'_k$ . Jelikož  $\eta_1 \leq \eta'_1$ , tak  $\sqcup(\langle \hat{\eta}_1, \dots, \hat{\eta}_k \rangle) \leq \sqcup(\langle \hat{\eta}'_1, \dots, \hat{\eta}'_k \rangle)$ . Tudíž podle indukčního předpokladu je  $\hat{\eta}_i = \hat{\eta}'_i$  pro  $i = 1, \dots, k$  (i pokud  $k = 0$ ) a tedy  $\eta_1 = \eta'_1$ . Pak ale  $\sqcup(\langle \eta_2, \dots, \eta_n \rangle) \leq \sqcup(\langle \eta'_2, \dots, \eta'_n \rangle)$  a tudíž opět dle indukčního předpokladu je také  $\eta_i = \eta'_i$  pro  $i = 2, \dots, n$ . Speciální tvrzení plyne bezprostředně.  $\square$

**TVRZENÍ 1.3.5.** (O výskytech designátorů.) *Výskyt designátoru  $\eta'$  v designátoru  $\eta$  tvaru  $\langle S \rangle \sqcup (s)$  s  $S \in \mathcal{S}$  a  $s \in D(\mathcal{S})^{Ars(S)}$  je buď  $\eta$  nebo je to výskyt v některém členu  $(s)_i$ .*

**Důkaz.** Nechť výskyt symbolu, jenž je první člen uvažovaného výskytu designátoru  $\eta'$ , je první  $S$  v  $\eta$ ; je  $\eta' \leq \eta$ , tedy dle 1.3.4 je  $\eta = \eta'$ .

Nechť výskyt symbolu, jenž je první člen uvažovaného výskytu designátoru  $\eta'$ , je v některém  $(s)_i$ . Pak dle 1.3.6 je tento výskyt prvním členem výskytu nějakého designátoru  $\eta''$  v  $(s)_i$ . Je nutně  $\eta' \leq \eta''$  nebo  $\eta'' \leq \eta'$ , tedy  $\eta' = \eta''$  a tedy  $\eta'$  se vyskytuje v  $(s)_i$  jako  $\eta''$ .  $\square$

**LEMMA 1.3.6.** *Každý výskyt symbolu v nějakém designátoru  $\eta$  je prvním členem nějakého výskytu nějakého designátoru v  $\eta$ .*

**Důkaz.** Indukcí na designátorech. Máme dokázat: když  $S \in \mathcal{S}$ ,  $s \in D(\mathcal{S})^{Ars(S)}$  a tvrzení platí pro každé  $\eta$  rovno některému  $(s)_i$ , tak tvrzení platí pro  $\eta$  rovno  $\langle S \rangle \sqcup (s)$ . Je-li  $s = \emptyset$ , je to jasné. Jinak jde o výskyt v nějakém  $(s)_i$ . Podle indukčního předpokladu je prvním členem nějakého výskytu nějakého designátoru v  $(s)_i$ ; ten je ovšem výskytem designátoru v  $\langle S \rangle \sqcup (s)$ .  $\square$

**TVRZENÍ 1.3.7.** (O substituci v designátorech.) *Nahradí-li se výskyt designátoru  $\eta'$  v designátoru  $\eta$  designátorem  $\eta''$ , získá se designátor.*

**Důkaz.** Indukcí na designátorech. Buď  $\eta = \langle S \rangle \cup \sqcup (s)$  a pro  $(s)_i$  s  $i < \text{Ar}_S(S)$  necht' to platí. Pak uvažovaný výskyt  $\eta'$  je  $\eta$  a platí to, nebo je to výskyt v některém  $(s)_i$ ; pak díky indukčnímu předpokladu to opět platí.  $\square$

**TVRZENÍ 1.3.8.** (Konstrukce rekurzí na  $D(\mathcal{S})$ .) *Necht'  $\langle \mathcal{S}, \text{Ar}_S \rangle$  je notace a  $U, W$  množiny. Pro každé  $S \in \mathcal{S}$  a  $n = \text{Ar}_S(S)$  buďte dány funkce  $G_S(z_1, \dots, z_n, u)$  s hodnotami ve  $W$  a definovaná pro každé  $z_1, \dots, z_n \in \mathcal{P}(W)$ ,  $u \in U$  a  $G_{S,1}(u), \dots, G_{S,n}(u)$  s hodnotami v  $\mathcal{P}(U)$  a definované pro každé  $u \in U$ . Pak existuje právě jedna funkce  $H : D(\mathcal{S}) \times U \rightarrow W$  vyhovující podmínkám:*

pro  $S \in \mathcal{S}$  četnosti  $n$  a  $\eta_1, \dots, \eta_n \in D(\mathcal{S})$  je

$$H(\langle S \rangle \cup \eta_1 \cup \dots \cup \eta_n, u) = G_S(H[\{\eta_1\} \times G_{S,1}(u)], \dots, H[\{\eta_n\} \times G_{S,n}(u)], u). \quad (1.7)$$

Říkáme, že  $H$  z 1.3.8 je *zkonstruována* či *sestrojena rekurzí předpisy (pravidly)* (1.7) z funkcí  $G_S, G_{S,i}$ ,  $0 < i \leq n$ .

**POZNÁMKA 1.3.9.**

1. Jelikož  $\eta \in D(\mathcal{S})$  je jednoznačně tvaru  $\langle S \rangle \cup \eta_1 \cup \dots \cup \eta_n$ , předpisy (1.7) jsou korektní. Rekurentnost definice je dána tím, že  $H(\langle S \rangle \cup \eta_1 \cup \dots \cup \eta_n, u)$  se počítá z množin  $H[\{\eta_i\} \times G_{S,i}(u)]$  (a parametru  $u$ ), tj. pomocí „již známých hodnot“  $H(\eta_i, u')$  (s libovolným  $u' \in U$ ). Pro nulární  $S$  máme jen  $G_S$  a rovnost z (1.7) má tvar

$$H(\langle S \rangle, u) = G_S(u).$$

2. Důležitým a praktickým speciálním případem rekurzivního předpisu je

$$\begin{aligned} H(\langle S \rangle \cup \eta_1 \cup \dots \cup \eta_n, u) &= G_S(H(\eta_1, G_{S,1}(u)), \dots, H(\eta_n, G_{S,n}(u)), u) \\ \text{s } G_S(w_1, \dots, w_n, u) &\in W \text{ definovaným pro každé } w_1, \dots, w_n \in W, u \in U, \\ G_{S,i}(u) &\in U \text{ pro každé } u \in U, i = 1, \dots, n; \end{aligned} \quad (1.8)$$

zde se odvoláváme jen na prvky  $w$  z  $W$ , nikoli na všechny podmnožiny  $W$  jako v (1.7).

**Důkaz 1.3.8.** Buď

$D_0 = \{\langle S \rangle; S \in \mathcal{S} \text{ je nulární}\}$ ,  $D_{m+1} = \{\langle S \rangle \cup \sqcup (s); S \in \mathcal{S} \text{ a } s \in D_m^{\text{Ar}_S(S)}\}$  pro  $m \in \mathbb{N}$ . Snadno se ukáže indukcí, že  $D_m \subseteq D_{m+1}$  pro  $m \in \mathbb{N}$  a  $D(\mathcal{S}) = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} D_m$ .

Indukcí podle  $m$  plyne, že jsou-li  $h_m, h'_m$  definované na  $D_m \times U$  a splňují (1.7) s  $h_m, h'_m$  místo  $H$  pro všechna  $S \in \mathcal{S}$ ,  $\eta_i \in D_{m-1}$  a  $u \in U$ , tak  $h_m = h'_m$ . Tudíž  $H$  je nejvýše jedna. Protože každé  $h_m$  lze (jednoznačně) rozšířit na  $D_{m+1} \times U$  do  $h_{m+1}$ , hledané  $H$  je rovno  $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} h_m$ .  $\square$

### 1.3.10. Hodnota designátoru ve struktuře.

Necht'  $\langle \mathcal{S}, \text{Ar}_S \rangle$  je notace a  $\mathcal{A}$  je  $\langle \mathcal{S}, \text{Ar}_S \rangle$ -struktura. *Hodnota  $H^A(\eta)$  designátoru  $\eta$  z  $D(\mathcal{S})$  v  $\mathcal{A}$  je definována rekurzí:*

$$\begin{aligned} \text{Pro } S \in \mathcal{S} \text{ s } n = \text{Ar}_S(S) \text{ a } \eta_1, \dots, \eta_n \in D(\mathcal{S}) \text{ je} \\ H^A(S(\eta_1, \dots, \eta_n)) &= S^A(H^A(\eta_1), \dots, H^A(\eta_n)). \end{aligned} \quad (1.9)$$

Speciálně když  $\eta$  je  $\langle c \rangle$  s konstantním  $c$ , je  $H^A(\eta) = c^A$ .

**TVRZENÍ.** *Necht'  $\langle \mathcal{S}, \text{Ar}_S \rangle$  je notace a  $\mathcal{A} = \underline{D}(\mathcal{S})$ . Pak pro  $\eta \in D(\mathcal{S})$  je  $H^A(\eta) = \eta$ .*

**Důkaz.** Indukcí na designátorech. Necht'  $\eta = \langle S \rangle \cup \sqcup (s)$  s  $n$ -árním  $S$  a s rovným  $\langle \eta_1, \dots, \eta_n \rangle$ , přičemž pro  $\eta_1, \dots, \eta_n$  to platí. Pak

$$H^A(\eta) = S^A(\eta_1, \dots, \eta_n) = S^o(\eta_1, \dots, \eta_n) = \eta.$$

$\square$

# Kapitola 2

## Výroková logika

Stručný obsah kapitoly.

- Jazyk a formule výrokové logiky.
- Modely, pravdivost v teorii, sémantická ekvivalence. Normální tvary.
- Booleovská pravidla. Nezávislé formule. Vlastnosti  $\models$ .
- Extenze teorie, ekvivalentní teorie, kompletní teorie.
- Sémantická kompaktnost. Axiomatizovatelnost.
- Dedukce: důkaz, teorém, vyvratitelná formule, (beze)sporná teorie.
- Existence modelu bezesporné teorie. Věta o úplnosti výrokové logiky.
- Syntaktické metody dokazování.
- 
- 

### 2.1 Sémantika

#### Elementární syntax výroků.

##### 2.1.1. Výrokový jazyk, výroky a teorie.

1. *Výrokový jazyk nad  $\mathbb{P}$*  tvoří: a) neprázdná množina  $\mathbb{P}$  *prvovýroků* (též *výrokových proměnných* či *atomů*), b) logické spojky  $\neg, \rightarrow$  (negace, implikace).

Dále používáme pomocně delimitery  $(, )$  k usnadnění čitelnosti designátorů. Prvovýroky značíme  $p, q, r, p_0, p'$  apod.

Je-li potřeba, chápeme  $\mathbb{P}$  jako prostý indexovaný soubor  $\mathbb{P} = \langle p_i; i \in I \rangle$ .

2. *Výroky* čili (*výrokové*) *formule* nad  $\mathbb{P}$  jsou právě designátory z  $D(\mathcal{F}_{\mathbb{P}})$ , kde  $\mathcal{F}_{\mathbb{P}} = \mathbb{P} \cup \{\neg, \rightarrow\}$ ; přitom prvky z  $\mathbb{P}$  jsou nulární,  $\neg$  je unární,  $\rightarrow$  je binární.

$$\mathbf{VF}_{\mathbb{P}}$$

značí množinu všech výroků nad  $\mathbb{P}$ :  $\mathbf{VF}_{\mathbb{P}} = D(\mathcal{F}_{\mathbb{P}})$ . Výroky značíme  $\varphi, \psi, \chi, \varphi', \varphi_1, \psi'$  apod. Symbol  $\text{var}(\varphi)$  značí množinu všech prvovýroků vyskytujících se ve  $\varphi$ .

Množina  $\mathbf{VF}_{\mathbb{P}}$  je zřejmě definována induktivně pravidly: Pro  $p \in \mathbb{P}$  je  $\langle p \rangle$  je výrok a jsou-li  $\varphi, \psi$  výroky, jsou jimi i  $\neg(\varphi)$  a  $\rightarrow(\varphi, \psi)$ .

Zpravidla zapisujeme  $\langle p \rangle$  pro  $p \in \mathbb{P}$  jako  $p$ ; prvovýrok je tak výrok.

3. *Výroková teorie nad  $\mathbb{P}$* , též  *$\mathbb{P}$ -teorie*, je množina  $T \subseteq \mathbf{VF}_{\mathbb{P}}$ ; její prvky jsou její *axiomy*. Symbol  $\mathbb{P}(T)$  značí množinu prvovýroků jazyka teorie  $T$ . Výrok teorie  $T$  je výrok jejího jazyka.

##### 2.1.2. Zavedení $\&, \vee, \leftrightarrow$ a $\perp, \top$ . Konvence o zápisu formulí. Normální tvary.

1. Binární logické spojky  $\vee$  *disjunkce* (čili *nebo*),  $\&$  *konjunkce* (čili *a*) a  $\leftrightarrow$  *ekvivalence* zavádíme jako zkratky dané následovně:



$$(\varphi \vee \psi) \text{ za } (\neg(\varphi) \rightarrow \psi), \quad (\varphi \& \psi) \text{ za } \neg(\varphi \rightarrow \neg(\psi)), \\ (\varphi \leftrightarrow \psi) \text{ za } ((\varphi \rightarrow \psi) \& (\psi \rightarrow \varphi)).$$

Místo  $\&$  se píše také  $\wedge$ .

*Pravdivý* výrok  $\top$  specifikujeme jako  $p \rightarrow p$ , *lživý* výrok  $\perp$  jako  $\neg(p \rightarrow p)$ ; na konkrétní volbě  $p$  nezáleží. Mluvíme o nich též jako o nulárních logických spojkách či výrokových konstantách.

2. Konvence o zápisu formulí. Často se vynechávají vnější závorky, místo  $\neg(\varphi)$  se píše  $\neg\varphi$ . Používá se též konvence, že  $\neg$  má v zápise vyšší prioritu než spojky  $\&$  a  $\vee$ , ty zase než  $\leftrightarrow$  a ta zase než  $\rightarrow$ . Místo  $((\varphi \& (\neg\psi)) \rightarrow (\chi \vee \psi))$  tak máme  $\varphi \& \neg\psi \rightarrow \chi \vee \psi$ ; můžeme ovšem použít i méně radikální zkrácení, jako např.  $(\varphi \& \neg\psi) \rightarrow (\chi \vee \psi)$ . Místo  $(\varphi_1 \diamond (\varphi_2 \diamond \dots \diamond \varphi_n) \dots)$  píšeme též  $\varphi_1 \diamond \varphi_2 \diamond \dots \diamond \varphi_n$ , kde  $\diamond$  je  $\rightarrow$ ,  $\&$  nebo  $\vee$ ; nekumulujeme zde tedy závorky zprava. Formule  $\varphi_1 \diamond \varphi_2 \diamond \dots \diamond \varphi_n$ , kde  $\diamond$  je  $\&$  resp.  $\vee$  se nazývá *konjunkce s konjunkty*  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  resp. *disjunkce s disjunkty*  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ . Závorky můžeme pro zlepšení čitelnosti i přidat.

3. Výrok je *literál*, je-li to prvovýrok nebo negace prvovýroku. Disjunkce literálů se nazývá *klauzule*, konjunkce literálů též *elementární konjunkce*. Výrok je v *disjunktivně* resp. *konjunktivně normálním tvaru*, je-li to disjunkce konjunkcí literálů resp. konjunkce disjunkcí literálů.

**ZNAČENÍ.** Pro výrok  $\varphi$ ,  $n$ -tici výroků  $s = \langle \varphi_0, \dots, \varphi_{n-1} \rangle$  a  $\sigma : n \rightarrow 2$  užíváme následující značení:

$$\varphi^1 \text{ je } \varphi, \quad \varphi^0 \text{ je } \neg\varphi, \quad s^\sigma \text{ je } \langle \varphi_0^{\sigma(0)}, \dots, \varphi_{n-1}^{\sigma(n-1)} \rangle,$$

$$\bigwedge s \text{ je } \varphi_0 \& \dots \& \varphi_n, \quad \bigwedge \emptyset \text{ je } \top, \quad \bigvee s \text{ je } \varphi_0 \vee \dots \vee \varphi_n, \quad \bigvee \emptyset \text{ je } \perp.$$

Je-li  $s$  konečná množina výroků, je  $\bigwedge s$  rovno  $\bigwedge s'$  a  $\bigvee s$  rovno  $\bigvee s'$  pro nějaké prosté očíslování  $s'$  množiny  $s$ .

## Sémantika výroků.

### 2.1.3. Modely výrokového jazyka a teorie. Sémantická ekvivalence výroků.

1. *Pravdivostní ohodnocení*  $\mathbb{P}$  čili *model výrokového jazyka nad*  $\mathbb{P}$  je funkce  $v \in {}^{\mathbb{P}}2$ . *Hodnota*  $\bar{v}(\varphi)$  *výroku*  $\varphi$  *z*  $\text{VF}_{\mathbb{P}}$  *v ohodnocení*  $v$  je hodnota  $\varphi$  v  $\mathbb{F}_{\mathbb{P}}$ -struktuře

$$\langle 2, v(p), -1, \rightarrow_1 \rangle_{p \in \mathbb{P}}.$$

Tedy  $\bar{v}$  je funkce  $\bar{v} : \text{VF}_{\mathbb{P}} \rightarrow 2$  sestavená rekurzí pravidly:

$$\bar{v}(p) = v(p), \quad \bar{v}(\neg\varphi) = -1\bar{v}(\varphi), \quad \bar{v}(\varphi \rightarrow \psi) = \rightarrow_1(\bar{v}(\varphi), \bar{v}(\psi)).$$

Když  $\bar{v}(\varphi) = 1$ , říkáme, že  $\varphi$  *platí* či *je splněno ve*  $v$  a také, že  $v$  je *model*  $\varphi$ . Dále je  $v$  *model teorie*  $T \subseteq \text{VF}_{\mathbb{P}}$ , když je modelem každého axiomu  $T$ ; píšeme

$$v \models T$$

a místo  $v \models \{\varphi\}$  píšeme  $v \models \varphi$ . Místo  $\bar{v}(\varphi)$  píšeme stručněji  $v(\varphi)$ .

2. Pro  $T \subseteq \text{VF}_{\mathbb{P}}$  je  $\text{M}^{\mathbb{P}}(T)$  *třída všech modelů teorie*  $T$ :

$$\text{M}^{\mathbb{P}}(T) = \{v \in {}^{\mathbb{P}}2; v \models T\}.$$

Místo  $\text{M}^{\mathbb{P}}(T \cup \{\varphi_1, \dots, \varphi_k\})$  píšeme  $\text{M}^{\mathbb{P}}(T, \varphi_1, \dots, \varphi_k)$  a  $T$  vynecháme, je-li  $\emptyset$ . Dále  $-\text{M}^{\mathbb{P}}(T)$  značí  ${}^{\mathbb{P}}2 - \text{M}^{\mathbb{P}}(T)$ ; je to *komplement třídy*  $\text{M}^{\mathbb{P}}(T)$ .

3. Buď  $T \subseteq \text{VF}_{\mathbb{P}}$ . Formule  $\varphi, \psi$  z  $\text{VF}_{\mathbb{P}}$  jsou  *$T$ -sémanticky ekvivalentní*, když platí  $\text{M}^{\mathbb{P}}(T, \varphi) = \text{M}^{\mathbb{P}}(T, \psi)$ ; píšeme

$$\varphi \sim_T \psi.$$

Vynecháme  $T$ , je-li  $\emptyset$ ; místo  $\emptyset$ -sémanticky ekvivalentní tedy říkáme *sémanticky ekvivalentní* a máme  $\varphi \sim \psi \Leftrightarrow \text{M}^{\mathbb{P}}(\varphi) = \text{M}^{\mathbb{P}}(\psi)$ .

**ÚMLUVA.** Symbol  $\mathbb{P}$  můžeme vynechat, nevede-li to k nedorozumění. Mluvíme tak např. jen o výrocích, místo  $\text{VF}_{\mathbb{P}}$  píšeme  $\text{VF}$ , místo  $\text{M}^{\mathbb{P}}$  jen  $\text{M}$  atd.



Snadno se zjistí, že pro  $T \subseteq VF$  a  $\emptyset \neq \mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(VF)$  platí:

$$T' \subseteq T \Rightarrow M(T) \subseteq M(T'), \quad M(\bigcup \mathcal{T}) = \bigcap \{M(T); T \in \mathcal{T}\}.$$

*Budťe  $v \in {}^{\mathbb{P}}2$ ,  $\varphi, \psi \in VF_{\mathbb{P}}$ .*

1) a) *Pro  $v \in {}^{\mathbb{P}}2$  závisí  $v(\varphi)$  jen na hodnotách  $v$  na  $\text{var}(\varphi)$ .*

b)  *$v(\varphi \diamond \psi) = v(\varphi) \diamond_1 v(\psi)$  pro  $\diamond$  rovnou  $\vee, \wedge, \leftrightarrow$ .*

2) *Budť  $\mathbb{P}$  konečné,  $K \subseteq {}^{\mathbb{P}}2$ ; označme  $-K = {}^{\mathbb{P}}2 - K$ . Pak*

$$M^{\mathbb{P}}(\bigvee_{w \in K} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{w(p)}) = K = M^{\mathbb{P}}(\bigwedge_{w \in -K} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{-1w(p)}).$$

3) *Formule  $\varphi$  je sémanticky ekvivalentní formuli jak v disjunktivně normálním tvaru, tak formuli v konjunktivně normálním tvaru.*

Důkaz. 1) a) se dokáže snadno indukcí na výrocích. b) plyne ihned z definic.

2) Pro  $v, w \in {}^{\mathbb{P}}2$  máme  $v(p^{w(p)}) = 1 \Leftrightarrow v(p) = w(p)$ . Tedy  $v(\bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{w(p)}) =$

$1 \Leftrightarrow v = w$ . Odtud a užitím 1) b):  $v(\bigvee_{p \in \mathbb{P}} \bigwedge_{p \in \mathbb{P}} p^{w(p)}) = 1 \Leftrightarrow v \in K$ . Podobně

$v(\bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{-1w(p)}) = 1 \Leftrightarrow v \neq w$  a tedy  $v(\bigwedge_{p \in \mathbb{P}} \bigvee_{p \in \mathbb{P}} p^{-1w(p)}) = 1 \Leftrightarrow v \notin -K \Leftrightarrow v \in K$ .

3) Pro  $\mathbb{P}$  konečné to dává 2) s  $K = M^{\mathbb{P}}(\varphi)$ . Díky 1) a) to platí pro každé  $\mathbb{P}$ .  $\square$

TVRZENÍ 2.1.5. (O třídách modelů formulí v teorii. Definice  $AM_T$ .)

*Budť  $T \subseteq VF$*

*s  $M(T) \neq \emptyset$ . Pak*

$$M(T, \neg\varphi) = M(T) - M(T, \varphi), \quad M(T, \perp) = \emptyset, \quad M(T, \top) = M(T),$$

$$M(T, \varphi \diamond \psi) = M(T, \varphi) \diamond' M(T, \psi), \quad \text{kde } \diamond \text{ je } \vee, \& \text{ a } \diamond' \text{ je } \cup, \cap.$$

*Důsledky.*

a)  $AM_T = \{M(T, \varphi); \varphi \in VF\}$  je univerzum podalgebry algebry  $\mathcal{P}(M(T))$ . Uve-

dená podalgebra se nazývá algebra tříd modelů formulí v  $T$  a značíme ji  $AM_T$ .

b) Chápeme-li  $\neg, \vee, \&, \perp, \top$  jako operace na  $VF_{\mathbb{P}}$ , platí o nich booleovské zákony,

tj. asociativita, komutativita, distributivita, absorbce a kompletace, nahradíme-li

v nich  $=$  vztahem  $\sim_T$ . Z nich plynou dále: idempotence, extremalita, neutralita

a de Morganovy zákony.

Důkaz. Prvá část tvrzení plyne ihned z definic. Důsledek a) je bezprostřední, neboť

uvedené rovnosti zaručují uzavřenost  $AM_T$  na komplement do  $M(T)$ ,  $\cup, \cap$  a  $\emptyset$ . Důsle-

dek b). Máme  $M(T, \varphi \vee \psi) = M(T, \varphi) \cup M(T, \psi) = M(T, \psi) \cup M(T, \varphi) = M(T, \psi \vee \varphi)$ .

Tedy  $\varphi \vee \psi \sim_T \psi \vee \varphi$ . Podobně je tomu s komutativitou  $\&$ , asociativitou  $\vee$  atd.  $\square$

TVRZENÍ 2.1.6. (O sémantické ekvivalenci.)

*Vznikne-li formule  $\varphi'$  z  $\varphi$  nahrazením*

*některého výskytu podformule  $\psi$  formulí  $\psi'$ , tak  $\psi \sim_T \psi' \Rightarrow \varphi \sim_T \varphi'$ .*

Důkaz. Indukcí na výrocích. Pro prvovýrok  $\varphi$  to jasně platí. Je-li  $\varphi$  tvaru  $\neg\varphi_0$ , je

budť uvažovaný výskyt formule  $\psi$  právě  $\varphi$  a je to jasné, nebo to je výskyt ve  $\varphi_0$ .

Pak z indukčního předpokladu máme  $M(\varphi_0) = M(\varphi'_0)$  a tedy i  $\varphi \sim_T \varphi'$ . Podobně,

je-li  $\varphi$  tvaru  $\varphi_0 \rightarrow \varphi_1$ .  $\square$

APLIKACE. Důsledek b) z 2.1.5 a 2.1.6 lze užít k nalézání sémantických ekviva-

lentů. Např.:  $(p \rightarrow q) \& q \sim (\neg p \vee q) \& q \sim (\neg p \& q) \vee (q \& q) \sim (\neg p \& q) \vee q \sim q$ .

1.  $\sim$  plyne užitím tvrzení o sémantické ekvivalenci a díky  $p \rightarrow q \sim \neg p \vee q$ , 2.

$\sim$  dává distributivní zákon, 3.  $\sim$  idempotence, 4. absorbce. Získali jsme zároveň

k formuli  $(p \rightarrow q) \& q$  sémantické ekvivalenty v konjunktivně normálním tvaru i

v disjunktivně normálním tvaru.

2.1.7. Pravdivost a lživost výroku v teorii. Nezávislá a splnitelná formule.

Budť  $T \subseteq VF_{\mathbb{P}}$ ,  $\varphi \in VF_{\mathbb{P}}$ .

• Formule  $\varphi$  je *pravdivá* v  $T$ , když  $\varphi$  platí v každém modelu v teorii  $T$ ; píšeme

$$T \models \varphi.$$

- Formule  $\varphi$  je *lživá* v  $T$ , neplatí-li v žádném modelu teorie  $T$ , čili když  $T \models \neg\varphi$ . Množinu všech  $\mathbb{P}$ -formulí pravdivých resp. lživých v  $T$  značíme

$$\Theta_{\mathbb{P}}(T) \quad \text{resp.} \quad \Theta'_{\mathbb{P}}(T).$$

- Není-li  $\varphi$  ani pravdivá ani lživá v  $T$ , je  $\varphi$  *nezávislá* v  $T$ .
- Není-li  $\varphi$  lživá v  $T$ , je *splnitelná* v  $T$  a též *konzistentní* s  $T$ .
- Když  $T \models \varphi \rightarrow \psi$ , je  $\varphi$  *silnější než*  $\psi$  a  $\psi$  *slabší než*  $\varphi$  v  $T$ .

Je-li  $T$  prázdná teorie, říkáme "v (s)  $T$ " vynecháváme. Místo  $\varphi$  je pravdivá resp. lživá také říkáme, že  $\varphi$  je *tautologie* resp. *lež*. Množina všech tautologií resp. splnitelných výroků se značí též  $\text{TAUT}_{\mathbb{P}}$  resp.  $\text{SAT}_{\mathbb{P}}$ .

Místo  $\emptyset \models \varphi$  píšeme  $\models \varphi$ , místo  $\{\varphi_0, \dots, \varphi_{n-1}\} \models \varphi$  též jen  $\varphi_0, \dots, \varphi_{n-1} \models \varphi$ .

**TVRZENÍ 2.1.8.** (Vlastnosti  $\Theta(T)$ .) *Budte  $T, S$  teorie. Pak platí:*

- 1)  $\mathbf{M}(\Theta(T)) = \mathbf{M}(T)$ .
- 2)  $T \subseteq \Theta(T)$ ,  $T \subseteq S \Rightarrow \Theta(T) \subseteq \Theta(S)$ ,  $\Theta(T) = \Theta(\Theta(T))$ .

*Důkaz.* 1) Jelikož  $v \models T \Rightarrow v \models \Theta(T)$ , máme  $\mathbf{M}(T) \subseteq \mathbf{M}(\Theta(T))$ . Inkluze  $\supseteq$  plyne z  $T \subseteq \Theta(T)$ . Druhé tvrzení z 2) plyne snadno. Jelikož  $T \models \varphi \Leftrightarrow \mathbf{M}(T) \subseteq \mathbf{M}(\varphi)$ , dostaneme i třetí tvrzení z 2) užitím 1):  $\varphi \in \Theta(\Theta(T)) \Leftrightarrow \Theta(T) \models \varphi \Leftrightarrow \mathbf{M}(\Theta(T)) \subseteq \mathbf{M}(\varphi) \Leftrightarrow \mathbf{M}(T) \subseteq \mathbf{M}(\varphi) \Leftrightarrow T \models \varphi \Leftrightarrow \varphi \in \Theta(T)$ .  $\square$

**TVRZENÍ 2.1.9.** (Vztahy  $\models$  a  $\mathbf{M}$ .) *Pro teorii  $T$  a formule  $\varphi, \psi$  jejího jazyka platí:*

- 1)  $T \models \varphi \Leftrightarrow \mathbf{M}(T) \subseteq \mathbf{M}(\varphi)$
- 2)  $T \models \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \mathbf{M}(T, \varphi) \subseteq \mathbf{M}(T, \psi) \Leftrightarrow \mathbf{M}(T, \varphi) \subseteq \mathbf{M}(\psi) \Leftrightarrow T, \varphi \models \psi$
- 3)  $T \models \varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow \mathbf{M}(T, \varphi) = \mathbf{M}(T, \psi)$

*Důkaz* plyne snadno z definic.  $\square$

**VĚTA 2.1.10.** (Vlastnosti  $\models$ .) *Pro teorii  $T$  a formule  $\varphi, \psi, \chi$  jejího jazyka platí:*

- 1)
 

$T \models \varphi \rightarrow \psi$	$\Leftrightarrow$	$T \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$
$T \models \varphi \leftrightarrow \psi$	$\Leftrightarrow$	$T \models \varphi \rightarrow \psi$ a $T \models \psi \rightarrow \varphi$
$T \models \varphi \& \psi$	$\Leftrightarrow$	$T \models \varphi$ a $T \models \psi$
$T \models \varphi \vee \psi$	$\Leftarrow$	$T \models \varphi$ nebo $T \models \psi$
$T \models \varphi \rightarrow \psi$ a $T \models \varphi$	$\Rightarrow$	$T \models \psi$
$T \models \varphi \rightarrow \psi$ a $T \models \psi \rightarrow \chi$	$\Rightarrow$	$T \models \varphi \rightarrow \chi$
$T \models \varphi \leftrightarrow \psi$ a $T \models \psi \leftrightarrow \chi$	$\Rightarrow$	$T \models \varphi \leftrightarrow \chi$
$T \models \varphi \leftrightarrow \psi$	$\Rightarrow$	$(T \models \varphi \Leftrightarrow T \models \psi)$
- 2) (*Rozbor případů.*)  $T \models (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Leftrightarrow (T \models \varphi \rightarrow \chi \text{ a } T \models \psi \rightarrow \chi)$   
*Speciálně:*  $T \models \varphi \rightarrow \psi$  a  $T \models \neg\varphi \rightarrow \psi \Rightarrow T \models \psi$

*Důkaz.* 1)  $T \models \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \mathbf{M}(T, \varphi) \subseteq \mathbf{M}(T, \psi) \Leftrightarrow \neg\mathbf{M}(T, \psi) \subseteq \neg\mathbf{M}(T, \varphi) \Leftrightarrow \mathbf{M}(T, \neg\psi) \subseteq \mathbf{M}(T, \neg\varphi) \Leftrightarrow T \models \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$ . Užili jsme 2.1.9. Podobně nebo užitím již dokázaného plynou další položky.

2)  $T \models (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Leftrightarrow \mathbf{M}(\varphi \vee \psi) \subseteq \mathbf{M}(\chi) \Leftrightarrow \mathbf{M}(\varphi) \subseteq \mathbf{M}(\chi)$  a  $\mathbf{M}(\psi) \subseteq \mathbf{M}(\chi) \Leftrightarrow T \models \varphi \rightarrow \chi$  a  $T \models \psi \rightarrow \chi$ .  $\square$

**2.1.11.** Extenze teorie, ekvivalentní, konečně axiomatizovatelné a kompletní teorie.

Budte  $T, S$  výrokové teorie.

1. Teorie  $S$  je *extenze*  $T$ , když  $\mathbb{P}(T) \subseteq \mathbb{P}(S)$  a  $\Theta(T) \subseteq \Theta(S)$ . Je-li  $\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(S)$ , je to *jednoduchá* extenze. Teorie  $T$  je *ekvivalentní* s  $S$ , je-li každá z nich extenzí druhé. Teorie je *konečně axiomatizovatelná*, je-li ekvivalentní teorii s konečně axiomaty.

2. Teorie  $T$  je *kompletní*, jestliže má model a pro každou formuli  $\varphi$  jejího jazyka je  $T \models \varphi$  nebo  $T \models \neg\varphi$ , tj.  $T$  nemá nezávislý výrok.

**TVRZENÍ 2.1.12.** *Budte  $T, S$  výrokové teorie v témže jazyce.*

- 1) *Teorie  $S$  je extenze  $T$ , právě když  $M(S) \subseteq M(T)$ . Teorie  $S$  je ekvivalentní s  $T$ , právě když  $M(S) = M(T)$ .*
- 2) *Teorie  $T$  je kompletní, právě když má právě jeden model.*

**Důkaz.** 1) Platí  $T' \subseteq T \Rightarrow M(T) \subseteq M(T')$ . Užijeme-li ještě 2.1.8, 1), dostaneme požadované. 2) Má-li  $T$  právě jeden model, je jasně kompletní. Nechť naopak  $T$  má alespoň dva různé modely  $v, w$ ; existuje prvovýrok  $p$  s  $v(p) \neq w(p)$ . Pak  $p$  je nezávislý výrok  $T$ .  $\square$

**APLIKACE.** Základní analýza teorií nad konečně prvovýroky.

Buď  $\mathbb{P}$  velikosti  $l \in \mathbb{N}$ ,  $T$  nějaká  $\mathbb{P}$ -teorie. Pomocí 2.1.9 a 2.1.12 lze zjistit počet pravdivých, lživých a nezávislých výroků  $T$  až na sémantickou ekvivalenci  $\sim$ , dále počet neekvivalentních jednoduchých (kompletních) extenzí  $T$ , počet nezávislých výroků  $T$  až na  $\sim_T$  apod. Např. počet pravdivých výroků  $\varphi$  teorie  $T$  až na  $\sim$  je  $2^{2^l - |M(T)|}$ , neboť různých  $M(\varphi)$  takových, že  $M(T) \subseteq M(\varphi)$  je tolik, kolik je podmnožin množiny  $\mathbb{P}_2 - M(T)$ .

### Sémantická kompaktnost. Axiomatizovatelnost.

**VĚTA 2.1.13.** (O sémantické kompaktnosti.) *Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.*

**Důkaz.** Implikace zleva doprava je jasná. Dokážeme opačnou. Buď  $T$  teorie, jejíž každá konečná část má model; říkejme, že  $T$  je konečně splnitelná. Existuje maximální konečně splnitelná teorie  $S \supseteq T$ , tj. taková konečně splnitelná teorie  $S \supseteq T$ , jejíž každé vlastní rozšíření má konečnou část, která nemá model. Existence  $S$  plyne z principu maximality, aplikovaného na uspořádání

$$\{\{T'; T' \text{ je konečně splnitelná a } T' \supseteq T\}, \subseteq\};$$

to splňuje předpoklad principu maximality, že totiž každá lineárně uspořádaná podmnožina  $\mathbb{L}$  má majorantu – tou je jasně  $\bigcup \mathbb{L}$ . Tudíž uvažované uspořádání má maximální prvek  $S$ . Ukážeme, že  $S$  má model; ten je díky  $T \subseteq S$  i modelem  $T$ . Předně platí:

- (a)  $(\varphi \in S, \varphi \rightarrow \psi \in S) \Rightarrow \psi \in S$ ,      (b)  $\varphi \in S \Leftrightarrow \neg\varphi \notin S$ ,
- (c)  $\varphi \rightarrow \psi \in S \Leftrightarrow \neg\varphi \in S \text{ nebo } \psi \in S$ .

(a) je jasné, neboť  $S \cup \{\psi\}$  je konečně splnitelná. (b):  $\Rightarrow$  platí, neboť  $\{\varphi, \neg\varphi\}$  nemá model. Dokážeme  $\Leftarrow$ . Buď  $\neg\varphi \notin S$ ; dokážeme, že  $S \cup \{\varphi\}$  je konečně splnitelná – díky maximalitě pak  $\varphi \in S$ . Existuje  $S_0 \subseteq S$  konečná tak, že  $S_0 \cup \{\neg\varphi\}$  nemá model. Pro  $S' \subseteq S$  konečnou existuje model  $v \models S' \cup S_0$ ; ovšem  $v(\varphi) = 1$  a jsme hotovi. (c) Implikace  $\Rightarrow$ . Když  $\neg\varphi \notin S$ , tak  $\varphi \in S$  dle (b) a pak  $\psi \in S$  dle (a). Implikace  $\Leftarrow$ . Když  $\neg\varphi \in S$ , pro  $S' \subseteq S$  konečnou existuje model  $v \models S' \cup \{\neg\varphi\}$ ; pak  $v(\varphi \rightarrow \psi) = 1$  a vidíme, že  $S \cup \{\varphi \rightarrow \psi\}$  je konečně splnitelná. Stejně je tomu, když  $\psi \in S$ .

Definujme nyní  $v \in \mathbb{P}_2$  takto:  $v(p) = 1 \Leftrightarrow p \in S$ . Pak pro každou formuli  $\varphi$  platí  $v(\varphi) = 1 \Leftrightarrow \varphi \in S$ , což plyne indukcí na formulích: pro prvovýrok  $\varphi$  to vyplývá z definice, indukční krok pro  $\neg$  resp.  $\rightarrow$  plyne užitím (b) resp. (c).  $\square$

### 2.1.14. Axiomatizovatelné množiny ohodnocení. Elementární konjunkce $\varepsilon_\sigma$ .

1. Množina  $K \subseteq \mathbb{P}_2$  je *axiomatizovatelná* resp. *konečně axiomatizovatelná*, existuje-li teorie resp. konečná teorie  $T$  tak, že  $K = M(T)$ . Je-li  $K$  konečně axiomatizovatelná, je zřejmě  $K = M(\varphi)$  pro nějakou formuli  $\varphi$ .

2. Pro funkci  $\sigma \subseteq \mathbb{P} \times 2$  značíme

$$\tilde{\sigma} = \{v \in \mathbb{P}_2; \sigma \subseteq v\}.$$

Pro konečnou funkci  $\sigma \subseteq \mathbb{P} \times 2$  je *elementární konjunkce určená  $\sigma$  formule*  $\bigwedge_{p \in \text{dom}(\sigma)} p^{\sigma(p)}$ ; značíme ji  $\varepsilon_\sigma$ . Platí:  $M(\varepsilon_\sigma) = \tilde{\sigma}$ .

Bud'  $K \subseteq \mathbb{P}_2$ . Řekneme, že  $v \in \mathbb{P}_2$  je *oddělené* od  $K$ , když existuje  $\sigma \subseteq v$  konečné s  $\tilde{\sigma} \cap K = \emptyset$ . Dále  $K$  je *uzavřená*, když  $K$  obsahuje každé  $v$ , které není oddělené od  $K$ .  $K$  je *otevřená* resp. *obojetná*, je-li komplement  $\mathbb{P}_2 - K$  uzavřená resp.  $K$  i její komplement jsou uzavřené. Zřejmě  $\emptyset, \mathbb{P}_2$  jsou uzavřené.

Z definic ihned plyne:

- K1) a) Průnik neprázdného systému uzavřených množin je uzavřená množina.  
 b) Sjednocení konečně mnoha uzavřených množin je uzavřená množina.  
 K2) Bud'  $K \subseteq \mathbb{P}_2$ . Pak:  
 a)  $v \in \mathbb{P}_2 - K$  je oddělená od  $K \Leftrightarrow$  existuje  $\psi$  s  $v \in M(\psi)$  a  $M(\psi) \cap K = \emptyset$ .  
 b)  $K$  je uzavřená  $\Leftrightarrow$  pro každou  $v \in \mathbb{P}_2 - K$  existuje  $\psi$  s  $v \in M(\psi)$  a  $M(\psi) \cap K = \emptyset$ .

VĚTA 2.1.15. (O axiomatizovatelnosti.)

- 1) Množina  $K \subseteq \mathbb{P}_2$  je konečně axiomatizovatelná, právě když ona i její komplement jsou axiomatizovatelné.
- 2) a) Množina  $K \subseteq \mathbb{P}_2$  je axiomatizovatelná, právě když je uzavřená.  
 b) Množina  $K \subseteq \mathbb{P}_2$  je konečně axiomatizovatelná, právě když je obojetná.

*Důkaz.* 1) Implikace  $\Rightarrow$  je jasná. Dokážeme opačnou. Necht'  $T, S$  jsou takové teorie, že  $K = M(T) = -M(S)$ . Pak  $M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = \emptyset$ , tedy díky kompaktnosti existují  $T' \subseteq T$ ,  $S' \subseteq S$  konečné tak, že  $T' \cup S'$  nemá model; pak  $\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$ . Konečně  $M(T) \subseteq M(T') \subseteq -M(S') \subseteq -M(S) \subseteq M(T)$ , tedy  $M(T) = M(T')$ .

2) a) Implikace  $\Leftarrow$ . Dle K2) b) je  $-K = \bigcup_{\psi \in S} M(\psi)$  pro jistou množinu  $S$  formulí. Pak  $K = \bigcap_{\psi \in S} M(\neg\psi)$  a tedy  $K = M(T)$  s  $T = \{\neg\psi; \psi \in S\}$ .

Implikace  $\Rightarrow$ . Předně je  $M(\varphi)$  uzavřená. Pro  $v$  z  $-M(\varphi)$  je totiž  $v \in M(\psi_i)$  s jistou  $\psi_i$ , přičemž  $\bigvee_{i < n} \psi_i$  je disjunktivně normální tvar  $\neg\varphi$  s elementárními konjunkcemi  $\psi_i$ ; uzavřenost  $M(\varphi)$  plyne z K2) b). Je-li nyní  $K = M(T)$ , je  $K = \bigcap_{\varphi \in T} M(\varphi)$  a uzavřenost  $K$  plyne z K1) a).

b) je důsledek 1) a 2) a). □

## 2.2 Dedukce. Úplnost výrokové logiky

Dedukce je vyvozování formulí z jistých předpokladů, a to podle pravidel dedukce. Předpoklady jsou představovány axiomy nějaké teorie  $T \subseteq VF$ ; vždy k nim přidáváme množinu LAX tzv. *logických axiomů*, což jsou jisté pravdivé formule. Pravidlo dedukce je obecně zobrazení, které nějakým konečně mnoha formulí přiřadí jednu jako jejich důsledek, vyvozený podle tohoto pravidla.

### 2.2.1. Logické axiomy a pravidlo dedukce.

1. Logické výrokové axiomy LAX jsou dány následujícími schematy formulí:

$$(PL1) \quad \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$(PL2) \quad (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$$

$$(PL3) \quad (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

2. V seznamu axiomů teorie  $T$  logické axiomy nadále neuvádíme. Říkáme pak, že formule z  $T$  jsou *mimologické axiomy* teorie  $T$ .

3. Pravidlo dedukce je ve výrokové logice jediné, a to *pravidlo odloučení* neboli *modus ponens* (MP):

$$\text{z } \varphi, \varphi \rightarrow \psi \text{ odvod } \psi.$$

Formálně jde o zobrazení  $MP(\varphi, \varphi \rightarrow \psi) = \psi$ .

### 2.2.2. Důkaz, dokazatelná formule čili teorém. Sporná a bezesporná teorie.

Buď  $T$  teorie.

1. *Důkaz v  $T$*  je  $\{\text{MP}\}$ -odvození z  $T \cup \text{LAX}$ ; je to *důkaz formule*, která je jeho posledním členem. Formule  $\varphi$  je *dokazatelná v  $T$*  čili to je *teorém v  $T$* , existuje-li nějaký její důkaz v  $T$ ; píšeme pak

$$T \vdash \varphi.$$

Formule  $\varphi$  je *vyvratitelná* a též *spor v  $T$* , když  $T \vdash \neg\varphi$ . Když  $T = \emptyset$ , vypouštíme v uvedených pojmech výraz „v  $T$ “ či jej nahradíme výrazem „logicky“. Množinu všech teorémů teorie  $T$  značíme

$$\text{Thm}(T) \quad \text{nebo} \quad \text{Thm}_T.$$

Tedy  $\text{Thm}(T)$  je  $\{\text{MP}\}$ -uzávěr  $T \cup \text{LAX}$ . Speciálně jsou teorémy teorie  $T$  definovány induktivně pravidly:

- Každý axiom teorie  $T$  a každý logický axiom je teorém teorie  $T$ .
- Jsou-li  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi$  teorémy teorie  $T$ , je  $\psi$  teorém teorie  $T$ .

2. Teorie  $T$  je *sporná*, je-li v ní dokazatelná každá formule; jinak je *bezesporná*.

TVRZENÍ 2.2.3.

- 1) (O korektnosti.) *Každá v  $T$  dokazatelná formule je v  $T$  pravdivá.*
- 2) *Má-li teorie model, je bezesporná.*

*Důkaz.* 1) Indukcí na teorémech. Každý axiom z  $T$  nebo logický je v  $T$  pravdivý. Jsou-li  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi$  pravdivé v  $T$  je takové i  $\psi$ . 2)  $\varphi$  a  $\neg\varphi$  nejsou zároveň platné v žádném modelu.  $\square$

Níže dokážeme i opačnou implikaci k tvrzení o korektnosti a získáme tak zásadní větu o úplnosti výrokové logiky: formule je v  $T$  dokazatelná, právě když je v  $T$  pravdivá. Její důkaz se opírá o větu o existenci modelu bezesporné teorie – vše je formulováno v 2.2.6.

VĚTA 2.2.4. *Buďte  $\varphi, \psi$  formule výrokové teorie  $T$ .*

- 1)  $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ .
- 2) (O dedukci.)  $T, \psi \vdash \varphi \Leftrightarrow T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ .

*Důkaz.* 1) Nechť  $\psi$  je  $\varphi \rightarrow \varphi$ ; pak jsou výrokovými axiomy formule  $\varphi \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi), \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi))$ . Užitím modus ponens tedy  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$  a opět dle modus ponens  $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ .

2) Implikace  $\Leftarrow$  plyne ihned užitím modus ponens. Buď nyní  $T, \psi \vdash \varphi$ ; dokážeme  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ , a to indukcí na teorémech teorie  $T, \psi$ . Buď  $\varphi$  axiom teorie  $T, \psi$ . Je-li  $\varphi$  rovno  $\psi$ , je  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$  dle 1). Pro  $\varphi \in T \cup \text{LAX}$  plyne z (PL1) užitím modus ponens žádané  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ . Buď konečně  $\varphi$  odvozeno pomocí modus ponens z  $\chi, \chi \rightarrow \varphi$  a pro teorémy  $\chi, \chi \rightarrow \varphi$  teorie  $T, \psi$  nechť to platí. Odtud a z výrokového axiomu  $(\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$  užitím modus ponens získáme  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ .  $\square$

LEMMA 2.2.5. *Pro výroky  $\varphi, \psi$  platí:*

- |  |   |
|--|---|
| a) $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi), \quad \{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \psi$ | c) $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ |
| $\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$  | d) $\vdash \varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi))$ |
| b) $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi, \quad \vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$          | e) $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$                     |

*Důkaz.* a)  $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$  dle (PL1), z věty o dedukci  $\neg\varphi \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$ . Odtud, užitím (PL3) a modus ponens získáme  $\neg\varphi \vdash \varphi \rightarrow \psi$  a užitím věty o dedukci prvý dokazovaný vztah a zbývající dva z něj užitím věty o dedukci.

b)  $\neg\neg\varphi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$  dle a) a věty o dedukci, tedy  $\neg\neg\varphi \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$  užitím (PL3), tedy  $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$  a konečně  $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$ . Odtud a užitím (PL3) plyne i  $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ .

c)  $\neg\neg\varphi, \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi, \neg\psi$  dle b) a modus ponens, tedy dle věty o dedukci  $\varphi \rightarrow \psi \vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi$ , dle (PL3), modus ponens a díky větě o dedukci  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ .

d) Je  $\varphi \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \psi$ , dle c)  $\varphi \vdash \neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \psi)$  a věta o dedukci dá žádaný vztah.

e)  $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg(\neg\varphi \rightarrow \varphi))$  dle d),  $\neg\varphi \vdash \neg(\neg\varphi \rightarrow \varphi)$  pomocí věty o dedukci, odtud  $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$  užitím (PL3) a modus ponens.  $\square$

**VĚTA 2.2.6.** *Bud'  $\varphi, \psi$  formule teorie  $T$ .*

- 1) a) *Teorie  $T$  je sporná, právě když je v ní dokazatelný spor.*  
b) (Důkaz sporem.)  $T, \neg\varphi$  je sporná  $\Leftrightarrow T \vdash \varphi$ .
- 2) *Bud'  $T$  maximální bezesporná teorie. Pak platí:*  
a)  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi \in T \Leftrightarrow T, \varphi$  je bezesporná.  
b)  $\varphi \in T \Leftrightarrow \neg\varphi \notin T, \quad \varphi \rightarrow \psi \in T \Leftrightarrow \neg\varphi \in T$  nebo  $\psi \in T$ .  
c) *Ohodnocení v takové, že  $v(p) = 1 \Leftrightarrow p \in T$  pro každý prvovýrok  $p$ , je jediný model  $T$ .*
- 3) *Bezesporná teorie má maximální bezesporné rozšíření (v témže jazyce).*
- 4) (O existenci modelu.) *Teorie má model, právě když je bezesporná.*
- 5) (O kompaktnosti.) *Teorie má model, právě když každá její konečná podteorie má model.*
- 6) (O úplnosti.)  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow T \models \varphi$  platí pro každou teorii  $T$  a její formuli  $\varphi$ .

*Důkaz.* 1) a) Je-li  $\varphi$  spor, tj.  $\vdash \neg\varphi$ , a  $T \vdash \varphi$ , plyne z 2.2.5, a), že  $T \vdash \psi$  pro jakýkoli výrok  $\psi$ . b) Implikace  $\Rightarrow$ :  $T, \neg\varphi$  sporná implikuje  $T \vdash \neg\varphi \rightarrow \varphi$  užitím věty o dedukci. Pak  $T \vdash \varphi$  užitím z 2.2.5, e). Implikace  $\Leftarrow$  plyne z 2.2.5, a).

2) a)  $\Rightarrow$  v prvé  $\Leftrightarrow$  plyne z toho, že rozšíření bezesporné teorie o její teorém je bezesporné,  $\Leftarrow$  je jasná. Druhá  $\Leftrightarrow$  je zřejmá z definice maximální bezesporné teorie. b)  $\neg\varphi \notin T \Leftrightarrow T, \neg\varphi$  je sporná  $\Leftrightarrow T \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi \in T$  dle 2) a) a důkazu sporem. Tvzení o implikaci: Když  $\varphi \rightarrow \psi \in T$ , tak  $\neg\varphi \notin T$  plyne  $\varphi \in T$ ; pak  $T \vdash \psi$  a díky a) je  $\psi \in T$ . Když  $\neg\varphi \in T$ , tak  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$  díky 2.2.5, a), tedy  $\varphi \rightarrow \psi \in T$  díky a). Podobně když  $\psi \in T$ , tak  $T, \varphi \vdash \psi$ , tudíž  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$ . c) Platí  $\varphi \in T \Leftrightarrow v(\varphi) = 1$ , což plyne indukcí dle složitosti  $\varphi$  ihned užitím b); tedy  $v \models T$ . Konečně pro  $w \models T$  máme  $w(p) = 1 \Leftrightarrow p \in T$  pro každý prvovýrok  $p$ , tedy  $w = v$ .

3) plyne z principu maximality (ekvivalentního s axiomem výběru), aplikujeme-li jej na množinu všech bezesporných teorií  $S$  s  $S \supseteq T$ , na níž uvažujeme uspořádání inkluzí; každý řetězec  $R$  v popsaném uspořádání má majorantu, kterou je jeho sjednocení  $\bigcup R$ , neboť to je teorie, rozšiřující  $T$ , která je bezesporná, protože spor v ní je sporem v nějaké teorii z  $R$ .

4) Má-li  $T$  model  $v$  a  $T \vdash \varphi$ , tak  $\overline{v}(\varphi) = 1$ , tedy  $\overline{v}(\neg\varphi) = 0$ , tedy  $T \not\vdash \neg\varphi$  a  $T$  je bezesporná. Nechť je  $T$  bezesporná. Dle 3) existuje maximální bezesporná teorie  $T' \supseteq T$  a dle 2), c) existuje model teorie  $T'$ , což je i model  $T$ .

5) Plyne z 4) a z toho, že teorie je bezesporná, právě když je bezesporná každá její konečná podteorie.

6)  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$  je tvrzení o korektnosti. Bud' obráceně  $T \models \varphi$ . Pak je  $T, \neg\varphi$  sporná dle tvrzení o existenci modelu, tedy  $T \vdash \varphi$  dle důkazu sporem 1), b).  $\square$

**POZNÁMKA 2.2.7.** K existenci maximálního bezesporného rozšíření teorie  $T$  jsme potřebovali axiom výběru. Je-li  $T$  v jazyce s nejvýše spočetně prvovýroky, uvedené rozšíření se sestojí snadno indukci takto. Buď  $\{\varphi_n; 0 < n \in \omega\}$  očíslování formulí,  $T_0$  teorie  $T$  a  $T_{n+1}$  rovna teorii  $T_n \cup \{\varphi_{n+1}\}$ , je-li tato bezesporná, a rovna teorii  $T_n \cup \{\neg\varphi_{n+1}\}$  jinak. Pak  $\bigcup_{n \in \omega} T_n$  je hledané maximální rozšíření.

Uvedme několik důsledků věty o úplnosti.  
Je  $\text{Thm}(T) = \Theta(T)$ . Speciálně je  $T'$  extenze  $T$ , právě když  $\mathbb{P}(T) \subseteq \mathbb{P}(T')$  a  $\text{Thm}(T) \subseteq \text{Thm}(T')$ . Z 2.1.6 získáme syntaktickou verzi tvrzení o ekvivalenci: *Vznikne-li formule  $\varphi'$  z  $\varphi$  nahrazením některých výskytů podformule  $\psi$  formulí  $\psi'$ , tak  $T \vdash \psi \leftrightarrow \psi' \Rightarrow T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$ .* V 2.1.10 lze zaměnit  $\models$  za  $\vdash$ ; získaná tvrzení můžeme nazývat *deduktivní obraty výrokové logiky*.

## Syntaktické metody dokazování.

### 2.2.8. O syntaktických metodách dokazování.

Jde o metody prokazování dokazatelnosti formulí (v nějaké dané teorii  $T$ , to jest vztahu  $T \vdash \varphi$ ) jen pomocí syntaktických pojmů, tj. bez užití pojmu modelu, pravdivosti a věty o úplnosti. Typicky se užívají:

- Již syntakticky prokázané dokazatelnosti nějakých formulí, speciálně axiomů.
- Pravidlo MP, věta o dedukci, důkaz sporem a dále indukce.
- Obraty tvaru

$T \vdash \varphi_1, \dots, T \vdash \varphi_n \Rightarrow T \vdash \varphi$ , pokud  $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \varphi$  splňují – –, jsou-li získány syntakticky. Říkejme jim neformálně důkazová pravidla; pojem zavádíme jen k jistému zpřehlednění vyjadřování. Uvedme, že z  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$  plyne triviálně důkazové pravidlo  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \psi$ ; můžeme tak např. užívat jako důkazové pravidlo  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \neg\neg\varphi$  dle b) z 2.2.5, dále důkazové pravidlo  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \psi \rightarrow \varphi$  plynoucí z (PL1) apod. Další taková pravidla jsou obsažena např. v 2.2.9 3). Jiné důkazové pravidlo je obsaženo v 2.2.12 ve formulaci b).

Syntakticky prokázané jsou zatím

$$\vdash \varphi \rightarrow \varphi \text{ (viz 2.2.4),} \quad \text{a) } - \text{ e) z 2.2.5.}$$

Na a) – e) z 2.2.5 se budeme dále odvolávat jako na [a] – [e].

Abychom se mohli úsporně vyjadřovat, označme pro dvě množiny formulí  $T, S$  vlastnost, že každá formule z  $S$  je dokazatelná v  $T$ , symbolem

$$T \vdash S.$$

Znamená to právě, že  $\text{Thm}(S) \subseteq \text{Thm}(T)$ , neboť  $T \vdash S \Leftrightarrow S \subseteq \text{Thm}(T) \Leftrightarrow \text{Thm}(S) \subseteq \text{Thm}(T)$ ; to plyne díky známým vlastnostem uzávěru  $\text{Thm}$ . Zřejmě dále  $T \vdash S$  a  $S \vdash S' \Rightarrow T \vdash S'$ ; tomuto tvrzení říkáme *tranzitivita dedukce*. Speciálním případem je *tranzitivita  $\rightarrow$* :  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$  a  $T \vdash \psi \rightarrow \psi' \Rightarrow T \vdash \varphi \rightarrow \psi'$ . Místo  $T \vdash S$  a  $S \vdash S'$  můžeme psát stručně  $T \vdash S \vdash S'$ .

### TVRZENÍ 2.2.9.

- |   |   |
|---|---|
| 1) a) $\varphi \& \psi \vdash \varphi, \psi$  | b) $\varphi, \psi \vdash \varphi \& \psi$   |
| 2) a) $\varphi \leftrightarrow \psi \vdash \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \varphi\}$                              | b) $\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \varphi\} \vdash \varphi \leftrightarrow \psi$ |
| 3)  |   |
| $T \vdash \varphi \& \psi \Leftrightarrow T \vdash \varphi$ a $T \vdash \psi$   |   |
| $T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow T \vdash \varphi \rightarrow \psi$ a $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ |   |

*Pravidlo tranzitivity  $\leftrightarrow$ :*

$$T \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \text{ a } T \vdash \psi \leftrightarrow \chi \Rightarrow T \vdash \varphi \leftrightarrow \chi$$

**Důkaz.** Hlavní kroky důkazu píšeme do sloupce vlevo, vpravo pak argumentaci pro platnost kroku (opírající se o platnost předešlých kroků); přitom  $[x]$  je odvolání na položku x) z 2.2.5.



1) Připomeňme, že  $\varphi \& \psi$  je  $\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi)$ .

a)

$\varphi \& \psi \vdash \varphi$	$\varphi \& \psi \vdash \psi$
$\vdash \neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$ [a]	$\vdash \neg\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\psi)$ (PL1)
$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\neg\varphi$ [c], MP	$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\neg\psi$ [c], MP
$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \varphi$ [b], tranzitivita $\rightarrow$	$\vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \psi$ [b], tranzitivita $\rightarrow$
$\varphi \& \psi \vdash \varphi$ věta o dedukci	$\varphi \& \psi \vdash \psi$ věta o dedukci

b)

$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi))$ [d]	
$\varphi \vdash (\neg\neg\psi \rightarrow \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi))$ věta o dedukci	
$\varphi, \psi \vdash \neg(\varphi \rightarrow \neg\psi)$ [b], věta o dedukci	

2) Protože  $\varphi \leftrightarrow \psi$  je  $\varphi \rightarrow \psi \& \psi \rightarrow \varphi$ , plyne tvrzení ihned z 1).

3) Ekvivalence o  $\&$ . Z  $T \vdash \varphi \& \psi$  plyne pomocí 1) a)  $T \vdash \{\varphi, \psi\}$ , tj.  $\Rightarrow$  platí. Obdobně pomocí 1) b) plyne  $\Leftarrow$ . Ekvivalence o  $\leftrightarrow$  se dokáže stejně pomocí 2). Pravidlo tranzitivity  $\leftrightarrow$  plyne z předešlé  $\Leftrightarrow$  a z 1), 2).  $\square$

TVRZENÍ 2.2.10. *Následující ekvivalence jsou dokazatelné:*

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1) | $\varphi \leftrightarrow (\varphi \& \varphi)$                                  | <i>idempotence <math>\&amp;</math></i>          |
| 2) | $\varphi \& \psi \leftrightarrow \psi \& \varphi$                               | <i>komutativita <math>\&amp;</math></i>         |
| 3) | $(\varphi \& \psi) \& \chi \leftrightarrow \varphi \& (\psi \& \chi)$           | <i>asociativita <math>\&amp;</math></i>         |
| 4) | $\varphi \leftrightarrow \varphi$   | <i>reflexivita <math>\leftrightarrow</math></i> |
| 5) | $(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \varphi)$ | <i>symetrie <math>\leftrightarrow</math></i>    |
| 6) | $\varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$                                       | <i>idempotence <math>\neg</math></i>            |

Důkaz. 1) Z 2.2.9 1) a věty o dedukci máme  $\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \& \varphi)$ ,  $\vdash (\varphi \& \varphi) \rightarrow \varphi$ , dle 2.2.9 2) tedy  $\vdash \varphi \leftrightarrow (\varphi \& \varphi)$ . 2) Dle 2.2.9 1) je  $\varphi \& \psi \vdash \{\varphi, \psi\} \vdash \{\psi, \varphi\} \vdash \psi \rightarrow \varphi$ , tj.  $\vdash (\varphi \& \psi) \rightarrow (\psi \& \varphi)$ . Tudíž i  $\vdash (\psi \& \varphi) \rightarrow (\varphi \& \psi)$  a dokazovaná ekvivalence plyne z 2.2.9 2). 3) se dokáže zcela obdobně.

4) Je  $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ , dle 2.2.9 3) tedy i  $\vdash \varphi \leftrightarrow \varphi$ .

5)  $\varphi \leftrightarrow \psi \vdash \varphi \rightarrow \psi \& \psi \rightarrow \varphi \vdash \psi \rightarrow \varphi \& \varphi \rightarrow \psi \vdash \psi \leftrightarrow \varphi$  užitím definice  $\leftrightarrow$  a komutativity  $\&$ .

6) Je  $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ ,  $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$  dle [b], dle 2.2.9 3) tedy i  $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg\neg\varphi$ .  $\square$

TVRZENÍ 2.2.11. *Následující ekvivalence jsou dokazatelné:*

- |    |  |
|----|--|
| 1) | $(\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots))) \leftrightarrow ((\varphi_1 \& \varphi_2 \& \dots \& \varphi_n) \rightarrow \psi)$ |
| 2) | $(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \& (\psi \rightarrow \varphi))$  |
| 3) | $(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi)$  |

Důkaz. 1) Stačí ukázat dokazatelnost  $\rightarrow$  a  $\Leftarrow$ ; tvrzení pak plyne z 2.2.9 2) b). Dokažme  $\rightarrow$  indukcí dle  $n$ . Užitím 2.2.9 1) b), MP a indukčního předpokladu máme

$$\{\varphi_1 \& (\varphi_2 \& \dots \& \varphi_n), (\varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)))\} \vdash \{\varphi_2 \& \dots \& \varphi_n, \varphi_2 \rightarrow (\dots (\varphi_n \rightarrow \psi) \dots)\} \vdash \psi.$$

Zcela stejně plyne  $\Leftarrow$ .

2) Stačí ukázat dokazatelnost  $\rightarrow$  a  $\Leftarrow$ ; tvrzení pak plyne z 2.2.9 2) b). Implikace  $\rightarrow$  plyne z 2.2.9 2) a), 1) b) a tranzitivity dedukce, implikace  $\Leftarrow$  z 2.2.9 1) a), 2) b) a tranzitivity dedukce.

3) Stačí ukázat dokazatelnost  $\rightarrow$  a  $\Leftarrow$ ; tvrzení pak plyne z 2.2.9 2) b). Implikace  $\rightarrow$ .  $\varphi \leftrightarrow \psi, \neg\varphi \vdash \{\psi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\} \vdash \{\neg\varphi \rightarrow \neg\psi, \neg\varphi\} \vdash \neg\psi$  užitím 2.2.9, [c], MP; tedy  $\varphi \leftrightarrow \psi \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$ . Zcela stejně plyne  $\varphi \leftrightarrow \psi \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$ . Dle 2.2.9 2) b) tedy  $\varphi \leftrightarrow \psi \vdash \neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi$  a dle věty o dedukci i  $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi) \rightarrow (\neg\varphi \leftrightarrow \neg\psi)$ . Implikace  $\Leftarrow$  plyne zcela analogicky.  $\square$

**TVRZENÍ 2.2.12.** (O ekvivalenci.) *Vznikne-li formule  $\varphi'$  z  $\varphi$  nahrazením některého výskytu podformule  $\psi$  formulí  $\psi'$ , tak*

$$\text{a) } \vdash \psi \leftrightarrow \psi' \rightarrow \varphi \leftrightarrow \varphi', \quad \text{b) } T \vdash \psi \leftrightarrow \psi' \Rightarrow T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'.$$

*Důkaz.* Jasně je b) důsledkem a). Dokazujeme a). Je-li nahrazovaný výskyt  $\psi$  celá formule  $\varphi$ , je  $\varphi$  rovno  $\psi$  a  $\varphi'$  rovno  $\psi'$  a dokazované má tvar  $\vdash (\psi \rightarrow \psi') \rightarrow (\psi \rightarrow \psi')$ , což platí díky  $\vdash \chi \rightarrow \chi$ . Dále nechť nahrazovaný výskyt  $\psi$  není celá formule  $\varphi$ . Dokazujeme indukcí na výrocích. Je-li  $\varphi$  prvovýrok, je  $\varphi'$  rovno  $\varphi$  a jasně to platí.

Buď  $\varphi$  tvaru  $\neg\varphi_0$ . Máme

$$\psi \leftrightarrow \psi' \vdash \varphi_0 \leftrightarrow \varphi'_0 \vdash \neg\varphi_0 \leftrightarrow \neg\varphi'_0 \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi';$$

prvé  $\vdash$  plyne z indukčního předpokladu a z věty o dedukci, druhé  $\vdash$  z 2.2.11 3). Věta o dedukci dá  $\vdash \psi \leftrightarrow \psi' \rightarrow \varphi \leftrightarrow \varphi'$ .

Buď  $\varphi$  tvaru  $\varphi_0 \rightarrow \varphi_1$ . Pak  $\varphi'$  je  $\varphi'_0 \rightarrow \varphi'_1$  s tím, že v některém  $\varphi_i$  nahrazení neprovádíme; pak je  $\varphi'_i$  rovno  $\varphi_i$ . Stačí dokázat:  $\psi \leftrightarrow \psi' \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$ . Indukční předpoklad je  $\psi \leftrightarrow \psi' \vdash \{\varphi_0 \leftrightarrow \varphi'_0, \varphi_1 \leftrightarrow \varphi'_1\}$ . Pak  $\psi \leftrightarrow \psi', \varphi_0 \rightarrow \varphi_1, \varphi'_0 \vdash \varphi'_1$  a věta o dedukci dá  $\psi \leftrightarrow \psi' \vdash ((\varphi_0 \rightarrow \varphi_1) \rightarrow (\varphi'_0 \rightarrow \varphi'_1))$ , tj.  $\psi \leftrightarrow \psi' \vdash \varphi \rightarrow \varphi'$ . Zcela analogicky  $\psi \leftrightarrow \psi' \vdash \varphi' \rightarrow \varphi$ . Celkem díky 2.2.9 3) pak  $\psi \leftrightarrow \psi' \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$ .  $\square$

**TVRZENÍ 2.2.13.** *Následující ekvivalence jsou dokazatelné:*

- |    |   |                                       |
|----|---|---------------------------------------|
| 1) | $\neg(\varphi \& \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)$           | <i>de Morganův vztah</i>              |
| 2) | $\neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \& \neg\psi)$           | <i>de Morganův vztah</i>              |
| 3) | $\varphi \leftrightarrow \varphi \vee \varphi$                                | <i>idempotence <math>\vee</math></i>  |
| 4) | $\varphi \vee \psi \leftrightarrow \psi \vee \varphi$                         | <i>komutativita <math>\vee</math></i> |
| 5) | $(\varphi \vee \psi) \vee \chi \leftrightarrow \varphi \vee (\psi \vee \chi)$ | <i>asociativita <math>\vee</math></i> |

*Důkaz.* 1) Následující ekvivalence jsou dokazatelné; vpravo je uveden argument:

$$\begin{aligned} \neg(\varphi \& \psi) &\leftrightarrow \neg\neg(\varphi \rightarrow \neg\psi) && \text{zavedení } \& \\ &\leftrightarrow \varphi \rightarrow \neg\psi && \vdash \neg\neg\chi \leftrightarrow \chi \\ &\leftrightarrow \neg\neg\varphi \rightarrow \neg\psi && \text{věta o ekvivalenci, } \vdash \chi \leftrightarrow \neg\neg\chi \\ &\leftrightarrow \neg\varphi \vee \neg\psi && \text{zavedení } \vee. \end{aligned}$$

Z pravidla tranzitivity  $\leftrightarrow$  plyne  $\neg(\varphi \& \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)$ .

2) plyne stejně, jako 1).

3) – 5) plynou snadno z odpovídajících vlastností  $\&$ , de Morganových vztahů a již dokázaných vlastností  $\leftrightarrow$ .  $\square$

Podobně lze dále syntakticky dokázat pravidlo rozbor případů:

$$T \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Leftrightarrow (T \vdash \varphi \rightarrow \chi \text{ a } T \vdash \psi \rightarrow \chi).$$

Pomocí něj pak distributivnost konjunkce a disjunkce a další a další tvrzení. Speciálně tak syntakticky dokážeme výrokovou variantu ( $\wedge$  změněno na  $\&$ ,  $=$  na  $\leftrightarrow$ ) booleovských axiomů, což je asociativita, komutativita, distributivita  $\vee, \wedge$ , absorbce  $x \vee (x \wedge y) = x = x \wedge (x \vee y)$ , komplementace  $x \vee (-x) = 1, x \wedge (-x) = 0$ , a základních booleovských identit, což je idempotence  $x \vee x = x, x \wedge x = x, -(-x) = x$ , extremalita  $x \vee 1 = 1, x \wedge 0 = 0$ , neutralita  $x \vee 0 = x, x \wedge 1 = x$ , De Morgan  $x \wedge y = -(x \vee -y), x \vee y = -(-x \wedge -y)$ .

### Vícehodnotová sémantika výroků.

#### 2.2.14. Výroková evaluace a sémantika nad ní.

Ukážeme jistě abstraktní zobecnění výrokové sémantiky. Pomocí ní prokážeme nevývoditelnost některých axiomů výrokové logiky z jiných.

1. *Výroková evaluace* je struktura  $\underline{V} = \langle V, \neg^V, \rightarrow^V \rangle$ , kde

$$\{0, 1\} \subseteq V, \quad \neg^V \text{ je unární funkce, } \rightarrow^V \text{ je binární funkce.}$$

2. Pro *ohodnocení*  $v : \mathbb{P} \rightarrow \mathbf{V}$  výrokových proměnných ve  $\mathbf{V}$  je *hodnota*  $v^{\mathbf{V}}(\varphi)$  výroku  $\varphi$  hodnota  $\mathcal{F}_{\mathbb{P}}$ -designátoru  $\varphi$  ve struktuře

$$\langle \mathbf{V}, v(p)_{p \in \mathbb{P}}, \neg^{\mathbf{V}}, \rightarrow^{\mathbf{V}} \rangle,$$

tj. je sestrojena rekurzí pravidly:

$$v^{\mathbf{V}}(p) = v(p) \text{ je-li } \varphi \text{ z } \mathbb{P}, v^{\mathbf{V}}(\neg\varphi) = \neg^{\mathbf{V}}(v^{\mathbf{V}}(\varphi)), v^{\mathbf{V}}(\varphi \rightarrow \psi) = v^{\mathbf{V}}(\varphi) \rightarrow^{\mathbf{V}} v^{\mathbf{V}}(\psi).$$

Říkáme, že  $\underline{\mathbf{V}}$  je *MP-korektní*, pokud platí:

$$(v^{\mathbf{V}}(\varphi) = 1 \text{ a } v^{\mathbf{V}}(\varphi \rightarrow \psi) = 1) \Rightarrow v^{\mathbf{V}}(\psi) = 1.$$

Speciálním případem je výroková evaluace  $\langle 2, \neg_1, \rightarrow_1 \rangle$ , o které mluvíme jako o klasické dvouhodnotové výrokové evaluaci. Nad ní je sestrojena klasická dvouhodnotová sémantika výroků. Sestrojíme analogicky sémantiku nad  $\underline{\mathbf{V}}$ . Buď  $\varphi \in \mathbf{VF}_{\mathbb{P}}$ ,  $T \subseteq \mathbf{VF}_{\mathbb{P}}$ ,  $v : \mathbb{P} \rightarrow \mathbf{V}$ .

- $v \models^{\mathbf{V}} \varphi$  značí, že  $v^{\mathbf{V}}(\varphi) = 1$ .
- $v \models^{\mathbf{V}} T$  značí, že  $v \models^{\mathbf{V}} \varphi$  pro každé  $\varphi$  z  $T$ . Tedy  $v \models^{\mathbf{V}} \emptyset$  pro každé  $v : \mathbb{P} \rightarrow \mathbf{V}$ .
- $T \models^{\mathbf{V}} \varphi$  značí, že  $v \models^{\mathbf{V}} T \Rightarrow v \models^{\mathbf{V}} \varphi$ . Je-li  $T = \emptyset$ , nepíšeme je.
- $\varphi$  je  $^{\mathbf{V}}$ -*tautologie*, když  $\models^{\mathbf{V}} \varphi$ .

**TVRZENÍ 2.2.15.** (O korektnosti.) *Nechť  $\underline{\mathbf{V}}$  je MP-korektní výroková evaluace a  $T \subseteq \mathbf{VF}_{\mathbb{P}}$ . Když  $\varphi$  je  $\{\text{MP}\}$ -odvozeno z  $T$ , tak  $T \models^{\mathbf{V}} \varphi$ .*

*Důkaz.* Indukcí na prvcích z  $\{\text{MP}\}\langle T \rangle$ . Pro  $\varphi$  z  $T$  to platí a indukční krok plyne z korektnosti  $\underline{\mathbf{V}}$ .

2.2.16.

Buď  $T$  tvořeno právě schematy (PL1), (PL2).

1. Buď výroková evaluace  $\underline{\mathbf{V}} = \langle 3, \neg', \rightarrow' \rangle$  dána takto:

$\neg'$		$\rightarrow'$	0	1	2
0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	2
2	0	2	0	1	1

Platí:

a)  $\underline{\mathbf{V}}$  je MP-korektní a  $\models^{\mathbf{V}} T \cup \{\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)\}$ . Speciálně  $T \models^{\mathbf{V}} \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)$ .

b) Buďte  $p, q$  různé prvovýroky. Pak:

Není  $\models^{\mathbf{V}} (\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow p)$ .

Axiom  $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$  není  $\{\text{MP}\}$ -odvozený z  $T$ .

*Důkaz.* a) MP-korektnost je zřejmá.  $v^{\mathbf{V}}(\chi) = 1$  pro  $\chi$  z  $T \cup \{\varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi)\}$  se zjistí propočtem. b) Buď  $v(p) = 2$ ,  $v(q) = 1$ . Pak

$$v^{\mathbf{V}}((\neg p \rightarrow \neg q) \rightarrow (q \rightarrow p)) = (0 \rightarrow' 0) \rightarrow' (1 \rightarrow' 2) = 1 \rightarrow' 2 = 2.$$

Odtud a z 2.2.15 plyne, že axiom  $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$  není  $\{\text{MP}\}$ -odvozený z  $T$ .

2. Buď výroková evaluace  $\underline{\mathbf{W}} = \langle 3, \neg'', \rightarrow'' \rangle$  dána takto ( $\rightarrow''$  jako  $\rightarrow'$  z 1.):

$\neg''$		$\rightarrow''$	0	1	2
0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	2
2	2	2	0	1	1

Platí:

a)  $\underline{\mathbf{W}}$  je MP-korektní a  $\models^{\mathbf{W}} T$ .

b) Buďte  $p, q$  různé prvovýroky. Pak:

Není  $\models^{\mathbf{W}} p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$ .

Formule  $p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$  není  $\{\text{MP}\}$ -odvozená z  $T$ .

Je však  $T \models^{\mathbf{V}} p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$ .

Důkaz. a) MP-korektnost je zřejmá a  $v^W(\chi) = 1$  pro  $\chi$  z  $T$  se zjistí propočtem. b) Buď  $v(p) = 2$ ,  $v(q) = 0$ . Pak  $v^W(p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)) = 2 \rightarrow'' (\neg'' 2 \rightarrow'' 0) = 2 \rightarrow'' 0 = 0$ . Odtud a z 2.2.15 plyne, že formule  $p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$  není  $\{\text{MP}\}$ -odvozená z  $T$ . Konečně  $T \models^V p \rightarrow (\neg p \rightarrow q)$  víme z 1. a).



# Kapitola 3

## Predikátová logika

Stručný obsah kapitoly.

- Základní syntax. Model jazyka, platnost v modelu, platnost v teorii. Dedukce. Teorémy logiky a pravidla dokazování. Prenexní tvar.
- Existence modelu. Věta o úplnosti a kompaktnosti.
- Extenze teorie o funkční symbol a definicemi.
- 
- 
- 

Predikátová logika je základní a nejrozvinutější matematická verze logiky; její význam dokresluje i to, že v ní lze formulovat teorii množin, která je obecnouází pro veškerou matematiku. Predikátová logika se zabývá dokazováním a zjišťováním pravdivosti tvrzení o individuích, přičemž je k dispozici predikování o individuích, operování s nimi a kvantifikování typu „každé individuum“ a „existuje individuum“ (symbolicky  $(\forall x)$ ,  $(\exists x)$ ), a dále logické spojky; tím spolu se spočetně proměnnými jakožto symbolizacemi individuí je dán jazyk  $L$  v predikátové logice a korelativně množina  $Fm_L$  jeho formulí. Predikátové logice se také říká *logika 1. řádu*, anglicky *first order logic*, neboť již nevypovídá navíc o systémech individuí, systémech systémů individuí atd., což přísluší logikám 2., 3. a dalších řádů.

Predikátová logika obsahuje výrokovou logiku, hledíme-li na formule jako na výroky nad množinou  $\mathbb{P}$  prvovýroků, kterými jsou formule z  $Fm_L$  neobsahující logickou spojku nebo začínají kvantifikací (tvaru  $(\forall x)$ ). Teorií rozumíme nějakou množinu  $T \subseteq Fm_L$  (axiomů). Na straně syntaxe je definován vztah „dokazatelnost formule  $\varphi$  v teorii  $T$ “, formálně  $T \vdash \varphi$ , na straně sémantiky pak vztah „platnost formule  $\varphi$  v teorii  $T$ “, formálně  $T \models \varphi$ . Základním rysem predikátové logiky je její úplnost:  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow T \models \varphi$ ; to plyne z tvrzení, že každá bezesporná teorie má model, odkud plyne i kompaktnost pro tuto logiku: teorie má model, má-li její každý konečný fragment model. Jelikož sémantické realizace neboli modely v predikátové logice jsou struktury 1. řádu (široce uplatňované v matematice), přináší logika řadu netriviálních tvrzení o nich. Zkoumání v tomto směru se označuje jako teorie modelů; zabývá se klasifikací modelů a strukturou třídy všech modelů dané teorie. Problém složitosti množiny  $\text{Thm}(T)$  všech v  $T$  dokazatelných formulí se posuzuje jednak co do efektivnosti  $\text{Thm}(T)$ , jednak z hlediska deskriptivní složitosti formulí  $\varphi$  patřících do  $\text{Thm}(T)$ . Deskriptivní složitost se základně měří počtem a typem kvantifikací v  $\varphi$ . V extrémním případě může být každá formule v  $T$  ekvivalentní formuli bezkvantifikátorové; pak říkáme, že  $T$  má eliminaci kvantifikátorů a lze říci, že  $T$  je deskriptivně jednoduchá. Efektivnost  $\text{Thm}(T)$  chápeme tak, že  $\text{Thm}(T)$  je rekurzivní, tj. je to po vhodném zakódování rekurzivní množina přirozených čísel. Přitom množina  $X$  přirozených čísel je rekurzivní, je-li její charakteristická funkce

rekurzivní, neboli algoritmicky vyčíslitelná; to, zda  $n \in \mathbb{N}$  patří do rekurzivní  $X$ , lze tedy zjistit algoritmicky. Je-li dán rekurzivní jazyk  $L$  a  $T$  je teorie v něm zapsaná, říkáme, že  $T$  je rozhodnutelná, je-li rekurzivní  $\text{Thm}(T)$ .

Problematika klasifikace modelů, deskriptivní složitosti a (ne)rozhodnutelnosti pro různé teorie patří ke stěžejní problematice predikátové logiky.

## 3.1 Základy syntaxe a sémantiky

**Základní syntax: Jazyk, termy, formule, teorie. Substitute.**

### 3.1.1. Jazyk predikátové logiky.

1. Jazyk tvoří *logické symboly*, *mimologické symboly* a eventuálně *relační symbol rovnosti*  $=$ .

• Logické symboly jsou:

- logické spojky  $\neg, \rightarrow$ ,
- *proměnné* tvořící spočetnou množinu  $\text{Var}$ ,
- *obecné kvantifikace*  $\forall_x$  (proměnné)  $x$  s  $x \in \text{Var}$ ;  $\forall_x$  čteme „pro každé  $x$ “.

Proměnné značíme často  $x, y, z$  s indexy, čárkami apod.

• Mimologické symboly jsou symboly nějaké signatury  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ , přičemž  $\mathcal{R}, \mathcal{F}$  neobsahují žádný logický symbol ani  $=$ . Říkáme pak, že jde o *jazyk signatury*  $L$ ; signatura může být prázdná. Symboly z  $\mathcal{R}$  resp.  $\mathcal{F}$  jsou *relační* (též *predikátové*) resp. *funkční symboly* jazyka  $L$ . Pro mimologický symbol  $S$  jazyka  $L$  řekneme, že jeho *typ* v  $L$  je relační resp. funkční, je-li to relační resp. funkční symbol jazyka  $L$ .

2. Jazyk s *rovností* je jazyk, který obsahuje predikátový symbol rovnosti  $=$ ; jinak je to *jazyk bez rovnosti*. Vždy předpokládáme, že jazyk má alespoň jeden relační symbol.

Jazyk je tedy specifický jen svou signaturou  $L$  a tím, zda je jeho symbolem  $=$ . Říkáme proto, že jde o *jazyk*  $L$ , eventuálně navíc *s rovností*; jazyk v tomto smyslu ztotožňujeme s jeho signaturou.

3. *Velikost* čili *kardinalita*  $\|L\|$  jazyka  $L$  je velikost signatury, je-li nekonečná a je spočetná jinak; formálně to je  $\max(\omega, |L|)$ , kde  $|L|$  je velikost signatury  $L$ .

4. Buďte  $L, L'$  dva jazyky. Jazyk  $L'$  je *extenze*  $L$  a  $L$  je *restrikce*  $L'$ , pokud každý mimologický symbol jazyka  $L$  je mimologickým symbolem jazyka  $L'$  téhož typu a četnosti v  $L'$  jako  $S$  v  $L$  a dále je-li  $L$  s rovností, je i  $L'$ ; píšeme  $L \subseteq L'$ .

Jazyky  $L$  a  $L'$  jsou *izomorfní*, jsou-li oba buď s rovností nebo oba bez rovnosti a dále existuje prosté zobrazení  $h$  množiny mimologických symbolů jazyka  $L$  na množinu mimologických symbolů jazyka  $L'$  tak, že pro každý mimologický symbol  $S$  z  $L$  je  $h(S)$  téhož typu a četnosti v  $L'$  jako  $S$  v  $L$ .

Jazyk  $L$  zapisujeme uvedením jeho signatury, často ve tvaru

$$\langle R_0, \dots, F_0, \dots, c_0, \dots \rangle,$$

$R_0$  je  $m_0$ -ární relační symbol,  $\dots$ ,

$F_0$  je  $n_0$ -ární funkční symbol,  $\dots$ ,  $c_0$  je konstantní symbol,  $\dots$

Nemusíme pak ani nejprve vypisovat relační a pak funkční symboly, ale můžeme je uvádět v libovolném pořadí, avšak tak, aby byly patrné četnosti. Například jazyk aritmetiky přirozených čísel  $L^A$  je jazyk s rovností, který zapisujeme jako  $\langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$ ,  $S$  je unární funkční symbol,  $+, \cdot$  jsou binární funkční symboly,  $0$  je konstantní symbol,  $\leq$  je binární relační symbol.

ÚLOHA. Co lze říci o jazycích  $L_0, L_1$ , kde:

$L_0 = \langle +, < \rangle$ ,  $+$  je binární funkční symbol,  $<$  je binární relační symbol.

$L_1 = \langle +, < \rangle$ ,  $+$  je binární relační symbol,  $<$  je binární funkční symbol.



$L_2 = \langle +, <, 0 \rangle$ ,  $+$  je binární relační symbol,  $<$  je binární funkční symbol,  $0$  je konstantní funkční symbol.

### 3.1.2. Termy a formule.

Pro daný jazyk  $L$  symbolicky reprezentují termy složené operace z funkčních symbolů jazyka  $L$  a formule pak tvrzení či vlastnosti, jež lze formulovat v  $L$ . Termy a formule budeme definovat jako designátory. K usnadnění čitelnosti designátorů používáme pomocně obvyklým způsobem delimitery  $\langle \rangle$ . Dále zde užíváme často konvence, že designátor tvaru  $\langle S \rangle$ , kde  $S$  je symbol, „ztotožňujeme“ s  $S$ .

Bud'  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  jazyk.

1. Množina  $\text{Term}_L$  *termů jazyka  $L$*  čili  $L$ -*termů* je množina  $D(\text{Var} \cup \mathcal{F})$  designátorů, kde každá proměnná představuje nulární funkční symbol. Má tedy indukativní definici s pravidly: Každé  $\langle x \rangle$  s  $x \in \text{Var}$  je  $L$ -term. Je-li  $F$  z  $\mathcal{F}$ ,  $n$  četnost  $F$  a  $t_0, \dots, t_{n-1}$  jsou  $L$ -termy, je  $F(t_0, \dots, t_{n-1})$  také  $L$ -term. Nadále zpravidla  $\langle x \rangle$  s  $x \in \text{Var}$  zapisujeme jako  $x$ ; proměnná je tak term.

2. Množina  $\text{APFm}_L$  *atomických  $L$ -preformulí* je tvořena právě designátory tvaru

$$R(t_0, \dots, t_{n-1}), \quad (3.1)$$

kde  $R$  je predikátový symbol jazyka  $L$ ,  $n$  je četnost  $R$  a  $t_0, \dots, t_{n-1}$  jsou  $L$ -termy.

Množina  $\text{Fm}_L$  *formulí jazyka  $L$*  čili  $L$ -*formulí* je množina

$$D(\text{APFm}_L \cup \{\neg, \rightarrow\} \cup \{\forall_x; x \in \text{Var}\}),$$

kde symboly z  $\text{APFm}_L$  jsou nulární a každý symbol  $\forall_x$  je unární. Má tedy indukativní definici s pravidly: Každé  $\langle \eta \rangle$  s  $\eta \in \text{APFm}_L$  je  $L$ -formule. Jsou-li  $\varphi, \psi$  nějaké  $L$ -formule, jsou jimi i  $\neg\varphi, \varphi \rightarrow \psi$  a  $\forall_x(\varphi)$  pro každé  $x$  z  $\text{Var}$ .

Formule  $\langle \eta \rangle$  s  $\eta \in \text{APFm}_L$  se nazývá *atomická  $L$ -formule*. Nadále ji zapisujeme zpravidla jako  $\eta$ , tj. ztotožňujeme ji s atomickou preformulí  $\eta$ . Množinu všech atomických  $L$ -formulí značíme  $\text{AFm}_L$ .

Bud' např.  $L = \langle \leq \rangle$ , kde  $\leq$  je binární relační symbol,  $x, y$  proměnné. Pak atomickou  $L$ -formulí  $\langle x \leq y \rangle$  запиšeme jako (atomickou preformulí)  $x \leq y$ . Dále například  $\langle \forall_x, \rightarrow, x \leq y, x \leq y \rangle$  je formule, kterou запиšeme v obvyklém tvaru jako  $(\forall x)(x \leq y \rightarrow x \leq y)$  – viz též zkratky a konvence.

3. Je-li jazyk  $L$  patrný z kontextu či nevede-li to k nedorozumění, vynecháváme  $L$ . Říkáme tak například jen term, formule a píšeme jen Term, Fm apod., a to i v souvislosti s dále definovanými pojmy vztahujícími se k  $L$ .

4. *Podterm* resp. *podformule* termu resp. formule  $\eta$  je poddesignátor  $\eta$ . Výskyt proměnné  $x$  v (3.1) je výskyt  $x$  v nějakém  $t_i, i < n$ , výskyt proměnné  $x$  ve formulí je výskyt  $x$  v nějaké její atomické podformulí. *Proměnná* uvedeného designátoru  $\eta$  je proměnná se v něm vyskytující. Term resp. formule je *bez proměnných*, neobsahuje-li žádnou proměnnou. Term bez proměnných se též nazývá *konstantní*.

Termy značíme nejčastěji,  $t, s, t', t_0$  apod., formule pak  $\varphi, \psi, \chi, \varphi', \varphi_0$  apod.

Je patrné, že formule jazyka  $L$  1. řádu jsou výroky nad prvovýroky  $\mathbb{P}(L)$ , kterými jsou právě všechny atomické a kvantifikátorem začínající  $L$ -formule.

**TVRZENÍ 3.1.3.** *Bud'  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  jazyk. Velikost množiny  $L$ -termů je  $\max(\omega, |\mathcal{F}|)$ , velikost množiny  $L$ -formulí je  $\|L\| = \max(\omega, |\mathcal{R}|, |\mathcal{F}|)$ .*

*Důkaz.* Termů je alespoň tolik, kolik je velikost množiny  $\text{Var} \cup \mathcal{F}$ , což je  $\max(\omega, |\mathcal{F}|)$ . Dále jich není více, než je počet sekvencí ve  $\text{Var} \cup \mathcal{F}$ ; těch je také  $\max(\omega, |\mathcal{F}|)$ . Podobně je tomu s velikostí množiny všech formulí.  $\square$

### 3.1.4. Zavedení $\&, \vee, \leftrightarrow, \exists$ a další konvence o zápisu formulí.

• Logické spojky  $\&, \vee, \leftrightarrow$  *konjunkce, disjunkce, ekvivalence* zavádíme jako zkratky stejně jako ve výrokové logice. Užíváme i ostatní konvence z výrokové logiky.

• Formulí  $\forall_x(\varphi)$  zapisujeme jako  $(\forall x)\varphi$ . Říkáme, že  $\forall$  je *obecný (univerzální) kvantifikátor*.

$(\exists x)\varphi$  je zavedeno jako zkratka za  $\neg(\forall x)\neg\varphi$ ;  $(\exists x)$  je *existenční kvantifikace* (proměnné)  $x$ .  $(\exists x)$  čteme „existuje  $x$ “. Říkáme, že  $\exists$  je *existenční kvantifikátor*.

Je-li  $Q$  kvantifikátor, píšeme též  $(Qx_1, \dots, x_n)\varphi$  za  $(Qx_1)(Qx_2) \dots (Qx_n)\varphi$ .

- Je-li  $\diamond$  binární relační symbol, píše se též  $t \not\phi s$  za  $\neg(t \diamond s)$ .

ÚLOHA. Buď  $L$  jazyk s rovností,  $\varphi$  buď  $L$ -formule a  $0 < n \in \mathbb{N}$ .

Napište  $L$ -formule vyjadřující:

- „existuje právě  $n$  prvků“, „existuje méně než  $n$  prvků“,
- „existuje  $\diamond n$  prvků“ s  $\diamond \in \{<, \leq, >, \geq\}$ .
- „existuje právě  $n$  prvků  $x$  s vlastností  $\varphi(x, \dots)$ “,
- „prvků  $x$  s vlastností  $\varphi$  je  $\diamond n$ “ s  $\diamond \in \{<, \leq, >, \geq\}$ .

### 3.1.5. Teorie. Teorie rovnosti.

1. *Teorie* je dána jako jazyk  $L$  a množina  $T \subseteq \text{Fm}_L$ ; formule z  $T$  jsou *axiómy* a  $L$  jazyk takové teorie – formálně je teorie dvojice  $\langle L, T \rangle$ . Říkáme pak (tradičně), že  $T$  je *teorie v  $L$*  neboli  *$L$ -teorie* a její jazyk značíme  $L(T)$ ; ten je ovšem určen jednoznačně. *Teorie s rovností* je taková teorie, jejíž jazyk je s rovností. Místo  $L(T)$ -formule se říká též *formule teorie  $T$* . Teorie značíme často  $T, S, T', T_0$  apod.

2. *Teorie rovnosti v  $L$*  je teorie  $\text{TE}_L = \emptyset$  v jazyce  $L$  s rovností, tj. teorie bez milogických axiomů v jazyce  $L$  s rovností; je-li  $L$  prázdný jazyk s rovností, značíme  $\text{TE}_\emptyset$  jako PE a říkáme, že to je *teorie čisté rovnosti*.

Jakožto množiny axiomů jsou PE a  $\text{TE}_L$  totožné a prázdné, jako teorie však nikoli, neboť  $L(\text{PE}) \neq L(\text{TE}_L)$ , je-li signatura  $L$  neprázdná.

Buď  $T$  teorie  $\text{TE}_L$ , kde  $L$  je jazyk aritmetiky  $L^A = \langle S, +, \cdot, 0, \leq \rangle$  (což je spočetný jazyk). Je zajímavé, že  $T$  je nerozhodnutelná teorie, avšak teorie PE je rozhodnutelná; to jsou již hlubší poznatky z matematické logiky.

### 3.1.6. Volné a vázané proměnné. Otevřené formule. Sentence. Generální uzávěr.

1. *Výskyt proměnné  $x$*  ve formuli  $\varphi$  je *vázaný* ve  $\varphi$ , je-li to výskyt v nějaké podformuli  $(\forall x)\psi$  formule  $\varphi$ ; v opačném případě je tento výskyt *volný* ve  $\varphi$ . Říkáme, že *proměnná  $x$  je volná* resp. *vázaná* ve  $\varphi$ , jestliže některý její výskyt je volný resp. vázaný ve  $\varphi$ .

Proměnná může být zároveň volná i vázaná v nějaké formuli. Jsou-li proměnné  $x, y$  různé, tak volné výskyty  $x$  v  $\neg\varphi$ ,  $\varphi \rightarrow \psi$ ,  $(\forall y)\varphi$  jsou právě volné výskyty ve  $\varphi$  a  $\psi$ ; to plyne z tvrzení o jednoznačnosti designátorů. Dále  $x$  nemá volný výskyt v  $(\forall x)\varphi$ . (Upozorníme, že v  $(\forall x)\varphi$  není  $x$  těsně za  $\forall$  výskyt proměnné  $x$ .)

2. Formule se nazývá *uzavřená*, čili *sentence*, není-li v ní volná žádná proměnná. Formule je *otevřená* a též *bezkvantifikátorová*, není-li v ní žádný kvantifikátor. (*Generální*) *uzávěr*  $\varphi$  je formule  $(\forall x_1, \dots, x_n)\varphi$ , kde mezi  $x_1, \dots, x_n$  jsou všechny volné proměnné formule  $\varphi$ . Množinu všech otevřených  $L$ -formulí značíme  $\text{OFm}_L$ .

Nápis

$t(x_0, \dots, x_{n-1})$  nebo  $t(\bar{x})$       resp.       $\varphi(x_0, \dots, x_{n-1})$  nebo  $\varphi(\bar{x})$   
 značí, že  $\bar{x} = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle$  je prostá sekvence proměnných a mezi  $x_0, \dots, x_{n-1}$  jsou všechny proměnné termu  $t$  resp. všechny volné proměnné formule  $\varphi$ .

### 3.1.7. Substitute, instance, varianta.

1. Term  $t$  je *substituovatelný* za  $x$  do  $\varphi$ , jestliže pro každou proměnnou  $y$  termu  $t$  žádná podformule  $(\forall y)\psi$  formule  $\varphi$  neobsahuje výskyt  $x$ , který je volný ve  $\varphi$ .

Substituce termu  $t$  do formule  $\varphi$  za proměnnou  $x$  se provádí tak, že všechny volné výskyty proměnné  $x$  ve  $\varphi$  se nahradí termem  $t$ , pokud(!) je term  $t$  substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$ . Snadno se indukcí dle složitosti  $\varphi$  dokáže, že získaný výraz je formule; zapisujeme ji jako

$$\varphi(x/t)$$

a pokud je tento symbol užit, znamená to, že  $t$  je substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$ .

Je-li  $\varphi$  bezkvantifikátorová formule, je zřejmě každý term substituovatelný za každou proměnnou do  $\varphi$ .

2. *Instance* formule  $\varphi$  je formule značená

$$\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$$

a získána z  $\varphi$  nahražením všech volných výskytů  $x_1, \dots, x_n$  za  $t_1, \dots, t_n$ , přičemž  $x_1, \dots, x_n$  jsou různé proměnné, term  $t_i$  je substituovatelný za  $x_i$  do  $\varphi$  pro  $i = 1, \dots, n$  a substituce se provádí simultánně. Formule  $\varphi(x_1/t_1)(x_2/t_2) \cdots (x_n/t_n)$  získána postupně prováděnou substitucí tedy není obecně instance  $\varphi$ .

Obdobně  $t(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$  značí term získaný z termu  $t$  simultánním nahražením všech výskytů  $x_1, \dots, x_n$  za  $t_1, \dots, t_n$ , přičemž  $x_1, \dots, x_n$  jsou různé proměnné. Výsledkem je term, jak plyne z tvrzení o substituci v designátorech.

Místo  $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$  resp.  $t(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$  píšeme též, nevede-li to k nedorozumění, jen

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) \text{ resp. } t(t_1, \dots, t_n).$$

Poznamenejme, že  $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$  můžeme získat postupně prováděnou substitucí  $t_i$  za  $x'_i$  do  $\varphi(x_1/x'_1, \dots, x_n/x'_n)$ , kde  $x'_1, \dots, x'_n$  jsou různé a nevyskytují se ani ve  $\varphi$  ani v žádném  $t_i$  (a  $x'_i$  je substituovatelné za  $x_i$  do  $\varphi$ ). Obdobně je tomu s termy.

3. *Varianta* formule  $\varphi$  je formule, která se získá z  $\varphi$  konečnou aplikací kroků: podformulí  $(\forall x)\psi$  nahraď  $(\forall y)\psi(x/y)$ , kde proměnná  $y$  není volná ve  $\psi$  (a je substituovatelná za  $x$  do  $\psi$ ).

### POZNÁMKA 3.1.8.

1. Substituovatelnost vyjadřuje korektnost substituce; ta má např. zaručit platnost formule  $(\forall x)\varphi \rightarrow \varphi(x/t)$ . Pokud nahradíme všechny volné výskyty  $x$  termem  $t$  i tehdy, kdy term  $t$  není substituovatelný za  $x$  do  $\varphi$ , nemusí uvedená implikace platit. Buď totiž např.  $\varphi(x)$  tvaru  $(\exists y)(x \neq y)$  s různými  $x, y$ . Pak  $(\forall x)\varphi$  platí např. v oboru individuí  $A = \{0, 1\}$  s = interpretovaným jako identita, tj. platí ve struktuře  $\langle A \rangle$ . Avšak po nekorektní substituci termu  $t$  rovnému  $y$  za  $x$  do  $\varphi$  získáme  $(\exists y)(y \neq y)$  a tato formule neplatí v  $\langle A \rangle$ . Tedy ani  $(\forall x)\varphi \rightarrow (\exists y)(y \neq y)$  neplatí v  $\langle A \rangle$ .

2. Nechť  $y$  není volná ve  $\varphi$  a je substituovatelná za  $x$  do  $\varphi$ ,  $\varphi'$  je  $\varphi(x/y)$ . Pak  $\varphi'(y/x)$  je  $\varphi$ . Oba předpoklady dohromady totiž zaručují, že volný výskyt  $y$  ve  $\varphi'$  je právě tam, kde je volný výskyt  $x$  v  $\varphi$ . Tedy  $x$  je substituovatelné za  $y$  do  $\varphi'$  a také rovnost obou uvažovaných formulí platí.

3. a) Buď  $\varphi$  formule  $(\exists x)(x < y) \vee (x = y)$  s různými proměnnými  $x, y$ . Je-li proměnná  $z$  různá od  $x, y$ , je  $(\exists z)(z < y) \vee (x = y)$  varianta  $\varphi$ . Nelze však „variovat“  $x$  na  $y$ , neboť  $y$  má volný výskyt v  $(\exists x)(x < y)$ .

b) Chceme, aby varianta  $\varphi'$  formule byla ekvivalentní s  $\varphi$ ; že tomu tak je dokážeme později jako tvrzení o variantách. Pokud bychom nedodrželi pravidla vytváření varianty, neplatilo by to. Vezmeme-li totiž za  $\varphi$  formuli  $(\exists x)(x \neq y)$  s různými  $x, y$  a budeme chybně (neboť  $y$  má volný výskyt v  $x \neq y$ ) „variovat“  $x$  na  $y$ , získáme  $\varphi'$  tvaru  $(\exists y)(y \neq y)$ , což zjevně není ekvivalentní s  $\varphi$ . Nelze pominout ani podmínku substituovatelnosti. Buď totiž  $\varphi$  formule  $(\exists y)(\exists x)(x \neq y)$ ; budeme-li chybně (díky tomu, že  $x$  není substituovatelné za  $y$  do  $(\exists x)(x \neq y)$ ) „variovat“  $y$  na  $x$ , získáme  $\varphi'$  tvaru  $(\exists x)(\exists x)(x \neq x)$ , což zjevně není ekvivalentní s  $\varphi$ .

Pomocí tvrzení o variantách lze až na ekvivalenci docílit, aby v dané formuli nebyla žádná proměnná zároveň vázaná i volná. Například ve formuli  $\varphi$ , která má tvar  $(\forall x)(x < y) \ \& \ x + 0 = x$  s různými  $x, y$ , je  $x$  volná i vázaná. Buď  $x'$  proměnná různá od  $x, y$ . Pak je formule  $(\forall x')(x' < y) \ \& \ x + 0 = x$  varianta  $\varphi$ , ve které není žádná proměnná zároveň vázaná i volná.

### Realizace čili model jazyka $L$ , platnost v modelu.

#### 3.1.9. Model jako $L$ -struktura. Redukt, expanze.

Buď  $L$  jazyk se signaturou  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ .

1. *Realizace* či *model* jazyka  $L$  je nějaká  $\langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ -struktura  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$ ; je-li  $L$  jazyk s rovností, je navíc realizace  $=^A$  symbolu  $=$  identita na  $A$ . Říkáme též, že  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a můžeme psát  $\mathcal{A} \models L$ .

2. Buďte  $L, L'$  jazyky s  $L \subseteq L'$ ,  $\mathcal{A}'$  nějaká  $L'$ -struktura. *Redukce* či *redukt*  $\mathcal{A}'$  na  $L$  je  $L$ -struktura  $\mathcal{A}$ , která vznikne z  $\mathcal{A}'$  odebráním realizací symbolů, které nejsou v  $L$ ; značíme ji  $\mathcal{A}' \upharpoonright L$ . Říkáme též, že  $\mathcal{A}'$  je *expanze*  $\mathcal{A}$  do  $L'$ .

#### 3.1.10. Hodnota termu a platnost formule ve struktuře. Model teorie.

Buď  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  jazyk,  $\mathcal{A} = \langle A, \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$  buď  $L$ -struktura.

1. Zobrazení  $e : \text{Var} \rightarrow A$  je *ohodnocení proměnných* v  $A$ , krátce *ohodnocení* v  $A$ . Pro takové  $e$ , prvek  $a \in A$  a proměnnou  $x$  je  $e(x/a)$  ohodnocení nabývající hodnotu  $a$  v  $x$  a jinak shodné s  $e$ .

Buď dále  $e$  nějaké ohodnocení proměnných v  $A$ .

2. *Hodnota  $L$ -termu  $t$  v  $\mathcal{A}$  při ohodnocení  $e$*  je hodnota designátoru  $t$  z  $D(\text{Var} \cup \mathcal{F})$  ve struktuře  $\mathcal{A}^e = \langle A, \mathcal{F}^A, e(x) \rangle_{x \in \text{Var}}$ . Značíme ji  $t^A[e]$ , stručněji často  $t[e]$ .

Tedy  $t^A[e]$  je  $H_{tm}^A(t, e)$ , kde  $H_{tm}^A$  je sestavená rekurzí:

$$\begin{aligned} H_{tm}^A(t, e) &= e(x), & \text{je-li } t \text{ proměnná } x, \\ H_{tm}^A(t, e) &= F^A(H_{tm}^A(t_0, e), \dots, H_{tm}^A(t_{n-1}, e)), & \begin{aligned} &\text{je-li } F \text{ z } \mathcal{F}, n \text{ je četnost } F \\ &t_0, \dots, t_{n-1} \text{ jsou } L\text{-termy a} \\ &t \text{ je } F(t_0, \dots, t_{n-1}). \end{aligned} \end{aligned}$$

3. *Hodnota  $H_{at}^A(\varphi, e)$  atomické formule  $\varphi$  v  $\mathcal{A}$  při ohodnocení  $e$*  definujeme takto:

Když  $\varphi$  je tvaru  $R(t_0, \dots, t_{m-1})$ , kde  $R$  je relační symbol  $L$  (tj. i  $=$ , je-li  $L$  s rovností),  $R$  má četnost  $m$  a  $t_0, \dots, t_{m-1}$  jsou termy, tak definovaná hodnota je 1 resp. 0, právě když  $R^A(t_0^A[e], \dots, t_{m-1}^A[e])$  platí resp. neplatí.

4. *Hodnota  $H^A(\varphi, e)$  formule  $\varphi$  v  $\mathcal{A}$  při ohodnocení  $e$*  je definována rekurzí:

$$\begin{aligned} H^A(\varphi, e) &= H_{at}^A(\varphi, e), & \text{když } \varphi \text{ je atomická,} \\ &= \neg H^A(\varphi_0), & \text{když } \varphi \text{ je } \neg \varphi_0, \\ &= H^A(\varphi_0) \rightarrow_1 H^A(\varphi_1), & \text{když } \varphi \text{ je } \varphi_0 \rightarrow \varphi_1, \\ &= \min\{H^A(\varphi_0, e(x/a)); a \in A\}, & \text{když } \varphi \text{ je } (\forall x)\varphi_0. \end{aligned}$$

5. a) *Formule  $\varphi$  platí v  $\mathcal{A}$  při ohodnocení  $e$* , když  $H^A(\varphi, e) = 1$ ; píšeme  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ .

b) *Formule  $\varphi$  platí v  $\mathcal{A}$* , platí-li v  $\mathcal{A}$  při každém ohodnocení  $e$  proměnných v  $A$ ; píšeme  $\mathcal{A} \models \varphi$ .

c) Buď  $T$  nějaká  $L$ -teorie. Je-li  $\mathcal{A} \models \varphi$  pro každé  $\varphi$  z  $T$ , říkáme, že  $\mathcal{A}$  je *model*  $T$  a píšeme  $\mathcal{A} \models T$ .

Poznamenejme, že z definic ihned plyne, je-li  $\diamond$  po řadě  $\vee, \&, \leftrightarrow$  a „ $\diamond$ “ po řadě nebo, a, právě když:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models (\varphi \diamond \psi)[e] &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e] \text{ „}\diamond\text{“ } \mathcal{A} \models \psi[e], \\ \mathcal{A} \models (\forall x)\varphi[e] &\Leftrightarrow \text{pro každé } a \in A \text{ je } \mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)], \\ \mathcal{A} \models (\exists x)\varphi[e] &\Leftrightarrow \text{existuje } a \in A \text{ s } \mathcal{A} \models \varphi[e(x/a)]. \end{aligned}$$

3.1.11. *Triviální  $L$ -struktura dané velikosti* je  $L$ -struktura  $\mathcal{A}$  s univerzem  $A$  dané velikosti přičemž:  $\emptyset \in A$ , pro každý relační mimologický symbol  $R$  jazyka  $L$  četnosti  $m$  je  $R^A = A^m$ , pro každý funkční mimologický symbol  $F$  jazyka  $L$  četnosti  $n$  je  $F^A = A^n \times \{\emptyset\}$ . Speciálně je každý konstantní symbol interpretován jako  $\emptyset$ . Takovou strukturu značíme  $A_L$ . (Poznamenejme, že předpoklad  $\emptyset \in A$  je jen technický; roli  $\emptyset$  může hrát jakýkoli prvek z  $A$ .) Zřejmě platí:

a) Každý jazyk má model libovolné (nenulové) velikosti.

b)  $A_L \models \text{AFm}_L$ , jakmile  $A_L$  je triviální  $L$ -struktura nějaké velikosti a  $L$  je bez rovnosti.

**TVRZENÍ 3.1.12.** (O závislosti hodnoty na proměnných.) *Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura a  $t$  resp.  $\varphi$  nějaký  $L$ -term resp.  $L$ -formule,  $e, e'$  jsou ohodnocení proměnných v  $A$ , která se rovnají na všech proměnných termu  $t$  resp. volných proměnných formule  $\varphi$ . Pak platí:*

$$\text{a) } t^A[e] = t^A[e'], \quad \text{b) } \mathcal{A} \models \varphi[e], \text{ právě když } \mathcal{A} \models \varphi[e'].$$

*Speciálně pro  $t$  bez proměnných a sentenci  $\varphi$  nezávisí  $t^A[e]$  a  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  na  $e$ .*

**Důkaz.** a) plyne bezprostředně indukcí na termech. b) se dokáže snadno indukcí na formulích; uveďme jen indukční krok pro univerzální kvantifikátor. Buď  $\varphi$  tvaru  $(\forall x)\psi$  a necht pro  $\psi$  tvrzení platí. Volné proměnné formule  $\psi$  jsou volné proměnné formule  $\varphi$  a eventuálně ještě proměnná  $x$ . Pak zřejmě platí:

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi[e] &\Leftrightarrow \text{pro každé } a \in A \text{ je } \mathcal{A} \models \psi[e(x/a)] \\ &\Leftrightarrow \text{pro každé } a \in A \text{ je } \mathcal{A} \models \psi[e'(x/a)] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e']. \end{aligned} \quad \square$$

Pomocí 3.1.12 rozšíříme přirozeně význam  $t^A[e]$  a  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ . Řekneme, že zobrazení  $e \subseteq \text{Var} \times A$  je *parciální ohodnocení v  $A$*  a že to je *ohodnocení pro  $t$  resp.  $\varphi$  v  $A$* , pokud definiční obor  $e$  obsahuje každou proměnnou termu  $t$  resp. volnou proměnnou formule  $\varphi$ . Pro takové  $e$  necht značí  $t^A[e]$  resp.  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  hodnotu  $t^A[e]$  resp. vztah  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$ , kde  $e' : \text{Var} \rightarrow A$  s  $e \subseteq e'$  je libovolné; to je dle 3.1.12 korektní.

**ZNAČENÍ 3.1.13.** Je-li  $\bar{x} = \langle x_0, \dots, x_{n-1} \rangle$  prostá sekvence proměnných, značíme  $\langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle$  nebo jen  $\bar{a}$

ohodnocení  $e = \{\langle x_i, a_i \rangle; i < n\}$  těchto proměnných. Pro proměnnou  $y$  pak značí  $\bar{a}(y/b)$  ohodnocení, nabývající hodnotu  $b$  v  $y$  a hodnotu  $a_i$  pro  $x_i$  různé od  $y$ .

Speciálně, je-li každé  $a_i \in A$ , je uvedené  $e$ , tj.  $\langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle$  čili  $\bar{a}$ , ohodnocení pro term  $t(x_0, \dots, x_{n-1})$  a formuli  $\varphi(x_0, \dots, x_{n-1})$  v  $A$ . Píšeme pak

$$\begin{array}{ll} t^A[a_0, \dots, a_{n-1}] \text{ či } t^A[\bar{a}] & \text{místo } t^A[e], \\ \mathcal{A} \models \varphi[a_0, \dots, a_{n-1}] \text{ či } \mathcal{A} \models \varphi[\bar{a}] & \text{místo } \mathcal{A} \models \varphi[e]. \end{array}$$

**TVRZENÍ 3.1.14.** (O korektnosti substituce.) *Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura,  $t, s$  jsou termy,  $\varphi$  je formule jazyka  $L$  a  $e$  ohodnocení proměnných v  $A$ . Platí:*

$$1) t(x/s)[e] = t[e(x/s[e])]. \quad 2) \mathcal{A} \models \varphi(x/s)[e] \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e(x/s[e])].$$

**Důkaz.** 1) Indukcí na termech. Buď  $t$  proměnná  $y$ . Je-li  $y$  proměnná  $x$ , je vlevo  $s[e]$  a vpravo je také  $s[e]$ . Když  $y$  není  $x$ , je vlevo  $e(y)$  a vpravo také. Necht  $t$  je  $F(t_1, \dots, t_m)$ , kde  $F$  je  $m$ -ární funkční symbol a pro termy  $t_1, \dots, t_m$  tvrzení platí. Pak  $t(x/s)[e] = F(t_1(x/s), \dots)[e] = F^A(t_1(x/s)[e], \dots) = F^A(t_1[e(x/s[e])], \dots) = t[e(x/s[e])]$ .

2) Indukcí na formulích. Pro  $\varphi$  atomickou tvaru  $R(t_1, \dots, t_m)$  to platí, neboť

$$\begin{aligned} \mathcal{A} \models \varphi(x/s)[e] &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models R(t_1(x/s), \dots)[e] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow R^A(t_1(x/s)[e], \dots) \Leftrightarrow R^A(t_1[e(x/s[e])], \dots) \Leftrightarrow \mathcal{A} \models R(t_1, \dots)[e(x/s[e])]. \end{aligned}$$

Indukční krok pro  $\neg, \rightarrow$  je jasný, neboť  $(\neg\varphi_0)(x/s)$  je  $\neg\varphi_0(x/s)$  a  $(\varphi_0 \rightarrow \varphi_1)(x/s)$  je  $\varphi_0(x/s) \rightarrow \varphi_1(x/s)$ .

Buď  $\varphi$  tvaru  $(\forall y)\psi$  a pro  $\psi$  necht to platí. a)  $x$  nemá volný výskyt ve  $\varphi$ . Pak je  $\varphi(x/s)$  rovno  $\varphi$  a  $e, e(x/s[e])$  se rovnají na všech volných proměnných formule  $\varphi$  a dokazované  $\Leftrightarrow$  tedy platí. b)  $x$  má volný výskyt ve  $\varphi$ . Pak

b1)  $y$  není  $x$ ,                      b2)  $y$  není v  $s$  a tedy  $s[e(y/a)] = s[e]$ .

Platí tedy užitím b2), definic a indukčního předpokladu:

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} \models \varphi(x/s)[e] &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \psi(x/s)[e(y/a)] && \text{pro každé } a \in A \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \psi[e(y/a)(x/s[e(y/a)])] && \text{pro každé } a \in A \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \psi[e(x/s[e])(y/a)] && \text{pro každé } a \in A \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models (\forall y)\psi[e(x/s[e])].
 \end{aligned}$$

□

LEMMA 3.1.15. (O hodnotě v reduktu.) *Buďte  $L \subseteq L'$ ,  $\mathcal{A}' \models L'$ ,  $\mathcal{A}$  redukt  $\mathcal{A}'$  na  $L$ ,  $e$  ohodnocení proměnných v  $A (= A')$ .*

1) *Pro  $L$ -term  $t$  platí  $t^{\mathcal{A}}[e] = t^{\mathcal{A}'}[e]$ .*

2) *Pro  $L$ -formuli  $\varphi$  platí  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{A}' \models \varphi[e]$ .*

Důkaz. 1) Snadno indukcí na  $L$ -termech. 2) Snadno indukcí na  $L$ -formulích. □

TVRZENÍ 3.1.16. (O izomorfních modelech.) *Nechť  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  jsou  $L$ -struktury. Prostě zobrazení  $h$  množiny  $A$  na  $B$  je izomorfismus  $\mathcal{A}$  a  $\mathcal{B}$ , právě když platí 1) a 2):*

1)  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = t^{\mathcal{B}}[he]$  pro každý  $L$ -term  $t$  a ohodnocení  $e \in \text{Var}A$ .

2)  $\mathcal{A} \models \varphi[e] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[he]$  pro každou  $L$ -formuli  $\varphi$  a ohodnocení  $e \in \text{Var}A$ .

Důkaz. Implikace  $\Rightarrow$ . 1) Indukcí na  $L$ -termech. Je-li  $t$  proměnná  $x$ , máme  $h(t^{\mathcal{A}}[e]) = h(e(x)) = he(x) = t^{\mathcal{B}}[he]$ . Je-li  $t$  tvaru  $F(t_0, \dots, t_{n-1})$  s  $n$ -árním funkčním symbolem  $F$  a termy  $t_0, \dots, t_{n-1}$ , pro které to platí, tak

$$\begin{aligned}
 h(t^{\mathcal{A}}[e]) &= h(F^{\mathcal{A}}(t_0^{\mathcal{A}}[e], \dots, t_{n-1}^{\mathcal{A}}[e])) = F^{\mathcal{B}}(h(t_0^{\mathcal{A}}[e]), \dots, h(t_{n-1}^{\mathcal{A}}[e])) \\
 &= F^{\mathcal{B}}(t_0^{\mathcal{B}}[he], \dots, t_{n-1}^{\mathcal{B}}[he]) = t^{\mathcal{B}}[he].
 \end{aligned}$$

Druhá rovnost plyne z toho, že  $h$  je izomorfismus, třetí z indukčního předpokladu a čtvrtá z definice hodnoty termu.

2) Indukcí na formulích. Pro  $\varphi$  atomickou to plyne z toho, že  $h$  je izomorfismus a díky 1). Indukční krok pro  $\neg, \rightarrow$  je patrný. Buď konečně  $\varphi$  tvaru  $(\forall y)\psi$  a necht' pro  $\psi$  to platí. Pak

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} \models \varphi[e] &\Leftrightarrow \mathcal{A} \models \psi[e(y/a)] \text{ pro každé } a \in A \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{B} \models \psi[he(y/h(a))] \text{ pro každé } a \in A \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{B} \models \psi[he(y/b)] \text{ pro každé } b \in B \\
 &\Leftrightarrow \mathcal{B} \models (\forall y)\psi[he].
 \end{aligned}$$

Druhý vztah  $\Leftrightarrow$  plyne díky indukčnímu předpokladu, třetí z toho, že  $h$  je na  $B$ .

Implikace  $\Leftarrow$ . Vztah  $h(F^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_{n-1})) = F^{\mathcal{B}}(h(a_0), \dots, h(a_{n-1}))$  pro  $n$ -ární funkční symbol  $F$  a  $a_0, \dots, a_{n-1}$  z  $A$  plyne volbou  $t(x_0, \dots, x_n)$  tvaru  $F(x_0, \dots, x_{n-1})$  a  $e(x_i) = a_i$  pro  $i < n$  v 1). Vztah  $R^{\mathcal{A}}(a_0, \dots, a_{n-1}) \Leftrightarrow R^{\mathcal{B}}(h(a_0), \dots, h(a_{n-1}))$  pro  $n$ -ární relační symbol  $R$  a prvky  $a_0, \dots, a_{n-1}$  z  $A$  plyne volbou  $\varphi(x_0, \dots, x_{n-1})$  tvaru  $R(x_0, \dots, x_{n-1})$  a  $e(x_i) = a_i$  pro  $i < n$  v 2). □

### Třídy modelů, kategoričnost, izomorfní spektrum.

#### 3.1.17. Třídy modelů. Axiomatizovatelné třídy.

1. *Třída všech modelů teorie  $T$  resp. velikosti  $\kappa$  resp. konečných resp. nekonečných se značí*

$$M(T) \text{ resp. } M^{\kappa}(T) \text{ resp. } M^{<\infty}(T) \text{ resp. } M^{\infty}(T),$$

eventuálně uvedený symbol  $M^*(T)$  zapíšeme jako  $M_T^*$ . Je-li  $T$  prázdná  $L$ -teorie, píšeme  $M^*(L)$ , eventuálně  $M_L^*$ . Pak  $M_L$  resp.  $M_L^{\kappa}$  resp.  $M_L^{<\infty}$  resp.  $M_L^{\infty}$  je třída všech modelů jazyka  $L$  resp. velikosti  $\kappa$  resp. konečných resp. nekonečných. Platí tedy např.



$$\mathbf{M}^\kappa(T) \subseteq \mathbf{M}^{<\omega}(T) \cup \mathbf{M}^\infty(T) = \mathbf{M}(T) \subseteq \mathbf{M}(L).$$

Množinu všech modelů teorie  $T$  s pevným univerzem  $A$  ( $\neq \emptyset$ ) označujeme  $\mathbf{M}(A, T)$ .

2. Buď  $K$  třída modelů jazyka  $L$ , tj.  $K \subseteq \mathbf{M}(L)$ . Třída  $K$  je *axiomatizovatelná* resp. *konečně axiomatizovatelná*, existuje-li  $L$ -teorie  $T$  resp. navíc konečná tak, že  $K = \mathbf{M}(T)$ .

Symbolem  $-K$  značíme *komplement třídy modelů*  $K$ , tj. třídu  $\mathbf{M}(L) - K$ .

První představu o třídě  $\mathbf{M}^\kappa(T)$  si můžeme udělat pomocí  $\mathbf{M}(A, T)$ . Je  $\mathbf{M}(A, T) \subseteq \mathbf{M}^{|A|}(T)$  a množina  $\mathbf{M}(A, T)$  obsahuje až na izomorfismus každý model z  $\mathbf{M}^{|A|}(T)$ , neboť pro  $B \in \mathbf{M}^{|A|}(T)$  existuje prosté zobrazení  $h$  množiny  $B$  na  $A$ , které přenese každou relaci a funkci struktury  $B$ , čímž vznikne struktura  $A$  s univerzem  $A$  a  $h$  je izomorfismus  $B$  a  $A$ .

**TVRZENÍ 3.1.18.** (Odhad počtu  $L$ -struktur s daným univerzem.)  $L$ -struktur s univerzem  $\kappa \geq \omega$  resp.  $2 \leq \kappa < \omega$  je nejvýše  $2^{\kappa \cdot \|L\|}$  resp.  $2^{\|L\|}$ .

**Důkaz.** Buď  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$ . Množina  $Rel$  resp.  $Op$  všech relací resp. operací konečných četností v  $\kappa$  má kardinalitu nejvýše  $2^\kappa$  resp.  $\omega$ . Označme  $\lambda = \|L\|$ . Je-li  $A = \langle \kappa, \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$ , je  $\mathcal{R}^A : \mathcal{R} \rightarrow Rel$ ,  $\mathcal{F}^A : \mathcal{F} \rightarrow Op$ . Tudíž uvažovaných dvojic  $\langle \mathcal{R}^A, \mathcal{F}^A \rangle$  je nejvýše tolik, kolik je kardinalita množiny  $(2^\kappa)^\lambda \times (2^\kappa)^\lambda$  resp.  $\omega^\lambda \times \omega^\lambda$ , což je  $2^{\kappa \cdot \lambda}$  resp.  $2^\lambda$ , neboť  $\lambda \geq \omega$ .

**TVRZENÍ 3.1.19.** *Nechť  $T$  je  $L$ -teorie,  $\varphi_0, \dots, \varphi_n$  jsou  $L$ -formule a  $\text{g.c.}(\varphi)$  značí generální uzávěr  $\varphi$ . Platí:*

$$\begin{aligned} 1) \quad & \mathcal{A} \models \varphi_0 \Rightarrow \mathcal{A} \not\models \neg \varphi_0 \\ & \mathcal{A} \models \varphi_1 \text{ nebo } \dots \text{ nebo } \mathcal{A} \models \varphi_n \Rightarrow \mathcal{A} \models \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n \\ & \mathcal{A} \models \varphi_1 \text{ a } \dots \text{ a } \mathcal{A} \models \varphi_n \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi_1 \& \dots \& \varphi_n \\ & \mathcal{A} \models \varphi_0 \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \text{g.c.}(\varphi_0). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(T) - \mathbf{M}(\neg \varphi_0) & \supseteq \mathbf{M}(T, \varphi_0) \\ \mathbf{M}(T, \varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_n) & \supseteq \mathbf{M}(T, \varphi_1) \cup \dots \cup \mathbf{M}(T, \varphi_n) \\ \mathbf{M}(T, \varphi_1 \& \dots \& \varphi_n) & = \mathbf{M}(T, \varphi_1) \cap \dots \cap \mathbf{M}(T, \varphi_n) \\ \mathbf{M}(T, \varphi_0) & = \mathbf{M}(T, \text{g.c.}(\varphi_0)) \end{aligned}$$

2) *Uvedené dvě implikace  $\Rightarrow$  resp. inkluze  $\subseteq$  nelze obrátit. Jsou-li  $\varphi_0, \dots, \varphi_n$  sentence, platí  $\Leftrightarrow$  místo  $\Rightarrow$  resp.  $=$  místo  $\subseteq$ .*

$$3) \mathbf{M}(\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}) = \mathbf{M}(\varphi_1 \& \dots \& \varphi_n), \quad \mathbf{M}(T) = \mathbf{M}(\{\text{g.c.}(\varphi); \varphi \in T\}).$$

**Důkaz.** 1) Nechť  $e$  je ohodnocení proměnných v  $A$ . První implikace. Je  $\mathcal{A} \models \varphi_0[e]$ , tedy  $\mathcal{A} \not\models \neg \varphi_0[e]$ . Podobně snadno plynou ostatní tři vztahy. Zbývající čtyři vztahy jsou důsledkem prvních čtyř.

2) Prvou implikaci  $\Rightarrow$  nelze obrátit. Buď totiž  $\varphi_0$  formule  $x \leq 0$ ,  $\mathcal{A} = \langle \mathbb{Z}, \leq, 0 \rangle$ . Pak  $\mathcal{A} \not\models \neg \varphi_0$ ,  $\mathcal{A} \not\models \varphi_0$ . Podobně je to s druhou implikací  $\Rightarrow$ . Odtud pak plyne, že nelze obrátit ani inkluze  $\subseteq$ .

Nechť  $e$  je ohodnocení proměnných v  $A$ . Je-li  $\varphi_0$  sentence, tak

$$\mathcal{A} \models \varphi_0 \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi_0[e] \Leftrightarrow \mathcal{A} \not\models \neg \varphi_0[e] \Leftrightarrow \mathcal{A} \not\models \neg \varphi_0,$$

neboť hodnota  $\mathcal{A} \models \varphi_0$  nezávisí na  $e$ . Podobně je tomu s disjunkcí. Důsledkem je, že místo inkluzí  $\subseteq$  můžeme psát  $=$ .

3) plyne ihned ze 7. a 8. vztahu z 1). □

### 3.1.20. Pojem kategoričnosti. Izomorfní spektrum.

Teorie je  $\kappa$ -kategoričná, čili *kategoričná v kardinalitě  $\kappa$* , má-li až na izomorfismus jediný model kardinality  $\kappa$ . Pro teorii  $T$  definujeme její *izomorfní spektrum*  $\mathbf{I}(\kappa, T)$ :



$I(\kappa, T)$  = počet neizomorfních modelů z  $M^\kappa(T)$ .

Je-li  $T$  prázdná  $L$ -teorie, místo  $I(\kappa, T)$  píšeme  $I(\kappa, L)$ ; je to počet neizomorfních modelů jazyka  $L$ , které mají kardinalitu  $\kappa$ .

Definici  $I(\kappa, T)$  můžeme formálněji vyjádřit jako kardinalitu množiny  $M(\kappa, T)/\cong$ . Přitom  $M(\kappa, T)/\cong$  je množina všech tříd ekvivalence  $E$  na  $M(\kappa, T)$ , kde

$$\mathcal{A} E \mathcal{B} \Leftrightarrow \mathcal{A} \cong \mathcal{B}.$$

### PŘÍKLADY 3.1.21.

$L = \langle U \rangle$ , $U$ je unární relační symbol.		
$ M(\kappa, L) $	$= 2^\kappa$	pro $\kappa > 0$
$I(\kappa, L)$	$=  \mathbf{Cn} \cap \kappa^+ $	pro $\kappa > 0$
$L = \langle R \rangle$ , $R$ je binární relační symbol.		
$ M(\kappa, L) $	$= 2^\kappa$	pro $\kappa \geq \omega$
$I(\kappa, L)$	$= 2^\kappa$	pro $\kappa \geq \omega$
$L = \langle c_i \rangle_{i \in n}$ , $c_i$ jsou konstantní symboly, $0 < n < \omega$ .		
$ M(\kappa, L) $	$= \kappa^n$	pro $\kappa < \omega$
	$\kappa$	pro $\kappa \geq \omega$
$I(\kappa, L)$	$= B(n)$	$\kappa \geq \omega$
Poznámka. $B(n)$ je $n$ -té Bellovo číslo, udávající počet rozkladů $n$ .		
$L = \langle c_i \rangle_{i \in n}$ , $c_i$ jsou konstantní symboly, $0 < n < \omega$ . $T = \{c_i \neq c_j, i \neq j \text{ a } i, j \in n\}$ ; teorie $n$ různých konstant.		
$ M(\kappa, T) $	$= \binom{\kappa}{n} n!$	pro $n \leq \kappa < \omega$
	$\kappa$	pro $\kappa \geq \omega$
$I(\kappa, T)$	$= 1$	pro $n \leq \kappa$
Poznámka. $\binom{\kappa}{n} n!$ je počet prostých $n$ -tic v $\kappa$ .		
$L = \langle \leq \rangle$ , $\leq$ je binární relační symbol. $T$ je teorie LO lineárního uspořádání (v $L$ ).		
$ M(\kappa, T) $	$= \kappa!$	pro $\kappa < \omega$
	$2^\kappa$	pro $\kappa \geq \omega$ .
$I(\kappa, T)$	$= 1$	pro $\kappa < \omega$
	$2^\kappa$	pro $\kappa \geq \omega$
$L = \langle \leq \rangle$ , $\leq$ je binární relační symbol. $T$ je teorie DeLO hustého lineárního uspořádání bez konců (v $L$ ).		
$I(\kappa, T)$	$= 1$	pro $\kappa = \omega$
	$2^\kappa$	pro $\kappa > \omega$

### 3.1.22. Teorie struktury. Elementární ekvivalence struktur.

1. Teorie  $L$ -struktury  $\mathcal{A}$  je množina  $L$ -sentencí platných v  $\mathcal{A}$ ; značíme ji

$$\text{Th}(\mathcal{A}).$$

2. Dvě  $L$ -struktury  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  jsou *elementárně ekvivalentní*, když  $\text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(\mathcal{B})$ ; píše se pak

$$\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}.$$

Snadno se zjistí, že  $\mathcal{A} \cong \mathcal{B} \Rightarrow \mathcal{A} \equiv \mathcal{B} \Leftrightarrow (\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi$  pro každou  $L$ -formuli  $\varphi$ ).

ÚLOHY. 1. Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura,  $T = \text{Th}(\mathcal{A})$  a  $\varphi$  buď  $L$ -formule. Platí:

- a)  $T \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ . b)  $T \models \neg \varphi$  nebo  $T \models \varphi$ , je-li  $\varphi$  sentence.

2. Buď  $L$  s rovností,  $\mathcal{A}$  buď  $L$ -struktura. Platí:

- a) Buď  $|A| \geq 2$ . Pak existuje  $L$ -formule  $\varphi$  s  $\text{Th}(\mathcal{A}) \not\models \varphi$  a  $\text{Th}(\mathcal{A}) \not\models \neg \varphi$ .
- b) Buď  $|A| = 1$ . Pak neexistuje  $L$ -formule  $\varphi$  s  $\text{Th}(\mathcal{A}) \not\models \varphi$  a  $\text{Th}(\mathcal{A}) \not\models \neg \varphi$ .

3. Buď  $L = \langle c, d \rangle$  jazyk s rovností, kde  $c, d$  jsou konstantní symboly,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$  nechť jsou modely  $L$ . Kdy právě platí  $\mathcal{A} \equiv \mathcal{B}$ ?

## Dedukce.

## 3.1.23. Logické axiomy a pravidla.

Buď  $L$  jazyk.

1. *Logické axiomy*  $\text{L}Ax_L$ , stručněji  $\text{L}Ax$ , predikátové logiky v jazyce  $L$  jsou:

$L$ -formule tvaru (PL1) – (PL3), *axiomy o kvantifikátorech* jazyka  $L$  a *axiomy rovnosti* jazyka  $L$ , jakmile je  $L$  s rovností:

*Axiomy o kvantifikátorech*:

*Axiomy substituce*:  $L$ -formule  $(\forall x)\varphi \rightarrow \varphi(x/t)$ , je-li term  $t$  substitovatelný za proměnnou  $x$  do formule  $\varphi$ .

*Axiomy  $\forall$ -zavedení*:  $L$ -formule  $(\forall x)(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\forall x)\psi)$ , není-li proměnná  $x$  volná ve  $\varphi$ .

*Axiomy rovnosti*:  $x = x$ ,

$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n = y_n \rightarrow R(x_1, \dots, x_n) \rightarrow R(y_1, \dots, y_n)$ ,  
pokud  $R$  je  $n$ -ární relační symbol jazyka  $L$ .

$x_1 = y_1 \rightarrow \dots \rightarrow x_n = y_n \rightarrow F(x_1, \dots, x_n) = F(y_1, \dots, y_n)$ ,  
pokud  $F$  je  $n$ -ární funkční symbol jazyka  $L$ .

2. *Pravidla dedukce (odvozování)* jsou:

Pravidlo *modus ponens*  $\text{MP}(\varphi, \varphi \rightarrow \psi) = \psi$ :  $z \varphi, \varphi \rightarrow \psi$  odvod'  $\psi$ .

Pravidla *generalizace*  $\text{Gen}_x(\varphi) = (\forall x)\varphi$  pro  $x \in \text{Var}$ :  $z \varphi$  odvod'  $(\forall x)\varphi$ .

3. Když  $T$  je  $L$ -teorie, neuvádíme v  $T$  logické axiomy jazyka  $L$ . Říkáme pak, že formule z  $T$  jsou *mimologické axiomy* teorie  $T$ .

## 3.1.24. Důkaz, teorém, vyvratitelná, nezávislá a konzistentní formule.

Buď  $T \subseteq \text{Fm}_L$ .

1. *Důkaz v  $T$*  je  $\{\text{MP}\} \cup \{\text{Gen}_x; x \in \text{Var}\}$ -odvození z  $T \cup \text{L}Ax$ ; je to *důkaz formule*, která je jeho posledním členem. Formule  $\varphi$  je *dokazatelná v  $T$*  čili to je *teorém v  $T$* , existuje-li nějaký její důkaz v  $T$ ; píšeme pak

$$T \vdash \varphi.$$

Množinu všech teorémů teorie  $T$  resp. těch, které jsou navíc sentencemi, značíme

$$\text{Thm}(T) \text{ nebo } \text{Thm}_T \text{ resp. } \text{Th}(T) \text{ nebo } \text{Th}_T.$$

Tedy  $\text{Thm}(T)$  je  $\{\text{MP}\} \cup \{\text{Gen}_x; x \in \text{Var}\}$ -uzávěr  $T \cup \text{L}Ax$ . Speciálně jsou teorémy teorie  $T$  definovány induktivně pravidly:

- Každý axiom teorie  $T$  a každý logický axiom je teorém teorie  $T$ .
- Jsou-li  $\varphi, \varphi \rightarrow \psi$  teorémy teorie  $T$ , je  $\psi$  a  $(\forall x)\varphi$  teorém teorie  $T$ , když  $x \in \text{Var}$ .

Jakožto uzavěr má operace  $\text{Thm}$  následující vlastnosti pro  $T \subseteq \text{Fm}_L$  (viz 1.1.3):

$$T' \subseteq T \Rightarrow \text{Thm}(T') \subseteq \text{Thm}(T), \quad T \subseteq \text{Thm}(T) = \text{Thm}(\text{Thm}(T)).$$

- Formule  $\varphi$  je *vyvratitelná* a *těž spor* v  $T$ , když  $T \vdash \neg\varphi$ ,  
*nezávislá v  $T$* , když  $T \not\vdash \varphi$  a  $T \not\vdash \neg\varphi$ ,  
*konzistentní s  $T$* , když  $T \not\vdash \neg\varphi$ .

3. Když  $T = \emptyset$ , vypouštíme v uvedených pojmech výraz „ $v[s]$   $T$ “ či jej nahradíme výrazem „logicky“ nebo „v logice“.

TVRZENÍ 3.1.25. (O korektnosti predikátové logiky.)

- 1) a) Každý logický axiom je *pravidlivý*.  
b) Když  $\mathcal{A} \models \{\varphi, \varphi \rightarrow \psi\}$ , tak  $\mathcal{A} \models \psi$  a  $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi$ .
- 2) Pro teorii  $T$  a její formuli  $\varphi$  platí:  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$ .

**Důkaz.** 1) Nechť  $\mathcal{A}$  je  $L$ -struktura. a) Každá  $L$ -formule tvaru (PL1) – (PL3) jasně platí v  $\mathcal{A}$ , neboť to je tautologie. Z definice platnosti atomické formule plyne platnost axiomů rovnosti v  $\mathcal{A}$ . Buď  $t$  term substituovatelný do  $\varphi$  za  $x$  a  $e$  ohodnocení proměnných v  $\mathcal{A}$ ; dokážeme, že  $\mathcal{A} \models ((\forall x)\varphi \rightarrow \varphi(x/t))[e]$ . Nechť  $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi[e]$ . Pak  $\mathcal{A} \models \varphi[e(x/t[e])]$  a dle tvrzení 3.1.14 o korektnosti substituce je  $\mathcal{A} \models \varphi(x/t)[e]$ . Snadno se dokáže také i každý axiom  $\forall$ -zavedení, užijeme-li toho, že  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  nezávisí na  $e(x)$ , není-li  $x$  volná ve  $\varphi$ . b) Evidentně  $\mathcal{A} \models \psi$ . Protože  $\mathcal{A} \models \varphi$  značí, že  $\mathcal{A} \models \varphi[e]$  pro každé ohodnocení proměnných v  $\mathcal{A}$ , jasně  $\mathcal{A} \models (\forall x)\varphi$ .

2) plyne indukcí na teorémech  $T$  bezprostředně užitím 1).  $\square$

**POZNÁMKA.** Formule  $\varphi \rightarrow (\forall x)\varphi$  není obecně pravdivá, tedy ji nelze vzít za logický axiom. Buď totiž např.  $\varphi$  tvaru  $U(x)$ , kde  $U$  je unární relační symbol. Pak  $\langle 2, \{0\} \rangle \not\models \varphi \rightarrow (\forall x)\varphi$ .

Formule jazyka  $L$  predikátové logiky jsou výroky nad prvovýroky  $\mathbb{P}(L)$ , kterými jsou právě všechny atomické a kvantifikátorem začínající  $L$ -formule. V tomto smyslu dedukce predikátové logiky obsahuje dedukci výrokové logiky. Speciálně je každá tautologie dokazatelná v predikátové logice. Protože všechny vztahy z 2.1.10, píšeme-li tam  $\vdash$  místo  $\models$ , plynou z jistých tautologií a užitím pravidla modus ponens, platí i v predikátové logice. Shrňme to:

**TVRZENÍ 3.1.26.** Každá tautologie je dokazatelná v predikátové logice. Platí tvrzení z (2.1.10), kde píšeme  $\vdash$  místo  $\models$ . Speciálně platí následující pravidla.

*Rozbor případů:*  $T \vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow \chi \Leftrightarrow (T \vdash \varphi \rightarrow \chi \text{ a } T \vdash \psi \rightarrow \chi)$ .  
*Konjunkce:*  $T \vdash \varphi \text{ a } T \vdash \psi \Leftrightarrow T \vdash \varphi \& \psi$ .  
*Tranzitivita implikace:*  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi \text{ a } T \vdash \psi \rightarrow \chi \Rightarrow T \vdash \varphi \rightarrow \chi$ .

### 3.1.27. Bezesporná a kompletní teorie. Extenze, ekvivalentnost a konzervativnost.

1. Teorie  $T$  je *sporná*, je-li v ní dokazatelná každá  $L(T)$ -formule; jinak je *bezezporná*. Teorie  $T$  je *kompletní*, je-li bezesporná a každá  $L(T)$ -sentence je v ní dokazatelná nebo vyvratitelná.

2. Teorie  $T'$  je *extenze* teorie  $T$ , když  $L(T) \subseteq L(T')$  a  $\text{Thm}(T) \subseteq \text{Thm}(T')$ ; je *jednoduchá*, když navíc  $L(T) = L(T')$ . Dvě teorie jsou *ekvivalentní*, je-li každá z nich extenzí druhé. Pro teorii  $T$  tedy platí díky  $\text{Thm}(T) = \text{Thm}(\text{Thm}(T))$ :

$T$  je ekvivalentní s  $\text{Thm}(T)$ .

3. Extenze  $T'$  teorie  $T$  je *konzervativní*, je-li každá  $L(T)$ -formule dokazatelná v  $T'$  dokazatelná i v  $T$ .

**TVRZENÍ 3.1.28.** Pro teorii  $T$  platí:

- $T \vdash \perp \Leftrightarrow T$  je *sporná*.
- $T \vdash \perp \Leftrightarrow \varphi$ , *jakmile*  $\varphi$  je *vyvratitelná* v  $T$ .
- $T \vdash \top \Leftrightarrow \varphi$ , *jakmile*  $\varphi$  je *dokazatelná* v  $T$ .

**Důkaz.** Formule  $\top$  je  $\varphi_0 \rightarrow \varphi_0$  pro jisté  $\varphi_0$  a  $\perp$  je  $\neg\top$ . a) Implikace  $\Leftarrow$  je jasná, dokazujeme  $\Rightarrow$ . Když  $T \vdash \perp$ , díky  $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ ,  $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)$  a modus ponens máme  $T \vdash \chi$  pro každou  $L(T)$ -formuli  $\chi$ .

b) Buď  $T \vdash \neg\varphi$ . Jelikož  $\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$  je tautologie, modus ponens dá  $T \vdash \varphi \rightarrow \perp$ . Jelikož  $\perp \rightarrow \varphi$  je tautologie, máme  $T \vdash \perp \rightarrow \varphi$ . Podle 1) je  $T \vdash \psi \Leftrightarrow \chi \Leftrightarrow T \vdash \psi \rightarrow \chi$  a  $T \vdash \chi \rightarrow \psi$ , tedy  $T \vdash \perp \Leftrightarrow \varphi$  platí.

c) jako b) nebo z b) aplikovaného nyní na v  $T$  vyvratitelnou formuli  $\neg\varphi$ .  $\square$

**TVRZENÍ 3.1.29.** Pro teorii  $T$  platí:

- $T$  je *bezezporná*  $\Leftrightarrow \text{Thm}(T)$  je *bezezporná*
- $T$  je *kompletní*  $\Leftrightarrow \text{Thm}(T)$  je *kompletní*.
- $T$  je *maximální bezesporná*  $\Rightarrow T = \text{Thm}(T)$ .
- $T$  je *kompletní*  $\Leftrightarrow \text{Thm}(T)$  je *maximální bezesporná*.

Důkaz. 1) a 2) plyne z toho, že  $T$  je ekvivalentní s  $\text{Thm}(T)$ .

3) Je  $T \subseteq \text{Thm}(T)$  a dle 1) je  $\text{Thm}(T)$  bezesporná, díky maximalitě  $T$  nutně  $\text{Thm}(T) \subseteq T$ .

4) Implikace  $\Rightarrow$ . Buď  $T$  kompletní. Je  $\text{Thm}(T)$  bezesporná. Je-li  $S \supseteq \text{Thm}(T)$   $L(T)$ -teorie a  $\varphi \in S - \text{Thm}(T)$ , tak pro generální uzávěr  $\varphi'$  formule  $\varphi$  je  $S \vdash \varphi'$ . Nutně  $T \not\vdash \varphi'$  (neboť jinak  $T \vdash \varphi$ ), tedy  $T \vdash \neg\varphi'$  díky kompletnosti  $T$  a  $\varphi', \neg\varphi' \in \text{Thm}(S)$ , tedy  $S$  je sporná. Implikace  $\Leftarrow$ . Buď  $\text{Thm}(T)$  maximální bezesporná. Pro sentenci  $\sigma$  je  $\text{Thm}(T) \vdash \sigma$  nebo  $\text{Thm}(T) \vdash \neg\sigma$ . Díky  $\text{Thm}(\text{Thm}(T)) = \text{Thm}(T)$  tedy  $T \vdash \sigma$  nebo  $T \vdash \neg\sigma$ .  $\square$

### POZNÁMKY 3.1.30.

1. Nechť  $T$  je  $L$ -teorie, která má model. Pak platí:

a)  $T$  je kompletní  $\Leftrightarrow T$  je ekvivalentní s  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro nějakou  $L$ -strukturu  $\mathcal{A}$ .

b) Je-li  $T$  je kompletní, jsou každé její dva modely elementárně ekvivalentní.

Důkaz. a) Implikace  $\Rightarrow$ . Buď  $T$  kompletní. Předpokládáme, že  $T$  má nějaký model  $\mathcal{A}$ :  $\mathcal{A} \models T$ . Je  $T$  ekvivalentní s  $\text{Th}(\mathcal{A})$ . Buď totiž  $\varphi$  sentence. Když  $T \vdash \varphi$ , tak  $\mathcal{A} \models \varphi$  díky korektnosti a pak  $\text{Th}(\mathcal{A}) \vdash \varphi$ . Buď naopak  $\text{Th}(\mathcal{A}) \vdash \varphi$ . Je  $\mathcal{A} \models \text{Th}(\mathcal{A})$ , díky korektnosti je  $\mathcal{A} \models \varphi$  a díky kompletnosti  $T$  nutně  $T \vdash \varphi$ . Implikace  $\Leftarrow$ . Nechť  $T$  je ekvivalentní s  $\text{Th}(\mathcal{A})$  pro nějakou  $L$ -strukturu  $\mathcal{A}$ . Pak je  $T$  bezesporná, neboť  $\mathcal{A} \models T$ . (Pro  $\varphi \in T$  je totiž  $\text{Th}(\mathcal{A}) \vdash \varphi$ , tedy  $\mathcal{A} \models \varphi$  díky  $\mathcal{A} \models \text{Th}(\mathcal{A})$  a korektnosti.) Nechť  $\varphi$  je sentence. Pak  $\mathcal{A} \models \varphi$  nebo  $\mathcal{A} \models \neg\varphi$ , tedy  $T \vdash \varphi$  nebo  $T \vdash \neg\varphi$ . b) Pro modely  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  kompletní teorie  $T$  a sentenci  $\varphi$  jazyka  $L(T)$  máme dle a):

$$\varphi \in \text{Th}(\mathcal{A}) \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{A}) \vdash \varphi \Leftrightarrow T \vdash \varphi \Leftrightarrow \text{Th}(\mathcal{B}) \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi \in \text{Th}(\mathcal{B}).$$

(V prvé  $\Leftrightarrow$  je  $\Rightarrow$  jasné a  $\Leftarrow$  platí, neboť  $\text{Th}(\mathcal{A}) \vdash \varphi \Rightarrow \mathcal{A} \models \varphi \Rightarrow \varphi \in \text{Thm}(\mathcal{A})$ ; zde prvá  $\Rightarrow$  plyne z  $\mathcal{A} \models \text{Th}(\mathcal{A})$  a korektnosti.)  $\square$

2. Buďte  $T, T'$  teorie.

a) Buď  $L(T) \subseteq L(T')$ .  $T'$  je extenze  $T$  právě když je každý axiom teorie  $T$  dokazatelný v  $T'$ . Buď  $L(T) = L(T')$ .  $T'$  je ekvivalentní s  $T'$  právě když každý axiom  $T$  je dokazatelný v  $T'$  a naopak.

b)  $T$  je ekvivalentní s  $L(T)$ -teorií  $\{\text{g.c.}(\varphi); \varphi \in T\}$ , kde  $\text{g.c.}(\varphi)$  je uzávěr  $\varphi$ .

Důkaz. a) Implikace  $\Rightarrow$  je jasná. Když naopak  $T \subseteq \text{Thm}(T')$ , tak  $\text{Thm}(T) \subseteq \text{Thm}(\text{Thm}(T')) = \text{Thm}(T')$ . Tvzení o ekvivalenci plyne bezprostředně. b) Je  $\{\varphi\} \vdash \text{g.c.}(\varphi)$  dle pravidla generalizace. Naopak  $\{\text{g.c.}(\varphi)\} \vdash \varphi$  užitím axiomu substitute a modus ponens. Tvzení tedy plyne z a).  $\square$

### Teorémy logiky a pravidla dokazování.

Říkáme, že proměnná  $x$  je [ne]kvantifikovaná ve formuli  $\varphi$ , když [není] ve  $\varphi$  výskyt  $(\forall x)$ . Když proměnná  $x$  je nekvantifikovaná ve  $\varphi$ , je substituovatelná za každou proměnnou do  $\varphi$ . Nemá-li proměnná  $x$  výskyt ve  $\varphi$ , nemusí být substituovatelná do  $\varphi$  za nějakou proměnnou. Např.  $x$  nemá výskyt ve  $\varphi$  tvaru  $(\exists x)(y = z)$  a není substituovatelná za  $y$  do  $\varphi$ .

TVRZENÍ 3.1.31. Buďte  $\varphi, \psi$  formule teorie  $T$ .

1)  $\vdash \varphi(x/t) \rightarrow (\exists x)\varphi$ .

2) (Pravidlo  $\forall$ -zavedení.)  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow T \vdash \varphi \rightarrow (\forall x)\psi$ , pokud  $x$  není volná proměnná  $\varphi$ .

3) (Pravidlo  $\exists$ -zavedení.)  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi \Rightarrow T \vdash (\exists x)\varphi \rightarrow \psi$ , pokud  $x$  není volná proměnná  $\psi$ .

Důkaz. 1) Je  $\vdash (\forall x)\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi(x/t)$ , tedy pomocí tautologie a modus ponens také  $\vdash \varphi(x/t) \rightarrow \neg(\forall x)\neg\varphi$  a tvrzení plyne z definice  $\exists$ .

2) Pravidlo generalizace dá  $T \vdash (\forall x)(\varphi \rightarrow \psi)$ ,  $(\forall x)(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\forall x)\psi)$  je axiom  $\forall$ -zavedení, užitím modus ponens pak  $T \vdash \varphi \rightarrow (\forall x)\psi$ .

3) Je  $T \vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$  pomocí modus ponens z  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$  a  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$ , dále je  $T \vdash \neg\psi \rightarrow (\forall x)\neg\varphi$  dle pravidla  $\forall$ -zavedení;  $T \vdash (\exists x)\varphi \rightarrow \psi$  plyne pomocí zřejmých tautologií a z definice  $\exists$ .  $\square$

**VĚTA 3.1.32.** *Budte  $\varphi, \psi$  nějaké  $L$ -formule,  $T$  buď  $L$ -teorie.*

- 1) (O uzávěru.)  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow T \vdash \varphi'$ , je-li  $\varphi'$  uzávěr  $\varphi$ .
- 2) (O instanci.)  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi'$ , je-li  $\varphi'$  instance  $\varphi$ .
- 3) (O konstantách.)  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow T' \vdash \varphi(x_1/c_1, \dots, x_n/c_n)$ , pokud je  $T'$  extenze  $T$  o nové konstantní symboly  $c_1, \dots, c_n$  (a žádný nový mimologický axiom).
- 4) (O dedukci.) Když  $\psi$  je sentence, tak  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi \Leftrightarrow T, \psi \vdash \varphi$ .
- 5) (Důkaz sporem.) Když  $\varphi$  je sentence, tak  $(T, \neg\varphi \vdash \perp) \Rightarrow T \vdash \varphi$ .

*Důkaz.* 1) Implikace  $\Rightarrow$  plyne ihned z pravidla generalizace, opačná užitím axiomu substitute a pravidla modus ponens.

2) Nechť  $T \vdash \varphi$ . Je-li  $\varphi'$  tvaru  $\varphi(x_1/t_1, x_2, \dots, x_n)$ , platí to na základě generalizace, axiomu substitute a pravidla modus ponens. Nechť  $\varphi'$  je  $\varphi(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$ ;  $y_1, \dots, y_n$  budte různé proměnné nekvantifikované a nevyskytující se ani ve  $\varphi$  ani ve  $\varphi'$ . Podle již dokázaného platí  $T \vdash \varphi_0$ , kde  $\varphi_0$  je  $\varphi(x_1/y_1, \dots, x_n/y_n)$ , neboť zde simultánní substituování vede k témuž, jako postupné. Touž argumentací dostaneme  $T \vdash \varphi_0(y_1/t_1, \dots, y_n/t_n)$  a poslední formule je jasně  $\varphi'$ .

3) Zřejmě  $T \vdash \varphi \Rightarrow T' \vdash \varphi \Rightarrow T' \vdash \varphi(x_1/c_1, \dots, x_n/c_n)$ . Buď naopak  $T' \vdash \varphi(x_1/c_1, \dots, x_n/c_n)$ ; buď  $D$  příslušný důkaz a  $y_1, \dots, y_n$  různé proměnné, které se nevyskytují ani nejsou kvantifikované v žádné formuli z  $D$ . Nahradíme-li v  $D$  každý výskyt  $c_i$  proměnnou  $y_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , získáme tak důkaz v  $T$  formule  $\varphi_0$  tvaru  $\varphi(x_1/y_1, \dots, x_n/y_n)$ , neboť z každého logického axiomu získáme uvedeným nahrazením logický axiom, mimologické se nových konstant netýkají a z aplikace pravidla se opět stane aplikace pravidla. Jelikož  $\varphi$  je  $\varphi_0(y_1/x_1, \dots, y_n/x_n)$ , máme  $T \vdash \varphi$  podle tvrzení o instanci.

4) Implikace  $\Rightarrow$  plyne ihned užitím modus ponens, dokonce bez předpokladu, že  $\psi$  je sentence. Buď nyní  $T, \psi \vdash \varphi$ ; dokážeme  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ , a to indukcí na teoremech teorie  $T, \psi$ .

Buď  $\varphi$  axiom teorie  $T, \psi$ . Je-li  $\varphi$  rovno  $\psi$ , je  $\psi \rightarrow \varphi$  tautologie, tedy je dokazatelná v  $T$ . Je-li  $\varphi$  axiom  $T$ , plyne z axiomu  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$  užitím modus ponens žádané  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ .

Buď  $\varphi$  odvozeno pomocí modus ponens z  $\chi$ ,  $\chi \rightarrow \varphi$  a pro  $\chi$ ,  $\chi \rightarrow \varphi$  nechť to platí. Odtud a z axiomu  $\psi \rightarrow (\chi \rightarrow \varphi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi))$  užitím modus ponens získáme  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ .

Buď  $\varphi$  odvozeno generalizací z  $\chi$ , tj.  $\varphi$  je tvaru  $(\forall x)\chi$ , a pro  $\chi$  nechť tvrzení platí. Je  $T, \psi \vdash \chi$ , tedy  $T \vdash \psi \rightarrow \chi$  dle indukčního předpokladu; generalizace a pravidlo  $\forall$ -zavedení dá  $T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ .

5) Z  $T, \neg\varphi \vdash \perp$  plyne  $T \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$  užitím věty o dedukci. Pomocí tautologií  $(\neg\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow (\top \rightarrow \varphi)$ ,  $(\top \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$  a modus ponens pak  $T \vdash \varphi$ .  $\square$

**POZNÁMKA 3.1.33.** Nechť  $U$  je unární relační symbol.

1.  $\models U(x) \rightarrow (\forall x)U(x)$ . O tom svědčí model  $\mathcal{A} = \langle 2, \{0\} \rangle$ .
2. Ve větě o dedukci " $T, \psi \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \psi \rightarrow \varphi$ , jakmile  $\psi$  je sentence" nelze vynechat předpoklad, že  $\psi$  je sentence. Máme totiž  $U(x) \vdash (\forall x)U(x)$  dle pravidla generalizace, nikoli však  $\vdash U(x) \rightarrow (\forall x)U(x)$ , neboť to by znamenalo  $\models U(x) \rightarrow (\forall x)U(x)$ , což dle 1. neplatí.
3. V tvrzení o důkazu sporem " $(T, \neg\varphi \vdash \perp) \Rightarrow T \vdash \varphi$ , jakmile je  $\varphi$  sentence" nelze vynechat předpoklad, že  $\varphi$  je sentence. O tom svědčí  $\varphi$  tvaru  $U(x) \rightarrow (\forall x)U(x)$ , neboť  $\neg\varphi \vdash (\forall x)U(x)$ ,  $\neg(\forall x)U(x)$ , tedy  $\neg\varphi \vdash \perp$ . Avšak  $\not\models \varphi$  dle 1.
4. V tvrzení o instanci " $T \vdash \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi'$ , jakmile je  $\varphi'$  instance  $\varphi$ ", nelze implikaci obrátit. To ukazuje  $\varphi$  rovno  $x = 0$ ; je  $T \vdash \varphi(x/0)$ , nemusí ale být  $T \vdash \varphi$ .

VĚTA 3.1.34.

- 1) (Pravidlo distribuce ( $Q$ ).) *Když  $Q$  je  $\forall$  nebo  $\exists$ , tak*  

$$(T \vdash \varphi \rightarrow \psi) \Rightarrow T \vdash (Qx)\varphi \rightarrow (Qx)\psi.$$
- 2) (O ekvivalenci.) *Nechť formule  $\varphi'$  se získá z  $\varphi$  nahrazením některých výskytů podformulí  $\psi_1, \dots, \psi_n$  po řadě formulemi  $\psi'_1, \dots, \psi'_n$ . Pak platí*  

$$(T \vdash \psi_1 \leftrightarrow \psi'_1, \dots, T \vdash \psi_n \leftrightarrow \psi'_n) \Rightarrow T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'.$$
- 3) (O variantách.) *Je-li  $\varphi'$  varianta  $\varphi$ , tak  $\vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$ .*
- 4) (Vytýkání kvantifikátorů.)
  - a)  $\vdash (Qx)(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi \rightarrow (Qx)\psi)$ , nemá-li  $x$  volný výskyt ve  $\varphi$  a  $Q$  je kvantifikátor.
  - b)  $\vdash (Qx)(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow ((Q'x)\varphi \rightarrow \psi)$ , nemá-li  $x$  volný výskyt ve  $\psi$ ,  $Q$  je kvantifikátor a  $Q'$  je  $\exists$  resp.  $\forall$ , pokud  $Q$  je  $\forall$  resp.  $\exists$ .
  - c)  $\vdash (Qx)(\varphi \diamond \psi) \leftrightarrow ((Qx)\varphi \diamond \psi)$ , nemá-li  $x$  volný výskyt ve  $\psi$ ,  $Q$  je kvantifikátor a  $\diamond$  je  $\&$  nebo  $\vee$ .

Důkaz. 1) Z axiomu  $(\forall x)\varphi \rightarrow \varphi$  a  $T \vdash \varphi \rightarrow \psi$  dostaneme  $T \vdash (\forall x)\varphi \rightarrow \psi$  a užitím pravidla  $\forall$ -zavedení požadované  $T \vdash (\forall x)\varphi \rightarrow (\forall x)\psi$ . Tvrzení pro  $Q$  rovno  $\exists$  plyne z dokázaného a z definice  $\exists$ .

2) Indukcí dle složitosti  $\varphi$ . Je-li  $\varphi$  atomická,  $\varphi'$  je  $\varphi$  nebo některé  $\psi'_i$  a  $\varphi$  je  $\psi_i$ ; tvrzení pak jasně platí. Indukční krok pro negaci a implikaci je snadný a pro obecnou kvantifikaci plyne z pravidla distribuce  $\forall$ .

3) Díky tvrzení o ekvivalenci a definici varianty stačí zřejmě dokázat, že  $\vdash (\forall x)\psi \leftrightarrow (\forall y)\psi(x/y)$ , není-li proměnná  $y$  volná ve  $\psi$ . Označme  $\psi(x/y)$  jako  $\psi'$ ; zřejmě  $\psi'(y/x)$  je  $\psi$ . Jak  $(\forall y)\psi' \rightarrow \psi$ , tak  $(\forall x)\psi \rightarrow \psi'$  je axiom substitute; pomocí pravidla  $\forall$ -zavedení dostaneme snadno dokazovanou ekvivalenci.

4) a) Buď  $Q$  rovno  $\forall$ . Stačí dokázat  $\leftarrow$ .  $((\forall x)\psi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\forall x)\psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi))$  je tautologie a její předpoklad je axiom substitute; pomocí modus ponens a pravidla  $\forall$ -zavedení dostaneme žádanou implikaci.

Buď  $Q$  rovno  $\exists$ . Dokážeme  $\rightarrow$ . Jako v a) je  $(\psi \rightarrow (\exists x)\psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\exists x)\psi))$  tautologie a  $\vdash \psi \rightarrow (\exists x)\psi$ , tedy  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\exists x)\psi)$ . Užitím pravidla  $\exists$ -zavedení získáme dokazovaný vztah.

Dokážeme  $\leftarrow$ . Platí  $\vdash \neg\varphi \rightarrow (\exists x)(\varphi \rightarrow \psi)$  (neboť  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\exists x)(\varphi \rightarrow \psi)$  díky 3.1.31, 1) a  $\neg\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$  je tautologie) a dále  $\vdash (\exists x)\psi \rightarrow (\exists x)(\varphi \rightarrow \psi)$  (užitím pravidla distribuce na tautologii  $\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ). Pravidlo rozbor případů,  $\vdash (\neg\varphi \vee (\exists x)\psi) \leftrightarrow (\varphi \rightarrow (\exists x)\psi)$  a tvrzení o ekvivalenci dají  $\vdash (\varphi \rightarrow (\exists x)\psi) \rightarrow (\exists x)(\varphi \rightarrow \psi)$ .

b) plyne z a), užijeme-li  $\vdash (\neg\psi \rightarrow (Qx)\neg\varphi) \leftrightarrow ((Q'x)\varphi \rightarrow \psi)$  a  $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$ .

c) plyne z a), b) a ekvivalentu  $\diamond$  pomocí  $\rightarrow$ . □

3.1.35. Prenexní tvar formulí. Prenexní operace.

1. Formule  $\varphi$  je v *prenexním tvaru*, má-li tvar  $(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)\psi$ , kde  $Q_i$  je  $\forall$  nebo  $\exists$ ,  $x_1, \dots, x_n$  jsou navzájem různé proměnné a  $\psi$  je otevřená formule;  $(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)$  se nazývá *prefix* a  $\psi$  *otevřené jádro*  $\varphi$ .

2. *Prenexní operace* na formulích jsou dány pravidly pa) – pf), přičemž  $Q'$  je  $\exists$  resp.  $\forall$ , když  $Q$  je  $\forall$  resp.  $\exists$  a  $\diamond$  je  $\&$  nebo  $\vee$ ; nahrazená a nahrazující formule jsou za uvedených předpokladů logicky ekvivalentní díky tvrzení o variantách, o vytýkání kvantifikátorů a zavedení  $\exists$ .

- pa) Nahraď podformuli její variantou.
- pb) Nahraď podformuli  $\neg(Qx)\psi$  za  $(Q'x)\neg\psi$ .
- pc) Nahraď podformuli  $(Qx)\psi \diamond \chi$  za  $(Qx)(\psi \diamond \chi)$ , není-li  $x$  volná v  $\chi$ .
- pd) Nahraď podformuli  $\psi \diamond (Qx)\chi$  za  $(Qx)(\psi \diamond \chi)$ , není-li  $x$  volná ve  $\psi$ .
- pe) Nahraď podformuli  $(Qx)\psi \rightarrow \chi$  za  $(Q'x)(\psi \rightarrow \chi)$ , není-li  $x$  volná v  $\chi$ .
- pf) Nahraď podformuli  $\psi \rightarrow (Qx)\chi$  za  $(Qx)(\psi \rightarrow \chi)$ , není-li  $x$  volná ve  $\psi$ .



**VĚTA 3.1.36.** (O prenexním tvaru.) *Ke každé formulí lze nalézt pomocí prenexních operací formulí v prenexním tvaru s ní ekvivalentní.*

**Důkaz.** Označme  $\varphi'$  formulí v prenexním tvaru ekvivalentní s  $\varphi$ . Dokazujeme tvrzení indukci dle složitosti  $\varphi$ . Atomická  $\varphi$  je v prenexním tvaru. Je-li  $\varphi$  tvaru  $\neg\psi$ , získáme  $\varphi'$  z  $\neg\psi'$  po postupné aplikaci pb) a užitím tvrzení o ekvivalenci. Podobně, je-li  $\varphi$  tvaru  $\psi \rightarrow \chi$ , pomocí pa) lze docílit, že proměnné v prefixech  $\psi'$ ,  $\chi'$  jsou různé a navíc jsou různé od proměnných volných v  $\psi'$ ,  $\chi'$ . Aplikací pe), pf) získáme  $\varphi'$ . Pro  $\varphi$  tvaru  $(\forall x)\psi$  je  $\varphi$  ekvivalentní  $(\forall x)\psi'$  a pomocí tvrzení pa) docílíme, aby všechny proměnné v prefixu byly různé.  $\square$

**VĚTA 3.1.37.** (O rovnosti.)

$$1) \vdash x = x, \quad \vdash x = y \leftrightarrow y = x, \quad \vdash x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z.$$

2) *Buďte  $t, t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$  termy a  $\varphi$  formule teorie  $T$ .*

a) *Nechť  $T \vdash t_1 = s_1, \dots, T \vdash t_n = s_n$  a nechť  $t'$  resp.  $\varphi'$  se získá z  $t$  resp.  $\varphi$  nahrazením některých výskytů  $t_1, \dots, t_n$  odpovídajícími termy  $s_1, \dots, s_n$ . Pak platí  $T \vdash t = t'$  a  $T \vdash \varphi \leftrightarrow \varphi'$ .*

$$b1) \quad T \vdash t_1 = s_1 \rightarrow \dots \rightarrow t_n = s_n \rightarrow t(t_1, \dots, t_n) = t(s_1, \dots, s_n).$$

$$b2) \quad T \vdash t_1 = s_1 \rightarrow \dots \rightarrow t_n = s_n \rightarrow \varphi(t_1, \dots, t_n) \leftrightarrow \varphi(s_1, \dots, s_n).$$

**Důkaz.** 1) Dokážeme  $\vdash x = y \rightarrow y = x$ . Formule  $x = y \rightarrow x = x \rightarrow x = x \rightarrow y = x$  je axiom rovnosti, tedy  $\vdash x = y \rightarrow (x = x \rightarrow y = x)$  užitím  $\vdash x = y \rightarrow x = x$  (díky  $\vdash x = x$ ). Odtud analogicky  $\vdash x = y \rightarrow y = x$ . Podobně se dokáže  $\vdash y = x \rightarrow x = y$  a tedy také  $\vdash x = y \leftrightarrow y = x$ . Obdobně plyne  $\vdash x = y \rightarrow y = z \rightarrow x = z$ .

2) a) Indukcí dle složitosti  $t$ . Je-li  $t$  proměnná nebo konstantní symbol, je  $t'$  rovno  $t$  nebo  $s_i$  a  $t$  je  $t_i$ ;  $T \vdash t = t'$  tedy platí. Buď  $t$  tvaru  $F(r_1, \dots, r_m)$ . Pak  $t'$  je tvaru  $F(r'_1, \dots, r'_m)$ , kde  $T \vdash r_i = r'_i$  pro  $i = 1, \dots, m$  dle indukčního předpokladu. Z axiomu rovnosti a substituce dostáváme  $\vdash r_1 = r'_1 \rightarrow \dots \rightarrow r_m = r'_m \rightarrow t = t'$ , užitím modus ponens konečně  $T \vdash t = t'$ .

Indukcí podle složitosti  $\varphi$ . Buď  $\varphi$  atomická tvaru  $R(r_1, \dots, r_m)$ ; pak  $\varphi'$  je tvaru  $R(r'_1, \dots, r'_m)$ , kde  $T \vdash r_i = r'_i$  pro  $i = 1, \dots, m$  dle již dokázané části. Z axiomu rovnosti a substituce plyne  $\vdash r_1 = r'_1 \rightarrow \dots \rightarrow r_m = r'_m \rightarrow \varphi \rightarrow \varphi'$ , užitím modus ponens konečně  $T \vdash \varphi \rightarrow \varphi'$ . Ze symetrie rovnosti plyne podobně i  $T \vdash \varphi' \rightarrow \varphi$ . Indukční krok pro  $\neg$  a  $\rightarrow$  plyne ihned užitím vhodných tautologií (např.  $((\varphi_0 \leftrightarrow \varphi'_0) \& (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi'_1)) \rightarrow (\varphi_0 \rightarrow \varphi_1) \leftrightarrow (\varphi'_0 \rightarrow \varphi'_1)$ ) pro případ  $\rightarrow$  a indukčního předpokladu. Indukční krok pro  $\forall$  plyne užitím pravidla distribuce.

b1) Nahradíme každou proměnnou vyskytující se v  $t_i$  nebo  $s_i$  novým konstantním symbolem, kterým nahradíme tyto proměnné i v termech  $t(t_1, \dots, t_n)$ ,  $t(s_1, \dots, s_n)$ ; získáme tak  $t'_i$  a  $s'_i$  a  $t'(t'_1, \dots, t'_n)$ ,  $t'(s'_1, \dots, s'_n)$ . Díky větě o konstantách stačí dokázat

$$T' \vdash t'_1 = s'_1 \rightarrow \dots \rightarrow t'_n = s'_n \rightarrow t'(t'_1, \dots, t'_n) = t'(s'_1, \dots, s'_n),$$

kde  $T'$  je  $T$  v jazyce rozšířeném o nové konstanty. To je díky větě o dedukci ekvivalentní s  $T' \vdash t'_1 = s'_1 \& \dots \& t'_n = s'_n \rightarrow t'(t'_1, \dots, t'_n) = t'(s'_1, \dots, s'_n)$ ; tento vztah plyne z a). b2) se dokáže stejně.  $\square$

**TVRZENÍ 3.1.38.** *Následující formule jsou logicky dokazatelné;  $Q$  je kvantifikátor.*

- |    |  |  |
|----|--|--|
| a) | $(\forall x)(\varphi \& \psi) \leftrightarrow (\forall x)\varphi \& (\forall x)\psi$ | $(\exists x)(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\exists x)\varphi \vee (\exists x)\psi$ |
| b) | $(\exists x)(\varphi \& \psi) \rightarrow (\exists x)\varphi \& (\exists x)\psi$     | $(\forall x)\varphi \vee (\forall x)\psi \rightarrow (\forall x)(\varphi \vee \psi)$     |
| c) | $(\forall x)(\forall y)\varphi \leftrightarrow (\forall y)(\forall x)\varphi$        | $(\exists x)(\exists y)\varphi \leftrightarrow (\exists y)(\exists x)\varphi$            |
| d) | $(\exists x)(\forall y)\varphi \rightarrow (\forall y)(\exists x)\varphi$            | $(Qx)\varphi \leftrightarrow \varphi$ není-li $x$ volná ve $\varphi$                     |

**Důkaz.** Dokážeme nejprve

$$i) \vdash (Qx)(\varphi \& \psi) \rightarrow (Qx)\varphi \& (Qy)\psi, \quad ii) \vdash (\forall x)\varphi \& (\forall x)\psi \rightarrow (\forall x)(\varphi \& \psi).$$



Nechť  $L$ -formule  $\varphi, \psi$  mají všechny volné proměnné mezi  $x, x_1, \dots, x_n$ . Buďte dále  $c_1, \dots, c_n$  nové konstantní symboly,  $T$  prázdná teorie v jazyce  $L \cup \{c_1, \dots, c_n\}$  a  $\varphi'$  resp.  $\psi'$  formule

$$\varphi(x, x_1/c_1, \dots, x_n/c_n) \text{ resp. } \psi(x, x_1/c_1, \dots, x_n/c_n).$$

i) Máme  $\vdash (Qx)(\varphi \ \& \ \psi) \rightarrow (Qx)\varphi, (Qx)\psi$  z pravidla distribuce. Odtud plyne

$$T, (Qx)(\varphi' \ \& \ \psi') \vdash (Qx)\varphi', (Qx)\psi'$$

a pomocí vět o dedukci a o konstantách dostáváme i). ii) Užitím axiomu substituce, tvrzení o tautologiích a modus ponens dostaneme  $T, (\forall x)\varphi', (\forall x)\psi' \vdash \varphi' \ \& \ \psi'$ . Užitím generalizace a vět o dedukci a konstantách dostaneme ii).

Prvá formule z a) plyne snadno z i), ii), druhá snadno z první, první formule z b) z i), druhá snadno z první. c) Prvá formule. Z axiomů substituce:  $\vdash (\forall x)(\forall y)\varphi \rightarrow (\forall y)\varphi, \vdash (\forall y)\varphi \rightarrow \varphi$ ; odtud díky tvrzení o tautologiích  $\vdash (\forall x)(\forall y)\varphi \rightarrow \varphi$ . Užitím axiomu  $\forall$ -zavedení pak  $\vdash (\forall x)(\forall y)\varphi \rightarrow (\forall y)(\forall x)\varphi$ . Ze symetrie plyne i obrácená implikace a nakonec dokazovaná ekvivalence. Druhá formule z c) plyne snadno z první. d) Prvá formule:  $\vdash \varphi \rightarrow (\exists x)\varphi$ , dle pravidla distribuce tedy  $\vdash (\forall y)\varphi \rightarrow (\forall y)(\exists x)\varphi$ , užitím pravidla  $\exists$ -zavedení pak dokazované. Druhá formule pro  $Q$  rovno  $\forall$ : implikace  $\rightarrow$  plyne snadno z axiomu substituce, opačná z pravidla  $\forall$ -zavedení. Pro  $Q$  rovno  $\exists$  to je důsledek právě dokazaného.  $\square$

**TVRZENÍ 3.1.39.** *Není-li  $x$  obsaženo v termu  $t$ , je dokazatelné:*

$$1) \varphi(x/t) \leftrightarrow (\forall x)(x = t \rightarrow \varphi), \quad 2) \varphi(x/t) \leftrightarrow (\exists x)(x = t \ \& \ \varphi).$$

**Důkaz.** 1) Axiom substituce dává  $\vdash (\forall x)(x = t \rightarrow \varphi) \rightarrow (t = t \rightarrow \varphi(x/t))$ . (Implicitně se předpokládá substituovatelnost  $t$  za  $x$  do  $\varphi$ .) Užitím tautologie odtud plyne  $\vdash t = t \rightarrow ((\forall x)(x = t \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi(x/t))$  a dále  $\vdash (\forall x)(x = t \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi(x/t)$  díky  $\vdash t = t$ . Opačnou implikaci dokážeme pomocí

$$\vdash x = t \rightarrow (\varphi \leftrightarrow \varphi(x/t)). \quad (3.2)$$

Užitím tautologie plyne  $\vdash \varphi(x/t) \rightarrow (x = t \rightarrow \varphi)$ . Jelikož  $x$  není volná v  $\varphi(x/t)$ , pravidlo  $\forall$ -zavedení dá  $\vdash \varphi(x/t) \rightarrow (\forall x)(x = t \rightarrow \varphi)$ .

2) Z  $\psi(x/t) \rightarrow (\exists x)\psi$ , aplikovaného na  $\psi$  tvaru  $x = t \ \& \ \varphi$  dostaneme  $\vdash (t = t \ \& \ \varphi(x/t)) \rightarrow (\exists x)(x = t \ \& \ \varphi)$ . Odtud díky  $\vdash t = t$  máme  $\vdash \varphi(x/t) \rightarrow (\exists x)(x = t \ \& \ \varphi)$ . Opačná implikace. Z (3.2) plyne užitím tautologie:  $\vdash (x = t \ \& \ \varphi) \rightarrow \varphi(x/t)$ . Protože  $x$  není volná v  $\varphi(x/t)$ , pravidlem  $\exists$ -zavedení získáme  $\vdash (\exists x)(x = t \ \& \ \varphi) \rightarrow \varphi(x/t)$ .  $\square$

### Existence modelu, úplnost, kompaktnost.

#### 3.1.40. Kanonická struktura pro teorii.

Buď  $L = \langle \mathcal{R}, \mathcal{F} \rangle$  jazyk s konstantním symbolem,  $T$  buď  $L$ -teorie.

Obor designátorů  $\underline{D}(\mathcal{F})$  se nazývá též *struktura* či *algebra konstantních termů jazyka  $L$* ; její univerzum je množina konstantních  $L$ -termů.

1. *Konstantní struktura pro  $T$*  je  $\langle \underline{D}, \mathcal{F} \rangle$ -struktura  $\mathcal{A}$ , jež je expanzí oboru designátorů  $\underline{D}(\mathcal{F})$  takovou, že pro  $n$ -ární  $R \in \mathcal{R}$  a konstantní  $L$ -termy  $t_1, \dots, t_n$  je

$$R^{\mathcal{A}}(t_1, \dots, t_n) \Leftrightarrow T \vdash R(t_1, \dots, t_n).$$

Je-li  $L$  bez rovnosti, říkáme, že  $\mathcal{A}$  je *kanonická struktura pro  $T$* .

2. Buď  $L$  navíc s rovností. Definujeme ekvivalenci  $\sim$  na univerzu  $\mathcal{A}$ :

$$t \sim s \Leftrightarrow T \vdash t = s.$$

Pak pro  $t_1 \sim t'_1, \dots, t_n \sim t'_n$  a  $n$ -ární relační symbol  $R$  či funkční symbol  $F$  je

$$\begin{aligned} R^{\mathcal{A}}(t_1, \dots, t_n) &\Leftrightarrow R^{\mathcal{A}}(t'_1, \dots, t'_n), \\ F^{\mathcal{A}}(t_1, \dots, t_n) &\sim F^{\mathcal{A}}(t'_1, \dots, t'_n). \end{aligned}$$

Tedy můžeme definovat  $L$ -strukturu  $\mathcal{B}$  s univerzem  $B = \{t/\sim; t \in A\}$  korektně pomocí reprezentantů faktorů takto: pro  $R, F, t_1, \dots, t_n$  jako výše je

$$\begin{aligned} R^B(t_1/\sim, \dots, t_n/\sim) &\Leftrightarrow R^A(t_1, \dots, t_n), \\ F^B(t_1/\sim, \dots, t_n/\sim) &= F^A(t_1, \dots, t_n)/\sim. \end{aligned}$$

Říkáme, že  $\mathcal{B}$  je *kanonická struktura pro  $T$* .

Pro konstantní term  $t$  platí  $t^A = t$ ; odtud a indukcí podle složitosti konstantního termu  $t$  snadno plyne:

$$t^B = t/\sim. \quad (3.3)$$

**TVRZENÍ 3.1.41.** *Nechť  $\mathcal{B}$  je kanonická struktura pro teorii  $T$ . Pak  $\|\mathcal{B}\| \leq \|L(T)\|$  a pro každou atomickou  $L(T)$ -sentenci  $\varphi$  platí:*

$$\mathcal{B} \models \varphi \Leftrightarrow T \vdash \varphi. \quad (3.4)$$

**Důkaz.** Je  $B = \{t/\sim; t \text{ je konstantní } L(T)\text{-term}\}$  pro jistou ekvivalenci  $\sim$ , tudíž  $|B| \leq \|L(T)\|$ . Zbytek tvrzení plyne ihned z konstrukce  $\mathcal{B}$ .  $\square$

Chceme najít podmínku na teorii  $T$ , aby kanonická struktura  $\mathcal{B}$  pro  $T$  splňovala (3.4) pro každou  $L(T)$ -sentenci  $\varphi$ ; pak by platilo  $\mathcal{B} \models T$  a také, že je  $T$  kompletní. Hledanou podmínkou je, že teorie  $T$  je kompletní a henkinovská; to říká 3.1.44. Podle 3.1.43 má každá bezesporná teorie  $T_0$  kompletní henkinovskou extenzi  $T$ ; kanonická struktura pro  $T$ , zredukovaná na  $L(T_0)$ , je pak modelem  $T_0$ .

### 3.1.42. Henkinovské konstanty, henkinovská teorie.

Nechť  $T$  je  $L$ -teorie. Množina  $D$  (ne nutně všech) konstantních symbolů jazyka  $L$  je množina *henkinovských konstant* teorie  $T$ , když pro každou  $L$ -formuli  $\varphi(x)$  s nejvýše jednou volnou proměnnou existuje konstantní symbol  $d$  z  $D$  tak, že

$$T \vdash (\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/d).$$

*Henkinovská teorie* je taková teorie, jejíž konstantní symboly tvoří množinu henkinovských konstant této teorie.

**TVRZENÍ 3.1.43.** (O kanonické struktuře pro kompletní henkinovskou teorii.) *Buď  $T$  bezesporná kompletní henkinovská teorie,  $\mathcal{A}$  kanonická struktura pro  $T$ . Pak pro každou  $L(T)$ -sentenci  $\varphi$  je  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow T \vdash \varphi$ .*

**Důkaz.** Říkejme, že výška  $\varphi$  je počet výskytů  $\neg, \rightarrow$  a kvantifikací ve  $\varphi$ . Dokážeme indukci, že pro každé  $n \in \mathbb{N}$  platí:

$(*)_n$  Každá sentence  $\varphi$  výšky nejvýše  $n$  splňuje  $\mathcal{A} \models \varphi \Leftrightarrow T \vdash \varphi$ .

Pro  $n = 0$  to platí díky (3.1.41), neboť  $\varphi$  je atomická sentence. Nechť platí  $(*)_n$  a  $\varphi$  je výšky  $n + 1$ . Je-li  $\varphi$  tvaru  $\neg\psi$ , plyne dokazované ihned z kompletnosti  $T$ . Buď  $\varphi$  tvaru  $\psi \rightarrow \psi'$ . Nechť  $\mathcal{A} \models \varphi$ . Pokud  $\mathcal{A} \not\models \psi$ , z indukčního předpokladu a kompletnosti  $T$  plyne  $T \vdash \neg\psi$  a díky tautologii  $\neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \psi')$  i  $T \vdash \psi \rightarrow \psi'$ . Pokud  $\mathcal{A} \models \psi$ , tak z indukčního předpokladu plyne  $T \vdash \psi'$  a tedy i  $T \vdash \psi \rightarrow \psi'$ . Nechť  $\mathcal{A} \not\models \varphi$ ; pak  $\mathcal{A} \models \psi$  a  $\mathcal{A} \not\models \psi'$ , tedy  $T \vdash \psi$ ,  $T \vdash \neg\psi'$  a díky bezespornosti  $T$  i  $T \not\vdash \psi \rightarrow \psi'$ .

Buď konečně  $\varphi$  tvaru  $(\forall x)\psi$ . Nechť  $D$  je množina henkinovských konstant teorie  $T$ . Buď  $\mathcal{A} \models \varphi$ . Kdyby  $T \not\vdash \varphi$ , tj.  $T \vdash \neg\varphi$ , tak  $T \vdash (\exists x)\neg\psi$ , tudíž  $T \vdash \neg\psi(d)$  pro nějaké  $d \in D$ . Výška  $\psi(d)$  je nejvýše  $n$ , tudíž díky indukčnímu předpokladu a kompletnosti  $T$  je  $\mathcal{A} \models \neg\psi(d)$ , což díky  $\mathcal{A} \models (\forall x)\psi$  není možné.

Buď naopak  $\mathcal{A} \models \neg\varphi$ , tj.  $\mathcal{A} \models \neg(\forall x)\psi$ . Tudíž  $\mathcal{A} \models \neg\psi[a]$  pro jisté  $a \in A$ . Přitom  $a$  je  $t$  resp.  $t/\sim$  s nějakým konstantním  $L$ -termem  $t$ , je-li  $L$  bez rovnosti resp. s rovností;  $\sim$  je z 2. v 3.1.40.

Buď  $L$  bez rovnosti. Díky  $t^A = t$  máme tedy (dle tvrzení o korektnosti substituce)  $\mathcal{A} \models \neg\psi(x/t)$ . Buď  $L$  s rovností. Dle (3.3) je  $t^A = t/\sim$ , máme tedy (dle

tvrzení o korektnosti substituce) opět  $\mathcal{A} \models \neg\psi(x/t)$ . Je výška  $\psi(x/t) \leq n$ , tedy dle indukčního předpokladu a kompletnosti  $T$  je  $T \vdash \neg\psi(x/t)$ , tedy  $T \vdash (\exists x)\neg\psi$  a tedy  $T \vdash \neg\varphi$ .  $\square$

VĚTA 3.1.44. (O maximální a henkinovské extenzi.)

- 1) Každá bezesporná teorie  $T$  má maximální bezespornou extenzi v  $L(T)$ ; to je kompletní teorie.
- 2) Každá teorie  $T$  má konzervativní henkinovskou extenzi v jazyce kardinality  $\|L(T)\|$ . Speciálně má každá bezesporná teorie  $T$  maximální bezespornou henkinovskou extenzi v jazyce kardinality  $\|L(T)\|$ .

Důkaz. Označme  $L = L(T)$ . 1) Hledaná maximální extenze je maximální prvek množiny  $\mathcal{T}$  všech bezesporných množin formulí jazyka  $L$ , které rozšiřují  $T$ . Jeho existence plyne z principu maximality aplikovaného na  $\mathcal{T}$  uspořádané inkluzí; v tomto uspořádání má totiž každý řetěz majorantu, rovnou jeho sjednocení.

2) Buď  $L$  jazyk teorie  $T$ . Nechť  $D_n$ ,  $n \in \omega$ , jsou prosté a disjunktní soubory konstantních symbolů nepatřících do  $L$ , definované indukcí takto:

$$D_0 = \{d_{\varphi(x)}; \varphi(x) \text{ je } L\text{-formule}\},$$

$$D_n = \{d_{\varphi(x)}; \varphi(x) \text{ je } (L \cup \bigcup_{i < n} D_i)\text{-formule, v níž je symbol z } D_{n-1}\};$$

$d_{\varphi(x)}$  je speciální konstanta pro  $\varphi(x)$  a  $(\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/d_{\varphi(x)})$  je speciální axiom pro  $d_{\varphi(x)}$ . Buď  $D = \bigcup_{i \in \omega} D_i$ ,  $L' = L \cup D$  a  $T'$  rozšíření  $T$  o speciální axiomy pro speciální konstanty. Zřejmě  $\|L'\| = \|L\|$  a  $D$  je množina henkinovských konstant teorie  $T'$  v  $L'$ .

Dokážeme, že  $T'$  je konzervativní extenze  $T$ . Extenze  $T_0$  teorie  $T$  o nové konstantní symboly z  $D$  (bez přidání axiomů) je podle tvrzení o konstantách konzervativní extenze  $T$ ; stačí tedy dokázat, že  $T'$  je konzervativní extenze  $T_0$ . Nechť  $\chi$  je  $L(T_0)$ -formule,  $T' \vdash \chi$  a  $\psi_1, \dots, \psi_m$  všechny navzájem různé speciální axiomy, vyskytující se v důkazu  $\chi$  v  $T'$ ; tedy

$$T_0 \vdash \psi_1 \rightarrow \psi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \psi_m \rightarrow \chi.$$

Indukcí podle  $m$  dokážeme, že  $T_0 \vdash \chi$ . Pro  $m = 0$  to triviálně platí. Buď  $m > 0$ . Buď  $n$  největší takové, že nějaký konstantní symbol z  $D_n$  je v některé formuli  $\psi_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ ; můžeme předpokládat, že je v  $\psi_1$ . Nechť  $\psi_1$  je tvaru

$$(\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/d_{\varphi(x)}).$$

Pak  $d_{\varphi(x)}$  není v žádné formuli  $\psi_2, \dots, \psi_m$ , neboť jinak takové  $\psi_i$  je speciální axiom pro  $d$  z  $D_{n'}$  s  $n' > n$ . Nechť proměnná  $y$  se nevyskytuje a není kvantifikovaná v žádné z formulí  $\psi_1, \dots, \psi_m, \chi$ . Z tvrzení o konstantách plyne

$$T_0 \vdash ((\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/y)) \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \psi_m \rightarrow \chi),$$

neboť  $((\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/y))(y/d_{\varphi(x)})$  je  $\psi_1$ . Užitím pravidla  $\exists$ -zavedení pak získáme  $T_0 \vdash (\exists y)((\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/y)) \rightarrow (\psi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \psi_m \rightarrow \chi)$ . Tvrzení o variantách dá  $T_0 \vdash (\exists x)\varphi \rightarrow (\exists y)\varphi(x/y)$ , vytýkání kvantifikátorů pak  $T_0 \vdash (\exists y)((\exists x)\varphi \rightarrow \varphi(x/y))$ . Konečně pravidlo modus ponens dá  $T_0 \vdash \psi_2 \rightarrow \dots \rightarrow \psi_m \rightarrow \chi$  a dle indukčního předpokladu  $T_0 \vdash \chi$ . Speciální tvrzení plyne snadno užitím 1).  $\square$

VĚTA 3.1.45. (O existenci modelu, úplnosti a kompaktnosti.)

- 1) (O existenci modelu.) Každá bezesporná teorie  $T$  má model kardinality nejvýše  $\|L(T)\|$ .
- 2) (O úplnosti.) Formule teorie  $T$  je v  $T$  dokazatelná, právě když je v  $T$  pravdivá.
- 3) (O kompaktnosti.) Teorie má model, právě když každá její konečná část má model.

*Důkaz.* 1) Hledaným modelem je redukt na  $L(T)$  kanonické struktury pro nějakou maximální bezespornou henkinovskou extenzi  $T'$  teorie  $T$  v jazyce  $L(T')$  kardinality  $\|L(T)\|$  – viz 3.1.43, 3.1.44.

2) Pro formulí  $\varphi(\bar{x})$  užitím pravidla generalizace, důkazu sporem a věty o existenci modelu máme:  $T \not\models \varphi \Leftrightarrow T \not\models (\forall \bar{x})\varphi \Leftrightarrow T, (\exists \bar{x})\neg\varphi$  je bezesporná  $\Leftrightarrow T, (\exists \bar{x})\neg\varphi$  má model  $\Leftrightarrow T \not\models \varphi$ .

3) plyne z toho, že teorie je sporná, právě když je nějaká její konečná část sporná.  $\square$

**VĚTA 3.1.46.** *Buď  $L$  jazyk s rovností.*

- 1) *Je-li  $\kappa \geq \|L\|$ , je každá nekonečná  $L$ -struktura elementárně ekvivalentní s nějakou  $L$ -strukturou kardinality  $\kappa$ .*
- 2) *Nechť  $T$  je  $L$ -teorie.*
  - a) *Má-li  $T$  nekonečný model, má model každé kardinality  $\geq \|L\|$ .*
  - b) *Má-li  $T$  pro každé  $n < \omega$  alespoň  $n$ -prvkový model, má nekonečný model.*
  - c) *Má-li  $T$  jen nekonečné modely a v nějaké kardinalitě  $\kappa \geq \|L\|$  až na izomorfismus jediný model, je  $T$  kompletní.*

*Důkaz.* 1) Buď  $\mathcal{A}$  nekonečná  $L$ -struktura,  $T = \text{Th}(\mathcal{A}) \cup \{c_i \neq c_j; i \neq j \text{ a } i, j \in \kappa\}$  teorie v jazyce  $L'$ , jenž je extenzí  $L$  o  $\kappa$  nových konstantních symbolů  $\langle c_i \rangle_\kappa$ . Teorie  $T'$  je díky větě o kompaktnosti bezesporná a má tedy model  $\mathcal{B}$  kardinality  $\leq \|L'\| = \kappa$ ; je ovšem  $|B| = \kappa$ . Redukt  $\mathcal{B}$  na  $L$  je model  $\text{Th}(\mathcal{A})$  kardinality  $\kappa$ , tedy to je hledaný model.

2) a) plyne z 1): pro nekonečný model  $\mathcal{A}$  teorie  $T$  existuje s ním elementárně ekvivalentní model kardinality  $\kappa$  a ten je ovšem modelem  $T$ .

b) Buď  $T'$  teorie  $T \cup \{c_i \neq c_j; i < j < \omega\}$  v jazyce  $L'$ , jenž je extenzí  $L$  o nové konstantní symboly  $\langle c_i \rangle_\omega$ . Každá konečná část  $S \subseteq T'$  má dle učiněných předpokladů model, dle věty o kompaktnosti má  $T'$  model; ten je ovšem nekonečný a jeho redukt na  $L$  je nekonečný model  $T$ .

c) Buď  $\mathcal{A} \models T$ ,  $|A| = \kappa$ . Nechť  $\varphi$  je  $L$ -sentence. Dokážeme, že  $T \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ ; díky větě o úplnosti pak  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi$  a  $T$  je tedy kompletní. Pro  $\mathcal{B} \models T$  existuje dle 1)  $\mathcal{B}' \equiv \mathcal{B}$  s  $|B'| = \kappa$ . Jelikož  $\mathcal{B}' \cong \mathcal{A}$ , máme  $\mathcal{B} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{B}' \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ .  $\square$

Nadále, není-li řečeno jinak, pracujeme v logice s rovností.
--

Délku sekvence $\bar{a}$ se může značit také $l(\bar{a})$ .
---

**TVRZENÍ 3.1.47.**

- 1) *Má-li teorie  $T$  pro každé  $n < \omega$  konečný model kardinality alespoň  $n$ , není třída všech konečných modelů teorie  $T$  axiomatizovatelná.*  
*Speciálně třída všech konečných modelů nějakého jazyka není axiomatizovatelná.*
- 2) *Třída  $K$  nějakých  $L$ -struktur je konečně axiomatizovatelná, právě když  $K$  i  $-K$  je axiomatizovatelná.*

*Důkaz.* 1) plyne z 3.1.46 2) b). Speciální tvrzení pak ještě z toho, že každý jazyk má model libovolné kardinality.

2) Implikace  $\Rightarrow$  je jasná. Dokážeme opačnou. Nechť  $T, S$  jsou takové  $L$ -teorie, že  $K = M(T) = -M(S)$ . Pak  $M(T \cup S) = M(T) \cap M(S) = \emptyset$ , tedy díky kompaktnosti existují  $T' \subseteq T$ ,  $S' \subseteq S$  konečné tak, že  $T' \cup S'$  nemá model; pak  $\emptyset = M(T' \cup S') = M(T') \cap M(S')$ . Konečně  $M(T) \subseteq M(T') \subseteq -M(S') \subseteq -M(S) \subseteq M(T)$ , tedy  $M(T) = M(T')$ .  $\square$

- 1)  $T$  je kompletní.
- 2) Každé dva modely  $T$  jsou elementárně ekvivalentní.
- 3)  $\text{Th}(T) = \text{Th}(\mathcal{A})$  pro nějakou  $L(T)$ -strukturu  $\mathcal{A}$ .

*Důkaz.* 1)  $\Rightarrow$  2). Bud'  $T$  kompletní. Když  $\mathcal{A} \models T$ , tak  $\text{Th}(\mathcal{A}) = \text{Th}(T)$ ; 2) tedy platí. 2)  $\Rightarrow$  3). Bud'  $\mathcal{A} \models T$ . Pro sentenci  $\varphi$  máme nyní:  $T \vdash \varphi \Leftrightarrow \mathcal{A} \models \varphi$ , tedy  $\text{Th}(T) = \text{Th}(\mathcal{A})$ . 3)  $\Rightarrow$  1). Z  $\text{Th}(T) = \text{Th}(\mathcal{A})$  plyne, že pro sentenci  $\varphi$  je  $T \vdash \varphi$  nebo  $T \vdash \neg\varphi$ . □

## PŘÍKLADY.

1. Teorie  $\text{FL}_0$  těles charakteristiky 0 není konečně axiomatizovatelná.  
*Důkaz.* Bud'  $L$  jazyk teorie těles. Třída  $K = \{\mathcal{A} \models L; \mathcal{A} \models \text{FL}_0\}$  všech těles charakteristiky 0 totiž není konečně axiomatizovatelná, neboť  $\neg K$  není axiomatizovatelná. Kdyby totiž  $S$  axiomatizovala  $\neg K$ , tak, značí-li  $\text{FL}$  teorii těles,  $S' = S \cup \text{FL} \cup \{p1 \neq 0; p \text{ je prvočíslo}\}$  by byla bezesporná, neboť těleso  $\mathbb{Z}_p \in \neg K$  a je to model fragmentu  $S \cup \text{FL} \cup \{q1 \neq 0; q < p, q \text{ je prvočíslo}\}$ . Tedy  $S'$  je bezesporná užitím kompaktnosti; její model patří do  $\neg K$  i  $K$  – spor. □

2. Třída  $K = \{\mathcal{A} \models \langle \leq \rangle; \mathcal{A} \text{ je dobré uspořádání}\}$  všech dobrých uspořádání není axiomatizovatelná. Přitom dobré uspořádání je takové lineární uspořádání, jehož každá neprázdná podmnožina má nejmenší prvek.  
*Důkaz.* Sporem. Nechť  $S$  axiomatizuje  $K$ ,  $S' = S \cup \{c_{i+1} \leq c_i \ \& \ c_{i+1} \neq c_i; i < \omega\}$ , kde  $c_i$  jsou nové konstantní symboly. Pak  $S'$  je bezesporná, neboť existuje nekonečné dobré uspořádání; to dovoluje sestrojit model každého konečného fragmentu teorie  $S'$ . Tudíž  $S'$  má model  $\mathcal{A}$ . Jeho redukt  $\langle \mathcal{A}, \leq^{\mathcal{A}} \rangle$  na jazyk  $\langle \leq \rangle$  uspořádání je dobré uspořádání. Avšak množina  $\{c_i^{\mathcal{A}}; i < \omega\}$  nemá v  $\langle \mathcal{A}, \leq^{\mathcal{A}} \rangle$  nejmenší prvek. □

## PŘÍKLADY.

1. Pro každou nekonečnou velikost  $\kappa$  existuje uspořádané nearchimedovské těleso velikosti  $\kappa$  elementárně ekvivalentní s uspořádaným tělesem  $\mathbb{R}' = \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$  reálných čísel. Přitom uspořádané těleso je archimedovské, když v něm pro každé jeho dva prvky  $a, b > 0$  existuje  $n$  s  $b < na$ ; těleso  $\mathbb{R}'$  je archimedovské.  
*Důkaz.* Bud'  $S = \text{Th}(\mathbb{R}') \cup \{n1 \leq c; n < \omega\}$ , kde  $c$  je konstantní symbol nepatřící do jazyka uspořádaných těles. Pak je  $S$  bezesporná, neboť každý její konečný fragment má model, snadno sestrojitelný pomocí  $\mathbb{R}'$ . Protože jazyk teorie  $S$  je spočetný, existuje pro každé  $\kappa \geq \omega$  model  $\mathcal{A} \models S$  kardinality  $\kappa$ ; ten má požadované vlastnosti. □

2. Existuje spočetný model elementárně ekvivalentní se standardním modelem  $\mathbb{N}$  přirozených čísel, který není izomorfní s  $\mathbb{N}$ .  
*Důkaz.* Bud'  $S = \text{Th}(\mathbb{N}) \cup \{n \leq c; n < \omega\}$ , kde  $c$  je nový konstantní symbol, nepřítící do jazyka aritmetiky. Pak je  $S$  bezesporná, neboť každý její konečný fragment má model sestrojitelný snadno pomocí  $\mathbb{N}$ . Jelikož jazyk  $S$  je spočetný, má  $S$  spočetný model; jeho redukt na jazyk aritmetiky je hledaný – je to tzv. nestandardní model přirozených čísel. □

## PŘÍKLADY.

1. Teorie DeLO má až na izomorfismus právě jeden spočetný model, je tedy kompletní. Teorie DeLO\* má právě čtyři jednoduché kompletní extenze až na ekvivalenci teorií. Jsou jimi rozšíření DeLO\* o čtyři kombinace formulí „ne/existuje nejmenší/největší prvek“; definitoricky je DeLO rozšíření teorie DeLO\* o „neexistuje ani nejmenší ani největší prvek“.

2. Právě všechny jednoduché kompletní extenze teorie čisté rovnosti PE, až na ekvivalenci teorií, jsou:

$$\begin{aligned} \text{PE}(n) &= \text{PE} \cup \{ \text{„existuje právě } n \text{ prvků“} \}, \\ \text{PE}(\infty) &= \text{PE} \cup \{ \text{„existuje nekonečně prvků“} \}. \end{aligned}$$

### Extenze teorie o funkční symbol a definicemi.

**VĚTA 3.1.49.** (Extenze o funkční symbol.) *Buď  $T \vdash (\exists y)\psi(x_1, \dots, x_n, y)$  a necht'  $T'$  je extenze  $T$  o axiom  $\psi(y/F(x_1, \dots, x_n))$ , kde  $F$  je  $n$ -ární funkční symbol (eventuálně nulární), nevyskytující se v  $L(T)$  (a  $F(x_1, \dots, x_n)$  je substituovatelné za  $y$  do  $\psi$ ). Pak je  $T'$  konzervativní extenze  $T$ .*

*Důkaz.* Necht'  $T' \vdash \varphi$  a  $\varphi$  je  $L(T)$ -formule. Buď  $\mathcal{A} \models T$  a  $f : A^n \rightarrow A$  taková funkce, že pro každé  $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in A^n$  platí  $\mathcal{A} \models \psi[a_1, \dots, a_n, f(a_1, \dots, a_n)]$ ; tu sestrojíme užitím axiomu výběru. Pak expanze  $\mathcal{A}'$  struktury  $\mathcal{A}$  o funkci  $f$  je model  $T'$ , tedy  $\mathcal{A}' \models \varphi$ , tedy i  $\mathcal{A} \models \varphi$ . Z věty o úplnosti plyne  $T \vdash \varphi$ .  $\square$

#### 3.1.50. Otevřená teorie, univerzální a existenční formule. Skolemova varianta.

1. Teorie je *otevřená*, je-li každý její mimologický axiom otevřená formule.
2. Formule je *univerzální[existenční]*, je-li v prenexním tvaru a všechny kvantifikátory jsou univerzální[existenční].
3. Buď  $\varphi$  uzavřená formule v prenexním tvaru. Uzavřená univerzální formule  $\varphi_S$  s vlastností  $\vdash \varphi_S \rightarrow \varphi$  a zvaná *Skolemova varianta* formule  $\varphi$  se sestrojí následovně.  
Necht'  $\varphi'$  je  $\varphi$  pro  $\varphi$  univerzální a  $\varphi'$  je  $(\forall x_1, \dots, x_n)\psi(y/F(x_1, \dots, x_n))$ , pokud  $\varphi$  má tvar  $(\forall x_1, \dots, x_n)(\exists y)\psi$  ( $n \geq 0$ ), přičemž  $F$  je nový  $n$ -ární funkční symbol; substituce je korektní díky prostotě sekvence proměnných v prefixu. Formule  $\varphi'$  má o jeden existenční kvantifikátor méně než  $\varphi$ , některá formule  $\varphi'' \dots'$  je tedy univerzální a prvou takovou označme  $\varphi_S$ . Platí  $\vdash \psi(y/F(x_1, \dots, x_n)) \rightarrow (\exists y)\psi$ , tedy i  $\vdash \varphi' \rightarrow \varphi$ . Odtud plyne  $\vdash \varphi_S \rightarrow \varphi$ .

**VĚTA 3.1.51.** *Každá teorie má otevřenou konzervativní extenzi.*

*Důkaz.* Buď  $T$  uvažovaná teorie.  $L(T)$ -teorie  $T_1$  tvořená prenexními tvary uzávěrů axiomů  $T$  je ekvivalentní s  $T$ ; to plyne z věty o prenexních tvarech a uzávěru. Buď  $T_2 = T_1 \cup S$ , kde  $S = \{\varphi_S; \varphi \in T_1\}$ . Přitom pro různá  $\varphi$  jsou do  $\varphi_S$  přidány různé nové funkční symboly. Pro  $S_0 \subseteq S$  konečné je na základě věty o extenzi o funkční symbol  $T_1 \cup S_0$  konzervativní extenze  $T_1$ , tedy i  $T_2$  je konzervativní extenze  $T_1$ . Každý axiom z  $T_1$  je dokazatelný v  $S$ , tedy je  $S$  ekvivalentní s  $T_2$  a speciálně konzervativní extenze  $T$ . Nahradíme každý axiom z  $S$  otevřenou formulí, jíž je generálním uzávěrem; získaná teorie je otevřená a ekvivalentní s  $S$ , tedy to je hledaná konzervativní extenze teorie  $T$ .  $\square$

**TVRZENÍ 3.1.52.** *Necht'  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  jsou  $L$ -struktury,  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ .*

- 1) *Pro  $L$ -term  $t(\bar{x})$  a  $\bar{a} \in A^{l(\bar{x})}$  je  $t^{\mathcal{A}}[\bar{a}] = t^{\mathcal{B}}[\bar{a}]$ .*
- 2) *Pro otevřenou  $L$ -formuli  $\varphi(\bar{x})$  a  $\bar{a} \in A^{l(\bar{x})}$  je  $\mathcal{A} \models \varphi[\bar{a}] \Leftrightarrow \mathcal{B} \models \varphi[\bar{a}]$ .*
- 3) *Je-li  $\mathcal{B}$  model otevřené teorie  $T$ , je  $\mathcal{A}$  model  $T$ .*

*Důkaz.* 1) resp. 2) snadno indukci podle složitosti termu  $t$  resp. formule  $\varphi$  a užitím definice podstruktury. 3) Je-li  $\varphi(\bar{x})$  axiom  $T$ , tak  $\mathcal{B} \models (\forall \bar{x})\varphi$ , tedy také  $\mathcal{A} \models \varphi[\bar{a}]$  pro  $\bar{a} \in A^{l(\bar{x})}$  dle 2) a tedy  $\mathcal{A} \models \varphi$ .  $\square$

**PŘÍKLADY.** 1. Teorie Booleových algeber je otevřená teorie. Tedy podstruktura Booleovy algebry je Booleova algebra.

2. Teorie grup v jazyce  $\langle +, -, 0 \rangle$  je otevřená; pak je podstruktura grupy grupa.

V jazyce  $\langle +, 0 \rangle$  je třeba axiom  $x + (-x) = 0$  &  $0 = (-x) + x$  zapsat jako  $(\exists y)(x + y = 0 \text{ \& } 0 = y + x)$ . Axiomatika pak již není otevřená. Je  $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$  grupa,  $\langle \mathbb{N}, +, 0 \rangle$  její podstruktura, která není grupou.



## 3.1.53. Extenze teorie o definovaný symbol.

1. Nechť  $R$  je  $n$ -ární predikátový symbol nepatřící do jazyka  $L(T)$  a  $\chi(x_1, \dots, x_n)$  formule jazyka  $L(T)$ . Generální uzávěr formule

$$R(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n)$$

je tzv. *definující axiom*  $R$ . Teorie v jazyce  $L(T)$  rozšířeném o  $\{R\}$  s axiomy  $T$  a uvedeným axiomem je *extenze teorie*  $T$  o formulí  $\chi$  *definovaný relační symbol*  $R$ .

2. Buď  $F$  nějaký  $n$ -ární funkční symbol nepatřící do  $L(T)$  a  $\varphi(x_1, \dots, x_n, y)$  formule jazyka  $L$ . Nechť v  $T$  je dokazatelné

$$\begin{aligned} &(\forall x_1, \dots, x_n)(\exists y)\chi(x_1, \dots, x_n, y), \\ &(\forall x_1, \dots, x_n)(\forall y, y')((\chi(x_1, \dots, x_n, y) \ \& \ \chi(x_1, \dots, x_n, y')) \rightarrow y = y'); \end{aligned}$$

tyto dva vztahy nazýváme po řadě *podmínka existence* a *jednoznačnosti definice*  $n$ -árního funkčního symbolu formulí  $\chi(x_1, \dots, x_n, y)$  v  $T$ . Generální uzávěr formule

$$F(x_1, \dots, x_n) = y \leftrightarrow \chi(x_1, \dots, x_n, y)$$

je tzv. *definující axiom*  $F$ . Teorie v jazyce  $L(T)$  rozšířeném o  $\{F\}$  s axiomy  $T$  a uvedeným axiomem je *extenze teorie*  $T$  o formulí  $\chi$  *definovaný funkční symbol*  $F$ .

Pokud speciálně se v  $\chi$  proměnné  $x_1, \dots, x_n$  nevyskytují, získáváme tak definovaný nulární funkční symbol, čili *definovaný konstantní symbol*.

Upozorníme na speciální případ, kdy definující axiom je

$$F(x_1, \dots, x_n) = y \leftrightarrow t(x_1, \dots, x_n) = y$$

a  $t$  je term; zde je ovšem splněná podmínka existence a jednoznačnosti.

LEMMA 3.1.54. *Extenze teorie  $T$  o definovaný symbol je konzervativní extenze  $T$ .*

*Důkaz.* V případě funkčního symbolu to plyne z 3.1.49. Uvažovaná extenze  $T'$  je totiž ekvivalentní s extenzí  $T$  o axiom  $\chi'(y/F(x_1, \dots, x_n))$ , kde  $\chi'$  je jistá varianta  $\chi$ . V případě relačního symbolu plyne tvrzení užitím zřejmé modifikace důkazu 3.1.49.  $\square$

## 3.1.55. Překlad definovaného symbolu.

Buď  $T'$  extenze teorie  $T$  o nějaký formulí  $\chi$  definovaný  $n$ -ární relační resp. funkční symbol  $R$  resp.  $F$ , přičemž všechny volné proměnné  $\chi$  jsou mezi navzájem různými proměnnými  $x_1, \dots, x_n$  resp.  $x_1, \dots, x_n, y$ .

Buď  $\varphi$  formule jazyka  $L(T')$ . Nechť  $\chi'$  je varianta  $\chi$ , ve které není žádná proměnná formule  $\varphi$  ani vázaná ani kvantifikovaná; pak každý term vyskytující se ve  $\varphi$  je substituovatelný do  $\chi'$  za  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ . dR- resp. dF-*překlad*  $\varphi$  do  $T$  (závislý na  $\chi'$ ) je formule  $\varphi^*$  jazyka  $L(T)$ , kterou získáme podle (dR) resp. (dF) uvedených níže, jde-li o relační resp. funkční symbol  $R$  resp.  $F$ .

(dR)  $\varphi^*$  se získá z  $\varphi$  nahrazením každé podformule  $R(t_1, \dots, t_n)$  formulí  $\chi'(t_1, \dots, t_n)$ .

(dF)  $\varphi^*$  se získá z  $\varphi$  nahrazením každé atomické podformule  $\psi$  formulí  $\psi^*$ , přičemž pro  $\psi$  atomickou je  $\psi^*$  definováno indukcí podle počtu výskytů  $F$  ve  $\psi$ : Je-li tento počet 0, buď  $\psi^*$  rovno  $\psi$ . Jinak je  $\psi$  tvaru  $\psi_0(z/F(t_1, \dots, t_n))$ , kde  $\psi_0$  je atomická formule obsahující o jeden výskyt  $F$  méně než  $\psi$ ,  $t_1, \dots, t_n$  neobsahují  $F$  a  $z$  není kvantifikovaná v  $\chi'$ ; buď pak  $\psi^*$  následující formule (substituce jsou korektní):

$$(\exists z)(\chi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n, y/z) \ \& \ \psi_0^*). \quad (3.5)$$

Vezmeme-li místo  $\chi'$  jinou variantu s vlastnostmi uvedenými pro  $\chi'$ , bude zřejmě překlad sestrojený pomocí ní variantou  $\varphi^*$  a tedy ekvivalentní s  $\varphi^*$ .



**VĚTA 3.1.56.** (O překladu definovaného symbolu.) *Když  $T'$  je extenze  $T$  o definovaný symbol  $S$ , tak pro  $L(T')$ -formuli  $\varphi$  a její dS-překlad  $\varphi^*$  platí*

$$T' \vdash \varphi \Leftrightarrow T \vdash \varphi^*.$$

**Důkaz.** Dokážeme, že  $T' \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi^*$ ; protože  $T'$  je dle 3.1.54 konzervativní extenze  $T$ , plyne odtud tvrzení věty. Nechť  $S$  je  $n$ -ární formulí  $\chi$  definovaný symbol a nechť  $\chi'$  je varianta  $\chi$ , ve které není žádná proměnná formule  $\varphi$  vázaná ani kvantifikovaná, přičemž překlad  $\varphi^*$  je sestrojený pomocí  $\chi'$ .

Nechť  $S$  je relační symbol  $R$  a  $\chi$  je  $\chi(x_1, \dots, x_n)$ . Pak  $T' \vdash R(t_1, \dots, t_n) \Leftrightarrow \chi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n)$  platí pro termy  $t_1, \dots, t_n$  vyskytující se ve  $\varphi$ ; to plyne z tvrzení o variantách, z axiomu substituce a pravidla modus ponens. Z věty o ekvivalenci plyne pak ihned  $T' \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi^*$ .

Nechť  $S$  je funkční symbol  $F$  a  $\chi$  je  $\chi(x_1, \dots, x_n, y)$ . Stačí dokázat  $T' \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi^*$  pro  $\varphi$  atomickou; označme ji  $\psi$ . Provedeme to indukcí podle počtu výskytů  $F$  v  $\psi$ . Je-li tento počet 0, platí to. Jinak, jako v (dF), je  $\psi$  tvaru  $\psi_0(z/F(t_1, \dots, t_n))$ , kde  $\psi_0$  je atomická formule obsahující o jeden výskyt  $F$  méně než  $\psi$ ,  $t_1, \dots, t_n$  neobsahují  $F$ ,  $z$  není kvantifikovaná v  $\chi'$  a  $\psi^*$  je (3.5). Tvrzení o variantách, axiom substituce a pravidlo modus ponens dají  $T' \vdash F(t_1, \dots, t_n) = z \Leftrightarrow \chi'(x_1/t_1, \dots, x_n/t_n, y/z)$ , tvrzení o ekvivalenci pak  $T' \vdash (\exists z)(F(t_1, \dots, t_n) = z \ \& \ \psi_0^*) \Leftrightarrow \psi^*$ ; máme tedy  $T' \vdash \psi_0^*(z/F(t_1, \dots, t_n)) \Leftrightarrow \psi^*$ . Dle indukčního předpokladu je  $T' \vdash \psi_0 \Leftrightarrow \psi_0^*$ , tedy i  $T' \vdash \psi_0(z/F(t_1, \dots, t_n)) \Leftrightarrow \psi^*$ .  $\square$

**3.1.57.** *Extenze (rozšíření) teorie o definice, též definicemi, je taková její extenze, která se získá postupným rozšiřováním o definovaný relační či funkční symbol.*

Postupné rozšiřování zde znamená konstrukci rekurzí, a to eventuálně transfinitní, kdy v limitních krocích se sjednotí všechny již získané teorie.

**VĚTA 3.1.58.** (O extenzi teorie o definice.) *Extenze  $T'$  teorie  $T$  o definice je konzervativní. Model teorie  $T$  lze jednoznačně expandovat do modelu  $T'$ .*

**Důkaz.** V každém kroku při sestrojování  $T'$  máme dle 3.1.54 konzervativní extenzi  $T$ , speciálně je  $T'$  konzervativní extenze  $T$ .

Je-li  $\mathcal{A} \models T$ , v každém kroku při sestrojování  $T'$  máme také jednoznačnou expanzi do modelu právě získané teorie, neboť model  $\mathcal{A}_0$  jakékoli teorie  $T_0$  lze jednoznačně expandovat do modelu extenze  $T'_0$  teorie  $T_0$  o definovaný symbol. Jde-li totiž o formulí  $\chi$  definovaný  $n$ -ární funkční symbol  $F$ , je expanze  $\mathcal{A}'_0$  struktury  $\mathcal{A}_0$  o funkci

$$f = \{ \langle a_1, \dots, a_n, b \rangle \in A_0^{n+1}; \mathcal{A}_0 \models \chi[a_1, \dots, a_n, b] \}$$

model  $T'_0$  a zřejmě je  $\mathcal{A}'_0$  jediná expanze  $\mathcal{A}_0$ , která je modelem  $T'_0$ . Obdobně je tomu s extenzí o definovaný relační symbol.  $\square$