




1. A Visão Geral (O que estamos olhando)

"Este gráfico representa a cinética de crescimento (*Time-Kill*) do nosso microrganismo ao longo de 24 horas. O objetivo é ver não apenas se as substâncias matam o fungo, mas **quão rápido** e **por quanto tempo** elas conseguem segurar o crescimento."

2. Olhando para os Controles (As linhas Azul e Laranja)

"Primeiro, olhamos para as linhas que sobem: o **Controle de Crescimento (Azul)** e o **Controle do Veículo (Laranja)**."

- Como esperado, até as 4 horas o fungo está se adaptando, mas no tempo T8 ocorre um pico de crescimento exponencial (chegando a quase 200 UFC).
- **Um detalhe crucial:** Repare que as linhas azul e laranja param no T8 e não chegam no T24. Isso ocorre porque, em 24 horas, o crescimento do fungo foi tão extremo que as placas se tornaram **incontáveis**. Ou seja, sem tratamento, o fungo tomou conta de tudo."

3. Olhando para o Antifúngico Padrão (A Nistatina)

"Agora olhamos para as linhas da **Nistatina (marrom, rosa e cinza)**, que é o nosso controle positivo."

- Independentemente da dose (1X, 2X ou 4X), a nistatina demonstrou uma forte ação fungicida rápida. Já nas primeiras horas (T2 a T4), ela derrubou a contagem de UFC para zero ou quase zero, e manteve o fungo suprimido até o final do experimento em 24 horas."

4. Olhando para o seu Tratamento (As linhas do EAO)

"Aqui está o principal achado do estudo. O efeito do nosso extrato/fração (EAO) foi **dose-dependente** (dependeu da concentração):

- **Nas doses menores (Verde 250_1X e Vermelha 500_2X):** A substância conseguiu retardar o crescimento inicial do fungo em comparação ao controle. Porém, a partir de 4 horas, ela perdeu a força e o fungo "escapou", voltando a crescer muito no tempo T8 (assim como os controles, ficando incontável em 24h). Ela teve um leve efeito *fungistático* temporário.
- **Na dose maior (Roxa 1000_4X):** Tivemos um resultado excelente! A linha roxa acompanhou o desempenho da Nistatina, derrubando a contagem de fungos e mantendo o crescimento inibido (próximo a zero)."

5. A Conclusão (O "Takeaway" da sua fala)

"Concluimos que a fração EAO possui atividade antifúngica comprovada. Em concentrações mais baixas ela apenas atrasa o crescimento, mas na concentração de 4X a CIM (1000 µg/mL), **ela se mostrou altamente eficaz, com um perfil de inibição semelhante ao do antifúngico comercial (Nistatina).**"