

LA CHROMOMYCOSE

Cours 4 ème année Pharmacie

Pr.Ag. Thérèse DIENG

DEFINITION

- Mycose verruqueuse chronique
- Atteinte dermique et épidermique
- Champignon dématiés (= noirs) dimorphiques
- Présence dans les tissus de cellules fumagoïdes

1. EPIDEMIOLOGIE

1.1 . LES AGENTS PATHOGENES

1.1.1. Taxonomie

Phylum : *Deuteromycotina*

Classe : Hyphomycètes

Ordre : Moniliales

Famille : *Dematiaceae*

1.1.1. Taxonomie

Espèces : *Phialophora verrucosa*

Fonsecaea pedrosoi

Fonsecaea compacta

Cladophialophora (anciennement
Cladosporium) *carrionii*

Wangiella dermatidis

Exophiala spinifera

Rhinocladiella cerophila

1.1.2. Morphologie

a) Forme parasitaire

Cellule fumagoïde : cellule arrondie de 4 à 12 μm , coloration brune, paroi épaisse, cloisonnée dans les 3 axes

Cellules fumagoïdes



1.1.2. Morphologie

b) Forme saprophytique

- Filaments mycéliens septés , 3 à 4 μm
- Fructifications caractéristiques de l'espèce :
 - Phialide : en forme d'ampoule portant des phialospores et présentant ou non une collerette

1.1.2. Morphologie

b) Forme saprophytique


- Forme hormodendron : spores cylindriques donnant naissance à des spores secondaires en chainettes courtes et ramifiées ou en chainettes longues peu ramifiées

1.1.2. Morphologie

b) Forme saprophytique

- Forme acrotheca : cellules cylindriques denticulées dont la moitié supérieure porte un manchon de spores

Fonseceae pedrosoi : fructifications



1.1.3. Habitat

a) Forme parasitaire

Lésions , extra ou intracellulaire
(dans les cellules géantes)

b) Forme saprophytique

- Sol
- Bois mort
- Végétaux(épineux, cactus)

1. EPIDEMIOLOGIE

1.2. MODE DE CONTAMINATION

Inoculation transcutanée de spores :

- Blessure par outil souillé de terre contaminée
- Piqure d' épine ou d'écharde

1. EPIDEMIOLOGIE

1. 3 . FACTEURS FAVORISANTS

a) d'ordre général

- Climat : sec ou humide
- Végétation : épineux, forestière
- Déforestation

1. EPIDEMIOLOGIE

1. 3 . FACTEURS FAVORISANTS

b) D'ordre individuel

- Profession : agriculteur, éleveurs, planteurs
- Comportement : marche pieds nus
- Utilisation du bois comme source d'énergie ou de chauffage

1. EPIDEMIOLOGIE

1. 4 . REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Zone intertropicale

- Amérique Centrale et du Sud
- Afrique : Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar
- Asie : Indonésie, Ceylan, Laos, Japon
- Australie

2.SYMPATOMATOLOGIE

2.1. FORME CUTANEE

- a) **Localisation**: membres inférieurs 80% des cas, autres: main, face, tronc
- b) **Lésion initiale** : papule → pustule qui s'ulcère, devient verruqueuse
- c) **Evolution** lente sur plusieurs années s'étendant de façon centrifuge ,non douloureuse mais prurigineuse→lésions satellites

2.SYMPATOMATOLOGIE

2.1. FORME CUTANEE

d) Aspects cliniques

- Nodules isolés ou multiples, mous, violacés ressemblant à de grosses verrues
- Forme pseudotumorale : lésion bourgeonnante, grisâtre à rosée, aspect en chou- fleur

2.SYMPATOMATOLOGIE

2.1. FORME CUTANEE

d) Aspects cliniques

- Forme en nappes ou en plaques: lésions polycycliques, à bords actifs, limites nettes, hyperkératosiques, verruqueuses, violacées
- Forme cicatricielle
- Surinfection bactérienne

2.SYMPATOMATOLOGIE

2.2.FORMES GENERALISES ET VISCERALES

- Rares
- Disémination lymphatique
- Contiguïté
- Voie hématogène

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.1. DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE

3.1.1. Prélèvements

- Squames
- Pus
- Croûtes
- Biopsies cutanées

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.1. DIAGNOSTIC MYCOLOGIQUE

3.1.2. Examen microscopique direct

- Eclaircissement à la potasse 10% ou au chloral lactophénol
- Cellules fumagoïdes isolées ou en amas

3.1.3. Culture

a) Milieux

- d'isolement :

Sabouraud Chloramphénicol Actidione (SCA) , 37 °C , 8 à 15 jours

- d'identification

Culture sur lame sur milieux :

- Pomme de terre-carotte
- Corn Meal Agar

3.1.3. Culture

b) Examen macroscopique


Colonies duveteuses, grises à noires au recto selon l'espèce et noires au verso

c) Examen microscopique


Éléments de fructification :

- Phialide
- Hormodendron court ou long
- Acrotheca

Phialophora verrucosa




Fonsecaea pedrosoi



Cladophialophora carrionii

Hormodendron
long



3.1.4. Inoculation à l'animal de laboratoire

- Animal sensible : souris
- Voie intradermique dans les tissus plantaires
- Lésions verruqueuses au bout d'un an

3. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

3.2. DIAGNOSTIC HISTOLOGIQUE

- Biopsies cutanées
- Coloration à l' Hémalun Eosine Safran (HES)
- Granulome
- Cellules fumagoïdes

4. TRAITEMENT

4.1. TRAITEMENT MEDICAL

- Terbunafine (Lamisil®) cp
500 mg/j x 1 an
- Association : Itraconazole (Sporanox®) cp
200 à 400mg/j + 5 Fluorocytosine (Ancotil®)
100 à 200 mg/j, pendant plusieurs mois

4.2. TRAITEMENT CHIRURGICAL

- Exérèse chirurgicale
- Décapage mécanique
- Grattage des parties atteintes
- Laser
- Azote liquide