

## Critères spécifiques d'admission en SAUV

### • Cardiovasculaire :

- o FC  $\leq 40$ /min ou  $\geq 140$ /min.
- o PAS  $\leq 90$
- o PAS  $\geq 220$  mmHg et souffrance viscérale ( dyspnée, douleur thoracique, céphalée, trouble neurologique)
- o Marbrures au-dessus de la ceinture
- o Douleur thoracique avec ECG pathologique,
- o Troubles métaboliques avec signe ECG

### • Pneumologique :

- o FR  $\geq 30$ /min ou  $\leq 8$ /min
- o Oxygénorequérance  $\geq 6$ L/min
- o Signes de lutte : balancement thoraco abdominal, tirage
- o Hémoptysie active de moyenne abondance

### • Neurologique :

- o GCS  $\leq 10$  si contexte toxique
- o GCS  $< 13$  hors contexte toxique.
- o Convulsions en cours et état de mal épileptique

### • Digestif :

- o Hématémèse active
- o Rectorragie active avec instabilité hémodynamique

### • Traumatologique :

- o Bilan des fonctions vitales perturbé avec traumatisme thoracique et/ou abdominal
- o AVP haute cinétique, chute  $> 6$ m
- o Plaie du tronc, du cou, des racines de membres
- o Plaie avec hémorragie active non contrôlée
- o Nécessité prévisible d'une sédation procédurale (Fracture déplacée, ouverte, luxation)

### • Toxique :

- o Intoxication aux cardiotropes
- o Toutes IMV à grande quantité de médicament quelle que soit la classe médicamenteuse
- o Toutes IMV avec GCS  $< 10$

### • Circonstanciel :

- o Dextro  $> 2,5$ g/L et cétonémie  $\geq 3$ mmol/L
- o Brûlure du 3ème degré  $> 10\%$  de la SC
- o Hypothermie  $\leq 32^{\circ}\text{C}$
- o Réaction cutanée avec hypotension ou tachycardie ou gêne respiratoire ou œdème face ou signes digestifs
- o Problématique respiratoire/matériel sur patient trachéotomisé
- o Accouchement imminent
- o Pendu/dépendu avec signe respiratoire/ neurologique
- o Pneumothorax spontané
- o Hémophilie

Ces critères sont théoriques, ne pas hésiter à proposer des patients n'ayant pas ces critères mais qu'ils doivent bénéficier d'une prise en charge rapide