

<b>Protocole Médecine d'Urgences</b>	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences
Analgésie Protocole analgésie IOA	Version : 3 Date d'application : 05/2017

## I - OBJET DU DOCUMENT :

Protocole de prise charge thérapeutique per os de la douleur par l'IOA

1. Evaluation de l'EN avec traçabilité sur le dossier IOA.
2. Interrogatoire du patient sur les prises antérieures d'antalgiques
3. Administration et traçabilité sur la fiche IOA du traitement donné à l'accueil, à adapter selon l'intensité de l'EN, terrain, CI et traitement antérieur pris.

EN	1 <sup>ère</sup> intention (sous réserve des CI)	Associations possibles
< 3	<i>Paracétamol 1gr</i>	<i>Kétoprofène 100 mg : 1 cpé</i>
3, 4, 5	<i>Paracétamol 500mg+ 1 cpé de tramadol/paracétamol</i> (325 mg de paracétamol + 37.5 mg de tramadol) <b>OU</b> <i>Paracétamol codéiné 2 cpés</i> <b>OU</b> <i>Izalgi : 1 gelule + 500 mg de paracétamol</i>  <b>Personne âgée : Tramadol 50 mg LP 1 cpé (zamadol) + 1 g paracétamol.</b> <b>OU</b> <i>Izalgi : 1 gélule + 500 mg de paracétamol</i>	<i>Kétoprofène 100 mg : 1 cpé</i>          <i>Pas de kétoprofène pour la personne âgée ;</i>
≥6	Voir avec le MAO pour décider d'une analgésie per os en ambulatoire ou IV en secteur d'hospitalisation selon le contexte et le terrain.	

## Co analgésiques :

- Glace pour hématome, contusions...
- Immobilisation pour traumatismes cervicaux et de membres.
- Penser à installer le patient en box pour MEOPA si algique++.

## Rappel :

### Paracétamol :

Posologie adulte : 1 gramme toutes les 6 heures ( 4 fois par jour).

CI : Insuffisance hépato-cellulaire sévère, hypersensibilité connue (rare)

Rédigé par : Dr LECOULES

Vérifié par Dr FERNANDEZ

Approuvé par : DR FERNANDEZ

<b>Protocole Médecine d'Urgences</b>	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences
Analgésie Protocole analgésie IOA	Version : 3 Date d'application : 05/2017

**Tramadol :**

Analgésique morphinique faible + action périphérique.

Existe sous forme LP seul (contramal) ou à **libération immédiate en association avec 325 mg de paracétamol** (à préférer en urgence car plus rapide)

Contre-indications : Traitement par IMAO, sevrage du toxicomane, intoxications aiguës par OH ou psychotropes, épilepsie non contrôlée par un traitement, hypersensibilité connue au tramadol ou opiacés, grossesse.

**Codeïne** : Paracétamol + codéine)

Analgésique morphinique faible + Paracétamol

CI : grossesse, allaitement, toxicomanie, insuffisance hépatique, insuffisance rénale sévère, celles du paracétamol.

**Izalgi** (poudre d'opium + paracétamol) :

CI : Insuffisance hépato-cellulaire sévère, asthme et insuffisance respiratoire, grossesse, allaitement,

**Kétoprofène 100**

Posologie : 1 comprimé toutes les 12 heures, pendant le repas de préférence.

Attention chez l'insuffisant rénal, sujet âgé.

CI : grossesse 1<sup>er</sup> et 3<sup>eme</sup> trimestre, allaitement, insuffisances hépatiques ou rénales sévères, allergie à l'aspirine ou AINS apparentés, ulcère gastro-duodéal actif.

**II - DOMAINE D'APPLICATION :**

Service des Urgences de Purpan et Rangueil

**III- PERSONNES AUTORISEES** (à compléter par le responsable médical signant le protocole) en fonction des références réglementaires.

**A prescrire** : X Médecin **OU A entreprendre** X IDE, X IADE, ☐ Sage-femme, ☐ Manipulateur en électroradiologie, ☐ Masseurs kinésithérapeutes

**A administrer** : X IDE, X IADE, ☐ Sage-femme, ☐ Manipulateur en électroradiologie, ☐ Masseurs kinésithérapeutes

**IV-DOCUMENT(S) DE REFERENCE :**

**V-DOCUMENTS ASSOCIES :**

Protocoles CLUD

**VI – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS :**

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS		
N°version	Date	Nature des modifications
V3	09/05/2017	

ANNEE PREVISIONNELLE DE REVISION :  
2018

Rédigé par : Dr LECOULES

Vérifié par Dr FERNANDEZ

Approuvé par : DR FERNANDEZ