

 COMEDIMS	DESCRIPTIF TECHNIQUE		MD-POL-DT-024
	Conservation des multi-doses après ouverture " FORME BUvable "		Approuvé par le président pour la COMEDIMS le 24/09/2013 La CME le : 22/10/2013
			Validé par le service qualité

Liste des produits pharmaceutiques disponibles au livret thérapeutique du CH de Saumur

Abri de la lumière

Au réfrigérateur

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
ADVIL 20MG/ML SUSP BUV	6 mois	< 25 °C
ALCOOL MENTHE RICQLES SOL BUV FL 40ML	1 mois	< 25 °C
AMOXICILLINE/ACIDECLAVULANIQUE 100MG/12,5MG/ML PD SUSP BUV 30ML	7 jours entre + 2°C et + 8°C	< 30 °C
ATARAX SIROP FL 200ML	1 mois < 25 °C Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
BACTRIM NN/ENF 200MG/40MG SUSP BUV	20 jours à < 25°C 40 jours entre +2°C + 8°C	Sans précautions particulières de conservation
CELESTENE 0.5MG/ML SOL BUV FL 30 ML	8 semaines <25°C Emballage extérieur Abri de la lumière	<25°C Emballage extérieur Abri de la lumière
CETIRIZINE 10MG/ML SOL BUV GTTES FL 15ML	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
CLAMOXYL FL 125 MG/5ML PD SUSP BUV	7 jours < 25°C	< 25 °C
CLAMOXYL FL 250MG/5ML PD SUSP BUV	7 jours < 25°C	< 25 °C
CLAMOXYL FL500MG/5 ML PD SUSP BUV	7 jours < 25°C	< 25 °C
CLOPIXOL 2% SOL BUV FL 20ML	1 mois < 25 °C Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière

Conservation des multi-doses après ouverture " FORME BUvable "	MD-POL-DT-024
--	---------------

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
CODENFAN 1MG/ML SIROP FL 200ML	1mois	Sans précautions particulières de conservation
DAFALGAN SIROP PEDIATRIQUE	6 mois < 25 °C	< 25 °C
DAKTARIN 2% GEL BUCCAL TUBE 40G	Durée traitement	Sans précautions particulières de conservation
DEBRIDAT FL 250 ML PD SUSP BUV	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
DEPAKINE FL 40 ML 200 MG/ML SOL BUV	1 mois < 25 °C	< 25 °C
DIGOXINE 5µG/0.1ML SOL BUV FL 60ML	2 mois	< 25 °C
DIPIPERON FL 30 ML 40 MG/ML SOL BUV	1 mois < 25 °C Abri de la lumière	< 25 °C
DOMPERIDONE FL 200 ML 1 MG/ML SUSP BUV	3 mois	Sans précautions particulières de conservation
FERROSTRANE SIROP FL 125ML	1 mois	< 25 °C
FLAGYL 125MG/5ML SUSP BUV FL 120ML	15 jours < 25 °C	< 25 °C
FLUANXOL 4% SOL BUV FL 10ML	15 jours	< 25 °C
FLUOXETINE 20MG/5ML SOL BUV FL 70ML	15 jours < 25 °C	Sans précautions particulières de conservation
FUNGIZONE FL 40 ML 100 MG/ML SUSP BUV	10 jours < 25 °C	< 25 °C
GASTROGRAFINE FL 100 ML SOL ORALE/RECT	1 flacon=1 patient < 25 °C Emballage d'origine Abri de l'humidité Abri de la lumière	< 25 °C Emballage d'origine Abri de l'humidité Abri de la lumière
HALDOL 2MG/ML SOL BUV FL 15ML	3 mois < 25 °C Abris de la lumière	Ne pas congeler

Conservation des multi-doses après ouverture " FORME BUvable "	MD-POL-DT-024
--	---------------

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
HELICIDINE 10% SIROP FL 250ML	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
HEPT-A-MYL FL 20 ML 0,305 G/ML SOL BUV	1 flacon=1patient= durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
HYDROSOL POLYVITAT PHARMA SOL BUV 20ML	20 jours	< 25 °C
LARGACTIL 4% SOL BUV FL 30ML	1 mois < 25 °C Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
LAROXYL 4% FL 20 ML 1 MG SOL BUV	1 mois	Sans précautions particulières de conservation
LASILIX FL 60 ML 10 MG/ML SOL BUV	6 semaines < 25 °C Emballage d'origine Abri de l'humidité Abri de la lumière	< 25 °C Emballage d'origine Abri de l'humidité Abri de la lumière
LOXAPAC FL 30ML 25MG/ML SOL BUV	4 semaines < 25 °C Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
LYSANXIA 15MG/ML SOL BUV FL 20ML	1 mois	< 25 °C
MYCOSTATINE PD SUSP BUV FL 24ML	7 jours < 25°C	< 30 °C
NOZINAN 4% SOL BUV FL 30ML	durée de traitement Abris de la lumière	Abris de la lumière
ORELOX 40MG/5ML GRL SUSP BUV FL 50ML	10 jours entre + 2°C et + 8°C	< 25 °C
PEDIAZOLE 200MG/5ML GR SIROP FL 100ML	10 jours entre + 2°C et + 8°C	<25 °C
POTASSIUM GLUCONATE H3 SANTE FL 250ML SIROP	3 mois < 25 °C	< 25 °C
PRIMPERAN AD 0.1% SOL BUV FL 200ML	durée de traitement < 25 °C Emballage d'origine Abri de la lumière	< 25 °C Emballage d'origine Abri de la lumière

Conservation des multi-doses après ouverture " FORME BUvable "	MD-POL-DT-024
--	---------------

Produit	Conservation après ouverture	Conditions de conservation avant ouverture/Remarques
RIFADINE 2% SUSP BUV FL 120ML	2 semaines < 25 °C	< 25 °C
RISPERDAL 1MG/ML FL 60ML SOL BUV	3 mois < 30 °C Emballage d'origine Abri de l'humidité Abri de la lumière	<30 °C Emballage d'origine Abri de l'humidité Abri de la lumière
RIVOTRIL 2,5MG/ML FL 20ML SOL BUV	1 mois Abri de la lumière < 25°C	< 25°C Abri de la lumière
SECTRAL FL 125 ML 40 MG/ML SIROP ENF	1 flacon=1patient= durée du traitement	< 25 °C
SEROPRAM 40MG/ML SOL BUV FL 15ML	16 semaines < 25°C	Sans précautions particulières de conservation
TEGRETOL 100MG/5ML FL 150ML SOL BUV	1 mois <30 °C Emballage d'origine Abri de la lumière	<30 °C Emballage d'origine Abri de la lumière
TERCIAN 40MG/ML SOL BUV FL 30ML	1 mois Abri de la lumière	Abri de la lumière
THERALENE FL 30 ML 1 MG/GTTE SOL BUV	210 jours < 25°C Abri de la lumière	< 25°C Abri de la lumière
TIAPRIDAL 5MG/GOUTTE SOL BUV FL 30ML	45 jours < 25°C	< 25°C
TOXICARB 20G/100ML SUSP BUV FL 250ML	1 flacon=1patient= durée du traitement	Sans précautions particulières de conservation
UVESTEROL FL 20 ML SOL BUV	1 mois < 25 °C Abri de la lumière	< 25 °C Abri de la lumière
VALIUM 1% FL 20 ML 10 MG/ML SOL BUvable	3 mois < 25 °C	< 25°C
ZOVIRAX 200MG/ 5ML SUSP BUV FL 125ML	1 mois	< 25°C