

Protocole Médecine d'Urgences Médicaments d'Urgences Gastro Entérologie EUPANTHOL ® (PANTOPRAZOLE) Service émetteur : SAU Purpan Pôle : Médecine d'urgences Version : 1 Date d'application : Septembre 2012

I - OBJET DU DOCUMENT:

Indication et protocole d'administration de l'EUPANTHOL ® Flacon de 40 mg

INDICATION:

Hémorragies digestives hautes d'origine ulcéreuse, avec signes endoscopiques de gravité (Forrest 1a : saignement artériel, 1b : saignement capillaire, 2a : vaisseau visible non hémorragique, 2b : caillot adhérent)

POSOLOGIE:

- ➤ 80 mg en bolus Intra Veineux
- ➤ Puis 8 mg / heure durant 70 heures en perfusion continue :
 - o Seringue: 80 mg dans 50 ml de chloruré isotonique 0,9%
 - Débit 5 ml/heure
 - Durée : 10 heures soit 7 seringues pour 70 heures
- ➤ Puis relais per os simple dose (40mg / jour) dès que possible

Rédigé par : Dr OLIVIER Michel Vérifié par : Dr OLIVIER Michel

Approuvé par : Dr FERNANDEZ Sophie



Protocole Médecine d'Urgences Médicaments d'Urgences Gastro Entérologie EUPANTHOL ® (PANTOPRAZOLE) Service émetteur : SAU Purpan Pôle : Médecine d'urgences Version : 1 Date d'application : Septembre 2012

| II . | DON | IAIN | E.D' | APPL | ICA | TION: |
|------|-----|------|------|------|-----|-------|
| | | | | | | |

Service des Urgences de Purpan et Rangueil

| III- PERS | ONNES | AUTO | RISEES |
|-----------|-------|------|--------|
|-----------|-------|------|--------|

| A prescrire: | X N | <i>M</i> édeci | n (| OU A | entreprend | re 🗆 I | DE, | \Box IA | ADE, 🗆 |] Sa | ge-femme, | , 🔲] | Manip | ılateur | en |
|---------------------------------|--------|----------------|------|----------|------------|--------|-----|-----------|----------|------|------------|---------|-------|---------|------|
| électroradiolog | gie, 🗆 | Masse | eurs | kinésitl | hérapeutes | | | | | | | | | | |
| A administrer kinésithérapeu | | IDE, | X | IADE, | □ Sage- | femme, | | Manij | oulateur | en | électrorad | liologi | e, 🗆 | Masse | eurs |

IV-DOCUMENT(S) DE REFERENCE – DOCUMENTS ASSOCIES :

Recommandations AFSSaPS Novembre 2007 de bonne pratique des anti-sécrétoires gastriques chez l'adulte Par extension à l'ésoméprazole, les IPP étudiés dans les hémorragies digestives hautes d'origine ulcéreuse étant oméprazole ou pantoprazole

Protocole Pole Digestif IPP à la seringue électrique Validé le 01 / 01 / 2009 par le Dr E. DUPUIS

| HISTORIQUE DES MODIFICATIONS | | | | | | | |
|------------------------------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| N°version | Date | Nature des modifications | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ANNEE PREVISONNELLE DE REVISION: 2013

Rédigé par : Dr OLIVIER Michel Vérifié par : Dr OLIVIER Michel

Approuvé par : Dr FERNANDEZ Sophie