

Protocole Médecine d'Urgences	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'urgences
Douleur abdominale – Drapeaux rouges	Version : 1 Date d'application : 01/2023

Douleur abdominale et drapeaux rouges : dans le cadre d'une douleur abdominale, certains éléments liés au contexte, au terrain et à l'examen clinique doivent faire évoquer une cause organique nécessitant une prise en charge spécialisée et/ou une hospitalisation. Ces éléments sont appelés « drapeaux rouges » et sont reconnus dans la littérature.

La présence de drapeaux rouges, notamment s'ils sont plusieurs, doit faire discuter la réalisation d'une **imagerie abdominale** (et d'une biologie si non réalisée).

Contexte :

- Patient déjà passé aux urgences dans les jours précédents pour le même motif.
- Patient adressé aux urgences par un médecin.
- Symptômes inhabituels si contexte de constipation, de TFI, de MICI...

Terrain :

- Age > 50 ans
- Immunodépression
- MICI
- Antécédent de chirurgie abdominale
- Néoplasie active ou récente

Clinique :

- EVA > 6 et nécessité d'antalgiques de palier II/III
- Douleur abdominale localisée
- Signe d'irritation péritonéale (contracture ou défense, mais aussi douleur à la décompression et à la toux)
- Abdomen empâté (non souple à la palpation)
- Distension abdominale
- Psoïtis
- Hématémèse, méléna et/ou rectorragie
- Vomissements fécaloïdes
- Hyperleucocytose
- élévation de la CRP
- Fièvre

Rédigé par : Tom VERCELLONE

Vérifié par : Adrien LE MEUR

Approuvé par : Nathalie VINNEMANN ; Charles Henri HOUZE CERFON