

Enregistrement	Page n°1 sur 4
CONSERVATION APRES OUVERTURE DES FORMES LIQUIDES VOIE ORALE	Date d'application : 29/10/2020 Indexation : QUA-EN-057

Liste des formes liquides voie orale référencées au CHU de Toulouse, avec des conditions de conservations particulières extraites des RCP, de la base de données Thériaque et des données fournies par les laboratoires.

Pour le bon usage des médicaments sous forme buvable, se référer à la fiche réflexe correspondante disponible sur ENNOVDOC (QUA-EN-051).

La date d'ouverture doit être notée sur le flacon.

Frigo : Température comprise entre +2 et +8°C (attention : relevé de température du réfrigérateur quotidien)

A l'abri de la lumière : si possible dans le conditionnement d'origine

Spécialité, présentation	Durée de conservation après ouverture	Température, lumière
ADRYGL 10 000 UI/ML BUV FL 10ML	Pas de données*	< 25°C.
ADVIL 20MG/ML ENF/NR BUV FL 200ML	6 mois	< 25°C
ALFATIL 250MG/5ML BUV FL 60ML	14 jours après reconstitution	Frigo (+ 2°C et + 8°C)
AMANTADINE 50MG/5ML SIROP FL 150 ML	Pas de données*	< 25°C (Abri lumière)
AMOXICILLINE 125MG/5ML BUV FL 60ML SDZ	14 jours une fois reconstitué	< 25°C
AMOXICILLINE 250MG/5ML BUV FL 60ML SDZ	14 jours une fois reconstitué	< 25°C
ARTANE 4MG/ML BUV FL 30ML	1 flacon=1patient=durée du traitement	< 25°C
ATARAX 10MG/5ML SIROP FL 200ML	Pas de données*	< 25°C (Abri lumière)
AUGMENTIN 100MG/12,5MG/ML BUV FL 60ML	7 jours	Frigo (+ 2°C et + 8°C)
BACTRIM ENFANT BUV FL 100ML	Pas de données*	Pas de précautions particulières
BETAMETHASONE 0.5MG/ML BUV FL 30ML (0.05%) ARROW	8 semaines	Pas de précautions particulières
BIOGAIA SUSP BUVABLE FL 5ML	3 mois	< 25°C
CAFEINE CITRATE 50MG/2ML INJ/BUV AMP	Utilisation immédiate après ouverture/dilution/reconstitution	Abri de la lumière
CELLCEPT 1G/5ML BUV FL 225ML	2 mois après reconstitution	< 30°C
CIFLOX 500MG/5ML BUV FL 100ML	14 jours	Frigo ou < 30°C Ne pas congeler
CLARITHROMYCINE 50MG/ML BUV FL60ML ARW RESERVE PEDIATRIE	14 jours	< 25°C
CLOPIXOL 20MG/ML BUV FL 20ML (2%)	6 semaines	< 25°C Abri lumière
CONTRAMAL 100MG/ML SOL BUV FL 10ML	12 mois (flacon bien fermé)	< 25°C
CYSTADANE PDRE BUV FL 180G	3 mois	< 25°C Abri humidité
DEBRIDAT 24MG/5ML BUV FL 125ML	4 semaines	< 25°C
DEBRIDAT 24MG/5ML BUV FL 250ML	4 semaines	< 25°C
DEDROGYL 5MCG/GTTE BUV FL 100ML	Pas de données*	< 25°C Abri lumière
DESLORATADINE 0.5MG/ML FL 150ML ARROW	Pas de données*	Pas de précaution particulière
DIGOXINE 0.05MG/ML BUV FL 60ML	2 mois	Pas de précaution particulière
DIPIPERON 40MG/ML BUV FL 30ML	Pas de données*	Pas de précaution particulière
DOLIPRANE 2.4% BUV FL 100ML	6 mois	< 30°C
DOMPERIDONE 1MG/ML BUV FL200ML	3 mois	< 30°C , abri lumière , ne pas mettre au frigo ou congeler
DUOCAL SUPER SOLUBLE PDRE SOL	Utiliser dans un délai d'un mois	Entreposer dans un endroit

Enregistrement	Page n°2 sur 4
CONSERVATION APRES OUVERTURE DES FORMES LIQUIDES VOIE ORALE	Date d'application : 29/10/2020 Indexation : QUA-EN-057

Spécialité, présentation	Durée de conservation après ouverture	Température, lumière
BUV400g	après ouverture. Reconstitué : 24h au frigo	sec et frais (< 25°C) et à l'abri de la lumière
DUPHALAC 66,5% BUV FL 200ML	Pas de données	<25°C Ne pas mettre au frigo
EBIXA 5MG/PRESSION SOL BUV FL 50ML	3 mois	< 30°C Position verticale
EXACYL 1G/10ML BUV AMP	Pas de données*	Pas de précaution particulière
EPIVIR 10MG/ML BUV FL 240ML	1 mois	< 25°C
FERRIPROX 100 MG/ML SOL BUV FL 500ML	35 jours	< 30°C Abri lumière
FERROSTRANE SIROP FL 125ML	1 mois	< 25°C
FLAGYL 125MG/5ML BUV FL 120ML	8 jours	< 30°C Abri lumière
FLUANXOL 40MG/ML BUV FL 10ML (4%)	15 jours	< 25°C Abri de la lumière
FLUCONAZOLE 50 MG/5ML BUV FL 35ML ARROW	14 jours après reconstitution	Pas de précaution particulière
FLUOXETINE 20MG/5ML BUV FL 70ML ARW	1 flacon=1patient=durée du traitement **	Pas de précaution particulière
FUCIDINE 250MG/5ML BUV FL 90ML	Pas de données*	Pas de précaution particulière
FUNGIZONE 100MG/ML BUV FL 40ML(10%)	Pas de données*	< 25°C
GASTROGRAFINE 370MG/ML BUV FL 100ML	Une seule utilisation	Abri lumière dans l'emballage d'origine
GAVICON NOURRISSON BUV FL 150ML	30 jours	< 25°C
HALDOL 2MG/ML GTTE BUV FL 30ML	3 mois	Ne pas congeler
HEMANGIOL 3.75MG/ML BUV FL 120ML	2 mois	Ne pas congeler , Abri lumière
HUILE DE PARAFFINE BUV FL250ML	Pas de données*	Abri lumière ; <25°C
HYDROSOL POLYVITAMINE BUV FL 20ML	Pas de données*	< 25°C
JOSACINE 250MG/5ML BUV FL 60ML	7 jours	Pas de précaution particulière
KALETRA SOL BUV FL 60ML	6 semaines après sortie du frigo (inscription date de sortie sur le flacon)	Abri lumière. Conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C)
KANEURON 1MG/GTTE BUV FL30ML(5,4%)	18 jours	<25°C Abri de la lumière
LARGACTIL 40MG/ML BUV FL 125ML	1 mois	Abri lumière <25°C
LARGACTIL 40MG/ML BUV FL 30ML (4%)	1 mois	Abri lumière <25°C
LAROXYL 40MG/ML BUV FL 20ML (4%)	Pas de données*	Pas de précaution particulière
LASILIX 10MG/ML BUV FL 60ML	6 semaines	< 30°C Abri lumière et humidité
LEVETIRACETAM 100MG/ML BUV FL300ML ARW	7 mois	Pas de précaution particulière
LEVOCARNIL 100MG/ML BUV FL 10ML	Pas de données*	Frigo (entre 2 °C et 8 °C)
LIKOZAM 150MG/150ML SUSP BUV (POST ATU)	28 jours	< 25°C
LOCASOL PDRE SOL BUV BTE 400G	Pas de données*	< 25°C et à l'abri de la lumière.
LOXAPAC 25MG/ML BUV FL 30ML	4 semaines	< 25°C Abri lumière
L-THYROXINE 5MCG/GTTE BUV FL 15ML	30 jours	Frigo (entre 2 °C et 8 °C)
L-THYROXINE 150MCG/ML SOL BUV FL 15ML	30 jours	Frigo (entre 2 °C et 8 °C)
LYSANXIA 15MG/ML BUV FL 20ML	1 mois, flacon bien fermé	< 25°C
METHADONE 60MG/40MG/20MG/10MG/5MG	A administrer immédiatement	< 25°C
MICROPAQUE SCANNER BUV FL 150ML	A administrer immédiatement	Pas de précaution particulière
MICROPAQUE SUSP BUV BIDON 2L	Ne pas conserver après	A l'abri du gel

Enregistrement	Page n°3 sur 4
CONSERVATION APRES OUVERTURE DES FORMES LIQUIDES VOIE ORALE	Date d'application : 29/10/2020 Indexation : QUA-EN-057

Spécialité, présentation	Durée de conservation après ouverture	Température, lumière
	ouverture	
MOTILIUM 1MG/ML BUV FL200ML	3 mois	< 30°C
MYCOSTATINE 100000UI/ML BUV 24ML FL	7 jours	< 25°C
NEORAL 100MG/ML BUV FL 50ML	2 mois	Entre 15°C et 30°C.
NEULEPTIL 40MG/ML BUV FL 30ML (4%)	Pas de données*	Abri lumière dans le conditionnement d'origine. Abri de la chaleur. Bien refermer après utilisation.
NIVAQUINE 25 MG/5 ML SIROP	2 mois température ambiante	Température ambiante
NOXAFIL 40MG/ML BUV FL 105ML	4 semaines	Ne pas congeler
NOYADA 25MG/5ML SOL BUV FL 100ML (POST ATU)	3 semaines	< 25°C Abri lumière Ne pas mettre au réfrigérateur
NOYADA 5MG/5ML SOL BUV FL 100ML (POST ATU)	3 semaines	< 25°C Abri lumière Ne pas mettre au réfrigérateur
NOZINAN 40MG/ML BUV FL 125ML (4%)	6 mois	< 25°C Abri lumière
ORACILLINE 500 000UI/5ML BUV FL 120ML	15 jours	Entre 2 et 8°C
ORAMORPH 20MG/ML BUV FL 20ML	3 mois	< 25°C Abri lumière
ORFADIN 4MG/ML SUSPENSION BUVABLE	2 mois	< 25°C Position verticale
OROKEN ENF 100MG/5ML BUV FL 40ML	10 jours	< 25°C
OROKEN NOURR 40MG/5ML BUV FL 40ML	10 jours	< 25°C
OXOMEMAZINE 0.33MG/ML SIROP FL150ML ARROW	6 mois	< 25°C
OXYNORM BUV 300MG/30 ML FLACON	48 mois	< 30°C Rincer la seringue doseuse après chaque utilisation
PHOSPHONEUROS BUV FL 120ML	Pas de données*	< 25°C Abri lumière
POTASSIUM GLUCONATE H2 PHARMA SIROP FL 250ML	3 mois	< 25°C ou frigo
PREZISTA 100 MG/ML SUSP BUV FL 200ML	6 semaines	< 30°C. A conserver dans l'emballage d'origine. Ne pas congeler
PRIMALAN 0.5MG/ML SIROP FL 60ML	24 jours	<25°C Abri lumière
PRIMPERAN 1MG/ML BUV FL 200ML (0.1%)	1 flacon=1patient=durée du traitement	< 25°C. Abri lumière
RAPAMUNE 1MG/ML BUV FL 60ML	1 mois dans le flacon, 24h dans le seringue doseuse	Frigo. Abri lumière
REBETOL 40MG/ML SOL BUV FL 100ML	30 jours	< 30°C
RESIKALI 500G BUV/RECT POT VERT EX CALCIUM SORBISTERIT	3 mois	Récipient soigneusement fermé. A l'abri de l'humidité.
RETROVIR 100MG/10ML BUV FL 200ML	1 mois	< 30°C
REVATIO 10MG/ML SUSP BUV (ORPH)	30 jours après reconstitution	< 30°C ou frigo. Ne pas congeler
RIFADINE 20MG/ML BUV FL 120ML	30 jours	< 25 °C
RISPERDAL 1MG/ML BUV FL 60ML	3 mois	< 30°C Ne pas mettre au frigo
RIVOTRIL 2.5MG/ML BUV FL 20ML	120 jours	< 30°C
ROVALCYTE 50MG/ML SOLUTION BUVABLE 100ML	49 jours après reconstitution	Frigo
SECTRAL 40MG/ML BUV FL 125ML	1 flacon=1patient=durée du traitement	A conserver dans l'emballage d'origine. Bien refermer le bouchon après utilisation.

Enregistrement	Page n°4 sur 4
CONSERVATION APRES OUVERTURE DES FORMES LIQUIDES VOIE ORALE	Date d'application : 29/10/2020 Indexation : QUA-EN-057

Spécialité, présentation	Durée de conservation après ouverture	Température, lumière
		Bien rincer la seringue.
SEROPRAM 40MG/ML BUV FL 12ML	16 semaines	< 25°C
SOLIAN 100MG/ML BUV FL 60ML	2 mois	< 25°C
SPORANOX 10MG/ML BUV FL 150ML	1 mois	< 25°C
TALOX 600MG/5ML BUV FL 230ML	1 mois	< 25°C. Conserver le flacon soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.
TAMIFLU 6MG/ML BUV FL 100ML	10 jours après reconstitution	< 25°C
TAREG 3 MG/ML BUV	3 mois	<30°C
TEGLUTIK 5MG/ML BUV FL 300ML	15 jours	Pas de précaution particulière
TEGRETOL 20MG/ML BUV FL 150ML	Pas de données*	<30°C Abri lumière
TERCIAN 40MG/ML BUV FL 30ML	1 mois	<30°C Abri lumière
THERALENE 40MG/ML BUV FL 30ML (4%)	Durée du traitement du patient	< 25°C Abri lumière
TOXICARB 20G/100ML BUV FL 250ML	Utilisation extemporanée	Pas de précaution particulière
TRIFLUCAN 200MG/5ML BUV FL 35ML	28 jours après reconstitution	< 30°C, ne pas congeler
TRIFLUCAN 50MG/5ML BUV FL 35ML	28 jours après reconstitution	< 30°C, ne pas congeler
TRILEPTAL 60MG/ML BUV FL 250ML	7 semaines	Pas de précaution particulière
UN-ALFA 0.1MCG/GTTE BUV FL 10ML	4 mois	Abri lumière Frigo. Ne pas congeler
UVESTEROL A.D.E.C BUV FL 10ML	30 jours	< 25°C Abri lumière
VALIUM 10MG/ML BUV FL 20ML (1%)	1 mois	Pas de précaution particulière
VALPROATE DE NA 200MG/ML BUV FL 40ML ARROW	2 mois	Température ambiante
VEDROP 50MG/ML BUV FL 60 ML	1 mois	Pas de précaution particulière
VFEND 40MG/ML BUV FL 70ML	14 jours	< 30°C Ne pas congeler, ne pas réfrigérer
VIMPAT 10MG/ML SIROP FL 200ML	2 mois	Ne pas conserver au réfrigérateur
VIRAMUNE 50MG/5ML BUV FL 240ML	6 mois	Pas de précaution particulière
WELLVONE 750MG/5ML BUV FL 226ML	3 semaines	< 25°C Ne pas congeler
XALUPRINE 20MG/ML BUV FL 100ML	56 jours	< 25°C. Flacon soigneusement fermé
XYREM 500MG/ML BUV FL 180ML	40 jours	Pas de précaution particulière
ZIAGEN 20MG/ML BUV FL 240ML	2 mois	< 30°C
ZINNAT 125 MG/5ML GNLE SUSP BUVABLE FLACON 40ML	10 jours	Frigo
ZITHROMAX SOL BUV 1200MG/30ML	5 jours	< 25°C
ZOPHREN 40MG/50ML FL BUV RESERVE PEDIA	28 jours	Position verticale 10°C à 30°C Abri lumière
ZOVIRAX 200MG/5ML BUV FL 125ML	Pas de données*	Température ambiante
ZYVOXID 100MG/5ML BUV FL 150 ML	3 semaines	Abri de la lumière dans l'emballage extérieur

* Pour les médicaments n'ayant pas subi d'étude de stabilité après ouverture, il convient d'éliminer le flacon à la fin de la durée conventionnelle de traitement.

** source OMEDIT : <http://www.omedit-paysdelaloire.fr/files/00/01/74/00017412-290cc3d43d73dab2af44f48bf9888338/conservation-des-multi-doses-forme-buvable.pdf>