

Critères par motif de recours

- Cardiologie
- Neurologie
- Pneumologie
- Digestif
- Infectiologie
- Dermatologie
- Endocrino Métab
- Hémato
- Rhumato
- Traumato
- Gynéco
- Urologie
- OPH ORL
- Toxico psychiatrie

Cardiologie

TA, FC, SaO2, EN, T° obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Douleur Thoracique			Non typique sans ATCD	Paramètres vitaux normaux	4	AUA *
	ECG TA 2 bras FR	Lire ECG	Typique ou + ATCD ou dyspnée	et / ou 1 paramètre anormal	3	AMT
			SCA ST +		2	SAUV
Ischémie aigue membre					3	AMT
Suspicion TVP	FR		Sans DT ni dyspnée	Paramètres Normaux	4	AUA *
			DT, dyspnée, terrain	et / ou 1 paramètre anormal	3	AMT
Malaise	Dextro		Syncopal ou avec TC suivi PC		3	AMT
			Avec trauma non ambu		3	AMT
			ATCD ou patient âgé	et / ou 1 paramètre anormal	3	AMT
			Autre	Paramètres normaux	4	AUA*

Cardiologie

TA, FC, SaO2, EN, T° obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
OMI bilatéraux			Age, ATCD		4	AUA *
				1 paramètre vital aNaI	3	AMT
Palpitations			Age, ATCD	FC < 120	4	AUA *
				120 < FC < 140	3	AMT
				FC > 140	2	SAUV
HyperTA	Décubitus		+ Céphalées, troubles conscience, vomissements, signes neuro, dyspnée, cyanose, syncope, DT	PAs > 200mmHg	2	SAUV
			RAS		3	AMT
HypoTA	Position déclive			< 75 mmHg	2	SAUV

Douleur thoracique typique

IOA
TA 2 bras
ECG lu par MCO

ECG normal
Non typique
Pas d'ATCD

Urgences
Ambulatoires

ECG normal
Typique
ATCD

AMT

SCA +

SAUV

Neurologie

TA, FC, Glasgow, T°, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Coma profond : GCS \leq 12					1 / 2	SAUV
Déficit sensitif ou moteur	HGT	X			2 / 3	UNV
Convulsions	HGT		Convulsions répétées		2	SAUV
					3	AMT
			Epileptique connu		4	AUA*
Confusion mentale, trouble vigilance : GCS \geq 12					3	AMT
Céphalée brutale inhabituelle					3	AMT
			Trouble de la vigilance		2	SAUV
Céphalée \geq 24 h ou sur terrain migraineux					4	AUA

Suspicion AVC ou AIT

IOA

Déficit neurologique focal brutal
(aphasie/déficit moteur /perte acuité visuelle)
(Si doute appel MCO 75916)

Ictus amnésique
(si doute appel MCO 75916)

Régressif
en < 24h

Persistent

H24
Senior
75671

Semaine
9h-17h
75673

Nuit WE
senior 75671

H24
Senior
75671

Urgences Ambu
Glycémie veineuse
OH
βHCG

Clinique des AIT PPR
Urqual réorientation

UNV PPR ou
AMT

Pneumologie

TA, FC, Sa O2, FR, T°, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Hémoptysie	Hb				3	AMT
Crise Asthme	DEP				4	AUA *
				150<DEP<250 Femme 200<DEP<300 Homme	3	AMT
			Difficulté à parler	FR <8 ou >32 SpO2 <90% DEP impossible	2	SAUV
Suspicion Pneumopathie	Masque		Co morbidité	1 paramètre anormal	3	AMT
					4	AUA *
Suspicion EP					3	AMT
Toux Crachats	Masque	X			4/5	AUA* ou MCO

Digestif (1)

TA, FC, T°, HGT, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Hématémèse-mélena-rectorragie	Hb, TTT anticoag			Paramètre vital aNaI	2	SAUV
					3	AMT
Suspicion Appendicite			Comorbidités, Age		3	AMT
					4	AUA*
Suspicion occlusion					3	AMT
Ictère			Comorbidités, Age, AEG		3	AMT
					4	AUA*
Ascite					3	AMT
Douleur abdominale			Comorbidités, Age, AEG		3	AMT
					4	AUA*

Digestif (2)

TA, FC, T°, HGT, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Constipation ou diarrhée					4	AUA*
			Comorbidité, Age	1 paramètre anormal mal toléré	3	AMT
Nausées ou vomissements					4	AUA*
			Comorbidité, Age	1 paramètre anormal mal toléré	3	AMT
Dysphagie ou hoquet		X			4 ou 5	AUA*
			Comorbidité, Age	1 paramètre anormal mal toléré	3	AMT
Proctologie					4	AUA*
Problème sonde gastrostomie					3 ou 4	AMT
Corps étranger ingéré					3 ou 4	AUA *
Corps étranger rectal					3 ou 4	AMT

Maladies Infectieuses

TA, FC, FR, SaO2, T°, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Suspicion méningite	Masque patient		Trbles csce, agitation, purpura		2	SAUV +/- déchoc
					3	AMT
Hyperthermie			Mal tolérée, Comorbidité Immunodépression	39° < T° < 40° 120 < FC < 150	3	AMT
			Retour voyage		5	SMIT
Hypothermie				T° < 32°	2	SAUV
				32 < T° < 35,5	3	AMT
AES	Personnel CHU				5	Méd. travail
	Autre	X			5	SMIT
Adénopathie					4/5	AUA
			Comorbidité		3	AMT
Vaccin rage					5	SMIT

Dermatologie

TA, FC, T°, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Affection cutanée fébrile, suspicion érysipèle					4	AUA*
			Comorbidité, âge	ou Fièvre mal tolérée	3	AMT
Érythème étendu					4	AUA*
				1 Paramètre anormal	3	AMT
Affection vénérienne					4	AUA*
Affection cutanée ou muqueuse limitée		X			5	AUA* ou MCO

Endocrino Métabolisme

TA, FC, T° obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Hyperglycémie	HGT Cétonémie		Trbles neuro, polypnée	HGT>14 mmol/l	2	SAUV
					3	AMT
			Pas ATCD diabète	HGT<14 mmol/l	3	AMT
			ATCD diabète	HGT<14mmol/l	4	AUA*
Anomalie métabolique		X			3	AMT
					2	SAUV
Altération état général et comorbidité(s)	HGT				3	AMT
Hypoglycémie	HGT		Trbles csce, convulsions	HGT<2,8 mmom/l	2	SAUV
			Agitation, douleur abdo, confusion	2,8<HGT<3,8	2/3	AMT

Hématologie

TA, FC, EN, T°, SaO2

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Leucopénie < 1.000 PNN					3	AMT
				Fièvre	2	SAUV
Anémie Hb ≤ 8					3	AMT
				Mal tolérée	2	SAUV
Thrombopénie ≤ 50.000					3	AMT
Crise drépanocytaire					3	AMT

Rhumato

TA, FC, T°, EN obligatoires

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Sciatalgie et autres névralgies					4	AUA*
			Déficit neurologique	Fièvre, hyperalgique	3	AMT
Arthrite ou gonflement (péri)articulaire					4	AUA*
			Comorbidités	Fièvre	3	AMT
Douleur(s) musculaire(s) ou articulaire(s)					4	AUA*
			Comorbidités		3	AMT
Cervicalgie, dorsalgie ou lombalgie					5	AUA*
			Déficit neurologique	Fièvre, hyperalgique	4	AMT

Traumatologie

TA, FC, EN

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Polytraumatisé	Allo Déchoc				1	SAS SAUV
Polycassé	GSC				2	SAUV
Trauma Haute cinétique				Symptomatique	2	SAUV
					3	AMT
Trauma violent face, cou, rachis, thorax, abdomen	GSC, SaO2				2	SAUV
Trauma crânien et PC ou confusion post PC	GSC				3	AMT
				Glasgow < 14	2	SAUV
Trauma crânien sans PC	TTT				4	AUA
			Anticoag, anti agrégant		3	AMT
Plaie délabrante membre					3	AMT
					2	SAUV

Traumatologie

TA, FC, EN

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIM U	Secteur
Trauma membre inférieur				Distale sans déformation (genou et dessous)	4	AUA
				Distale déformée ou proximale	4	AMT
				Suspicion Fracture diaphyse fémorale avec haute cinétique	3	SAUV
Trauma. bassin					3 /4	AMT

Traumatologie

TA, FC, EN

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Plaie(s) cou, thorax ou abdomen				Superficielle	3	AMT
				Profonde	2	SAUV
Plaie(s) superficielle(s) membres					4	AUA
Plaie(s) profonde(s) membres (hors SOS main)	TTT		TTT anticoag		3	AMT
					4	AUA*
Plaie(s) : érosion cutanée, abrasion		X			5	AUA ou MCO
Amputation				Proximale	3	SAUV
				Distale	2	AUA*
SOS mains					4	AUA*
Abcès					4	AUA

Traumatologie

TA, FC, EN

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Électrisation					3	AMT
				PCI, malaise, douleur thoracique, douleur membre	2	SAUV
Problème de plâtre					4	AUA
Noyade, pendaison	GSC, SaO2				3	AMT
					2	SAUV

Gynéco

TA, FC, T°, EN

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Métrorragies	Hb	X	DDR		3 ou 4	PDV
				Paramètre vital anormal	2	SAUV
Menace d'accouchement		X			2	SAUV
Douleur pelvienne	Hb	X	DDR		3 ou 4	PDV
Suspicion GEU	Hb	X			2	SAUV

Urologie

TA, FC, T°, EN

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Douleur aiguë de bourse / suspicion de torsion		X			3	AMT
RAU ou anurie					3	AMT
Pyélonéphrite ou colique néphrétique (suspicion)			Comorbidités	1 paramètre anormal mal toléré	3	AMT
					4	AUA*
Douleur de la fosse lombaire ou flanc			Comorbidités	1 paramètre anormal mal toléré	3	AMT
					4	AUA*
Hématurie macroscopique	Hb		Comorbidités	1 paramètre aNal mal toléré	3	AMT
					4	AUA*
Priapisme					3	AMT
SFU, écoulement urétral					4	AUA*
Problème sonde urinaire					3 ou 4	AMT

Urgences OPH PPR
H24

Ophtalmo - ORL

TA, FC, T°

Urgences ORL PPR
Lu – Ve 9h-17h
Allo IdG

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
Trouble ou perte de la vision		Appel UNV	Trbles neuro . associés		3	UNV
		X	Terrain		3	OPH/ UNV AMT
CE ou brûlure oph					4	OPH
Vertige				TA normale	4	AUA*
			ATCD vasculaires	TA s > 160mmHg	3	AMT
odynophagie, tuméfaction ORL, rhinite			Comorbidité		4	AUA*
					5	MCO
Paralysie Faciale		X	Périph. (atteinte œil)			ORL
			Centrale			UNV
Epistaxis			TTT anticoag		3	AMT
			Pas TTT		4	AUA*
Douleur dentaire					5	MCO

Toxicologie , Psychiatrie

TA, FC

Motif IOA	IOA	MCO	Déterminants primaires	Déterminants secondaires	CIMU	Secteur
IMV/OH	GSC, SaO2				3	AMT
			ADT, Cardiotrope, Baclofène	Atteinte fonctions vitales	2	SAUV
Agitation	SaO2, HGT, T°	X		Ethylotest -	3	Cs Psy
				Ethylotest +	3	AMT
1° épisode psychotique					5	Cs Psy
Trouble psychiatrique calme					5	Cs Psy