


<b>Protocole Orientation Urgence</b>	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences
Malaise	Version : 1 Date d'application : 07/2019

## I. OBJET DU DOCUMENT :

### 1. Orientation en secteur de soin




Rédigé par : Dr BALEN F.

Vérifié par : Pr LAUQUE D.

Approuvé par : Pr CHARPENTIER S.

<b>Protocole Orientation Urgence</b>	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences
Malaise	Version : 1 Date d'application : 07/2019

## 2. Check-List du patient orienté à l'AMCT/AMT



Rédigé par : Dr BALEN F.

Vérifié par : Pr LAUQUE D.

Approuvé par : Pr CHARPENTIER S.

<b>Protocole Orientation Urgence</b>	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences
Malaise	Version : 1 Date d'application : 07/2019

### 3. Aide à l'orientation étiologique

#### Malaise

**Origine cardiaque :** Retour immédiat à la conscience, perte brutale de conscience ou lipothymie associée à douleur thoracique ou palpitation. *A rechercher impérativement : conditionne le pronostic +++.*

- Embolie pulmonaire
- TV/FV
- BAV III
- RAO serré (syncope à l'effort)
- FA rapide
- Tachycardie jonctionnelle

**Origine neurologique :** Prodromes possibles, recherche de mouvements anormaux constatés par témoins, confusion post critique pouvant être associée à céphalées.

- Epilepsie
- Méningite/Méningo-encéphalite
- Hémorragie intracrânienne...

**Origine vagale :** Contexte vagal, sueurs, pâleur, bradycardie, lipothymie, antécédents vagues.

**Hypotension orthostatique :** Malaise et hypoTA à l'orthostatisme (à tester), rechercher iatrogénie (ttt hypotenseur +++)

**Origine métabolique :** sensation de malaise persistante, rechercher iatrogénie.

- Hypoglycémie
- Hyperglycémie (acido-cétose ou hyperosmolarité)
- Dysnatrémie
- Déshydratation...

**Origine Toxique :**

- OH
- Sevrage
- IMV
- ...

<b>Protocole Orientation Urgence</b>	Service émetteur : Service d'Accueil des Urgences Pôle : Médecine d'Urgences
Malaise	Version : 1 Date d'application : 07/2019

#### 4. Orientation après prise en charge initiale

**Hub (AMT) / AMCT :** Bilan initial, le malade peut être orienté vers un autre secteur après évaluation médicale séniorisée.

**SAUV / Zone Rouge :** Si aggravation du malade (cf critères en 1.) ou risque évolutif important après évaluation médicale.

**Zone Orange (AMT) / AMCT :** Scopé en attente des examens complémentaires, de la réponse aux thérapeutiques et orientation post SU, si suspicion de trouble du rythme/conduction paroxystique ou risque convulsif évaluer comme élevé.

**Zone Verte (AMT) / Zone de surveillance (AMCT) :** Non scopé, en attente des examens complémentaires, de la réponse aux thérapeutiques et orientation post SU, dans les autres cas.

## **II - DOMAINE D'APPLICATION :**

Service des Urgences de Rangueil et Purpan.

**III- PERSONNES AUTORISEES** (à compléter par le responsable médical signant le protocole) en fonction des références réglementaires.

**A prescrire :** X Médecin OU A entreprendre X IDE, ● IADE, ● Sage-femme, ● Manipulateur en électroradiologie, ● Masseurs kinésithérapeutes

**A administrer :** X IDE, X IADE, ● Sage-femme, ● Manipulateur en électroradiologie, ● Masseurs kinésithérapeutes

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS		
N°version	Date	Nature des modifications

ANNEE PREVISIONNELLE DE REVISION : 2021

Rédigé par : Dr BALEN F.

Vérifié par : Pr LAUQUE D.

Approuvé par : Pr CHARPENTIER S.