

1. Із якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла?
- a. Для попередження підвищення температури тіла
  - b. Для уникнення запаморочення**
  - c. Для кращої взаємодії з назальними краплями
  - d. Для попередження виникнення кашлю
  - e. Для підсилення лікувального ефекту
2. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує пацієнта з підтвердженим діагнозом: тупа травма живота.
- a. Хірургічні рукавички
  - b. Респіратор**
  - c. Хірургічну маску
  - d. Халат
  - e. Захисний екран
3. В якому періоді менструального циклу найчастіше виникає апоплексія яєчника?
- a. У період регресу жовтого тіла
  - b. У період менструації
  - c. У період овуляції**
  - d. У фолікуліновій фазі
  - e. У лютеїновій фазі
4. В якій клінічній ситуації сестрі медичній рекомендовано (показано) використання нестерильних (оглядаючих) рукавичок?
- a. Під час приготування препаратів для парентерального харчування
  - b. У разі ризику контакту з кров'ю чи іншими біологічними рідинами**
  - c. У разі транспортування пацієнта до іншого відділення
  - d. Під час збору і заміни постільної білизни
  - e. Під час вимірювання артеріального тиску
5. Вагітній жінці діагностовано тазове передлежання плода. У якому терміні вагітності можна виконати кесарів розтин?
- a. 40 тижнів
  - b. 28 тижнів
  - c. 36 тижнів**
  - d. 38 тижнів
  - e. 42 тижні
6. Вкажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки.
- a. Гістамін
  - b. Лізоцим
  - c. Гепарин
  - d. Гірудин**
  - e. Фібринолізин
7. Вкажіть віддалене ускладнення генітального туберкульозу у жінок.
- a. Підвищена пітливість
  - b. Субфебрилітет
  - c. Порушення менструального циклу
  - d. Швидка втомлюваність
  - e. Безпліддя**
8. Вкажіть дію, спричинену електричним струмом, що проходить через організм людини, яка виявляєтьс
- a. -
  - b. Магнітну
  - c. Електролітичну
  - d. Біологічну**
  - e. Термічну
9. Вкажіть засіб, яким потрібно промити непошкоджену шкіру при потраплянні на неї крові або інших рідин.
- a. Фізіологічним розчином
  - b. Антисептиком
  - c. Етиловим спиртом
  - d. Дезінфікуючим розчином
  - e. Водою з милом**
10. Вкажіть ключову умову для попередження пневмотораксу під час дренирування плевральної порожнини.

a. Проведення місцевої анестезії

**b. Забезпечення герметичності системи**

c. Дотримання правил асептики

d. Перебування пацієнта під час процедури у позі <<вершника>>

e. Проведення загальної анестезії

11. Вкажіть метод специфічної профілактики туберкульозу, що проводиться особам, які перебувають у

a. -

b. Щеплення вакциною БЦЖ

c. Ревакцинація вакциною БЦЖ

d. Хіміопротекція стрептоміцином

**e. Хіміопротекція ізоніазидом**

12. Вкажіть місце накладання електроду з зеленим маркуванням під час проведення електрокардіогра

**a. Ліва нога**

b. Права нога

c. Права рука

d. ---

e. Ліва рука

13. Вкажіть місце перебування породіллі упродовж найближчих двох годин після фізіологічних пологів.

**a. У пологовій залі**

b. У післяпологовому відділенні

c. У відділенні патології вагітних

d. У відділенні екстрагенітальної патології

e. У гінекологічному відділенні

14. Вкажіть особливість підготовки пацієнта до проведення езофагогастродуоденоскопії.

a. Вранці застосувати олійну клізму

b. Напередодні застосувати харчову клізму

c. За 1 годину до обстеження треба випити барій

**d. Дослідження проводиться натще**

e. Призначити розвантажувальну дієту

15. Вкажіть постін'єкційне ускладнення, що характеризується гнійним запаленням м'яких тканин та утв

a. Інфільтрат

**b. Абсцес**

c. Некроз

d. Емболія

e. Флебіт

16. Вкажіть прилад, який дозволяє виміряти пікову швидкість форсованого видиху та використовується

**a. Пікфлоуметр**

b. Пульсоксиметр

c. Тонometr

d. Радіометр

e. Глюкометр

17. Вкажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

a. Порушення виділення плаценти

b. Защемлення плаценти

c. Порушення зсідання крові

**d. Затримка частин плаценти**

e. Щільне прикріплення плаценти

18. Вкажіть прояви дизуричного синдрому.

a. Піурія, протеїнурія

b. Гіпертензія, набряки

c. Позитивний симптом Пастернацького

**d. Часте болісне сечовипускання**

e. Альбумінурія, кетонурія

19. Вкажіть типовий симптом, характерний для хронічної серцевої недостатності.

a. Пітливість

- b. Підвищення температури тіла
- c. Крововиливи на шкірі
- d. Набряки на обличчі

e. Набряки на нижніх кінцівках

20. Вкажіть тривалість прийому родонової ванни.

a. 30--40 хв

b. 10--15 хв

c. 1--2 хв

d. 50--60 хв

e. 5--7 хв

21. Вкажіть шлях введення контрастної речовини в кровоносне русло під час проведення холецистогра

a. Сублінгвально

b. Внутрішньом'язово

c. Внутрішньошкірно

d. Внутрішньовенно

e. Підшкірно

22. Вода якої температури використовується для процедури постановки гірчичників?

a. 39--40°C

b. 20--25°C

c. ---

d. 18--20°C

e. 25--27°C

23. Восьмирічний хлопчик хворіє на епідемічний паротит. На 7-ий день від початку захворювання на тлі

a. Кишківника

b. Яєчок

c. Нирок

d. Підшлункової залози

e. Головного мозку

24. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика з п

a. 35 мл

b. 3,5 мл

c. 5 мл

d. 10 мл

e. 1,5 мл

25. Гірудотерапія - це метод лікування за допомогою медичних п'явок. Яке з нижченаведених захворю

a. Тромбофлебіт

b. Анемія

c. Глаукома

d. Бронхіт

e. Гастрит

26. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спо

a. Акромегалії

b. Вродженого гіпотиреозу

c. Дифузного токсичного зоба

d. Рахіту

e. Вродженої вади серця

27. Для діагностики якого захворювання використовується реакція Ваалера-Роуза?

a. Системного червоного вовчака

b. Деформуючого остеоартрозу

c. Ревматоїдного артриту

d. Дерматоміозиту

e. Системної склеродермії

28. Для проведення проби якості передстерилізаційного очищення медичного інструментарію сестра м

a. 3 год

b. 1 добу

- c. 1 місяць
- d. 6 год

e. 2 год

29. Для профілактики якого специфічного ускладнення черевного тифу на 3-му тижні хвороби пацієнту

- a. Печінкової недостатності
- b. Розриву селезінки
- c. Генералізації інфекції
- d. Рецидиву захворювання

e. Кишкової кровотечі

30. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігастрі

- a. Хронічного холециститу
- b. Хронічного атрофічного гастриту

c. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

- d. Виразкової хвороби шлунка
- e. Хронічного панкреатиту

31. Для якого захворювання характерна поява таких клінічних проявів (великих діагностичних критеріїв)

a. Гострої ревматичної гарячки

- b. Системного червоного вовчака
- c. Деформуючого остеоартрозу
- d. Системної склеродермії
- e. Ревматоїдного артриту

32. Для якого захворювання характерним є зниження секреторної та кислотоутворювальної функцій шлунка

- a. Хронічного панкреатиту
- b. Хронічного гіпертрофічного гастриту

c. Хронічного атрофічного гастриту

- d. Цирозу печінки
- e. Виразкової хвороби шлунку

33. Для якого захворювання характерні такі зміни в загальному аналізі сечі: сеча каламутна, з осадом

a. Ниркової недостатності

b. Гострого пієлонефриту

- c. Хронічного гломерулонефриту
- d. Гострого гломерулонефриту
- e. Сечокам'яної хвороби

34. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гарячка, кашель (сухий, згодом вологий і продуктивний)

- a. Бронхіальної астми
- b. Гострого бронхіту
- c. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту
- d. Спонтанного пневмотораксу

e. Пневмонії

35. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гострий початок, слабко виражені катаральні зміни в носоглотці

- a. Кору
- b. Вітряної віспи

c. Краснухи

- d. Менінгококової інфекції
- e. Скарлатини

36. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність

- a. Ангінозного
- b. Церебрального
- c. Гастралгічного

d. Астматичного

e. Аритмічного

37. До гінекологічного відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 16 тижнів зі скаргами на

a. Зондування порожнини матки

b. Діагностичного вишкрібання стінок порожнини матки

c. Пункції заднього склепіння піхви

d. Гістеросальпінгографії

e. Кольпоскопії

38. До жіночої консультації звернулася жінка у терміні вагітності 36 тижнів. Під час зовнішнього аку

a. Завмерла

b. Одноплідна

c. Багатоплідна

d. Переношена

e. Несправжня

39. До медичного пункту батальйону скеровано бійця, який скаржиться на підвищення температури тіл

a. Ботулізму

b. Сепсису

c. Сказу

d. Правця

e. Менінгіту

40. До перинатального центру у відділення інтенсивної терапії шпиталізовано вагітну жінку (вагітніст

a. Хронічної серцевої недостатності

b. Феохромоцитоми

c. Помірної прееклампсії

d. Гестаційної гіпертензії

e. Тяжкої прееклампсії

41. До пологового відділення шпиталізовано жінку у терміні вагітності 26--27 тижнів, яка скаржиться

a. Кольпоскопію

b. Зовнішнє акушерське обстеження

c. Трансвагінальне УЗД

d. Амніоскопію

e. Внутрішнє акушерське обстеження

42. До приймального відділення шпиталізовано жінку віком 28 років у непритомному стані. Зі слів роди

a. Уремичної

b. Гіпоглікемічної

c. Печінкової

d. Гіперглікемічної

e. Церебральної

43. До сімейного лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту та тупий ниючий бі

a. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

b. Виразкової хвороби шлунку

c. Хронічного гіпоацидного гастриту

d. Хронічного панкреатиту

e. Раку шлунку

44. До якого обстеження сестрі медичній треба підготувати пацієнта, у якого є припущення на ішемічни

a. Електрокардіографії

b. Магнітно-резонансної томографії

c. Електроміографії

d. Рентгенографії кісток черепа

e. Ехокардіографії

45. До якої фармакологічної групи відноситься діазепам?

a. Транквілізатори

b. Міорелаксанти

c. Антиконвульсанти

d. Ноотропи

e. Антидепресанти

46. До якої фармакологічної групи лікарських засобів відноситься діазепам?

a. Транквілізатори

b. Антидепресанти

c. Ноотропи

d. Антиконвульсанти

е. Міорелаксанти

47. До якої функціональної проби треба підготувати пацієнта зі стабільною стенокардією напруження п

a. Велоергометрії

b. Кліноортостатичної проби

c. Синокаротидної проби

d. Проби із затримкою дихання

е. Атропінової проба

48. Дорослому пацієнту встановлено діагноз: бронхіальна астма. Який шлях введення ліків має переваг

a. Ентеральний

b. Ректальний

c. Сублінгвальний

d. Інгаляційний

е. Ін'єкційний

49. Дорослому пацієнту проведено внутрішньошкірну пробу Манту. На 3-тю добу в місці ін'єкції з'явила

a. -

b. Позитивна

c. Гіперергічна

d. Негативна

е. Сумнівна

50. Дієтотерапія - це метод лікування за допомогою раціонального харчування. Що означає принцип за

a. Збалансування харчування щодо білків, жирів, вуглеводів

b. Уведення в раціон харчування продуктів, у компонентах яких організм має дефіцит

c. Уникання можливості вживання продуктів, забруднених мікробами

d. Вживання продуктів харчування з тривалим терміном придатності

е. Виключення з раціону харчування їжі, багатой на клітковину

51. Епідемічний паротит - це інфекційне захворювання, що характеризується гарячкою, інтоксикацією т

a. Poliovirus з родини Picornaviridae

b. Togaviridae, роду Rubivirus

c. Rubeola virus, роду Morbillivirus

d. Bordetella pertussis

е. Mups virus з родини Coronaviridae

52. Жінка в терміні вагітності 36-37 тижнів скаржиться на появу незначних кров'янистих виділень (кро

a. Передчасних пологів

b. Загрози розриву матки

c. Провісників пологів

d. Передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

е. Передлежання плаценти

53. Жінка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, прискорене серц

a. Гемолітичної

b. B<sub>12</sub>-дефіцитної

c. Залізодефіцитної

d. Фолієводефіцитної

е. Гіпопластичної

54. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що

a. Ексудативного плевриту

b. Гострого бронхіту

c. Негоспітальної пневмонії

d. Сухого плевриту

е. Міжреберної невралгії

55. Жінка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість і гострий біль у грудній клітці справа, що

a. Сухого плевриту

b. Негоспітальної пневмонії

c. Гострого бронхіту

d. Ексудативного плевриту

е. Міжреберної невралгії

56. Жінка віком 35 років перебуває на 39-му тижні вагітності. Вагітність I, передбачувана маса плода

- a. Вакуум-екстракція плода
- b. Пологи через природні пологові шляхи
- c. Накладання акушерських щипців
- d. Кесарів розтин
- e. -

57. Жінка віком 36 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла

- a. Бешихи
- b. Лімфангіоми
- c. Дерматиту
- d. Тромбофлебіту
- e. Флегмони

58. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну

- a. Білірубину та його фракцій
- b. Ревматоїдного фактора
- c. АлАТ, АсАТ
- d. С-реактивного білка
- e. Сечової кислоти

59. Жінка віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей рук, ранкову скутість, загальну

- a. Сечову кислоту
- b. Ревматоїдний фактор
- c. АлАТ, АсАТ
- d. С-реактивний білок
- e. Білірубін

60. Жінка отримала опік окропом передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. В

- a. 37%
- b. 19%
- c. 51%
- d. 39%
- e. 25%

61. Жінка перебуває на 30-му тижні вагітності. Вагітність II, багатоплідна (монохоріональна моноамні

- a. 36 тижнів
- b. 40 тижнів
- c. 37 тижнів
- d. 32 тижні
- e. 38 тижнів

62. Жінка після ДТП скаржиться на біль і відсутність рухів у ділянці лівої ключиці. Під час огляду в

- a. Вивиху ключиці
- b. Забою у ділянці ключиці
- c. Перелому ключиці без зміщення кісткових уламків
- d. Перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків
- e. Відкритого перелому ключиці

63. Жінка скаржиться на гіркий присмак у роті, печію, нудоту і відрижку повітрям після вживання жирної

- a. Кишкової диспепсії
- b. Астеновегетативного синдрому
- c. Болювого синдрому
- d. Інтоксикаційного синдрому
- e. Шлункової диспепсії

64. Жінку в терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового будинку. Вкажіть ознаку початку

- a. Розкриття шийки матки
- b. Опущення дна матки
- c. Біль у ділянці крижів
- d. Регулярні перейми
- e. Часте сечовипускання

65. Жінці віком 35 років діагностовано залізодефіцитну анемію. Які продукти харчування мають бути у

- a. Борошняні вироби
- b. Молочні продукти
- c. Морська капуста

**d. М'ясні продукти**

- e. Овочі і фрукти

66. З якою метою флакон із вушними краплями перед застосуванням треба підігріти у руках до температури тіла?

**a. Для уникнення запаморочення**

- b. Для попередження підвищення температури тіла
- c. Для кращої взаємодії з назальними краплями
- d. Для попередження виникнення кашлю
- e. Для підсилення лікувального ефекту

67. За призначенням лікаря сестра медична проводить забір венозної крові пацієнта вакуумною системою.

a. Перелити її вміст в іншу ємність

**b. Акуратно перевернути її 5-8 разів для повного змішування її вмісту**

c. Енергійно струсити до повного змішування її вмісту

d. -

e. Підігріти її вміст до температури 37°C

68. За який термін часу треба зібрати сечу на дослідження для визначення вмісту глюкози?

a. За 1 год

b. ---

**c. За добу**

d. За 8 год

e. За 10 год

69. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно оформити?

a. Медичну карту амбулаторного хворого

**b. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання**

c. Контрольну карту диспансерного нагляду

d. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів

e. Медичну карту стаціонарного хворого

70. Мати тримісячного хлопчика скаржиться, що дитина стала неспокійною, погано спить, пітніє, особливо ввечері.

a. Гіпотиреозу

**b. Рахіту**

c. Спазмофілії

d. Анемії

e. Гіпотрофії

71. На яку глибину вводиться газовідвідна трубка в пряму кишку дорослим пацієнтам для усунення метеоризму?

a. 10--15 см

b. 15--20 см

**c. 20--30 см**

d. 3--4 см

e. 5--10 см

72. Нормальні пологи - це одноплідні пологи з мимовільним початком і прогресуванням пологової діяльності.

**a. 37-42 тиж.**

b. 27-32 тиж.

c. 42-45 тиж.

d. 32-35 тиж.

e. 35-37 тиж.

73. Одинадцятирічному пацієнту встановлено діагноз: гострий гломерулонефрит. Який сечовий синдром характерний для цього захворювання?

a. Міоглобінурія

b. Білірубінурія

**c. Гематурія**

d. Глюкозурія

e. Бактеріурія

74. Опіки якого ступеня характеризуються появою пухирів різної величини, наповнених прозорою рідиною?

a. III

b. ---

c. II

d. I

e. IV

75. П'ятирічна дитина захворіла гостро, спостерігається підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , сильн

a. Менінгокок

b. Ротавірус

c. Стрептокок

d. Мікобактерія туберкульозу

e. Стафілокок

76. Пацієнт віком 14 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,6^{\circ}\text{C}$ , пітливість, головний

a. Первинна туберкульозна інтоксикація

b. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

c. Первинний туберкульозний комплекс

d. Гострий бронхіт

e. Міліарний туберкульоз

77. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , набряк і почервонінн

a. Карбункул

b. Абсцес

c. Гідраденіт

d. Фурункул

e. Флегмона

78. Пацієнт віком 35 років скаржиться на прогресуючу слабкість, рясну пітливість, біль у горлі під ч

a. Гемофілії

b. Постгеморагічної анемії

c. Залізодефіцитної анемії

d. Апластичної анемії

e. Гострого лейкозу

79. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприєм

a. Гострого бронхіту

b. Бронхоектатичної хвороби

c. Сухого плевриту

d. Негоспітальної пневмонії

e. Ексудативного плевриту

80. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападоподібний біль у ділянці правого підреб

a. Гострий панкреатит

b. Ниркова коліка

c. Кишкова коліка

d. Гострий гастрит

e. Печінкова коліка

81. Пацієнт віком 39 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, появу набряків на обличч

a. Ниркової коліки

b. Гострого пієлонефриту

c. Гострого гломерулонефриту

d. Хронічної хвороби нирок

e. Гострого циститу

82. Пацієнт віком 40 років протягом останнього місяця скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність

a. Рентгенографію органів грудної клітки

b. Шкірні прик-тести

c. Визначення газового складу крові

d. Бронхоскопію

e. Спірографію

83. Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий нападоподібний біль у поперековій ділянці з правого

a. Промити шлунок

b. Провести катетеризацію сечового міхура

с. Прикласти холодний компрес на поперекову ділянку

d. Прикласти грілку на поперекову ділянку

е. Застосувати газовідвідну трубку

84. Пацієнт віком 48 років скаржиться на слабкість та відчуття оніміння у нижніх кінцівках, біль у с

a. Мієліту

b. Пухлини спинного мозку

с. Поліомієліту

d. Спінального інсульту

е. Розсіяного склерозу

85. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в пра

a. Стимулятори перистальтики

b. Проносні

с. Спазмолітики

d. Протимікробні

е. Ентеросорбенти

86. Пацієнт віком 55 років, який зловживає алкоголем, скаржиться на нападоподібний стискальний біль

a. Хронічного панкреатиту

b. Гострої кишкової інфекції

с. Гострого апендициту

d. Кишкової непрохідності

е. Виразкової хвороби шлунка

87. Пацієнт віком 57 років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей, що виникає в другій половин

a. Ехокардіографія

b. Рентгенографія кистей

с. Електрокардіографія

d. Рентгенографія органів грудної клітки

е. Загальний аналіз сечі

88. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів свідчить пр

a. Свербіж шкіри

b. Біль у кістках

с. Екзофтальм

d. Шум у вухах

е. Тризм жувальних м'язів

89. Пацієнт ендокринологічного відділення скаржиться на прискорене серцебиття, біль у ділянці серця

a. Аналіз крові на глюкозу

b. Загальний аналіз крові

с. УЗД щитоподібної залози

d. Аналіз крові на тиреоїдні гормони

е. МРТ головного мозку

90. Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні у зв'язку з перелом

a. Спочатку на хвору руку, потім на здорову руку, далі через голову і розправити

b. Через голову, потім на здорову руку, далі на хвору руку і розправити

с. Спочатку на здорову руку, потім на хвору руку, далі через голову і розправити

d. Через голову, потім на хвору руку, далі на здорову руку і розправити

е. Спочатку на хвору руку, потім через голову, далі на здорову руку і розправити

91. Пацієнт скаржиться на біль у грудній клітці, особливо під час кашлю та глибокому диханні. Аускул

a. Амфоричне дихання

b. Крепітація

с. Жорстке дихання

d. Шум тертя плеври

е. Голосове тремтіння

92. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, бажання випорожнити сечовий міхур, сечовиділе

a. Олігурія

b. Ниркова колька

с. Поліурія

d. Гостра затримка сечі

e. Ніктурія

93. Пацієнт скаржиться на біль унизу живота та часті рідкі випорожнення (спочатку калового характеру).

a. Загальний аналіз крові

b. Копрологічний

c. Бактеріологічний

d. Аналіз крові на глюкозу

e. Біохімічний аналіз крові

94. Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, гіркий присмак у роті, біль і відчуття тяжкості у правому

a. Гострого гастриту

b. Хронічного гепатиту

c. Хронічного панкреатиту

d. Хвороби Крона

e. Виразкової хвороби шлунку

95. Пацієнт скаржиться на надсадний кашель, прогресуючу задишку, біль у грудній клітці, кровохаркання.

a. ФГДС із біопсією

b. Іригоскопії

c. Бронхоскопії з біопсією

d. Електрокардіографії

e. Колоноскопії

96. Пацієнт скаржиться на озноб, гарячку, профузне потовиділення, що повторюються кожні три дні. З

a. Вірусного гепатиту

b. Грипу

c. Малярії

d. Лептоспірозу

e. Висипного тифу

97. Пацієнт скаржиться на розпирюючий біль унизу живота та неспроможність самостійно спорожнити с

a. Прикладання міхура з льодом на низ живота

b. Літотрепсія (дроблення каменів у нирках)

c. Обмеження вживання харчової солі

d. Катетеризація сечового міхура

e. Обмеження вживання рідини

98. Пацієнт скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, біль у сугло

a. Лептоспірозу

b. ВІЛ-інфекції

c. Вірусного гепатиту С

d. Висипного тифу

e. Кишкового ієрсиніозу

99. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рід

a. Панкреатогенної

b. Кишкової (ентерогенної)

c. -

d. Печінкової (гепатобіліарної)

e. Шлункової

100. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у першому плесно-фаланговому суглобі, що виник уночі. С

a. Хвороби Рейно

b. Панарицію

c. Ревматоїдного артрити

d. Подагри

e. Первинного коксартрозу

101. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання в руках, судоми в м'язах кистей.

a. Цукрового діабету

b. Вібраційної хвороби

c. Системної склеродермії

d. Пневмоконіозу

е. Ревматоїдного артрити

102. Пацієнт хворіє на деформуючий остеоартроз. Укажіть найефективніший захід для зменшення меха

а. Дотримання харчового етикету

б. Поліпшення побутових умов

с. Відмова від шкідливих звичок

d. Нормалізація маси тіла

е. Дотримання режиму дня

103. Пацієнт хворіє на хронічний спастичний коліт. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцев

а. Гірчичники

б. Медичні п'явки

с. Медична грілка

d. Міхур із льодом

е. Медичні банки

104. Пацієнт із діагнозом: хронічний панкреатит, отримує протирецидивне лікування. Яке дослідження

a. Дослідження калу на вміст еластази-1

б. Загальний аналіз крові

с. УЗД органів черевної порожнини

d. Дослідження шлункового соку

е. Холецистографію

105. Пацієнт, який збирає сечу для дослідження за методом Зимницького, повідомив сестру медичну пр

а. Виконати катетеризацію сечового міхура

б. Застосувати методи рефлекторного виклику акту сечовипускання

с. Увести пацієнту сечогінний препарат

d. Дати пацієнту випити води

е. Третій контейнер залишити порожнім

106. Пацієнт, який проживає в гірській місцевості, скаржиться на відчуття стиснення в ділянці шиї, р

а. Дифузного токсичного зоба

б. Аутоімунного тиреоїдиту

с. Ендемічного зоба

d. Підгострого тиреоїдиту

е. Гіпотиреозу

107. Пацієнта віком 25 років шпиталізовано бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги до лікарн

a. Гіпоглікемічна

б. Уремична

с. Діабетична

d. Гіперосмолярна

е. Мозкова

108. Пацієнта віком 27 років, який хворіє на цукровий діабет 1-го типу, шпиталізовано до лікарні в н

a. 40%-й розчин глюкози в/в

б. 0,1%-й розчин адреналіну п/ш

с. 2,5%-й розчин гідрокортизону в/м

d. 10%-й розчин натрію хлорид в/в краплинно

е. 5%-й розчин глюкози в/в

109. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на періодичний біль унизу живота, незначні кров'яністі виділ

а. Естрадіолу

б. Окситоцину

с. Хоріонічного гонадотропіну

d. Прогестерону

е. Пролактину

110. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на різкий біль у правій клубовій ділянці з іррадіацією в пря

a. Апоплексія яєчника

б. Гострий апендицит

с. Порушена позаматкова вагітність

d. Гострий сальпінгоофорит

е. Прогресуюча позаматкова вагітність

111. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, прискорене серцебиття та сп
- a. Геморагічного васкуліту
  - b. Апластичної анемії
  - c. Хвороби Верльгофа
  - d. Залізодефіцитної анемії
  - e. Гемофілії
112. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість
- a. Вогнищевої пневмонії
  - b. Пневмосклерозу
  - c. Абсцесу легень
  - d. Гострого бронхіту
  - e. Раку легень
113. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на тупий ниючий біль у правому підребер'ї з іррадіацією у п
- a. Гострого апендициту
  - b. Неспецифічного виразкового коліту
  - c. Хронічного холециститу
  - d. Кишкової непрохідності
  - e. Виразкової хвороби шлунка
114. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на сухість у роті, невгамовну спрагу, загальну слабкість, п
- a. Гіпотиреозу
  - b. Цукрового діабету
  - c. Корости
  - d. Гіпертиреозу
  - e. Кропив'янки
115. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, серцебиття, пощипування яз
- a. Апластичної
  - b. Залізодефіцитної
  - c. Аутоімунної гемолітичної
  - d. Гострої постгеморагічної
  - e. Вітамін В<sub>12</sub>-дефіцитної
116. Пацієнтка після апендектомії скаржиться на дворазове блювання, затримку газів і відсутність вип
- a. Гострий перитоніт
  - b. Гострий холецистит
  - c. Гострий панкреатит
  - d. Парез кишечника
  - e. Гострий аднексит
117. Пацієнтка після струмектомії скаржиться на млявість, загальну слабкість, зниження працездатнос
- a. Атеросклерозу
  - b. Гіпотиреозу
  - c. Гіпертиреозу
  - d. Акромегалії
  - e. Цукрового діабету
118. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратів
- a. Куріння
  - b. Порушення дієти
  - c. Шкідливі звички
  - d. Переохолодження
  - e. Психотравма
119. Пацієнтка скаржиться на погіршення апетиту, неприємний присмак у роті, печію, тяжкість і розпир
- a. Печінкової (гепатобіліарної)
  - b. Кишкової (ентерогенної)
  - c. Шлункової
  - d. -
  - e. Панкреатогенної
120. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниже

- a. Системного червоного вовчака
- b. Ревматичного поліартриту
- c. Деформуючого остеоартрозу
- d. Системного васкуліту
- e. Ревматоїдного артрити

121. Пацієнту в першу добу після травми показане прикладання міхура з льодом до місця ушкодження.

- a. Кожні 60 хв робити перерву на 20-30 хв
- b. -
- c. Кожні 5 хв робити перерву на 20-30 хв

d. Кожні 20 хв робити перерву на 10-15 хв

e. Кожні 40 хв робити перерву на 10-15 хв

122. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати

- a. Гепатопротектори
- b. Кардіопротектори

c. Цитостатики

- d. Антибіотики
- e. Противірусні

123. Пацієнту встановлено діагноз: гострий пієлонефрит. Чим зумовлений біль у поперековій ділянці у

- a. Дизуричними розладами
- b. Уремією

c. Розтягненням ниркової капсули

- d. Підвищенням артеріального тиску
- e. Корінцевим синдромом

124. Пацієнту встановлено діагноз: пептична виразка шлунка. Який із нижченаведених лікарських засок

- a. -
- b. Амоксицилін
- c. Кларитроміцин
- d. Вісмуту субцитрат (де-нол)

e. Омепразол

125. Пацієнту встановлено діагноз: інсулінозалежний цукровий діабет. Яка тактика зменшить ризик роз

- a. Використання інсулінових шприців
- b. Уведення підігрітого розчину інсуліну
- c. Уведення інсуліну за 15-20 хв до приймання їжі
- d. Повільне (упродовж 15-20 хв) введення інсуліну

e. Зміна місця ін'єкцій

126. Пацієнту віком 27 років діагностовано кропив'янку. Які продукти потрібно виключити з раціону хв

- a. Оливкову олію, зерновий хліб
- b. Кабачки, капуста

c. Шоколад, мед

- d. Каші з вівсяної та гречаної крупи
- e. Макаронні вироби з твердих сортів пшениці

127. Пацієнту віком 27 років, який лікується в нефрологічному відділенні, призначено дослідження сеч

- a. Визначенні кількості формених елементів, що виділяються з сечею за 1 хв
- b. Дослідженні концентраційної здатності нирок
- c. Встановленні щільності сечі та її густини в окремих порціях
- d. Визначенні кількості формених елементів у добовій кількості сечі

e. Визначенні кількості формених елементів і циліндрів в 1 мл осаду сечі

128. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для

- a. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв
- b. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння
- c. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних значень
- d. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік
- e. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, "повним ротом"

129. Пацієнту віком 38 років сімейним лікарем призначено внутрішньом'язові ін'єкції біциліну-5. Розч

a. Бензилпеніциліну натрієвої солі

- b. Цефазоліну
- c. Стрептоміцину сульфату
- d. Канаміцину
- e. Амоксициліну

130. Пацієнту віком 49 років встановлено попередній діагноз: ексудативний плеврит. До якої діагностики

a. Люмбальної пункції

b. Торакоцентезу

c. Бронхоскопії

d. Спірометрії

e. Абдомінальної пункції

131. Пацієнту для лікування геморою призначено ректальне введення супозиторіїв із новокаїном. Укажіть

a. За температури повітря не вище ніж 25°C

b. У темному місці

c. В окремій шафі

d. У сухому темному місці

e. У приміщенні з витяжною вентиляцією

132. Пацієнту ендокринологічного відділення за призначенням лікаря треба підшкірно ввести 36 МО інсуліну

a. 0,6 мл

b. 0,7 мл

c. 1,0 мл

d. 0,8 мл

e. 0,9 мл

133. Пацієнту з гострим коронарним синдромом призначено нітрогліцерин сублінгвально у дозі 0,5 мг. Які

a. <150 мм рт. ст.

b. <180 мм рт. ст.

c. <140 мм рт. ст.

d. <90 мм рт. ст.

e. <120 мм рт. ст.

134. Пацієнту з дихальною недостатністю призначено інгаляції кисню в об'ємі понад 5 л/хв. Які дії по

a. Підняти головний кінець ліжка

b. Зволожити кисень

c. Стежити за тиском

d. Обробити кисневий катетер олійним розчином

e. Регулювати редуктор

135. Пацієнту з діагнозом: гіпертонічна хвороба I ст., призначено електрофорез із 5% розчином сульфату

a. Гальванічний комір за Щербаком

b. ---

c. Півмаска Бергоньє

d. Електрофорез по Келату

e. Електрофорез за Вермелем

136. Пацієнту з діагнозом: неврастенія, гіперстенічна форма, призначено бром-електрофорез за методом

a. Один електрод на низ живота, другий --- на попереково-крижову ділянку

b. Один електрод між лопатками, другий --- на литкові м'язи

c. Обидва електроди між правою та лівою лопатками

d. Один електрод на потилицю, другий --- на попереково-крижову ділянку

e. Один електрод між лопатками, другий --- на грудну клітку

137. Пацієнту неврологічного відділення встановлено попередній діагноз: субарахноїдальний крововилив

a. Білувато-жовтий

b. Фіолетовий

c. Безбарвний

d. Червоний

e. Сіро-зелений

138. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено

a. Безбарвний

b. Жовтувато-зеленуватий

с. Червоний

d. Прозорий

е. Каламутний

139. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 60 мг 4% розчину гентаміцину сульфату. В ампу

a. 1,5 мл

b. 1 мл

с. 0,5 мл

d. 2 мл

е. 3 мл

140. Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 800 000 ОД антибіотика (флакон містить 1 000 0

a. 10 мл

b. 4 мл

с. 3 мл

d. 8 мл

е. 5 мл

141. Пацієнту призначено підшкірне введення олійного розчину. Які дії має виконати сестра медична д

a. Змінювати місце ін'єкцій

b. Промасажувати місце ін'єкції стерильною ватною кулькою

с. Дотримуватися правил асептики

d. Перевірити, чи не потрапила голка в просвіт кровоносної судини

е. Перевірити кут і глибину введення голки

142. Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності с

a. УВЧ-терапію

b. Вакуум-терапію медичними банками

с. Застосування медичної грілки

d. Накладання гірчичників

е. Накладання зігрівального компресу

143. Пацієнту проведено прицільну біопсію з метою діагностики онкологічного захворювання. Яке лабор

a. Цитологічне

b. Біохімічне

с. Загальноклінічне

d. Бактеріологічне

е. Серологічне

144. Пацієнту пульмонологічного відділення встановлено діагноз: пневмонія - та призначено оксигенот

a. Кожні 30 хв

b. Кожні 2 год

с. Кожні 40 хв

d. Кожні 8 год

е. Кожні 3 год

145. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимн

a. -

b. 1:1

с. 1:4

d. 1:3

е. 3:1

146. Пацієнту, який хворіє на бронхоектатичну хворобу, призначено масаж грудної клітки та дихальну п

a. Загартування організму

b. Полегшення больових відчуттів

с. Профілактика набряку легень

d. Попередження кровохаркання

е. Полегшення процесу відходження мокротиння

147. Пацієнту, який хворіє на бронхіальну астму, з метою моніторингу функціонального стану дихально

a. Резервний об'єм вдику

b. Пікова швидкість видиху

с. Резервний об'єм видиху

- d. Об'єм форсованого видиху
- e. Життєва ємність легень

148. Пацієнту, який хворіє на залізодефіцитну анемію, призначено терапію препаратами заліза. Одночасно

- a. Кальциферолу
- b. Токоферолу
- c. Аскорбінової кислоти
- d. Піридоксину
- e. Ціанокобаламіну

149. Пацієнтці віком 18 років діагностовано гострий гнійний менінгіт. Укажіть особливості складу лік

- a. Підвищення концентрації хлоридів
- b. Клітинно-білкова дисоціація
- c. Білково-клітинна дисоціація
- d. Підвищення рівня глюкози
- e. -

150. Пацієнтці віком 42 років встановлено діагноз: варикозна хвороба нижніх кінцівок. Укажіть найчас

- a. Кардіосклероз
- b. Параліч
- c. Сепсис
- d. Системна склеродермія
- e. Тромбофлебіт

151. Пацієнтці віком 52 роки встановлено діагноз: системний червоний вовчак. Які з нижченаведених си

- a. "Маскоподібне обличчя", кисетоподібні складки навколо рота, ущільнення шкіри кистей та розвиток і
- b. Відчуття оніміння пальців рук, зниження чутливості кінцівок за типом "рукавичок" і "шкарпеток"
- c. Еритематозний висип на спинці носа та вилицях у вигляді "метелика", біль у м'язах, підвищення тем
- d. Летючий характер болю у великих суглобах, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
- e. Ранкова скутість, біль у дрібних суглобах кистей і стоп, деформація суглобів

152. Периферичну вену з якими властивостями доцільно обрати для проведення її безпечної катетериза

- a. Великого діаметру та деформовану
- b. М'яку та еластичну на дотик
- c. Розташовану поруч з артерією
- d. Розташовану на зап'ясті
- e. Тверду та склерозовану

153. Породілля в ранньому післяпологовому періоді перебуває в пологовій залі. Як часто треба виконув

- a. Кожні 30 хвилин
- b. Кожні 5 хвилин
- c. Кожні 10 хвилин
- d. Кожні 60 хвилин
- e. Кожні 15 хвилин

154. Породілля на 4 добу після пологів скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла

- a. Гострий аднексит
- b. Гострий ендометрит
- c. Гострий кольпіт
- d. Гострий перитоніт
- e. Гострий пельвіоперитоніт

155. Працівники, які обслуговують каналізаційну мережу, відчули в повітрі специфічний запах <<тухлий

- a. Вуглецю оксидом
- b. Хлором
- c. Аміаком
- d. Сірководнем
- e. Фосгеном

156. Під час догляду за пацієнтом із хронічною серцевою недостатністю сестра медична звернула увагу

- a. Поява прихованих набряків
- b. ---
- c. Порушення метаболізму
- d. Ожиріння

е. Зневоднення

157. Під час догляду та для допомоги пацієнту, у якого триває друга стадія гарячки (температура тіла

а. Через 1 год

б. За вимогою

с. Кожні 2-3 хв

д. Кожні 30 хв

е. Раз на добу

158. Під час лабораторного дослідження мокротиння виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейд

а. Бронхоектатичної хвороби

б. Бронхіальної астми

с. Гострого бронхіту

д. Сухого плевриту

е. Туберкульозу легень

159. Під час об'єктивного обстеження пацієнта сестра медична виявила, що на тлі сповільненого та рів

а. Інспіраторна задишка

б. Експіраторна задишка

с. Дихання Біота

д. Дихання Куссмауля

е. Дихання Чейна-Стокса

160. Під час обстеження роділлі виявлено, що спинка плода обернена до правої стінки матки, над вход

а. Друга позиція, тазове передлежання

б. Друга позиція, головне передлежання

с. Задній вид, головне передлежання

д. Задній вид, тазове передлежання

е. Перша позиція, тазове передлежання

161. Під час операції на неушкоджену шкіру сестри медичної, яка асистує лікарю, потрапила кров. Укаж

а. Фізіологічним розчином

б. Антисептиком

с. Етиловим спиртом

д. Дезінфікуючим розчином

е. Водю з милом

162. Під час оцінювання стану новонародженої дитини на 1-й хвилині життя виявлено: ЧСС --- 120/хв, д

а. 2 бали

б. 5 балів

с. 7 балів

д. 10 балів

е. 4 бали

163. Під час парентерального введення камфорної олії сестра медична після введення шприца відтягну

а. Гематоми

б. Повітряної емболії

с. Медикаментозної емболії

д. Некрозу

е. Інфільтрату

164. Під час проведення внутрішнього акушерського дослідження роділлі виявлено: шийка матки зглад

а. Потиличне

б. ---

с. Лобне

д. Лицьове

е. Передньоголовне

165. Під яким кутом вводиться голка у верхньо-зовнішній квадрант сідниці під час виконання внутрішн

а. 70°

б. 90°

с. 30°

д. 15°

е. 45°

166. Під яким кутом потрібно ввести голку інсулінового шприца в підшкірно-жирову клітковину, якщо її

- a. 45°
- b. 90°
- c. 40°
- d. 30°
- e. 15°

167. Після роботи з електроприладами чоловік помітив на долоні правої руки біло-сіру пляму діаметром

- a. Електроофтальмія
- b. Опік
- c. Знак
- d. ---
- e. Металізація

168. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним ар

- a. Пневмопресинг
- b. Міостимуляція
- c. Механотерапія
- d. Вакуумний масаж
- e. Вісцеральна терапія

169. Роділлю проінформовано про активне ведення третього періоду фізіологічних пологів, що передба

- a. Внутрішньошкірно
- b. Внутрішньовенно струминно
- c. Ректально
- d. Підшкірно
- e. Внутрішньом'язово

170. Роділлю проінформовано щодо активної тактики ведення третього періоду пологів. Розвиток якого

- a. Розриву матки
- b. Еклампсії
- c. Порушення зсідання крові
- d. Емболії навколоплідними водами
- e. Гіпотонічної кровотечі

171. Роділля, у якої триває другий період пологів, відчула різкий біль у ділянці дна матки. Об'єktiv

- a. Стимуляція пологової діяльності
- b. Плродоруйнівна операція
- c. Спостереження за роділлем
- d. Кесарів розтин
- e. Накладання акушерських щипців

172. Розвиток якого патологічного стану вказує на те, що в пацієнта триває III стадія артеріальної г

- a. Ниркової недостатності
- b. Дихальної недостатності
- c. Тиреотоксикозу
- d. Діабетичної нефропатії
- e. Печінкової недостатності

173. Семирічна дитина скаржиться на біль в епігастрії, періодичні нудоту, відрижку повітрям, печію,

- a. Припинити приймання антибіотиків за 4--6 тижнів до дослідження
- b. Перед обстеженням збільшити вживання рідини
- c. Приймати проносні засоби упродовж 3-х днів до дослідження
- d. Застосувати очисну клізму напередодні
- e. Уникати чищення зубів і полоскання рота зранку перед дослідженням

174. Сестра медична навчає пацієнта, якому діагностовано цукровий діабет 1-го типу, техніці введення

- a. Ліподистрофія
- b. Медикаментозна емболія
- c. Гіперглікемія
- d. Тромбофлебіт
- e. Гіпоглікемія

175. Сестра медична проводить заміну та сортування постільної білизни тяжкохворого пацієнта. Класифі

a. III

b. IV

c. I

d. II

e. -

176. Сестра медична проводить сортування медичних відходів після виконання лікарських призначень.

a. -

b. D

c. C

d. B

e. A

177. Сестра медична у пологовому будинку проводить підготовку новонародженої дитини з масою тіла

a. <<Пентаксим>>

b. БЦЖ-М

c. <<Пріорікс>>

d. <<Інфанрікс>>

e. БЦЖ

178. Сестра медична, надаючи медичну допомогу пацієнту, в якого розвинувся напад стенокардії, засто

a. Поліпшує функцію ендотелію

b. Покращує метаболізм

c. Підвищує силу і швидкість скоротливості міокарда

d. Розширює коронарні судини

e. Розслабляє гладку мускулатуру бронхів

179. Сестра медична, щоденно вимірюючи температуру тіла пацієнта та реєструючи її графічно в темпе

a. Постійна

b. Гектична

c. Послаблювальна

d. Переміжна

e. Хвилеподібна

180. Споживання продуктів зі збагачених вмістом якого мікроелементу треба порекомендувати пацієнт

a. Заліза

b. Натрію

c. Калію

d. Магнію

e. Кальцію

181. Старша сестра медична інструктує своїх підлеглих щодо правил гігієни рук. Який тип нагадування

a. Аудіоповідомлення

b. Конференції

c. Інформаційні плакати

d. Санбюлетні

e. Накази

182. Тяжкохворий пацієнт хоспісу перебуває на ліжковому режимі. З якою метою застосовується шкала

a. Оцінювання ступеня виникнення ризику пролежнів

b. Корекції психоемоційного стану

c. Оцінки психоемоційного стану

d. Планування реабілітаційних заходів

e. Розрахунку індексу маси тіла

183. У вагітної жінки віком 42 роки під час вимірювання зовнішніх розмірів таза з'ясувалося, що зовн

a. Вакуум-екстракція плода

b. Стимуляція пологів

c. Витягання плода за тазовий кінець

d. Накладання акушерських щипців

e. Кесарів розтин

184. У гастроентерологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба шлунку. Як

a. Нестероїдні протизапальні

**b. Інгібітори протонної помпи**

c. Антибактеріальні

d. Антигістамінні

e. Антацидні

185. У дванадцятирічного пацієнта попередній діагноз: епілепсія. Який метод обстеження потрібно виконати?

**a. Електроенцефалографія**

b. Ультразвукове дослідження головного мозку

c. Магнітно-резонансна томографія головного мозку

d. Електрокардіографія

e. Комп'ютерна томографія головного мозку

186. У дев'ятирічного хлопчика спостерігаються сухий кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння.

a. Плевриту

b. Ларингіту

c. Бронхіту

d. Бронхіоліту

**e. Пневмонії**

187. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки висівають вузлуваті висівкоподібні висипи.

a. Екземи

**b. Висівкоподібного лишаю**

c. Дерматиту

d. Мікроспорії

e. Токсикодермії

188. У дівчини віком 22 роки через декілька місяців після незахищеного статевого акту над поверхнею губ з'явилися висівкоподібні висипи.

a. Протей

b. Хламідія

**c. Папіломавірус**

d. Гарднерела

e. Трихомонада

189. У дівчини за декілька місяців після початку статевого життя у ділянці великих статевих губ з'явилися висівкоподібні висипи.

a. Хламідія

b. Трихомонада

c. Протей

**d. Папіломавірус**

e. Гарднерела

190. У жінки в терміні вагітності 33 тижні спостерігається збільшення маси тіла --- 500 г за тиждень.

a. Бактеріологічне дослідження сечі

b. Загальний аналіз крові

c. Біохімічний аналіз крові

**d. Визначення білка в сечі**

e. Коагулограма

191. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі в цервікальному секреті.

a. Аборт у ході

b. Неповне передлежання плаценти

c. Розрив матки, що відбувся

**d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

e. Загроза розриву матки

192. У жінки в терміні вагітності 35 тижнів з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі в цервікальному секреті.

a. Розрив матки, що відбувся

b. Аборт у ході

**c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**

d. Загроза розриву матки

e. Неповне передлежання плаценти

193. У жінки в терміні вагітності 35---36 тижнів спостерігаються головний біль, нудота, блювання, м'язові болі.

**a. Прееклампсії тяжкого ступеня**

b. Еклампсії

- c. Артеріальної гіпертензії
- d. Прееклампсії легкого ступеня
- e. Прееклампсії середнього ступеня

194. У жінки віком 25 років після переохолодження з'явилися скарги на загальну слабкість, озноб, під

- a. Сечокам'яної хвороби
- b. Гострого пієлонефриту

- c. Гострого циститу
- d. Гострого гломерулонефриту
- e. Амілоїдозу нирок

195. У жінки з регулярним менструальним циклом спостерігається затримка менструації упродовж 5-ти

- a. Збільшення об'єму живота
- b. Нагрубання грудних залоз

c. Зміна форми матки

- d. Пігментація шкіри обличчя
- e. Ціаноз слизової оболонки піхви

196. У жінки на 31 тижні вагітності розпочалися пологи та з'явилася кровотеча з піхви. Під час вагін

a. Бокове

- b. Центральне
- c. Оболонкове
- d. Низьке
- e. Крайове

197. У жінки на другий день після діагностичного вишкрібання порожнини матки підвищилася температура

- a. Седативні
- b. Глюкокортикоїди
- c. Гемостатики
- d. Цитостатики

e. Антибактеріальні

198. У жінки протягом 1 год після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явився висип у вигляді

- a. Набряку Квінке
- b. Кору

c. Кропив'янки

- d. Сироваткової хвороби
- e. Анафілактичного шоку

199. У жінки під час статевого акту виник різкий біль у правій здухвинній ділянці з іррадіацією у ві

- a. Ендометріозу
- b. Синдрому полікістозних яєчників
- c. Хоріонепітеліоми

d. Апоплексії яєчника

e. Позаматкової вагітності

200. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза врахов

- a. Міжгребенева відстань
- b. Міжостьова відстань
- c. Зовнішня кон'югата
- d. Міжвертлюгова відстань

e. Справжня кон'югата

201. У маніпуляційному кабінеті під час взяття крові з вени пацієнт знепритомнів. Яке положення тіл

a. Горизонтальне, з піднятими вище рівня голови ногами

- b. Горизонтальне, лежачи на боку
- c. Сидяче, із нахиленим вперед тулубом
- d. Горизонтальне, з піднятим головним кінцем ліжка
- e. Напівсидяче, з опущеними донизу ногами

202. У п'ятирічної дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, спостерігається підвищення температури

a. 7 днів

b. 22 дні

c. 5 днів від початку захворювання

d. 21 день

e. 5 днів від моменту появи висипань

203. У пацієнта віком 20 років захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 39,

a. Бабінського, Россалімо

b. Хвостека, Труссо

c. Кера, Ортнера

d. Керніга, Брудзинського

e. Пастернацького, Ровзінга

204. У пацієнта віком 32 роки раптово вночі з'явилася експіраторна задишка, що супроводжується сухим

a. Напад стенокардії

b. Гострий бронхіт

c. Напад бронхіальної астми

d. Набряк легень

e. Сухий плеврит

205. У пацієнта віком 42 роки встановлено діагноз: сечокам'яна хвороба. Які продукти харчування реко

a. М'ясні страви

b. Гострі страви

c. Незбиране молоко

d. Лужні мінеральні води

e. Прянощі

206. У пацієнта віком 50 років після емоційного перенавантаження виникли інтенсивний стискальний по

a. Стабільної стенокардії

b. Стенокардії напруги

c. Міжреберної невралгії

d. Перикардиту

e. Інфаркту міокарда

207. У пацієнта гематологічного відділення на шкірі тулуба візуалізується петехіально-плямистий висип

a. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури

b. Лімфогранулематозу

c. Хронічного мієлолейкозу

d. Гемолітичної анемії

e. Гемофілії А

208. У пацієнта діагностовано цукровий діабет 2-го типу легкого ступеня тяжкості (рівень глікемії -

a. Прогулянки

b. Загартовування

c. Дієтотерапія

d. Повноцінний сон

e. Вітамінотерапія

209. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, підвищилася температура тіла до 39,0°C, шкіра червона, гаряча

a. Накласти зігрівальний компрес

b. Фізичні методи охолодження

c. Обкласти грілками

d. Поставити гірчичники

e. Поставити банки

210. У пацієнта з діагнозом: хронічна ниркова недостатність, розвинулася уремія. Який симптом характ

a. Гіперемія шкірних покривів

b. Підвищення температури тіла

c. Аміачний запах з рота

d. Підвищення апетиту

e. Збільшення лімфатичних вузлів

211. У пацієнта з хронічною нирковою недостатністю швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл

a. Шунтування

b. Фонофорезу

c. Гемодіалізу

d. Лапароцентезу

е. Літотрипсії

212. У пацієнта з інсультом спостерігається часткове обмеження довільних рухів у правих кінцівках із

- а. Центральна геміплегія
- б. Периферичний геміпарез
- с. Периферична геміплегія
- д. Центральний парапарез

е. Центральний геміпарез

213. У пацієнта затяжний напад бронхіальної астми завершився розвитком астматичного статусу. Який

- а. Частота дихальних рухів
- б. Температура тіла
- с. Вік пацієнта понад 50 років
- д. Тривалість хвороби

е. Рівень сатурації

214. У пацієнта кардіологічного відділення частота серцевих скорочень уповільнилася до 54/хв. Укажіть

а. Гіпотензія

б. Брадикардія

с. Гіпертензія

д. Тахікардія

е. Асистолія

215. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилю

- а. Серцева астма
- б. Тромбоемболія легеневої артерії
- с. набряк легень
- д. Нестабільна стенокардія

е. Кардіогенний шок

216. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда у першу добу захворювання розвинулися та

а. Бронхообструктивний

б. Резорбтивно-некротичний

с. Сидеропенічний

д. Менінгеальний

е. Гіпертензивний

217. У пацієнта нефрологічного відділення під час лабораторного дослідження сечі виявлено: олігурію,

а. Гострого гломерулонефриту

б. Сечокам'яної хвороби

с. Хронічного пієлонефриту

д. Гострого пієлонефриту

е. Гострого циститу

218. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене с

а. Гіповолемічний шок

б. набряк Квінке

с. Напад бронхіальної астми

д. Анафілактичний шок

е. Кардіогенний шок

219. У пацієнта попередній діагноз: загострення хронічного панкреатиту. Яке дослідження проводиться

а. Аналіз калу на приховану кров

б. Аналіз крові на креатинін

с. Аналіз сечі на глюкозу

д. Аналіз сечі на  $\alpha$ -амілазу

е. Аналіз крові на білірубін

220. У пацієнта пульмонологічного відділення розвинувся бронхообструктивний синдром. Укажіть прові

а. Інспіраторна задишка

б. Експіраторна задишка

с. "Гавкаючий" кашель

д. Дихання Куссмауля

е. Брадипное

221. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, "гавкаючий кашель".

- a. Кропив'янка
- b. Дифтерійний круп

c. Набряк Квінке

- d. Анафілактичний шок
- e. Аспірація стороннього тіла

222. У пацієнта після внутрішньовенного введення антибіотику розвинувся анафілактичний шок. Який препарат?

- a. Фуросемід
- b. Кофеїн

c. Епінефрин

- d. Дротаверин
- e. Нітрогліцерин

223. У пацієнта після парентерального введення антибіотику розвинувся анафілактичний шок. Яка ділянка тіла?

- a. Зовнішня поверхня передпліччя
- b. Внутрішня поверхня плеча

c. Зовнішня поверхня стегна

- d. Внутрішня поверхня передпліччя
- e. Внутрішня поверхня стегна

224. У пацієнта після укусу бджоли раптово виник сильний головний біль, з'явилися психоемоційне збудження.

- a. Абдомінальний

b. Церебральний

- c. Асфіктичний
- d. Гемодинамічний
- e. Кардіогенний

225. У пацієнта після фізичного навантаження виник стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку.

- a. Колапс

b. Напад стенокардії

- c. Кардіогенний шок
- d. Гіпертензивний криз
- e. Інфаркт міокарда

226. У пацієнта розвинувся ангіоневротичний набряк. Препарати якої фармакологічної групи потрібно ввести?

a. Антигістамінні

- b. Антихолінестеразні
- c. Антибіотики
- d. Анальгетики
- e. Адреноміметики

227. У пацієнта розвинулися симптоми гострого гастриту в результаті споживання неякісної їжі. Які заходи лікування?

a. Промити шлунок

- b. Застосувати очисну клізму
- c. Прикласти грілку на епігастральну ділянку
- d. Прикласти міхур із льодом на епігастральну ділянку
- e. Провести сліпе зондування

228. У пацієнта спостерігаються клінічні прояви харчової алергії. Яке з нижченаведених досліджень є найбільш інформативним?

a. Шкірна скарифікаційна проба

- b. Біопсія шкіри
- c. Проба Манту
- d. Загальний аналіз крові
- e. Біохімічний аналіз крові

229. У пацієнта спостерігається загострення хронічного пієлонефриту. Яке обстеження доцільно провести?

- a. Аналіз сечі на  $\alpha$ -амілазу
- b. Екскреторну урографію
- c. Біохімічний аналіз крові

d. Бактеріологічний аналіз сечі

- e. Хромоцистоскопію

230. У пацієнта терапевтичного відділення діагностовано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Які заходи лікування?

- a. Escherichia coli
- b. Streptococcus
- c. Salmonella
- d. Staphylococcus aureus
- e. Helicobacter pylori**

231. У пацієнта терапевтичного відділення, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, виник закріп. Ук

- a. Покласти міхур із льодом на живіт
- b. Промити шлунок
- c. Покласти грілку на живіт
- d. Запропонувати тепле питво
- e. Застосувати очисну клізму**

232. У пацієнта інфекційного стаціонару спостерігається тяжкий загальний стан, акроціаноз, сухість ш

- a. Ексудативний
- b. Секреторний**
- c. Інвазивний
- d. Осмотичний
- e. Запальний

233. У пацієнта, який довгий час хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, спостерігається

- a. Перфорація
- b. Пілоростеноз
- c. Пенетрація**
- d. Ахалазія кардії
- e. Малігнізація

234. У пацієнта, який нещодавно повернувся з африканської країни та захворів на інфекційне захворюв

- a. Малярії**
- b. Грипу
- c. Лептоспірозу
- d. Вірусного гепатиту
- e. Висипного тифу

235. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, з'явилися скарги на швидку втомлюваність,

- a. Шлункової кровотечі
- b. Пілоростенозу
- c. Перфорації
- d. Пенетрації
- e. Малігнізації**

236. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово виникла шлунково-кишкова кровоте

- a. Брадикардія, зниження АТ
- b. Тахікардія, підвищення АТ
- c. Тахікардія, зниження АТ**
- d. Аритмія, АТ не змінюється
- e. Брадикардія, підвищення АТ

237. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, раптово розпочалося блювання <<кавовою п

- a. Прикласти медичну грілку на ділянку епігастрія
- b. Застосувати протиблювотні препарати
- c. Прикласти міхур із льодом на ділянку епігастрія**
- d. Промити шлунок
- e. Застосувати ентеросорбенти

238. У пацієнта, який хворіє на дифузний токсичний зоб, спостерігається симптом "телеграфного стовп

- a. Переміжна кульгавість
- b. Ністагм
- c. Тремор всього тіла**
- d. Девіація язика
- e. Атактична хода

239. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження темп

- a. Колапс**

- b. Кардіогенний шок
- c. набряк легень
- d. Астматичний статус
- e. Анафілактичний шок

240. У пацієнта, який хворіє на рак легень, раптово, під час кашлю розпочалося виділення пінистої яє

a. Застосувати помірне охолодження грудної клітки

b. Дати вдихнути пари нашатирного спирту

c. Промити шлунок

d. Провести сліпе зондування

e. Прикласти грілку на грудну клітку

241. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти діб спостерігаються часті рідкі вип

a. Зневоднення (дегідратація)

b. Гіпокальціємія

c. Дефіцит заліза

d. Гіпергідратація (затримка води)

e. Дефіцит вітаміну D

242. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести

a. -

b. Стернальну

c. Плевральну

d. Люмбальну

e. Абдомінальну

243. У пацієнтки віком 25 років за 2 тижні після перенесеного тонзиліту з'явилися різкий біль і прип

a. Гострої ревматичної гарячки

b. Хвороби Рейтера

c. Ревматоїдного артрити

d. Подагри

e. Реактивного артрити

244. У пацієнтки віком 49 років після приймання вітамінного препарату виникли набряк губ та язика, о

a. набряк Квінке

b. Анафілактичний шок

c. Кропив'янка

d. Поліноз

e. набряк легенів

245. У пацієнтки віком 55 років після емоційного перенавантаження з'явилися скарги на головний біль

a. Тиреотоксичний криз

b. Гіпертонічний криз

c. Анафілактичний шок

d. Колапс

e. Кардіогенний шок

246. У пацієнтки віком 60 років після фізичного навантаження виник стискаючий біль за грудниною з ір

a. Стенокардії

b. Міокардиту

c. Гострого перикардиту

d. Інфаркту міокарда

e. Міжреберної невралгії

247. У пацієнтки віком 67 років раптово розвинулися загальна слабкість, запаморочення, оніміння ліво

a. Ішемічного інсульту

b. Геморагічного інсульту

c. Транзиторної ішемічної атаки

d. -

e. Дисциркуляторної енцефалопатії

248. У пацієнтки діагностовано системний червоний вовчак. Вкажіть ключовий метод профілактики заг

a. Запобігання стресу

b. Вживання у їжу йодовмісних продуктів (риба, йодована сіль)

- с. Обмеження фізичної активності
- д. Загартовування (водні процедури)

е. Фотопротекція (обмеження перебування на сонці)

249. У пацієнтки з діагнозом: дифузний токсичний зоб, після важкого емоційного перенавантаження ра

- а. набряк мозку
- б. Гіперглікемічна кома

с. Тиреотоксичний криз

- д. Гіпертензивний криз
- е. Гіпоглікемічна кома

250. У пацієнтки з ожирінням під час обстеження в ділянці живота та стегон виявлено надлишкове, рівн

а. Аліментарно-конституційне

- б. Церебральне
- с. Гіпотиреоїдне
- д. ---

е. Диспластичне

251. У пацієнтки температура тіла швидко, протягом декількох годин, знизилася з 39,5°C до 37°C (крит

- а. 1%-й розчин супрастину
- б. 2%-й розчин дроперідину
- с. 0,2%-й розчин платифіліну

д. 1%-й розчин мезатону

е. 2%-й розчин папаверину

252. У пацієнтки, в якій розвинулося гостре порушення мозкового кровообігу, спостерігається відсутні

а. Центральна геміплегія

- б. Триплегія за центральним типом
- с. Моноплегія за периферичним типом
- д. Периферична геміплегія
- е. Центральний паретез

253. У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після випадкового передозування інсуліну

а. Увести інсулін підшкірно

б. Запропонувати вжити прості вуглеводи (цукор, солодку воду)

- с. Запропонувати прийняти 15-20 крапель корвалолу
- д. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- е. Застосувати нітрогліцерин сублінгвально

254. У пацієнтки перебіг цукрового діабету ускладнився розвитком синдрому діабетичної стопи. Які пора

а. Носити відкрите взуття

б. Не ходити босоніж

- с. Приймати гарячі ванни для ніг
- д. Використовувати тальк
- е. Користуватися пемзою

255. У пологовому будинку новонародженій дитині на 3-й день життя заплановано проведення щеплен

- а. Внутрішньовенно
- б. Підшкірно

с. Внутрішньошкірно

- д. Внутрішньом'язово
- е. Перорально

256. У пологовій залі породіллі запропонували провести перше раннє прикладання дитини до грудей. Ц

- а. Вазопресину
- б. Адренокортикотропного
- с. Хоріонічного гонадотропіну

д. Окситоцину

е. Соматотропіну

257. У породіллі за тиждень після пологів підвищилася температура тіла до 39,0°C, з'явилися біль у н

- а. Перитоніт
- б. Пельвіоперитоніт
- с. Ендометрит

d. Параметрит

e. Сальпінгоофорит

258. У породіллі після народження посліду посилилася кровотеча. Матка м'яка, погано скорочується, пі

a. Огляд пологових шляхів

b. Зовнішній масаж матки

c. Масаж матки на кулаці

d. Ручна ревізія порожнини матки

e. Введення токолітичних препаратів

259. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри промежи

a. -

b. II

c. I

d. IV

e. III

260. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата

a. Розрив шийки матки

b. Розрив промежини

c. Порушення згортальної системи крові

d. Затримка частин плаценти в порожнині матки

e. Розрив матки

261. У пульмонологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: бронхоектатична хвороба. Яку про

a. Парафінові аплікації

b. Зігрівальні компреси

c. Фонофорез

d. Кріотерапія

e. Постуральний дренаж

262. У роділлі під час перебігу першого періоду пологів з'явилися кров'яністі виділення зі статевих

a. Прийоми Леопольда-Левицького

b. Вимірювання висоти стояння дна матки

c. Пальцеве дослідження ділянки внутрішнього вічка

d. Ультразвукове дослідження

e. Огляд шийки матки за допомогою гінекологічних дзеркал

263. У роділлі триває латентна фаза першого періоду фізіологічних пологів. Пологи I, вагітність II,

a. Електрокардіографія

b. Електроміографія

c. Сцинтиграфія

d. Ультрасонографія

e. Кардіотокографія

264. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності - 39 тиж

a. Кожні 30 хв

b. Кожні 15 хв

c. Раз на 1 год

d. 3 інтервалом 10 хв

e. 3 інтервалом 20 хв

265. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період пологів. Під час прорізування голівки післ

a. Продовжити очікувальну тактику

b. Провести епізіотомію під місцевим знеболенням

c. Провести кесарів розтин

d. Провести плодоруйнівну операцію

e. Забезпечити стимулювання пологів

266. У семирічній дитини після внутрішньовенного введення антибіотика з'явилися слабкість, пульсуюч

a. Змішаного

b. Гемодинамічного

c. Абдомінального

d. Церебрального

**е. Асфіктичного**

267. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість

- a. Гіпотрофії
- b. Гіпервітамінозу D

**с. Рахіту**

- d. Спазмофілії
- e. Алергічного діатезу

268. У тримісячної дитини спостерігається неспокій, плаксивість, порушення сну, підвищена пітливість

- a. Спазмофілії
- b. Гіпотрофії
- c. Алергічного діатезу

**d. Рахіту**

- e. Гіпервітамінозу D

269. У тяжкохворого лежачого пацієнта на шкірі п'яток та ліктів виявлено зону стійкої гіперемії, ціл

- a. -
- b. II
- c. III
- d. IV

**e. I**

270. У чоловіка виявлено відкритий перелом середньої третини лівого стегна. Із рани пульсуючим струм

- a. Туга тампонада рани

**b. Накладання артеріального джгута**

- c. Підвищене положення кінцівки
- d. Максимальне згинання кінцівки в суглобі
- e. Тиснуча пов'язка

271. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи спостерігаються гіперемія шкіри та поява дріб

- a. Імпетиго
- b. Мікроспорії
- c. Фурункулу
- d. Кандидозу

**e. Сикозу**

272. У чоловіка віком 54 роки спостерігається головний біль, шум у вухах, запаморочення та стійке пі

- a. Серцева астма
- b. Стенокардія

**с. Артеріальна гіпертензія**

- d. Ішемічний інсульт
- e. Інфаркт міокарда

273. У чоловіка віком 58 років, який хворіє на цироз печінки, раптово з'явилися такі симптоми: збудж

- a. Перфорація
- b. Пенетрація
- c. Бактеріальний перитоніт

**d. Печінкова кома**

- e. Шлункова кровотеча

274. У чоловіка віком 62 роки після стресу раптово розвинулися загальна слабкість, прискорене серцеб

- a. Напад стенокардії
- b. Міокардит
- c. Печінкова коліка

**d. Інфаркт міокарда**

- e. Набряк легень

275. У чоловіка віком 65 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово розвинувся напад задишк

**a. Набряку легень**

- b. Бронхіальної астми
- c. Туберкульозу
- d. Інфаркту міокарда
- e. Серцевої астми

276. У чоловіка з діагнозом: недостатність мітрального клапана, після фізичного навантаження раптово

- a. Астматичний статус
- b. Гіпертонічний криз
- c. Серцева астма
- d. Легенева кровотеча

e. Набряк легень

277. У чоловіка після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці

a. ---

b. Напад ниркової кольки

- c. Гостра затримка сечі
- d. Напад жовчної кольки
- e. Харчове отруєння

278. У чоловіка розвинувся напад задишки з різко утрудненим видихом, відчуття стиснення за грудиною

- a. Напад ниркової кольки
- b. Напад ларингостенозу

c. Напад бронхіальної астми

- d. Набряк Квінке
- e. Напад серцевої астми

279. У чоловіка через декілька годин після вживання неякісної їжі з'явилися біль у животі, блювання,

a. Гострий гастрит

- b. Гострий апендицит
- c. Гострий панкреатит
- d. Виразкова хвороба шлунка
- e. Кишкова непрохідність

280. У чоловіка, якого вжалила бджола, через декілька хвилин на шкірі тулуба з'явився висип у вигляді

- a. Смекта, ентеросгель
- b. Ацетилсаліцилова кислота, аспаркам
- c. Фуросемід, гіпотіазид

d. Супрастин, тавегіл

e. Дигоксин, корглікон

281. У чотирирічної дитини на шкірі тулуба виявлено висипання у вигляді поодиноких розеол, папул із

- a. Бульозна
- b. Пустульозна
- c. Типова
- d. Вісцеральна

e. Рудиментарна

282. У чотирирічної дитини спостерігаються напади спазматичного кашлю з репризами. Який матеріал

- a. Промивні води бронхів
- b. Змиви із носоглотки
- c. Промивні води шлунку

d. Слиз методом <<кашльових пластинок>>

e. Мокротиння

283. У юнака віком 20 років після укусу бджоли з'явилися: щільний набряк повік і губ, захриплість го

a. Кропив'янка

b. Набряк Квінке

- c. Астматичний стан
- d. Анафілактичний шок
- e. Синдром Лайєлла

284. У якому віці згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні проводиться четверте щеплен

- a. 6 місяців
- b. 12 місяців
- c. 6 років
- d. 3 роки

e. 18 місяців

285. У якому положенні має перебувати пацієнт протягом перших 2-х год після проведення люмбальної

а. Позиції Сімса

**б. Лежачи на животі**

с. Лежачи на спині

д. Позиції Фаулера

е. Позиції Тренделенбурга

286. У якій зоні централізованого стерилізаційного відділення проводиться комплектація, пакування та

а. Стерильній

**б. Чистій**

с. Брудній

д. Реєстраційній

е. Режимній

287. У якій лабораторії проводиться дослідження носоглоткових змивів на грип та ГРВІ?

а. Бактеріологічній

б. Клінічній

с. Біохімічній

**д. Вірусологічній**

е. Імунологічній

288. Укажіть ЕКГ-ознаки, що характерні для нападу стенокардії.

а. Високі зубці Р

б. Низький вольтаж комплексу QRS

**с. Високий, гострий зубець Т, сегмент ST нижче ізолінії**

д. Дугоподібний сегмент ST над ізолінією

е. Глибокий і широкий зубець Q

289. Укажіть дозволений максимальний відсоток заповнення ємності (коробки безпечного зберігання) д

а. 55%

**б. 75%**

с. 45%

д. 60%

е. 50%

290. Укажіть ділянку локалізації набряку Квінке, що є потенційно небезпечним для життя.

а. Повіки

б. Губи

**с. Гортань**

д. Статеві органи

е. Вушні раковини

291. Укажіть механізм дії медичної грілки у разі її місцевого застосування.

**а. Розширення (вазодилатація) судин шкіри та нижчeroзташованих тканин**

б. Звуження (вазоконстрикція) судин шкіри та нижчeroзташованих тканин

с. Уповільнення обмінних процесів

д. Дезінфекція та підсушування ушкоджених ділянок шкіри

е. Збільшення напруги м'язів

292. Укажіть надостовірніший метод діагностики вагітності на ранніх термінах.

а. Огляд шийки матки в дзеркалаx

**б. Дослідження хоріонічного гонадотропіну в крові**

с. Кольпоскопія

д. Зовнішнє акушерське обстеження

е. Бімануальне обстеження

293. Укажіть найнебезпечніше ускладнення, що може розвинутиx в пацієнта під час блювання.

а. Печія

б. Метеоризм

с. Відрижка повітрям

д. Відрижка шлунковим вмістом

**е. Аспірація шлункового вмісту**

294. Укажіть найпоширеніше ускладнення, що є наслідком гострої ревматичної гарячки.

**а. Набуті вади серця**

- b. Артеріальна гіпертензія
- c. Пароксизмальна тахікардія
- d. Розшарування аорти
- e. Гострий коронарний синдром

295. Укажіть найінформативніший метод діагностики набутих вад серця.

- a. Ангіографія
- b. Ехокардіографія**

- c. Спірометрія
- d. Пульсоксиметрія
- e. Реовазографія

296. Укажіть необхідне оснащення точки догляду за пацієнтом.

- a. Диспенсер із паперовими одноразовими рушниками
- b. Умивальник

**c. Диспенсер з антисептиком**

- d. Кран із ліктьовим механізмом
- e. Диспенсер із рідким милом

297. Укажіть оптимальну температуру води для проведення очисної клізми пацієнту з атонічним закрепом.

- a. 18-20°C**
- b. 38-40°C
- c. 28-32°C
- d. 37-38°C
- e. 25-30°C

298. Укажіть основний синдром, що характерний для перебігу початкового періоду скарлатини.

- a. Бронхообструктивний
- b. Диспептичний
- c. Геморагічний
- d. Менінгеальний

**e. Інтоксикаційний**

299. Укажіть особливості приймання ферментних препаратів.

- a. За 2 год до вживання їжі
- b. Через 2 год після вживання їжі
- c. Натщесерце

**d. Під час вживання їжі**

- e. Через 1 год після вживання їжі

300. Укажіть показання до застосування міхура з льодом.

**a. Внутрішні кровотечі**

- b. Трофічні ураження шкіри
- c. Спастичний біль
- d. Перший період гарячки
- e. Гостра затримка сечі

301. Укажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

a. Порушення виділення плаценти

**b. Затримка частин плаценти в порожнині матки**

- c. Порушення зсідання крові
- d. Щільне прикріплення плаценти
- e. Защемлення плаценти

302. Укажіть процедуру, що використовується для лікування хронічної хвороби нирок, під час якої кров

**a. Перитонеальний діаліз**

- b. Трансплантація нирок
- c. Цистоскопія
- d. Урографія
- e. Гемодіаліз

303. Укажіть ранній симптом цукрового діабету.

- a. Анорексія
- b. Анурія

- c. Ейфорія
- d. Депресія

**e. Полідипсія**

304. Укажіть ранній і характерний симптом ураження мозкових оболонок.

- a. Падалки
- b. Пастернацького

**c. Керніга**

- d. Ортнера
- e. Грефе

305. Укажіть специфічну лабораторну ознаку системного червоного вовчака.

- a. Диспротеїнемія

**b. Наявність LE-клітин**

- c. Підвищення рівня С-реактивного білка
- d. Нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво
- e. Прискорення ШОЕ

306. Укажіть сучасний метод дослідження стану легень, що використовується для визначення функції зовнішнього дихання.

- a. Велоергометрія

**b. Спірометрія**

- c. КТ легень
- d. Пульсоксиметрія
- e. УЗД легень

307. Укажіть типове ускладнення інтерстиціальної пневмонії.

- a. Емфізема легень

**b. Пневмосклероз**

- c. Легенева кровотеча
- d. Бронхіальна астма
- e. Кардіосклероз

308. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути в пацієнта під час внутрішньовенного введення гідрохлориду морфіну.

- a. Брадикардія
- b. Закреп
- c. Порушення зору
- d. Сонливість

**e. Відчуття жару в тілі**

309. Укажіть інгаляційний лікарський засіб, що застосовується для надання невідкладної медичної допомоги при бронхоспазмі.

- a. Амброксол
- b. Ацетилцистеїн

**c. Сальбутамол**

- d. Тобрамцін
- e. Лібексин

310. Укажіть інструментальний ендоскопічний метод дослідження прямої та сигмоподібної кишок.

- a. Іригоскопія
- b. Колоноскопія
- c. Фіброгастроскопія
- d. Холангіографія

**e. Ректороманоскопія**

311. Упродовж якого терміну часу потрібно провести обстеження на ВІЛ медичного працівника, у якого підозрюють інфекцію?

- a. 3-х місяців
- b. 14-ти днів

**c. 5-ти днів**

- d. 1-го місяця
- e. 2-х місяців

312. Ускладненням якого захворювання є кретинізм?

- a. Нецукрового діабету
- b. Хвороби Іценко-Кушинга
- c. Цукрового діабету

**d. Вродженого гіпотиреозу**

e. Хвороби Аддісона

313. Чим треба насамперед промити рану після укусу собаки до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

a. 10% розчином натрію хлориду

**b. Мильним розчином**

c. ---

d. Розчином фурациліну

e. Розчином бетадину

314. Чоловік віком 45 років після емоційного перенапруження раптом відчув різкий головний біль, спос

a. Транзиторного порушення мозкового кровообігу

**b. Субарахноїдального крововиливу**

c. Геморагічного інсульту

d. Дисциркуляторної енцефалопатії

e. Ішемічного інсульту

315. Чоловік віком 45 років скаржиться на різкий біль у потиличній ділянці голови, запаморочення, шу

a. Анальгін

b. Адреналін

c. Кордіамін

**d. Магнію сульфат**

e. Димедрол

316. Чоловік віком 50 років скаржиться на загальну слабкість, свербіння шкіри, тупий ниючий біль у п

a. Хронічного холецистити

**b. Цирозу печінки**

c. Жовчнокам'яної хвороби

d. Хронічного гепатиту

e. Вірусного гепатиту

317. Чоловік віком 50 років скаржиться на різкий, інтенсивний, стискаючий біль за грудиною з іррадіа

a. Q-інфаркт міокарда, аритмічна форма

b. Q-інфаркт міокарда, астматична форма

**c. Q-інфаркт міокарда, ангінозна форма**

d. Q-інфаркт міокарда, гастралгічна форма

e. ---

318. Чоловік віком 52 роки скаржиться на сильний оперізувальний біль у верхній половині живота, нудос

a. Аналіз крові на глюкозу

**b. Аналіз крові на  $\alpha$ -амілазу**

c. Дуоденальне зондування

d. Загальний аналіз сечі

e. Аналіз калу на приховану кров

319. Чоловік віком 54 роки скаржиться на гіркоту в роті та тупий ниючий біль у правому підребер'ї, щ

a. Гострого гепатиту

b. Гострого панкреатиту

**c. Гострого холецистити**

d. Гострого коліту

e. Гострого гастриту

320. Чоловік віком 54 роки скаржиться на зниження апетиту, біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття

a. Хронічного гастриту

b. Жовчнокам'яної хвороби

**c. Цирозу печінки**

d. Хронічного панкреатиту

e. Хронічного холецистити

321. Чоловік віком 58 років із тривалим рецидивним перебігом виразкової хвороби шлунку скаржиться н

a. Шлункова кровотеча

**b. Малігнізація**

c. Пілоростеноз

d. Пенетрація

е. Перфорація

322. Чоловік віком 79 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на озноб, пітливість, с

а. Пневмонії

**б. Інфаркту міокарда**

с. Артеріальної гіпертензії

д. Стенокардії

е. Серцевої астми

323. Чоловік після тряскої їзди скаржиться на сильний нападоподібний біль у поперековій ділянці та ч

а. Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку

б. Увести седативні препарати

**с. Покласти грілку на поперекову ділянку**

д. Провести катетеризацію сечового міхура

е. Увести сечогінні препарати

324. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний б

а. Оглядовий рентген-знімок черевної порожнини

**б. Колоноскопія**

с. Комп'ютерна томографія

д. УЗД

е. Іригоскопія

325. Чоловік скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та різкий розпираючий біль у д

а. Дерматофітії

**б. Карбункулу**

с. Контагіозного молюска

д. Бешихи

е. Фурункулу

326. Чоловік скаржиться на раптову появу висипу на шкірі та свербіж після вживання полуниці. Під час

а. набряк Квінке

**б. Кропив'янка**

с. Короста

д. Геморагічний васкуліт

е. Анафілактичний шок

327. Чоловік скаржиться на сильний біль у поперековій ділянці та часті позиви до сечовипускання, нуд

а. Холод на поперекову ділянку

б. Уведення спазмолітичних препаратів

с. Уведення сечогінних препаратів

д. Уведення знеболювальних засобів

**е. Тепло на поперекову ділянку**

328. Чоловік упродовж 10-ти років хворіє на дерматологічне захворювання, що загострюється в осінньо

а. Сухої себореї

б. Червоного плоского лишая

с. Нейродерміту

**д. Псоріазу**

е. Системного червоного вовчака

329. Чоловік, який хворіє на гіпертонічну хворобу, після емоційного перенавантаження раптово втратив

а. На спині, з піднятим нижнім кінцем ліжка

б. На животі, з повернутою на бік головою

с. На лівому боці, з відхиленою назад головою

**д. На спині, з піднятим головним кінцем ліжка**

е. На правому боці, з відхиленою назад головою

330. Чоловіка, у якого через 1,5 год після вживання грибів виникли нудота, блювання та різка слабкіс

а. Підкладне судно

б. Газовивідну трубку

с. Апарат Боброва

д. Тонометр Короткова

**е. Кухоль Есмарха**

331. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичн

- a. Голку Касирського
- b. Троакар
- c. Біопсійну голку
- d. Голку Дюфо
- e. Голку Біра

332. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фам

- a. Спазмолітична
- b. Антисекреторна
- c. Антигістамінна
- d. Бактерицидна
- e. Бактеріостатична

333. Чоловіку віком 40 років встановлено попередній діагноз: геморагічний інсульт. У якому положенні

- a. На правому боці
- b. На спині, з припіднятою головою
- c. На спині, з припіднятими нижніми кінцівками
- d. Сидячи
- e. На животі, з підкладеним під грудну клітку валиком

334. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться введенням вакцини БЦЖ внутрішн

- a. &lt;&lt;Холодний абсцес&gt;&gt;
- b. Ліподистрофія
- c. Інфільтрат
- d. Виразка
- e. Олійна емболія

335. Що з нижченаведеного відноситься до медичних відходів категорії В?

- a. Побутові відходи усіх відділень закладу охорони здоров'я
- b. Первинна упаковка лікарських засобів
- c. Дезінфекційні засоби
- d. Використаний одноразовий шприц
- e. Харчові відходи усіх відділень закладу охорони здоров'я

336. Як називається виробничий фактор, вплив якого призводить до погіршення стану здоров'я і зниже

- a. Допустимий
- b. Оптимальний
- c. Шкідливий
- d. ---
- e. Небезпечний

337. Як називається графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за

- a. Кардіограма
- b. Токограма
- c. Партограма
- d. Міограма
- e. Спірограма

338. Як називається графічний запис вимірювання висоти стояння дна матки (ВДМ) з метою динамічног

- a. Кардіограма
- b. Токограма
- c. Міограма
- d. Партограма
- e. Гравідограма

339. Як називається метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура?

- a. Бронхоскопія
- b. Цистоскопія
- c. Езофагогастродуоденоскопія
- d. Колоноскопія
- e. Ректороманоскопія

340. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться д

a. Спірографія

b. Бронхоскопія

c. УЗД легень

d. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки

e. Шкірні алергологічні тести

341. Як називається патологічний стан, що розвивається як ускладнення бронхіальної астми та характерно для неї?

a. Легенева кровотеча

b. Астматичний статус

c. Анафілактичний шок

d. набряк легень

e. Кардіогенний шок

342. Як називається патологічний стан, що характеризується болем у суглобі та не супроводжується запаленням?

a. Артрит

b. Поліартрит

c. Артроз

d. Арталгія

e. Полікістоз

343. Як називається порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі?

a. Ніктурія

b. Олігурія

c. Полакіурія

d. Дизурія

e. Поліурія

344. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки?

a. Гістероскопія

b. Гідротубація

c. Пертубація

d. Кольпоскопія

e. Лапароскопія

345. Як називається розмір площини входу в малий таз, що проходить між крижовим мисом та середніми крижовими хребцями?

a. ---

b. Інтерспінальний

c. Прямий

d. Косий

e. Поперечний

346. Як називається спеціалізований медичний заклад стаціонарного типу, де проводиться паліативне лікування?

a. Амбулаторія

b. Поліклініка

c. Хоспіс

d. Санаторій

e. Клініка

347. Як називається спосіб комунікації, пов'язаний з використанням слів (мови) для передачі інформації?

a. Дистанційна

b. Офіційна

c. Виховна

d. Невербальна

e. Вербальна

348. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пацієнта в лікарні?

a. Листок лікарських призначень

b. Консультативний висновок спеціаліста

c. Температурний листок

d. Журнал обліку процедур

e. Реєстраційна генетична карта

349. Як називається шлях передачі інфекції, що може бути пов'язаний із проведенням інвазивних лікувальних процедур?

a. Артифіційний

- b. Вертикальний
- c. Рановий
- d. Контактно-побутовий
- e. Аліментарний

350. Як називається індивідуальна упаковка, що безпосередньо контактує з лікарським засобом та спри

a. Загальна

b. Первинна

c. Зовнішня

d. Спеціальна

e. Вторинна

351. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для проведення щеплення БЦЖ?

a. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя

b. Передня поверхня стегна

c. Підлопаткова ділянка

d. Верхній зовнішній квадрант сідниці

e. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча

352. Яка група лікарських засобів використовується для етіологічного лікування гострого пієлонефриту?

a. Ентеросорбенти

b. Жовчогінні

c. Антациди

d. Нітрофурани

e. Ферменти

353. Яка група лікарських засобів застосовується для лікування рухових порушень після травми мозку?

a. Антихолінестеразні

b. Антиконвульсанти

c. Кортикостероїди

d. Ноотропи

e. Міорелаксанти

354. Яка група лікарських препаратів використовується для етіотропного лікування госпітальної (нозоск

a. Жарознижувальні

b. Бронхолітики

c. Відхаркувальні

d. Седативні

e. Антибіотики

355. Яка дія електричного струму проявляється у подразненні та збудженні тканин організму людини?

a. Термічна

b. Біологічна

c. Механічна

d. ---

e. Електролітична

356. Яка з наведених нижче груп лікарських засобів використовується для лікування алергічних захворю

a. Антигістамінні

b. Антидепресанти

c. Антациди

d. Антагоністи кальцію

e. Антиагреганти

357. Яка контрастна речовина використовується для ректального введення під час рентгенологічного о

a. Верографін

b. Біліграфін

c. Холевід

d. Барію сульфат

e. Уротраст

358. Яка кровотеча супроводжується виділенням яскраво-червоної пінистої крові під час кашлю?

a. ---

b. Носова

с. Легенева

d. Шлункова

е. Кишкова

359. Яка окружність талії в чоловіків асоціюється з високим ризиком розвитку артеріальної гіпертензії

a. 90 см

b. 88 см

с. 102 см

d. 60 см

е. 75 см

360. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу

a. NIHSS

b. FAST

с. MMSE

d. NRS

е. ABCDE

361. Яке додаткове обстеження треба провести пацієнту для виявлення конкрементів у нирках?

a. Іригоскопію

b. УЗД

с. Бронхоскопію

d. Ректороманоскопію

е. Холецистографію

362. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики ішемічної хвороби серця

a. Спірографія

b. Нейроміографія

с. Велоергометрія

d. Аудиометрія

е. Енцефалографія

363. Яке захворювання нирок характеризується наявністю таких клінічних проявів: артеріальна гіпертензія, набряки, анемія, нудота, блювота, сеча з кров'ю

a. Хронічна ниркова недостатність

b. Сечокам'яна хвороба

с. Хронічний пієлонефрит

d. Гострий гломерулонефрит

е. Гостра ниркова недостатність

364. Яке положення тіла потрібно надати шестирічній дитині, у якої після введення антибіотика розвинувся набряк

a. На животі

b. На лівому боці

с. На спині, з повернутою на бік головою

d. Напівсидяче

е. На спині, з припіднятими ногами

365. Яке скринінгове дослідження призначається пацієнтам, які хворіють на хронічну хворобу нирок, для виявлення ускладнень

a. Ультразвукове дослідження органів сечостатевої системи

b. Визначення нічного діурезу

с. Визначення швидкості клубочкової фільтрації

d. Виявлення формених елементів у сечі

е. Визначення концентрації сечі

366. Яке специфічне місцеве ускладнення інсулінотерапії виникає у разі введення інсуліну в одне й те ж місце

a. Інфільтрат

b. Абсцес

с. Некроз

d. Ліподистрофія

е. Гематома

367. Яке співвідношення розчинника та активної речовини антибіотика використовується у разі стандартного тесту на чутливість

a. 1 мл на 100 000 ОД

b. 5 мл на 100 000 ОД

с. 2 мл на 200 000 ОД

d. 2 мл на 100 000 ОД

е. 1 мл на 500 000 ОД

368. Яке ускладнення може розвинутися в пацієнта під час проведення абдомінальної пункції у разі шви

а. Шлункова кровотеча

**b. Колапс**

с. Ушкодження внутрішніх органів

d. Блювання

е. Пневмоторакс

369. Яке ускладнення може розвинутися в пацієнта у разі безконтрольного приймання адреноміметиків

а. Пневмоторакс

b. Серцева астма

с. Пневмонія

**d. Астматичний статус**

е. Набряк легень

370. Яке ускладнення розвивається внаслідок потрапляння олійного розчину в просвіт судини під час в

а. Абсцес

**b. Жирова емболія**

с. Гематома

d. Інфільтрат

е. Алергічна реакція

371. Яке ускладнення розвивається як наслідок ревматоїдного артрити?

а. Адинамія

b. Астенія

с. Гарячка

d. Невралгія

**е. Анкілоз**

372. Який біологічний матеріал використовується для первинного діагностичного тесту на виявлення л

**a. Кал**

b. Слина

с. Ексудат

d. Кров

е. Сеча

373. Який вигляд мокротиння характерний для раку легень?

а. Пінисте рожеве

**b. <<Малинового желе>>**

с. Склоподібне

d. <<Іржаве>>

е. <<Перлинне>>

374. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

а. За Вишневським

b. Інфільтраційна

с. Внутрішньокісткова

d. Термінальна

**е. За Оберстом-Лукашевичем**

375. Який вид гастриту (за характером патологічних змін слизової оболонки шлунка) може розвинутися

а. Катаральний

b. Флегмонозний

с. Еритематозний

d. Фібринозний

**е. Корозивний**

376. Який вид пов'язки використовується для фіксації кінцівки у разі перелому ключиці без зсуву улам

а. Колосоподібна

b. Т-подібна

с. Циркулярна

d. Черепашача

е. Дезо

377. Який етіологічний фактор має вирішальне значення у розвитку гострого гломерулонефриту?

- а. Споживання гострої та жирної їжі
- б. Аутоімунні захворювання

с. Інфікування beta-гемолітичним стрептококом

- д. Професійні інтоксикації
- е. Порушення обміну речовин

378. Який засіб контрацепції використовується для запобігання незапланованої вагітності та інфікуван

- а. Внутрішньоматкова спіраль

б. Презерватив

- с. Шийковий ковпачок
- д. Сперміциди
- е. Хірургічна стерилізація

379. Який збудник найчастіше спричиняє розвиток післяпологового маститу?

- а. Протей
- б. Стрептокок
- с. Епідермальний стафілокок
- д. Анаеробні коки

е. Золотистий стафілокок

380. Який лікарський засіб використовується для замісної терапії у разі недостатності зовнішньосекре

а. Панкреатин

- б. Активоване вугілля
- с. Платифілін
- д. Папаверин
- е. Метоклопрамід

381. Який лікарський засіб використовується для надання невідкладної допомоги пацієнту у разі виникн

- а. Клофелін
- б. Строфантин
- с. Папаверин

д. Кордіамін

- е. Фуросемід

382. Який лікарський засіб використовується у разі консервативного лікування тиреотоксикозу для при

- а. Глюкоза
- б. Новокаїн
- с. Інсулін

д. Мерказоліл

- е. Преднізолон

383. Який лікарський засіб, що пригнічує агрегацію тромбоцитів, застосовується на догоспітальному ет

а. Ацетилсаліцилова кислота

- б. Гепарин
- с. Бісопрол
- д. Нітрогліцерин
- е. Ніфедипін

384. Який лікарський препарат використовується насамперед під час надання невідкладної медичної до

а. Епінефрин

- б. Атропін
- с. Еритроміцин
- д. Ампіцилін
- е. Диклофенак

385. Який метод дослідження використовується для діагностики лейкозів?

- а. Загальний аналіз сечі
- б. Біохімічний аналіз крові

с. Стернальна пункція

- д. Імунологічний аналіз крові
- е. Коагулограма

386. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної функції нирок?

- a. За Нечипоренко
- b. За Аддіс-Каковським
- c. ---
- d. За Амбурже

e. За Зимницьким

387. Який метод діагностики використовується для визначення прохідності вінцевих артерій?

- a. Коронарографія
- b. Ехокардіографія
- c. Електрокардіографія
- d. Пневмотахометрія
- e. Електроенцефалографія

388. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для в

- a. Візуальний
- b. Фізичний

c. Бактеріологічний

- d. Інструментальний
- e. Хімічний

389. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується у II періоді гарячки

- a. Зігрівальний компрес
- b. Гірчичники
- c. Медичні банки

d. Міхур із льодом

e. Медичну грілку

390. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної оброб

a. 3 мл

- b. 1 мл
- c. 9 мл
- d. 6 мл
- e. 5 мл

391. Який препарат із групи нейролептиків використовується у пацієнтів з діагнозом: шизофренія, для

- a. Натрію оксидутират
- b. Димедрол

c. Аміназин

- d. Налоксон
- e. Пірацетам

392. Який прилад використовується для моніторингу інтенсивності бактерицидного потоку ультрафіоле

a. Гігрометр

b. Радіометр

- c. Динамометр
- d. Барометр
- e. Вольтметр

393. Який режим фізичної активності необхідно забезпечити пацієнту, в якого спостерігається активна

a. Ліжковий

- b. Активний
- c. Палатний
- d. Кімнатний
- e. Загальний

394. Який розмір периферичного венозного катетера переважно використовується для внутрішньовенн

- a. 14G
- b. 16G
- c. 20G
- d. 18G
- e. 26G

395. Який розчин використовується для промивання постійного катетера Фолея?

a. 0,02% р-н фурациліну

b. 5% р-н глюкози

c. 3% р-н хлораміну

d. 6% р-н перекису водню

e. 2% р-н натрію гідрокарбонату

396. Який симптом найхарактерніший для хронічного гастриту з підвищеною секреторною функцією шлунка?

a. Метеоризм

b. Гикавка

c. Дисфагія

d. Печія

e. Діарея

397. Який симптом є часто позитивним у разі захворювань нирок?

a. Ортнера

b. Бабінського

c. Пастернацького

d. Щоткіна-Блюмберга

e. Кера

398. Який спеціальний інструмент треба підготувати сестрі медичній для аспіраційної біопсії слизової оболонки шлунка?

a. Скальпель

b. Пінцет

c. Пайпель

d. Корцанг

e. Конхотом

399. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

a. Іктеричність шкіри

b. Свербіж шкіри

c. Сльозотеча

d. Ціаноз шкіри

e. Мерзлякуватість

400. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для нападу бронхіальної астми?

a. Крепітація

b. Експіраторна задишка

c. Біль у грудній клітці

d. Інспіраторна задишка

e. Шум тертя плеври

401. Який тип мінеральної води треба порекомендувати вживати пацієнту, у якого під час обстеження виявлено підвищення рівня кальцію в крові?

a. Гідрокарбонатну (лужну)

b. Сульфатну

c. Хлоридну

d. Сірководневу

e. Вуглекислу

402. Який шлях передачі інфекції в закладах охорони здоров'я відноситься до артифіційних?

a. Асоційований із медичними процедурами

b. Повітряно-краплинний

c. Контактно-побутовий

d. Фекально-оральний

e. Вертикальний

403. Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший для діагностики туберкульозу легень?

a. Стернальна пункція

b. Спірометрія

c. Біохімічний аналіз крові

d. Рентгенографія органів грудної клітки

e. Загальний аналіз крові

404. Який із нижченаведених клінічних проявів характерний для передлежання плаценти?

a. Гострий біль у проекції локалізації плаценти, дистрес-синдром у плода

b. Тахікардія, підвищення артеріального тиску

c. Кровотеча зі статевих шляхів (часто повторна), що не супроводжується больовим синдромом

d. Прискорення серцебиття у плода

e. Гіпертонус матки, больовий синдром

405. Який із нижченаведених методів дослідження використовується для визначення видільної функції

a. Екскреторна (внутрішньовенна) урографія

b. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

c. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

d. Аналіз сечі за методом Нечипоренка

e. Загальноклінічний аналіз сечі

406. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим у діагностиці бронхоектатич

a. Велоергометрія

b. Ларингоскопія

c. Бронхографія

d. Бронхіальна артеріографія

e. Спірометрія

407. Який із нижченаведених симптомів характерний для перебігу гострого пієлонефриту в дітей перш

a. Кашель

b. Закреп

c. Гіпертензія

d. Блювання

e. Задишка

408. Який із нижченаведених факторів забезпечує швидкість появи терапевтичного ефекту у разі сублі

a. Біохімічний склад слини

b. Інтенсивна васкуляризація під'язикового простору

c. Біологічна доступність препаратів

d. Склад (діюча речовина та допоміжні речовини) препаратів

e. pH слини

409. Який із нижченаведених чинників належить до немодифікованих (незмінних) факторів ризику розв

a. Стрес

b. Гіперліпідемія

c. Ожиріння

d. Гіподинамія

e. Вік

410. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку виразкової хвороби?

a. Ожиріння

b. Переохолодження

c. Молодий вік

d. Стрес

e. Алергени

411. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку хронічного бронхіту?

a. Надлишкова маса тіла

b. Недотримання режиму харчування

c. Малорухливий спосіб життя

d. Активне і пасивне куріння

e. Зловживання алкоголем

412. Яким способом проводиться дренажування плевральної порожнини для видалення повітря у разі пне

a. По Суботіну

b. По Бюлау

c. Стрічковим дренажем

d. Мікроіригатором

e. Трубчастим дренажем

413. Які заходи (дії) треба включити сестрі медичній у план догляду за пацієнтом з геморагічним інсу

a. Зняття ЕКГ

b. Уведення анальгетиків

- с. Уведення протиблювотних засобів
- д. Промивання шлунку

е. Профілактику гіпостатичної пневмонії

414. Які клінічні прояви найхарактерніші для гострого пієлонефриту?

- а. Гіпертензія, набряки
- б. Гарячка, біль у поперековій ділянці
- с. Анурія, свербіж шкіри
- д. Тахікардія, сеча кольору <<м'ясних помиїв>>
- е. ---

415. Які клінічні прояви найхарактерніші для системної склеродермії?

- а. Параорбітальний набряк із пігментацією
- б. Еритематозна висипка на обличчі у вигляді <<метелика>>
- с. Кільцеподібна еритема на руках і тулубі
- д. Маскоподібне обличчя, рот у вигляді <<кисету>>
- е. Деформації пальців рук у вигляді <<плавників моржа>>

416. Які клінічні прояви нацхарактерніші для гострого гломерулонефриту?

- а. Гіпертензія, набряки
- б. Гіпотензія, біль у поперековій ділянці
- с. Гарячка, часте і болісне сечовипускання
- д. Гіпертермія, гіпотензія
- е. Анурія, свербіж шкіри

417. Які лікарські засоби відносяться до списку <<Б>>?

- а. Отруйні
- б. Психотропні
- с. Імунобіологічні
- д. Наркотичні
- е. Сильнодіючі

418. Які лікарські засоби застосовуються впродовж усього життя як замісна терапія пацієнтам після ст

- а. Антидепресанти
- б. Тиреоїдні гормони
- с. Антибіотики
- д. Транквілізатори
- е. Наркотичні анальгетики

419. Які лікарські засоби найчастіше викликають медикаментозну алергію?

- а. Ентеросорбенти
- б. Антибіотики
- с. Сечогінні
- д. Гіпотензивні
- е. Проносні

420. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

- а. Температура тіла
- б. Частота та ритмічність пульсу
- с. Серцебиття плода
- д. Частота, тривалість та інтенсивність перейм
- е. Артеріальний тиск

421. Які продукти треба обмежити в раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота те метеоризм?

- а. Каву, міцний чай
- б. Яйця, гречану крупу
- с. Капусту, бобові
- д. М'ясо, печінку
- е. Яблука, гарбуз

422. Які продукти треба обмежити в харчовому раціоні пацієнта, у якого виявлено здуття живота та ме

- а. Капусту, бобові
- б. М'ясо, печінку
- с. Яйця, гречану крупу

d. Каву, міцний чай

e. Яблука, гарбуз

423. Які процедури треба порадити пацієнту після зняття гіпсової пов'язки для відновлення функції тр

a. УФО

b. Гірудотерапію

c. Зігрівальний компрес

d. ЛФК, масаж

e. Фототерапію