

1. Існує багато ефективних методів управління конфліктними ситуаціями в трудовому колективі. Які з них?
- a. Внутрішньоособові
 - b. Персональні
 - c. Структурні
 - d. Міжособові
 - e. -
2. Існує багато ефективних методів управління конфліктними ситуаціями в трудовому колективі. Які з них?
- a. Персональні
 - b. Внутрішньоособові
 - c. -
 - d. Міжособові
 - e. Структурні
3. Бойовий медик надає допомогу пораненим під час бойових дій. У якій зоні надання допомоги він може надавати допомогу?
- a. Тільки в зеленій
 - b. Червоній або зеленій
 - c. Жовтій або зеленій
 - d. Червоній або жовтій
 - e. Тільки в червоній
4. Бойовий медик надає допомогу пораненим під час бойових дій. У якій зоні надання допомоги він може надавати допомогу?
- a. Тільки в зеленій
 - b. Червоній або зеленій
 - c. Червоній або жовтій
 - d. Жовтій або зеленій
 - e. Тільки в червоній
5. В операційному блоці, де чіткий розподіл повноважень є критично важливим для безпеки пацієнтів, існує багато методів управління конфліктними ситуаціями. Який з них є найефективнішим?
- a. -
 - b. Поступливість
 - c. Роз'яснення
 - d. Переговори
 - e. Консенсус
6. В операційному блоці, де чіткий розподіл повноважень є критично важливим для безпеки пацієнтів, існує багато методів управління конфліктними ситуаціями. Який з них є найефективнішим?
- a. Переговори
 - b. Роз'яснення
 - c. Консенсус
 - d. -
 - e. Поступливість
7. Вакцинація проти яких захворювань розпочинається у віці 12 місяців (вводиться перша доза вакцини)?
- a. Краснухи, кашлюка, туберкульозу
 - b. Епідемічного паротиту, краснухи, кору
 - c. Дифтерії, туберкульозу, вірусного гепатиту В
 - d. Кашлюка, дифтерії, правця
 - e. Туберкульозу, кашлюка, вірусного гепатиту В
8. Вакцинація проти яких захворювань розпочинається у віці 12 місяців (вводиться перша доза вакцини)?
- a. Краснухи, кашлюка, туберкульозу
 - b. Епідемічного паротиту, краснухи, кору
 - c. Дифтерії, туберкульозу, вірусного гепатиту В
 - d. Туберкульозу, кашлюка, вірусного гепатиту В
 - e. Кашлюка, дифтерії, правця
9. Генеральний директор медичного закладу під час обговорення конфліктної ситуації наголосив, що сім'я пацієнта повинна бути повідомлена про стан здоров'я пацієнта. Хто з медичного персоналу повинен бути повідомлений?
- a. Пособа сестра медична відділення
 - b. Головний лікар
 - c. Заступник головного лікаря
 - d. Старша сестра медична відділення
 - e. Головна сестра медична
10. Генеральний директор медичного закладу під час обговорення конфліктної ситуації наголосив, що сім'я пацієнта повинна бути повідомлена про стан здоров'я пацієнта. Хто з медичного персоналу повинен бути повідомлений?

- a. Постова сестра медична відділення
- b. Заступник головного лікаря
- c. Старша сестра медична відділення
- d. Головна сестра медична
- e. Головний лікар

11. Головна сестра медична клінічної лікарні на нараді з підлеглими сестрами медичними, які пройшли

- a. Заснування, період росту та розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або онов
- b. Заснування, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення
- c. Утворення, народження, період росту, припинення існування або оновлення
- d. Період росту та розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення
- e. Період розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення

12. Головна сестра медична клінічної лікарні на нараді з підлеглими сестрами медичними, які пройшли

- a. Утворення, народження, період росту, припинення існування або оновлення
- b. Заснування, період росту та розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або онов
- c. Заснування, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення
- d. Період розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення
- e. Період росту та розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення

13. Головна сестра медична лікувального закладу концентрує управлінські функції на собі, самостійно

- a. -
- b. Діловий
- c. Авторитарний
- d. Колегіальний
- e. Ліберальний

14. Головна сестра медична лікувального закладу концентрує управлінські функції на собі, самостійно

- a. Діловий
- b. -
- c. Ліберальний
- d. Колегіальний
- e. Авторитарний

15. Головна сестра медична розробила заходи, які заклад охорони здоров'я має виконати за рік, вказал

- a. Сервісне блокування
- b. Оперативне планування
- c. Організаційний аналіз
- d. Стратегічний менеджмент
- e. Функціональне блокування

16. Головна сестра медична розробила заходи, які заклад охорони здоров'я має виконати за рік, вказал

- a. Функціональне блокування
- b. Сервісне блокування
- c. Організаційний аналіз
- d. Оперативне планування
- e. Стратегічний менеджмент

17. Дівчина підліткового віку, перебуваючи в малопровітрюваному людному приміщенні, спочатку відчу

- a. Забезпечити доступ свіжого повітря, надати пацієнтці горизонтальне положення з трохи піднятими н
- b. -
- c. Дати вжити легкозасвоювані вуглеводи (воду з цукром)
- d. Розпочати виконання серцево-легеневої реанімації у співвідношенні 30 компресій на грудну клітку д
- e. Увести адреналін (епінефрин) внутрішньовенно

18. Дівчина підліткового віку, перебуваючи в малопровітрюваному людному приміщенні, спочатку відчу

- a. Забезпечити доступ свіжого повітря, надати пацієнтці горизонтальне положення з трохи піднятими н
- b. Дати вжити легкозасвоювані вуглеводи (воду з цукром)
- c. Розпочати виконання серцево-легеневої реанімації у співвідношенні 30 компресій на грудну клітку д
- d. -
- e. Увести адреналін (епінефрин) внутрішньовенно

19. Для якої вродженої вади серця характерні чотири анатомічні ознаки: стеноз легеневої артерії, деф

- a. Тетради Фалло

- b. -
- c. Декстракардії
- d. Аномалії Ебштейна
- e. Коарктації аорти

20. Для якої вродженої вади серця характерні чотири анатомічні ознаки: стеноз легеневої артерії, деф

- a. Декстракардії
- b. -
- c. Аномалії Ебштейна
- d. Коарктації аорти

e. Тетради Фалло

21. Жінка віком 25 років годину тому отримала опік лівої кисті окропом. Об'єктивно спостерігається:

- a. Охолодити місце опіку прохолодною проточною водою
- b. Накласти мазеву пов'язку на уражену ділянку
- c. Проколоти пухирі та накласти суху пов'язку на уражену ділянку
- d. Накласти пов'язку з антисептиком на уражену ділянку
- e. Обробити місце опіку спиртовмісним розчином

22. Жінка віком 25 років годину тому отримала опік лівої кисті окропом. Об'єктивно спостерігається:

- a. Обробити місце опіку спиртовмісним розчином
- b. Накласти мазеву пов'язку на уражену ділянку
- c. Проколоти пухирі та накласти суху пов'язку на уражену ділянку
- d. Накласти пов'язку з антисептиком на уражену ділянку

e. Охолодити місце опіку прохолодною проточною водою

23. Жінка віком 29 років скаржиться на свербіж і печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, диско

- a. Аеробного вагініту
- b. Бактеріального вагінозу

c. Трихомоніазу

- d. Кандидозного вульвовагініту
- e. Хламідіозу

24. Жінка віком 29 років скаржиться на свербіж і печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, диско

- a. Кандидозного вульвовагініту
- b. Бактеріального вагінозу
- c. Аеробного вагініту

d. Трихомоніазу

e. Хламідіозу

25. Жінка віком 30 років, яку за нижню кінцівку вкусила змія, скаржиться на різкий біль і печіння в

- a. Накладання джгута на кінцівку вище місця укусу
- b. Надрізання шкіри в місці укусу

c. Проведення іммобілізації кінцівки

- d. Відсмоктування ротом отрути з місця укусу
- e. Припікання місця укусу гарячим предметом

26. Жінка віком 30 років, яку за нижню кінцівку вкусила змія, скаржиться на різкий біль і печіння в

- a. Накладання джгута на кінцівку вище місця укусу
- b. Надрізання шкіри в місці укусу

c. Проведення іммобілізації кінцівки

- d. Припікання місця укусу гарячим предметом
- e. Відсмоктування ротом отрути з місця укусу

27. Керівник лікувального закладу проводить загальні збори з працівниками, а секретар задокументовує

a. Протокол

b. Вказівка

c. -

d. Наказ

e. Розпорядження

28. Керівник лікувального закладу проводить загальні збори з працівниками, а секретар задокументовує

a. Наказ

b. Протокол

- с. Вказівка
- d. -
- е. Розпорядження

29. Кому з нижченаведених пацієнтів показане лікування в денному стаціонарі медичного центру?

- a. Пацієнту віком 56 років із термінальною стадією цирозу печінки
- b. Пацієнту віком 49 років із загостренням хронічного холециститу**
- с. Пацієнтці віком 27 років, якій показаний остеосинтез
- d. Пацієнтці віком 78 років із IV стадією раку шлунка
- е. Пацієнту віком 67 років із гострим порушенням мозкового кровообігу

30. Кому з нижченаведених пацієнтів показане лікування в денному стаціонарі медичного центру?

- a. Пацієнтці віком 78 років із IV стадією раку шлунка
- b. Пацієнту віком 67 років із гострим порушенням мозкового кровообігу
- с. Пацієнтці віком 27 років, якій показаний остеосинтез
- d. Пацієнту віком 49 років із загостренням хронічного холециститу**
- е. Пацієнту віком 56 років із термінальною стадією цирозу печінки

31. Лікар встановив пацієнту діагноз: цукровий діабет 2-го типу - та виписав рецепт на антидіабетичн

- a. Препарат можна придбати за рецептом безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках, що беруть**
- b. Потрібно порекомендувати придбати препарат пізніше, коли з'являться кошти
- с. Препарат можна придбати зі знижкою в аптеках, що проводять спеціальні акції
- d. Препарат можна придбати нетерміново, після вирішення фінансових проблем
- е. Порекомендувати звернутися до соціальних служб, які можуть фінансово допомогти з придбанням пр

32. Лікар встановив пацієнту діагноз: цукровий діабет 2-го типу - та виписав рецепт на антидіабетичн

- a. Препарат можна придбати за рецептом безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках, що беруть**
- b. Препарат можна придбати зі знижкою в аптеках, що проводять спеціальні акції
- с. Порекомендувати звернутися до соціальних служб, які можуть фінансово допомогти з придбанням пр
- d. Препарат можна придбати нетерміново, після вирішення фінансових проблем
- е. Потрібно порекомендувати придбати препарат пізніше, коли з'являться кошти

33. Медичну допомогу населенню надають медичні заклади, номенклатура яких затверджена Міністеро

- a. Амбулаторії**
- b. -
- с. Аптечні установи
- d. Клінічні лабораторії
- е. Бактеріологічні лабораторії

34. Медичну допомогу населенню надають медичні заклади, номенклатура яких затверджена Міністеро

- a. Аптечні установи
- b. Бактеріологічні лабораторії
- с. -
- d. Клінічні лабораторії
- е. Амбулаторії**

35. Між сестрами медичними лікувального закладу, які працюють в одному відділенні, виник конфлікт ч

- a. Міжособовий**
- b. Внутрішньоособовий
- с. -
- d. Міжгруповий
- е. Між особою та групою

36. Між сестрами медичними лікувального закладу, які працюють в одному відділенні, виник конфлікт ч

- a. Між особою та групою
- b. Внутрішньоособовий
- с. Міжособовий**
- d. -
- е. Міжгруповий

37. Основною формою медсестринської комунікації є спілкування сестри медичної та пацієнта, успішніс

- a. Виникнення комунікативних бар'єрів
- b. Неправильність думки співрозмовника та відповідна реакція на неї
- с. Відсутність спільного комунікативного простору

d. Пасивність учасників комунікації

e. Формування, отримання, оброблення інформації та розвиток стосунків

38. Основною формою медсестринської комунікації є спілкування сестри медичної та пацієнта, успішні

a. Неправильність думки співрозмовника та відповідна реакція на неї

b. Виникнення комунікативних бар'єрів

c. Пасивність учасників комунікації

d. Відсутність спільного комунікативного простору

e. Формування, отримання, оброблення інформації та розвиток стосунків

39. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку. Напере

a. Гострого апендициту

b. Кишкової непрохідності

c. Перфоративної виразки шлунка

d. Гострого холецистити

e. Гострого панкреатиту

40. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку. Напере

a. Гострого панкреатиту

b. Гострого апендициту

c. Гострого холецистити

d. Кишкової непрохідності

e. Перфоративної виразки шлунка

41. Пацієнт віком 35 років перебуває в реанімаційному відділенні у зв'язку з гострим отруєнням невід

a. Олігурія та гіпостенурія

b. Діурез та відносна густина сечі в межах норми

c. Поліурія та гіперстенурія

d. -

e. Олігурія та гіперстенурія

42. Пацієнт віком 35 років перебуває в реанімаційному відділенні у зв'язку з гострим отруєнням невід

a. Олігурія та гіперстенурія

b. Олігурія та гіпостенурія

c. Поліурія та гіперстенурія

d. Діурез та відносна густина сечі в межах норми

e. -

43. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у грудній клітці зліва, що посилюється під час дихання

a. Сухого плевриту

b. Бронхоектатичної хвороби

c. Гострого бронхіту

d. Гострого стенозуючого ларингіту

e. Бронхіальної астми

44. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у грудній клітці зліва, що посилюється під час дихання

a. Бронхоектатичної хвороби

b. Бронхіальної астми

c. Сухого плевриту

d. Гострого стенозуючого ларингіту

e. Гострого бронхіту

45. Пацієнт віком 45 років скаржиться на довготривалий кашель, зниження маси тіла, загальну слабкіс

a. Лейкоцитоз у периферичній крові

b. Позитивний квантифероновий тест

c. Виявлення збудника туберкульозу в мокротинні

d. Специфічні рентгенологічні зміни органів грудної клітки

e. Позитивна проба Манту

46. Пацієнт віком 45 років скаржиться на довготривалий кашель, зниження маси тіла, загальну слабкіс

a. Позитивна проба Манту

b. Позитивний квантифероновий тест

c. Специфічні рентгенологічні зміни органів грудної клітки

d. Виявлення збудника туберкульозу в мокротинні

е. Лейкоцитоз у периферичній крові

47. Пацієнт віком 45 років хворіє на бронхіальну астму. Який метод функціональної діагностики викори

а. -

б. Піклуфометрія

с. Пневмотахометрія

д. Пульсоксиметрія

е. Спірометрія

48. Пацієнт віком 45 років хворіє на бронхіальну астму. Який метод функціональної діагностики викори

а. Пневмотахометрія

б. Пульсоксиметрія

с. Піклуфометрія

д. Спірометрія

е. -

49. Пацієнт віком 49 років, який упродовж двадцяти трьох років працює апаратником синтезу на фарма

а. Хронічна інтоксикація бензолом

б. Гостра інтоксикація бензолом

с. -

д. Хронічна інтоксикація марганцем

е. Гостра інтоксикація окисом вуглецю

50. Пацієнт віком 49 років, який упродовж двадцяти трьох років працює апаратником синтезу на фарма

а. Гостра інтоксикація окисом вуглецю

б. Хронічна інтоксикація марганцем

с. Гостра інтоксикація бензолом

д. -

е. Хронічна інтоксикація бензолом

51. Пацієнт віком 57 років скаржиться на біль у ділянці шлунка, який виникає після їжі переважно в о

а. Біохімічний аналіз крові

б. УЗД органів черевної порожнини

с. Дуоденальне зондування

д. Колоноскопія

е. Фіброезофагогастродуоденоскопія

52. Пацієнт віком 57 років скаржиться на біль у ділянці шлунка, який виникає після їжі переважно в о

а. Дуоденальне зондування

б. Фіброезофагогастродуоденоскопія

с. УЗД органів черевної порожнини

д. Колоноскопія

е. Біохімічний аналіз крові

53. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на біль у правому колінному суглобі, що виникає в момент початк

а. Бурситу

б. Деформуючого остеоартрозу

с. Ревматоїдного артрити

д. Системного червоного вовчака

е. Подагри

54. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на біль у правому колінному суглобі, що виникає в момент початк

а. Подагри

б. Бурситу

с. Системного червоного вовчака

д. Деформуючого остеоартрозу

е. Ревматоїдного артрити

55. Пацієнт віком 65 років під час нападу стенокардії прийняв сублінгвально 1 таблетку нітрогліцерин

а. Головний біль

б. Агранулоцитоз

с. Парестезії

д. Ністагм

е. Зниження слуху

56. Пацієнт віком 65 років під час нападу стенокардії прийняв сублінгвально 1 таблетку нітрогліцерин

- a. Ністагм
- b. Агранулоцитоз
- c. Зниження слуху
- d. Парестезії

e. Головний біль

57. Пацієнт віком 70 років скаржиться на стискальний біль за грудниною, що іррадіює в ліве плече, ру

- a. Гідазепам
- b. Парацетамол

c. Нітрогліцерин

- d. Дротаверин
- e. Ібупрофен

58. Пацієнт віком 70 років скаржиться на стискальний біль за грудниною, що іррадіює в ліве плече, ру

- a. Дротаверин
- b. Ібупрофен

c. Гідазепам

d. Парацетамол

e. Нітрогліцерин

59. Пацієнт, який довгий час працює бурильником у шахті, скаржиться на дискомфорт у кистях. Який із

- a. Капіляроскопія
- b. Динамометрія
- c. Палестезіометрія
- d. Холодова проба

e. Алгезиметрія

60. Пацієнт, який довгий час працює бурильником у шахті, скаржиться на дискомфорт у кистях. Який із

- a. Капіляроскопія
- b. Палестезіометрія
- c. Холодова проба

d. Алгезиметрія

e. Динамометрія

61. Пацієнт, який перебуває на етапі відновлення після інсульту, висловив бажання самостійно виконув

a. Інженерна

b. Колегіальна

c. Контактна

d. Патерналістична

e. Авторитарна

62. Пацієнт, який перебуває на етапі відновлення після інсульту, висловив бажання самостійно виконув

a. Патерналістична

b. Контактна

c. Колегіальна

d. Інженерна

e. Авторитарна

63. Пацієнт, який хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, скаржиться на слабкість, задиш

a. Залізодефіцитна анемія

b. Гемолітична анемія

c. Апластична анемія

d. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія

e. Еритремія

64. Пацієнт, який хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, скаржиться на слабкість, задиш

a. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія

b. Апластична анемія

c. Гемолітична анемія

d. Залізодефіцитна анемія

e. Еритремія

65. Пацієнта віком 68 років, який хворіє на цукровий діабет, шпиталізовано до лікарні в коматозному

a. -

b. Діабетична кетацидотична

c. Гіперосмолярна

d. Гіпоглікемічна

e. Лактацидотична

66. Пацієнта віком 68 років, який хворіє на цукровий діабет, шпиталізовано до лікарні в коматозному

a. Діабетична кетацидотична

b. Лактацидотична

c. Гіпоглікемічна

d. Гіперосмолярна

e. -

67. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на рясні виділення зі статевих шляхів із неприємним "рибним"

a. Трихомоніазу

b. Генітального герпесу

c. Бактеріального вагінозу

d. Кандидозного вульвовагініту

e. Хламідіозу

68. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на рясні виділення зі статевих шляхів із неприємним "рибним"

a. Хламідіозу

b. Бактеріального вагінозу

c. Трихомоніазу

d. Кандидозного вульвовагініту

e. Генітального герпесу

69. Пацієнтка віком 34 роки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, раптово втратила свідомість. О

a. 10-14 ОД інсуліну короткої дії в/в

b. 40%-ий розчин глюкози в/в

c. 5%-ий розчин глюкози в/в

d. 0,1%-ий розчин адреналіну (епінефрину) в/м

e. 0,2%-ий розчин норадреналіну в/в

70. Пацієнтка віком 34 роки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, раптово втратила свідомість. О

a. 5%-ий розчин глюкози в/в

b. 40%-ий розчин глюкози в/в

c. 10-14 ОД інсуліну короткої дії в/в

d. 0,2%-ий розчин норадреналіну в/в

e. 0,1%-ий розчин адреналіну (епінефрину) в/м

71. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на задишку, помірний кашель із виділенням невеликої кількості

a. Абсцесу легені

b. Туберкульозу легень

c. Ексудативного плевриту

d. Міжреберної невралгії

e. Бронхоектатичної хвороби

72. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на задишку, помірний кашель із виділенням невеликої кількості

a. Туберкульозу легень

b. Міжреберної невралгії

c. Ексудативного плевриту

d. Бронхоектатичної хвороби

e. Абсцесу легені

73. Пацієнтка віком 49 років після фізичного перенавантаження відчула раптове прискорене серцебиття

a. Катетерна абляція

b. Проба Вальсальви

c. Електрична дефібриляція

d. Перикардіоцентез

e. Черезстравохідна електростимуляція

74. Пацієнтка віком 49 років після фізичного перенавантаження відчула раптове прискорене серцебиття

a. Катетерна абляція

b. Черезстравохідна електростимуляція

c. Проба Вальсальви

d. Перикардіоцентез

e. Електрична дефібриляція

75. Пацієнтка віком 55 років перебуває у стані без свідомості. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий

a. Гіпоглікемічна кома

b. Гіперглікемічна кома

c. Гіпертонічний криз

d. Анафілактичний шок

e. Кардіогенний шок

76. Пацієнтка віком 55 років перебуває у стані без свідомості. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий

a. Гіпоглікемічна кома

b. Кардіогенний шок

c. Анафілактичний шок

d. Гіперглікемічна кома

e. Гіпертонічний криз

77. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, сонливість,

a. Хронічного тиреоїдиту

b. Гіпотиреозу

c. Тиреотоксикозу

d. Вузлового токсичного зоба

e. Гострого тиреоїдиту

78. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, сонливість,

a. Хронічного тиреоїдиту

b. Вузлового токсичного зоба

c. Гіпотиреозу

d. Тиреотоксикозу

e. Гострого тиреоїдиту

79. Пацієнтка віком 62 роки одразу після парентерального введення вітаміну групи В відчула раптову с

a. Гіпертонічний криз

b. Анафілаксія

c. Гіперглікемія

d. Пневмоторакс

e. Гіпоглікемія

80. Пацієнтка віком 62 роки одразу після парентерального введення вітаміну групи В відчула раптову с

a. Гіпоглікемія

b. Анафілаксія

c. Гіпертонічний криз

d. Гіперглікемія

e. Пневмоторакс

81. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на біль у язичку, відсутність апетиту, зміни смаку, оніміння,

a. Вітамін B12-дефіцитної

b. Апластичної

c. Залізодефіцитної

d. Гіпопластичної

e. Постгеморагічної

82. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на біль у язичку, відсутність апетиту, зміни смаку, оніміння,

a. Гіпопластичної

b. Апластичної

c. Залізодефіцитної

d. Вітамін B12-дефіцитної

e. Постгеморагічної

83. Пацієнтка віком 82 роки скаржиться на біль у мезогастральній ділянці, нудоту та триразове блюван

a. Огляд, пальпація, перкусія, аускультация

b. Огляд, перкусія, пальпація, аускультация

с. Огляд, аускультация, пальпация, перкусия

d. Огляд, аускультация, перкусия, пальпация

е. Огляд, перкусия, аускультация, пальпация

84. Пацієнтка віком 82 роки скаржиться на біль у мезогастральній ділянці, нудоту та триразове блювання

a. Огляд, перкусия, пальпация, аускультация

b. Огляд, аускультация, перкусия, пальпация

с. Огляд, перкусия, аускультация, пальпация

d. Огляд, пальпация, перкусия, аускультация

е. Огляд, аускультация, пальпация, перкусия

85. Пацієнтка після перенесеного інсульту відчуває виражений страх втратити рівновагу та впасти, червоніє

a. Послідовність

b. Безперервність

с. Цілеспрямованість

d. Пацієнтоцентричність

е. Своєчасність

86. Пацієнтка після перенесеного інсульту відчуває виражений страх втратити рівновагу та впасти, червоніє

a. Своєчасність

b. Пацієнтоцентричність

с. Цілеспрямованість

d. Послідовність

е. Безперервність

87. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до лікарні із симптомами передозування морфіном. Після введіння

a. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів

b. Стимуляція серотонінових рецепторів

с. Блокада дофамінових рецепторів

d. Блокада ГАМК-рецепторів

е. Блокада опіоїдних рецепторів

88. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до лікарні із симптомами передозування морфіном. Після введіння

a. Стимуляція серотонінових рецепторів

b. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів

с. Блокада ГАМК-рецепторів

d. Блокада опіоїдних рецепторів

е. Блокада дофамінових рецепторів

89. Пацієнту встановлено попередній діагноз: шигельоз. Який специфічний лабораторний метод діагностики

a. Бактеріологічне дослідження випорожнень

b. Загальний аналіз сечі

с. Загальний аналіз крові

d. Аналіз крові на глюкозу

е. Біохімічний аналіз крові

90. Пацієнту встановлено попередній діагноз: шигельоз. Який специфічний лабораторний метод діагностики

a. Загальний аналіз крові

b. Біохімічний аналіз крові

с. Загальний аналіз сечі

d. Аналіз крові на глюкозу

е. Бактеріологічне дослідження випорожнень

91. Пацієнту віком 20 років проводять серцево-легеневу реанімацію. Який із нижченаведених критеріїв

a. Зниження тонусу повік

b. Збільшення ціанозу

с. Поява акроціанозу

d. Звуження зіниць

е. -

92. Пацієнту віком 20 років проводять серцево-легеневу реанімацію. Який із нижченаведених критеріїв

a. Поява акроціанозу

b. -

с. Зниження тонусу повік

d. Збільшення ціанозу

e. Звуження зіниць

93. Пацієнту віком 37 років призначено інгаляції іпратропію броміду (беродуалу). Який прилад викорис

a. Небулайзер

b. Пікфлуометр

c. Спірометр

d. Пульсоксиметр

e. -

94. Пацієнту віком 37 років призначено інгаляції іпратропію броміду (беродуалу). Який прилад викорис

a. Спірометр

b. Небулайзер

c. -

d. Пульсоксиметр

e. Пікфлуометр

95. Пацієнту віком 43 роки встановлено попередній діагноз: хронічний панкреатит. Які лабораторні мар

a. Білірубін, трансамінази

b. Холестерин, білірубін

c. alpha-амілаза, еластаза 1

d. Трансамінази, C-реактивний білок

e. Протромбіновий індекс, гематокрит

96. Пацієнту віком 43 роки встановлено попередній діагноз: хронічний панкреатит. Які лабораторні мар

a. Протромбіновий індекс, гематокрит

b. Холестерин, білірубін

c. alpha-амілаза, еластаза 1

d. Трансамінази, C-реактивний білок

e. Білірубін, трансамінази

97. Пацієнту віком 55 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія, I стадія, 2-й ступінь. У с

a. Адреноміметики

b. Петльові діуретики

c. Адреноблокатори

d. Антагоністи кальцію

e. Тіазидні діуретики

98. Пацієнту віком 55 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія, I стадія, 2-й ступінь. У с

a. Петльові діуретики

b. Тіазидні діуретики

c. Адреноблокатори

d. Антагоністи кальцію

e. Адреноміметики

99. Пацієнту віком 69 років сестра медична за призначенням лікаря ввела внутрішньом'язово 1%-ий роз

a. Колір шкірних покривів

b. Частоту дихання

c. Температуру тіла

d. Рівень глюкози в крові

e. Частоту серцевих скорочень

100. Пацієнту віком 69 років сестра медична за призначенням лікаря ввела внутрішньом'язово 1%-ий ро

a. Частоту серцевих скорочень

b. Рівень глюкози в крові

c. Частоту дихання

d. Температуру тіла

e. Колір шкірних покривів

101. Пацієнту гематологічного відділення встановлено попередній діагноз: хронічний лімфолейкоз. Ука

a. Артралгія

b. Жовтяниця

c. Анасарка

d. Лімфаденопатія

е. Гемартроз

102. Пацієнту гематологічного відділення встановлено попередній діагноз: хронічний лімфолейкоз. Ука

а. Жовтяниця

б. Артралгія

с. Анасарка

d. Лімфаденопатія

е. Гемартроз

103. Пацієнту кардіологічного відділення проводиться аускультация серця. Який клапан серця найкращ

a. Аортальний

б. Легеневої артерії

с. -

d. Тристулковий

е. Мітральний

104. Пацієнту кардіологічного відділення проводиться аускультация серця. Який клапан серця найкращ

a. Тристулковий

б. Мітральний

с. -

d. Аортальний

е. Легеневої артерії

105. Пацієнту інфекційного стаціонару встановлено діагноз: дифтерія ротоглотки - та з лікувальною ме

a. Знищення збудника інфекції

b. Нейтралізація токсину

с. Стимуляція імунної системи

d. Стабілізація гемодинаміки

е. Забезпечення седативного ефекту

106. Пацієнту інфекційного стаціонару встановлено діагноз: дифтерія ротоглотки - та з лікувальною ме

a. Стабілізація гемодинаміки

б. Забезпечення седативного ефекту

с. Стимуляція імунної системи

d. Знищення збудника інфекції

e. Нейтралізація токсину

107. Пацієнту, який хворіє на Н. pylori-асоційований гастрит, у складі комплексної терапії призначен

a. Антибіотики

б. Пробіотики

с. Антациди

d. Спазмолітики

е. Гастропротектори

108. Пацієнту, який хворіє на Н. pylori-асоційований гастрит, у складі комплексної терапії призначен

a. Спазмолітики

b. Антибіотики

с. Антациди

d. Пробіотики

е. Гастропротектори

109. Пацієнту, який хворіє на артеріальну гіпертензію, призначено проведення офтальмоскопії. Перед п

a. Гострий іридоцикліт

b. Напад закритокутової глаукоми

с. Крововилив у сітківку

d. Анафілактичний шок

е. Гіпертонічний криз

110. Пацієнту, який хворіє на артеріальну гіпертензію, призначено проведення офтальмоскопії. Перед п

a. Крововилив у сітківку

б. Гострий іридоцикліт

с. Анафілактичний шок

d. Напад закритокутової глаукоми

е. Гіпертонічний криз

111. Пацієнтці віком 46 років, яка скаржиться на сухість у роті та швидку стомлюваність, проведено г

a. Порушення толерантності до вуглеводів

b. Цукровий діабет 2-го типу

c. Нецукровий діабет

d. Фізіологічна норма

e. Цукровий діабет 1-го типу

112. Пацієнтці віком 46 років, яка скаржиться на сухість у роті та швидку стомлюваність, проведено г

a. Фізіологічна норма

b. Цукровий діабет 2-го типу

c. Цукровий діабет 1-го типу

d. Нецукровий діабет

e. Порушення толерантності до вуглеводів

113. Пацієнтці з декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю призначено комплексне лікування

a. Еналаприл

b. Фуросемід

c. Спіронолактон

d. -

e. Бісопролол

114. Пацієнтці з декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю призначено комплексне лікування

a. Бісопролол

b. Еналаприл

c. Фуросемід

d. Спіронолактон

e. -

115. Постраждалий перебуває у стані без свідомості, але в нього збережений пульс і самостійне дихання

a. Стабільне бічне

b. Ортопное

c. Тренделенбурга

d. Фаулера

e. Сімса

116. Постраждалий перебуває у стані без свідомості, але в нього збережений пульс і самостійне дихання

a. Сімса

b. Ортопное

c. Тренделенбурга

d. Фаулера

e. Стабільне бічне

117. Потерпілому внаслідок ДТП чоловіку віком 44 роки проведено ургентне оперативне втручання з пр

a. Селезінки

b. Печінки

c. Шлунка

d. Тонкого кишечника

e. Підшлункової залози

118. Потерпілому внаслідок ДТП чоловіку віком 44 роки проведено ургентне оперативне втручання з пр

a. Шлунка

b. Підшлункової залози

c. Тонкого кишечника

d. Печінки

e. Селезінки

119. Під час консультації в центрі первинної медико-санітарної допомоги мати трирічної дитини цікави

a. 35%

b. 40%

c. 25%

d. 50%

e. 15%

120. Під час консультації в центрі первинної медико-санітарної допомоги мати трирічної дитини цікави

- a. 50%
- b. 40%
- c. 15%
- d. 35%
- e. 25%

121. Під час огляду грудної клітки пацієнта терапевтичного відділення сестра медична виявила такі зміни:

- a. Емфізематозна
- b. Паралітична
- c. Воронкоподібна
- d. Човникоподібна
- e. Рахітична

122. Під час огляду грудної клітки пацієнта терапевтичного відділення сестра медична виявила такі зміни:

- a. Човникоподібна
- b. Рахітична
- c. Воронкоподібна
- d. Паралітична
- e. Емфізематозна

123. Під час оцінки нервово-психічного та фізичного розвитку дитини з'ясувалося, що вона знає назви предметів:

- a. 12 місяців
- b. 9 місяців
- c. 5 місяців
- d. 8 місяців
- e. 3 місяці

124. Під час оцінки нервово-психічного та фізичного розвитку дитини з'ясувалося, що вона знає назви предметів:

- a. 5 місяців
- b. 8 місяців
- c. 9 місяців
- d. 3 місяці
- e. 12 місяців

125. Під час оцінки рівня свідомості в постраждалого з'ясувалося, що він не реагує на зовнішні подразники:

- a. ABCDE
- b. FAST
- c. SCORE
- d. AVPU
- e. SAMPLE

126. Під час оцінки рівня свідомості в постраждалого з'ясувалося, що він не реагує на зовнішні подразники:

- a. FAST
- b. SAMPLE
- c. SCORE
- d. ABCDE
- e. AVPU

127. Під час роботи на промисловому об'єкті один із працівників зазнав ураження електричним струмом:

- a. Безпечно припинити контакт постраждалого із джерелом електроструму
- b. негайно розпочати проведення серцево-легеневої реанімації
- c. Увести внутрішньовенно 0,1%-ий розчин адреналіну (епінефрину)
- d. Очікувати на прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
- e. Провести оксигенотерапію

128. Під час роботи на промисловому об'єкті один із працівників зазнав ураження електричним струмом:

- a. Безпечно припинити контакт постраждалого із джерелом електроструму
- b. Очікувати на прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
- c. Негайно розпочати проведення серцево-легеневої реанімації
- d. Провести оксигенотерапію
- e. Увести внутрішньовенно 0,1%-ий розчин адреналіну (епінефрину)

129. Після успішного проведення реанімаційних заходів новонародженій дитині в пологовій залі необхідно:

- a. Вени пуповини

- b. Ліктьові вени
- c. Підключичні вени
- d. Вени голови
- e. Пахові вени

130. Після успішного проведення реанімаційних заходів новонародженій дитині в пологовій залі необхідні

- a. Підключичні вени
- b. Вени пуповини

- c. Пахові вени
- d. Ліктьові вени
- e. Вени голови

131. Сестра медична проводить бесіду з пацієнтом, який нещодавно завершив лікування з приводу гострої

- a. Санація вогнищ хронічної інфекції
- b. Обмеження вживання солі
- c. Збільшення фізичної активності
- d. Регулярний прийом сечогінних препаратів
- e. Уникнення вживання солодощів

132. Сестра медична проводить бесіду з пацієнтом, який нещодавно завершив лікування з приводу гострої

- a. Санація вогнищ хронічної інфекції
- b. Обмеження вживання солі
- c. Збільшення фізичної активності
- d. Уникнення вживання солодощів
- e. Регулярний прийом сечогінних препаратів

133. Сестрі медичній кардіологічного відділення необхідно виміряти пульс пацієнту. У який період доби

- a. В обідній час, після вживання їжі
- b. Ввечері, перед сном, після вечері
- c. Вдень, після фізичного навантаження
- d. Вранці, одразу після сніданку
- e. Вранці, одразу після пробудження, натще

134. Сестрі медичній кардіологічного відділення необхідно виміряти пульс пацієнту. У який період доби

- a. В обідній час, після вживання їжі
- b. Вранці, одразу після сніданку
- c. Вдень, після фізичного навантаження
- d. Вранці, одразу після пробудження, натще
- e. Ввечері, перед сном, після вечері

135. Сестрі медичній потрібно оцінити швидкість адаптації організму пацієнтки до фізичного навантаження

- a. Мартіне-Кушелевського
- b. Генчі
- c. Кліностатичну
- d. Штанге
- e. -

136. Сестрі медичній потрібно оцінити швидкість адаптації організму пацієнтки до фізичного навантаження

- a. Штанге
- b. Генчі
- c. -
- d. Мартіне-Кушелевського
- e. Кліностатичну

137. Складність і різноманітність організацій зумовлюють необхідність їх класифікації. Укажіть види

- a. Комерційні та некомерційні
- b. Приватні і державні
- c. Формальні та неформальні
- d. Безстрокові та тимчасові
- e. Одиничні та об'єднані на основі кооперації

138. Складність і різноманітність організацій зумовлюють необхідність їх класифікації. Укажіть види

- a. Формальні та неформальні
- b. Приватні і державні

- с. Безстрокові та тимчасові
- д. Одиничні та об'єднані на основі кооперації
- е. Комерційні та некомерційні

139. Старша сестра медична амбулаторії складає графік роботи підлеглих працівників. Укажіть норми н

- а. 750 осіб у місті, 600 осіб у сільській місцевості
- б. 450 осіб у місті, 150 осіб у сільській місцевості
- с. 1500 осіб у місті, 1200 осіб у сільській місцевості
- д. 800 осіб у місті, 400 осіб у сільській місцевості
- е. 900 осіб у місті, 800 осіб у сільській місцевості

140. Старша сестра медична амбулаторії складає графік роботи підлеглих працівників. Укажіть норми н

- а. 750 осіб у місті, 600 осіб у сільській місцевості
- б. 800 осіб у місті, 400 осіб у сільській місцевості
- с. 1500 осіб у місті, 1200 осіб у сільській місцевості
- д. 450 осіб у місті, 150 осіб у сільській місцевості
- е. 900 осіб у місті, 800 осіб у сільській місцевості

141. Старша сестра медична нефрологічного відділення проводить ознайомлення підлеглого медичного

- а. Посадова інструкція
- б. -
- с. Розпорядження
- д. Рішення
- е. Договір

142. Старша сестра медична нефрологічного відділення проводить ознайомлення підлеглого медичного

- а. Договір
- б. Рішення
- с. Посадова інструкція
- д. -
- е. Розпорядження

143. Старша сестра медична терапевтичного відділення організовує роботу підлеглого медичного перс

- а. Своєчасність
- б. Доступність
- с. -
- д. Корисність
- е. Періодичність

144. Старша сестра медична терапевтичного відділення організовує роботу підлеглого медичного перс

- а. -
- б. Корисність
- с. Своєчасність
- д. Доступність
- е. Періодичність

145. Сімейний лікар встановив пацієнту попередній діагноз: гіпотиреоз - та скерував його на консуль

- а. Первинну
- б. Вторинну
- с. Екстрену
- д. Третинну
- е. Невідкладну

146. Сімейний лікар встановив пацієнту попередній діагноз: гіпотиреоз - та скерував його на консуль

- а. Первинну
- б. Вторинну
- с. Невідкладну
- д. Третинну
- е. Екстрену

147. У вагітної жінки віком 33 роки на 39-му тижні вагітності розпочалися генералізовані судоми, яки

- а. -
- б. Тяжка прееклампсія
- с. Тромбоемболія легеневої артерії

d. Екламсія

e. Епілептичний статус

148. У вагітної жінки віком 33 роки на 39-му тижні вагітності розпочалися генералізовані судоми, яки

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Тяжка прееклампсія

c. Екламсія

d. -

e. Епілептичний статус

149. У дворічної дитини, яка протягом п'яти днів хворіє на ГРВІ, раптово вночі з'явилися хриплий гол

a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

b. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом

c. Напад бронхіальної астми

d. Гострий обструктивний бронхіт

e. Паратонзиллярний абсцес

150. У дворічної дитини, яка протягом п'яти днів хворіє на ГРВІ, раптово вночі з'явилися хриплий гол

a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

b. Паратонзиллярний абсцес

c. Гострий обструктивний бронхіт

d. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом

e. Напад бронхіальної астми

151. У дев'ятирічної дитини триває напад надшлуночкової тахікардії. Після проведення вагусних маневр

a. Аденозин

b. Атропін

c. Анальгін (метамізол натрію)

d. Амідарон

e. Адреналін (епінефрин)

152. У дев'ятирічної дитини триває напад надшлуночкової тахікардії. Після проведення вагусних маневр

a. Атропін

b. Адреналін (епінефрин)

c. Амідарон

d. Анальгін (метамізол натрію)

e. Аденозин

153. У десятирічної дівчинки спостерігаються тривалий субфебрилітет, зменшення маси тіла. Під час об

a. Інфекційного мононуклеозу

b. Вітамін В₁₂-дефіцитної анемії

c. Гострого лейкозу

d. Анемії Фанконі

e. Гідраденіту

154. У десятирічної дівчинки спостерігаються тривалий субфебрилітет, зменшення маси тіла. Під час об

a. Гідраденіту

b. Гострого лейкозу

c. Анемії Фанконі

d. Вітамін В₁₂-дефіцитної анемії

e. Інфекційного мононуклеозу

155. У дитини грудного віку (вік - 6 місяців), яка хворіє на ГРВІ, спостерігається гарячка (температ

a. Лоратадин

b. Фуросемід

c. Дротаверин

d. Ацетилсаліцилова кислота

e. Парацетамол

156. У дитини грудного віку (вік - 6 місяців), яка хворіє на ГРВІ, спостерігається гарячка (температ

a. Фуросемід

b. Парацетамол

c. Лоратадин

d. Дротаверин

е. Ацетилсаліцилова кислота

157. У дитини, яка народилася з масою тіла 5200 г, об'єктивно спостерігається: щільні набряки на тил

а. Діазепам

б. Гідрокортизон

с. Преднізолон

д. Левотироксин (L-тироксин)

е. Калію йодид (йодомарин)

158. У дитини, яка народилася з масою тіла 5200 г, об'єктивно спостерігається: щільні набряки на тил

а. Преднізолон

б. Гідрокортизон

с. Левотироксин (L-тироксин)

д. Калію йодид (йодомарин)

е. Діазепам

159. У доношеній новонародженій дівчинки на четвертий день життя з'явилися кров'янисто-слизові виділення

а. Гнійного маститу

б. Сечокислого інфаркту нирок

с. Статевого кризу

д. Вагініту

е. Вульвовагініту

160. У доношеній новонародженій дівчинки на четвертий день життя з'явилися кров'янисто-слизові виділення

а. Сечокислого інфаркту нирок

б. Статевого кризу

с. Вагініту

д. Гнійного маститу

е. Вульвовагініту

161. У жінки, яка перебуває на 30-му тижні вагітності, спостерігаються такі зміни показників крові:

а. Помірної прееклампсії

б. Еклампсії

с. HELLP-синдрому

д. Поєднаної прееклампсії

е. Тяжкої прееклампсії

162. У жінки, яка перебуває на 30-му тижні вагітності, спостерігаються такі зміни показників крові:

а. Поєднаної прееклампсії

б. Тяжкої прееклампсії

с. HELLP-синдрому

д. Помірної прееклампсії

е. Еклампсії

163. У закладі охорони здоров'я за наказом МОЗ створено відділ, до складу якого увійшли: лікар-епіде

а. Інфекційного контролю

б. Епідеміологічний

с. Інфекційних захворювань

д. Профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

е. Особливо небезпечних інфекцій

164. У закладі охорони здоров'я за наказом МОЗ створено відділ, до складу якого увійшли: лікар-епіде

а. Особливо небезпечних інфекцій

б. Інфекційного контролю

с. Інфекційних захворювань

д. Профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

е. Епідеміологічний

165. У здорової доношеній дитини на третю добу життя сеча набула жовтувато-цегляного кольору (зал

а. Сечокислого інфаркту нирок

б. Токсичної еритеми

с. Статевого кризу

д. Транзиторної альбумінурії

е. -

166. У здорової доношеної дитини на третю добу життя сеча набула жовтувато-цегляного кольору (зал.

- a. -
- b. Токсичної еритеми

c. Сечокиислого інфаркту нирок

- d. Транзиторної альбумінурії
- e. Статевого кризу

167. У концепції надання допомоги постраждалим на догоспітальному етапі основою є проведення пер

- a. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів та стабілізація шийного відділу хребта
- b. Забезпечення психоемоційного супроводу

c. Швидке визначення станів, що загрожують життю постраждалого, та їх негайне усунення

- d. Аналіз функцій центральної нервової системи
- e. Забезпечення достатньої оксигенації з метою підтримання аеробного метаболізму

168. У концепції надання допомоги постраждалим на догоспітальному етапі основою є проведення пер

- a. Забезпечення психоемоційного супроводу

b. Швидке визначення станів, що загрожують життю постраждалого, та їх негайне усунення

- c. Аналіз функцій центральної нервової системи
- d. Забезпечення достатньої оксигенації з метою підтримання аеробного метаболізму
- e. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів та стабілізація шийного відділу хребта

169. У лейкоцитарній формулі здорової дитини спостерігається приблизно однакова кількість нейтрофілів

- a. 11-12 років

b. 5-6 років

- c. 7-8 років
- d. 9-10 років
- e. 2-3 роки

170. У лейкоцитарній формулі здорової дитини спостерігається приблизно однакова кількість нейтрофілів

- a. 9-10 років

b. 5-6 років

- c. 7-8 років
- d. 11-12 років
- e. 2-3 роки

171. У новонародженої дитини (вік - 1 місяць) виявлено холодний абсцес у ділянці верхньої третини лі

a. Спосіб введення вакцини

- b. Дозування імунобіологічного препарату
- c. Недотримання умов асептики
- d. Вибір ділянки введення вакцини
- e. Термін вакцинації

172. У новонародженої дитини (вік - 1 місяць) виявлено холодний абсцес у ділянці верхньої третини лі

a. Спосіб введення вакцини

- b. Термін вакцинації
- c. Дозування імунобіологічного препарату
- d. Вибір ділянки введення вакцини
- e. Недотримання умов асептики

173. У п'ятирічної дитини протягом останніх трьох років спостерігаються періодичні напади чхання, св

a. Алергічного риніту

- b. Інфекційного мононуклеозу
- c. Гострого фарингіту
- d. Гострого гаймориту
- e. Дифтерії носа

174. У п'ятирічної дитини протягом останніх трьох років спостерігаються періодичні напади чхання, св

a. Алергічного риніту

- b. Дифтерії носа
- c. Гострого гаймориту
- d. Інфекційного мононуклеозу
- e. Гострого фарингіту

175. У пацієнта без свідомості на кардіомоніторі фіксується порушення серцевого ритму, що потребує н

- a. Шлуночкова тахікардія без пульсу
- b. Фібриляція передсердь
- c. Асистолія
- d. Безпульсова електрична активність
- e. Атріовентрикулярна блокада

176. У пацієнта без свідомості на кардіомоніторі фіксується порушення серцевого ритму, що потребує негайних дій.

- a. Фібриляція передсердь
- b. Безпульсова електрична активність
- c. Атріовентрикулярна блокада
- d. Асистолія

- e. Шлуночкова тахікардія без пульсу

177. У пацієнта віком 45 років після фізичного навантаження розвинулися такі симптоми: задишка, виснаження, tachycardia.

- a. Нападу бронхіальної астми
- b. Нападу надшлуночкової пароксизмальної тахікардії
- c. Тиреотоксичного кризу
- d. Гострого коронарного синдрому
- e. набряку легень

178. У пацієнта віком 45 років після фізичного навантаження розвинулися такі симптоми: задишка, виснаження, tachycardia.

- a. Гострого коронарного синдрому
- b. набряку легень
- c. Тиреотоксичного кризу

- d. Нападу бронхіальної астми

- e. Нападу надшлуночкової пароксизмальної тахікардії

179. У пацієнта віком 60 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на сильний оперізувальний біль в області живота.

- a. Гострого панкреатиту
- b. Інфаркту міокарда
- c. Гострого апендициту
- d. Ниркової коліки
- e. Кишкової непрохідності

180. У пацієнта віком 60 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на сильний оперізувальний біль в області живота.

- a. Ниркової коліки
- b. Гострого панкреатиту
- c. Інфаркту міокарда
- d. Кишкової непрохідності
- e. Гострого апендициту

181. У пацієнта під час аускультативного дослідження серця вислуховується систолічний шум у ділянці верхівкового пошухрилування.

- a. -
- b. Легеневої артерії
- c. Тристулкового

- d. Мітрального

- e. Аортального

182. У пацієнта під час аускультативного дослідження серця вислуховується систолічний шум у ділянці верхівкового пошухрилування.

- a. Аортального
- b. Легеневої артерії

- c. Мітрального

- d. -

- e. Тристулкового

183. У пацієнта фтизіатричного стаціонару на тлі нападоподібного кашлю виникли різка задишка та білосинюшність кінцівок.

- a. набряк легень

- b. Спонтанний пневмоторакс

- c. Гострий коронарний синдром
- d. Напад бронхіальної астми
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

184. У пацієнта фтизіатричного стаціонару на тлі нападоподібного кашлю виникли різка задишка та білосинюшність кінцівок.

- a. Тромбоемболія легеневої артерії

- b. Гострий коронарний синдром
- c. набряк легень
- d. Напад бронхіальної астми

e. Спонтанний пневмоторакс

185. У пацієнта як реакція на стрес розвинувся патологічний стан, що проявляється значним зниженням

- a. Кома
- b. Деменція
- c. Параліч
- d. Делірій

e. Ступор

186. У пацієнта як реакція на стрес розвинувся патологічний стан, що проявляється значним зниженням

- a. Параліч
- b. Делірій
- c. Деменція

d. Ступор

e. Кома

187. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, температура тіла впродовж кількох годин швидко знизилася

- a. Гостра дихальна недостатність
- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Гостра серцева недостатність
- d. Гіпертонічний криз

e. Гостра судинна недостатність

188. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, температура тіла впродовж кількох годин швидко знизилася

- a. Гіпертонічний криз
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Гіпоглікемічна кома

d. Гостра судинна недостатність

e. Гостра дихальна недостатність

189. У пацієнта, який хворіє на туберкульоз легень, після фізичного навантаження раптово з'явилося в

a. Легенева кровотеча

- b. Спонтанний пневмоторакс
- c. Носова кровотеча
- d. Відкритий пневмоторакс
- e. Шлункова кровотеча

190. У пацієнта, який хворіє на туберкульоз легень, після фізичного навантаження раптово з'явилося в

a. Легенева кровотеча

- b. Шлункова кровотеча
- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Носова кровотеча
- e. Відкритий пневмоторакс

191. У пацієнтки віком 19 років спостерігаються зміни зовнішності: збільшення кистей рук, стоп, лице

a. Соматотропіну

- b. Тестостерону
- c. Прогестерону
- d. Інсуліну
- e. Тиреотропіну

192. У пацієнтки віком 19 років спостерігаються зміни зовнішності: збільшення кистей рук, стоп, лице

- a. Тестостерону
- b. Прогестерону
- c. Тиреотропіну
- d. Інсуліну

e. Соматотропіну

193. У пацієнтки віком 30 років розвинувся напад пароксизмальної тахікардії. З яких заходів необхідн

a. Проведення вагусних проб

b. Виконання електричної дефібриляції

- c. Забезпечення горизонтального положення тіла
- d. Введення гіпотензивних засобів
- e. -

194. У пацієнтки віком 30 років розвинувся напад пароксизмальної тахікардії. З яких заходів необхідн

- a. Забезпечення горизонтального положення тіла
- b. Введення гіпотензивних засобів
- c. Виконання електричної дефібриляції
- d. Проведення вагусних проб

e. -

195. У пацієнтки віком 56 років на тлі дефіциту вітаміну B₁₂ в організмі розвинулися такі симптоми:

- a. Поліартриту
- b. Фунікулярного мієлозу
- c. Атеросклерозу
- d. Остеопорозу
- e. Метаболічної міопатії

196. У пацієнтки віком 56 років на тлі дефіциту вітаміну B₁₂ в організмі розвинулися такі симптоми:

- a. Поліартриту
- b. Метаболічної міопатії
- c. Фунікулярного мієлозу

- d. Остеопорозу
- e. Атеросклерозу

197. У пацієнтки, яка хворіє на дифузний токсичний зоб, після раптового стресу з'явилися такі симпто

- a. Гіпертонічний криз
- b. Гіпотиреоїдна кома
- c. Анафілаксія
- d. Тиреотоксичний криз

e. Гіпоглікемічна кома

198. У пацієнтки, яка хворіє на дифузний токсичний зоб, після раптового стресу з'явилися такі симпто

- a. Гіпотиреоїдна кома
- b. Гіпертонічний криз
- c. Тиреотоксичний криз

- d. Анафілаксія
- e. Гіпоглікемічна кома

199. У пацієнтки, яка хворіє на ревматоїдний артрит та впродовж року приймає глюкокортикоїди, з'явил

a. Денситометрія

- b. Термографія
- c. Томографія
- d. Ангіографія
- e. Артропневмографія

200. У пацієнтки, яка хворіє на ревматоїдний артрит та впродовж року приймає глюкокортикоїди, з'явил

a. Артропневмографія

b. Денситометрія

- c. Ангіографія
- d. Томографія
- e. Термографія

201. У перинатальному центрі народилася дитина, яка має ознаки недоношеності. Яка шкала використо

- a. Глазго
- b. Бішопа
- c. Лаутона
- d. Апгар

e. Баллард

202. У перинатальному центрі народилася дитина, яка має ознаки недоношеності. Яка шкала використо

- a. Лаутона
- b. Глазго
- c. Баллард

- d. Бішопа
- e. Ангар

203. У постраждалого, який отримав вогнепальне поранення передпліччя, через 2 доби з'явилися інтен

- a. М'язова контрактура
- b. Тромбофлебіт

c. Компартмент-синдром

- d. ДВЗ-синдром
- e. Синдром тривалого стиснення

204. У постраждалого, який отримав вогнепальне поранення передпліччя, через 2 доби з'явилися інтен

- a. Синдром тривалого стиснення

b. Компартмент-синдром

- c. М'язова контрактура
- d. Тромбофлебіт
- e. ДВЗ-синдром

205. У тримісячної дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, за результатами антропометричн

- a. Вимірювання довжини тіла дитини
- b. Визначення пульсу та його властивостей
- c. Перевірка наявності й симетричності сухожильних рефлексів
- d. Вимірювання окружності голови та грудної клітки

e. Контрольне зважування дитини

206. У тримісячної дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, за результатами антропометричн

- a. Перевірка наявності й симетричності сухожильних рефлексів
- b. Вимірювання окружності голови та грудної клітки
- c. Визначення пульсу та його властивостей
- d. Вимірювання довжини тіла дитини

e. Контрольне зважування дитини

207. У трирічної дитини розвинувся гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Об'єктивно спостерігається: L

- a. D
- b. B
- c. E
- d. A
- e. C

208. У трирічної дитини розвинувся гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Об'єктивно спостерігається: L

- a. A
- b. D
- c. E
- d. C
- e. B

209. У хірургічному відділенні перебуває пацієнт після пілороантрумектомії (операції на шлунку у зв'

a. Дихальну гімнастику

- b. Суворий ліжковий режим
- c. Антибіотикотерапію
- d. Еластичне бинтування нижніх кінцівок
- e. Часте провітрювання палати

210. У хірургічному відділенні перебуває пацієнт після пілороантрумектомії (операції на шлунку у зв'

- a. Часте провітрювання палати
- b. Антибіотикотерапію

c. Дихальну гімнастику

- d. Еластичне бинтування нижніх кінцівок
- e. Суворий ліжковий режим

211. У центрі ПМСД медичний працівник проводить обстеження трирічної дитини. Яка формула викорис

- a. $10 + 2n$
- b. $70 + 5n$
- c. $90 + 2n$
- d. $80 * n$

e. $70 * n$

212. У центрі ПМСД медичний працівник проводить обстеження трирічної дитини. Яка формула викорис

a. $80 * n$

b. $10 + 2n$

c. $70 * n$

d. $70 + 5n$

e. $90 + 2n$

213. У центрі ПМСД проводиться обстеження дитини віком 4 тижні, щодо дисплазії кульшових суглобів.

a. Ортолані

b. Мерфі

c. Кера

d. Бабкіна

e. Мюссі

214. У центрі ПМСД проводиться обстеження дитини віком 4 тижні, щодо дисплазії кульшових суглобів.

a. Бабкіна

b. Мерфі

c. Ортолані

d. Мюссі

e. Кера

215. У чоловіка внаслідок проникаючого поранення грудної клітки розвинувся напружений пневмоторакс.

a. 5-те міжребер'я по передній пахвинній лінії

b. 2-е міжребер'я по пригруднинній лінії

c. 5-те міжребер'я по середньоключичній лінії

d. 4-те міжребер'я по передній пахвинній лінії

e. -

216. У чоловіка внаслідок проникаючого поранення грудної клітки розвинувся напружений пневмоторакс.

a. 4-те міжребер'я по передній пахвинній лінії

b. 5-те міжребер'я по передній пахвинній лінії

c. 2-е міжребер'я по пригруднинній лінії

d. 5-те міжребер'я по середньоключичній лінії

e. -

217. У чоловіка віком 42 роки діагностовано вивих нижньої щелепи. Який вид пов'язки накладається після вивиху?

a. Пращоподібна

b. Чеpecь

c. Хрестоподібна

d. Неаполітанська

e. Вузлова

218. У чоловіка віком 42 роки діагностовано вивих нижньої щелепи. Який вид пов'язки накладається після вивиху?

a. Чеpecь

b. Хрестоподібна

c. Вузлова

d. Пращоподібна

e. Неаполітанська

219. У чоловіка віком 55 років раптово виникли сильний головний біль, запаморочення, блювання, оніміння кінцівок.

a. Гіпертензивний криз

b. Гострий менінгіт

c. Мігренозний статус

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

e. Неврит лицевого нерва

220. У чоловіка віком 55 років раптово виникли сильний головний біль, запаморочення, блювання, оніміння кінцівок.

a. Мігренозний статус

b. Гострий менінгіт

c. Неврит лицевого нерва

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

e. Гіпертензивний криз

221. У чоловіка під час фізичних навантажень часто виникають синкопальні стани та задишка. В анамнезі

- a. Дефекту міжшлуночкової перегородки
- b. Стенозу мітрального клапана
- c. Недостатності тристулкового клапана
- d. Недостатності мітрального клапана
- e. Недостатності аортального клапана

222. У чоловіка під час фізичних навантажень часто виникають синкопальні стани та задишка. В анамнезі

- a. Недостатності тристулкового клапана
- b. Стенозу мітрального клапана
- c. Дефекту міжшлуночкової перегородки
- d. Недостатності мітрального клапана
- e. Недостатності аортального клапана

223. У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$. Який лікарський засіб ка

- a. Ацетилсаліцилова кислота
- b. Ібупрофен
- c. Парацетамол
- d. Мефенамінова кислота
- e. -

224. У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$. Який лікарський засіб ка

- a. Ацетилсаліцилова кислота
- b. Мефенамінова кислота
- c. Ібупрофен
- d. -
- e. Парацетамол

225. Укажіть вид медичної допомоги, що надається пацієнтам з невиліковними захворюваннями на пізн

- a. Паліативна
- b. Первинна
- c. Вторинна
- d. Висококваліфікована
- e. Реабілітаційна

226. Укажіть вид медичної допомоги, що надається пацієнтам з невиліковними захворюваннями на пізн

- a. Вторинна
- b. Первинна
- c. Паліативна
- d. Висококваліфікована
- e. Реабілітаційна

227. Укажіть медичний заклад, що надає медичну допомогу з багатьох лікарських спеціальностей у ме

- a. Перинатальний центр
- b. Санітарна станція
- c. Хоспіс
- d. Станція переливання крові
- e. Поліклініка

228. Укажіть медичний заклад, що надає медичну допомогу з багатьох лікарських спеціальностей у ме

- a. Перинатальний центр
- b. Станція переливання крові
- c. Санітарна станція
- d. Поліклініка
- e. Хоспіс

229. Укажіть обов'язковий документ, що медичний працівник має надати для проходження атестації, д

- a. Особова медична картка
- b. Протокол засідання лікарської комісії
- c. Характеристика з місця роботи
- d. Довідка про доходи
- e. Автобіографія

230. Укажіть обов'язковий документ, що медичний працівник має надати для проходження атестації, д

а. Протокол засідання лікарської комісії

б. Характеристика з місця роботи

с. Особова медична картка

д. Довідка про доходи

е. Автобіографія

231. Укажіть орієнтовний вік дитини, яка добре фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку

а. 2 місяці

б. 5 місяців

с. 4 місяці

д. 7 місяців

е. 8 місяців

232. Укажіть орієнтовний вік дитини, яка добре фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку

а. 8 місяців

б. 5 місяців

с. 7 місяців

д. 2 місяці

е. 4 місяці

233. Укажіть посаду керівника недержавної форми власності, який відповідає за раціональну фінансову

а. Головна сестра медична

б. Директор

с. Старша сестра медична

д. Завідувач відділення

е. Ординатор

234. Укажіть посаду керівника недержавної форми власності, який відповідає за раціональну фінансову

а. Головна сестра медична

б. Директор

с. Старша сестра медична

д. Ординатор

е. Завідувач відділення

235. Укажіть пріоритетні дії медичного працівника перед початком надання невідкладної допомоги по

а. негайно перевезти постраждалого до найближчого медичного закладу

б. Оцінити місце події та впевнитися в безпеці - власній та постраждалого

с. Перевести постраждалого в стабільне бічне положення

д. негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

е. Перевірити в постраждалого життєво важливі показники (пульс, АТ, дихання)

236. Укажіть пріоритетні дії медичного працівника перед початком надання невідкладної допомоги по

а. негайно перевезти постраждалого до найближчого медичного закладу

б. Перевірити в постраждалого життєво важливі показники (пульс, АТ, дихання)

с. Оцінити місце події та впевнитися в безпеці - власній та постраждалого

д. Перевести постраждалого в стабільне бічне положення

е. негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

237. Укажіть технічний нормативний документ, який визначає вимоги до надання медичної допомоги па

а. Комплексні стандарти

б. Формуляр

с. Технологічні стандарти

д. Рецепт

е. Клінічний протокол

238. Укажіть технічний нормативний документ, який визначає вимоги до надання медичної допомоги па

а. Технологічні стандарти

б. Формуляр

с. Комплексні стандарти

д. Клінічний протокол

е. Рецепт

239. Укажіть три основних типи поведінки керівника залежно від стилю лідерства.

а. Демократичний, монархічний, партokraticний

b. Авторитарний, демократичний, ліберальний

c. Демократичний, ліберальний, охлократичний

d. Партократичний, монархічний, ліберальний

e. Анархічний, авторитарний, партократичний

240. Укажіть три основних типи поведінки керівника залежно від стилю лідерства.

a. Демократичний, монархічний, партократичний

b. Партократичний, монархічний, ліберальний

c. Анархічний, авторитарний, партократичний

d. Авторитарний, демократичний, ліберальний

e. Демократичний, ліберальний, охлократичний

241. Укажіть форму первинної медико-санітарної допомоги, надаючи яку, лікар загальної практики опік

a. Екстрена (швидка)

b. Педіатрична

c. Консультативна

d. Спеціальна

e. Сімейна

242. Укажіть форму первинної медико-санітарної допомоги, надаючи яку, лікар загальної практики опік

a. Спеціальна

b. Сімейна

c. Консультативна

d. Педіатрична

e. Екстрена (швидка)

243. Укажіть форму соціального медичного страхування в країнах із розвинутою системою охорони здо

a. Змішане

b. Обов'язкове

c. Державне

d. Приватне

e. Добровільне

244. Укажіть форму соціального медичного страхування в країнах із розвинутою системою охорони здо

a. Приватне

b. Обов'язкове

c. Змішане

d. Добровільне

e. Державне

245. Укажіть частоту компресій на грудну клітку за 1 хв під час проведення серцево-легеневої реаніма

a. 100-120

b. 130-140

c. 60-70

d. 70-80

e. 80-90

246. Укажіть частоту компресій на грудну клітку за 1 хв під час проведення серцево-легеневої реаніма

a. 100-120

b. 70-80

c. 60-70

d. 130-140

e. 80-90

247. Умови денного стаціонару поліклініки передбачають надання медичної допомоги пацієнтам, які не

a. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок

b. Гострий психоз

c. Ускладнений гіпертонічний криз

d. Активна (відкрита) форма туберкульозу

e. -

248. Умови денного стаціонару поліклініки передбачають надання медичної допомоги пацієнтам, які не

a. -

b. Ускладнений гіпертонічний криз

с. Активна (відкрита) форма туберкульозу

д. Гострий психоз

е. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок

249. Унаслідок бойових дій постраждалий опинився під завалами зруйнованої будівлі. Об'єктивно спост

а. Негайно після звільнення розмасажувати стиснуту кінцівку

б. Одразу після звільнення кінцівки підняти її вище рівня голови постраждалого

с. Одразу після звільнення кінцівки розтерти її спиртовмісним розчином

д. Накласти джгут на кінцівку вище місця стиснення після її звільнення

е. Накласти джгут на кінцівку вище місця стиснення перед її звільненням

250. Унаслідок бойових дій постраждалий опинився під завалами зруйнованої будівлі. Об'єктивно спост

а. Одразу після звільнення кінцівки підняти її вище рівня голови постраждалого

б. Негайно після звільнення розмасажувати стиснуту кінцівку

с. Одразу після звільнення кінцівки розтерти її спиртовмісним розчином

д. Накласти джгут на кінцівку вище місця стиснення перед її звільненням

е. Накласти джгут на кінцівку вище місця стиснення після її звільнення

251. Чоловік віком 42 роки отримав проникаючу травму грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: шкі

а. Накласти на рану оклюзійну пов'язку

б. Накласти комірець Шанца

с. Надати постраждалому стабільне бічне положення

д. Прикласти холодний компрес на грудну клітку

е. Провести електричну дефібриляцію

252. Чоловік віком 42 роки отримав проникаючу травму грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: шкі

а. Прикласти холодний компрес на грудну клітку

б. Накласти на рану оклюзійну пов'язку

с. Провести електричну дефібриляцію

д. Накласти комірець Шанца

е. Надати постраждалому стабільне бічне положення

253. Чоловік віком 57 років скаржиться на стискальний пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліве

а. Інфаркту міокарда

б. Ендокардиту

с. Перикардиту

д. Ревматичної хвороби серця

е. Міокардиту

254. Чоловік віком 57 років скаржиться на стискальний пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліве

а. Ревматичної хвороби серця

б. Інфаркту міокарда

с. Перикардиту

д. Ендокардиту

е. Міокардиту

255. Чоловік отримав вогнепальне поранення обличчя. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережен

а. Носоглотковий повітровід

б. Зонд Блекмора

с. Ендотрахеальна трубка

д. Пульсоксиметр

е. Орофарингеальний повітровід

256. Чоловік отримав вогнепальне поранення обличчя. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережен

а. Пульсоксиметр

б. Орофарингеальний повітровід

с. Носоглотковий повітровід

д. Зонд Блекмора

е. Ендотрахеальна трубка

257. Як називаються помилкові або неадекватні дії медичного працівника, що були виконані з профілак

а. Ятрогенія

б. Лікарська помилка

с. Медична помилка

- d. Упущення
- e. Лікарська недбалість

258. Як називаються помилкові або неадекватні дії медичного працівника, що були виконані з профілактичних цілей?

- a. Лікарська помилка
- b. Медична помилка
- c. Лікарська недбалість
- d. Упущення

e. Ятрогенія

259. Як називається комплекс заходів, спрямованих на знищення збудників патогенних мікроорганізмів?

- a. Асептика
- b. Дезінфекція
- c. Дезінсекція
- d. Вакцинація
- e. Дератизація

260. Як називається комплекс заходів, спрямованих на знищення збудників патогенних мікроорганізмів?

- a. Асептика
- b. Дезінфекція
- c. Дератизація
- d. Дезінсекція
- e. Вакцинація

261. Як називається національний документ, що засвідчує право на здійснення медичної діяльності з дозволу держави?

- a. Закон
- b. Ліцензія
- c. Постанова
- d. Припис
- e. Розпорядження

262. Як називається національний документ, що засвідчує право на здійснення медичної діяльності з дозволу держави?

- a. Постанова
- b. Закон
- c. Розпорядження
- d. Ліцензія
- e. Припис

263. Як називається тип професійного спілкування, що передбачає обмін інформацією, пропозиціями, висновками?

- a. Ділове
- b. Товариське
- c. Формальне
- d. Емоційне
- e. Розважальне

264. Як називається тип професійного спілкування, що передбачає обмін інформацією, пропозиціями, висновками?

- a. Товариське
- b. Формальне
- c. Ділове
- d. Емоційне
- e. Розважальне

265. Як називається шкала, що використовується для об'єктивного оцінювання рівня свідомості пацієнта?

- a. Нортон
- b. Франкеля
- c. Глазго
- d. Апгар
- e. Бартела

266. Як називається шкала, що використовується для об'єктивного оцінювання рівня свідомості пацієнта?

- a. Франкеля
- b. Апгар
- c. Бартела
- d. Нортон

е. Глазго

267. Як у медичній організації називається комплекс заходів, спрямований на врахування потреб пацієнтів?

а. Фінансовий менеджмент

б. Маркетинг

с. Адміністративне управління

д. Логістика

е. Управління персоналом

268. Як у медичній організації називається комплекс заходів, спрямований на врахування потреб пацієнтів?

а. Фінансовий менеджмент

б. Маркетинг

с. Логістика

д. Адміністративне управління

е. Управління персоналом

269. Яка група інвалідності встановлюється пацієнту зі стійкими, вираженими функціональними порушеннями?

а. Друга

б. Перша

с. Четверта

д. Третя

е. -

270. Яка група інвалідності встановлюється пацієнту зі стійкими, вираженими функціональними порушеннями?

а. Четверта

б. Третя

с. -

д. Друга

е. Перша

271. Яка з нижченаведених причин є основною для виникнення ділових конфліктів у медичних установах?

а. Відсутність належних умов праці

б. Дисбаланс у розподілі матеріальних ресурсів

с. Нестабільність у суспільстві

д. Низький рівень управлінської культури

е. Дефіцит товарів першої необхідності

272. Яка з нижченаведених причин є основною для виникнення ділових конфліктів у медичних установах?

а. Дефіцит товарів першої необхідності

б. Відсутність належних умов праці

с. Низький рівень управлінської культури

д. Нестабільність у суспільстві

е. Дисбаланс у розподілі матеріальних ресурсів

273. Яка форма медичного страхування згідно із Законом України "Про страхування" реалізується шляхом?

а. Загальне

б. Добровільне

с. Некомерційне

д. Спеціальне

е. Обов'язкове

274. Яка форма медичного страхування згідно із Законом України "Про страхування" реалізується шляхом?

а. Загальне

б. Обов'язкове

с. Добровільне

д. Спеціальне

е. Некомерційне

275. Яка із загальних функцій менеджменту передбачає спонукання працівників організації до високої продуктивності?

а. Мотивація

б. Прогнозування

с. Планування

д. Організація

е. Контроль

276. Яка із загальних функцій менеджменту передбачає спонукання працівників організації до високої продуктивності?

- a. Прогнозування
- b. Планування
- c. Мотивація
- d. Організація
- e. Контроль

277. Який внутрішній змінний фактор в організації визначає поділ праці та відповідальність за виконання завдань?

- a. Організаційна структура
- b. Матеріально-технічні ресурси
- c. Загальні цілі
- d. Трудові ресурси (персонал)
- e. Постановка завдань

278. Який внутрішній змінний фактор в організації визначає поділ праці та відповідальність за виконання завдань?

- a. Матеріально-технічні ресурси
- b. Організаційна структура
- c. Загальні цілі
- d. Постановка завдань
- e. Трудові ресурси (персонал)

279. Який етап алгоритму MARCH передбачає оцінювання прохідності верхніх дихальних шляхів?

- a. A
- b. C
- c. M
- d. H
- e. R

280. Який етап алгоритму MARCH передбачає оцінювання прохідності верхніх дихальних шляхів?

- a. A
- b. M
- c. R
- d. H
- e. C

281. Який лікарський засіб необхідно насамперед застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту з астмою?

- a. Сальбутамол
- b. Азитроміцин
- c. Фуросемід
- d. Дексаметазон
- e. Дротаверин

282. Який лікарський засіб необхідно насамперед застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту з астмою?

- a. Дротаверин
- b. Дексаметазон
- c. Фуросемід
- d. Сальбутамол
- e. Азитроміцин

283. Який лікарський засіб призначають усім здоровим новонародженим дітям у першу добу життя з метою профілактики кровотеч?

- a. Вітамін D
- b. Вітамін C
- c. Вітамін K
- d. Гепарин
- e. Транексамову кислоту

284. Який лікарський засіб призначають усім здоровим новонародженим дітям у першу добу життя з метою профілактики кровотеч?

- a. Транексамову кислоту
- b. Вітамін C
- c. Вітамін D
- d. Гепарин
- e. Вітамін K

285. Який підрозділ організовують в амбулаторно-поліклінічних закладах або поліклінічних відділеннях для надання першої допомоги пацієнтам з гострими захворюваннями?

- a. Відділення реабілітації
- b. Домашній стаціонар
- c. Лікувально-діагностичний центр

d. Денний стаціонар

- e. Центр первинної медико-санітарної допомоги

286. Який підрозділ організовують в амбулаторно-поліклінічних закладах або поліклінічних відділеннях

- a. Лікувально-діагностичний центр

b. Денний стаціонар

- c. Центр первинної медико-санітарної допомоги
- d. Відділення реабілітації
- e. Домашній стаціонар

287. Який саме аспект управлінського процесу стосується створення й закріплення системи прав, обов'

a. Організаційний

- b. Соціальний
- c. Економічний
- d. Технологічний
- e. Правовий

288. Який саме аспект управлінського процесу стосується створення й закріплення системи прав, обов'

a. Організаційний

- b. Технологічний
- c. Правовий
- d. Економічний
- e. Соціальний

289. Який спеціальний державний орган, створений для реформування галузі охорони здоров'я в Україні

a. Національна служба здоров'я України

- b. Центр первинної медико-санітарної допомоги
- c. Міністерство охорони здоров'я України
- d. Обласна державна адміністрація
- e. Кабінет Міністрів України

290. Який спеціальний державний орган, створений для реформування галузі охорони здоров'я в Україні

- a. Кабінет Міністрів України
- b. Обласна державна адміністрація
- c. Міністерство охорони здоров'я України
- d. Центр первинної медико-санітарної допомоги
- e. Національна служба здоров'я України**

291. Який тип організаційної структури дозволяє організувати управлінський процес за схемою: керівни

- a. Матрична

b. Лінійно-функціональна

- c. Лінійно-штабна
- d. Проектна
- e. Дивізіонально-продуктова

292. Який тип організаційної структури дозволяє організувати управлінський процес за схемою: керівни

- a. Матрична
- b. Дивізіонально-продуктова
- c. Проектна

d. Лінійно-функціональна

- e. Лінійно-штабна

293. Який тип управління домінує в медичному закладі, якщо більшу частину повноважень щодо ухвален

- a. Децентралізований

b. Централізований

- c. Лінійно-функціональний
- d. Змішаний
- e. Функціональний

294. Який тип управління домінує в медичному закладі, якщо більшу частину повноважень щодо ухвален

- a. Лінійно-функціональний

b. Децентралізований

c. Централізований

d. Функціональний

e. Змішаний

295. Який із нижченаведених факторів є протипоказанням для лікування пацієнта в умовах домашнього

a. Похилий вік

b. -

c. Часті респіраторні захворювання

d. Тяжкий перебіг захворювання

e. Інвалідність

296. Який із нижченаведених факторів є протипоказанням для лікування пацієнта в умовах домашнього

a. Похилий вік

b. Інвалідність

c. Часті респіраторні захворювання

d. -

e. Тяжкий перебіг захворювання

297. Який інформативно-аналітичний документ на вимогу старшої сестри медичної терапевтичного відд

a. Акт про неявку на роботу

b. Доповідна записка

c. Пояснювальна записка

d. Службова записка про дисциплінарне порушення

e. Заява про звільнення

298. Який інформативно-аналітичний документ на вимогу старшої сестри медичної терапевтичного відд

a. Службова записка про дисциплінарне порушення

b. Заява про звільнення

c. Акт про неявку на роботу

d. Пояснювальна записка

e. Доповідна записка

299. Яку допомогу потрібно надати породіллі в III періоді пологів, якщо плацента не відокремилася пі

a. Спостерігати за кровотечею

b. Ушити розриви промежини

c. Провести ручне відділення та виділення посліду

d. Оглянути пологові шляхи на цілісність

e. Підготувати роділлю до лапаротомії

300. Яку допомогу потрібно надати породіллі в III періоді пологів, якщо плацента не відокремилася пі

a. Ушити розриви промежини

b. Оглянути пологові шляхи на цілісність

c. Спостерігати за кровотечею

d. Підготувати роділлю до лапаротомії

e. Провести ручне відділення та виділення посліду