

1. Яким епітелієм вкрита слизова оболонка дихальної частини порожнини носа?

- a. Багатошаровим плоским
- b. Одношаровим плоским
- c. Специфічним нюхальним
- d. Зроговілим плоским
- e. Багаторядним циліндричним миготливим**

2. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на біль у вусі. Із анамнезу відомо, що хворіє 2 дні, скарги виникли після самостійного видалення сірки зі слухового ходу ватними паличками. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина не змінена, під час натискування на козелок виникає різкий біль. Під час отоскопії виявлено: гіперемія та дифузна інфільтрація шкіри зовнішнього слухового ходу, барабанна перетинка гіперемована по краю, слух не порушений. Який найімовірніший діагноз?

- a. Дифузний зовнішній отит**
- b. Фурункул зовнішнього вуха
- c. Стороннє тіло вуха
- d. Екзема зовнішнього слухового проходу
- e. Загострення хронічного середнього отиту

3. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C , загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х днів. Під час орофарингоскопії виявлено: піднебінні мигдалики гіперемовані, набряклі, вогнищево вкриті нальотом білого кольору, піднебінні дужки гіперемовані, набряклі. Лікар провів забір зразків матеріалу на мікробіологічну діагностику, але їхнє транспортування безпосередньо в лабораторію на момент прийому неможливе. Які умови зберігання тампона із зібраним матеріалом?

- a. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C максимум 12 год
- b. Зберігати тампон у термостаті при температурі 37°C , доки не відкриють лабораторію
- c. Зберігати тампон у холодильнику при температурі $4-6^{\circ}\text{C}$ максимум 12 год**
- d. Зберігати тампон у холодильнику при температурі $4-6^{\circ}\text{C}$, доки не відкриють лабораторію
- e. Зберігати тампон у термостаті при температурі 20°C максимум 24 год

4. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на задишку під час незначного фізичного навантаження, захриплість. Із анамнезу відомо, що появу цього стану пов'язує із перенесеною тотальною тиреоїдектомією рік тому. Об'єктивно спостерігається: втягування міжреберних проміжків на вдиху. ЧД - 24/хв, голос практично відсутній. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка - рожева, без набряку, голосова щілина звужена, складки сірі, розташовані парамедіально, нерухомі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Посттравматична деформація гортані
- b. Гранулематоз Вегенера
- c. Парез верхнього гортанного нерва
- d. Органічний центральний параліч гортані
- e. Парез зворотного гортанного нерва**

5. Трирічна дитина вночі несподівано прокинулася. Об'єктивно спостерігається: грубий "гавкаючий" кашель, дихання шумне, уривчасте, під час вдиху втягуються міжреберні проміжки, губи ціанотичні, голос звучний, температура тіла - $37,3^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що 2-гу добу хворіє на ГРВІ. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт**
- b. Дифтерія гортані
- c. Гострий геморагічний ларингіт
- d. Гострий флегмонозний ларингіт
- e. Скарлатина

6. У пацієнта віком 45 років, який скаржиться на хронічну захриплість голосу, під час непрямой ларингоскопії виявлено параліч правої голосової складки. З анамнезу відомо, що жодних травм чи операцій у ділянці шиї не було. Яке дослідження обов'язково потрібно провести пацієнту в цьому разі?

- a. МРТ шийного та грудного відділу хребта
- b. КТ голови та шиї, КТ органів грудної клітки**
- c. Рентгенографію шиї в бічній проекції
- d. КТ головного мозку
- e. Рентгенографію грудної клітки у прямій і бічній проекціях

7. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на утруднення носового дихання, сухість у горлі, охриплість, постійне відхаркування кірок. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 15-ти років. Під час риноскопії та фарингоскопії виявлено: сухі кірки, інфільтрати та рубцеві зміни слизової оболонки. Під час ларингоскопії виявлено: гіперемія слизової оболонки, кірки на голосових складках, інфільтрат під правою голосовою складкою. Який найімовірніший діагноз?

- a. Дифтерія гортані
- b. Туберкульоз гортані
- c. Гранулематоз із поліангіїтом
- d. Папіломатоз гортані
- e. Склерома гортані**

8. Під час очищення зовнішнього слухового проходу у пацієнта виникла кровотеча. Яку невідкладну допомогу необхідно надати першочергово?

- a. Покласти пацієнта на здоровий бік, промити слуховий прохід та накласти асептичну пов'язку
- b. Шпиталізувати до спеціалізованого відділення
- c. Промити слуховий прохід, увести марлеву турунду
- d. Покласти пацієнта на здоровий бік, увести в слуховий прохід стерильну турунду**
- e. -

9. Пацієнт віком 26 років скаржиться на відчуття закладеності у вухах і зниження слуху, що з'явилося під час польоту в літаку. Після ковтання, позіхання слух частково відновлюється. Під час отоскопії виявлено: барабанні перетинки з обох боків - сіро-перламутрові з вираженими пізнавальними пунктами, втягнуті, інші ЛОР-органи в нормі. Укажіть анатомічну структуру, у якій відбулося порушення прохідності в пацієнта.

- a. Носоглотка
- b. Зовнішній слуховий хід
- c. Слухова труба**
- d. Носова порожнина
- e. Ротоглотка

10. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на виражений біль у правому вусі, що іррадіює в зуби та скроню, закладеність вуха, головний біль, підвищення температури тіла до $37,9^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, захворюванню передувала нежить. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина не змінена, зовнішній слуховий хід вільний, барабанна перетинка гіперемована, інфільтрована, випинає, пізнавальні орієнтири не визначаються. Пальпація та перкусія соскоподібного відростка безболісна. Шепіт сприймає правим вухом із відстані 1,5 метра. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий середній отит**
- b. Гостра нейросенсорна приглухуватість
- c. Стороннє тіло вуха
- d. Фурункул зовнішнього вуха
- e. Загострення хронічного середнього отиту

11. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, постійний шум у вухах. Із анамнезу відомо, що хворіє більше 10-ти років, працювала на бавовняному комбінаті в умовах сильного шуму. Отоскопія та інші ЛОР-органи без патологічних змін. Чує шепіт на відстані 2 м кожним вухом. Гірше чує високі звуки. У досліді Вебера латеризація звуку відсутня. Дослід Рінне та Желле - позитивні. Дослід Швабаха - вкорочений. Який найімовірніший діагноз?

- a. Тимпаносклероз
- b. Хронічний двосторонній адгезивний середній отит
- c. Хронічна двостороння сенсоневральна приглухуватість**
- d. Хронічний двосторонній катар середнього вуха

е. Отосклероз

12. Пацієнт віком 27 років скаржиться на виражений біль у лівому крилі носа, набряк тканин, що розповсюджується на щоку та нижню повіку з лівого боку, підвищення температури тіла до $38,1^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: шкіра в ділянці зовнішнього носа ліворуч інфільтрована, гіперемована, напружена, різко болюча під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

а. Фурункул носа

- b. Сикоз присінка носа
- c. Реактивний набряк повіки
- d. Бешиха зовнішнього носа
- e. Тромбоз кавернозного синуса

13. Які основні симптоми тимпанального отосклерозу?

- a. Флюктуюче зниження слуху, низькочастотний шум
- b. Нормальний слух, високочастотний шум
- c. Глухота, відсутність шуму
- d. Гноєтеча з вуха, прогресуюче зниження слуху, низькочастотний шум

е. Прогресуюче зниження слуху, середньочастотний шум

14. До якої анатомічної структури може перейти інфекція у разі фурункула зовнішнього слухового проходу?

а. Привушної слинної залози

- b. Середньої мозкової ямки
- c. Очниці
- d. Підщелепної слинної залози
- e. Печеристого синусу

15. Які з нижченаведених артерій беруть участь у кровопостачанні піднебінних мигдаликів?

а. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та нижня щитоподібна

b. Язикова, лицева, висхідна глоткова та верхньощелепна

- c. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхня та нижня щитоподібна
- d. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та очна
- e. Язикова, лицева, висхідна глоткова, верхньощелепна та верхня щитоподібна

16. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на закладеність і сухість у носі, носове дихання погіршується в горизонтальному положенні і в задушливому приміщенні. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 6-ти років. Регулярно користується судинозвужувальними краплями, які покращують дихання на 2-3 год. Під час передньої риноскопії виявлено: нижні носові раковини збільшені в об'ємі, носові ходи звужені, слизова оболонка носа ціанотична, місцями на ній визначаються білі плями. Використання судинозвужувальних крапель призводить до різкого зменшення об'єму носових раковин. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий катаральний риніт
- b. Хронічний катаральний риніт
- c. Вазомоторний риніт, алергічна форма
- d. Хронічний гіпертрофічний риніт
- е. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма**

17. Яке захворювання характеризується наявністю клітин Мікулича в біоптатних зразках із носа та може викликати обструкцію (стеноз) носа та гортані?

- a. Ринофіма
- b. Туберкульоз
- c. Риносклерома**
- d. Сифіліс
- e. Гранулематоз із поліангіїтом

18. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на інтенсивний біль у правому вусі, з іррадіацією у скроню, зниження слуху, підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє другий день. За результатами отоскопії виявлено: зовнішній слуховий прохід без явищ

запалення, барабанна перетинка гіперемована, без пізнавальних контурів, випинає. Пальпація соскоподібного відростка безболісна. Який найімовірніший діагноз?

a. Загострення хронічного мезотимпаніту

b. Гострий правобічний середній отит

c. Гострий мастоїдит

d. Гострий зовнішній дифузний отит

e. Секреторний отит

19. До лікаря-отоларинголога звернулася мати із п'ятирічною дитиною зі скаргами на те, що дитина постійно ходить із відкритим ротом, погано дихає носом, має часто нежить, хропить. Під час ендоскопічного огляду виявлено: аденоїд повністю перекриває хоани. Алергічний анамнез не обтяжений. Який найімовірніший діагноз?

a. Гіпертрофія аденоїда IV стадії

b. Атрезія хоан

c. Гіпертрофія аденоїда III стадії

d. Хронічний назофарингіт

e. Аденоїдит

20. У пацієнта віком 30 років під час проведення камертонального дослідження виявлено: Швабах подовжений. Який тип ураження слуху в цього пацієнта?

a. Змішана приглухуватість

b. Ураження звукосприйняття

c. Ураження мозочка

d. Ураження стовбура мозку

e. Ураження звукопроведення

21. Шестирічна дитина скаржиться на біль у правому вусі. Із анамнезу відомо, що тиждень тому перехворіла на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: дитина дихає ротом та гугнявить, часто перепитує, слизова оболонка носа - рожева, у задніх відділах порожнини носа візуалізується помірна кількість в'язкого слизу, який стікає по задній стінці глотки. Яке обстеження є недоцільним у цьому разі?

a. Задня риноскопія

b. Ендоскопія носоглотки

c. Тимпанометрія

d. МРТ приносових пазух

e. Пальцеве дослідження носоглотки

22. За яким критерієм оцінюється ступінь важкості перебігу гострого тонзиліту?

a. Генералізована лімфаденопатія

b. ШОЕ

c. Температурна реакція

d. Регіонарна лімфаденопатія

e. Рівень болю в горлі

23. У чотирирічної дитини протягом року прогресує дисфонія та утруднення дихання. На біль не скаржиться, загальний стан задовільний. Голос майже беззвучний, при вдиху - залучення яремної ямки. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка - рожева, складки - сірі, рухомі, змикаються не повністю, на них численні вузлики сіро-рожевого кольору, що частково звувають голосову щілину. Який найімовірніший діагноз?

a. Папіломатоз гортані

b. Пухлина гортані

c. Дифтерія гортані

d. Туберкульоз гортані

e. Гранулематоз із поліангіїтом

24. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2N1 після хірургічного лікування (надскладкової резекції та шийної лімфаденектомії) під час гістологічного дослідження виявлено: позитивні краї резекції (наявність залишкової пухлини). Яке подальше

лікування необхідно провести пацієнту?

- a. Радикальна хіміотерапія
- b. Паліативна хіміотерапія
- c. Спостереження, при виявленні активного росту - радикальна хіміотерапія
- d. Повторна резекція або променева терапія**
- e. Спостереження, при виявленні активного росту - повторна резекція або променева терапія

25. Гілки якого нерва здійснюють чутливу іннервацію носа?

- a. Лицевого
- b. Трійчастого**
- c. Блукаючого
- d. -
- e. Нюхового

26. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на гнійні виділення з обох половин носа, утруднення носового дихання, головний біль, важкість у ділянці щік, підвищення температури тіла до $38,4^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня, захворювання пов'язує із застудою. Об'єктивно спостерігається: болісність під час пальпації в ділянці щік, слизова оболонка носа гіперемована, набрякла, у середніх носових ходах - смужки гною. За результатами рентгенологічного дослідження виявлено: затемнення обох верхньощелепних пазух. Встановлено діагноз: гострий бактеріальний риносинусит. Яку групу антибактеріальних препаратів необхідно призначити першочергово?

- a. Захищені пеніциліни**
- b. Цефалоспорини третього покоління
- c. Макроліди
- d. Цефалоспорини другого покоління
- e. Аміноглікозиди

27. Укажіть мінімальний термін тривалості симптомів для встановлення діагнозу: хронічний риносинусит.

- a. 12 тижнів**
- b. 20 тижнів
- c. 6 місяців
- d. 8 тижнів
- e. 2 роки

28. Що досліджується під час виконання досліду Тойнбі?

- a. Пошкодження слуху за звукоприймальним типом
- b. Пошкодження слуху за звукопровідним типом
- c. Рухомість стремінця
- d. Прохідність внутрішньої слухової труби**
- e. Визначається латералізація звуку

29. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, біль під час ковтання слини та їжі, підвищення температури тіла до 39°C . Під час орофарингоскопії виявлено: рот відкривається вільно, передні піднебінні дужки - гіперемовані, набряклі, піднебінні мигдалики збільшені, червоного кольору, на їх поверхні є біло-жовтий наліт, що не поширюється за межі мигдалика та легко знімається шпателем. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хронічний тонзиліт
- b. Гострий тонзиліт**
- c. Гострий катаральний тонзиліт
- d. Паратонзиллярний абсцес
- e. Дифтерія глотки

30. Для якого ускладнення гострого риносинуситу характерна така картина комп'ютерної томографії: субтотальне затемнення лівої лобової та верхньощелепної пазух і комірок решітчастого лабіринту, субперіостальна остеомалія лобової кістки ліворуч із ерозією передньої та задньої стінок лівої лобової пазухи?

- a. Абсцесу лобової частки головного мозку
- b. Остеомієліту лобової пазухи (пухлини Потта)**
- c. Остеоперіоститу лобової пазухи
- d. Ретробульбарного абсцесу
- e. Флегмони орбіти

31. До приймального відділення лікарні звернулися схвильовані батьки із дворічним хлопчиком, який раптово прокинувся серед ночі із сухим, гавкаючим кашлем, який постійно погіршувався. Хлопчик не міг заснути, став неспокійним, температура тіла субфебрильна. Які лікарські засоби згідно з міжнародними рекомендаціями розглядаються як перша лінія допомоги в цьому разі?

- a. Дексаметазон/преднізолон**
- b. Епінефрин/дротаверин
- c. Преднізолон/хлоропірамін
- d. Дротаверин/дексаметазон
- e. Хлоропірамін/дезлоратадин

32. Пацієнтка віком 43 роки перед проведенням синусліфтингу була спрямована на КТ верхньої щелепи та приносових пазух. За результатами КТ дослідження виявлено: двобічне інтенсивне негомogene зниження пневматизації обох верхньощелепних пазух та решітчастого лабіринту. Встановлено діагноз: хронічний риносинусит із поліпами. Яке лікування показано пацієнтці?

- a. Двобічна мікрогайморотомія
- b. Двобічна гайморотомія за Калдвел-Люком
- c. Двобічна пункція верхньощелепних пазух
- d. Двобічна гайморо-етмоїдотомія зовнішнім доступом
- e. Функціональна ендоскопічна хірургія синусів**

33. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на зниження слуху, періодичний біль у вусі з наявністю гнійних виділень, які зникають після закапування антибактеріальних крапель ендаурально. Із анамнезу відомо, що останнє загострення було 6 місяців тому. Під час отоскопії спостерігається: центральна суха перфорація в натягнутій частині барабанної перетинки. На аудіограмі: кістково-повітряний інтервал в 40 Дб, кісткова провідність збережена. За результатами КТ виявлено: відсутність деструкції кістки. Яка тактика лікування пацієнтки?

- a. Шунтування барабанної порожнини
- b. Тимпанопластика**
- c. Кохлеарна імплантація
- d. Консервативне лікування
- e. Сануюча операція на середньому вусі

34. Пацієнт віком 49 років скаржиться на осиплість голосу, що турбує протягом року. Із анамнезу відомо, що курить упродовж 28-ми років. Об'єктивно спостерігається: у порожнині глотки патологічних змін немає. Під час непрямой ларингоскопії виявлено: горбистий інфільтрат на лівій голосовій складці, рухомість обмежена. У підскладковому просторі - без змін. Лікар запідозрив новоутворення гортані. Який метод є обов'язковим у діагностиці раку гортані?

- a. Біопсія**
- b. Мікроларингоскопія
- c. Томографія гортані
- d. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів
- e. Цитологія

35. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль та почервоніння в ділянці лівого очного яблука. Із анамнезу відомо, що протягом останніх 4-х тижнів турбували закладеність носа, однобічні гнійні виділення з носа, головний біль, хворіє на хронічний риносинусит впродовж 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: почервоніння та набряк тканин у ділянці внутрішнього краю орбіти ліворуч, незначне обмеження рухливості лівого очного яблука в горизонтальній площині. Гострота зору не змінена. Яке риногенне ускладнення виникло в пацієнта?

- a. Флегмона орбіти
- b. Реактивний набряк повіки**

с. Абсцес орбіти

d. Субперіостальний абсцес орбіти

е. Тромбофлебіт кавернозного синуса

36. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 39^oC. Під час орофарингоскопії виявлено: слизова оболонка ротової порожнини - яскраво-рожева, на нижній губі та щоках візуалізуються поодинокі афти, піднебінні мигдалики, піднебінні дужки та задня стінка глотки - яскраво-рожеві, набряклі. Передньо-шийні лімфатичні вузли збільшені, болючі, рухомі. Зі слів матері пацієнтки відомо, що аналогічні випадки трапляються періодично протягом останніх 2-х років. Який найімовірніший діагноз?

a. Хронічний фарингіт

b. Рекурентний тонзиліт

с. Синдром PFAPA

d. Лептотрихоз

е. Афтозний стоматит

37. Що таке грушоподібні ямки?

a. Заглиблення між боковою стінкою глотки та гортанню

b. Заглиблення між передньою та задньою піднебінними дужками

с. Заглиблення між вестибулярною та голосовою складками

d. Заглиблення між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика

е. Інша назва хоан

38. У якому квадранті барабанної перетинки виконують парацентез або тимпанотомію?

a. У передньо-верхньому

b. У задньо-верхньому

с. У передньо-нижньому

d. У двох передніх

е. У задньо-нижньому

39. Якою отоскопічно буде барабанна перетинка при секреторному отиті?

a. Перфорована

b. Мутна, гіперемована та різко втягнута

с. Дещо мутна, з рубцевими змінами

d. Без змін

е. Набрякла, ціанотична та випнута

40. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на постійну охриплість та утруднення дихання під час респіраторних вірусних захворювань. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися два роки тому, після струмектомії з приводу вузлуватого зоба. Об'єктивно спостерігається: ліва голосова складка білого кольору, нерухома під час фонації та дихання, права голосова складка активно рухається. Який найімовірніший діагноз?

a. Параліч лівого заднього верхнього гортанного нерва

b. Параліч правого передньо верхнього гортанного нерва

с. Параліч лівого зворотного нерва

d. Параліч правого зворотного нерва

е. Параліч лівого переднього верхнього гортанного нерва

41. Пацієнт віком 62 роки протягом року лікувався з приводу хронічного гіперпластичного ларингіту. Під час непрямой ларингоскопії виявлено: потовщення, тьмяність та застійна гіперемія голосових складок, поодинокі слизові нальоти. При більш детальному обстеженні фіброскопом виявлена неглибока виразка в ділянці основи надгортанника діаметром 0,6 см із дном, вкритим фібриновим нальотом та судинною ін'єкцією по периферії, яка розповсюджується на праву та ліву голосові складки. Рухомість надгортанника та голосових складок порушена. Під час патогістологічного дослідження біоптату пухлини спостерігається: плоскоклітинний рак. Виявлено збільшення передньошийних лімфатичних вузлів, які мають щільну консистенцію, неоднорідні, не болючі та визначаються окремими конгломератами. Під час проведення ПЕТ-КТ ураження інших органів і систем не виявлено. Який із діагнозів

найбільш точно характеризує анатомічну поширеність ураження за класифікацією TNM?

- a. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N0, M0
- b. Рак гортані вестибулярної локалізації T1, N1, M1
- c. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N0, M1
- d. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M0**
- e. Рак гортані вестибулярної локалізації T2, N1, M1

42. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано у стані вираженого оглушення. Збір анамнезу утруднений через тяжкий загальний стан пацієнта. Об'єктивно спостерігається: пульс - 106/хв, ЧД - 26/хв, сатурація - 94%, температура тіла - 38,2^оС. Наявна ригідність потиличних м'язів та позитивний симптом Керніга з обох боків. З лівого вуха витікають виділення з неприємним запахом, після туалету вуха виявляється крайова перфорація в ненацягнутій частині барабанної перетинки. Який найімовірніший діагноз?

- a. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит
- b. Лівобічний хронічний середній отит, менінгіт**
- c. Отосклероз
- d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- e. Хвороба Мен'єра

43. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на утруднене носове дихання, масивні водянисті виділення з носа, чхання. Із анамнезу відомо, що скарги з'являються щороку на початку липня. Під час передньої риноскопії виявлено: нижні носові раковини збільшені в об'ємі, носові ходи звужені, слизова оболонка носа ціанотична, місцями на ній визначаються білі плями. Встановлено діагноз: сезонний алергічний риніт. Яка тактика лікування в цьому разі?

- a. Промивання носа сольовим розчином, назальний кортикостероїд**
- b. Антибактеріальна терапія
- c. Промивання носа сольовим розчином, в'яжучі антисептики до носа
- d. Судинозвужувальні та секретолітичні препарати
- e. Нестероїдні протизапальні препарати, судинозвужувальні препарати

44. Чим утворена верхня стінка порожнини носа?

- a. Виличною кісткою
- b. Верхньою щелепою
- c. Ситоподібною пластинкою решітчастої кістки**
- d. Перпендикулярною пластинкою решітчастої кістки
- e. -

45. Пацієнту встановлено попередній діагноз: правобічний мастоїдит. Який метод дослідження буде найінформативнішим для підтвердження діагнозу?

- a. Рентгенографія скроневої кістки по Шуллеру
- b. КТ скроневих кісток**
- c. КТ голови
- d. Рентгенографія скроневої кістки по Стенверсу
- e. Рентгенографія скроневої кістки по Майєру

46. При яких хворобах вуха утворюється холестеатома?

- a. Хронічному секреторному отиті
- b. Хронічному доброякісному гнійному середньому отиті
- c. Гострому гнійному середньому отиті
- d. Хронічному злоякісному гнійному отиті, ателектатичному отиті**
- e. Хронічному гнійному середньому отиті з центральною перфорацією

47. Під час активних ворожих дій на лінії розмежування бойовий медик помітив, що його побратим гучно закричав та впав на землю. За декілька секунд одяг пораненого в ділянці ноги почав просякати кров'ю. Який перший крок повинен виконати бойовий медик у цьому разі?

- a. Очистити дихальні шляхи від сторонніх предметів
- b. -
- c. Подбати про безпечність місця надання допомоги**

- d. Провести непрямий масаж серця
- e. Накласти турнікет потерпілому

48. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на незначний біль та дискомфорт у горлі ліворуч під час ковтання, неприємний запах з рота. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - $37,2^{\circ}\text{C}$. Під час орофарингоскопії виявлено: у ділянці верхнього полюса лівого піднебінного мигдалика візуалізується виразка з нерівними краями, покрита сірувато-жовтим нальотом. Під час пальпації шиї ліворуч відзначаються збільшені та болючі лімфатичні вузли. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий стрептококовий тонзиліт
- b. Сифіліс-асоційований тонзиліт
- c. Пухлина мигдалика
- d. Паратонзиллярний абсцес
- e. Ангіна Симановського-Венсана-Плаута

49. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на біль та поколювання з правого боку горла, що посилюється під час ковтання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х днів, симптоми з'явилися після того, як пацієнтка їла смажену рибу. Температура тіла нормальна. Який найімовірніший діагноз?

- a. Стоматит
- b. Стороннє тіло у глотці
- c. Гострий фарингіт
- d. Гострий тонзиліт
- e. Паратонзиліт

50. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на зниження слуху та середньочастотний суб'єктивний шум на обидва вуха. Із анамнезу відомо, що захворіла приблизно 7 років тому після другої вагітності та пологів. Почалася хвороба зі зниження слуху на праве вухо та шуму, 5 років тому приєдналися такі ж симптоми на лівому вусі. Під час отоскопії виявлено: обидві барабанні перетинки - сірі, блискучі, рухомі. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне - "-" на обидва вуха, Вебер - вправо. На аудіограмі спостерігається: повітряно-кістковий розрив на обох вухах, більше праворуч, та ніша Кархарт - на 1000 Гц кісткової провідності. Який найімовірніший діагноз?

- a. Отосклероз
- b. Хвороба Мен'єра
- c. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- d. Хронічна правобічна сенсоневральна приглухуватість
- e. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість

51. Де знаходяться валекули?

- a. Між боковою стінкою глотки та гортанню
- b. Між черпакувато-надгортанною складкою та боковою стінкою гортані
- c. У грушоподібних ямках
- d. Між язиковою поверхнею надгортанника та коренем язика
- e. Між вестибулярною та голосовою складками

52. Пацієнт віком 40 років скаржиться на зниження слуху на ліве вухо після акустичної травми на виробництві. Під час отоскопії виявлено: барабанні перетинки з обох боків - сіро-перламутрові з вираженими пізнавальними пунктами, інші ЛОР-органи в нормі. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне з лівого боку - слабкопозитивний, Вебер - у праве вухо, Швабах - вкорочений із лівого боку. Укажіть тип втрати слуху.

- a. Кондуктивний
- b. Травматичний
- c. Перцептивний
- d. Змішаний
- e. Виробничий

53. Десятирічного хлопчика шпиталізовано зі стенозом гортані IV стадії. Визначте оптимальний

вид хірургічного втручання.

- a. Канюляція трахеї
- b. Інтубація гортані
- c. Ларингофісура
- d. Конікотомія**
- e. Трахеостомія

54. Між якими хрящами розташована конічна зв'язка?

- a. Черпакуватими
- b. Щитоподібним та перснеподібним**
- c. Рожковидними
- d. Надгортанником та перснеподібним
- e. Клиноподібними

55. На огляд до лікаря-отоларинголога звернувся пацієнт, якого турбує зміна голосу (осиплість) упродовж 2-х місяців. Яке рутинне обстеження повинен провести лікар-отоларинголог у цьому разі?

- a. Пряму ларингоскопію
- b. Електроміографію гортані
- c. Рентгенографію гортані
- d. Стробоскопію гортані
- e. Непряму ларингоскопію**

56. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху на обидва вуха, шум у вухах. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 5 років тому після пологів. Об'єктивно спостерігається: з обох боків зовнішні слухові ходи широкі, шкіра слухового ходу стоншена, сірка відсутня. Під час огляду барабанної перетинки з обох боків - позитивний симптом "рожевої плями". Інші ЛОР-органи - без патології. Шепіт чує: праве вухо - 1 м, ліве вухо - 1 м. Дослід Рінне "-" з обох боків. На тональній аудіограмі: кістково-повітряний розрив до 40 дБ при нормальній кістковій провідності на обох вухах. Який найімовірніший діагноз?

- a. Отосклероз, тимпанальна форма**
- b. Двобічна хронічний ексудативний отит
- c. Двобічна хронічна сенсоневральна приглухуватість
- d. Отосклероз, кохлеарна форма
- e. Двобічний хронічний катар середнього вуха

57. У пацієнта із плоскоклітинним раком вестибулярного відділу гортані T2 після курсу радикальної променевої терапії виявлено залишкову пухлину. Яке подальше лікування необхідно провести пацієнту?

- a. Паліативна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз
- b. Повторний курс променевої терапії
- c. Променева терапія + хіміотерапія
- d. Хірургічне видалення + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз**
- e. Радикальна хіміотерапія + шийна дисекція, якщо виявлено метастаз

58. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на відчуття сухості, подряпання, лоскотання в носі, чхання, підвищення температури тіла до 38,2^oC. Із анамнезу відомо, що хворіє 1 день. Під час передньої риноскопії виявлено: слизова оболонка носа гіперемована, суха, набрякла. Дихання через ніс дещо утруднене. Інші ЛОР-органи без патології. Який найімовірніший діагноз?

- a. Вазомоторний риніт, алергічна форма
- b. Гострий вірусний риносинусит**
- c. Гострий ринофарингіт
- d. Загострення хронічного катарального риніту
- e. Гострий травматичний риніт

59. Із якими з нижченаведених анатомічних утворень межує верхньощелепна пазуха?

- a. Порожниною рота, орбітою, шилоподібним відростком
- b. Порожниною рота, орбітою, соскоподібним відростком

- c. Порожниною носа, собачою ямкою, комірковим відростком верхньої щелепи
- d. Порожниною носа, орбітою, соскоподібним відростком
- e. Порожниною носа, орбітою, комірковим відростком верхньої щелепи**

60. Мати семирічного хлопчика скаржиться на те, що в її дитини постійний нежить, відсутнє дихання носом, вночі дитина спить із відкритим ротом і хропить, часом на ранок відзначається блювання. Із анамнезу відомо, що протягом останніх 3-х місяців дитина тричі хворіла на гострий гнійний середній отит. Об'єктивно спостерігається: відкритий рот, згладження носогубної складки. Під час орофарингоскопії виявлено: прикус деформований, готичне піднебіння. Під час риноскопії візуалізується пухлинне утворення носоглотки, що повністю перекриває обидві хоани. Який найімовірніший діагноз?

- a. Викривлення носової перегородки
- b. Ювенільна ангіофіброза носоглотки
- c. Хронічний поліпозний риносинусит
- d. Аденоїдні вегетації**
- e. Гострий бактеріальний риносинусит

61. У п'ятирічної дитини спостерігається утруднення дихання, що з'явилося після випадкового вдиху насіння квасолі. Відразу з'явилося наростаюче утруднене дихання та ціанотичність кінцівок. Лікар провів прийом Геймліха, проте він виявився неефективним. Об'єктивно спостерігається: стан дитини тяжкий, дихання різко утруднене, поверхнєве, шумне, відзначається втягнення міжреберних проміжків, епігастральної ділянки над- і підключичних ямок. Пульс частий зі слабим наповненням, шкірні покриви ціанотичного кольору, вологі. Яка тактика лікування дитини в цьому разі?

- a. Ургентна трахеостомія**
- b. Введення адреналіну внутрішньовенно
- c. Інтубація трахеї
- d. Киснева маска
- e. Введення кортикостероїдів внутрішньовенно

62. Пацієнт віком 60 років скаржиться на колючий біль під час ковтання. Із анамнезу відомо, що скарги пов'язує із вживанням риби годину тому. За результатами фарингоскопії стороннє тіло не виявлено. Під час ларингоскопії в правій валекулі візуалізується риб'яча кістка. Яким способом необхідно видалити стороннє тіло?

- a. Горловим корцангом при фарингоскопії
- b. Горловим корцангом при непрямій ларингоскопії**
- c. Горловим корцангом при прямій ларингоскопії
- d. Видалення кістки не є обов'язковим
- e. Зовнішнім доступом

63. Під час виконання бойової задачі військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму із втратою свідомості. Об'єктивно спостерігається: утруднене дихання, що супроводжується "булькаючими" звуками. Які дії необхідно виконати на етапі евакуації відповідно до протоколу MARCH?

- a. Конікотомію
- b. Потрійний прийом Сафара
- c. Інтраназальне введення назофарингіальної трубки**
- d. Інтубацію трахеї
- e. Трахеотомію

64. Яким епітелієм вистилається носоглотка?

- a. Однорядним кубічним
- b. Плоским зроговілим
- c. Багаторядним кубічним
- d. Миготливим багаторядним**
- e. Багатошаровим плоским

65. Мати чотирирічної дівчинки скаржиться на те, що дитина погано дихає носом, постійно

ходить із відкритим ротом, має частий нежить, хропіння та зупинки дихання вночі. Об'єктивно спостерігається: згладжені носогубні складки, напіввідкритий рот, змінений прикус. Під час ендоскопічного огляду носа виявлено: слизова оболонка набрякла, глотковий мигдалик повністю перекриває хоани. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гіпертрофія глоткового мигдалика II ступеня
- b. Гіпертрофія глоткового мигдалика III ступеня**
- c. Хронічний назофарингіт
- d. Гострий тонзилофарингіт
- e. Гіпертрофія глоткового мигдалика I ступеня

66. Укажіть місце відкриття співустя лобової пазухи.

- a. -
- b. Нижній носовий хід
- c. Загальний носовий хід
- d. Середній носовий хід**
- e. Верхній носовий хід

67. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до 38-38,5 °C, утруднене носове дихання. Із анамнезу відомо, що 7 днів тому пацієнт потрапив у ДТП та отримав травму носа. По медичну допомогу не звертався. Об'єктивно спостерігається: тканини зовнішнього носа набряклі, червоного кольору, пальпаторно безболісні. Під час передньої риноскопії виявлено: з обох боків перегородки носа визначається випинання ціанотично-червоного кольору, м'якої консистенції. Після місцевої анестезії лікарем проведено розтин у ділянці випинання на переділці носа, отримано 3 мл гною. Який найімовірніший діагноз?

- a. Перелом лицевого черепа
- b. Гематома носової перегородки
- c. Посттравматична деформація носа
- d. Саркома капоші
- e. Абсцес носової перегородки**

68. Батьки однорічної дитини скаржаться, що посеред ночі в дитини розвинувся специфічний гавкаючий кашель, який переріс у задишку. Із анамнезу відомо, що за декілька днів до цього в дитини був нежить, закладений ніс, субфебрильна температура тіла. Об'єктивно виявлено: загальний стан дитини середньої тяжкості, шкіра бліда, ціанозу не виявлено. Під час вдиху в спокої спостерігається втягнення надгруднинного та міжреберних проміжків. Визначте ступінь тяжкості гострого стенозуючого ларинготрахеїту в дитини.

- a. Середньої тяжкості**
- b. Асфіксія
- c. Загроза дихальної недостатності
- d. Легкого ступеня
- e. Тяжкого ступеня

69. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на запаморочення, хиткість під час ходьби, слизисто-гнійні виділення з правого вуха. Із анамнезу відомо, що періодичні гнійні виділення з правого вуха турбують протягом 20-ти років. Два дні тому збільшилися слизисто-гнійні виділення з неприємним запахом у правому зовнішньому слуховому ході, вперше з'явилися запаморочення та хиткість ходи. Під час отоскопії виявлено: у зовнішньому слуховому ході праворуч візуалізуються слизисто-гнійні виділення з неприємним запахом, барабанна перетинка - рожева з крайовою перфорацією в передньоверхньому квадранті. Виявлена позитивна фістульна проба, горизонтальний дрібнорозмашистий ністагм під час погляду вправо. Під час ходьби відхиляється вліво, у позі Ромберга падає вліво, при повороті голови напрямок падіння змінюється. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хронічний гнійний ексудативний отит, ускладнений обмеженим лабіринтитом
- b. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений абсцесом мозочка
- c. Хронічний гнійний епітимпаніт праворуч, ускладнений гострим серозним обмеженим лабіринтитом**

- d. Хронічний гнійний мезотимпаніт праворуч, ускладнений обмеженим лабіринтитом
- e. -

70. У п'ятирічного хлопчика спостерігаються такі симптоми: відмовляється від їжі, важко ковтає, голос гугнявий, мовлення нерозбірливе. Із анамнезу відомо, що дитина нещодавно переохворіла на ГРВІ. Об'єктивно виявлено: голова дещо відкинута назад і нахилена вліво, глотка гіперемована, на задній стінці ліворуч відзначається пухлиноподібне утворення, м'яке та болюче на дотик, що переходить у носоглотку. Температура тіла - $38,5^{\circ}\text{C}$) Шийні лімфатичні вузли набрякли та болючі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Заглотковий абсцес
- b. Аденоїдні вегетації
- c. Гострий катаральний тонзиліт
- d. Лівобічний паратонзиллярний абсцес
- e. Інфекційний мононуклеоз

71. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: під час пальпації шийні лімфатичні вузли збільшені, болісні, слизова оболонка ротоглотки гіперемована, піднебінні мигдалики збільшені та покриті нашаруванням. Укажіть кількість балів за Шкалою McIsaac, яка відповідає стану пацієнтки.

- a. 1
- b. 3
- c. 4
- d. 2
- e. 5

72. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття, підвищення температури тіла до $37,7^{\circ}\text{C}$, утруднене носове дихання. Із анамнезу відомо, що впродовж 7-ми днів хворіє на ГРВІ. День тому з'явилося відчуття тиску в правій щогці, що підсилюється при нахилах голови. Під час ендоскопії носа виявлено: слизова оболонка гіперемована, набрякла, в остіомеатальному комплексі праворуч візуалізується гнійний вміст. Яке ускладнення найімовірніше виникло в пацієнта?

- a. Парез лицевого нерва
- b. Кіста верхньощелепної пазухи
- c. Ретробульбарний абсцес
- d. Реактивний набряк щоки
- e. Гострий бактеріальний риносинусит

73. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на односторонній біль у горлі, який іррадіює у вухо. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом останніх 3-х днів. За результатами орофарингоскопії виявлено: піднебінний мигдалик праворуч застійно-гіперемований, набряклий, на верхньому полюсі візуалізується виразка, вкрита товстим шаром нальоту брудно-білого кольору, піднебінні дужки праворуч яскраво-рожеві та незначно набрякли, ліворуч - піднебінний мигдалик та піднебінні дужки інтактні. Задня стінка глотки не змінена. Під час огляду інших ЛОР-органів патологічних змін не виявлено. Який збудник найімовірніше спричинив цю форму тонзиліту?

- a. *Neisseria gonorrhoeae*
- b. *Streptococcus pyogenes*
- c. *Corynebacterium diphtheriae*
- d. Epstein Barr virus
- e. Симбіоз *Fusobacterium nucleatum* і *Borrelia vincentii*

74. Який напрямок завжди має ністагм?

- a. Залежно від виду нервової системи
- b. У залежності від руху
- c. У бік руху ендолімфи
- d. Не залежить від руху ендолімфи
- e. У протилежний до руху ендолімфи

75. Шестирічна дитина погано дихає носом, часто хворіє на респіраторні захворювання з явищами назофарингіту, сальпінгоотиту, спить із відкритим ротом. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, напіввідкритий рот, високе "готичне" піднебіння. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гіпертрофія глоткового мигдалика
- b. Хронічний декомпенсований тонзиліт
- c. Викривлення переділки носа
- d. Ювенільна ангіофіброма носоглотки
- e. Хронічний гіпертрофічний фарингіт

76. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на сильний біль у горлі, появу білих нальотів на мигдаликах, які не виходять за межі мигдалика, збільшення та болючість щелепних лімфатичних вузлів, підвищення температури тіла до $38,4^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що тиждень тому перехворів на ГРВІ. Під час обстеження виявлено: оцінка за шкалою Мак Айзек - 4 бали, тризм відсутній, експрес БГСА-тест - негативний. Який найімовірніший діагноз?

- a. Інфекційний моноклеоз
- b. Гострий вірусний тонзиліт
- c. Паратонзиллярний абсцес
- d. Гострий стрептококовий тонзиліт
- e. Гострий бактеріальний тонзиліт

77. У пацієнтки віком 36 років через 6 місяців після народження дитини виникли напад запаморочення без втрати свідомості, нудота, блювання, спонтанний горизонтальний ністагм, зниження слуху у правому вусі, шум у вусі. Через 3 год напад припинився, ністагм і шум зникли, слух покращився, стан поліпшився. Отоскопічна картина - в нормі. За результатами аудіометричного обстеження виявлено: підвищення порогів сприйняття за повітряною провідністю на низьких частотах, з наявністю кістково-повітряного інтервалу. Пацієнтці було проведено гліцерол-тест, який виявився позитивним. Який найімовірніший діагноз?

- a. Вестибулярний нейроніт
- b. Периферична вестибулопатія
- c. Доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння
- d. Гострий лабіринтит
- e. Хвороба Мен'єра

78. Пацієнт віком 38 років скаржиться на біль у правому вусі, гнійні виділення, зниження слуху. Із анамнезу відомо, що хворіє з дитинства після перенесеного кору. Загострення - 2 рази на рік. Під час отоскопії спостерігається: піорея з неприємним запахом, барабанна перетинка перфорована в pars flaccida. Аудіологічно: кондуктивна приглухуватість. За результатами КТ виявлено: деструктивні зміни соскоподібного відростка праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хронічний мезотимпаніт
- b. Гострий середній отит
- c. Хронічний епітимпаніт

- d. Отосклероз, тимпанальна форма
- e. Секреторний отит

79. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на запаморочення, порушення координації та ходьби, виражений шум і зниження слуху в лівому вусі, виділення з цього вуха з неприємним запахом. Із анамнезу відомо, що хворіє приблизно 37 років, періодично лікувався амбулаторно консервативними засобами (туалет, вушні краплі та антибіотики) з нетривалим ефектом. Три дні тому виникли запаморочення та порушення координації, які швидко прогресували. Під час отоскопії виявлено: у лівому зовнішньому слуховому ході - гнійні виділення з неприємним запахом, перфорація у розслабленій частині барабанної перетинки. Який найімовірніший діагноз?

- a. Отосклероз
- b. Лівобічний хронічний епітимпаніт, абсцес скроневої частки мозку

- с. Хвороба Мен'єра
- д. Лівобічний хронічний мезотимпаніт, лівобічний лабіринтит
- е. Лівобічний хронічний епітимпаніт, лівобічний лабіринтит**

80. У пацієнта віком 30 років виявлено ознаки правобічного гострого бактеріального верхньощелепного риносинуситу. Із анамнезу відомо, що захворів тиждень тому після переохолодження. Іншої патології не виявлено. Про який шлях інфікування приносової пазухи, найімовірніше, йдеться в цьому разі?

- а. Лімфогенний
- б. Гематогенний
- с. Травматичний
- д. Одонтогенний

е. Риногенний

81. Пацієнтка віком 57 років звернулася до лікаря-отоларинголога зі скаргами на зниження слуху, дзвін у вухах. Із анамнезу відомо, що мати пацієнтки мала двобічну приглухуватість, проте до лікаря не зверталася. Після проведеного огляду та додаткових методів обстеження встановлено діагноз: отосклероз. Яке хірургічне лікування необхідно провести пацієнтці?

- а. Осиклопластику
- б. Стапедопластику**
- с. Антромастоїдотомію
- д. Тимпанопластику
- е. Шунтування барабанної перетинки

82. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на загальну слабкість, біль у горлі, під час ковтання є болючий "порожній" ковток, що часто супроводжується болем у вусі. Температура тіла нормальна. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х днів. Під час отофарингоскопії виявлено: слизова оболонка задньої стінки глотки гіперемована, вкрита слизово-гнійним ексудатом, язичок набряклий. Який найімовірніший діагноз?

- а. Стоматит
- б. Паратонзиліт
- с. Гострий ларингіт
- д. Гострий тонзиліт

е. Гострий фарингіт

83. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у ділянці лоба, закладеність носа, гнійні виділення з носа. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти днів, захворювання пов'язує з перенесеним нежитем. Під час передньої риноскопії спостерігається: гіперемія та набряк слизової оболонки в ділянці лівого середнього носового ходу, там же гнійна смужка. За результатами рентгенологічного дослідження виявлено: затемнення лівої лобової пазухи. Який найімовірніший діагноз?

- а. Гострий лівобічний гнійний гемісинусит
- б. Лівобічний гострий гнійний етмоїдит
- с. Загострення лівобічного гнійного фронтиту
- д. Лівобічний гострий гнійний сфеноїдит
- е. Гострий бактеріальний фронтальний риносинусит**

84. Військовослужбовець під час виконання завдання унаслідок вибуху отримав акустичну баротравму. Скаржиться на кровотечу з вуха, біль у вусі, шум і порушення слуху. Під час отоскопії виявлено: візуалізується медіальна стінка барабанної порожнини, її слизова оболонка гіперемована. Яку невідкладну допомогу необхідно надати потерпілому?

- а. Промивання вуха розчином фурациліну
- б. Туга тампонада зовнішнього слухового ходу
- с. Вушні краплі з розчином антисептика
- д. Введення у слуховий хід стерильної марлевої турунди**
- е. Введення турунди з борним спиртом

85. Семирічна дитина скаржиться на біль у горлі, слабкість, підвищення температури тіла до

38,5^oC. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: під час пальпації шийні лімфатичні вузли збільшені, болісні, слизова оболонка ротоглотки гіперемована, піднебінні мигдалики збільшені та покриті нашаруванням. Які додаткові методи обстеження необхідно призначити для диференціювання між вірусною та бактеріальною етіологією захворювання?

- a. Прокальцитонін крові
- b. Кров на антистрептолізин О
- c. Кров на С-реактивний протеїн

d. Експрес-тест на стрептокок

- e. Загальний аналіз крові

86. Пацієнт скаржиться на біль у правому вусі, що посилюється під час пальпації, підвищення температури тіла до 37,6^oC. Із анамнезу відомо, що початок захворювання пов'язує з переохолодженням, хворіє 4 дні, раз на рік вимиває сірчану пробку. Під час отоскопії виявлено: зовнішній слуховий прохід звужений, на задній стінці перетинчасто-хрящового відділу візуалізується обмежене випинання з гіперемованою та набряклою шкірою над ним. Барабанну перетинку можна оглянути лише частково, вона сірого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- a. Катар зовнішнього вуха

b. Фурункул зовнішнього слухового проходу

- c. Гострий гнійний середній отит
- d. Гострий катаральний середній отит
- e. Сірчана пробка

87. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на жовто-зелені виділення з лівої половини носа з неприємним запахом, відчуття тиску в ділянці лівої щоки. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 10-ти днів, приблизно 3 тижні тому успішно пролікувалася з приводу лівобічного гаймориту. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - 37,5^oC. Під час огляду ротової порожнини виявлено каріознозмінений 2-й моляр з лівого боку. Під час риноскопії спостерігається: у середньому носовому ході з лівого боку - гнійні виділення з неприємним запахом, слизова оболонка носа - гіперемована, набрякла. Який найімовірніший діагноз?

- a. Алергічний риніт
- b. Антрохоанальний поліп
- c. Вазомоторний риніт

d. Одонтогенний верхньощелепний синусит

- e. Стороннє тіло в носовій порожнині

88. Які лімфатичні вузли є регіонарними для гортані?

- a. Завушні
- b. Білявушні
- c. Глибокі шийні

- d. Підщелепні
- e. Защелепні

89. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на постійне утруднення носового дихання через обидві половини носа, слизові виділення з носа, головний біль. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років. Під час передньої риноскопії виявлено: слизова оболонка носа рожева, нижні носові раковини збільшені в об'ємі, носові ходи звужені, після змащування адреналіном раковини не зменшуються в розмірах і дихання через ніс не покращується. Інші ЛОР-органи без патології. Який найімовірніший діагноз?

- a. Вазомоторний риніт (нейровегетативна форма)

b. Хронічний гіпертрофічний риніт

- c. Вазомоторний риніт (алергічна форма)
- d. Хронічний катаральний риніт
- e. Хронічний атрофічний риніт

90. Пацієнт віком 50 років скаржиться на захриплість голосу, неприємні відчуття в горлі, періодичний сухий кашель. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років, багато курить,

працює на підприємстві з запиленістю повітря. Під час непрямой ларингоскопії виявлено: слизова оболонка голосових складок - рожевого кольору, нерівномірно потовщена, "застійний судинний малюнок", рухомість гортані не порушена. Голос хриплий, дихання через гортань не утруднене. Який найімовірніший діагноз?

- a. Склерома гортані
- b. Гострий ларингіт
- c. Злоякісна пухлина гортані
- d. Туберкульоз гортані
- e. Хронічний гіпертрофічний ларингіт, дифузна форма**

91. Пацієнт віком 47 років скаржиться на хропіння, періодичні в'язкі виділення, що затікають із носоглотки. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 5-6 місяців тому, пов'язує зі зміною роботи - працює на будівництві, часто переохолоджується. Неодноразово звертався до сімейного лікаря, лікувався судинозвужувальними краплями у ніс, протизастудними комплексними препаратами. Покращення стану після лікування короточасне. Об'єктивно спостерігається: носове дихання утруднене з обох боків, нюх - знижений, носова перегородка - по середній лінії, слизова оболонка носа - застійно-рожева, набрякла, після анемізації - скорочується. Виділення мутні жовтуваті, переважно в задніх відділах носової порожнини. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий рецидивуючий риносинусит
- b. Хронічний неалергічний риніт
- c. Хронічний риносинусит без поліпозу носа**
- d. Хронічний назофарингіт
- e. Алергічний риніт (холодова алергія)

92. Де знаходиться більшість кавернозної тканини у порожнині носа?

- a. Нижній носовій раковині**
- b. Середній носовій раковині
- c. Верхній носовій раковині
- d. Присінку носа
- e. Перегородці носа

93. У чоловіка віком 30 років після відвідування футбольного матчу на стадіоні виникла афонія. Під час непрямой ларингоскопії: поблизу передньої комісури на правій голосовій складці наявна гематома, голосова щілина вільна, під час фонації голосові складки рухомі. Яке початкове лікування необхідно призначити в цьому разі?

- a. Голосовий відпочинок і нагляд у динаміці**
- b. Системні глюкокортикостероїди
- c. Системна антибіотикотерапія
- d. Інгаляції з глюкокортикостероїдами
- e. Фонопедія

94. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на те, що її дворічна дитина (дівчинка) досі не почала говорити. Під час отоскопії спостерігається: обидві барабанні перетинки сірі, блискучі, рухомі. За результатами тимпанометрії виявлено: крива типу "А". Інші об'єктивні способи перевірки слуху (реєстрація КСВП та отоакустична емісія) виявили повну глухоту на обидва вуха. Який спосіб лікування дитини необхідно рекомендувати цій пацієнтці?

- a. Термінове консервативне лікування
- b. Оперативне втручання - стапедопластику
- c. Слухопротезування
- d. Відмовитися від будь-якого лікування
- e. Оперативне втручання - кохлеарну імплантацію**

95. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на зниження слуху у правому вусі, гнійні виділення, біль у ділянці правого вуха. Із анамнезу відомо, що хворіє з дитинства після перенесеного кору, періодично відзначає загострення у вигляді гнійних та білих крошкоподібних виділень, що мають неприємний запах, прогресуюче погіршення слуху. Під час отоскопії спостерігається: незначні гнійні виділення в слуховому ході, барабанна перетинка перфорована у верхньому відділі, шепітна мова - 1,2 м, розмовна - 5,0 м. За результатами комп'ютерної томографії

виявлено: деструктивні зміни головки молоточка, соскоподібний відросток склеротичного типу праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- a. Правобічний хронічний гнійний мезотимпаніт
- b. Правобічний хронічний мастоїдит
- c. Правобічний хронічний лабіринтит
- d. Правобічний хронічний отит із холестеатомаю**
- e. Гострий правобічний середній отит

96. Пацієнт віком 35 років скаржиться на утруднене носове дихання у лівій половині носа протягом довгого часу. Під час ендоскопічного обстеження виявлено: утворення білувато-сірого кольору, м'якої консистенції, що виходить із задніх відділів верхньощелепної пазухи та повністю обтурує носоглотку з лівого боку. Який найімовірніший діагноз?

- a. Етезіонейробластома
- b. Поліпозний риносинусит
- c. Кіста верхньощелепної пазухи
- d. Антрохоанальний поліп**
- e. Кровоточивий поліп перегородки носа

97. Пацієнт віком 31 рік скаржиться на біль у правому вусі, зниження слуху, підвищення температури тіла до $38,4^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно спостерігається: права вушна раковина відстовбурчена, відзначається набряклість та болючість у заушній ділянці, зовнішній слуховий хід звужений у кістковому відділі за рахунок нависання задньо-верхньої стінки. За результатами отоскопії виявлено: барабанна перетинка гіперемована, потовщена, із перфорацією в центральному відділі, з якої синхронно до пульсу виділяється крапля гною (пульсуючий рефлекс). Який найімовірніший діагноз?

- a. Правобічний гострий середній отит, правобічний петрозит
- b. Правобічний гострий середній отит, правобічний мастоїдит**
- c. Правобічний гострий середній отит, правобічний лабіринтит
- d. Правобічний гострий середній отит, правобічний отоанtrit
- e. Фурункул зовнішнього слухового проходу праворуч

98. Пацієнт віком 28 років скаржиться на раптову втрату слуху на ліве вухо після санації зовнішнього слухового ходу вушною паличкою. Об'єктивно спостерігається: лівий зовнішній слуховий хід обтурований сірчаними масами. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне ліворуч негативний, Вебер у ліве вухо, Швабах подовжений з лівого боку. Укажіть тип втрати слуху.

- a. Побутовий
- b. Обтуративний
- c. Перцептивний
- d. Кондуктивний**
- e. Змішаний

99. Пацієнт віком 35 років скаржиться на почервоніння, біль та набряклість кінчика носа, що розповсюджується на верхню губу, відповідну половину щоки. Температура тіла - 38°C Під час риноскопії виявлено: конусоподібне випинання з гнійним стержнем всередині, шкіра навколо утворення - гіперемована, набрякла. Встановлено діагноз: фурункул носа. Яке найбільш тяжке ускладнення може виникнути при фурункулі носа?

- a. Періостит верхньої щелепи, тромбоз печеристої пазухи
- b. Тромбоз печеристої пазухи, лімфаденіт підщелепової ділянки
- c. Періостит верхньої щелепи, абсцес перегородки носа
- d. Лімфаденіт підщелепної та шийної ділянки
- e. Тромбоз печеристої пазухи та сепсис**

100. Пацієнт віком 30 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення температури тіла до 38°C , незначний біль у горлі. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Під час орофарингоскопії виявлено: ротоглотка гіперемована з ціанотичним відтінком, язичок, піднебінні дужки та мигдалики - набряклі, на поверхні мигдалика - суцільні білувато-сірі щільні нальоти, що поширюються на м'яке піднебіння та знімаються шпателем зі

значними зусиллями, після їх видалення слизова оболонка кровоточить. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, дещо болючі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Дифтерія глотки**
- b. Гострий катаральний тонзиліт
- c. Агранулоцитарна ангіна
- d. Гострий лакунарний тонзиліт
- e. Паратонзиллярний абсцес

101. Пацієнта віком 50 років шпиталізовано до ЛОР-відділення з діагнозом: гострий гнійний середній отит, гостра нейросенсорна приглухуватість. В анамнезі: хронічний гломерулонефрит. Під час бакдослідження гною з вуха висіяно стафілокок, чутливий до гентаміцину, неоміцину, канаміцину, мономіцину, цефуруксиму. Який антибіотик необхідно призначити в комплексній терапії гострого гнійного середнього отиту, гострої нейросенсорної приглухуватості в цьому разі?

- a. Канаміцин
- b. Цефуроксим**
- c. Амікацин
- d. Гентаміцин
- e. Мономіцин

102. Із якою анатомічною структурою межує передня стінка зовнішнього слухового проходу?

- a. Середньою черепною ямкою
- b. Привушною залозою
- c. Барабанною перетинкою
- d. Суглобом нижньої щелепи**
- e. Соскоподібним відростком

103. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різке утруднення дихання через обидві половини носа, тяжкість у голові. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 7-ми років. Під час передньої риноскопії спостерігається: поліпи в середніх носових ходах, там же гнійні виділення. За результатами рентгенологічного обстеження виявлено: затемнення комірок решітчастого лабіринту з обох боків. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хронічний двобічний поліпозний верхньощелепний синусит
- b. Хронічний двобічний гнійний етмоїдит
- c. Хронічний двобічний етмоїдальний риносинусит з поліпами**
- d. Хронічний двобічний поліпозний етмоїдит
- e. Хронічний двобічний поліпозно-гнійний фронтит

104. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на сухість та печію у горлі, утворення сухих кірок на задній стінці горла, більше зранку. Із анамнезу відомо, що відзначає полегшення симптомів після того як поп'є воду, симптоми з'явилися 3 роки тому. Під час огляду виявлено: стоншена слизова оболонка глотки, через яку просвічується сітка кровоносних судин, поверхня глотки вкрита тонким шаром прозорих засохлих виділень. Який найімовірніший діагноз?

- a. Дисбіоз глотки
- b. Рецидивуючий тонзилофарингіт
- c. Хронічний атрофічний фарингіт**
- d. Хронічний (рекурентний) тонзиліт
- e. Хронічний гіпертрофічний ларингофарингіт

105. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на захриплість голосу, поступове прогресуюче порушення фонації протягом останніх 6-ти місяців. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка - рожева, голосові складки - сірі, на межі передньої та середньої третини лівої складки візуалізується округле, блідо-сіре шароподібне утворення із гладкою поверхнею, величиною як просяне зерно. Рухливість гортані не порушена. Який найімовірніший діагноз?

- a. Туберкульоз гортані
- b. Склерома гортані
- c. Карцинома гортані
- d. Папіломатоз гортані

е. Фіброма гортані

106. Пацієнт віком 56 років скаржиться на захриплість голосу протягом місяця, біль під час ковтання. Із анамнезу відомо, що курить упродовж 40 років, часто вживає алкогольні напої. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка гортані рожевого кольору, волога, нальоту немає, права голосова складка нерівномірно потовщена, бугриста, обмежено рухлива, під час фонації складки змикаються неповністю. Голос хриплий, дихання вільне. Під час пальпації шийних та надключичних лімфатичних вузлів відзначається полілімфаденопатія. Який найімовірніший діагноз?

а. Хронічний ларингіт

б. Рак гортані

с. Туберкульоз гортані

д. Парез голосових складок

е. Папіломи гортані

107. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на утруднене носове дихання, біль у горлі, зниження нюху та періодичну ринорею протягом 2-х років. Під час огляду носової порожнини виявлено: збільшення розміру носових раковин, ціанотичність слизової оболонки носової порожнини, виділення в носових ходах, у середньому носовому ході правої половини носа візуалізується поліпозне утворення сірого кольору. Який додатковий метод обстеження необхідно призначити в цьому разі?

а. Ольфактометрію

б. Комп'ютерну томографію приносових пазух

с. Передню риноскопії та задню риноскопії

д. Магнітно-резонансну томографію навколоносових пазух із контрастуванням

е. Рентгенографію навколоносових пазух

108. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на різкий стріляючий біль у вусі з лівого боку, зниження слуху, шум. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х днів. За результатами отоскопії виявлено: барабанна перетинка різко випнута, гіперемована, набрякла. Проби на прохідність внутрішньої слухової труби негативні. Укажіть характерні зміни, які спостерігатимуться в цього пацієнта під час аудіометрії лівого вуха.

а. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при нормальній кістковій провідності

б. Кісткова та повітряна провідність знижуються симетрично

с. Повітряна провідність залишається в нормі на високих частотах

д. Розрив між кістковою та повітряною провідністю, при зниженій кістковій

е. Обидві криві ідуть по діагоналі вниз

109. Пацієнт віком 55 років скаржиться на утруднене носове дихання та періодичні кровотечі через ліву половину носа. Риноскопично спостерігається: у присінку носа візуалізується округле утворення овальної форми з гладкою поверхнею багряного кольору. Під час натискування зондом - кровоточить, м'якої консистенції. Який найімовірніший діагноз?

а. Естезіонейробластома

б. Поліпозний риносинусит

с. Ангіофіброма носоглотки

д. Антрохоанальний поліп

е. Кровоточивий поліп носової перегородки

110. Чоловік віком 55 років працює зварювальником. Курить протягом 25-ти років. Укажіть ризик розвитку раку гортані, а саме: індекс курця (ІК).

а. Група виражено низького ризику виникнення раку гортані

б. Група середнього ризику виникнення раку гортані

с. Група низького ризику виникнення раку гортані

д. Група виражено високого ризику виникнення раку гортані

е. Група високого ризику виникнення раку гортані

111. Пацієнт віком 28 років скаржиться, що з дитинства часто хворіє на гострий тонзиліт. Із анамнезу відомо, що 3 роки тому гострий тонзиліт ускладнився ревматизмом з ураженням

серця та суглобів, із приводу чого пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні. Під час фарингоскопії виявлено: гіперемія передніх піднебінних дужок, мигдалики спаяні з піднебінними дужками, у лакунах - гнійний вміст. Підщелепні лімфатичні вузли ущільнені. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хронічний компенсований тонзиліт
- b. Хронічний субкомпенсований тонзиліт
- c. Хронічний декомпенсований тонзиліт**
- d. Ревматоїдна ангіна
- e. Хронічний фарингіт на фоні ГЕРХ

112. Із якою великою судиною межує передня стінка барабанної порожнини?

- a. Хребетною артерією
- b. Зовнішньою сонною артерією
- c. Загальною сонною артерією
- d. Внутрішньою сонною артерією**
- e. Внутрішньою яремною веною

113. Пацієнт віком 40 років повністю втратив слух у лівому вусі впродовж тижня та потрапив до стаціонару з попереднім діагнозом: гостра сенсоневральна приглуховатість, де пройшов лікування системними кортикостероїдами та був виписаний без покращення. Із анамнезу відомо, що напередодні в нього виникали періодичні запаморочення, які продовжувались 2 місяці, поки не з'явилися ознаки парезу лицевого нерва ліворуч. Яке захворювання треба запідозрити першочергово?

- a. Гломусну пухлину
- b. Хворобу Мен'єра
- c. Акустичну невриному**
- d. Раптову сенсоневральну приглуховатість
- e. Параліч Белла

114. У пацієнта під час профілактичного огляду виявили білувато-жовті "ріжки" на поверхні піднебінних і язикового мигдаликів, що мають конусоподібну форму, виступають над поверхнею слизової оболонки, не знімаються, щільної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- a. Мононуклеоз
- b. Хронічний (рекурентний) тонзиліт
- c. Дифтерія глотки
- d. Лептотрихоз глотки**
- e. Фарингомикоз

115. Укажіть місце відкриття нососльозового каналу в носовій порожнині.

- a. Загальний носовий хід
- b. Півмісяцева щілина
- c. Нижній носовий хід**
- d. Середній носовий хід
- e. Верхній носовий хід

116. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на зниження слуху ліворуч та на суб'єктивний шум у лівому вусі. Із анамнезу відомо, що захворіла приблизно 4 роки тому з поступовим зниженням слуху на ліве вухо, пов'язує захворювання з частими гострими вірусними риносинуситами та з гіпертонічними кризами (АТ - до 180 мм рт. ст.). Під час отоскопії спостерігається: обидві барабанні перетинки сірі, блискучі, рухомі. За результатами камертональних проб виявлено: Рінне - "+" на обидва вуха, Вебер - латералізація вправо, Швабах - вкорочений із лівого боку. На аудіограмі спостерігається: зниження як повітряної, так і кісткової провідностей за всією тональною шкалою на ліве вухо. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хвороба Мен'єра
- b. Отосклероз
- c. Хронічний двобічний секреторний середній отит
- d. Хронічна правобічна сенсоневральна приглуховатість**

е. Хронічна лівобічна сенсоневральна приглухуватість

117. Під час ендоназальної максилотомії є вірогідність травмування суміжних анатомічних структур до максиллярного синуса. Які анатомічні структури з нижченаведених можна пошкодити у разі необережного виконання цього хірургічного втручання?

- a. Порожнину рота, орбіту, носову переділку
- b. Порожнину носа, собачу ямку, комірковий відросток верхньої щелепи

с. Орбіту, носослізний канал, крилопіднебінну ямку

- d. Крилопіднебінну ямку, орбіту, соскоподібний відросток
- e. Порожнину рота, орбіту, шилоподібний відросток

118. Як скелетотопічно розташована глотка?

- a. Від II шийного до I грудного хребця
- b. Від основи черепа до VI шийного хребця**
- c. Від III шийного до II грудного хребця
- d. Від VI шийного до III грудного хребця
- e. Від IV шийного до II грудного хребця

119. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на гнійні виділення з лівої половини носа, підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня, захворювання пов'язує з перенесеною вірусною інфекцією, під час якої спостерігалися такі симптоми: підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$, біль у горлі, рясні виділення з носа. На 5-й день температура тіла знизилася, пацієнтка відчула покращення. На 8-му добу загальний стан різко погіршився - знову підвищилася температура тіла до фебрильних значень та з'явилися гнійні виділення з носа. Об'єктивно спостерігається: болючість під час пальпації в ділянці лівої щоки. Під час риноскопії виявлено: слизова оболонка лівої половини порожнини носа гіперемована, набрякла, у лівому середньому носовому ході - смужка гною. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий лівобічний бактеріальний фронтальний риносинусит
- b. Гострий лівобічний бактеріальний верхньощелепний риносинусит**
- c. Одонтогенний лівобічний верхньощелепний риносинусит
- d. Абсцес носової передгородки
- e. Гострий вірусний риносинусит

120. У пацієнта віком 47 років 2 тижні тому з'явився набряк, почервоніння повік правого ока, сильний головний біль, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє на цукровий діабет, протягом попередніх 5-ти днів лікувався з приводу загострення хронічного правобічного гемісинуїту. Об'єктивно спостерігається: ознаки правобічного гнійного гемісинуїту, екзофтальм, хемоз, офтальмоплегія правого ока, відсутність корнеальних та зіничних рефлексів, функціональні розлади зору. Яке риногенне ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Реактивний набряк повіки
- b. Флегмона орбіти**
- c. Ретробульбарний абсцес
- d. Остеоперіостит орбіти
- e. Субперіостальний абсцес орбіти

121. Яким епітелієм вистилається ротоглотка?

- a. Багаторядним кубічним
- b. Плоским зроговілим
- c. Однорядним кубічним
- d. Миготливим багаторядним
- e. Багатошаровим плоским**

122. Пацієнт віком 28 років скаржиться на сильний біль у горлі, що посилюється під час ковтання, головний біль, підвищення температура тіла до $37,9^{\circ}\text{C}$, періодичний кашель. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів. Під час огляду глотки виявлено: симетричне збільшення та гіперемія піднебінних мигдаликів. Який найімовірніший діагноз?

- a. Паратонзиліт

b. Гіпертрофія піднебінних мигдаликів

c. Гострий вірусний тонзиліт

d. Гострий фарингіт

e. Гострий бактеріальний тонзиліт

123. Пацієнтка віком 49 років захворіла раптово, коли вночі з'явився виражений головний біль, який не знімався анальгетиками. На ранок пацієнтка відзначила прогресуюче зниження зору та набряк шкіри навколо очей. Із анамнезу відомо, що протягом 7-ми років хворіє на хронічний риносинусит із періодичними загостреннями. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, рівень свідомості - сопор, АТ - 160/90 мм рт. ст., температура тіла - 39,2[°]С, обличчя пастозне, різко виражений птоз повік, наявний двобічний екзофтальм, двобічна офтальмоплегія, хемоз і крововиливи в кон'юнктиву. Виявлено ригідність потиличних м'язів та слабо позитивний симптом Керніга з обох боків. Лице без чітких асиметрій. Активні рухи в кінцівках ослаблені, без чіткої різниці боків. Тонус дифузно знижений. Рефлекси кінцівок торпідні D=S. На больові подразники реакція послаблена. Під час люмбальної пункції отримано 5 мл білуватого мутного ліквору. Встановлено діагноз: гострий бактеріальний пансинусит. Які ускладнення виникли у пацієнтки?

a. Гнійний менінгоенцефаліт. Двобічний тромбоз кавернозного синуса

b. Двобічний тромбоз кавернозного синуса. Абсцес фронтальної долі головного мозку

c. Двобічний ретробульбарний абсцес

d. Гнійний менінгоенцефаліт. Набряк Квінке

e. Гнійний менінгоенцефаліт. Флегмона орбіти

124. Укажіть ранній симптом злоякісних пухлин середнього відділу гортані.

a. Біль під час ковтання

b. Кровохаркання

c. Захриплість

d. Парез голосових складок

e. Утруднення дихання

125. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано з явищами рясної носової кровотечі, яку неможливо зупинити шляхом назальної тампонади. Із анамнезу відомо, що минулого року переніс ТЕЛА, після цього постійно приймає варфарин, аналіз згортальної системи крові протягом цього періоду не проводився. На момент шпиталізації МНВ (INR) - 18. Який лікарський засіб необхідно застосувати в цьому разі?

a. Еритроцитарну масу

b. Тромбоцитарну масу

c. Протаміну сульфат

d. Свіжозаморожену плазму

e. 4-факторний концентрат протромбінового комплексу

126. Пацієнт віком 48 років скаржиться на затруднене та болісне ковтання рідкої їжі та слини, кашель із рясним мокротинням. Під час ларингоскопії виявлено: у ділянці правого черпакуватого хряща візуалізується інфільтрат, що поширюється на черпакумато-надгортанну складку, у центрі якого визначається неглибока виразка з нерівними краями блідо-рожевого кольору та в'ялогранулюючим дном, голосові складки рожевого кольору, під час фонації змикаються не повністю, голос хриплий. Було проведено MGIT BBL тест, який виявився позитивним. Який найімовірніший діагноз?

a. Склерома гортані

b. Туберкульоз гортані

c. Дифтерія гортані

d. Гострий виразковий ларингіт

e. Рак гортані

127. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на погіршення носового дихання, рясні водянисті виділення з порожнини носа, порушення нюху, чхання, сльозотечу. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х років, під час загострень користується топічними деконгестантами, скарги з'являються під час цвітіння трав і дерев. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка

порожнини носа набрякла, має ціанотичний відтінок. Інші ЛОР-органи без - патології. Який найімовірніший діагноз?

- a. Персистуючий алергічний риніт
- b. Гострий поствірусний риносинусит
- c. Хронічний атрофічний риніт
- d. Вазомоторний риніт, нейровегетативна форма
- e. Інтермітуючий алергічний риніт**

128. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на осиплість голосу, яка з'явилася рік тому після застуди. З того часу пацієнт має дисфонію та афонію після респіраторних захворювань. Протягом 15-ти років постійно курить. Під час огляду патологічних змін з боку порожнини носа та глотки не виявлено. За результатами ларингоскопії: слизова оболонка гортані ціанотична, голосові складки гіперемовані, потовщені, рухомі, міжскладковий простір не звужений. Який найімовірніший діагноз?

- a. Парез гортані
- b. Рак гортані
- c. Склерома гортані
- d. Стеноз гортані в стадії компенсації
- e. Хронічний дифузний гіперпластичний ларингіт**

129. У трирічної дитини вночі виник напад задишки. Із анамнезу відомо, що дитина перехворіла на ГРВІ, проте останні два дні самопочуття було задовільним, температура тіла нормалізувалася. Об'єктивно спостерігається: стан дитини тяжкий, дихання часте, поверхнєве, в акті дихання бере участь допоміжна мускулатура грудної клітки, наявний ціаноз шкірних покривів. Раптово під час огляду дитина перестала дихати. Між якими анатомічними структурами шиї необхідно провести розтин для виконання конікотомії?

- a. Між щитоподібним хрящем і надгортанником
- b. Між дугою перснеподібного хряща та першим кільцем трахеї
- c. Між щитоподібним хрящем і під'язиковою кісткою
- d. Між дугою щитоподібного та перснеподібного хрящів**
- e. Між першим та другим кільцем трахеї

130. Пацієнт віком 33 роки скаржиться на зниження слуху у лівому вусі, гнійні виділення, біль у ділянці вуха. Із анамнезу відомо, що хворіє з дитинства після перенесеного кору. Періодично відзначає загострення у вигляді виділень, які мають неприємний запах, погіршення слуху. Під час отоскопії спостерігається: незначні гнійні виділення в слуховому ході, барабанна перетинка перфорована у верхньому відділі, сприйняття шепоту - 1,2 м, розмови - 5,0 м. За результатами комп'ютерної томографії виявлено: деструктивні зміни з боку соскоподібного відростка ліворуч. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий гнійний середній отит
- b. Хронічна нейросенсорна приглухуватість
- c. Отосклероз
- d. Лівобічний хронічний гнійний епітимпано-антральний отит**
- e. Лівобічний хронічний гнійний тубо-тимпанальний отит

131. Пацієнт віком 32 роки, спортсмен, скаржиться на помірний біль та виражену набряклість лівої вушної раковини, слух не погіршений. Із анамнезу відомо, що початок захворювання пов'язує з отриманням травми під час змагань кілька годин тому. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина ліворуч значно потовщена, збільшена, шкіра має ціанотичний відтінок, під час пальпації відзначається флюктуація. Який найімовірніший діагноз?

- a. Бешихове запалення
- b. Отогематома**
- c. Абсцес
- d. Хондроперихондрит
- e. Забій м'яких тканин

132. Який буде результат дослідження Швабаха при ураженні звукосприймання?

- a. -

- b. Негативний
- c. Подовжений
- d. Вкорочений**
- e. Позитивний

133. Пацієнт віком 37 років із перфорацією носової перегородки діаметром 0,3 см звернувся до лікаря-отоларинголога. Який із нижченаведених симптомів спостерігається найчастіше під час перфорації такого розміру?

- a. Ринорея
- b. Назальний свист**
- c. Носові кровотечі
- d. Порушення носового дихання
- e. Утворення кірочок та сухість у носі

134. Яке ймовірне ускладнення може виникнути після аплікаційного застосування 75%-го нітрату срібла, який був використаний із метою зупинки носової кровотечі?

- a. Гіпертонічний криз
- b. Перфорація носової перетинки**
- c. Інфаркт міокарда
- d. Анафілактичний шок
- e. Стеноз гортані

135. Пацієнт віком 20 років отримав удар по передній поверхні шиї. Через кілька годин з'явилися задишка та захриплість. Об'єктивно спостерігається: ажитований, тахікардія, інспіраторна задишка, дихання шумне, чутне на відстані, шкіра бліда, в акті дихання бере активну участь мускулатура грудної клітки, відзначається втягування надключичних, підключичних, яремних ямок, міжреберних проміжків та епігастральної ділянки під час вдиху. Під час ларингоскопії виявлено: пухлиноподібне утворення лівого присінку гортані ціанотичного кольору, що перекидає голосову щілину. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гематома гортані**
- b. Перелом хрящів гортані
- c. Гострий ларингіт
- d. Гострий хондроперихондрит гортані
- e. Гематома глотки

136. Пацієнт віком 40 років скаржиться на відчуття подряпання та лоскотання в горлі, сухий кашель, захриплість і швидко втомлюваність голосу. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - $37,6^{\circ}\text{C}$, голос хриплий, дихання через гортань не порушене. Під час ларингоскопії виявлено: слизова оболонка гортані різко гіперемована, на її поверхні - невелика кількість в'язких виділень, голосові складки інфільтровані, рухомість їх не змінена. Інші ЛОР-органи - без особливостей. Який найімовірніший діагноз?

- a. Дифтерія гортані
- b. Набряк гортані
- c. Загострення хронічного катарального ларингіту
- d. Гострий катаральний ларингіт**
- e. Хондроперихондрит гортані

137. Під час огляду пацієнта, якого шпиталізовано після побиття, виявлено утруднення носового дихання та деформацію піраміди носа. До побиття пацієнт не скаржився на носове дихання. На яке дослідження доцільно відправити пацієнта для підтвердження діагнозу: перелом кісток носа?

- a. Рентгенографію кісток носа**
- b. МРТ голови
- c. Рентгенографію придаткових пазух носа
- d. Риноманометрію
- e. Ендоскопічне дослідження порожнин носа

138. Укажіть епітелій, що вкриває слизову оболонку порожнини носа та приносових пазух.

- a. Багатошаровий плоский незроговілий
- b. Однорядний кубічний війчастий
- c. Багатошаровий однорядний призматичний війчастий
- d. Однорядний одношаровий призматичний миготливий
- e. Одношаровий багаторядний призматичний миготливий**

139. Пацієнтка віком 32 роки, 30 тиждень вагітності, скаржиться на погіршення слуху в лівому вусі протягом декількох місяців. Під час отоскопії виявлено: зовнішній слуховий хід з лівого боку широкий, сірка відсутня, барабанна перетинка сіра, здається витонченою, наявні всі пізнавальні знаки. На аудіограмі спостерігається: кістково-повітряний інтервал до 30 дБ. На тимпанограмі тип As, при визначенні стапедіальних рефлексів відзначаються дискордантні зубці. Який найімовірніший діагноз?

- a. Лівобічне порушення цілісності ланцюга слухових кісточок
- b. Прогресуюча лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- c. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість
- d. Лівобічна невринома слухового нерва
- e. Лівобічний отосклероз**

140. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у правому вусі, зниженням слуху, підвищення температури тіла. Із анамнезу відомо, що тиждень тому хворів на грип. За результатами отоскопії виявлено: візуалізуються міхурці з геморагічним вмістом на шкірі зовнішнього слухового ходу в кістковій частині та на барабанній перетинці праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- a. Бульозний отит**
- b. Зовнішній дифузний отит
- c. Туберкульоз вуха
- d. Фурункул зовнішнього слухового ходу
- e. Синдром Рамзі-Ханта

141. Пацієнт віком 60 років скаржиться на дискомфорт у горлі при ковтанні, скарги тривають кілька місяців. Під час огляду виявлено: вільний край надгортанника, більше праворуч, пророслий горбисто-виразкуватою пухлиною, рухомість голосових зв'язок збережена, просвіт гортані для дихання достатньо широкий, справа на шиї в місці біфуркації загальної сонної артерії поодинокий обмежено-рухомий лімфатичний вузол до 3 см. Гістологічно підтверджено плоскоклітинний рак. Укажіть стадію раку гортані згідно з TNM класифікацією.

- a. T1N1Mx**
- b. T1N0Mx
- c. T2N1M0
- d. T1NxM0
- e. T2N2Mx

142. Пацієнт віком 29 років скаржиться на сильний біль у горлі, утруднене ковтання, обмежене відкривання рота, підвищення температури тіла до 39^oC) Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 6-ти днів, лікувався самостійно: приймав протизапальні, полоскав горло ромашкою і пив багато рідини. Голос - гугнявий. Під час орофарингоскопії виявлено: визначається тризм щелеп, гіперемія, інфільтрація та випинання лівої половини м'якого піднебіння, язичок - набряклий, зміщений у здоровий бік. Задньощелепні та підщелепні лімфовузли ліворуч - збільшені, болючі під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- a. Флегмона шиї
- b. Паратонзиллярний абсцес**
- c. Заглотковий абсцес
- d. Гострий тонзиліт
- e. Гострий паратонзиліт

143. Восьмирічна дитина скаржиться на біль у горлі, утруднене носове дихання, гугнявість, підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, висипань на шкірі немає, гіперемія та набряк піднебінних і глоткового мигдаликів, які покриті білим

нашаруванням, ковтання болісне, дихання через ніс майже відсутнє, виражена гугнявість, збільшені позащелепні та задньошийні лімфатичні вузли, поліаденопатія, гепатоспленомегалія. Аналіз крові: лейкоцити - $27 \cdot 10^9/\text{л}$, еозинофіли - 1%, базофіли - 1%, паличкоядерні нейтрофіли - 2%, сегментоядерні нейтрофіли - 23%, лімфоцити - 38%, моноцити - 35% (атипові мононуклеари). Позитивні серологічні реакції Пауля-Бунеля, Гоффа-Бауера, Гоффа-Бауера-Давідсона. Взято мазки з носа та зіву на бацилу Леффлера. Який найімовірніший діагноз?

- a. Лакунарна ангіна
- b. Скарлатинозна ангіна
- c. Агранулоцитарна ангіна
- d. Токсична дифтерія ротоглотки
- e. Інфекційний мононуклеоз**

144. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на інтенсивний біль у лівому вусі з іррадіацією у ліву скроню, зниження слуху, головний біль, підвищення температури тіла до $38,2^\circ\text{C}$. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, захворюванню передувало ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: вушна раковина та зовнішній слуховий хід - без явищ запалення. Пальпація козелка та соскоподібного відростка - безболісна. Під час отоскопії виявлено: ліва барабанна перетинка гіперемована, інфільтрована, без пізнавальних контурів, випинає. Шепіт лівим вухом сприймає на відстані 1,5 м. Який найімовірніший діагноз?

- a. Лівобічний тубоотит
- b. Гострий гнійний середній отит з лівого боку**
- c. Лівобічний ексудативний отит
- d. Хронічний отит з лівого боку
- e. Гостра лівобічна сенсоневральна приглухуватість

145. Яке оперативне втручання необхідно провести пацієнту з хронічним гнійним середнім епітимпанітом, ускладненим холестеатомою, екстрадуральним абсцесом?

- a. Розширену радикальну загальнопорожнинну операцію**
- b. Тимпанопластику
- c. Стапедопластику
- d. Атикотомію з тимпанопластикою
- e. Антромастоїдотомію

146. Пацієнт віком 41 рік скаржиться на наявність пухлини на шиї з лівого боку, відчуття стороннього тіла в глотці протягом 4-х років. Лікувався з приводу підщелепного лімфаденіту. Об'єктивно спостерігається: у ділянці верхньої третини шиї під кутом нижньої щелепи ліворуч виявлено щільно-еластичної консистенції, малорухоме, округле новоутворення розмірами 9,5x7 см. Пульсація загальної сонної артерії відчувається по передньому краю утворення. Під час фарингоскопії спостерігається: асиметрія зіву через випинання бокової стінки глотки ліворуч, розмірами 3x5 см із відтисненням ніші лівого мигдалика до середини. За результатами КТ виявлено: у лівому парафарингеальному просторі візуалізується об'ємне утворення розмірами 86x54x57 мм овальної форми. Контури його чіткі, краї рівні, структурно однорідні, щільність - 28-34 HU. Новоутворення поширюється від основи черепа до C4. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

- a. Інтракапсулярна енуклеація пухлини зовнішнім доступом
- b. Пункційна біопсія під контролем ультрасонографії**
- c. Біопсія з використанням зовнішнього доступу
- d. Діагностична цервікотомія
- e. Інтракапсулярна енуклеація пухлини через ротову порожнину

147. Пацієнт віком 30 років скаржиться на утруднене носове дихання, гнійні виділення з носа, розпираючий біль у правій половині обличчя, головний біль. Під час передньої риноскопії виявлено: слизова оболонка носа гіперемована, набрякла, у середніх носових ходах є смужка гною. Які приноскові пазухи можуть бути уражені в пацієнта?

- a. Клиноподібна пазуха, задні решітчасті комірочки
- b. Лобова пазуха, клиноподібна пазуха, середні решітчасті комірочки

с. Верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки

d. Передні, задні решітчасті комірки

e. Лобова пазуха, верхньощелепна пазуха, передні решітчасті комірки

148. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на біль у правому вусі, підвищення температури тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$ Об'єктивно спостерігається: права вушна раковина відхилена, набряклість у парамеатальній ділянці, біль під час натискання на козелок, у хрящовому відділі - обмежений інфільтрат на задній стінці. Барабанна перетинка перламутрово-сірого кольору. Який найімовірніший діагноз?

a. Фурункул правого зовнішнього слухового проходу

b. Правобічний отоантрит

с. Правобічний мастоїдит

d. Правобічний гострий середній отит

e. Правобічний дифузний зовнішній отит

149. У чотирирічної дитини спостерігаються: утруднення дихання, гавкаючий кашель, осиплість голосу. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 3-х днів, захворювання почалося з нежитю, кашлю, підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$ Об'єктивно спостерігається: дитина збуджена, шкіра бліда, в акті дихання бере активну участь мускулатура грудної клітки, відзначається втягування надключичних, підключичних, яремних ямок, міжреберних проміжків та епігастральної ділянки під час вдиху. За результатами ларингоскопії виявлено: слизова оболонка гортані гіперемована, у підскладковому просторі визначаються валики червоного кольору, голосова щілина різко звужена, під час кашлю виділяється значна кількість гнійного мокротиння. Інші ЛОР-органи - без патології. Який найімовірніший діагноз?

a. Стороннє тіло гортані

b. Дифтерія гортані

с. Гострий ларинготрахеїт

d. Заглотковий абсцес

e. Папіломатоз гортані

150. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у горлі, підвищення температури тіла до 38°C . Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий тонзиліт. Результат обстеження за шкалою McIsaac становить 5 балів. Який антибактеріальний препарат необхідно призначити пацієнтці?

a. Норфлуксацин

b. Амоксицилін

с. Гентаміцин

d. Азитроміцин

e. Цефепім