

1. Добу тому потерпілий отримав опік від одягу, що спалахнув. Під час обстеження виявлено, що в нижній частині живота

a. Невідкладна декомпресійна некротомія

b. Етапна некротомія

c. Некротомія, аутодермопластика

d. Рання некротомія

e. Некротомія, ксенопластика

2. Добу тому потерпілий отримав опік від одягу, що спалахнув. Під час обстеження виявлено, що в нижній частині живота

a. Некротомія, ксенопластика

b. Невідкладна декомпресійна некротомія

c. Етапна некротомія

d. Рання некротомія

e. Некротомія, аутодермопластика

3. Дорослому пацієнту виконується відеоасистоване торакоскопічне втручання. З метою антибіотикопрофілактики

a. Більше 4 год

b. Більше 1 год

c. Більше 3 год

d. Більше 5 год

e. Більше 2 год

4. Дорослому пацієнту виконується відеоасистоване торакоскопічне втручання. З метою антибіотикопрофілактики

a. Більше 3 год

b. Більше 5 год

c. Більше 4 год

d. Більше 1 год

e. Більше 2 год

5. Дорослій пацієнтці планується виконання лапароскопічної холецистектомії. Яке покоління цефалоспориного антибіотика

a. Друге

b. Перше

c. Четверте

d. П'яте

e. Третє

6. Дорослій пацієнтці планується виконання лапароскопічної холецистектомії. Яке покоління цефалоспориного антибіотика

a. П'яте

b. Третє

c. Четверте

d. Друге

e. Перше

7. За критеріями якої шкали оцінюється ступінь печінкової недостатності при захворюваннях печінки?

a. Чайлд-П'ю

b. SOFA

c. Ренсон

d. Маршала

e. APACH II

8. За критеріями якої шкали оцінюється ступінь печінкової недостатності при захворюваннях печінки?

a. SOFA

b. Маршала

c. Чайлд-П'ю

d. APACH II

e. Ренсон

9. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на сильний ("кинджальний") біль в епігастрії. Виразковий анамнез

a. Гостра печінкова недостатність

b. Пенетруюча виразка

c. Тромбоз ворітної вени

d. Шлункова кровотеча

e. Перфоративна виразка

10. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на сильний ("кинджальний") біль в епігастрії. Виразковий анамнез

- a. Гостра печінкова недостатність
- b. Шлункова кровотеча
- c. Тромбоз ворітної вени

d. Перфоративна виразка

- e. Пенетруюча виразка

11. Пацієнт віком 25 років під час дорожньо-транспортної пригоди отримав перелом стегнової кістки в

a. Компресію судинно-нервового пучка

- b. Посттравматичний неврит сідничного нерва
- c. Гемартроз колінного суглоба
- d. Контрактуру колінного суглоба
- e. Зрощення перелому в поперечному положенні

12. Пацієнт віком 25 років під час дорожньо-транспортної пригоди отримав перелом стегнової кістки в

- a. Контрактуру колінного суглоба
- b. Зрощення перелому в поперечному положенні
- c. Посттравматичний неврит сідничного нерва

d. Компресію судинно-нервового пучка

- e. Гемартроз колінного суглоба

13. Пацієнт віком 26 років скаржиться на біль у верхній частині живота, який з'явився миттєво 2 год

- a. Гострий панкреатит
- b. Гострий холецистит
- c. Стеноз пілоруса

d. Перфоративна виразка

- e. Гострий гастрит

14. Пацієнт віком 26 років скаржиться на біль у верхній частині живота, який з'явився миттєво 2 год

- a. Гострий холецистит
- b. Гострий гастрит
- c. Стеноз пілоруса
- d. Гострий панкреатит

e. Перфоративна виразка

15. Пацієнт віком 27 років після падіння з висоти 2-х метрів скаржиться на біль у верхній половині ж

- a. Діафрагми
- b. Печінки
- c. Сечового міхура
- d. Кишки

e. Селезінки

16. Пацієнт віком 27 років після падіння з висоти 2-х метрів скаржиться на біль у верхній половині ж

- a. Сечового міхура
- b. Печінки
- c. Кишки

d. Селезінки

- e. Діафрагми

17. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль та сильне здуття по всьому животу, рідкі випорожнення

- a. Гострий ішіоректальний парапроктит
- b. Рак прямої кишки
- c. Хвороба Крона

d. Виразковий коліт

- e. Псевдомембранозний коліт

18. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль та сильне здуття по всьому животу, рідкі випорожнення

- a. Хвороба Крона
- b. Псевдомембранозний коліт
- c. Гострий ішіоректальний парапроктит

d. Виразковий коліт

- e. Рак прямої кишки

19. Пацієнт віком 30 років скаржиться на різкий біль у грудній клітці, який виник раптово під час фі

a. Коронарографія з можливим стентуванням

- b. Аортокоронарне шунтування
- c. Консервативне лікування
- d. Тромболітична терапія
- e. Спостереження

20. Пацієнт віком 30 років скаржиться на різкий біль у грудній клітці, який виник раптово під час фі

- a. Аортокоронарне шунтування
- b. Коронарографія з можливим стентуванням**

- c. Тромболітична терапія
- d. Спостереження
- e. Консервативне лікування

21. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль, почервоніння та набряк у ділянці лівого стегна, які з'

- a. Фурункул лівого стегна в стадії нагноєння**

- b. Карбункул правого стегна
- c. Лімфаденіт лівої пахвинної ділянки
- d. Гідраденіт лівого стегна
- e. Абсцес лівого стегна

22. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль, почервоніння та набряк у ділянці лівого стегна, які з'

- a. Гідраденіт лівого стегна
- b. Лімфаденіт лівої пахвинної ділянки
- c. Абсцес лівого стегна

- d. Фурункул лівого стегна в стадії нагноєння**

- e. Карбункул правого стегна

23. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що

- a. Паренхіматозна жовтяниця
- b. Синдром Жільбера
- c. Гемолітична жовтяниця

- d. Механічна жовтяниця**

- e. Вірусний гепатит В

24. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що

- a. Синдром Жільбера

- b. Механічна жовтяниця**

- c. Паренхіматозна жовтяниця

- d. Вірусний гепатит В

- e. Гемолітична жовтяниця

25. Пацієнт віком 35 років скаржиться на гострий біль у правій клубовій ділянці, який почався 8 год

- a. Гострий холецистит

- b. Гострий апендицит**

- c. Гострий панкреатит

- d. Ниркова коліка

- e. Гостра кишкова непрохідність

26. Пацієнт віком 35 років скаржиться на гострий біль у правій клубовій ділянці, який почався 8 год

- a. Гострий холецистит

- b. Ниркова коліка

- c. Гостра кишкова непрохідність

- d. Гострий панкреатит

- e. Гострий апендицит**

27. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечо

- a. Перелом шийки плеча

- b. Перелом великогомілкової кістки

- c. Вивих плеча**

- d. Перелом анатомічної шийки плеча

- e. Перелом діафіза плеча

28. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечо

- a. Перелом шийки плеча

- b. Перелом діафіза плеча

с. Вивих плеча

- d. Перелом анатомічної шийки плеча
- e. Перелом великогомілкової кістки

29. Пацієнт віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла, різку слабкість, пітливість, к

- a. Ехінококова кіста
- b. Кавернозний туберкульоз
- c. Пневмонія
- d. Периферичний рак

e. Гострий абсцес легені

30. Пацієнт віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла, різку слабкість, пітливість, к

- a. Ехінококова кіста
- b. Пневмонія
- c. Кавернозний туберкульоз
- d. Периферичний рак

e. Гострий абсцес легені

31. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у животі, нудоту, одноразове блювання. Із анамнезу від

- a. Гострий панкреатит
- b. Перфорація порожнистого органа
- c. Гостра кишкова непрохідність
- d. Гострий апендицит
- e. Гострий холецистит

32. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у животі, нудоту, одноразове блювання. Із анамнезу від

- a. Гострий панкреатит
- b. Гостра кишкова непрохідність

с. Перфорація порожнистого органа

- d. Гострий холецистит
- e. Гострий апендицит

33. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на біль у правому підребер'ї, що посилюється після вживання їжі

a. Консервативне лікування з використанням жовчогінних препаратів

b. Лапароскопічна холецистектомія

- c. Антибіотикотерапія
- d. Дренування загальної жовчної протоки
- e. Операція відкритим доступом

34. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на біль у правому підребер'ї, що посилюється після вживання їжі

- a. Консервативне лікування з використанням жовчогінних препаратів
- b. Антибіотикотерапія
- c. Дренування загальної жовчної протоки
- d. Операція відкритим доступом

e. Лапароскопічна холецистектомія

35. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль, нудоту, блювання, відчуття розпирання в лівому підребе

- a. Кровотеча
- b. Декомпенсований стеноз воротаря

- c. Пенетрація виразки
- d. Перфорація виразки
- e. Малігнізація виразки

36. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль, нудоту, блювання, відчуття розпирання в лівому підребе

- a. Перфорація виразки
- b. Декомпенсований стеноз воротаря

- c. Малігнізація виразки
- d. Пенетрація виразки
- e. Кровотеча

37. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на раптовий сильний біль у правій паховій ділянці, що супроводж

- a. Невправима пахова грижа
- b. Защемлена пахова грижа
- c. Ниркова коліка

- d. Гострий апендицит
- e. Перфорація порожнистого органа

38. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на раптовий сильний біль у правій паховій ділянці, що супроводж

- a. Ниркова коліка
- b. Невправима пахова грижа

c. Защемлена пахова грижа

- d. Гострий апендицит
- e. Перфорація порожнистого органа

39. Пацієнт віком 45 років звернувся до приймального відділення через 4,5 год від моменту початку за

- a. Шпиталізація пацієнта, ургентне операційне втручання - герніотомія, герніопластика
- b. Шпиталізація пацієнта, ургентне операційне втручання - серединна лапаротомія, ревізія кишок, герн
- c. Шпиталізація пацієнта, діагностична відеолапароскопія
- d. Відпустити пацієнта додому з рекомендацією про планове операційне лікування
- e. Шпиталізація пацієнта, динамічне спостереження, планове операційне втручання

40. Пацієнт віком 45 років звернувся до приймального відділення через 4,5 год від моменту початку за

- a. Шпиталізація пацієнта, ургентне операційне втручання - серединна лапаротомія, ревізія кишок, герн
- b. Шпиталізація пацієнта, ургентне операційне втручання - герніотомія, герніопластика
- c. Шпиталізація пацієнта, діагностична відеолапароскопія
- d. Шпиталізація пацієнта, динамічне спостереження, планове операційне втручання
- e. Відпустити пацієнта додому з рекомендацією про планове операційне лікування

41. Пацієнт віком 45 років перебуває на стаціонарному лікуванні протягом 10-ти днів з діагнозом: гос

a. Піопневмоторакс

- b. Гострий медіастеніт
- c. Плевропневмонія
- d. Перфорація стравоходу
- e. Пневмоторакс

42. Пацієнт віком 45 років перебуває на стаціонарному лікуванні протягом 10-ти днів з діагнозом: гос

a. Піопневмоторакс

- b. Плевропневмонія
- c. Пневмоторакс
- d. Перфорація стравоходу
- e. Гострий медіастеніт

43. Пацієнт віком 45 років скаржиться на болісну припухлість обох сідниць, труднощі під час сечовипу

- a. Аноректальний тромбоз
- b. Гострий простатит
- c. Гострий проктит

d. Гострий парапроктит

e. Защемлений геморой

44. Пацієнт віком 45 років скаржиться на болісну припухлість обох сідниць, труднощі під час сечовипу

a. Гострий проктит

b. Гострий парапроктит

- c. Аноректальний тромбоз
- d. Защемлений геморой
- e. Гострий простатит

45. Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність більше одного року утворень у ділянці анального о

- a. Хронічний комбінований геморой I стадії
- b. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- c. Хронічний комбінований геморой III стадії
- d. Хронічний комбінований геморой II стадії
- e. Хронічний комбінований геморой IV стадії

46. Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність більше одного року утворень у ділянці анального о

- a. Хронічний комбінований геморой I стадії
- b. Хронічний комбінований геморой II стадії
- c. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- d. Хронічний комбінований геморой IV стадії

е. Хронічний комбінований геморої III стадії

47. Пацієнт віком 45 років скаржиться на слабкість, багаторазове блювання свіжою кров'ю, запаморочення

а. Внутрішньовенна інфузія ІПП у високих дозах

б. Повторна спроба ендоскопічного гемостазу

с. Трансартеріальна емболізація

д. Динамічне спостереження стану пацієнта

е. Невідкладне хірургічне втручання

48. Пацієнт віком 45 років скаржиться на слабкість, багаторазове блювання свіжою кров'ю, запаморочення

а. Повторна спроба ендоскопічного гемостазу

б. Динамічне спостереження стану пацієнта

с. Внутрішньовенна інфузія ІПП у високих дозах

д. Невідкладне хірургічне втручання

е. Трансартеріальна емболізація

49. Пацієнт віком 46 років після трансатлантичного перельоту раптово відчув різкий біль у правій гомілкостопі

а. Артрит гомілковостопного суглоба

б. Облітеруючий ендартеріїт

с. Гострий тромбоз підколінної артерії

д. Гострий тромбоз глибоких вен

е. Хвороба Рейно

50. Пацієнт віком 46 років після трансатлантичного перельоту раптово відчув різкий біль у правій гомілкостопі

а. Гострий тромбоз підколінної артерії

б. Хвороба Рейно

с. Облітеруючий ендартеріїт

д. Гострий тромбоз глибоких вен

е. Артрит гомілковостопного суглоба

51. Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий біль у ділянці ануса та незначне виділення крові під час дефекації

а. Гострий геморої. Аноректальний тромбоз

б. Хронічна передня анальна тріщина

с. Хронічний геморої у стадії загострення

д. Аноректальний абсцес

е. Гостра передня анальна тріщина

52. Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий біль у ділянці ануса та незначне виділення крові під час дефекації

а. Хронічний геморої у стадії загострення

б. Гостра передня анальна тріщина

с. Гострий геморої. Аноректальний тромбоз

д. Аноректальний абсцес

е. Хронічна передня анальна тріщина

53. Пацієнт віком 46 років у зоні бойових дій отримав закриту тупу травму живота. На етапах лікування розвинулися ознаки сепсису

а. Постспленектомічний сепсис (OPSI-синдром)

б. Піддіафрагмальний абсцес

с. Рання післяопераційна кишкова непрохідність

д. Госпітальна пневмонія

е. ТЕЛА

54. Пацієнт віком 46 років у зоні бойових дій отримав закриту тупу травму живота. На етапах лікування розвинулися ознаки сепсису

а. Рання післяопераційна кишкова непрохідність

б. Постспленектомічний сепсис (OPSI-синдром)

с. ТЕЛА

д. Піддіафрагмальний абсцес

е. Госпітальна пневмонія

55. Пацієнт віком 47 років скаржиться на порушення сечовипускання при наявності покликувального рефлексу

а. Відкрите накладення цистостоми

б. Лапаротомія

с. Стимуляція діурезу

д. Встановлення катетера Фолея

е. Пункційна цистостомія

56. Пацієнт віком 47 років скаржиться на порушення сечовипускання при наявності покликів. Із анамнезу:

- a. Стимуляція діурезу
- b. Відкрите накладення цистостоми
- c. Встановлення катетера Фолея

d. Пункційна цистостомія

- e. Лапаротомія

57. Пацієнт віком 48 років скаржиться на різкий, оперізуючий біль у верхній половині живота, збільше

- a. Гостра кишкова странгуляційна непрохідність
- b. Гострий деструктивний холецистит
- c. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

d. Гострий панкреатит

- e. Тромбоз мезентеріальних судин

58. Пацієнт віком 48 років скаржиться на різкий, оперізуючий біль у верхній половині живота, збільше

- a. Гострий деструктивний холецистит
- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Гостра кишкова странгуляційна непрохідність
- d. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

e. Гострий панкреатит

59. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на сильний біль за грудниною, печію, блювання, після якого біль

- a. Тест на гелікобактерну інфекцію

b. Оперативне втручання

- c. Консервативне ведення пацієнта, призначення анальгетиків
- d. Призначення антисекреторних препаратів
- e. Проведення спазмолітичної терапії

60. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на сильний біль за грудниною, печію, блювання, після якого біль

- a. Тест на гелікобактерну інфекцію
- b. Консервативне ведення пацієнта, призначення анальгетиків
- c. Проведення спазмолітичної терапії

d. Оперативне втручання

- e. Призначення антисекреторних препаратів

61. Пацієнт віком 55 років скаржиться на гострий біль у животі, що почався раптово 3 год тому, блюва

- a. Гострий панкреатит
- b. Перфоративна виразка шлунка

c. Гостра кишкова непрохідність

- d. Гострий холецистит
- e. Гострий апендицит

62. Пацієнт віком 55 років скаржиться на гострий біль у животі, що почався раптово 3 год тому, блюва

- a. Перфоративна виразка шлунка
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий холецистит

d. Гостра кишкова непрохідність

- e. Гострий апендицит

63. Пацієнт віком 58 років скаржиться на біль у попереку праворуч, що поширювався на праву половину

a. Сечокам'яна хвороба

- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гострий цистит
- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Пухлина нирки

64. Пацієнт віком 58 років скаржиться на біль у попереку праворуч, що поширювався на праву половину

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Пухлина нирки
- c. Гострий цистит

d. Сечокам'яна хвороба

- e. Гострий пієлонефрит

65. Пацієнт віком 58 років скаржиться на інтенсивний постійний біль по всьому животу, нудоту, блюван

- a. Екстрене оперативне лікування після передопераційної підготовки: лапаротомія, апендектомія, санація
- b. Лапароскопічна апендектомія
- c. Апендектомія з доступу МакБерні
- d. Інтенсивна інфузійна антибактеріальна терапія
- e. Екстрене оперативне лікування без передопераційної підготовки
66. Пацієнт віком 58 років скаржиться на інтенсивний постійний біль по всьому животу, нудоту, блювання
- a. Екстрене оперативне лікування без передопераційної підготовки
- b. Апендектомія з доступу МакБерні
- c. Екстрене оперативне лікування після передопераційної підготовки: лапаротомія, апендектомія, санація
- d. Лапароскопічна апендектомія
- e. Інтенсивна інфузійна антибактеріальна терапія
67. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у ділянці лівої частини живота
- a. Антибіотикотерапія
- b. Амбулаторне спостереження
- c. Консервативне лікування
- d. Розкриття та дренивання абсцесу
- e. Електрофорез
68. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у ділянці лівої частини живота
- a. Антибіотикотерапія
- b. Консервативне лікування
- c. Електрофорез
- d. Розкриття та дренивання абсцесу
- e. Амбулаторне спостереження
69. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на біль та здуття живота, нудоту. В анамнезі: ішемічна хвороба
- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Гострий панкреатит
- c. Хвороба Гіршпрунга
- d. Абдомінальний ішемічний синдром
- e. Тромбоз мезентеріальних судин
70. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на біль та здуття живота, нудоту. В анамнезі: ішемічна хвороба
- a. Гострий панкреатит
- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Гостра кишкова непрохідність
- d. Хвороба Гіршпрунга
- e. Абдомінальний ішемічний синдром
71. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на постійний біль унизу живота, який посилюється під час фізичних навантажень
- a. Пахова грижа
- b. Варикозна хвороба нижніх кінцівок
- c. Ілеофеморальний тромбоз
- d. Міома
- e. Пухлина прямої кишки
72. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на постійний біль унизу живота, який посилюється під час фізичних навантажень
- a. Варикозна хвороба нижніх кінцівок
- b. Пухлина прямої кишки
- c. Ілеофеморальний тромбоз
- d. Міома
- e. Пахова грижа
73. Пацієнт віком 65 років скаржиться на біль у черевній порожнині, вздуття живота, блювання, невідкривається
- a. Механічна гостра кишкова непрохідність
- b. Гострий панкреатит. Гостра кишкова непрохідність
- c. Паралітична гостра кишкова непрохідність
- d. Динамічна гостра кишкова непрохідність
- e. Спастична гостра кишкова непрохідність
74. Пацієнт віком 65 років скаржиться на біль у черевній порожнині, вздуття живота, блювання, невідкривається
- a. Спастична гостра кишкова непрохідність

b. Динамічна гостра кишкова непрохідність

c. Механічна гостра кишкова непрохідність

d. Гострий панкреатит. Гостра кишкова непрохідність

e. Паралітична гостра кишкова непрохідність

75. Пацієнт віком 65 років скаржиться на жовтушність шкіри, видимих слизових оболонок, знебарвлення

a. Ендоскопічну ретроградну холангіо-панкреатографію

b. Лапароскопію

c. Черезшкірну черезпечінкову холангіографію

d. Фіброгастодуоденоскопію

e. Спіральну комп'ютерну томографію

76. Пацієнт віком 65 років скаржиться на жовтушність шкіри, видимих слизових оболонок, знебарвлення

a. Лапароскопію

b. Черезшкірну черезпечінкову холангіографію

c. Ендоскопічну ретроградну холангіо-панкреатографію

d. Спіральну комп'ютерну томографію

e. Фіброгастодуоденоскопію

77. Пацієнт віком 66 років скаржиться на відчуття оніміння, похолодання та затерпання в лівій нижній

a. IV

b. II a

c. II б

d. I

e. III

78. Пацієнт віком 66 років скаржиться на відчуття оніміння, похолодання та затерпання в лівій нижній

a. II б

b. I

c. IV

d. II a

e. III

79. Пацієнт віком 67 років скаржиться на оперізувальний біль у верхній половині живота, більше право

a. Гострий холецистит

b. Гостра кишкова непрохідність

c. Гострий апендицит

d. Виразкова хвороба

e. Гострий панкреатит

80. Пацієнт віком 67 років скаржиться на оперізувальний біль у верхній половині живота, більше право

a. Гострий холецистит

b. Гострий апендицит

c. Гостра кишкова непрохідність

d. Гострий панкреатит

e. Виразкова хвороба

81. Пацієнт віком 68 років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопи. Із анамнезу відомо,

a. Гострий тромбоз підколінної вени

b. Хвороба Рейно

c. Гострий варикотромбофлебіт

d. Тромбоемболія підколінної артерії

e. Артрит гомілковостопного суглоба

82. Пацієнт віком 68 років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопи. Із анамнезу відомо,

a. Гострий тромбоз підколінної вени

b. Хвороба Рейно

c. Гострий варикотромбофлебіт

d. Артрит гомілковостопного суглоба

e. Тромбоемболія підколінної артерії

83. Пацієнт віком 68 років скаржиться на раптовий біль у правій гомілці, з'явилося значне зменшення

a. Гострий тромбофлебіт глибоких вен

b. Емболія правої стегнової артерії

- с. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- d. Тромбоз стегнової артерії
- е. Попереково-крижовий остеохондроз

84. Пацієнт віком 68 років скаржиться на раптовий біль у правій гомілці, з'явилося значне зменшення

- a. Попереково-крижовий остеохондроз
- b. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- с. Емболія правої стегнової артерії**

- d. Тромбоз стегнової артерії
- е. Гострий тромбофлебіт глибоких вен

85. Пацієнт віком 68 років скаржиться на спастичний біль у животі, нудоту та блювання, затримку відх

- a. Обхідний трансверзо-ректоанастомоз
- b. Операція Гартмана**

- с. Накладення колостоми проксимальніше obturaції
- d. Лівобічна геміколектомія
- е. Черевно-анальна резекція прямої кишки

86. Пацієнт віком 68 років скаржиться на спастичний біль у животі, нудоту та блювання, затримку відх

- a. Черевно-анальна резекція прямої кишки
- b. Лівобічна геміколектомія
- с. Накладення колостоми проксимальніше obturaції
- d. Обхідний трансверзо-ректоанастомоз

е. Операція Гартмана

87. Пацієнт віком 78 років скаржиться на поклики до сечовипускання, відсутність сечі протягом останн

- a. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, гостра затримка сечі**
- b. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, хронічна затримка сечі
- с. Рак передміхурової залози, гостра затримка сечі
- d. Склероз передміхурової залози, хронічна затримка сечі
- е. Хронічний парапроктит, гостра затримка сечі

88. Пацієнт віком 78 років скаржиться на поклики до сечовипускання, відсутність сечі протягом останн

- a. Склероз передміхурової залози, хронічна затримка сечі
- b. Рак передміхурової залози, гостра затримка сечі
- с. Хронічний парапроктит, гостра затримка сечі
- d. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, хронічна затримка сечі
- е. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, гостра затримка сечі**

89. Пацієнт віком 85 років скаржиться на пожовтіння шкіри та слизових оболонок, наявність ахолічного

- a. ЕРХПГ
- b. МРХПГ**

- с. Діагностичну лапароскопію
- d. Спіральну комп'ютерну томографію ОЧП
- е. ЕФГДС

90. Пацієнт віком 85 років скаржиться на пожовтіння шкіри та слизових оболонок, наявність ахолічного

- a. Спіральну комп'ютерну томографію ОЧП
- b. ЕРХПГ
- с. Діагностичну лапароскопію
- d. ЕФГДС
- е. МРХПГ**

91. Пацієнт після операції з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки скаржиться на біль у в

- a. Панкреатит
- b. Післяопераційна кровотеча**
- с. Гостра кишкова непрохідність
- d. Рецидив виразки
- е. Післяопераційна інфільтрація

92. Пацієнт після операції з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки скаржиться на біль у в

- a. Рецидив виразки
- b. Гостра кишкова непрохідність
- с. Панкреатит

d. Післяопераційна кровотеча

e. Післяопераційна інфільтрація

93. Пацієнта віком 21 рік шпиталізовано без свідомості з ознаками побиття. Об'єктивно спостерігається

- a. Субдуральна гематома ліворуч
- b. Епідуральна гематома ліворуч

c. Забій головного мозку

- d. Субдуральна гематома праворуч
- e. Епідуральна гематома праворуч

94. Пацієнта віком 21 рік шпиталізовано без свідомості з ознаками побиття. Об'єктивно спостерігається

- a. Субдуральна гематома праворуч
- b. Епідуральна гематома праворуч
- c. Субдуральна гематома ліворуч
- d. Епідуральна гематома ліворуч

e. Забій головного мозку

95. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано з клінічною картиною апендикулярного інфільтрату. Після пр

- a. Апендектомія показана після чергового загострення
- b. Апендектомія показана через 2 тижні

c. Виконати апендектомію через 3 місяці

- d. Виконати апендектомію, не виписуючи пацієнта
- e. Апендектомія не показана

96. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано з клінічною картиною апендикулярного інфільтрату. Після пр

- a. Апендектомія показана через 2 тижні
- b. Апендектомія не показана
- c. Виконати апендектомію, не виписуючи пацієнта
- d. Апендектомія показана після чергового загострення

e. Виконати апендектомію через 3 місяці

97. Пацієнта віком 24 роки шпиталізовано зі скаргами на різкий інтенсивний біль в епігастрії, який в

- a. Ендоскопічне ушивання перфоративної виразки, противиразкова терапія
- b. Лапароскопічне висічення виразки, дуоденопластика

c. Невідкладне оперативне втручання після передопераційної підготовки: лапаротомія, ушивання перф

- d. Лапаротомія, резекція шлунка за Більрот-2, санація, дренивання черевної порожнини
- e. Консервативна інтенсивна інфузійна антибактеріальна противиразкова терапія

98. Пацієнта віком 24 роки шпиталізовано зі скаргами на різкий інтенсивний біль в епігастрії, який в

- a. Консервативна інтенсивна інфузійна антибактеріальна противиразкова терапія
- b. Лапароскопічне висічення виразки, дуоденопластика
- c. Лапаротомія, резекція шлунка за Більрот-2, санація, дренивання черевної порожнини

d. Невідкладне оперативне втручання після передопераційної підготовки: лапаротомія, ушивання перф

- e. Ендоскопічне ушивання перфоративної виразки, противиразкова терапія

99. Пацієнта віком 25 років прооперовано з приводу гострого апендициту 2 дні тому. Скаржиться на під

- a. Інфільтрат
- b. Тромбоз глибоких вен
- c. Геморагія
- d. Гостра кишкова непрохідність

e. Нагноєння післяопераційної рани

100. Пацієнта віком 25 років прооперовано з приводу гострого апендициту 2 дні тому. Скаржиться на пі

- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Інфільтрат
- c. Тромбоз глибоких вен
- d. Геморагія

e. Нагноєння післяопераційної рани

101. Пацієнта віком 27 років шпиталізовано зі скаргами на біль у животі. За результатами рентгеногра

- a. У поперечному відділі ободової кишки
- b. У початкових відділах ободової кишки
- c. На рівні дванадцятипалої кишки
- d. У сигмоподібній кишці

е. У початкових відділах тонкої кишки

102. Пацієнта віком 27 років шпиталізовано зі скаргами на біль у животі. За результатами рентгеногра

а. У початкових відділах тонкої кишки

б. У сигмоподібній кишці

с. У поперечному відділі ободової кишки

д. У початкових відділах ободової кишки

е. На рівні дванадцятипалої кишки

103. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано зі скаргами на слабкість, запаморочення. Із анамнезу відо

а. Гострий панкреатит

б. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

с. Шлунково-кишкова кровотеча

д. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

е. Синдром Меллорі-Вейса

104. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано зі скаргами на слабкість, запаморочення. Із анамнезу відо

а. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

б. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

с. Гострий панкреатит

д. Шлунково-кишкова кровотеча

е. Синдром Меллорі-Вейса

105. Пацієнта віком 29 років шпиталізовано з проникаючим пораненням грудної клітки ліворуч. Об'єкти

а. Геморагічний шок

б. Гідроторакс ліворуч

с. Пневмоторакс ліворуч

д. Поранення легень

е. Поранення серця

106. Пацієнта віком 29 років шпиталізовано з проникаючим пораненням грудної клітки ліворуч. Об'єкти

а. Поранення легень

б. Пневмоторакс ліворуч

с. Гідроторакс ліворуч

д. Геморагічний шок

е. Поранення серця

107. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано після ДТП з політравмою. Об'єктивно спостерігається: пульс

а. Пропофол

б. Кетамін

с. Оксibuтират натрію

д. Тіопентал натрію

е. Фентаніл

108. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано після ДТП з політравмою. Об'єктивно спостерігається: пульс

а. Пропофол

б. Кетамін

с. Тіопентал натрію

д. Оксibuтират натрію

е. Фентаніл

109. Пацієнта віком 33 роки шпиталізовано зі скаргами на нудоту, блювання нещодавно з'їденою їжею,

а. Кровотеча з гострих ерозій стравоходу, що викликані хімічним опіком

б. Кровоточива виразка шлунка

с. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу

д. Синдром Меллорі-Вейсса. Активна кровотеча

е. Гостра кровотеча, що викликана гострою поліорганною недостатністю після вживання сурогатів алко

110. Пацієнта віком 33 роки шпиталізовано зі скаргами на нудоту, блювання нещодавно з'їденою їжею,

а. Синдром Меллорі-Вейсса. Активна кровотеча

б. Кровоточива виразка шлунка

с. Гостра кровотеча, що викликана гострою поліорганною недостатністю після вживання сурогатів алко

д. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу

е. Кровотеча з гострих ерозій стравоходу, що викликані хімічним опіком

111. Пацієнта віком 34 роки шпиталізовано після ДТП зі скаргами на різкий біль у ділянці промежини,
а. Проктектомія з формуванням anus praeter naturalis

б. Формування колостоми з наступним ушиванням розриву прямої кишки

с. Первинне ушивання розриву через промежину

д. Проведення лапаротомії з ушиванням розриву прямої кишки без накладання колостоми

е. Призначення антибактеріальної та спазмолітичної терапії

112. Пацієнта віком 34 роки шпиталізовано після ДТП зі скаргами на різкий біль у ділянці промежини,

а. Проктектомія з формуванням anus praeter naturalis

б. Проведення лапаротомії з ушиванням розриву прямої кишки без накладання колостоми

с. Призначення антибактеріальної та спазмолітичної терапії

д. Формування колостоми з наступним ушиванням розриву прямої кишки

е. Первинне ушивання розриву через промежину

113. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано з відмороженням стоп у пізньому реактивному періоді. Об'єкт

а. Інфузійна терапія. Операція - декомпресійна некротомія

б. Первинна хірургічна обробка ран. Перев'язки

с. Інфузійна детоксикаційна терапія, комплексне антибактеріальне лікування, знеболення. Оперативне

д. Первинний туалет ран. Пов'язки з антисептиками. Операція - ксенопластика

е. Інфузійна терапія. Операція - некротомія з одномоментною аутодермопластиком

114. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано з відмороженням стоп у пізньому реактивному періоді. Об'єкт

а. Інфузійна терапія. Операція - некротомія з одномоментною аутодермопластиком

б. Первинний туалет ран. Пов'язки з антисептиками. Операція - ксенопластика

с. Інфузійна терапія. Операція - декомпресійна некротомія

д. Первинна хірургічна обробка ран. Перев'язки

е. Інфузійна детоксикаційна терапія, комплексне антибактеріальне лікування, знеболення. Оперативне

115. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано з опіком III ступеня правого передпліччя. Який метод ліку

а. Лазерне лікування

б. Пересадка ксенодерми

с. Аутодермопластика

д. Гіпербарична оксигенація

е. Консервативне лікування мазями

116. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано з опіком III ступеня правого передпліччя. Який метод ліку

а. Лазерне лікування

б. Пересадка ксенодерми

с. Гіпербарична оксигенація

д. Консервативне лікування мазями

е. Аутодермопластика

117. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано з різано-рваною раною по медіальній поверхні лівого стегн

а. Зшивання мобілізованих кінців артерії шляхом "кінець у кінець"

б. Протезування артерії за допомогою вставки із судинного протеза з дакрону

с. Протезування артерії за допомогою вставки із судинного протеза з політетрафторетилену

д. Протезування артерії фрагментом великої підшкірної вени зі здорової кінцівки

е. Протезування артерії фрагментом великої підшкірної вени з ураженої кінцівки

118. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано з різано-рваною раною по медіальній поверхні лівого стегн

а. Протезування артерії фрагментом великої підшкірної вени з ураженої кінцівки

б. Зшивання мобілізованих кінців артерії шляхом "кінець у кінець"

с. Протезування артерії за допомогою вставки із судинного протеза з дакрону

д. Протезування артерії фрагментом великої підшкірної вени зі здорової кінцівки

е. Протезування артерії за допомогою вставки із судинного протеза з політетрафторетилену

119. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано після ДТП зі скаргами на сильний біль у лівій частині груд

а. Гемоторакс

б. Пневмоторакс

с. Плевральний випіт

д. Перелом ребер

е. Контузія легень

120. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано після ДТП зі скаргами на сильний біль у лівій частині груд

a. Пневмоторакс

b. Гемоторакс

c. Плевральний випіт

d. Перелом ребер

e. Контузія легень

121. Пацієнта віком 45 років у шоковому стані шпиталізовано з діагнозом: закрита травма органів чере

a. Лапаротомія зі спленектомією

b. Переливання однокрупної крові

c. Інтенсивна інфузійна терапія

d. Діагностична лапароскопія

e. Лапаротомія з ушиванням розриву селезінки

122. Пацієнта віком 45 років у шоковому стані шпиталізовано з діагнозом: закрита травма органів чере

a. Лапаротомія з ушиванням розриву селезінки

b. Діагностична лапароскопія

c. Переливання однокрупної крові

d. Лапаротомія зі спленектомією

e. Інтенсивна інфузійна терапія

123. Пацієнта віком 46 років шпиталізовано зі встановленим діагнозом: защемлена пахова грижа право

a. Резекція тонкої кишки в межах - проксимально 35-40 см, дистально 15-20 см

b. Резекція тонкої кишки по 20 см з обох боків

c. Резекція тонкої кишки в межах - проксимально 20-25 см, дистально 10-15 см

d. Закрита назоінтестинальна інтубація

e. Накладання ентеростоми

124. Пацієнта віком 46 років шпиталізовано зі встановленим діагнозом: защемлена пахова грижа право

a. Резекція тонкої кишки по 20 см з обох боків

b. Накладання ентеростоми

c. Резекція тонкої кишки в межах - проксимально 20-25 см, дистально 10-15 см

d. Закрита назоінтестинальна інтубація

e. Резекція тонкої кишки в межах - проксимально 35-40 см, дистально 15-20 см

125. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано зі скаргами на ниючий біль в епігастрії, нудоту, блювання

a. Операцію "на виключення"

b. Гастректомію

c. Проксимальну резекцію шлунка

d. Хіміотерапію

e. Висічення виразки

126. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано зі скаргами на ниючий біль в епігастрії, нудоту, блювання

a. Хіміотерапію

b. Операцію "на виключення"

c. Проксимальну резекцію шлунка

d. Висічення виразки

e. Гастректомію

127. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано зі скаргами на слабкість, рідкий чорний стілець, блювання

a. Систолічного АТ та пульсу

b. Гемоглобіну та еритроцитів

c. Гематокриту, гемоглобіну, еритроцитів, ШОЕ

d. Гемоглобіну та гематокриту

e. Маса тіла та гематокриту

128. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано зі скаргами на слабкість, рідкий чорний стілець, блювання

a. Гематокриту, гемоглобіну, еритроцитів, ШОЕ

b. Маса тіла та гематокриту

c. Систолічного АТ та пульсу

d. Гемоглобіну та гематокриту

e. Гемоглобіну та еритроцитів

129. Пацієнта віком 68 років шпиталізовано зі скаргами на почорніння шкіри та набряк правої стопи й

a. Антибіотикотерапія та корекція рівня глікемії

- b. Некректомія з антибіотикотерапією широкого спектра дії
- c. Ампутація на рівні гомілки в межах здорових тканин
- d. Судинна реконструкція із подальшим спостереженням

e. Ампутація на рівні стегна

130. Пацієнта віком 68 років шпиталізовано зі скаргами на почорніння шкіри та набряк правої стопи й

- a. Судинна реконструкція із подальшим спостереженням
- b. Некректомія з антибіотикотерапією широкого спектра дії
- c. Ампутація на рівні гомілки в межах здорових тканин

d. Ампутація на рівні стегна

e. Антибіотикотерапія та корекція рівня глікемії

131. Пацієнта віком 69 років шпиталізовано з нападами судом, блюванням. В анамнезі: виразка дванадцятипалої кишки

- a. Рак тіла шлунка
- b. Синдром Золлінгера-Еллісона

c. Декомпенсований стеноз ворота

- d. Рак жовчного міхура
- e. Рак великого дуоденального сосочка

132. Пацієнта віком 69 років шпиталізовано з нападами судом, блюванням. В анамнезі: виразка дванадцятипалої кишки

a. Синдром Золлінгера-Еллісона

b. Декомпенсований стеноз ворота

- c. Рак жовчного міхура
- d. Рак великого дуоденального сосочка

e. Рак тіла шлунка

133. Пацієнта віком 70 років шпиталізовано зі скаргами на біль у черевній порожнині, вздуття живота,

- a. Жовчнокам'яна хвороба. Печінкова коліка
- b. Заворот товстої кишки. Гостра кишкова непрохідність
- c. Лівобічна пахова грижа. Гостра кишкова непрохідність
- d. Гострий панкреатит. Гостра печінкова недостатність

e. Рак товстої кишки. Гостра кишкова непрохідність

134. Пацієнта віком 70 років шпиталізовано зі скаргами на біль у черевній порожнині, вздуття живота,

a. Заворот товстої кишки. Гостра кишкова непрохідність

b. Рак товстої кишки. Гостра кишкова непрохідність

- c. Гострий панкреатит. Гостра печінкова недостатність
- d. Лівобічна пахова грижа. Гостра кишкова непрохідність
- e. Жовчнокам'яна хвороба. Печінкова коліка

135. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль та почервоніння шкіри дистальної фаланги п'ятого пальця

- a. Аргонна
- b. Біполярна
- c. Ультразвукова

d. Монополярна

e. Лазерна

136. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль та почервоніння шкіри дистальної фаланги п'ятого пальця

- a. Біполярна
- b. Ультразвукова
- c. Лазерна

d. Монополярна

e. Аргонна

137. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на гострий біль у нижніх відділах живота, з іррадіацією в правий бік

- a. Гострий сальпінгоофорит
- b. Апоплексія лівого яєчника
- c. Загрозливий аборт

d. Позаматкова вагітність

e. Гострий апендицит

138. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на гострий біль у нижніх відділах живота, з іррадіацією в правий бік

- a. Гострий сальпінгоофорит
- b. Апоплексія лівого яєчника

- c. Загрозливий аборт
- d. Гострий апендицит

e. Позаматкова вагітність

139. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на гострий пульсуючий біль у правій грудній залозі, високу

- a. Фіброзно-кістозна мастопатія
- b. Лактостаз
- c. Рак грудної залози
- d. Фіброаденома

e. Гострий гнійний мастит

140. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на гострий пульсуючий біль у правій грудній залозі, високу

- a. Фіброзно-кістозна мастопатія
- b. Фіброаденома

c. Гострий гнійний мастит

- d. Рак грудної залози
- e. Лактостаз

141. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на болючі випинання в ділянці прямої кишки. В анамнезі: поло

- a. Дезартерізація внутрішніх гемороїдальних вузлів та мукопексія

b. Гемороїдектомія

- c. Системна медикаментозна терапія із застосуванням пігулок на тлі місцевої медикаментозної терапії
- d. Місцева медикаментозна терапія із застосуванням супозиторіїв та мазей
- e. Латексне лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів

142. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на болючі випинання в ділянці прямої кишки. В анамнезі: поло

- a. Латексне лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів
- b. Місцева медикаментозна терапія із застосуванням супозиторіїв та мазей

c. Гемороїдектомія

- d. Системна медикаментозна терапія із застосуванням пігулок на тлі місцевої медикаментозної терапії
- e. Дезартерізація внутрішніх гемороїдальних вузлів та мукопексія

143. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на часті рідкі випорожнення з домішками крові до 20-ти разів

- a. Гострий панкреатит
- b. Псевдомембранозний коліт
- c. Хвороба Крона
- d. Шигельоз

e. Виразковий коліт

144. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на часті рідкі випорожнення з домішками крові до 20-ти разів

- a. Гострий панкреатит
- b. Псевдомембранозний коліт
- c. Шигельоз
- d. Хвороба Крона

e. Виразковий коліт

145. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль у верхніх відділах живота, потемніння сечі, пожовті

- a. Гострий висхідний холангіт
- b. Кишкова непрохідність
- c. Гостра ниркова недостатність
- d. Гострий холецистит

e. Гострий пост-ЕРХГ панкреатит

146. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль у верхніх відділах живота, потемніння сечі, пожовті

- a. Гострий холецистит
- b. Гостра ниркова недостатність

c. Гострий пост-ЕРХГ панкреатит

- d. Гострий висхідний холангіт
- e. Кишкова непрохідність

147. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на нудоту, блювання з домішками жовчі, біль у ділянці серця

- a. Інфаркт міокарда
- b. Виразка шлунка
- c. Напад жовчної коліки**

- d. Панкреонекроз
- e. Стенокардія Принцметала

148. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на нудоту, блювання з домішками жовчі, біль у ділянці серця

- a. Панкреонекроз
- b. Виразка шлунка
- c. Стенокардія Принцметала
- d. Інфаркт міокарда
- e. Напад жовчної коліки

149. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на багаторазове блювання, появу крові у блювотних масах. Із

- a. Хвороба Менетріє
- b. Хвороба Крона
- c. Хвороба Рендю-Ослера-Вебера
- d. Виразка кардіального відділу шлунка
- e. Синдром Меллорі-Вейса

150. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на багаторазове блювання, появу крові у блювотних масах. Із

- a. Хвороба Рендю-Ослера-Вебера
- b. Синдром Меллорі-Вейса
- c. Хвороба Крона
- d. Хвороба Менетріє
- e. Виразка кардіального відділу шлунка

151. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на затримку менструації, нудоту та загубіння молочних залоз

- a. beta-хоріонічний гонадотропін
- b. Фолікулстимулюючий гормон
- c. Пролактин
- d. alpha-фетопроутейн
- e. Лютеїнізуючий гормон

152. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на затримку менструації, нудоту та загубіння молочних залоз

- a. Фолікулстимулюючий гормон
- b. beta-хоріонічний гонадотропін
- c. Пролактин
- d. alpha-фетопроутейн
- e. Лютеїнізуючий гормон

153. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на постійний біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, слаб

- a. Апендектомія із доступу Волковича-Дьяконова
- b. Відеоендоскопічна апендектомія
- c. Лапаротомія, санація, дренування черевної порожнини
- d. Консервативне лікування в денному стаціонарі
- e. Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі

154. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на постійний біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, слаб

- a. Консервативне лікування в денному стаціонарі
- b. Апендектомія із доступу Волковича-Дьяконова
- c. Лапаротомія, санація, дренування черевної порожнини
- d. Відеоендоскопічна апендектомія
- e. Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі

155. Пацієнтка віком 39 років у результаті ДТП отримала удар по правій плечовій кістці дверима, відч

- a. Консервативне лікування - антибіотикотерапія, анальгетики
- b. Лікування скелетним витягінням
- c. Оперативне лікування - відкрита репозиція, остеометалосинтез, ревізія променевого нерва
- d. Консервативне лікування - закрита репозиція, гіпсова іммобілізація
- e. Оперативне лікування - накладання апарата зовнішньої фіксації

156. Пацієнтка віком 39 років у результаті ДТП отримала удар по правій плечовій кістці дверима, відч

- a. Оперативне лікування - накладання апарата зовнішньої фіксації
- b. Консервативне лікування - закрита репозиція, гіпсова іммобілізація
- c. Консервативне лікування - антибіотикотерапія, анальгетики
- d. Оперативне лікування - відкрита репозиція, остеометалосинтез, ревізія променевого нерва

е. Лікування скелетним витяжінням

157. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на постійний біль у животі протягом 6-ти днів, підвищення т

а. Правобічний піосальпінкс

б. Пухлина сліпої кишки

с. Правобічний паранефрит

д. Апендикулярний інфільтрат

е. Позаматкова трубна вагітність

158. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на постійний біль у животі протягом 6-ти днів, підвищення т

а. Пухлина сліпої кишки

б. Апендикулярний інфільтрат

с. Правобічний піосальпінкс

д. Позаматкова трубна вагітність

е. Правобічний паранефрит

159. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на постійний розпираючий біль у поперековій ділянці, загальн

а. Флегмона поперекової ділянки

б. Фурункульоз поперекової ділянки

с. Фурункул поперекової ділянки, у стадії абсцедування

д. Абсцес поперекової ділянки

е. Карбункул поперекової ділянки, стадія абсцедування

160. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на постійний розпираючий біль у поперековій ділянці, загальн

а. Фурункульоз поперекової ділянки

б. Карбункул поперекової ділянки, стадія абсцедування

с. Фурункул поперекової ділянки, у стадії абсцедування

д. Флегмона поперекової ділянки

е. Абсцес поперекової ділянки

161. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт у ділянці шиї, утруднене ковтання, легке відч

а. Кіста правої частки

б. Фолікулярний аденоматозний зоб

с. Вузловий колоїдний зоб

д. Ендемічний зоб

е. Папілярний рак щитоподібної залози

162. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт у ділянці шиї, утруднене ковтання, легке відч

а. Фолікулярний аденоматозний зоб

б. Кіста правої частки

с. Ендемічний зоб

д. Папілярний рак щитоподібної залози

е. Вузловий колоїдний зоб

163. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на симптоми кишкового дискомфорту, які з'явилися в неї місця

а. Хвороба Крона

б. Виразковий коліт

с. Дивертикуліт сигмоподібної кишки

д. Псевдомембранозний коліт

е. Рак сигмоподібної кишки

164. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на симптоми кишкового дискомфорту, які з'явилися в неї місця

а. Рак сигмоподібної кишки

б. Дивертикуліт сигмоподібної кишки

с. Хвороба Крона

д. Псевдомембранозний коліт

е. Виразковий коліт

165. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на розпираючий біль у ділянці лівої гомілки, підвищення тем

а. Гострий тромбоз вен лівої гомілки

б. Гострий артеріальний тромбоз підколінної артерії

с. Гострий лімфангоїт правої нижньої кінцівки

д. Варикозне розширення вен кінцівки

е. Артеріальна оклюзія

166. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на розпираючий біль у ділянці лівої гомілки, підвищення тем
- a. Артеріальна оклюзія
 - b. Гострий лімфангоїт правої нижньої кінцівки
 - c. Гострий тромбоз вен лівої гомілки**
 - d. Гострий артеріальний тромбоз підколінної артерії
 - e. Варикозне розширення вен кінцівки
167. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на сильний біль у правій половині живота, який іррадіює в пр
- a. Гострий холецистит**
 - b. Гострий апендицит
 - c. Перфоративна виразка
 - d. Гостра кишкова непрохідність
 - e. Правобічна ниркова коліка
168. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на сильний біль у правій половині живота, який іррадіює в пр
- a. Гострий апендицит
 - b. Гострий холецистит**
 - c. Правобічна ниркова коліка
 - d. Гостра кишкова непрохідність
 - e. Перфоративна виразка
169. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на блювання кров'ю, загальну слабкість, потемніння в очах.
- a. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу**
 - b. Легенева кровотеча
 - c. Синдром Золлінгера-Еллісона
 - d. Гостра печінкова недостатність
 - e. Шлунково-кишкова кровотеча
170. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на блювання кров'ю, загальну слабкість, потемніння в очах.
- a. Синдром Золлінгера-Еллісона
 - b. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу**
 - c. Легенева кровотеча
 - d. Шлунково-кишкова кровотеча
 - e. Гостра печінкова недостатність
171. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праву лопатку.
- a. Збільшення розмірів жовчного міхура
 - b. Наявність густої жовчі в жовчному міхурі
 - c. Скупчення рідини навколо жовчного міхура та розшарування його стінки**
 - d. Подвійний контур та потовщення стінок жовчного міхура
 - e. Наявність конкрементів з акустичною тінню в жовчному міхурі
172. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праву лопатку.
- a. Наявність конкрементів з акустичною тінню в жовчному міхурі
 - b. Подвійний контур та потовщення стінок жовчного міхура
 - c. Збільшення розмірів жовчного міхура
 - d. Скупчення рідини навколо жовчного міхура та розшарування його стінки**
 - e. Наявність густої жовчі в жовчному міхурі
173. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на періодичний біль у поперековій ділянці праворуч. На УЗД:
- a. Імунотерапія
 - b. Нефректомія праворуч
 - c. Променева терапія
 - d. Резекція правої нирки**
 - e. Хіміотерапія
174. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на періодичний біль у поперековій ділянці праворуч. На УЗД:
- a. Нефректомія праворуч
 - b. Резекція правої нирки**
 - c. Імунотерапія
 - d. Хіміотерапія
 - e. Променева терапія
175. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на різкий біль у лівій половині грудної клітки та задишку,

a. Напружений пневмоторакс

- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Набряк легень
- d. Інфаркт міокарда
- e. Пневмонія

176. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на різкий біль у лівій половині грудної клітки та задишку,

- a. Набряк легень
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Пневмонія

d. Напружений пневмоторакс

- e. Інфаркт міокарда

177. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на постійний ниючий біль в епігастральній ділянці з іррадіа

a. Цитологічне дослідження аспірату з утворювання

- b. Ретроградна холангіопанкреатографія
- c. Визначення рівня панкреатичних ферментів у крові
- d. МРТ
- e. Спіральна комп'ютерна томографія

178. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на постійний ниючий біль в епігастральній ділянці з іррадіа

- a. Визначення рівня панкреатичних ферментів у крові

b. Цитологічне дослідження аспірату з утворювання

- c. Ретроградна холангіопанкреатографія
- d. Спіральна комп'ютерна томографія
- e. МРТ

179. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці, у правому підребер'ї з ір

- a. Гострий панкреатит
- b. Сечокам'яна хвороба

c. Гострий холецистит

- d. Жовчно-міхурова коліка
- e. Холедохолітіаз, холангіт

180. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці, у правому підребер'ї з ір

- a. Холедохолітіаз, холангіт

b. Гострий холецистит

- c. Жовчно-міхурова коліка
- d. Сечокам'яна хвороба
- e. Гострий панкреатит

181. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на здуття кишечника, закрепи, різку слабкість, схуднення. І

- a. Рак сліпої кишки
- b. Рак підшлункової залози
- c. Гостра кишкова непрохідність

d. Рак сигмоподібної кишки

- e. Перфоративна виразка прямої кишки

182. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на здуття кишечника, закрепи, різку слабкість, схуднення. І

- a. Рак сліпої кишки
- b. Рак підшлункової залози
- c. Перфоративна виразка прямої кишки

d. Рак сигмоподібної кишки

- e. Гостра кишкова непрохідність

183. Пацієнтка віком 70 років скаржиться на раптовий інтенсивний головний біль та нудоту. Із анамнез

- a. Гіпертонічний криз
- b. Пухлина головного мозку
- c. Лакунарний інсульт
- d. Судинна енцефалопатія

e. Субарахноїдальний крововилив

184. Пацієнтка віком 70 років скаржиться на раптовий інтенсивний головний біль та нудоту. Із анамнез

- a. Пухлина головного мозку

b. Субарахноїдальний крововилив

- c. Судинна енцефалопатія
- d. Гіпертонічний криз
- e. Лакунарний інсульт

185. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на загальну слабкість, дискомфорт в епігастральній ділянці,

a. Рак головки підшлункової залози

- b. Перфоративна виразка ДПК
- c. Хронічний гепатит
- d. Гострий аднексит
- e. Позаматкова вагітність

186. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на загальну слабкість, дискомфорт в епігастральній ділянці,

a. Перфоративна виразка ДПК

- b. Позаматкова вагітність
- c. Рак головки підшлункової залози**

- d. Гострий аднексит
- e. Хронічний гепатит

187. Пацієнтку віком 19 років шпиталізовано зі скаргами на біль унизу живота, більше праворуч, з ірр

a. Апоплексія яєчника

- b. Ниркова коліка
- c. Гострий апендицит
- d. Порушена позаматкова вагітність
- e. Гострий панкреатит

188. Пацієнтку віком 19 років шпиталізовано зі скаргами на біль унизу живота, більше праворуч, з ірр

- a. Гострий апендицит
- b. Порушена позаматкова вагітність
- c. Ниркова коліка

d. Апоплексія яєчника

- e. Гострий панкреатит

189. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано зі скаргами на гострий біль у животі, який з'явився рапт

a. У динамічному спостереженні

b. У виконанні хірургічного втручання

- c. У консультації суміжних фахівців
- d. У призначенні антибактеріальних препаратів
- e. У виконанні інструментальної діагностики

190. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано зі скаргами на гострий біль у животі, який з'явився рапт

- a. У призначенні антибактеріальних препаратів
- b. У консультації суміжних фахівців
- c. У виконанні інструментальної діагностики

d. У виконанні хірургічного втручання

- e. У динамічному спостереженні

191. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано зі шлунково-кишковою кровотечею зі скаргами на загальну

a. Виразка дванадцятипалої кишки

- b. Варикозні вени стравоходу
- c. Пухлина ободової кишки
- d. Пухлина шлунка
- e. Внутрішній геморой

192. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано зі шлунково-кишковою кровотечею зі скаргами на загальну

- a. Варикозні вени стравоходу
- b. Внутрішній геморой

c. Виразка дванадцятипалої кишки

- d. Пухлина шлунка
- e. Пухлина ободової кишки

193. Пацієнтку віком 39 років 14 днів тому прооперовано з приводу перфоративного апендициту, пошир

a. Міжпетельний абсцес

- b. Пухлина черевної порожнини

- c. Абсцес печінки
- d. Абсцес селезінки
- e. Кіста лівої нирки

194. Пацієнтку віком 39 років 14 днів тому прооперовано з приводу перфоративного апендициту, пошир

a. Пухлина черевної порожнини

b. Міжпетельний абсцес

- c. Абсцес печінки
- d. Кіста лівої нирки
- e. Абсцес селезінки

195. Пацієнтку віком 40 років прооперовано з приводу вузлового тиреотоксичного зоба, виконано субто

a. Тиреотоксичний криз

- b. Гіпотиреоїдний криз
- c. Порушення мозкового кровообігу
- d. Ішемічна хвороба серця
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

196. Пацієнтку віком 40 років прооперовано з приводу вузлового тиреотоксичного зоба, виконано субто

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Порушення мозкового кровообігу
- c. Гіпотиреоїдний криз
- d. Тиреотоксичний криз**

e. Ішемічна хвороба серця

197. Пацієнтку віком 40 років прооперовано з приводу гострого гангренозного перфоративного апенди

a. Абсцес простору Дугласа

- b. Гостра кишкова непрохідність
- c. Заочеревинна флегмона
- d. Рак прямої кишки
- e. Гострий панкреатит

198. Пацієнтку віком 40 років прооперовано з приводу гострого гангренозного перфоративного апенди

- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Заочеревинна флегмона
- c. Гострий панкреатит
- d. Рак прямої кишки

e. Абсцес простору Дугласа

a. Защемлена пупкова грижа

- b. Невправима пупкова грижа
- c. Ліпома передньої черевної стінки
- d. Підшкірна евентрація
- e. Пухлина органів черевної порожнини

200. Пацієнтку віком 55 років шпиталізовано зі скаргами на біль у пупковій ділянці, який виник 6-8 г

a. Защемлена пупкова грижа

- b. Невправима пупкова грижа
- c. Ліпома передньої черевної стінки
- d. Підшкірна евентрація
- e. Пухлина органів черевної порожнини

201. Пацієнтку віком 63 роки прооперовано з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба великих роз

a. Недостатність паращитоподібних залоз

- b. Тиреотоксичний криз
- c. Пошкодження зворотного нерва
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Післяопераційний гіпотиреоз

202. Пацієнтку віком 63 роки прооперовано з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба великих роз

a. Тиреотоксичний криз

- b. Післяопераційний гіпотиреоз
- c. Недостатність паращитоподібних залоз**

- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Пошкодження зворотного нерва

203. Пацієнтку віком 65 років прооперовано з приводу гострої кишкової непрохідності, спричиненої спа

- a. Кровотеча з лінії шва
- b. Неспроможність анастомозу

- c. Парез кишечника
- d. Сепсис
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

204. Пацієнтку віком 65 років прооперовано з приводу гострої кишкової непрохідності, спричиненої спа

- a. Кровотеча з лінії шва
- b. Тромбоемболія легеневої артерії

c. Неспроможність анастомозу

- d. Парез кишечника
- e. Сепсис

205. Пацієнту віком 39 років встановлено діагноз: ехінококова кіста печінки. Яка лікувальна тактика

a. Хірургічне лікування після двотижневого курсу хіміотерапії

- b. Три курси хіміотерапії по 28 днів із перервою між курсами 14 днів
- c. Хірургічне лікування у вигляді паліативної операції
- d. Хірургічне лікування у вигляді радикальної операції
- e. Хірургічне лікування без застосування хіміотерапії

206. Пацієнту віком 39 років встановлено діагноз: ехінококова кіста печінки. Яка лікувальна тактика

- a. Хірургічне лікування у вигляді радикальної операції
- b. Хірургічне лікування без застосування хіміотерапії

c. Хірургічне лікування після двотижневого курсу хіміотерапії

- d. Три курси хіміотерапії по 28 днів із перервою між курсами 14 днів
- e. Хірургічне лікування у вигляді паліативної операції

207. Пацієнту віком 40 років із паховою грижею виконується лапароскопічна герніопластика. Накладанн

- a. Клубово-підчеревний та клубово-паховий нерви
- b. Сім'яний канатик
- c. Клубово-паховий нерв
- d. Нижні епігастральні судини

e. Бічний шкірний нерв стегна, статева та стегова гілки статево-стегового нерва

208. Пацієнту віком 40 років із паховою грижею виконується лапароскопічна герніопластика. Накладанн

a. Нижні епігастральні судини

b. Бічний шкірний нерв стегна, статева та стегова гілки статево-стегового нерва

- c. Клубово-паховий нерв
- d. Сім'яний канатик
- e. Клубово-підчеревний та клубово-паховий нерви

209. Пацієнту віком 43 роки із стенозом стравоходу вирішено провести черезшкірну ендоскопічну гастр

a. Метронідазол

b. Кліндаміцин

- c. Ципрофлоксацин
- d. Цефазолін
- e. Меропенем

210. Пацієнту віком 43 роки із стенозом стравоходу вирішено провести черезшкірну ендоскопічну гастр

- a. Метронідазол
- b. Цефазолін
- c. Меропенем

d. Кліндаміцин

e. Ципрофлоксацин

211. Пацієнту віком 44 роки з приводу вентральної грижі з грижовими воротами 15x18 см виконано гер

a. Післяопераційна пневмонія

b. Синдром малої черевної порожнини

- c. Післяопераційний перитоніт
- d. Масивна тромбоемболія легених артерій

е. Гостра шлунково-кишкова кровотеча

212. Пацієнту віком 44 роки з приводу вентральної грижі з гризовими воротами 15x18 см виконано герметизацію

а. Післяопераційний перитоніт

б. Масивна тромбоемболія легеневих артерій

с. Післяопераційна пневмонія

д. Гостра шлунково-кишкова кровотеча

е. Синдром малої черевної порожнини

213. Пацієнту віком 47 років встановлено діагноз: хронічна хвороба нирок V стадії, термінальна ниркова недостатність

а. Аутотрансплантація

б. Ортотопічна трансплантація

с. Ізотрансплантація

д. Гетеротрансплантація

е. Ксенотрансплантація

214. Пацієнту віком 47 років встановлено діагноз: хронічна хвороба нирок V стадії, термінальна ниркова недостатність

а. Аутотрансплантація

б. Ортотопічна трансплантація

с. Ізотрансплантація

д. Ксенотрансплантація

е. Гетеротрансплантація

215. Пацієнтці віком 45 років рік тому виконано лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозу

а. Резидуальний холедохолітіаз

б. Папіліт

с. Рубцева стриктура холедоха

д. Спайкова хвороба

е. Хронічний панкреатит

216. Пацієнтці віком 45 років рік тому виконано лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозу

а. Папіліт

б. Рубцева стриктура холедоха

с. Спайкова хвороба

д. Резидуальний холедохолітіаз

е. Хронічний панкреатит

217. Пацієнтці віком 48 років виконано типову лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозу

а. Жовчний перитоніт

б. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки

с. Гострий правобічний пієлонефрит

д. Інтраабдомінальна кровотеча

е. Гострий гнійний холангіт

218. Пацієнтці віком 48 років виконано типову лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозу

а. Гострий правобічний пієлонефрит

б. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки

с. Гострий гнійний холангіт

д. Жовчний перитоніт

е. Інтраабдомінальна кровотеча

219. Пацієнтці віком 72 роки виконано радикальну мастектомію за Мадденом праворуч з приводу раку молочної залози

а. Дексаметазон

б. L-тироксин

с. Тамоксифен

д. Дидрогестерон

е. Преднізолон

220. Пацієнтці віком 72 роки виконано радикальну мастектомію за Мадденом праворуч з приводу раку молочної залози

а. Дидрогестерон

б. Преднізолон

с. Дексаметазон

д. L-тироксин

е. Тамоксифен

221. Пацієнтці проведено алотрансплантацію нирки. Через 10 днів з'явилися скарги на підвищення тем

a. Гостре відторгнення трансплантата

b. Хронічне відторгнення трансплантата

c. Розрив трансплантованої нирки

d. Інфекція сечовивідних шляхів

e. Лімфоцеле

222. Пацієнтці проведено алотрансплантацію нирки. Через 10 днів з'явилися скарги на підвищення тем

a. Лімфоцеле

b. Інфекція сечовивідних шляхів

c. Розрив трансплантованої нирки

d. Гостре відторгнення трансплантата

e. Хронічне відторгнення трансплантата

223. При защемленій грижі живота пацієнт відзначає, що сильний біль, який виник на початку захворю

a. -

b. Про розвиток флегмони грижового мішка

c. Про перехід грижі з форми защемленої у форму невправимої

d. Про некроз грижового вмісту

e. Про охоронне гальмування рефлекторної дуги больових рецепторів

224. При защемленій грижі живота пацієнт відзначає, що сильний біль, який виник на початку захворю

a. Про перехід грижі з форми защемленої у форму невправимої

b. Про некроз грижового вмісту

c. Про охоронне гальмування рефлекторної дуги больових рецепторів

d. -

e. Про розвиток флегмони грижового мішка

225. При компенсованому цирозі печінки з варикозно розширеними венами стравоходу та рецидивами н

a. Накладання порто-кавального анастомозу

b. Дренування черевної порожнини

c. Накладання артеріо-венозного анастомозу

d. Спленектомія

e. Оментопексія

226. При компенсованому цирозі печінки з варикозно розширеними венами стравоходу та рецидивами н

a. Спленектомія

b. Оментопексія

c. Накладання порто-кавального анастомозу

d. Дренування черевної порожнини

e. Накладання артеріо-венозного анастомозу

227. Під час лапароскопічних операцій створення пневмоперитонеуму (заповнення черевної порожнини

a. 19-21 мм рт. ст.

b. 16-18 мм рт. ст.

c. 6-8 мм рт. ст.

d. 9-11 мм рт. ст.

e. 12-15 мм рт. ст.

228. Під час лапароскопічних операцій створення пневмоперитонеуму (заповнення черевної порожнини

a. 9-11 мм рт. ст.

b. 19-21 мм рт. ст.

c. 12-15 мм рт. ст.

d. 16-18 мм рт. ст.

e. 6-8 мм рт. ст.

229. Під час огляду пацієнтки віком 68 років виявлено: на обох ногах шкіра ціанотична з мармуровими

a. III ступінь обмороження

b. IV ступінь обмороження

c. I ступінь обмороження

d. II ступінь обмороження

e. Переохолодження

230. Під час огляду пацієнтки віком 68 років виявлено: на обох ногах шкіра ціанотична з мармуровими

- a. II ступінь обмороження
- b. Переохолодження
- c. I ступінь обмороження

d. III ступінь обмороження

- e. IV ступінь обмороження

231. Під час операції з приводу защемленої грижі виявлено нежиттєздатну петлю кишечника. Які подальші дії?

a. Резекція нежиттєздатної ділянки кишки, накладання анастомозу, пластика гризових воріт

- b. Закрити рану без пластики гризових воріт
- c. Продовжити операцію, спробувати вправити кишку
- d. Вивести ентеростому
- e. Відкласти операцію, призначити консервативне лікування

232. Під час операції з приводу защемленої грижі виявлено нежиттєздатну петлю кишечника. Які подальші дії?

- a. Закрити рану без пластики гризових воріт
- b. Відкласти операцію, призначити консервативне лікування
- c. Продовжити операцію, спробувати вправити кишку
- d. Вивести ентеростому

e. Резекція нежиттєздатної ділянки кишки, накладання анастомозу, пластика гризових воріт

233. Тромбоз (тромбоемболія) якої судини призводить до найпоширенішого ураження кишечника?

- a. Ворітної вени
- b. Нижньої брижової артерії

c. Верхньої брижової артерії

- d. Верхньої брижової вени
- e. Черевного стовбура

234. Тромбоз (тромбоемболія) якої судини призводить до найпоширенішого ураження кишечника?

- a. Ворітної вени
- b. Черевного стовбура
- c. Нижньої брижової артерії

d. Верхньої брижової артерії

- e. Верхньої брижової вени

235. У десятимісячної дитини під час обстеження виявлено: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу. Які подальші дії?

a. Тетрада Фалло

- b. Дефект міжзлукової перегородки
- c. Стеноз легеневої артерії
- d. Коарктація аорти
- e. Дефект міжпередсердної перегородки

236. У десятимісячної дитини під час обстеження виявлено: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу. Які подальші дії?

- a. Дефект міжзлукової перегородки
- b. Дефект міжпередсердної перегородки
- c. Коарктація аорти

d. Тетрада Фалло

- e. Стеноз легеневої артерії

237. У п'ятирічної дитини раптово з'явився сильний біль у животі, який локалізується навколо пупка. Які подальші дії?

- a. Аліментарна токсикація
- b. Кишкова інфекція
- c. Ниркова коліка
- d. Гострий апендицит

e. Інвагінація кишківника

238. У п'ятирічної дитини раптово з'явився сильний біль у животі, який локалізується навколо пупка. Які подальші дії?

- a. Ниркова коліка

b. Інвагінація кишківника

- c. Гострий апендицит
- d. Аліментарна токсикація
- e. Кишкова інфекція

239. У пацієнта віком 45 років після надмірного вживання алкоголю та калорійної їжі з'явилися гострі болі в животі. Які подальші дії?

- a. Виразкова хвороба шлунка

b. Панкреонекроз

c. Гострий панкреатит із явищами парезу кишечника

d. Гострий холецистит

e. Гостра кишкова непрохідність

240. У пацієнта віком 45 років після надмірного вживання алкоголю та калорійної їжі з'явилися гострі

a. Гостра кишкова непрохідність

b. Гострий панкреатит із явищами парезу кишечника

c. Виразкова хвороба шлунка

d. Гострий холецистит

e. Панкреонекроз

241. У пацієнта віком 28 років діагностовано клінічні ознаки напруженого пневмотораксу. Для надання

a. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на боці ураження

b. V-VI міжребер'ї по середній аксиллярній лінії на боці ураження

c. VIII-IX міжребер'ї по задній аксиллярній лінії на здоровому боці

d. VIII-IX міжребер'ї по задній аксиллярній лінії на боці ураження

e. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на здоровому боці

242. У пацієнта віком 28 років діагностовано клінічні ознаки напруженого пневмотораксу. Для надання

a. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на здоровому боці

b. VIII-IX міжребер'ї по задній аксиллярній лінії на здоровому боці

c. VIII-IX міжребер'ї по задній аксиллярній лінії на боці ураження

d. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на боці ураження

e. V-VI міжребер'ї по середній аксиллярній лінії на боці ураження

243. У пацієнта віком 35 років під час індукції в анестезію внутрішньовенним введенням діазепаму рап

a. Гостра надниркова недостатність

b. Напад бронхіальної астми

c. Анафілактичний шок

d. Гостра серцево-судинна недостатність

e. Гостра дихальна недостатність

244. У пацієнта віком 35 років під час індукції в анестезію внутрішньовенним введенням діазепаму рап

a. Напад бронхіальної астми

b. Гостра серцево-судинна недостатність

c. Гостра дихальна недостатність

d. Гостра надниркова недостатність

e. Анафілактичний шок

245. У пацієнта віком 48 років на тлі задовільного самопочуття виникло короткочасне запаморочення та

a. Аорто-коронарне шунтування

b. Встановлення штучного водія ритму серця

c. Стентування коронарних судин

d. Трансплантація серця

e. Систематична протисудомна терапія

246. У пацієнта віком 48 років на тлі задовільного самопочуття виникло короткочасне запаморочення та

a. Трансплантація серця

b. Систематична протисудомна терапія

c. Аорто-коронарне шунтування

d. Встановлення штучного водія ритму серця

e. Стентування коронарних судин

247. У пацієнта віком 50 років раптово виник біль у животі. Об'єктивно спостерігається: живіт збільш

a. Діагностичну лапаротомію

b. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

c. Рентгенографію органів черевної порожнини з контрастуванням

d. Комп'ютерну томографію органів черевної порожнини

e. Ультрасонографію органів черевної порожнини

248. У пацієнта віком 50 років раптово виник біль у животі. Об'єктивно спостерігається: живіт збільш

a. Рентгенографію органів черевної порожнини з контрастуванням

b. Комп'ютерну томографію органів черевної порожнини

с. Ультрасонографію органів черевної порожнини

d. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

е. Діагностичну лапаротомію

249. У пацієнта віком 73 роки діагностовано рак передньої стінки прямої кишки на відстані 2 см від а

a. Хіміопроменева терапія

b. Паліативна хіміотерапія

с. Черевно-промежинна екстирпація

d. Короткий курс променевої терапії

е. Тотальна мезоректумектомія

250. У пацієнта віком 73 роки діагностовано рак передньої стінки прямої кишки на відстані 2 см від а

a. Короткий курс променевої терапії

b. Паліативна хіміотерапія

с. Хіміопроменева терапія

d. Черевно-промежинна екстирпація

е. Тотальна мезоректумектомія

251. У пацієнта діагностовано хронічний комбінований геморої III стадії з рецидивними кровотечами пі

a. Гемороїдектомія за Мілліганом-Морганом

b. Консервативне лікування із застосуванням системних венотонічних засобів та місцевих кровоспинних

с. Лазерна вапоризація гемороїдальних вузлів

d. Склеротерапія гемороїдальних вузлів

е. Латексне лігування гемороїдальних вузлів

252. У пацієнта діагностовано хронічний комбінований геморої III стадії з рецидивними кровотечами пі

a. Латексне лігування гемороїдальних вузлів

b. Лазерна вапоризація гемороїдальних вузлів

с. Гемороїдектомія за Мілліганом-Морганом

d. Склеротерапія гемороїдальних вузлів

е. Консервативне лікування із застосуванням системних венотонічних засобів та місцевих кровоспинних

253. У пацієнта з відмороженням III ступеня пальців ніг лівої кінцівки спостерігається чітка демарка

a. Пересадка шкіри

b. Консервативне лікування

с. Гіпербарична оксигенація

d. Хірургічне видалення некротичних тканин

е. Фізіотерапія

254. У пацієнта з відмороженням III ступеня пальців ніг лівої кінцівки спостерігається чітка демарка

a. Фізіотерапія

b. Консервативне лікування

с. Пересадка шкіри

d. Гіпербарична оксигенація

е. Хірургічне видалення некротичних тканин

255. У пацієнта після черепно-мозкової травми розвинувся підвищений внутрішньочерепний тиск. Яке н

a. Призначення сечогінних препаратів

b. Хірургічне лікування (декомпресія)

с. Консервативне лікування (спокій, холод на голову)

d. Введення глюкокортикоїдів

е. Проведення люмбальної пункції

256. У пацієнта після черепно-мозкової травми розвинувся підвищений внутрішньочерепний тиск. Яке н

a. Призначення сечогінних препаратів

b. Введення глюкокортикоїдів

с. Хірургічне лікування (декомпресія)

d. Проведення люмбальної пункції

е. Консервативне лікування (спокій, холод на голову)

257. У пацієнтки віком 35 років під час менструації раптово з'явився сильний біль у нижніх відділах

a. Ендометрит

b. Міома матки

с. Фіброміома матки

d. Розрив кісти яєчника

e. Рак ендометрія

258. У пацієнтки віком 35 років під час менструації раптово з'явився сильний біль у нижніх відділах

a. Рак ендометрія

b. Розрив кісти яєчника

c. Міома матки

d. Ендометрит

e. Фіброміома матки

259. У пацієнтки віком 42 роки після апендектомії з приводу гострого гангренозного апендициту з'явився

a. Тазовий абсцес

b. Гострий геморой

c. Гострий цистит

d. Гострий дифузний перитоніт

e. Гострий проктит

260. У пацієнтки віком 42 роки після апендектомії з приводу гострого гангренозного апендициту з'явився

a. Тазовий абсцес

b. Гострий цистит

c. Гострий геморой

d. Гострий проктит

e. Гострий дифузний перитоніт

261. У породіллі на 4-ту добу після пологів виник сильний розпираючий біль у правій нозі. Поступово

a. Ілеофemorальний флеботромбоз

b. Гострий лімфостаз правої нижньої кінцівки

c. Післяпологовий тазовий флеботромбоз

d. Гострий тромбофлебіт правої нижньої кінцівки

e. Гостра емболія стегнової артерії праворуч

262. У породіллі на 4-ту добу після пологів виник сильний розпираючий біль у правій нозі. Поступово

a. Гостра емболія стегнової артерії праворуч

b. Гострий лімфостаз правої нижньої кінцівки

c. Ілеофemorальний флеботромбоз

d. Гострий тромбофлебіт правої нижньої кінцівки

e. Післяпологовий тазовий флеботромбоз

263. Укажіть доцільний спосіб оброблення вогнепальної рани через 2 год після поранення.

a. Висікти нежиттєздатні тканини, накласти провізорні шви на рану

b. Висікти нежиттєздатні тканини, зшити краї рани

c. Накласти провізорні шви на рану

d. Промити рану, накласти на неї асептичну пов'язку

e. Зшити краї рани

264. Укажіть доцільний спосіб оброблення вогнепальної рани через 2 год після поранення.

a. Промити рану, накласти на неї асептичну пов'язку

b. Висікти нежиттєздатні тканини, зшити краї рани

c. Накласти провізорні шви на рану

d. Висікти нежиттєздатні тканини, накласти провізорні шви на рану

e. Зшити краї рани

265. Укажіть найчастіше ускладнення, яке виникає під час дренивання кісти селезінки під контролем УЗД

a. Кровотеча в порожнину кісти

b. Нагноєння залишкової порожнини кісти

c. Підтікання вмісту кісти в плевральну порожнину з розвитком плевриту

d. Больовий синдром

e. Підтікання вмісту кісти у вільну черевну порожнину з розвитком перитоніту

266. Укажіть найчастіше ускладнення, яке виникає під час дренивання кісти селезінки під контролем УЗД

a. Кровотеча в порожнину кісти

b. Підтікання вмісту кісти у вільну черевну порожнину з розвитком перитоніту

c. Нагноєння залишкової порожнини кісти

d. Больовий синдром

е. Підтікання вмісту кісти в плевральну порожнину з розвитком плевриту

267. Укажіть триаду Мондора під час гострого панкреатиту.

- a. Біль в епігастральній ділянці, вільне повітря в животі, лейкопенія
- b. Одноразове блювання, kindжальний біль в епігастрії, жовчнокам'яна хвороба в анамнезі
- c. Міграція болю з епігастральної ділянки у всі відділи живота, вільна рідина в животі, інфільтрат в
- d. Гіпертермія, діарея, відсутність печінкової тупості

е. Біль в епігастрії, блювання багаторазове (нудота), метеоризм

268. Укажіть триаду Мондора під час гострого панкреатиту.

- a. Одноразове блювання, kindжальний біль в епігастрії, жовчнокам'яна хвороба в анамнезі
- b. Гіпертермія, діарея, відсутність печінкової тупості

c. Біль в епігастрії, блювання багаторазове (нудота), метеоризм

- d. Біль в епігастральній ділянці, вільне повітря в животі, лейкопенія
- e. Міграція болю з епігастральної ділянки у всі відділи живота, вільна рідина в животі, інфільтрат в

269. Укажіть хірургічний доступ вибору при підозрі на поранення серця в гемодинамічно нестабільних п

a. Лівобічна передньобокова торакотомія

- b. Торакотомія за типом "відкритої мушлі"
- c. Поздовжня стернотомія
- d. Лівобічна бокова торакотомія
- e. Правобічна передньобокова торакотомія

270. Укажіть хірургічний доступ вибору при підозрі на поранення серця в гемодинамічно нестабільних п

a. Торакотомія за типом "відкритої мушлі"

b. Лівобічна передньобокова торакотомія

- c. Поздовжня стернотомія
- d. Лівобічна бокова торакотомія
- e. Правобічна передньобокова торакотомія

271. Що є відносним протипоказанням до виконання транскатетерної імплантації аортального клапана

a. Двостулковий аортальний клапан

- b. Активний бактеріальний ендокардит
- c. Наявність тромба в лівому шлуночку
- d. Критичний стеноз мітрального клапана
- e. Очікувана тривалість життя пацієнта менше 1 року

272. Що є відносним протипоказанням до виконання транскатетерної імплантації аортального клапана

- a. Активний бактеріальний ендокардит
- b. Очікувана тривалість життя пацієнта менше 1 року
- c. Наявність тромба в лівому шлуночку

d. Двостулковий аортальний клапан

e. Критичний стеноз мітрального клапана

273. Що, за даними ВООЗ є найпоширенішим чинником, який викликає гостру фульмінантну печінкову н

a. Отруєння парацетамолом з метою суїциду

- b. Отруєння блідою поганкою
- c. Фульмінантна форма гепатиту В
- d. Отруєння наркотиками (DILI-синдром)
- e. Отруєння алкоголем

274. Що, за даними ВООЗ є найпоширенішим чинником, який викликає гостру фульмінантну печінкову н

a. Отруєння парацетамолом з метою суїциду

- b. Фульмінантна форма гепатиту В
- c. Отруєння алкоголем
- d. Отруєння блідою поганкою
- e. Отруєння наркотиками (DILI-синдром)

275. Яке оперативне втручання на органах черевної порожнини має найбільший ризик ятрогенного ушк

a. Лівобічна геміколектомія

b. Панкреатектомія

- c. Лівобічна нефректомія
- d. Резекція шлунка
- e. Лівобічна гемігепатектомія

276. Яке оперативне втручання на органах черевної порожнини має найбільший ризик ятрогенного ушкодження шлунка?

- a. Лівобічна нефректомія
- b. Лівобічна геміколектомія
- c. Лівобічна гемігепатектомія
- d. Резекція шлунка
- e. Панкреатектомія

277. Яке першочергове лікування доцільно призначити пацієнту віком 63 роки з гістологічно підтвердженою ерадикацією *H. pylori*?

- a. Ерадикаційна терапія *H. pylori*
- b. Хіміотерапія
- c. Гастректомія
- d. Гастротомія
- e. Інгібітори протонної помпи

278. Яке першочергове лікування доцільно призначити пацієнту віком 63 роки з гістологічно підтвердженою ерадикацією *H. pylori*?

- a. Хіміотерапія
- b. Ерадикаційна терапія *H. pylori*
- c. Гастротомія
- d. Гастректомія
- e. Інгібітори протонної помпи

279. Яке ускладнення є найбільш типовим після лапароскопічної герніопластики пахової грижі, зокрема?

- a. Хронічний больовий синдром у ділянці паха
- b. Підшкірна емфізема черевної стінки
- c. Рецидив грижі
- d. Тромбоемболія легеневої артерії
- e. Інфекція місця хірургічного втручання

280. Яке ускладнення є найбільш типовим після лапароскопічної герніопластики пахової грижі, зокрема?

- a. Підшкірна емфізема черевної стінки
- b. Інфекція місця хірургічного втручання
- c. Рецидив грижі
- d. Хронічний больовий синдром у ділянці паха
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

281. Який метод візуальної діагностики є найбільш інформативним для встановлення джерела шлункової кровотечі?

- a. Комп'ютерна томографія
- b. Магнітно-резонансна томографія
- c. Ультразвукове дослідження
- d. Езофагогастродуоденоскопія
- e. Рентгенографія органів черевної порожнини

282. Який метод візуальної діагностики є найбільш інформативним для встановлення джерела шлункової кровотечі?

- a. Магнітно-резонансна томографія
- b. Езофагогастродуоденоскопія
- c. Ультразвукове дослідження
- d. Комп'ютерна томографія
- e. Рентгенографія органів черевної порожнини

283. Який метод візуальної діагностики є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу гострої кишечної кровотечі?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. -
- c. Комп'ютерна томографія
- d. Фіброколоноскопія
- e. Магнітно-резонансна томографія

284. Який метод візуальної діагностики є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу гострої кишечної кровотечі?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. Фіброколоноскопія
- c. Магнітно-резонансна томографія
- d. Комп'ютерна томографія
- e. -

285. Який метод гемостазу при ушкодженні селезінки III-IV ступеня за шкалою тяжкості ушкоджень Аме...

a. Спленектомія

b. Спленорафія

c. Тампонування селезінки

d. Консервативне ведення

e. Перев'язка селезінкової артерії

286. Який метод гемостазу при ушкодженні селезінки III-IV ступеня за шкалою тяжкості ушкоджень Ам...

a. Спленектомія

b. Тампонування селезінки

c. Консервативне ведення

d. Спленорафія

e. Перев'язка селезінкової артерії

287. Який метод гемостазу є провідним при гострих кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового

a. Медикаментозний гемостаз

b. Невідкладне операційне втручання з метою гемостазу

c. Ангіоемболізація судини, що кровоточить

d. Переливання компонентів крові

e. Ендоскопічний гемостаз

288. Який метод гемостазу є провідним при гострих кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового

a. Невідкладне операційне втручання з метою гемостазу

b. Медикаментозний гемостаз

c. Ендоскопічний гемостаз

d. Переливання компонентів крові

e. Ангіоемболізація судини, що кровоточить

289. Який метод швидкого гемостазу при пошкодженні печінки III-IV ступеня за шкалою тяжкості пошко...

a. Атипова резекція печінки

b. Електрокоагуляція печінки

c. Перев'язка воротної вени

d. Тампонада печінки

e. Анатомічна резекція печінки

290. Який метод швидкого гемостазу при пошкодженні печінки III-IV ступеня за шкалою тяжкості пошко...

a. Електрокоагуляція печінки

b. Атипова резекція печінки

c. Тампонада печінки

d. Анатомічна резекція печінки

e. Перев'язка воротної вени

291. Який основний принцип надання першої допомоги при термічних опіках?

a. Нанести крем з антибіотиком

b. Змастити уражену ділянку олією

c. Охолодити уражену ділянку 70%-им розчином спирту

d. Охолодити уражену ділянку холодною водою

e. Знеболити

292. Який показник крові повинен бути врахований лікарем-хірургом обов'язково перед виконанням хір...

a. Час згортання крові

b. Прокальцитонін

c. Креатинін

d. С-реактивний білок

e. Гематокрит

293. Який показник крові повинен бути врахований лікарем-хірургом обов'язково перед виконанням хір...

a. С-реактивний білок

b. Час згортання крові

c. Креатинін

d. Гематокрит

e. Прокальцитонін

294. Який розчин використовують з метою склеротерапії порожнин звичайних кіст паренхіматозних орг...

a. Етанолу 96%

- b. Декасану
- c. Бетадину у співвідношенні 1:10
- d. Формаліну 40%
- e. Діоксидину 1% (для промивання порожнин)

295. Який розчин використовують з метою склеротерапії порожнин звичайних кіст паренхіматозних орг

- a. Бетадину у співвідношенні 1:10

b. Етанолу 96%

- c. Діоксидину 1% (для промивання порожнин)

d. Декасану

e. Формаліну 40%

296. Які види оперативного лікування показані при IV стадії гемороїдальної хвороби?

a. Гемороїдектомія, мукопексія, лазерна гемороїдопластика

b. Гемороїдектомія, лазерна гемороїдопластика, склеротерапія гемороїдальних вузлів

c. Гемороїдектомія, мукопексія, степлерна гемороїдопексія

d. Латексне лігування гемороїдальних вузлів, лазерна гемороїдопластика, інфрачервона коагуляція гем

e. Гемороїдектомія, мукопексія, латексне лігування гемороїдальних вузлів

297. Які види оперативного лікування показані при IV стадії гемороїдальної хвороби?

a. Гемороїдектомія, мукопексія, лазерна гемороїдопластика

b. Гемороїдектомія, мукопексія, латексне лігування гемороїдальних вузлів

c. Латексне лігування гемороїдальних вузлів, лазерна гемороїдопластика, інфрачервона коагуляція гем

d. Гемороїдектомія, лазерна гемороїдопластика, склеротерапія гемороїдальних вузлів

e. Гемороїдектомія, мукопексія, степлерна гемороїдопексія

298. Які хірургічні втручання повинен виконувати лікар-хірург в амбулаторних умовах?

a. Виконання лапароскопічної холецистектомії та дренування підпечінкового простору під ендотрахеал

b. Виконання хірургічного втручання при правостороній пахвинній грижі під спинальною анестезією

c. Виконання хірургічного втручання при гострому флегмонозно-гангренозному апендициті під загальн

d. Висічення карбункула в ділянці носогубного трикутника в гнійно-некротичній стадії під місцевим зн

e. Розкриття та дренування фурункула нижньої третини правого передпліччя під місцевим знеболенням

299. Які хірургічні втручання повинен виконувати лікар-хірург в амбулаторних умовах?

a. Висічення карбункула в ділянці носогубного трикутника в гнійно-некротичній стадії під місцевим зн

b. Виконання хірургічного втручання при правостороній пахвинній грижі під спинальною анестезією

c. Виконання хірургічного втручання при гострому флегмонозно-гангренозному апендициті під загальн

d. Виконання лапароскопічної холецистектомії та дренування підпечінкового простору під ендотрахеал

e. Розкриття та дренування фурункула нижньої третини правого передпліччя під місцевим знеболенням