

1. Батьки звернулись на консультацію щодо своєї восьмирічної доньки. Дівчинка навчається у другому класі. Які симптоми найбільш характерні для цього віку?
- Тривалий вокальний тіковий розлад
 - Тривалий моторний тіковий розлад
 - Синдром дефіциту уваги та гіперактивності
 - Синдром Туретта**
 - Транзиторний тіковий розлад
2. Батьки звернулись на консультацію щодо своєї восьмирічної доньки. Дівчинка навчається у другому класі. Які симптоми найбільш характерні для цього віку?
- Тривалий моторний тіковий розлад
 - Транзиторний тіковий розлад
 - Тривалий вокальний тіковий розлад
 - Синдром Туретта**
 - Синдром дефіциту уваги та гіперактивності
3. Батьки звернулись на консультацію щодо свого трирічного сина. Під час занять із батьками дитина чітко виконує інструкції. Які симптоми найбільш характерні для цього віку?
- Аутизм
 - Олігофренія
 - Синдром гіперактивності без дефіциту уваги
 - Синдром дефіциту уваги без гіперактивності
 - Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю**
4. Батьки звернулись на консультацію щодо свого трирічного сина. Під час занять із батьками дитина чітко виконує інструкції. Які симптоми найбільш характерні для цього віку?
- Синдром гіперактивності без дефіциту уваги
 - Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю**
 - Синдром дефіциту уваги без гіперактивності
 - Аутизм
 - Олігофренія
5. Виберіть твердження, що характеризує поведінку психотерапевта у гуманістичному підході.
- Застосовує переконання, спростовує помилкові судження, вказуючи на їх неточність, займає директивну позицію
 - На позиції рівного з пацієнтом, у контакті з власним життєвим досвідом, є конгруентним, застосовує активне вислуховування**
 - Виступає для пацієнта у ролі експерта, наставника, який допомагає сформувати нові більш адаптивні способи поведінки
 - Не розкриває свої переживання перед пацієнтом, має свої думки та емоції
 - Виступає для пацієнта у ролі слухача, який лише вислуховує і не коментує
6. Виберіть твердження, що характеризує поведінку психотерапевта у гуманістичному підході.
- Застосовує переконання, спростовує помилкові судження, вказуючи на їх неточність, займає директивну позицію
 - На позиції рівного з пацієнтом, у контакті з власним життєвим досвідом, є конгруентним, застосовує активне вислуховування**
 - Не розкриває свої переживання перед пацієнтом, має свої думки та емоції
 - Виступає для пацієнта у ролі слухача, який лише вислуховує і не коментує
 - Виступає для пацієнта у ролі експерта, наставника, який допомагає сформувати нові більш адаптивні способи поведінки
7. Визначте основну мету когнітивно-поведінкової психотерапії хронічного болю.
- Зміна сприйняття болю через вплив на психологічний складник
 - Зменшення психологічних симптомів у пацієнта
 - Послаблення когнітивних факторів, що посилюють больові відчуття
 - Покращення дієздатності та якості життя людини**
 - Поведінкова активізація та декатастрофізація переживань
8. Визначте основну мету когнітивно-поведінкової психотерапії хронічного болю.
- Послаблення когнітивних факторів, що посилюють больові відчуття
 - Поведінкова активізація та декатастрофізація переживань
 - Покращення дієздатності та якості життя людини**
 - Зміна сприйняття болю через вплив на психологічний складник
 - Зменшення психологічних симптомів у пацієнта
9. Визначте психогенно зумовлений субдепресивний розлад тривалістю 2 роки і більше, симптомами якого є:
- Ларвована депресія
 - Реактивна депресія
 - Рекурентна депресія
 - Дистимія**
 - Смуток породіллі
10. Визначте психогенно зумовлений субдепресивний розлад тривалістю 2 роки і більше, симптомами якого є:

a. Реактивна депресія

b. Дистимія

c. Ларвована депресія

d. Рекурентна депресія

e. Смуток породіллі

11. Визначте психотерапевтичні техніки, що характерні для психоаналітичного підходу.

a. Метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз переносу

b. Систематична десенсибілізація, імпульсивна терапія, метод інструкцій, імітаційне навчання, рольови

c. Рефлексивна техніка, техніка повторів, парадоксальна інтенція, дерефлексія, концентрування уваги

d. Персональне знаходження позиції, зміщення перспективи, метод знаходження сенсу, дерефлексія

e. Щоденник думок, аргументи "за" та "проти", сократівський діалог, переоцінка фактів

12. Визначте психотерапевтичні техніки, що характерні для психоаналітичного підходу.

a. Рефлексивна техніка, техніка повторів, парадоксальна інтенція, дерефлексія, концентрування уваги

b. Щоденник думок, аргументи "за" та "проти", сократівський діалог, переоцінка фактів

c. Персональне знаходження позиції, зміщення перспективи, метод знаходження сенсу, дерефлексія

d. Систематична десенсибілізація, імпульсивна терапія, метод інструкцій, імітаційне навчання, рольови

e. Метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз переносу

13. Вкажіть систему наукових знань і профілактичних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення

a. Психопрофілактика

b. Психотерапія

c. Психологія

d. Психогігієна

e. Психодіагностика

14. Вкажіть систему наукових знань і профілактичних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення

a. Психотерапія

b. Психопрофілактика

c. Психодіагностика

d. Психологія

e. Психогігієна

15. Для оцінки ступеня тяжкості порушень яких психічних явищ використовується Коротке дослідження

a. Когнітивних функцій

b. Моторики

c. Відчуттів

d. Інтелекту

e. Емоцій та настрою

16. Для оцінки ступеня тяжкості порушень яких психічних явищ використовується Коротке дослідження

a. Інтелекту

b. Моторики

c. Когнітивних функцій

d. Відчуттів

e. Емоцій та настрою

17. Для якого виду порушень інтелектуальної діяльності людини характерне нерозуміння переносного

a. Порушення сприйняття

b. Порушення мислення

c. Порушення пам'яті

d. Порушення мовлення

e. Порушення уяви

18. Для якого захворювання характерний такий психопатологічний симптом, як псевдогалюцинації?

a. Невротичного розладу

b. Інтоксикаційного психозу

c. Шизофренії

d. Інфекційного психозу

e. Реактивного психозу

19. Для якого захворювання характерний такий психопатологічний симптом, як псевдогалюцинації?

a. Невротичного розладу

- b. Інфекційного психозу
- c. Реактивного психозу
- d. Інтоксикаційного психозу

e. Шизофренії

20. Для якого синдрому характерна наявність несистематизованих маревних ідей різного змісту в поєднанні з галюцинаціями?

a. Параноїдного

b. Парафренного

c. Кандинського-Клерамбо

d. Соматичного

e. Паранояльного

21. Для якого синдрому характерна наявність несистематизованих маревних ідей різного змісту в поєднанні з галюцинаціями?

a. Парафренного

b. Кандинського-Клерамбо

c. Паранояльного

d. Соматичного

e. Параноїдного

22. Для якого синдрому характерний симптом ехолоалії?

a. Кататонічний ступор

b. Маніакальний синдром

c. Психоорганічний синдром

d. Кататонічне збудження

e. Іпохондричний синдром

23. Для якого синдрому характерний симптом ехолоалії?

a. Психоорганічний синдром

b. Маніакальний синдром

c. Кататонічне збудження

d. Іпохондричний синдром

e. Кататонічний ступор

24. Для якого стану дисгармонійного характеру доведеним методом терапії є діалектично-поведінкова?

a. Вікових криз

b. Межового розладу особистості

c. Обсесивно-компульсивного розладу

d. Прокрастинації

e. Тривожно-депресивних розладів

25. Для якого стану дисгармонійного характеру доведеним методом терапії є діалектично-поведінкова?

a. Прокрастинації

b. Обсесивно-компульсивного розладу

c. Тривожно-депресивних розладів

d. Межового розладу особистості

e. Вікових криз

26. До лікаря-психолога був направлений пацієнт для діагностики психопатологічних станів, психологічних розладів?

a. Діагностичні тестові методи

b. Скринінгові методики

c. Проективні методики

d. Клінічне інтерв'ю

e. Огляд

27. До лікаря-психолога був направлений пацієнт для діагностики психопатологічних станів, психологічних розладів?

a. Проективні методики

b. Клінічне інтерв'ю

c. Огляд

d. Скринінгові методики

e. Діагностичні тестові методи

28. До лікаря-психолога направлена пацієнтка віком 28 років із підозрою на розлад особистості. Під час діагностики виявлено:

a. Ананкастний

b. Залежної особистості

c. Шизоїдний

d. Тривожний

e. Дисоціальний

29. До лікаря-психолога направлена пацієнтка віком 28 років із підозрою на розлад особистості. Під ч

a. Залежної особистості

b. Ананкастний

c. Шизоїдний

d. Дисоціальний

e. Тривожний

30. До якого рівня психологічної допомоги на етапі комплексного реагування після гострої фази надзви

a. П'ятого

b. Другого

c. Першого

d. Четвертого

e. Третього

31. До якого рівня психологічної допомоги на етапі комплексного реагування після гострої фази надзви

a. Четвертого

b. Першого

c. П'ятого

d. Третього

e. Другого

32. До якого типу ознак синдрому емоційного вигорання належить формальне виконання роботи?

a. Поведінкових

b. Соматичних

c. Соціальних

d. Інтелектуальних (когнітивних)

e. Емоційних

33. До якого типу ознак синдрому емоційного вигорання належить формальне виконання роботи?

a. Поведінкових

b. Соціальних

c. Інтелектуальних (когнітивних)

d. Емоційних

e. Соматичних

34. До якого типу ознак синдрому емоційного вигорання необхідно віднести зміни апетиту та ваги?

a. Інтелектуальних (когнітивних)

b. Поведінкових

c. Соматичних

d. Соціальних

e. Емоційних

35. До якого типу ознак синдрому емоційного вигорання необхідно віднести зміни апетиту та ваги?

a. Поведінкових

b. Емоційних

c. Інтелектуальних (когнітивних)

d. Соціальних

e. Соматичних

36. Дівчинка віком 15 років демонструє впертість, відмовляється виконувати шкільні завдання, підтрим

a. Групова психотерапія

b. Емоційно-фокусована психотерапія

c. Гештальт-терапія

d. Поведінкова психотерапія

e. Психодинамічна психотерапія

37. Дівчинка віком 15 років демонструє впертість, відмовляється виконувати шкільні завдання, підтрим

a. Емоційно-фокусована психотерапія

b. Гештальт-терапія

c. Психодинамічна психотерапія

d. Поведінкова психотерапія

e. Групова психотерапія

38. Дівчину віком 18 років шпиталізовано до приймального відділення лікарні зі скаргами на запамороч

a. Застосувати дихальні техніки (подихати в паперовий мішок)

b. Дати кисневу маску

c. Призначити бензодіазепіни

d. Зробити скринінг сечі на наркотики

e. Негайно ввести розчин глюкози

39. Дівчину віком 18 років шпиталізовано до приймального відділення лікарні зі скаргами на запамороч

a. Негайно ввести розчин глюкози

b. Застосувати дихальні техніки (подихати в паперовий мішок)

c. Зробити скринінг сечі на наркотики

d. Призначити бензодіазепіни

e. Дати кисневу маску

40. Жінка амбулаторно впродовж шести тижнів отримує препарат есциталопрам для лікування депрес

a. Додати до лікування бензодіазепіни не довше, ніж на 14 днів

b. Додати до лікування антигістамінні препарати

c. Перейти на лікування антидепресантом іншої групи

d. Додати до лікування антипсихотики

e. Перейти на лікування іншим антидепресантом

41. Жінка амбулаторно впродовж шести тижнів отримує препарат есциталопрам для лікування депрес

a. Додати до лікування антипсихотики

b. Додати до лікування бензодіазепіни не довше, ніж на 14 днів

c. Додати до лікування антигістамінні препарати

d. Перейти на лікування іншим антидепресантом

e. Перейти на лікування антидепресантом іншої групи

42. Жінка віком 35 років звернулася до лікаря-психолога зі скаргами на пригнічений настрій, труднощі

a. Розлад адаптації

b. Генералізований тривожний розлад

c. Розлад тривалого горя

d. ПТСР

e. Нормальне горювання

43. Жінка віком 35 років звернулася до лікаря-психолога зі скаргами на пригнічений настрій, труднощі

a. Розлад адаптації

b. ПТСР

c. Нормальне горювання

d. Розлад тривалого горя

e. Генералізований тривожний розлад

44. Жінка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на втому та безсоння, що час від часу то зникал

a. Гештальт-терапію

b. КТП або EMDR

c. Тілесно-орієнтовану психотерапію

d. Психодинамічну психотерапію

e. Емоційно-фокусовану терапію

45. Жінка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на втому та безсоння, що час від часу то зникал

a. Психодинамічну психотерапію

b. КТП або EMDR

c. Емоційно-фокусовану терапію

d. Тілесно-орієнтовану психотерапію

e. Гештальт-терапію

46. Жінці під час лікування тривожно-депресивного розладу був призначений гідазепам у дозі 20 мг/до

a. Проблеми з сечовипусканням

b. Перепади артеріального тиску

c. Зниження швидкості реакцій

d. Порушення тонусу кишечника

е. Порушення вітамінного обміну

47. Жінці під час лікування тривожно-депресивного розладу був призначений гідазепам у дозі 20 мг/добу

а. Проблеми з сечовипусканням

б. Порушення вітамінного обміну

в. Перепади артеріального тиску

г. Зниження швидкості реакцій

е. Порушення тонуусу кишківника

48. За спостереженнями одного з видатних сучасних психотерапевтів К. Роджерса, якщо людині дозволяють

а. Принцип "авторитетного третього"

б. Принцип "виходу почуттів"

в. Принцип "примусового вислуховування опонента"

г. Принцип "оголення агресії"

е. Принцип "емоційного заміщення"

49. За спостереженнями одного з видатних сучасних психотерапевтів К. Роджерса, якщо людині дозволяють

а. Принцип "оголення агресії"

б. Принцип "емоційного заміщення"

в. Принцип "виходу почуттів"

г. Принцип "авторитетного третього"

е. Принцип "примусового вислуховування опонента"

50. Здобувач закладу вищої освіти отримав на іспиті першу низьку оцінку та дійшов висновку, що йому

а. Надмірне узагальнення

б. Персоналізація

в. Наклеювання ярликів

г. Читання думок

е. Передбачення

51. Здобувач закладу вищої освіти отримав на іспиті першу низьку оцінку та дійшов висновку, що йому

а. Надмірне узагальнення

б. Читання думок

в. Наклеювання ярликів

г. Передбачення

е. Персоналізація

52. Лікар в окулярах справляє на пацієнта краще враження, тому що асоціюється з вищими розумовими

а. Персоналізація

б. Передбачення

в. Читання думок

г. Наклеювання ярликів

е. Надмірне узагальнення

53. Лікар в окулярах справляє на пацієнта краще враження, тому що асоціюється з вищими розумовими

а. Читання думок

б. Передбачення

в. Надмірне узагальнення

г. Персоналізація

е. Наклеювання ярликів

54. Лікар-психіатр складає індивідуальну психотерапевтичну програму для пацієнта з шизоафективним

а. Арт-терапія

б. Поведінкова терапія

в. Тренінг соціальних навичок

г. Психосвіта

е. Когнітивний тренінг

55. Лікар-психіатр складає індивідуальну психотерапевтичну програму для пацієнта з шизоафективним

а. Когнітивний тренінг

б. Психосвіта

в. Арт-терапія

г. Поведінкова терапія

е. Тренінг соціальних навичок

56. На вирішення яких завдань спрямована соціально-корекційна терапія?

- a. Будь-яких соціальних проблем, включаючи ті, що пов'язані з психічними захворюваннями
- b. Будь-яких соціальних проблем, за винятком тих, що пов'язані з психічними захворюваннями
- c. На підкорення людини будь-яким нормам суспільства, включаючи не прийнятні для неї
- d. На виправлення викривлених соціальних стереотипів та норм поведінки
- e. На лікування дисоціального розладу особистості (соціопатії)

57. На вирішення яких завдань спрямована соціально-корекційна терапія?

- a. Будь-яких соціальних проблем, включаючи ті, що пов'язані з психічними захворюваннями
- b. На підкорення людини будь-яким нормам суспільства, включаючи не прийнятні для неї
- c. На виправлення викривлених соціальних стереотипів та норм поведінки
- d. На лікування дисоціального розладу особистості (соціопатії)
- e. Будь-яких соціальних проблем, за винятком тих, що пов'язані з психічними захворюваннями

58. На початку проведення обстеження лікар вибирає стиль спілкування зі своїм пацієнтом на основі його

- a. Авторитарний
- b. Демократичний
- c. Ритуальний
- d. Маніпулятивний
- e. Ліберальний

59. На початку проведення обстеження лікар вибирає стиль спілкування зі своїм пацієнтом на основі його

- a. Ліберальний
- b. Авторитарний
- c. Демократичний
- d. Маніпулятивний
- e. Ритуальний

60. На що повинна бути спрямована психопрофілактика у професійній діяльності лікаря?

- a. Попередження емоційного вигорання та конфліктних ситуацій у сімейному середовищі
- b. Психотерапію емоційного вигорання та професійної деформації
- c. Попередження конфліктних ситуацій у сімейному середовищі
- d. Попередження професійних конфліктних ситуацій із медичним персоналом
- e. Попередження професійних та особистих криз, професійної деформації особистості й емоційного вигорання

61. На що повинна бути спрямована психопрофілактика у професійній діяльності лікаря?

- a. Попередження конфліктних ситуацій у сімейному середовищі
- b. Психотерапію емоційного вигорання та професійної деформації
- c. Попередження емоційного вигорання та конфліктних ситуацій у сімейному середовищі
- d. Попередження професійних конфліктних ситуацій із медичним персоналом
- e. Попередження професійних та особистих криз, професійної деформації особистості й емоційного вигорання

62. На якій стадії психосексуального розвитку людини, згідно з психоаналітичною теорією З.Фрейда, фо

- a. Анальний
- b. Латентний
- c. Оральний
- d. Фалічний
- e. Генітальний

63. На якій стадії психосексуального розвитку людини, згідно з психоаналітичною теорією З.Фрейда, фо

- a. Анальний
- b. Оральний
- c. Генітальний
- d. Латентний
- e. Фалічний

64. Наявність якої ознаки при розладах статевої ідентифікації потребує психотерапевтичної інтервенції

- a. Гендерної дисфорії
- b. Вуайеризму
- c. Транссексуалізму
- d. Садомазохізму
- e. Трансвестизму

65. Наявність якої ознаки при розладах статевої ідентифікації потребує психотерапевтичної інтервенції

- a. Транссексуалізму
- b. Вуайеризму
- c. Трансвестизму

d. Гендерної дисфорії

- e. Садомазохізму

66. Оберіть шкалу, яку використовують для оцінки генералізованого тривожного розладу.

- a. SIAS

b. Пенсільванський опитувальник занепокоєння

- c. Опитувальник страху Метьюза та Маркса

d. SPIN

- e. Шкала соціальної тривоги Лібовіца

67. Оберіть шкалу, яку використовують для оцінки генералізованого тривожного розладу.

- a. Шкала соціальної тривоги Лібовіца

b. Пенсільванський опитувальник занепокоєння

- c. SPIN

d. Опитувальник страху Метьюза та Маркса

- e. SIAS

68. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на свербіж і печіння шкіри, відчуття повзання та укусів "якихос

- a. Обсесивно-компульсивний синдром

b. Нюхове марення

- c. Психогенний свербіж

d. Дисморфофобія

e. Дерматозойне марення

69. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на свербіж і печіння шкіри, відчуття повзання та укусів "якихос

- a. Психогенний свербіж

b. Нюхове марення

- c. Дисморфофобія

d. Обсесивно-компульсивний синдром

e. Дерматозойне марення

70. Пацієнт віком 25 років, звернувся на консультацію до лікаря-психолога зі скаргами на постійний с

- a. Психодинамічна психотерапія

b. Транзактний аналіз

- c. Гештальт-терапія

d. Раціонально-емотивна терапія

e. Майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія

71. Пацієнт віком 25 років, звернувся на консультацію до лікаря-психолога зі скаргами на постійний с

- a. Раціонально-емотивна терапія

b. Психодинамічна психотерапія

- c. Гештальт-терапія

d. Майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія

- e. Транзактний аналіз

72. Пацієнт віком 28 років, звернувся на консультацію, із висловленням агресивних тенденцій до свого

a. Нарцисичний

- b. Шизоїдний

c. Дисоціальний

- d. Тривожний

e. Емоційно-нестабільний

73. Пацієнт віком 28 років, звернувся на консультацію, із висловленням агресивних тенденцій до свого

- a. Емоційно-нестабільний

b. Нарцисичний

- c. Тривожний

d. Шизоїдний

- e. Дисоціальний

74. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на головний біль, тремор, перепади артеріального тиску, поруше

a. Екзогенно-органічний

- b. Ендогенно-органічний
- c. Психогенно-невротичний
- d. Психогенно-психотичний
- e. Особистісно-аномальний

75. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на головний біль, тремор, перепади артеріального тиску, поруше

- a. Екзогенно-органічний
- b. Психогенно-психотичний
- c. Особистісно-аномальний
- d. Ендогенно-органічний
- e. Психогенно-невротичний

76. Пацієнт віком 56 років скаржиться на постійний біль, через який "немає радості життя". Хворіє на

- a. Міртазапін
- b. Тразодон
- c. Амітриптилін
- d. Дулоксетин
- e. Сертралін

77. Пацієнт віком 56 років скаржиться на постійний біль, через який "немає радості життя". Хворіє на

- a. Сертралін
- b. Дулоксетин
- c. Міртазапін
- d. Тразодон
- e. Амітриптилін

78. Пацієнт намагається зменшити тривогу за допомогою виконання більш або менш складної стереоти

- a. Компенсація
- b. Ритуал
- c. Аскетизм
- d. Часткова компромісна реакція
- e. Раціоналізація

79. Пацієнт намагається зменшити тривогу за допомогою виконання більш або менш складної стереоти

- a. Компенсація
- b. Раціоналізація
- c. Ритуал
- d. Часткова компромісна реакція
- e. Аскетизм

80. Пацієнт скаржиться на знижений настрій, порушення сну, відсутність інтересу до діяльності, що ра

- a. ---
- b. Призначити дулоксетин у комбінації з амітриптиліном
- c. Когнітивно-поведінкова психотерапія
- d. Застосування пароксетину або флуоксетину
- e. Розчин амітриптиліну в/м за схемою

81. Пацієнт скаржиться на знижений настрій, порушення сну, відсутність інтересу до діяльності, що ра

- a. Призначити дулоксетин у комбінації з амітриптиліном
- b. Когнітивно-поведінкова психотерапія
- c. ---
- d. Розчин амітриптиліну в/м за схемою
- e. Застосування пароксетину або флуоксетину

82. Пацієнт із діагнозом: післяінсультна депресія, знаходиться на етапі підтримувальної терапії. Яки

- a. Когнітивна терапія на основі усвідомленості
- b. Керована самодопомога
- c. Когнітивно-поведінкова терапія
- d. Поведінкова активація
- e. Інтерперсональна терапія

83. Пацієнт із діагнозом: післяінсультна депресія, знаходиться на етапі підтримувальної терапії. Яки

- a. Когнітивна терапія на основі усвідомленості
- b. Поведінкова активація

- с. Керована самодопомога
- d. Когнітивно-поведінкова терапія
- е. Інтерперсональна терапія

84. Пацієнт, у якого місяць тому діагностовано загострення епізоду шизофренії та якого шпиталізовано

- a. -
- b. Стигматизація**

- с. Психо-соціальна підтримка
- d. Ефективний менеджмент
- е. Насильство

85. Пацієнт, у якого місяць тому діагностовано загострення епізоду шизофренії та якого шпиталізовано

- a. Насильство
- b. -
- с. Психо-соціальна підтримка
- d. Стигматизація**

- е. Ефективний менеджмент

86. Пацієнта віком 48 років шпиталізовано до психіатричного відділення. На момент обстеження стверд

- a. Синдром Котара**
- b. Парафренний синдром
- с. Синдром Кандинського-Клерамбо
- d. Синдром Капгра
- е. Паранояльний синдром

87. Пацієнта віком 48 років шпиталізовано до психіатричного відділення. На момент обстеження стверд

- a. Синдром Кандинського-Клерамбо
- b. Парафренний синдром
- с. Паранояльний синдром
- d. Синдром Котара**

- е. Синдром Капгра

88. Пацієнта, лежачого із закритими очима на кушетці або сидячого у зручному кріслі, вводять у стан

- a. Психодраму
- b. Транзактний аналіз

с. Кататимно-імагінативну психотерапію

- d. Символдраму
- е. Психодинамічну психотерапію

89. Пацієнта, лежачого із закритими очима на кушетці або сидячого у зручному кріслі, вводять у стан

- a. Транзактний аналіз
- b. Кататимно-імагінативну психотерапію**
- с. Психодинамічну психотерапію
- d. Символдраму
- е. Психодраму

90. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищений рівень тривожності, порушення сну у вигляді бе

- a. Психогенно-невротичний**
- b. Психогенно-психотичний
- с. Афективно-ендогенний
- d. Особистісно-аномальний
- е. Шизофренічний

91. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищений рівень тривожності, порушення сну у вигляді бе

- a. Психогенно-психотичний
- b. Шизофренічний
- с. Особистісно-аномальний
- d. Афективно-ендогенний
- е. Психогенно-невротичний**

92. Пацієнтка віком 22 роки звернулася на консультацію у зв'язку з раптовим посиленням сексуального

- a. Німфоманія**
- b. Сатіріазис
- с. Диспареунія

- d. Сексуальна аверсія
- e. Вагінізм

93. Пацієнтка віком 22 роки звернулася на консультацію у зв'язку з раптовим посиленням сексуального

- a. Вагінізм
- b. Сексуальна аверсія
- c. Сатіріазис
- d. Диспареунія
- e. Німфоманія

94. Пацієнтка віком 26 років знаходиться на лікуванні в стаціонарі психоневрологічного відділення у

- a. Орторексія
- b. Нервова анорексія
- c. Діабулімія
- d. Дранкорексія
- e. Нервова булімія

95. Пацієнтка віком 26 років знаходиться на лікуванні в стаціонарі психоневрологічного відділення у

- a. Орторексія
- b. Нервова анорексія
- c. Дранкорексія
- d. Нервова булімія
- e. Діабулімія

96. Пацієнтка віком 28 років на третій день після пологів почала агресивно поводити себе у відділенні

- a. Гостра реакція на стрес
- b. Післяпологовий психоз
- c. Післяпологова депресія
- d. Сутінкове потьмарення свідомості
- e. Сепсис

97. Пацієнтка віком 28 років на третій день після пологів почала агресивно поводити себе у відділенні

- a. Гостра реакція на стрес
- b. Післяпологовий психоз
- c. Сепсис
- d. Сутінкове потьмарення свідомості
- e. Післяпологова депресія

98. Пацієнтка віком 34 роки звернулася до лікаря-психолога зі скаргами на зниження настрою протягом

- a. Психогенно-невротичний
- b. Психогенно-психотичний
- c. Екзогенно-органічний
- d. Ендогенно-органічний
- e. Афективно-ендогенний

99. Пацієнтка віком 34 роки звернулася до лікаря-психолога зі скаргами на зниження настрою протягом

- a. Психогенно-психотичний
- b. Психогенно-невротичний
- c. Ендогенно-органічний
- d. Екзогенно-органічний
- e. Афективно-ендогенний

100. Пацієнтка віком 58 років хворіє на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу. У паціє

- a. Мотиваційне інтерв'ю для формування ефективної прихильності
- b. Сімейна терапія для перерозподілу навантаження
- c. Когнітивно-поведінкова терапія для змін способу життя
- d. М'язова релаксація для зменшення дратівливості
- e. Аутотренінг для профілактики психічних розладів

101. Пацієнтка віком 58 років хворіє на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу. У паціє

- a. Аутотренінг для профілактики психічних розладів
- b. Мотиваційне інтерв'ю для формування ефективної прихильності
- c. Сімейна терапія для перерозподілу навантаження
- d. М'язова релаксація для зменшення дратівливості

е. Когнітивно-поведінкова терапія для змін способу життя

102. Пацієнтка скаржиться на ниючий м'язовий біль, нездатність розслабитися, постійне занепокоєння,

а. Генералізований тривожний розлад

б. Панічний розлад

с. Специфічна фобія

д. Посттравматичний стресовий розлад

е. Гостра реакція на стрес

103. Пацієнтка скаржиться на ниючий м'язовий біль, нездатність розслабитися, постійне занепокоєння,

а. Гостра реакція на стрес

б. Посттравматичний стресовий розлад

с. Специфічна фобія

д. Генералізований тривожний розлад

е. Панічний розлад

104. Пацієнтка три тижні тому під час пограбування отримала удар кулаком в обличчя. Сліди забоїв ужо

а. Посттравматичний стресовий розлад

б. Генералізований тривожний розлад

с. Панічний розлад з агорафобією

д. Специфічна фобія

е. Гостра реакція на стрес

105. Пацієнтка три тижні тому під час пограбування отримала удар кулаком в обличчя. Сліди забоїв ужо

а. Специфічна фобія

б. Генералізований тривожний розлад

с. Панічний розлад з агорафобією

д. Гостра реакція на стрес

е. Посттравматичний стресовий розлад

106. Пацієнтку віком 23 роки шпиталізовано до лікарні у зв'язку з втратою свідомості та нападом тоні

а. Електроенцефалографію

б. Ангіографію судин головного мозку

с. Комп'ютерну томографію

д. Магніто-резонансну томографію

е. Ехоенцефалографію

107. Пацієнтку віком 23 роки шпиталізовано до лікарні у зв'язку з втратою свідомості та нападом тоні

а. Ехоенцефалографію

б. Ангіографію судин головного мозку

с. Електроенцефалографію

д. Магніто-резонансну томографію

е. Комп'ютерну томографію

108. Пацієнтку віком 78 років шпиталізовано до лікарні у стані психоемоційного збудження. Зі слів ро

а. Циклотомія

б. Гостра реакція на стрес

с. Патологічний афект

д. Деменція

е. Шизофренія

109. Пацієнтку віком 78 років шпиталізовано до лікарні у стані психоемоційного збудження. Зі слів ро

а. Циклотомія

б. Гостра реакція на стрес

с. Патологічний афект

д. Шизофренія

е. Деменція

110. Пацієнту, який був тренером з акробатики, після отримання поранення ампутували одну ногу. Після

а. Середній рівень

б. Гіперкомпенсація

с. Гіпокомпенсація

д. Низький рівень (пристосування до дефекту)

е. Високий рівень (активне подолання дефекту)

111. Пацієнту, який був тренером з акробатики, після отримання поранення ампутували одну ногу. Після

- a. Середній рівень
- b. Низький рівень (пристосування до дефекту)
- c. Гіпокомпенсація
- d. Гіперкомпенсація
- e. Високий рівень (активне подолання дефекту)

112. Під час огляду пацієнта віком 32 роки було виявлено руховий розлад, зокрема втрату здатності хо

a. Абазії

- b. Асинергії
- c. Астезії
- d. Апраксії
- e. Атаксії

113. Під час огляду пацієнта віком 32 роки було виявлено руховий розлад, зокрема втрату здатності хо

- a. Апраксії
- b. Астезії
- c. Атаксії
- d. Асинергії
- e. Абазії

a. Абазії

114. Після перенесеної психотравми пацієнтку турбує порушення сну, мінливість настрою, прискорене с

a. Астенічний

b. Істеричний

- c. Депресивний
- d. Іпохондричний
- e. Обсесивно-компульсивний

115. Після перенесеної психотравми пацієнтку турбує порушення сну, мінливість настрою, прискорене с

a. Обсесивно-компульсивний

b. Депресивний

c. Істеричний

- d. Астенічний
- e. Іпохондричний

116. Робота медичного працівника, як правило, емоційно насичена та призводить до розвитку синдрому

a. Негативне ставлення працівника до колег по роботі

b. Вичерпаність емоційних та фізичних ресурсів

- c. Зниження емоційного тону
- d. Розчарування результатами власної роботи
- e. Зникнення емоційності

117. Робота медичного працівника, як правило, емоційно насичена та призводить до розвитку синдрому

- a. Розчарування результатами власної роботи
- b. Негативне ставлення працівника до колег по роботі
- c. Зникнення емоційності
- d. Вичерпаність емоційних та фізичних ресурсів
- e. Зниження емоційного тону

a. Зниження емоційного тону

b. Вичерпаність емоційних та фізичних ресурсів

118. Скільки невдалих курсів лікування потрібно, щоб визначити терапевтично резистентну депресію?

a. 2 послідовних курси терапії

b. Понад 3 невдалих курси терапії

c. ---

d. 1 невдалий повний курс терапії

e. 3 послідовних курси терапії

119. Скільки невдалих курсів лікування потрібно, щоб визначити терапевтично резистентну депресію?

a. 1 невдалий повний курс терапії

b. 2 послідовних курси терапії

c. ---

d. Понад 3 невдалих курси терапії

e. 3 послідовних курси терапії

120. У військовослужбовця, який повернувся з зони активних бойових дій 2 місяці тому, діагностовано

a. EMDR

b. Клієнт-центровану психотерапію

c. Психоаналіз

d. Гештальт-терапію

e. Екзистенціальну психотерапію

121. У військовослужбовця, який повернувся з зони активних бойових дій 2 місяці тому, діагностовано

a. EMDR

b. Психоаналіз

c. Клієнт-центровану психотерапію

d. Екзистенціальну психотерапію

e. Гештальт-терапію

122. У контексті психотерапевтичної допомоги первинне інтерв'ю необхідне для збору інформації про п

a. 20 хв

b. 30 хв

c. 50 хв

d. 90 хв

e. 15 хв

123. У контексті психотерапевтичної допомоги первинне інтерв'ю необхідне для збору інформації про п

a. 20 хв

b. 30 хв

c. 15 хв

d. 50 хв

e. 90 хв

124. У пацієнта віком 65 років три тижні тому померла дружина, яка тривалий час хворіла на онкологіч

a. Запропонувати пройти курс лікування в умовах денного стаціонару

b. Провести психоосвіту щодо процесу нормального горювання

c. Призначити пірацетам у відповідних дозуваннях, курс 4 тижні з подальшим спостереженням

d. Призначити курс травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії

e. Призначити есциталопрам 10 мг уранці, курс 2 тижні

125. У пацієнта віком 65 років три тижні тому померла дружина, яка тривалий час хворіла на онкологіч

a. Призначити курс травма-фокусованої когнітивно-поведінкової терапії

b. Запропонувати пройти курс лікування в умовах денного стаціонару

c. Провести психоосвіту щодо процесу нормального горювання

d. Призначити пірацетам у відповідних дозуваннях, курс 4 тижні з подальшим спостереженням

e. Призначити есциталопрам 10 мг уранці, курс 2 тижні

126. У пацієнтки віком 36 років виявлено симптоми компульсивного переїдання («заїдає стрес», багато

a. Ділення продуктів на «корисні» та «шкідливі»

b. Підрахунок калорій

c. Інтуїтивне харчування

d. Обмеження харчування

e. Психоосвіта

127. У пацієнтки віком 36 років виявлено симптоми компульсивного переїдання («заїдає стрес», багато

a. Обмеження харчування

b. Інтуїтивне харчування

c. Психоосвіта

d. Ділення продуктів на «корисні» та «шкідливі»

e. Підрахунок калорій

128. У психічному стані пацієнта виявлено знижений настрій, психомоторне гальмування, маячні й суїци

a. Стаціонарне лікування комбінацією антидепресанта та антипсихотика першого покоління

b. Стаціонарне лікування комбінацією антидепресанта та транквілізатора

c. Амбулаторне лікування комбінацією антидепресанта та антипсихотика

d. Стаціонарне лікування комбінацією антидепресанта та антипсихотика другого покоління

e. -

129. У психічному стані пацієнта виявлено знижений настрій, психомоторне гальмування, маячні й суїци

a. Стаціонарне лікування комбінацією антидепресанта та транквілізатора

- b. Амбулаторне лікування комбінацією антидепресанта та антипсихотика
- c. Стаціонарне лікування комбінацією антидепресанта та антипсихотика першого покоління
- d. Стаціонарне лікування комбінацією антидепресанта та антипсихотика другого покоління
- e. -

130. У чоловіка віком 43 роки спостерігається стан психомоторного збудження: зазирає за двері і пере

a. Гострий галюциноз

b. Вербальні ілюзії

c. Конфабуляції

d. Маячіння

e. Нав'язливі ідеї

131. У чоловіка віком 43 роки спостерігається стан психомоторного збудження: зазирає за двері і пере

a. Маячіння

b. Гострий галюциноз

c. Нав'язливі ідеї

d. Конфабуляції

e. Вербальні ілюзії

132. У чоловіка діагностовано обсесивно-компульсивний розлад (ОКР). Пацієнт має високий вихідний рівень

a. Тілесно-орієнтовану терапію

b. Фармакотерапію селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну

c. Когнітивно-поведінкову психотерапію

d. Гештальт-терапію

e. Фармакотерапію нейролептиками

133. У чоловіка діагностовано обсесивно-компульсивний розлад (ОКР). Пацієнт має високий вихідний рівень

a. Фармакотерапію нейролептиками

b. Фармакотерапію селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну

c. Тілесно-орієнтовану терапію

d. Когнітивно-поведінкову психотерапію

e. Гештальт-терапію

134. У чоловіка з тяжким перебігом COVID-19, на тлі високої температури та задишки, виникло видіння

a. Соматогенія

b. Нозогенія

c. Неврастенія

d. Психогенія

e. Соматизована психічна реакція

135. У чоловіка з тяжким перебігом COVID-19, на тлі високої температури та задишки, виникло видіння

a. Соматизована психічна реакція

b. Психогенія

c. Нозогенія

d. Неврастенія

e. Соматогенія

136. У якому разі в терапії великого депресивного епізоду застосовуються тимостабілізатори?

a. За наявності виражених симптомів тривоги

b. Під час лікування антидепресантами другого ряду

c. За відсутності терапевтичного ефекту лікування антидепресантами впродовж 4-х тижнів

d. Лише в період ремісії

e. Під час амбулаторного лікування

137. У якому разі в терапії великого депресивного епізоду застосовуються тимостабілізатори?

a. Лише в період ремісії

b. За відсутності терапевтичного ефекту лікування антидепресантами впродовж 4-х тижнів

c. Під час амбулаторного лікування

d. За наявності виражених симптомів тривоги

e. Під час лікування антидепресантами другого ряду

138. Укажіть визначення, що характеризує зміст когніцій в осіб із панічним розладом.

a. Інтеріоризація негативної зовнішньої оцінки з її подальшою соматизацією

b. Запобігання негативним ситуаціям, що можуть статися з людиною чи її близьким оточенням

с. Викривлена катастрофічна інтерпретація симптомів тривоги

d. Перебільшення загрози та прогнозування високого ризику небажаного результату

е. Помилкове пояснення нешкідливих тілесних симптомів як проявів небезпечного захворювання

139. Укажіть визначення, що характеризує зміст когніцій в осіб із панічним розладом.

а. Перебільшення загрози та прогнозування високого ризику небажаного результату

b. Запобігання негативним ситуаціям, що можуть статися з людиною чи її близьким оточенням

с. Викривлена катастрофічна інтерпретація симптомів тривоги

d. Інтеріоризація негативної зовнішньої оцінки з її подальшою соматизацією

е. Помилкове пояснення нешкідливих тілесних симптомів як проявів небезпечного захворювання

140. Укажіть властивості особистості, для оцінки яких використовується опитувальник Спілбергера (STAI).

а. Когнітивні порушення

b. Особистісна та реактивна тривожність

с. Акцентуації характеру

d. Алекситимія

е. Тривога та депресія

141. Укажіть властивості особистості, для оцінки яких використовується опитувальник Спілбергера (STAI).

а. Тривога та депресія

b. Когнітивні порушення

с. Акцентуації характеру

d. Особистісна та реактивна тривожність

е. Алекситимія

142. Укажіть засновника нейролінгвістичного програмування (НЛП).

а. Р. Бендлер

b. З. Фройд

с. В. Сатир

d. Ф. Перлз

е. К. Роджерс

143. Укажіть засновника нейролінгвістичного програмування (НЛП).

а. В. Сатир

b. З. Фройд

с. Ф. Перлз

d. Р. Бендлер

е. К. Роджерс

144. Укажіть комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, функціонального стану і працездатності.

а. Психологічна діагностика

b. Психічна депривація

с. Психотерапія

d. Реабілітація

е. Психосоціальна підтримка

145. Укажіть комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, функціонального стану і працездатності.

а. Психотерапія

b. Психічна депривація

с. Психологічна діагностика

d. Реабілітація

е. Психосоціальна підтримка

146. Укажіть короточасне почуття повної спустошеності та байдужості, що виникає під дією раптових змін.

а. Ейфорія

b. Тривога

с. Апатія

d. Емоційна лабільність

е. Емоційний параліч

147. Укажіть короточасне почуття повної спустошеності та байдужості, що виникає під дією раптових змін.

а. Емоційна лабільність

b. Апатія

с. Емоційний параліч

- d. Ейфорія
- e. Тривога

148. Укажіть лікаря-психіатра, який широко використовував у своїй практиці гіпноз та виділив основні

a. Жан-Мартен Шарко

- b. Джеймс Бред
- c. Іван Павлов
- d. Іпполіт Бернгейм
- e. П'єр Жане

149. Укажіть лікаря-психіатра, який широко використовував у своїй практиці гіпноз та виділив основні

- a. Іпполіт Бернгейм
- b. Іван Павлов
- c. Джеймс Бред
- d. П'єр Жане

e. Жан-Мартен Шарко

150. Укажіть метод психотерапевтичної роботи, у якому учасники групи можуть відображати свої почуття

- a. Раціонально-емотивна терапія
- b. Символдрама
- c. Транзактний аналіз
- d. Екзистенційно-гуманістична психотерапія

e. Психодрама

151. Укажіть метод психотерапевтичної роботи, у якому учасники групи можуть відображати свої почуття

- a. Транзактний аналіз
- b. Екзистенційно-гуманістична психотерапія
- c. Символдрама
- d. Раціонально-емотивна терапія

e. Психодрама

152. Укажіть найчастішу причину деліріозного синдрому (делірію).

- a. Істерія
- b. Біполярний розлад
- c. Екзогенне ураження головного мозку
- d. Шизофренія
- e. Епілепсія

153. Укажіть найчастішу причину деліріозного синдрому (делірію).

- a. Шизофренія
- b. Біполярний розлад
- c. Екзогенне ураження головного мозку
- d. Епілепсія
- e. Істерія

154. Укажіть обов'язкову ознаку деліріозного затьмарення свідомості.

- a. Істинні зорові галюцинації та ілюзії
- b. Фантастичні сюжетні уявлення
- c. Автоматичні рухи
- d. Агресивно-захисна поведінка
- e. Афект здивування, розгубленість

155. Укажіть обов'язкову ознаку деліріозного затьмарення свідомості.

- a. Автоматичні рухи
- b. Агресивно-захисна поведінка
- c. Афект здивування, розгубленість
- d. Істинні зорові галюцинації та ілюзії
- e. Фантастичні сюжетні уявлення

156. Укажіть один із розладів, що характеризується посиленням харчового потягу, проявляється у пості

- a. Анорексія
- b. Полідипсія
- c. Парабулія
- d. Булімія

е. Гіпербулія

157. Укажіть один із розладів, що характеризується посиленням харчового потягу, проявляється у пост

а. Гіпербулія

б. Парабулія

с. Анорексія

д. Булімія

е. Полідипсія

158. Укажіть одне із завдань сімейної психотерапії.

а. -

б. Зцілення від психосоматичних розладів

с. Сприяння усвідомленню несвідомих тенденцій, потягів і конфліктів

д. Збільшення відкритості комунікації

е. Відслідковування автоматичних негативних думок

159. Укажіть одне із завдань сімейної психотерапії.

а. Відслідковування автоматичних негативних думок

б. Збільшення відкритості комунікації

с. Сприяння усвідомленню несвідомих тенденцій, потягів і конфліктів

д. Зцілення від психосоматичних розладів

е. -

160. Укажіть одну з пізнавальних діяльностей людини, для дослідження якої використовують таблиці Ш

а. Увага

б. Відчуття

с. Мислення

д. Пам'ять

е. Мова

161. Укажіть одну з пізнавальних діяльностей людини, для дослідження якої використовують таблиці Ш

а. Мова

б. Мислення

с. Пам'ять

д. Увага

е. Відчуття

162. Укажіть основну відмінність клінічного інтерв'ю від звичайного розпитування.

а. Націлене не лише на скарги, але й на виявлення прихованих мотивів поведінки людини та надання їй

б. Поєднує психодіагностичні процедури і безпосереднє обстеження

с. Передбачає емоційну підтримку та обговорення планів на майбутнє

д. Націлене лише на виявлення скарг пацієнта

е. Передбачає можливість оцінювання індивідуально-психологічних особливостей пацієнта

163. Укажіть основну відмінність клінічного інтерв'ю від звичайного розпитування.

а. Націлене лише на виявлення скарг пацієнта

б. Передбачає можливість оцінювання індивідуально-психологічних особливостей пацієнта

с. Націлене не лише на скарги, але й на виявлення прихованих мотивів поведінки людини та надання їй

д. Поєднує психодіагностичні процедури і безпосереднє обстеження

е. Передбачає емоційну підтримку та обговорення планів на майбутнє

164. Укажіть основні завдання психогігієни.

а. Попередження виникнення інвалідності при хронічних психічних захворюваннях

б. -

с. Прогнозування можливих спадкових психічних захворювань

д. Попередження виникнення конкретних психічних розладів

е. Формування та підтримка психічного здоров'я різних верств населення

165. Укажіть основні завдання психогігієни.

а. Прогнозування можливих спадкових психічних захворювань

б. Попередження виникнення інвалідності при хронічних психічних захворюваннях

с. -

д. Формування та підтримка психічного здоров'я різних верств населення

е. Попередження виникнення конкретних психічних розладів

166. Укажіть патологічний стан, за якого відсутні безумовні рефлекси.

- a. Оглушення
- b. Кома**
- c. Сопор
- d. Ступор
- e. Делірій

167. Укажіть патологічний стан, за якого відсутні безумовні рефлекси.

- a. Ступор
- b. Делірій
- c. Сопор
- d. Оглушення
- e. Кома**

168. Укажіть першу лінію індивідуальної психотерапії при гострому депресивному епізоді.

- a. Позитивна психотерапія
- b. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та міжособистісна терапія**
- c. Психодинамічна терапія та емоційно-сфокусована терапія
- d. Система психотерапії когнітивно-поведінкового аналізу
- e. Когнітивно-поведінкова терапія + фармакотерапія

169. Укажіть першу лінію індивідуальної психотерапії при гострому депресивному епізоді.

- a. Психодинамічна терапія та емоційно-сфокусована терапія
- b. Когнітивно-поведінкова терапія + фармакотерапія
- c. Система психотерапії когнітивно-поведінкового аналізу
- d. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та міжособистісна терапія**
- e. Позитивна психотерапія

170. Укажіть препарати з найбільшою доказовою базою для лікування депресивного епізоду.

- a. Нормотимічні засоби
- b. Інгібітори МАО
- c. ТЦА
- d. Психостимулятори
- e. СІЗЗС**

171. Укажіть препарати з найбільшою доказовою базою для лікування депресивного епізоду.

- a. ТЦА
- b. Нормотимічні засоби
- c. Психостимулятори
- d. Інгібітори МАО
- e. СІЗЗС**

172. Укажіть протипоказання до застосування когнітивно-поведінкової психотерапії.

- a. Генералізований тривожний розлад
- b. Психози в стадії загострення**
- c. Депресивний епізод
- d. Панічний розлад
- e. Шизофренія

173. Укажіть протипоказання до застосування когнітивно-поведінкової психотерапії.

- a. Депресивний епізод
- b. Шизофренія
- c. Генералізований тривожний розлад
- d. Панічний розлад
- e. Психози в стадії загострення**

174. Укажіть психогенні реакції, що виникають у зв'язку із соматичним захворюванням та належать до

- a. Соматогенії
- b. Соматоформні реакції
- c. Нозогенії**
- d. Неврози
- e. Ятрогенії

175. Укажіть психогенні реакції, що виникають у зв'язку із соматичним захворюванням та належать до

- a. Ятрогенії
- b. Соматоформні реакції
- c. Соматогенії

d. Нозогенії

- e. Неврози

176. Укажіть психолога, який запропонував трансперсональну психотерапію та є засновником Міжнародного товариства трансперсональної психології.

a. Станіслав Гроф

- b. Іпполіт Бернгейм
- c. Йозеф Брейер
- d. П'єр Жане
- e. Зигмунд Фройд

177. Укажіть психолога, який запропонував трансперсональну психотерапію та є засновником Міжнародного товариства трансперсональної психології.

- a. П'єр Жане
- b. Зигмунд Фройд
- c. Йозеф Брейер

d. Станіслав Гроф

- e. Іпполіт Бернгейм

178. Укажіть психологічну травму, яка характеризує психологічний чи емоційний ефект, що відчувають люди, які пережили події, які виходять за межі звичайного досвіду.

- a. Монотравма
- b. Повторювана травма
- c. Травма розвитку
- d. Трансгенераційна травма

e. Інтергенераційна травма

179. Укажіть психологічну травму, яка характеризує психологічний чи емоційний ефект, що відчувають люди, які пережили події, які виходять за межі звичайного досвіду.

- a. Повторювана травма
- b. Травма розвитку
- c. Інтергенераційна травма
- d. Трансгенераційна травма
- e. Монотравма

180. Укажіть розлади пам'яті, коли людина має помилкові спогади, яких не було в цей час, але які були в інший час.

- a. Амнестичне дезорієнтування

b. Псевдоремінісценції

- c. Конфабуляції
- d. Антероградна амнезія
- e. Ретроградна амнезія

181. Укажіть розлади пам'яті, коли людина має помилкові спогади, яких не було в цей час, але які були в інший час.

a. Конфабуляції

b. Псевдоремінісценції

- c. Ретроградна амнезія
- d. Антероградна амнезія
- e. Амнестичне дезорієнтування

182. Укажіть розлади пам'яті, коли людина має помилкові, вигадані, фантастичного змісту спогади про події, які відбулися в минулому.

- a. Амнезія
- b. Ілюзії
- c. Синдром Капгра
- d. Псевдоремінісценції

e. Конфабуляції

183. Укажіть розлади пам'яті, коли людина має помилкові, вигадані, фантастичного змісту спогади про події, які відбулися в минулому.

- a. Синдром Капгра
- b. Амнезія
- c. Псевдоремінісценції

d. Конфабуляції

- e. Ілюзії

184. Укажіть симптом, що характеризується утрудненням або нездатністю людини точно оцінити чи оприлюднити свої думки.

- a. Абулія

b. Алекситимія

c. Апатія

d. Гіпобулія

e. Ангедонія

185. Укажіть симптом, що характеризується утрудненням або нездатністю людини точно оцінити чи оп

a. Абулія

b. Гіпобулія

c. Апатія

d. Алекситимія

e. Ангедонія

186. Укажіть систему заходів, що буде першочерговим вибором для лікування гострого стресового розл

a. Психокорекція

b. Психореабілітація

c. Психопрофілактика

d. Психогігієна

e. Психофармакотерапія

187. Укажіть систему заходів, що буде першочерговим вибором для лікування гострого стресового розл

a. Психогігієна

b. Психореабілітація

c. Психокорекція

d. Психопрофілактика

e. Психофармакотерапія

188. Укажіть стан потьмарення свідомості, за якого спостерігається збереження усіх видів орієнтуванн

a. Абсанс

b. Сопор

c. Оглушення

d. Кома

e. Обнубіляція

189. Укажіть стан потьмарення свідомості, за якого спостерігається збереження усіх видів орієнтуванн

a. Оглушення

b. Обнубіляція

c. Сопор

d. Кома

e. Абсанс

190. Укажіть стан, за якого спостерігається ослаблення емоцій, байдужість до свого становища та оточ

a. Апатія

b. Емоційна лабільність

c. Гіпотимія

d. Морія

e. Гіпертимія

191. Укажіть стан, за якого спостерігається ослаблення емоцій, байдужість до свого становища та оточ

a. Морія

b. Апатія

c. Гіпотимія

d. Гіпертимія

e. Емоційна лабільність

192. Укажіть твердження, що найбільш характерне для нервової анорексії.

a. Апетит спочатку не втрачається

b. Блювання часто виникає пізніше в перебігу хвороби

c. Прагнення до струнності стає єдиним пріоритетом

d. Втрата ваги асоціюється з ескалацією гніву

e. Зазвичай присутня значна депресія

193. Укажіть твердження, що найбільш характерне для нервової анорексії.

a. Блювання часто виникає пізніше в перебігу хвороби

b. Апетит спочатку не втрачається

с. Втрата ваги асоціюється з ескалацією гніву

d. Прагнення до стрункості стає єдиним пріоритетом

е. Зазвичай присутня значна депресія

194. Укажіть твердження, що характеризує редукцію особистісних досягнень.

a. Розчарування результатами власної роботи

b. Вичерпаність емоційних ресурсів

с. Негативне ставлення працівника до колег по роботі

d. Зникнення емоційності

е. Зниження емоційного тону

195. Укажіть твердження, що характеризує редукцію особистісних досягнень.

a. Зниження емоційного тону

b. Вичерпаність емоційних ресурсів

с. Зникнення емоційності

d. Негативне ставлення працівника до колег по роботі

е. Розчарування результатами власної роботи

196. Укажіть тривожний стан, за якого людина має постійний страх захворіти, нав'язливу думку про хворобу

a. Алекситимія

b. Дисморфофобія

с. Ятрогенія

d. Фрустрація

е. Іпохондрія

197. Укажіть тривожний стан, за якого людина має постійний страх захворіти, нав'язливу думку про хворобу

a. Дисморфофобія

b. Ятрогенія

с. Фрустрація

d. Іпохондрія

е. Алекситимія

198. Укажіть форму потьмарення свідомості з переважанням незв'язності мовлення, моторики та розгубленості

a. Аментивний синдром

b. Ганзеровський синдром

с. Пуерилізм

d. Парафренний синдром

е. Псевдодеменція

199. Укажіть форму потьмарення свідомості з переважанням незв'язності мовлення, моторики та розгубленості

a. Псевдодеменція

b. Пуерилізм

с. Ганзеровський синдром

d. Аментивний синдром

е. Парафренний синдром

200. Укажіть форму психічного розладу, що проявляється у сутінковому затьмаренні свідомості, зовнішній поведінці

a. Обнубуляція

b. Пасивний негативізм

с. Транс

d. Аменція

е. Автоматичне підкорення

201. Укажіть форму психічного розладу, що проявляється у сутінковому затьмаренні свідомості, зовнішній поведінці

a. Обнубуляція

b. Пасивний негативізм

с. Автоматичне підкорення

d. Аменція

е. Транс

202. Укажіть шкалу вимірювання інтелекту.

a. Шкала MMPI

b. Шкала Манії

с. Шкала Спілберга

d. Шкала Бека

e. Шкала Векслера

203. Укажіть шкалу вимірювання інтелекту.

a. Шкала Спілберга

b. Шкала Манії

c. Шкала Бека

d. Шкала MMPI

e. Шкала Векслера

204. Укажіть імовірні зміни в лабораторних показниках крові пацієнта з синдромом емоційного вигорання:

a. Підвищення рівня адреналіну

b. Підвищення рівня дофаміну

c. Підвищення рівня кортизолу

d. Зниження рівня серотоніну

e. Зниження рівня кортизолу

205. Укажіть імовірні зміни в лабораторних показниках крові пацієнта з синдромом емоційного вигорання:

a. Підвищення рівня кортизолу

b. Підвищення рівня дофаміну

c. Зниження рівня серотоніну

d. Підвищення рівня адреналіну

e. Зниження рівня кортизолу

206. Укажіть, до якої складової частини профілактики професійного вигорання належить твердження: 'Важко бути хорошим фахівцем, якщо ти не любиш свою роботу':

a. Соціальної

b. Медичної

c. Духовної

d. Біологічної

e. Психологічної

207. Укажіть, до якої складової частини профілактики професійного вигорання належить твердження: 'Важко бути хорошим фахівцем, якщо ти не любиш свою роботу':

a. Соціальної

b. Психологічної

c. Медичної

d. Біологічної

e. Духовної

208. Укажіть, поєднання яких лікарських засобів використовують для лікування депресивного синдрому:

a. Антидепресантів та нейролептиків другого покоління

b. -

c. Антидепресантів першого та другого покоління

d. ТЦА та антихолінергічних засобів

e. Нейролептиків першого та другого покоління

209. Укажіть, поєднання яких лікарських засобів використовують для лікування депресивного синдрому:

a. -

b. Антидепресантів першого та другого покоління

c. ТЦА та антихолінергічних засобів

d. Нейролептиків першого та другого покоління

e. Антидепресантів та нейролептиків другого покоління

210. Ускладненням якого методу психотерапії гострого стресового розладу та ПТСР є повторна психологізація:

a. Аутотренінгу

b. Когнітивно-поведінкової терапії

c. Раннього дебрифінгу

d. Майндфулнес

e. Прогресивної релаксації

211. Ускладненням якого методу психотерапії гострого стресового розладу та ПТСР є повторна психологізація:

a. Прогресивної релаксації

b. Раннього дебрифінгу

c. Когнітивно-поведінкової терапії

d. Майндфулнес

е. Аутотренінгу

212. Через який час після перенесеної психотравмуючої події можна застосовувати травмофокусовані ін-

а. У перші години після психотравмуючої події

б. Не раніше ніж через 2 тижні після психотравмуючої події

с. Через 24 год після психотравмуючої події

д. Не раніше ніж через 2 місяці після психотравмуючої події

е. Через 48 год після психотравмуючої події

213. Через який час після перенесеної психотравмуючої події можна застосовувати травмофокусовані ін-

а. Через 48 год після психотравмуючої події

б. Через 24 год після психотравмуючої події

с. У перші години після психотравмуючої події

д. Не раніше ніж через 2 місяці після психотравмуючої події

е. Не раніше ніж через 2 тижні після психотравмуючої події

214. Через яку побічну дію психологічного дебрифінгу його не рекомендовано на початкових етапах тер-

а. Соматизацію

б. Ретравматизацію

с. Деадаптацію

д. Суїцидальну налаштованість

е. Сенсibilізацію

215. Через яку побічну дію психологічного дебрифінгу його не рекомендовано на початкових етапах тер-

а. Суїцидальну налаштованість

б. Деадаптацію

с. Сенсibilізацію

д. Соматизацію

е. Ретравматизацію

216. Чоловік віком 35 років викликав екстрену (швидку) медичну допомогу через відчуття задухи, страх

а. Лікування у стаціонарі

б. Повторне обстеження в іншого лікаря-кардіолога

с. Направити до лікаря-гастроентеролога

д. Направити до лікаря-психіатра

е. Направити до лікаря-невролога

217. Чоловік віком 35 років викликав екстрену (швидку) медичну допомогу через відчуття задухи, страх

а. Повторне обстеження в іншого лікаря-кардіолога

б. Направити до лікаря-невролога

с. Направити до лікаря-гастроентеролога

д. Лікування у стаціонарі

е. Направити до лікаря-психіатра

218. Чоловік протягом трьох місяців отримує циталопрам 20 мг/добу з приводу лікування ПТСР та прохо-

а. Продовження фармакотерапії до 12-ти місяців

б. Поступова відміна психотерапії

с. Продовження фармакотерапії до 3-х місяців

д. Поступова відміна антидепресанта

е. Різка відміна антидепресанта

219. Чоловік протягом трьох місяців отримує циталопрам 20 мг/добу з приводу лікування ПТСР та прохо-

а. Продовження фармакотерапії до 12-ти місяців

б. Різка відміна антидепресанта

с. Поступова відміна психотерапії

д. Продовження фармакотерапії до 3-х місяців

е. Поступова відміна антидепресанта

220. Чоловіку віком 45 років діагностовано депресію. Протягом останніх 10-ти років він бореться із з

а. Розлад вживання психоактивних речовин

б. Тривожний розлад

с. Шизофренія

д. Біполярний розлад

е. Розлад харчової поведінки

221. Чоловіку віком 45 років діагностовано депресію. Протягом останніх 10-ти років він бореться із з

a. Розлад харчової поведінки

b. Біполярний розлад

c. Розлад вживання психоактивних речовин

d. Шизофренія

e. Тривожний розлад

222. Що насамперед передбачає медико-психологічний супровід пацієнта з тяжкою деменцією?

a. Психологічну підтримку та психоосвіту пацієнта

b. Когнітивний тренінг для пацієнта

c. Сімейну психотерапію (пацієнт та доглядальник)

d. Тренінг соціальних навичок для пацієнта

e. Психологічну підтримку та психоосвіту доглядальника

223. Що насамперед передбачає медико-психологічний супровід пацієнта з тяжкою деменцією?

a. Тренінг соціальних навичок для пацієнта

b. Когнітивний тренінг для пацієнта

c. Психологічну підтримку та психоосвіту пацієнта

d. Психологічну підтримку та психоосвіту доглядальника

e. Сімейну психотерапію (пацієнт та доглядальник)

224. Що із нижченаведеного належить до поведінкових технік поведінкової психотерапії?

a. Експеримент-відкриття

b. Відволікання

c. Аналіз "за" і "проти"

d. Зважування плюсів і мінусів

e. Когнітивне викривлення

225. Що із нижченаведеного належить до поведінкових технік поведінкової психотерапії?

a. Когнітивне викривлення

b. Відволікання

c. Експеримент-відкриття

d. Зважування плюсів і мінусів

e. Аналіз "за" і "проти"

226. Юнак віком 17 років скаржиться на підвищену тривожність, негативні емоції, підвищену втомлюва

a. Психоаналіз

b. Тілесно-орієнтована психотерапія

c. Сугестія

d. Групова психотерапія

e. Арт-терапія

227. Юнак віком 17 років скаржиться на підвищену тривожність, негативні емоції, підвищену втомлюва

a. Психоаналіз

b. Сугестія

c. Групова психотерапія

d. Арт-терапія

e. Тілесно-орієнтована психотерапія

228. Як називається комплекс заходів спрямований на попередження рецидивів та хронізації нервово-п

a. Вторинна психопрофілактика

b. -

c. Третинна психопрофілактика

d. Екстрена психопрофілактика

e. Первинна психопрофілактика

229. Як називається комплекс заходів спрямований на попередження рецидивів та хронізації нервово-п

a. Екстрена психопрофілактика

b. Вторинна психопрофілактика

c. Первинна психопрофілактика

d. -

e. Третинна психопрофілактика

230. Як називається комплекс заходів, спрямований на максимально раннє виявлення початкових фаз н

a. Вторинна психопрофілактика

b. -

c. Третинна психопрофілактика

d. Первинна психопрофілактика

e. Психокорекція

231. Як називається комплекс заходів, спрямований на максимально раннє виявлення початкових фаз н

a. -

b. Третинна психопрофілактика

c. Психокорекція

d. Первинна психопрофілактика

e. Вторинна психопрофілактика

232. Яка група антидепресантів є препаратами першої лінії для медикаментозного лікування посттравм

a. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну

b. Селективні інгібітори зворотного захоплення дофаміну і норадреналіну

c. Інгібітори моноамінооксидази

d. Трициклічні антидепресанти

e. Селективні інгібітори зворотного захоплення норадреналіну

233. Яка група антидепресантів є препаратами першої лінії для медикаментозного лікування посттравм

a. Селективні інгібітори зворотного захоплення дофаміну і норадреналіну

b. Трициклічні антидепресанти

c. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну

d. Селективні інгібітори зворотного захоплення норадреналіну

e. Інгібітори моноамінооксидази

234. Яка група препаратів буде найбільш доцільною для медикаментозного лікування посттравматично

a. Психостимулятори

b. Транквілізатори

c. Антидепресанти

d. Седативні засоби

e. Нейролептики

235. Яка група препаратів буде найбільш доцільною для медикаментозного лікування посттравматично

a. Седативні засоби

b. Психостимулятори

c. Антидепресанти

d. Транквілізатори

e. Нейролептики

236. Яка діагностична шкала є скрінінговою для генералізованого тривожного розладу?

a. Шкала тривоги GAD-7

b. Шкала тривоги Гамільтона HAM-A

c. Шкала особистісної та реактивної тривожності Спілбергера-Ханіна

d. Госпітальна шкала тривоги і депресії HADS

e. Шкала тривоги Кові

237. Яка діагностична шкала є скрінінговою для генералізованого тривожного розладу?

a. Шкала тривоги GAD-7

b. Шкала тривоги Кові

c. Шкала тривоги Гамільтона HAM-A

d. Шкала особистісної та реактивної тривожності Спілбергера-Ханіна

e. Госпітальна шкала тривоги і депресії HADS

238. Яка з нижченаведених методик застосовується в неврологічній практиці для диференційної діагно

a. Шкала Хачинського

b. Опитувальник нейроповедінкових симптомів

c. Клінічна рейтингова шкала деменції

d. MMSE

e. MOCA

239. Яка з нижченаведених методик застосовується в неврологічній практиці для диференційної діагно

a. Клінічна рейтингова шкала деменції

- b. MOCA
- c. Опитувальник нейроповедінкових симптомів

d. Шкала Хачинського

e. MMSE

240. Яка з нижченаведених психодіагностичних методик дозволяє оцінити пам'ять, організацію діяльності?

- a. C-SSRS
- b. CDR
- c. CAPS
- d. MOCA

e. Тест на малювання годинника

241. Яка з нижченаведених психодіагностичних методик дозволяє оцінити пам'ять, організацію діяльності?

- a. MOCA
- b. CDR
- c. C-SSRS

d. Тест на малювання годинника

e. CAPS

242. Яка з нижченаведених психодіагностичних шкал застосовується для діагностики безсоння?

a. PSQI

- b. HADS
- c. MMPI
- d. NSI
- e. PCL-5

243. Яка з нижченаведених психодіагностичних шкал застосовується для діагностики безсоння?

a. PSQI

- b. HADS
- c. NSI
- d. MMPI
- e. PCL-5

244. Яка з нижченаведених шкал на визначення симптомів депресії заповнюється фахівцем, що має спеціальну освіту?

- a. HADS
- b. Шкала А.Бека
- c. PHQ-9

d. Шкала Монтгомері-Асберга

e. PDQ-5

245. Яка з нижченаведених шкал на визначення симптомів депресії заповнюється фахівцем, що має спеціальну освіту?

- a. HADS
- b. Шкала А.Бека
- c. PHQ-9
- d. PDQ-5

e. Шкала Монтгомері-Асберга

246. Яка основна побічна дія антипсихотиків першого покоління?

- a. Когнітивні порушення
- b. Стимулююча дія на психіку
- c. Серотоніновий синдром
- d. Метаболічні порушення

e. Екстрапірамідні розлади

247. Яка основна побічна дія антипсихотиків першого покоління?

- a. Серотоніновий синдром
- b. Метаболічні порушення
- c. Стимулююча дія на психіку
- d. Когнітивні порушення

e. Екстрапірамідні розлади

248. Яка патологія є протипоказанням до застосування Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)?

- a. Відшарування сітківки ока
- b. Депресія

- с. Обсесивно-компульсивний розлад
- d. ПТСР
- е. Тривожний розлад

249. Яка патологія є протипоказанням до застосування Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)?

- a. Депресія
- b. Відшарування сітківки ока**
- с. Обсесивно-компульсивний розлад
- d. ПТСР
- е. Тривожний розлад

250. Яка психотерапія є першою лінією для інтеграції у життя та пошуку сенсу травматичного досвіду?

- a. Наративна експозиційна терапія**
- b. Травма-фокусована психотерапія
- с. Розповідна експозиційна терапія
- d. Когнітивно-реконструктивна пролонгована експозиція
- е. Коротка еклектична психотерапія

251. Яка психотерапія є першою лінією для інтеграції у життя та пошуку сенсу травматичного досвіду?

- a. Розповідна експозиційна терапія
- b. Коротка еклектична психотерапія
- с. Когнітивно-реконструктивна пролонгована експозиція
- d. Наративна експозиційна терапія**
- е. Травма-фокусована психотерапія

252. Яка стадія емоційного вигорання характеризується зниженням інтересу до роботи та потреби в сп

- a. П'ята
- b. Друга**
- с. Третя
- d. Перша
- е. Четверта

253. Яка стадія емоційного вигорання характеризується зниженням інтересу до роботи та потреби в сп

- a. Третя
- b. Четверта
- с. П'ята
- d. Перша
- е. Друга**

254. Яка тактика лікування вважається найбільш доречною для пацієнтів із ранніми ознаками шизофре

- a. Когнітивно-поведінкова терапія та тренінг соціальних навичок
- b. Майндфулнес та релаксаційні техніки
- с. Групова терапія та арт-терапія
- d. Фармакотерапія та підтримуюча психотерапія**
- е. Негайна фармакотерапія та психодинамічна терапія

255. Яка тактика лікування вважається найбільш доречною для пацієнтів із ранніми ознаками шизофре

- a. Негайна фармакотерапія та психодинамічна терапія
- b. Фармакотерапія та підтримуюча психотерапія**
- с. Групова терапія та арт-терапія
- d. Майндфулнес та релаксаційні техніки
- е. Когнітивно-поведінкова терапія та тренінг соціальних навичок

256. Який антидепресант протипоказаний при епілепсії?

- a. Бупропіон**
- b. Моклобемід
- с. Вортіоксетин
- d. Міртазапін
- е. Агомелатин

257. Який антидепресант протипоказаний при епілепсії?

- a. Міртазапін
- b. Бупропіон**
- с. Агомелатин

- d. Вортиоксетин
- e. Моклобемід

258. Який вид терапії має найбільшу ефективність та доказовість щодо специфічної фобії?

- a. Психодинамічна психотерапія
- b. Групова когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)
- c. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) + фармакотерапія
- d. Систематична десенсибілізація
- e. Експозиційна терапія

259. Який вид терапії має найбільшу ефективність та доказовість щодо специфічної фобії?

- a. Систематична десенсибілізація
- b. Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) + фармакотерапія
- c. Групова когнітивно-поведінкова терапія (КПТ)
- d. Експозиційна терапія

e. Психодинамічна психотерапія

260. Який метод психотерапії використовується для когнітивної реструктуризації сенсу та інтеграції т

- a. Коротка еклектична психотерапія
- b. Когнітивно-реконструктивна пролонгована експозиція
- c. Розповідна експозиційна терапія
- d. Наративна експозиційна терапія
- e. Травма-фокусована психотерапія

261. Який метод психотерапії використовується для когнітивної реструктуризації сенсу та інтеграції т

- a. Коротка еклектична психотерапія
- b. Травма-фокусована психотерапія
- c. Розповідна експозиційна терапія
- d. Наративна експозиційна терапія
- e. Когнітивно-реконструктивна пролонгована експозиція

262. Який метод є найефективнішим для вирівнювання сезонних коливань настрою та запобігання зимово

- a. Когнітивно-поведінкова терапія
- b. Психодинамічна терапія

c. Світлотерапія

- d. Групова підтримуюча терапія
- e. Фармакотерапія з антидепресантами

263. Який метод є найефективнішим для вирівнювання сезонних коливань настрою та запобігання зимово

- a. Когнітивно-поведінкова терапія
- b. Фармакотерапія з антидепресантами

c. Світлотерапія

- d. Групова підтримуюча терапія
- e. Психодинамічна терапія

264. Який метод ґрунтується на усвідомленні зв'язку між думками та почуттями, що в результаті сприч

- a. Поведінкова активація
- b. Транзактний аналіз

c. Когнітивна реструктуризація

- d. Релаксація
- e. Ситуаційне управління

265. Який метод ґрунтується на усвідомленні зв'язку між думками та почуттями, що в результаті сприч

- a. Ситуаційне управління
- b. Релаксація

c. Когнітивна реструктуризація

- d. Транзактний аналіз
- e. Поведінкова активація

266. Який напрям психотерапії описує принцип "тут і зараз"?

- a. Психоаналіз
- b. Гештальт-терапія
- c. Арт-терапія
- d. Кататимно-імагінативна психотерапія

е. Психодрама

267. Який напрям психотерапії описує принцип "тут і зараз"?

а. Психоаналіз

б. Арт-терапія

с. Кататимно-імагінативна психотерапія

д. Гештальт-терапія

е. Психодрама

268. Який психотерапевтичний метод є найбільш ефективним для реабілітації людей, які пережили тра

а. Арт-терапія

б. Експозиційна терапія

с. Групова підтримуюча терапія

д. Нейропсихологічний тренінг

е. Діалектична поведінкова терапія

269. Який психотерапевтичний метод є найбільш ефективним для реабілітації людей, які пережили тра

а. Групова підтримуюча терапія

б. Експозиційна терапія

с. Арт-терапія

д. Нейропсихологічний тренінг

е. Діалектична поведінкова терапія

270. Який психотерапевтичний підхід є найефективнішим для полегшення прийняття втрати та адапта

а. Експозиційна терапія

б. Психодинамічна терапія

с. Групова терапія для осіб із фізичними ушкодженнями

д. Когнітивно-поведінкова терапія

е. Майндфулнес та релаксаційні техніки

271. Який психотерапевтичний підхід є найефективнішим для полегшення прийняття втрати та адапта

а. Психодинамічна терапія

б. Когнітивно-поведінкова терапія

с. Групова терапія для осіб із фізичними ушкодженнями

д. Експозиційна терапія

е. Майндфулнес та релаксаційні техніки

272. Який розділ загальної профілактики займається розробленням і впровадженням у практику заходів

а. Психогігієна

б. Психопрофілактика

с. Психотерапія

д. Психіатрія

е. Психологічне консультування

273. Який розділ загальної профілактики займається розробленням і впровадженням у практику заходів

а. Психіатрія

б. Психологічне консультування

с. Психопрофілактика

д. Психогігієна

е. Психотерапія

274. Який тест із нижченаведених використовується для оцінки симптомів посттравматичного стресу?

а. PCL-5

б. HADS

с. PHQ-9

д. MADRS

е. GAD-7

275. Який тест із нижченаведених використовується для оцінки симптомів посттравматичного стресу?

а. MADRS

б. GAD-7

с. PHQ-9

д. HADS

е. PCL-5

276. Який тип методів найдоцільніше застосувати під час встановлення діагнозу шестирічній дитині з п

- a. Анкетування
- b. Експериментальні
- c. Скринінгові
- d. Проєктивні
- e. Генетико-моделюючі

277. Який тип методів найдоцільніше застосувати під час встановлення діагнозу шестирічній дитині з п

- a. Експериментальні
- b. Генетико-моделюючі
- c. Проєктивні
- d. Анкетування
- e. Скринінгові

278. Який із нижченаведених лікарських засобів належить до групи антипсихотиків, та може використо

- a. Кветіапін
- b. Клозапін
- c. Міртазапін
- d. Галоперидол
- e. Вальпроат

279. Який із нижченаведених лікарських засобів належить до групи антипсихотиків, та може використо

- a. Вальпроат
- b. Міртазапін
- c. Клозапін
- d. Кветіапін
- e. Галоперидол

280. Який із нижченаведених методів є найефективнішим у відновленні когнітивних функцій та покращ

- a. Рефлексотерапія
- b. Гештальт-терапія
- c. Нейропсихологічний тренінг
- d. Медикаментозна терапія
- e. Арт-терапія

281. Який із нижченаведених методів є найефективнішим у відновленні когнітивних функцій та покращ

- a. Рефлексотерапія
- b. Гештальт-терапія
- c. Медикаментозна терапія
- d. Нейропсихологічний тренінг
- e. Арт-терапія

282. Який із нижченаведених напрямів психотерапії використовує рольові техніки та аналіз несвідомих

- a. Гештальт-терапія
- b. Поведінкова психотерапія
- c. Емоційно-фокусована психотерапія
- d. Сімейна психотерапія
- e. Психодинамічна психотерапія

283. Який із нижченаведених напрямів психотерапії використовує рольові техніки та аналіз несвідомих

- a. Гештальт-терапія
- b. Сімейна психотерапія
- c. Психодинамічна психотерапія
- d. Поведінкова психотерапія
- e. Емоційно-фокусована психотерапія

284. Яким основним типам медичних працівників загрожує синдром емоційного вигорання?

- a. Демонстративному, гіпертимному та збудливому
- b. Педантичному, демонстративному та емотивному
- c. Педантичному, демонстративному та збудливому
- d. Педантичному, гіпертимному та збудливому
- e. Демонстративному, гіпертимному та емотивному

285. Яким основним типам медичних працівників загрожує синдром емоційного вигорання?

- a. Педантичному, демонстративному та збудливому
- b. Педантичному, демонстративному та емотивному**
- c. Демонстративному, гіпертимному та емотивному
- d. Демонстративному, гіпертимному та збудливому
- e. Педантичному, гіпертимному та збудливому

286. Якому віку, згідно з психоаналітичною теорією З.Фрейда, відповідає латентна стадія психосексуал

- a. 1-2 роки
- b. 2-3 роки
- c. 7-8 років
- d. 3-5 років
- e. 5-6 років**

287. Якому віку, згідно з психоаналітичною теорією З.Фрейда, відповідає латентна стадія психосексуал

- a. 7-8 років
- b. 2-3 роки
- c. 5-6 років**
- d. 1-2 роки
- e. 3-5 років

288. Яку допомогу необхідно надати людині, що перебуває у стані гострої реакції на стрес?

- a. Увести розчин діазепаму внутрішньом'язово
- b. Шпиталізувати до психіатричного стаціонару
- c. Першу психологічну допомогу**
- d. Провести дебрифінг
- e. Провести сеанс когнітивно-поведінкової терапії

289. Яку допомогу необхідно надати людині, що перебуває у стані гострої реакції на стрес?

- a. Увести розчин діазепаму внутрішньом'язово
- b. Шпиталізувати до психіатричного стаціонару
- c. Першу психологічну допомогу**
- d. Провести сеанс когнітивно-поведінкової терапії
- e. Провести дебрифінг

290. Яку екстрену фармакотерапію рекомендовано при панічних атаках?

- a. Кветіапін 25 мг per os
- b. Корвалол 40 крапель per os
- c. Пропранолол 20 мг сублінгвально**
- d. Амітриптилін 2,0 мл в/в
- e. Пароксетин 20 мг per os

291. Яку екстрену фармакотерапію рекомендовано при панічних атаках?

- a. Корвалол 40 крапель per os
- b. Кветіапін 25 мг per os
- c. Пароксетин 20 мг per os
- d. Пропранолол 20 мг сублінгвально**
- e. Амітриптилін 2,0 мл в/в

292. Які препарати потрібно призначити насамперед як доповнення до немедикаментозних методів лік

- a. Антидепресанти, до 14-ти днів
- b. Седативні на ніч щоденно
- c. Снодійні, переважно небензодіазепінові на постійній основі
- d. Снодійні, переважно небензодіазепінові, коротким курсом**
- e. Снодійні, похідні бензодіазепіну, коротким курсом

293. Які препарати потрібно призначити насамперед як доповнення до немедикаментозних методів лік

- a. Снодійні, похідні бензодіазепіну, коротким курсом
- b. Снодійні, переважно небензодіазепінові, коротким курсом**
- c. Седативні на ніч щоденно
- d. Снодійні, переважно небензодіазепінові на постійній основі
- e. Антидепресанти, до 14-ти днів

294. Які симптоми належать до фази резистентності синдрому емоційного вигорання?

- a. Емоційна відстороненість та особистісна відстороненість

b. Емоційний дефіцит, психовегетативні та психосоматичні порушення

c. Редукція професійних обов'язків та емоційно-моральна дезадаптація

d. Переживання психотравмуючих подій, незадоволеність собою

e. Відчуття "загнаності до клітки", тривога та депресія

295. Які симптоми належать до фази резистентності синдрому емоційного вигорання?

a. Емоційний дефіцит, психовегетативні та психосоматичні порушення

b. Емоційна відстороненість та особистісна відстороненість

c. Редукція професійних обов'язків та емоційно-моральна дезадаптація

d. Відчуття "загнаності до клітки", тривога та депресія

e. Переживання психотравмуючих подій, незадоволеність собою

296. Які фундаментальні аспекти психотерапії ПТСР?

a. Зниження тривоги та встановлення особистості

b. Когнітивна корекція автоматичних думок та переконань щодо себе та своєї поведінки

c. Відтворення індивідуальних та фізичних якостей

d. Сприймання навколишнього середовища та себе в ньому

e. Підняття самовпевненості та самооцінки

297. Які фундаментальні аспекти психотерапії ПТСР?

a. Відтворення індивідуальних та фізичних якостей

b. Зниження тривоги та встановлення особистості

c. Сприймання навколишнього середовища та себе в ньому

d. Підняття самовпевненості та самооцінки

e. Когнітивна корекція автоматичних думок та переконань щодо себе та своєї поведінки

298. Які чинники зменшують вплив травматичної події на людину?

a. Активна поведінка

b. Сприйняття того, що сталося, як несправедливості

c. Фізична перевтома

d. Відсутність соціальної підтримки

e. Пасивність у прийнятті рішень

299. Які чинники зменшують вплив травматичної події на людину?

a. Пасивність у прийнятті рішень

b. Сприйняття того, що сталося, як несправедливості

c. Активна поведінка

d. Фізична перевтома

e. Відсутність соціальної підтримки