

1. В гинекологическое отделение госпитализирована больная с жалобами на боли внизу живота, повышение температуры до 38°C, гнойно-сукровичные выделения из половых путей. Эти симптомы появились 3 дня назад после введения ВМС. Определить приоритетную проблему пациентки

a. Боль внизу живота

b. Температура

c. Зуд во влагалище

d. Слабость

e. Патологические бели

2. У 40-летней пациентки с эрозией шейки матки при биопсии обнаружены атипичные клетки. Что необходимо сделать медсестре в первую очередь?

a. Провести влагалищную ванночку

b. Взять мазок на гп

c. Оформить карту „Д” учёта

d. Провести спринцевание

e. Ввести тампон с лекарственным веществом

3. Додатковий метод дослідження при підозрі на злюкісну пухлину:

a. Пельвіоскопічний

b. Бактеріологічний

c. Гістологічний

d. Амніоскопічний

e. Гістероскопічний

4. Скільки разів на рік виконують онкопрофігляд:

a. 4 рази

b. 3 рази

c. 2 рази

d. 1 раз

e. 5 разів

5. Виберіть інструмент для виконання біопсії шийки матки:

a. Затискач Кохера

b. Пінцет

c. Конхотом

d. Кюретка

e. Все необхідне

6. В медпункт обратилась женщина с жалобами на зуд наружных половых органов и влагалища. Мутные творожистые выделения. В браке не состоит. Последние месячные 2 недели назад. Каков предположительный диагноз?

a. Кандидоз

b. Гонорея

c. Пельвиоперитонит

d. Острый эндометрит

e. Трихомонадный кольпит

7. К школьной медсестре обратилась старшеклассница для консультации по поводу контрацепции. Что ей можно посоветовать?

a. Спермициды

b. МЛА

c. ВМС

d. Гормональную контрацепцию

e. Презервативы

8. Что является границей между наружными и внутренними половыми органами женщины?

a. Большие половые губы

**b. Девственная пleva**

- c. Вульва
- d. Малые половые губы
- e. Наружный зев матки

**9. Кольпоскопия – это метод, позволяющий прицельно осмотреть:**

- a. Толстый кишечник

**b. Влагалищную часть шейки матки и стенки влагалища**

- c. Органы брюшной полости
- d. Слизистую оболочку полости матки
- e. Органы малого таза

**10. Врач попросил медсестру подготовить инструменты для искусственного прерывания беременности в малом сроке. Какой инструмент медсестра должна включить в набор?**

**a. Расширители Гегара**

- b. Конхотом
- c. Ножницы
- d. Ложечку Фолькмана
- e. Скальпель

**11. Медсестра готовит набор инструментов для диагностического выскабливания полости матки. Какой метод стерилизации она должна выбрать?**

- a. Однократное кипячение 60 мин
- b. Стерилизация в 96% растворе этилового спирта
- c. Автоклавирование 1,5 атм. 20 минут
- d. В сухожаровом шкафу 180°C в течение 1 часа**
- e. Стерилизация парами формалина

**12. Сколько зевов имеет шейка матки?**

- a. 2 зева**
- b. 6 зевов
- c. 1 зев
- d. 3 зева
- e. 4 зева

**13. При наружном акушерском исследовании установлено, что спинка плода обращена к левой стороне матки. Укажите позицию плода**

- a. Вторая
- b. Первая**
- c. Правая
- d. Пердняя
- e. Левая

**14. Сальпингоофорит – это воспаление**

- a. Влагалища
- b. Яичников
- c. Мочевого пузыря
- d. Печени
- e. Придатков матки**

**15. В гинекологическом отделении находится пациентка с диагнозом киста левого яичника, у которой возникла острая боль внизу живота . Укажите тактику медицинской сестры**

- a. Ввести обезболивающий препарат
- b. Региональная криотерапия
- c. Тепло на низ живота
- d. Поставить очистительную клизму
- e. Сообщить врачу**

**16. В гинекологическое отделение на машине скорой медицинской помощи доставлена**

пациентка Т., 72 года, с профузным кровотечением из половых путей, обусловленным раком шейки матки. Окажите неотложную медицинскую помощь

a. Введение метилэргофрина в/в

b. Регионарная криотерапия

c. Прижатие брюшной аорты

d. Введение тампона с эфиром

e. Тугая тампонада влагалища

17. Вы медсестра женской консультации. Как определить срок предстоящих родов, зная дату последней менструации?

a. К первому дню последней менструации прибавить 3 месяца и отнять 10 дней

b. От первого дня последней менструации отнять 3 месяца и прибавить 7 дней

c. От первого дня последней менструации отнять 280 дней

d. К первому дню последней менструации прибавить 8 месяцев

e. От первого дня последней менструации отнять 3 месяца