

1. Дівчині віком 15 років лікар-стоматолог встановив попередній діагноз: локалізований пародонтит. Який інструмент треба застосувати для вимірювання глибини пародонтальних кишень?

- a. Кюрета Gracey
- b. Гудзиковий зонд
- c. Пародонтологічний зонд**
- d. Пародонтологічний ніж
- e. Ендодонтичну лінійку

2. До лікаря-стоматолога звернулася чотирнадцятирічна дівчина зі скаргами на сильний тривалий біль у ділянці зуба верхньої щелепи ліворуч. Діагностовано гострий дифузний пульпіт зуба 26. Який метод лікування найдоцільніше застосувати?

- a. Вітальну пульпектомію**
- b. Девітальну пульпектомію
- c. Девітальну пульпотомію
- d. Вітальну пульпотомію
- e. Біологічний метод

3. Дворічна дівчинка перебуває на лікуванні з приводу гострого герпетичного стоматиту важкої форми. Період згасання хвороби. Якими лікарськими засобами для місцевого оброблення слизової оболонки порожнини рота треба доповнити арсенал препаратів саме в цей період?

- a. Протеолітичними ферментами
- b. Антисептиками
- c. Кератопластичними**
- d. Противірусними
- e. Знеболювальними

4. Під час проведення припасовки каркаса металокерамічного мостоподібного протеза виявлено, що каркас контактує із зубами-антагоністами в положенні ЦО, доходить до уступів на опорних зубах, має товщину 0,3 мм. Яка тактика лікаря-стоматолога в цьому разі?

- a. Отримати відбиток зі встановленим каркасом
- b. Допрепарувати опорні зуби, зняти робочий відбиток**
- c. Зішліфувати металевий каркас у ділянках контакту із зубами-антагоністами
- d. Відправити каркас на наступний лабораторний етап
- e. Визначити ділянки, що заважають накладанню мостоподібного протеза

5. Лікар-стоматолог-ортодонт проводить пацієнту з дистальною оклюзією клінічний тест за Ешлером-Бітнером для диференціальної діагностики. Виявлено поліпшення форми та профілю обличчя. Яка це форма дистальної оклюзії згідно з цими результатами тесту?

- a. Надмірний розвиток нижньої щелепи
- b. Недостатній розвиток верхньої щелепи
- c. Недостатній розвиток нижньої щелепи**
- d. Надмірний розвиток верхньої щелепи
- e. Порушення росту та розвитку обох щелеп

6. У семирічного хлопчика діагностовано загострення хронічного гранулюючого періодонтиту зуба 75. Коронка зуба 75 зруйнована на 3/4. Під час обстеження дитина поводити себе спокійно та відповідала на запитання. Хлопчик соматично здоровий. Виберіть доцільний метод знеболювання для видалення зуба в цьому разі.

- a. Аплікаційна анестезія
- b. Внутрішньовенний наркоз
- c. Масковий наркоз
- d. Провідникова анестезія**
- e. Інфільтраційна анестезія

7. Жінка віком 54 роки скаржиться на наявність новоутворення на нижній губі, що з'явилося 6 місяців тому та протягом останніх 20-ти днів почало різко збільшуватися в розмірах. Об'єктивно спостерігається: на червоній облямівці нижньої губи вузол округлої форми сіро-червоного

кольору, який дещо виступає над прилеглими тканинами, відмежований, з лійкоподібним вдавленням посередині, заповненим роговими масами. Під час пальпації утворення щільне, рухоме, безболісне. Який діагноз найімовірніший?

- a. Хейліт Манганотті
- b. Лейкоплакія бородавчата
- c. Бородавчастий передрак
- d. Папілома
- e. Кератоакантома**

8. Батьки восьмирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта для профілактичного огляду дитини. Об'єктивно спостерігається: нижня губа виступає, форма верхнього зубного ряду трапецієвидна, нижнього - відповідає нормі. Між верхніми та нижніми передніми зубами сагітальна щілина 2 мм, перші постійні моляри змикаються за III класом Енгля. Який апарат треба застосувати для лікування патології прикусу в цьому разі?

- a. Пропульсор Мюлемана
- b. Брекет-систему
- c. Пластинку Шонхера
- d. Регулятор функції Френкля III типу**
- e. Регулятор функції Френкля I типу

9. Під час профілактичного огляду тринадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив застійну гіперемію ясенного краю у фронтальній ділянці верхньої та нижньої щелеп. Відмічається кровоточивість ясен під час чищення зубів. КРВ=1. Зубні пасти з яким вмістом доцільно рекомендувати пацієнту для індивідуальної гігієни порожнини рота?

- a. Екстракти трав**
- b. Натрію фторида
- c. Сполук кальцію
- d. Амінофторидів
- e. Сольових добавок

10. Чоловік віком 45 років звернувся до лікаря-стоматолога для протезування. Об'єктивно спостерігається: відсутні зуби 46, 47, 48, беззубий альвеолярний відросток значно атрофований. Зуби-антагоністи інтактні, з добре вираженими горбами. Прийнято рішення про виготовлення металокерамічних коронок з опорою на внутрішньокісткові імплантати. Що дозволить запобігти оклюзійному перевантаженню імплантатів?

- a. Зменшення висоти коронок
- b. Зменшення ширини коронок**
- c. Виведення коронок із прикусу
- d. Зменшення висоти горбів зубів-антагоністів
- e. Поглиблення фісур на коронках

11. Батьки трирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на естетичний дефект. З анамнезу відомо, що дитина має звичку смоктати язик. Під час огляду виявлено вертикальну щілину у фронтальній ділянці розміром 5 мм. Який ортодонтичний апарат показано для лікування цієї патології?

- a. Диск Фріеля
- b. Пластинка Шонхера
- c. Активатор Дасса
- d. Пластинка Крауса**
- e. Пластинка Кербітца

12. Пацієнт віком 29 років через два дні після видалення зуба 46 скаржиться на ниючий біль у ділянці альвеоли видаленого зуба. Об'єктивно спостерігається: гіперемія та набряк слизової оболонки в ділянці альвеоли, кров'яний згусток відсутній, лунка частково заповнена залишками їжі. Який попередній діагноз?

- a. Неврит альвеолярного нерва
- b. Гострий серозний альвеоліт**
- c. Хронічний обмежений остеомієліт

- d. Гострий гнійно-некротичний альвеоліт
- e. Гострий гнійний альвеоліт

13. Чоловік віком 55 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами підвищену чутливість зубів під час вживання кислої, холодної або твердої їжі. Об'єктивно спостерігається: висота коронок зубів зменшена на 1/3, оклюзійні поверхні зубів мають плоску форму із загостреними краями емалі та оголенням щільного блискучого дентину. Який імовірний діагноз?

- a. Ерозія твердих тканин зубів
- b. Системна гіоплазія емалі
- c. Клиноподібні дефекти
- d. Гіперестезія
- e. Патологічна стертість зубів

14. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на набряк та кровоточивість ясен під час чищення зубів протягом останніх пів року. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи набрякла, має ціанотичне забарвлення. Ясенні сосочки округлої форми, пастозні, збільшені в розмірах та перекривають коронкові частини зубів на 1/3 висоти. Відзначається вестибулярне положення зубів 13 і 23. Який попередній діагноз?

- a. Хронічний катаральний гінгівіт
- b. Локалізований пародонтит I ступеня
- c. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт
- d. Гострий катаральний гінгівіт
- e. Генералізований пародонтит I ступеня

15. У пацієнта діагностовано односторонній лінійний перелом у ділянці кута нижньої щелепи. Проведено іммобілізацію шляхом накладення двощелепної назубної дротяної шини із зачіпними петлями та міжщелепною еластичною тягою. Загоєння відбувалося без ускладнень. Через який проміжок часу треба зняти шини?

- a. 10 днів
- b. 7 днів
- c. 1 місяць
- d. 2 тижні
- e. 3 тижні

16. Дванадцятирічну дівчинку шпиталізовано через травмування під час падіння з висоти. Після обстеження встановлено діагноз: забійно-рвана рана щоки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. До яких пошкоджень належить ця травма?

- a. Поєднані
- b. Комбіновані
- c. Поодинокі
- d. Множинні
- e. Ізольовані

17. Шестирічній дівчинці проводиться лікування гострого дифузного пульпіту зуба 85 методом вітальної екстирпації пульпи. Матеріал якої групи найдоцільніше використати в цьому разі для постійної obturaції кореневих каналів?

- a. Паста на основі гідроксиду кальцію
- b. Цинк-евгенольні паста
- c. Склоіономерні цементи
- d. Паста на основі епоксидної смоли з гутаперчевими штифтами
- e. Цинк-фосфатні цементи

18. Пацієнту віком 54 роки планується виготовлення бюгельного протеза для верхньої щелепи. Робочий відбиток знято силіконовим, а допоміжний - альгінатним відбитковим матеріалом. Скільки моделей треба відлити для виготовлення одного бюгельного протеза?

- a. Одну робочу модель
- b. Дві робочі та дві допоміжні
- c. Дві робочі та одну допоміжну

- d. Одну робочу та одну допоміжну
- e. Одну робочу та дві допоміжні

19. Восьмирічний хлопчик 4 доби тому вдома вдарився підборіддям. Після травми з'явилася припухлість у цій ділянці, а через 2 доби посилився біль та підвищилася температура тіла. Об'єктивно спостерігається: у ділянці підпідборіддя значний набряк тканин, шкіра над ним гіперемована, ціанотична, під час пальпації виявлено болісний, щільний інфільтрат з ділянкою розм'якшення. Прикус не порушений, відкривання рота необмежене. Температура тіла  $37,5^{\circ}\text{C}$ ) Установіть попередній діагноз.

- a. Перелом нижньої щелепи
- b. Посттравматичний набряк тканин підпідборідної ділянки
- c. Нагноєна гематома підпідборідної ділянки**
- d. Гематома підпідборідної ділянки
- e. Запальний інфільтрат тканин підпідборідної ділянки

20. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на появу в дитини болісних висипань на губах та відмову від вживання їжі, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ . Під час огляду на шкірі навколоротової ділянки виявлено до 10-ти дрібних пухирців з прозорим вмістом. На слизовій оболонці губ спостерігається декілька ерозій округлої форми, діаметром 1-3 мм. Визначаються гострий катаральний гінгівіт та підщелепний лімфаденіт. Виберіть засоби для етіотропного лікування.

- a. Протизапальні
- b. Протівірусні**
- c. Протигрибкові
- d. Антибіотики
- e. Антигістамінні

21. Чоловік віком 50 років скаржиться на новоутворення в лівій половині лобної ділянки, що з'явилося 2 місяці тому та повільно збільшується. Новоутворення щільно-еластичне, має округлу форму, рухоме, безболісне. Шкіра над ним у кольорі не змінена, на поверхні визначається крапкова втягнутість, з якої виділяються білуваті маси з неприємним запахом. Установіть попередній діагноз.

- a. Кератоакантома
- b. Атерома**
- c. Екзофітна форма раку шкіри
- d. Ліпома
- e. Фіброма

22. У десятирічного хлопчика в пунктаті шийних лімфатичних вузлів виявлено клітини Пирогова-Лангханса. Який з нижченаведених діагнозів підтверджується цим клітинним складом пунктату?

- a. Актиномікоз
- b. Хронічний неспецифічний лімфаденіт
- c. Лімфогранулематоз
- d. Сифіліс
- e. Туберкульозний лімфаденіт**

23. Дівчинці, яка народилася з частковою розщелиною піднебіння, показано виготовлення obturatora. Який оптимальний вік дитини для виготовлення obturatora в разі розщелини піднебіння?

- a. 3-4 роки
- b. 5-6 років
- c. 1 рік
- d. Перші дні після народження**
- e. 2 роки

24. Жінка віком 36 років скаржиться на відчуття печіння, болісність та кровоточивість ясен. Об'єктивно спостерігається: ясна верхньої та нижньої щелеп набряклі, яскраво гіперемовані,

кровоточать під час зондування. Наявні пародонтальні кишені глибиною до 4 мм із серозно-гнійним ексудатом. Патологічна рухомість зубів I ступеня. На рентгенограмі виявлено нерівномірну резорбцію міжальвеолярних перегородок до 1/2 їх висоти з явищами дифузного остеопору губчастої речовини. Укажіть ступінь та перебіг генералізованого пародонтиту в пацієнтки.

- a. I ступінь, загострений перебіг
- b. II ступінь, хронічний перебіг
- c. III ступінь, хронічний перебіг
- d. II ступінь, загострений перебіг**
- e. I ступінь, хронічний перебіг

25. Семирічному хлопчику показано проведення вестибулопластики на нижній щелепі. До якої патології найчастіше призводить мілкий присінок порожнини рота?

- a. Затримка росту щелепи
- b. Парафункція м'язів
- c. Захворювання тканин пародонта**
- d. Глибокий прикус
- e. Тісне розташування фронтальних зубів

26. У жінки віком 45 років під час рентгенологічного обстеження перед протезуванням через відсутність зубів 24, 25 виявлено деструкцію кісткової тканини невеликих розмірів із чіткими контурами в апікальній ділянці кореня зуба 23. Кореневий канал зуба 23 запломбований на 2/3 довжини негомogenous пломбувальним матеріалом, постійна композитна пломба без дефектів. Перкусія зуба безболісна, слизова оболонка альвеолярного відростка цієї ділянки звичайного кольору. Яка тактика лікаря-стоматолога щодо зуба 23?

- a. Видалити зуб
- b. Провести повторне рентгенологічне обстеження через 6 місяців
- c. Провести повторне ендодонтичне лікування**
- d. Провести курс фізіотерапії
- e. Зробити резекцію верхівки кореня

27. Після проведеного обстеження пацієнту віком 34 роки встановлено діагноз синдром Мелькерсона-Розенталя. Який симптомокомплекс характерний для цього синдрому?

- a. Складчастий язик, атопічний хейліт та неврит трійчастого нерва
- b. Зуби Гетчінсона, вроджена глухота, вроджена сліпота
- c. Макрохейліт, складчастий язик та парез лицевого нерва**
- d. Ромбоподібний глосит, екзематозний хейліт та парез лицевого нерва
- e. Червоний плоский лишай, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет

28. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на періодичну появу нориці на яснах у ділянці проєкції кореня зуба 11 та неприємні відчуття в зубі. Раніше зуб лікували з приводу хронічного періодонтиту. Двічі проводилося переліковування кореневого каналу зуба, але позитивний результат не був досягнутий. На прицільній рентгенограмі зуба 11 виявлено: кореневий канал запломбований на всю довжину, у ділянці його верхівки спостерігається вогнище рентгенологічного просвітління розмірами до 0,8 см. Який метод лікування доцільно застосувати в цьому разі?

- a. Спостереження упродовж року
- b. Видалення
- c. Резекцію верхівки кореня**
- d. Реплантацію
- e. Повторне ендодонтичне лікування

29. Чоловік віком 43 роки під час видалення зуба поскаржився на різкий головний біль, запаморочення, нудоту, миготіння перед очима, відчуття жару, тремтіння в усьому тілі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, гіперемія шкіри шиї та обличчя, тахікардія, АТ - 190/110 мм рт. ст. Який невідкладний стан, ймовірно, розвинувся в пацієнта?

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Інфаркт міокарда

**с. Гіпертонічний криз**

- d. Напад стенокардії
- е. Анафілактичний шок

30. Хлопець віком 21 рік звернувся до лікаря-стоматолога-ортодонта зі скаргами на значну вираженість підборідної складки. Об'єктивно спостерігається: зменшена нижня третина обличчя, значно виражена підборідна складка. Під час внутрішньоротового огляду виявлено відсутність контактів між фронтальними зубами в положенні центральної оклюзії, сагітальна щілина 4 мм, передньо-щічний горбик першого верхнього моляра змикається з одноіменним горбиком першого нижнього моляра. Для якої патології характерні ці ознаки?

a. Глибокого прикуса

**b. Дистальної оклюзії**

- с. Мезіальної оклюзії
- d. Перехресного прикуса
- е. Відкритого прикуса

31. Жінка віком 39 років скаржиться на загальне нездужання, головний біль, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , біль у порожнині рота. Подібний стан виникає періодично, частіше в осінньо-весняний період. Об'єктивно спостерігається: на різко гіперемованій та набряклій слизовій оболонці щік, губ та м'якого піднебіння - еритематозні плями, пухирці, що розкрилися, та ерозії, укриті фібринозним нальотом. Симптом Нікольського негативний. Гіперсалівація. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, рухомі, злегка болісні під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

a. Червоний плоский лишай, ерозивно-виразкова форма

**b. Багатоформна ексудативна еритема**

- с. Хронічний рецидивний герпес
- d. Вульгарна пухирчатка
- е. Хронічний рецидивний афтозний стоматит

32. На прийом до лікаря-стоматолога-хірурга звернувся пацієнт, якому показано видалення зуба. Для виконання цієї маніпуляції лікар вибрав S-подібні щипці без шипів на щічках. Який зуб буде видаляти лікар?

- a. 17
- b. 41
- с. 34
- d. 26

**е. 14**

33. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,2^{\circ}\text{C}$ , біль у порожнині рота під час уживання їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота, що з'явилися три дні тому. Об'єктивно спостерігається: ясенний край верхньої та нижньої щелеп набряклий, гіперемований, вкритий брудно-сірим нальотом, місцями з ерозіями, різкоболісний та легко кровоточить від дотику. Яку групу лікарських препаратів треба насамперед застосувати під час місцевого лікування захворювання?

- a. Антисептики
- b. Ферменти

**с. Знеболювальні**

- d. Кератопластики
- е. Протизапальні

34. У чотирнадцятирічної дівчини під час огляду лікар-стоматолог виявив глибоку каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 16, що сполучається з пульповою камерою. Зондування сполучення та перкусія зуба безболісні. Реакція на температурні подразники відсутня. Слизова оболонка ясен у ділянці зуба 16 без змін. На рентгенограмі зуба 16 спостерігається деформація періодонтальної щілини у вигляді її нерівномірного розширення. Виберіть, з нижченаведених, оптимальний матеріал для постійної obturaції кореневих каналів зуба 16.

**a. Гутаперча із силером**

b. Препарат на основі мінералтріоксидагегату

- c. Паста на основі цинку оксиду та евгенолу
- d. Паста на основі гідроксиду кальцію
- e. Препарат на основі фенолу

35. Пацієнту віком 65 років виготовляють повні знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Виявлено виражене прогенічне співвідношення щелеп. Якими будуть особливості постановки зубів у цих протезах?

- a. Зуби фронтальної частини ставлять на приточці
- b. Верхню зубну дугу скорочують на два моляри
- c. Верхню зубну дугу скорочують на два премолари**
- d. Нижню зубну дугу скорочують на два моляри
- e. Нижню зубну дугу скорочують на два премолари

36. Чоловіку віком 82 роки показано виготовлення повного знімного пластинкового протеза на нижню щелепу. Наявна незначна атрофія альвеолярного відростка. На етапі припасування індивідуальної ложки за методикою Гербста вона скидається під час доторкання кінчиком язика до лівої щоки при напівзакритому роті. Назвіть ділянку, на якій треба вкоротити край ложки.

- a. Уздовж щелепно-під'язикової лінії з лівого боку
- b. Від ікла до ікла з вестибулярного боку
- c. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки праворуч**
- d. Біля вуздечки язика
- e. На відстані 1 см від середньої лінії на під'язиковому краї ложки ліворуч

37. Юнака шпиталізовано після ДТП із травмою м'яких тканин правої привушно-жувальної ділянки. У пацієнта не закривається праве око, опущений кут рота праворуч. Ушкодження якої анатомічної структури призвело до появи цих симптомів?

- a. Мімічних м'язів
- b. Лицевого нерва**
- c. Вивідної протоки привушної слинної залози
- d. Капсули привушної слинної залози
- e. Паренхіми привушної слинної залози

38. Чоловік віком 29 років скаржиться на біль у порожнині рота, неможливість вживання їжі, підвищення температури тіла до 38°C. З анамнезу відомо, що декілька днів тому в пацієнта було гостре харчове отруєння. Об'єктивно спостерігається: колір обличчя блідий, гіперсалівація, на слизовій оболонці губ, щік, ясен, дна порожнини рота наявні різко болісні виразки, укриті брудно-сірим нальотом. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, болючі під час пальпації. Який імовірний діагноз?

- a. Акантолітична пухирчатка
- b. Міліарно-виразковий туберкульоз
- c. Виразково-некротичний стоматит Венсана**
- d. Багатоформна ексудативна еритема
- e. Стоматит Сеттона

39. Під час ендодонтичного лікування зуба 26 з приводу хронічного гранулюючого періодонтиту лікар-стоматолог провів іригацію кореневих каналів антисептиком, що має здатність проникати в структури біоплівки, руйнувати їх та викликати розчинення органічних тканин. Який антисептик застосував лікар?

- a. Розчин гіпохлориту натрію**
- b. Фізіологічний розчин
- c. Розчин хлоргексидину
- d. Розчин фурациліну
- e. Розчин перекису водню

40. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 30 років зі скаргами на наявність порожнини в зубі верхньої щелепи праворуч. Під час огляду на жувальній поверхні зуба 16 виявлено каріозну порожнину з широким вхідним отвором у межах навколопульпарного дентину.



Каріозна порожнина не сполучається з пульповою камерою зуба, виповнена щільним пігментованим дентином. Зондування дна та стінок каріозної порожнини, термопроба та перкусія безболісні. ЕОД - 12 мкА. Який імовірний діагноз?

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Глибоке неактивне ураження карієсом**
- c. Середнє неактивне ураження карієсом
- d. Хронічний гангренозний пульпіт
- e. Хронічний фіброзний періодонтит

41. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль та хрускіт у ділянці СНЩС під час рухів нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, під час відкривання рота нижня щелепа незначно зміщується ліворуч. Зубні ряди збережені. Для встановлення діагнозу планується проведення рентгенологічного обстеження СНЩС. Який вид рентгенологічного обстеження буде найінформативнішим?

- a. Рентгенографія за методом Парма
- b. Телерентгенографія
- c. Комп'ютерна томографія СНЩС**
- d. Ортопантомографія
- e. Рентгенографія за методом Шюллера

42. Восьмирічній дівчинці після обстеження встановлено діагноз тортоаномалія латеральних різців верхньої щелепи з дефіцитом місця в зубній дузі через макродентію зубів. Для профілактики вестибулярного положення іклів проведено серійне видалення зубів за Hots. Яка правильна послідовність видалення зубів?

- a. Перші молочні моляри, молочні ікла, перші премоляри
- b. Молочні ікла, перші молочні моляри, перші премоляри**
- c. Другі різці, молочні ікла та перші молочні моляри
- d. Перші молочні моляри, молочні ікла, другі премоляри
- e. Перші молочні моляри, перші премоляри, молочні ікла

43. Пацієнтці віком 35 років виготовляють незнімний металокерамічний мостоподібний протез. Одержано двохарові відбитки С-силіконовим матеріалом "Спідекс". Відбитки відправлені на знезараження. Який антисептичний розчин треба застосувати для їх оброблення?

- a. 0,5%-й розчин гіпохлориту натрію**
- b. 0,5%-й розчин перекису водню
- c. 70%-й розчин спирту
- d. 1,5%-й розчин двовуглекислої соди
- e. 3%-й розчин хлораміну

44. До лікаря-стоматолога-хірурга звернувся чоловік віком 44 роки для встановлення зубних імплантатів. Планується проведення двоетапної імплантації в ділянці відсутніх зубів 15, 16, 17. За який мінімальний термін відбувається повна остеointegraція імплантатів на верхній щелепі?

- a. 2 місяці
- b. 3 місяці
- c. 12 місяців
- d. 6 місяців**
- e. 9 місяців

45. Чоловік віком 52 роки скаржиться на неприємні відчуття під час ковтання, появу ерозій на слизовій оболонці порожнини рота. З анамнезу відомо: перші симптоми захворювання виникли понад місяць тому. Об'єктивно спостерігається: ерозії яскраво-червоного кольору з уривками пухирів на незмінній слизовій оболонці м'якого піднебіння, щік та ясен. Слизова оболонка легко відшаровується. Симптом Нікольського позитивний. Які препарати необхідно призначити для лікування насамперед?

- a. Протеолітичні ферменти
- b. Нестероїдні протизапальні засоби
- c. Протигрибкові засоби
- d. Кортикостероїди**



е. Антибіотики

46. Батьки дванадцятирічного хлопчика скаржаться на наявність білих плям на передніх зубах верхньої щелепи в дитини, що з'явилися пів року тому, чутливість зубів від хімічних подразників. Під час огляду на вестибулярних поверхнях у пришийкових ділянках зубів 13, 12, 11, 21, 22, 23 виявлено крейдоподібні плями, емаль над якими втратила блиск, шорстка під час зондування. Яким буде попередній діагноз?

**а. Початкове активне ураження карієсом**

- б. Середнє активне ураження карієсом
- с. Флюороз зубів
- д. Початкове неактивне ураження карієсом
- е. Системна гіоплазія емалі

47. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога з тримісячним хлопчиком масою тіла 3400 г (під час народження 2850 г), у якого спостерігається вроджене повне незрощення верхньої губи. Цілісність альвеолярного відростка та піднебіння збережені. Дитина народилася від другої вагітності. Пологи були затяжними, накладалися акушерські щипці. У родині чоловіка були подібні вади. Укажіть імовірну причину народження хворого хлопчика.

- а. Гіпотрофія новонародженого
- б. Друга вагітність
- с. Вік матері
- д. Травма під час пологів

**е. Спадковість**

48. Пацієнту віком 34 роки лікар-стоматолог виготовив металокерамічну коронку на зуб 11. Препарування зуба проведено відповідно до всіх вимог. На якому етапі виготовлення проводили ретракцію ясен?

а. Після зняття відбитка

**б. Перед зняттям відбитка**

- с. Після припасування каркаса
- д. Перед припасуванням каркаса
- е. Після фіксації коронки

49. Чотирнадцятирічна дівчинка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на збільшення розміру ясенних сосочків у ділянці фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп. Під час огляду виявлено, що ясенні сосочки гіперемовані, набряклі, перекривають коронки зубів на 1/2 висоти, кровоточать від дотику. Зміни в якій системі організму найчастіше відіграють найважливішу роль в етіології цього захворювання?

- а. Центральній нервовій системі
- б. Імунній системі
- с. Травній системі

**д. Ендокринній системі**

е. Серцево-судинній системі

50. Батьки двомісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога з приводу вродженого дефекту верхньої губи в дитини. Об'єктивно спостерігається: щілиноподібний дефект тканин верхньої губи ліворуч, що проходить через всі тканини губи та на 4 мм не доходить до носового ходу. Цілісність альвеолярного відростка та твердого піднебіння збережена. Установіть діагноз.

- а. Вроджене повне лівостороннє незрощення верхньої губи
- б. Вроджене приховане лівостороннє незрощення верхньої губи
- с. Косе незрощення обличчя

**д. Вроджене неповне лівостороннє незрощення верхньої губи**

е. Вроджене неповне двостороннє незрощення верхньої губи

51. Чоловік віком 48 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на ниючий біль у ділянці зуба 48, що посилюється під час накушування, погіршення самопочуття та підвищення температури тіла до 37,5 °C. Об'єктивно спостерігається: у ретромоларній ділянці набряк та

гіперемія слизової оболонки, дистальна стінка інтактного зуба 48 вкрита слизовим каптуром, під час пальпації якого відзначається різкий біль та виділення гнійного ексудату. Який імовірний діагноз?

- a. Гострий гнійний періодонтит
- b. Гострий гнійний альвеоліт
- c. Гострий гнійний періостит
- d. Гострий гнійний перикоронарит**
- e. Флегмона піднижньощелепної ділянки

52. Батьки п'ятимісячного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на плаксивість та відмову дитини від уживання їжі, підвищення температури тіла до  $37,3^{\circ}\text{C}$ , почервоніння ясен. Під час огляду виявлено яскраво гіперемовані з ділянками ціанозу набряклі ясна фронтальної частини нижньої щелепи. Установіть найімовірнішу причину запалення ясен.

- a. Скарлатина
- b. Прорізування зубів**
- c. Гострий кандидоз
- d. Герпетична інфекція
- e. Інфекційний мононуклеоз

53. Жінка віком 27 років на третьому місяців вагітності звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на постійну кровоточивість та збільшення ясен, неприємний запах з рота. Об'єктивно спостерігається: ясна верхньої та нижньої щелепи ціанотичного кольору, набряклі, укривають коронки зубів на 1/2, під час зондування кровоточать. Яка тактика лікаря після усунення місцевих подразнювальних факторів?

- a. Фітотерапія**
- b. Глибока склерозуюча терапія
- c. Гінгівотомія
- d. Поверхнева склерозуюча терапія
- e. Електрокоагуляція ясенних сосочків

54. Мати тримісячної дівчинки скаржиться на періодичне попадання їжі в порожнину носа дитини під час годування. Під час огляду виявлено щілинний дефект в межах м'якого піднебіння. Установіть попередній діагноз.

- a. Ізольоване повне незрощення твердого та м'якого піднебіння
- b. Комбіноване незрощення піднебіння
- c. Ізольоване приховане незрощення піднебіння
- d. Ізольоване часткове незрощення твердого та м'якого піднебіння
- e. Ізольоване часткове незрощення м'якого піднебіння**

55. Чоловік віком 42 роки скаржиться на різкий біль та клацання в правому СНЩС, печіння в ділянці правого зовнішнього слухового проходу. З анамнезу відомо, що пацієнт нещодавно переніс гострий стрес. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, прикус за ортогнатичним типом. Нижня щелепа під час відкривання рота має зета-подібні рухи, з короткотривалими моментами блокування в суглобі та болем. Під час внутрішньоротової пальпації ділянок латеральних крилоподібних м'язів пацієнт відчуває біль праворуч. На томограмах патологічних змін контурів кісткових структур суглобових поверхонь не виявлено. Який імовірний діагноз?

- a. Гострий післятравматичний артрит СНЩС
- b. Нейромускулярний синдром СНЩС**
- c. Деформівний артроз СНЩС
- d. Ревматоїдний артрит СНЩС
- e. Фіброзний анкілоз СНЩС

56. У пацієнта, якому діагностовано генералізований пародонтит I ступеня тяжкості, загострений перебіг, спостерігається зниження титру секреторного IgA в ротовій рідині. Про що, найімовірніше, свідчать ці показники?

- a. Зниження рівня сенсibilізації організму
- b. Зниження захисних функцій слизової оболонки порожнини рота та несприятливий перебіг**

#### захворювання

- с. Зменшення активності запального процесу в тканинах пародонту
- d. Підвищення рівня неспецифічної резистентності організму
- e. Стабілізацію патологічного процесу

57. Під час огляду отриманого із зуботехнічної лабораторії готового повного знімного пластинкового протеза лікар-стоматолог виявив наявність характерного "мармурового" малюнка у вигляді білуватих розводів на поверхні та в товщі базисної пластмаси, з якої виготовлено протез. Яка ймовірна причина їх появи?

- a. Порушення температурного режиму полімеризації
- b. Недостатня кількість пластмасового тіста під час пакування
- c. Недостатня кількість мономера в пластмасовому тісті під час пакування**
- d. Недостатнє полірування протеза
- e. Недостатній тиск на пластмасове тісто під час полімеризації

58. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на безболісну припухлість у ділянці нижньої щелепи праворуч, що з'явилася 6 місяців тому та повільно збільшується в розмірах. Об'єктивно спостерігається: на тілі нижньої щелепи в ділянці зубів 45, 46 новоутворення розміром 2,5x1,5 см, безболісне під час пальпації, має щільну консистенцію. Шкірні покриви та слизова оболонка над ним у кольорі не змінені, рухомі. Порожнина рота санована. Зуби на нижній щелепі інтактні. Чутливість нижньої губи не змінена. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Під час рентгенологічного обстеження виявлено полікістозне утворення в ділянці тіла нижньої щелепи праворуч із чіткими межами. Який попередній діагноз?

a. Остеосаркома

**b. Амелобластома**

- с. Одонтогенна фіброма
- d. Фолікулярна кіста
- e. Одонтома

59. Пацієнтці віком 39 років показано видалення зуба 36 через руйнування його біфуркації. Коронкову частину зуба видалено разом із медіальним коренем. Дистальний корінь зуба 36 зруйнований нижче рівня ясен. Який інструмент найдоцільніше застосувати для видалення дистального кореня зуба 36?

**a. Кутовий елеватор від себе**

- b. Багнетоподібні кореневі щипці
- с. Прямий елеватор
- d. Кутовий елеватор на себе
- e. Дзьобоподібні щипці, що сходяться

60. Пацієнту віком 44 роки після комплексного обстеження лікар-стоматолог встановив діагноз: генералізований пародонтит, II ступінь, загострений перебіг. Останнім часом пацієнт спостерігає погіршення самопочуття, спрагу, сухість у порожнині рота, свербіж шкіри. Яке додаткове дослідження треба насамперед провести цьому пацієнту?

- a. Загальний розгорнутий аналіз крові
- b. Визначення вмісту вітаміну С в крові
- с. Визначення вмісту заліза в крові
- d. Імунологічне дослідження крові
- e. Визначення вмісту глюкози в крові**

61. Чоловік віком 36 років скаржиться на різкий біль у лівому СНЩС з іррадіацією у вухо, головний біль, неможливість вживання їжі, обмеження відкривання рота. Об'єктивно спостерігається: обличчя асиметричне через набряк у ділянці лівого СНЩС, відкривання рота обмежене до 15-20 мм. Біль посилюється при мінімальних рухах нижньої щелепи, пальпація суглоба викликає сильний біль. Який діагноз найімовірніший у цьому разі?

**a. Гострий артрит лівого СНЩС**

- b. Анкілоз лівого СНЩС
- с. Синдром больової дисфункції СНЩС
- d. Артроз лівого СНЩС

е. Хронічний артрит лівого СНЩС

62. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на руйнування зубів верхньої щелепи в дитини. Об'єктивно спостерігається: на жувальних поверхнях зубів 54 та 55 каріозні порожнини в межах плащового дентина, емаль та дентин у ділянках ураження розм'якшені, легко видаляються екскатором. Дитина відмовляється від препарування, її психоемоційний стан нестабільний. Який метод лікування доцільно застосувати в цьому разі?

а. Неінвазивну герметизацію

**б. ART-методику**

с. Інвазивну герметизацію

д. Ремінералізувальну терапію

е. ICON

63. Пацієнту віком 37 років діагностовано гострий остеомієліт нижньої щелепи праворуч у ділянці зубів 45, 46, 47. Під час обстеження виявлено симптом Венсана. Укажіть ознаки цього симптому.

а. Болісна перкусія причинного та сусідніх зубів

б. Наявність інфільтрату з обох боків альвеолярного відростка

с. Інтенсивний біль у ділянці причинного зуба

**д. Відчуття оніміння м'яких тканин нижньої губи та підборіддя**

е. Рухомість причинного та сусідніх зубів

64. Пацієнтці віком 55 років планується виготовлення знімних протезів на обидві щелепи з опорою на імпланти. Вибирається вид імплантації, необхідна кількість імплантатів та їх розташування. Використання якого додаткового метода дослідження дозволить здійснити це найефективніше?

а. Оклюзіографія

б. Вивчення діагностичних моделей

**с. Комп'ютерна томографія**

д. Прицільна рентгенографія

е. Ультразвукова денситометрія

65. Юнак віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на косметичний дефект переднього верхнього зуба. Під час огляду на вестибулярній поверхні зуба 22 виявлено крейдоподібну пляму. Яке з додаткових методів обстеження буде найінформативнішим у цьому разі для проведення диференційної діагностики та встановлення діагнозу?

**а. Забарвлення 2% розчином метиленового синього**

б. Люмінесцентна діагностика

с. Холодова проба

д. Рентгенографія

е. Електроодонтометрія

66. Жінка віком 62 роки скаржиться на сильний нападоподібний біль у ділянці лівої половини нижньої щелепи тривалістю 1-3 хв. Біль виникає під час розмови, умивання та дотику до шкіри. Під час рентгенологічного обстеження нижньої щелепи патологічних змін кісткової тканини не виявлено. Установіть попередній діагноз.

**а. Невралгія 3-ї гілки трійчастого нерва**

б. Гангліоніт крилопіднебінного вузла

с. Невралгія 2-ї гілки трійчастого нерва

д. Неврит 3-ї гілки трійчастого нерва

е. Неврит лицевого нерва

67. Пацієнту віком 24 роки вперше діагностовано слинокам'яну хворобу з локалізацією каменя в протоці піднижньощелепної слинної залози. Виберіть найдодільнішу тактику лікування.

а. Літотрипсія

б. Медикаментозне лікування

**с. Видалення каменя**

д. Видалення слинної залози

е. Операція марсупіалізація

68. Чотирнадцятирічний хлопчик, проводячи досліди на уроці хімії, отримав травматичний опік обличчя. Об'єктивно спостерігається: на місці пошкодження шкіра зневоднена, укрита щільним сухим струпом з чіткими межами та смугою гіперемії по периферії, струп заглиблений у шкіру. Назвіть найімовірніший травматичний агент.

а. Лужний

б. Променевий

с. Термічний

д. Сольовий

е. Кислотний

69. Жінка віком 45 років скаржиться на вивих скронево-нижньощелепного суглоба, що часто повторюється. Об'єктивно спостерігається: відсутні другі та треті моляри на обох щелепах. Діагностовано звичний вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Який метод лікування цієї пацієнтки найдоцільніший?

а. Повна іммобілізація рухів нижньої щелепи

б. Міогімнастика

с. Обмеження відкривання рота

д. Проведення фізіотерапевтичних процедур

е. Масаж

70. Пацієнту проводять ендодонтичне лікування зуба 11 через загострення хронічного пульпіту. Лікар-стоматолог провів інструментальне та медикаментозне оброблення кореневого каналу. Для пломбування каналу планується застосувати методику гарячої вертикальної конденсації гутаперчі. Виберіть інструмент для конденсації філера.

а. Плагер

б. Спредер

с. Гутаконденсор

д. К-файл

е. Коренева голка

71. Жінка віком 36 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на руйнування бічного зуба нижньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: на жувальній та мезіальній поверхнях зуба 46 глибока каріозна порожнина, міжзубний контакт порушений. Лікар планує виготовлення вкладки. До якого класу, за класифікацією Блека, належить ця порожнина?

а. IV

б. II

с. V

д. III

е. I

72. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба 46 з приводу хронічного фіброзного пульпіту. Для проходження та розширення кореневих каналів лікар обрав Step-back техніку. На першому етапі здійснено проходження кореневого каналу та визначено робочу довжину. Який наступний етап згідно з цією методикою має провести лікар?

а. Формування середньої третини кореневого каналу

б. Формування апікального упору

с. Формування верхньої третини кореневого каналу

д. Вирівнювання стінок кореневого каналу

е. Розкриття верхівкового отвору

73. Жінка віком 50 років під час протезування зубів раптово поскаржилася на задишку та відчуття "скутості" у грудній клітці. У пацієнтки спостерігається свистяче дихання з подовженим видихом та кашель. Із анамнезу відомо, що такі симптоми виникають після попереднього контакту з алергенами чи повітряними іритантами. Який невідкладний стан виник у пацієнтки?

а. Напад бронхіальної астми

- b. Хронічне обструктивне захворювання легенів, загострення
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Гостра серцева недостатність
- e. Алергічний риніт

74. Жінка віком 55 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на печіння в порожнині рота під час вживання подразнюючої їжі, відчуття шорсткості, незвичайний вигляд слизової оболонки щік. З анамнезу відомо: пацієнтка хворіє на хронічний холецистит. Об'єктивно спостерігається: у порожнині рота є штучні коронки із різномірних металів. На тлі незміненої слизової оболонки щік у ретромолярному просторі є ділянки висипання дрібних папул білястого кольору, що зроговіли і злегка підвищуються над її рівнем, утворюючи малюнок кільцеподібної форми та не знімаються під час пошкрябування. Установіть попередній діагноз.

- a. Верукозна лейкоплакія
- b. Гострий псевдомембранозний кандидоз
- c. Вторинний сифіліс
- d. Червоний плоский лишай**
- e. Червоний вовчак

75. Жінка віком 51 рік скаржиться на відчуття печіння та поколювання спинки та бічних поверхонь язика, що зникає під час їжі, але посилюється увечері, сухість у роті, спотворення смакових відчуттів. Уперше подібні відчуття з'явилися рік тому після психічної травми, з плином часу відчуття посилюються. З анамнезу відомо: пацієнтка хворіє на анацидний гастрит, цукровий діабет, погано спить. Під час огляду слизова оболонка язика блідо-рожевого кольору з незначною кількістю білуватого нальоту, без виражених патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?

- a. Десквамативний глосит
- b. Глосит Гунтера-Міллера
- c. Кандидозний глосит
- d. Гангліоніт під'язикових гангліїв
- e. Глосодинія**

76. Під час підготовки до протезування в пацієнта віком 38 років виявлено перфорацію дна пульпової камери в ділянці біфуркації коренів зуба 46. Об'єктивно спостерігається: зубний ряд безперервний, зуб 46 стійкий, пародонтальних кишень у цій ділянці не виявлено. На рентгенограмі кореневі канали зуба 46 запломбовано на всю довжину, патологічних змін у періапикальній ділянці коренів не виявлено. У ділянці біфуркації коренів зуба 46 незначна резорбція верхівки міжкореневої перегородки. Який вид зубозберігальної операції показано в цьому разі?

- a. Гемісекція
- b. Коронаро-радикулярна сепарація**
- c. Ампутація
- d. Резекція
- e. Реплантація

77. Пацієнт віком 35 років перебуває на лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії з діагнозом гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи. Для контролю якості лікування та визначення подальшої тактики планується проведення контрольного рентгенологічного обстеження. У які терміни від початку захворювання можна виявити перші ознаки деструкції кісткової тканини на рентгенограмі?

- a. Через 2-3 дні
- b. Через тиждень
- c. Через місяць
- d. До кінця 2-го тижня**
- e. Через 4-5 днів

78. Після обстеження одинадцятирічної дівчинки лікар-стоматолог-ортодонт встановив діагноз мікродентія верхніх різців. Який метод діагностики використовується для визначення пропорційності розмірів постійних різців верхньої та нижньої щелеп?

a. Tonn

b. Howes

c. Korkhauz

d. Pont

e. Gerlach

79. Пацієнта шпиталізовано із травмою обличчя після падіння з велосипеда. Об'єктивно спостерігається: у виличній та підочній ділянці ліворуч рана із помірною кровотечею, що має нерівні краї. Шкіра навколо неї гіперемована та вкрита точковими крововиливами. Яку назву має рана, що виникла під впливом вказаних чинників?

a. Розтрощена

b. Різана

c. Забійна

d. Колота

e. Рублена

80. Жінка віком 32 роки скаржиться на наявність білих та пігментованих плям на зубах. Мешкає в місцевості з вмістом фтору в питній воді - 1,7 мг/л. Установлено діагноз: флюороз, крейдно-крапчаста форма. Використання яких зубних паст показано в цьому разі?

a. Фторвмісні

b. Високоабразивні

c. Триклозанвмісні

d. Кальційфосфатвмісні

e. Що містять рослинні екстракти

81. П'ятирічній дівчинці через ранню втрату молочних других молярів були виготовлені знімні протези. Через який період часу треба їх замінити?

a. 1 рік

b. 1,5 року

c. 2,5 роки

d. 2 роки

e. 0,5 року

82. Жінці віком 68 років виготовляють повні знімні протези на обидві щелепи. Об'єктивно спостерігається: альвеолярні відростки щелеп незначно атрофовані, слизова оболонка помірно піддатлива. Отримані анатомічні відбитки. Який етап протезування буде наступним для цієї пацієнтки?

a. Отримання функціональних відбитків

b. Визначення центрального співвідношення щелеп

c. Перевірка конструкції протезів

d. Виготовлення воскових базисів з прикусними валиками

e. Виготовлення індивідуальних ложок

83. У пацієнта віком 63 роки із повною втратою зубів (верхня щелепа - II тип за Шредером, нижня щелепа - II тип за Келлером) спостерігається "стареча прогенія". Які фактори обумовлюють механізм її розвитку?

a. Базальні та альвеолярні дуги рівні за шириною на верхній та нижній щелепах

b. Базальні дуги вужчі, ніж альвеолярні на верхній та нижній щелепах

c. Базальні дуги ширші, ніж альвеолярні на верхній та нижній щелепах

d. Базальна дуга на верхній щелепі вужча, ніж альвеолярна, а базальна дуга на нижній щелепі ширша, ніж альвеолярна

e. Базальна дуга на верхній щелепі ширша, ніж альвеолярна, а базальна дуга на нижній щелепі вужча, ніж альвеолярна

84. З якою метою використовують алмазні бори з червоним маркуванням?

a. Універсальне застосування

b. Для швидкого видалення тканин зуба

c. Для попереднього полірування пломб із композиту



- d. Для фінішного полірування композитних пломб
- e. Для розкриття каріозних порожнин

85. Жінка віком 28 років скаржиться на наявність порожнини в зубі нижньої щелепи ліворуч. Об'єктивно спостерігається: дефект твердих тканин зуба 36 типу МОД, зуб вітальний. На рентгенограмі змін у періапикальних тканинах зуба 36 не виявлено. Відновлення анатомічної та функціональної цілісності зуба проводиться шляхом виготовлення вкладки непрямим методом. Під час першого відвідування лікар відпрепарував порожнину зуба. Який етап протезування має бути наступним?

- a. Відливання вкладки
- b. Відливання моделі
- c. Моделювання вкладки
- d. Отримання відбитка**
- e. Фіксація вкладки

86. Чоловік віком 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у горлі ліворуч, що посилюється під час розмови та ковтання, обмеження відкривання рота, порушення загального стану. Об'єктивно спостерігається: обличчя симетричне, різке обмеження відкривання рота та неможливість зміщення щелепи праворуч. Слизова оболонка в ділянці лівої крило-щелепної складки гіперемована, болісна. Пальпується болісний інфільтрат на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи ліворуч. Який діагноз можна припустити?

- a. Паратонзиллярний абсцес
- b. Гострий гнійний перикоронарит у ділянці зуба 38
- c. Флегмона лівого приглоткового простору
- d. Абсцес щелепно-язикового жолобка
- e. Флегмона лівого крило-щелепного простору**

87. Батьки десятирічної дівчинки звернулися до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота дитини. Під час огляду виявлено глибокі відкриті фісури зубів 14 та 24, емаль яких слабомінералізована, щільна.  $KPB + kp = 2 + 3 = 5$ . Значення індексу Green-Vermillion дорівнює 1,9. Визначте тактику лікаря-стоматолога в цьому разі.

- a. Інвазивна герметизація фісур
- b. Аплікації фторидвмісними препаратами
- c. Неінвазивна герметизація фісур**
- d. Аплікації антисептичними препаратами
- e. Профілактичне пломбування

88. Жінка віком 34 роки скаржиться на наявність темно-коричневих плям на передніх зубах верхньої щелепи. З анамнезу відомо, що плями вперше виявлені близько двох років тому. Об'єктивно спостерігається: пігментовані ділянки емалі коричневого кольору з чіткими межами на контактних поверхнях зубів 22, 23. Зондування безболісне, поверхня плям шорстка, зонд не затримується. Після висушування пустером поверхня плям втратила блиск, стала матовою. Перкусія та термодіагностика безболісні. ЕОД - 4 мкА. Який імовірний діагноз?

- a. Флюороз
- b. Середнє неактивне ураження карієсом
- c. Початкове неактивне ураження карієсом**
- d. Місцева гіоплазія емалі
- e. Тетрациклінові зуби

89. Чоловік віком 44 роки звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляду виявлено, що коронка зуба 17 повністю зруйнована. Після проведення додаткових методів обстеження встановлено діагноз хронічний гранулюючий періодонтит зуба 17. Показано видалення зуба. Яку провідникову анестезію треба застосувати в цьому разі?

- a. Інфраорбітальну та палатинальну
- b. Різцеву та інфраорбітальну
- c. Плексуальну
- d. Торусальну
- e. Туберальну та палатинальну**

90. Чоловік віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на зміну положення зуба 32 після травми та біль, що посилюється під час відкушування їжі. Об'єктивно спостерігається: набряк нижньої губи, гематома слизової оболонки в ділянці зуба 32, рухомість зуба I ступеня, невелике його зміщення в сагітальному напрямку. На рентгенограмі виявлено розширення періодонтальної щілини зуба 32. Установіть діагноз.

- a. Повний вивих зуба 32
- b. Неповний вивих зуба 32**
- c. Перелом кореня зуба 32
- d. Забій зуба 32
- e. Вбитий вивих зуба 32

91. Чоловік віком 62 роки звернувся до лікаря-стоматолога для видалення зуба 48. Під час огляду пацієнт раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: дихання та пульс повільні, голова нахилена, руки зігнуті в ліктях і зап'ястках, ноги витягнуті, щелепи стиснені. Розпочалися клонічні судоми, пінисте слиновиділення. Зіниці не реагують на світло, широкі. За 1,5 хв відбулося розслаблення м'язів. Свідомість сплутана. Який імовірний діагноз?

- a. Епілептичний напад**
- b. Напад пароксизмальної тахікардії
- c. Гостре порушення мозкового кровообігу
- d. Гіпертонічний криз
- e. Непритомність

92. Новонародженій дівчинці встановлено діагноз вроджене одностороннє повне незрощення верхньої губи з деформацією шкірно-хрящового відділу носа. Укажіть оптимальний вік дитини для оперативного лікування.

- a. 6 місяців**
- b. 10-та доба життя
- c. 12 місяців
- d. 24 місяці
- e. 18 місяців

93. Батьки чотирирічної дівчинки скаржаться на наявність дефектів на зубах верхньої щелепи в дитини. Об'єктивно спостерігається: у пришийкових ділянках вестибулярних поверхонь різців верхньої щелепи дефекти, які не перетинають емалево-дентинного сполучення та мають вигляд ділянок крейдоподібно зміненої емалі з видимим руйнуванням її структури. Під час зондування визначається шорстка, розм'якшена поверхня. Реакція на холодові подразники відсутня. Який імовірний діагноз?

- a. Глибоке активне ураження карієсом
- b. Середнє неактивне ураження карієсом
- c. Середнє активне ураження карієсом**
- d. Початкове активне ураження карієсом
- e. Початкове неактивне ураження карієсом

94. Під час огляду пацієнта віком 58 років лікар-стоматолог виявив деформацію та зменшення в розмірах язика, що має синюшно-червоний колір та щільну консистенцію. На слизовій оболонці піднебіння спостерігається гумозна інфільтрація. Установіть попередній діагноз.

- a. Третинний період сифілісу**
- b. Складчастий язик
- c. Ромбоподібний глосит
- d. Десквамативний глосит
- e. Вроджена аномалія язика

95. Жінка віком 53 роки скаржиться на стирання зубів на нижній щелепі, хрускіт у скронево-нижньощелепному суглобі, зміну рис обличчя. Об'єктивно спостерігається: висота нижньої третини обличчя знижена, носогубні складки різко виражені, кути рота опущені. Зуби 48, 47, 46, 36, 37, 38 відсутні. Зуби на нижній щелепі, що залишилися, стерті до рівня ясен. Міжальвеолярна висота 8 мм. Як правильно досягнути перебудови м'якотатичних рефлексів та необхідної висоти прикусу?

- a. Шляхом "вколочування" верхніх зубів
- b. Одномоментно назубними капами
- c. Хірургічним шляхом

**d. Поетапно назубоясненими капами**

- e. Одномоментно зубними протезами

96. Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у зубі нижньої щелепи ліворуч під час вживання солодкого, що зникає відразу після усунення подразника. Об'єктивно спостерігається: на жувальній поверхні зуба 34 каріозна порожнина з вузьким вхідним отвором, виповнена м'яким слабо пігментованим дентином. Зондування дна болісне, сполучення з пульповою камерою не визначається. Термодіагностика позитивна, короткотривала. Який імовірний діагноз?

- a. Гострий обмежений пульпіт
- b. Гострий дифузний пульпіт
- c. Хронічний фіброзний пульпіт

**d. Глибоке активне ураження карієсом**

- e. Середнє активне ураження карієсом

97. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 25 років зі скаргами на наявність поодиноких поперечних борозен на коронках деяких зубів верхньої щелепи. Дефекти було виявлено одразу після прорізування зубів. З анамнезу відомо: у дитинстві до року в пацієнта відзначалися часті ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: на середині коронкової частини зубів 16, 11, 21, 26 поодинокі горизонтальні заглиблення (перехват) у межах емалі. Борозни не забарвлюються метиленовим синім. Який імовірний діагноз?

- a. Недосконалий амелогенез
- b. Ерозія твердих тканин зуба
- c. Флюороз
- d. Гіперплазія емалі

**e. Системна гіпоплазія емалі**

98. Під час огляду дванадцятирічної дівчинки лікар-стоматолог на медіально-контактній поверхні зуба 46 виявив каріозну порожнину в межах плащового дентину, стінки та дно якої пігментовані, щільні. Реакція на температурні подразники відсутня. Препарування зуба в ділянці емалево-дентинного з'єднання болісне. КПВ+кп=2. Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал у цьому разі.

**a. Фотополімерний композит**

- b. Силікофосфатний цемент
- c. Склоіономерний цемент
- d. Амальгама
- e. Цинк-фосфатний цемент

99. Юнак віком 16 років після тренування з кікбоксингу скаржиться на біль у правій привушно-жувальній ділянці, відсутність змикання зубів, порушення мовлення та жування. Об'єктивно спостерігається: підборіддя зміщене ліворуч, рот напіввідкритий, бічні рухи нижньої щелепи обмежені, з правого боку попереду від козелка вуха – западання м'яких тканин. Установіть попередній діагноз.

- a. Перелом правого суглобового відростка нижньої щелепи
- b. Лівобічний задній вивих нижньої щелепи

**c. Правобічний передній вивих нижньої щелепи**

- d. Правобічний задній вивих нижньої щелепи
- e. Лівобічний передній вивих нижньої щелепи

100. У тринадцятирічного хлопчика під час лікування глибокого активного ураження карієсом зуба 25 на етапі препарування лікар-стоматолог випадково перфорував пульпову камеру в проекції рога пульпи. Яка подальша тактика лікаря-стоматолога?

- a. Застосувати девіталізувальну пасту
- b. Провести вітальну екстирпацію пульпи
- c. Запломбувати каріозну порожнину склоіономерним цементом

**d. Застосувати матеріал групи МТА**

е. Провести діатермокоагуляцію пульпи

101. Пацієнта шпиталізовано до відділення щелепно-лицевої хірургії з діагнозом: травматичний відкритий правосторонній ментальний перелом нижньої щелепи зі зміщенням відламків. Укажіть напрямок типового зміщення великого відламка.

**a. Донизу та в бік перелому**

b. Вгору та в бік перелому

c. Донизу та назовні

d. Тільки в бік перелому

е. Вгору та назовні

102. Жінка віком 65 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність слабкоболісної виразки на слизовій оболонці язика, що виникла два-три тижні тому. З анамнезу відомо: у пацієнтки хронічна недостатність кровообігу. Об'єктивно спостерігається: на бічній поверхні язика неглибока виразка діаметром до 1 см, укрита сіро-білим нальотом. Колір навколишньої слизової оболонки без змін. Під час пальпації виразка м'яка, помірно болісна. Порожнина рота санована. Який вид виразки, ймовірно, виявлено в цьому разі?

a. Декубітальна

b. Ракова

**c. Трофічна**

d. Туберкульозна

е. Сифілітична

103. Чоловік віком 42 роки скаржиться на періодичний біль у ділянці зуба 48. Об'єктивно спостерігається: зуб 48 частково прорізався своїми дистальними горбиками, слизова оболонка блідо-рожева, безболісна під час пальпації, відкривання рота в повному обсязі. На рентгенограмі визначається медіально-косе положення зуба 48 до зуба 47. Виберіть хірургічний метод лікування.

**a. Атипове видалення зуба 48**

b. Коронаро-радикулярна сепарація

c. Розтин каптура

d. Типове видалення зуба 48

е. Висічення каптура

104. Під час огляду десятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив повернуті навколо осі центральні різці нижньої щелепи. Яка це аномалія?

a. Супраоклюзія

**b. Тортооклюзія**

c. Інфраоклюзія

d. Ретенція

е. Транспозиція

105. До лікаря-стоматолога звернулася жінка віком 24 роки в терміні вагітності 22 тижні зі скаргами на гострий біль у ділянці зуба 38. Алергологічний анамнез не обтяжений. Об'єктивно спостерігається: коронка зуба 38 зруйнована на 2/3, перкусія різко болісна. Показано видалення зуба. Який анестетик із нижченаведених є препаратом вибору для вагітних пацієнток?

a. Бупівакаїн

b. Мепівакаїн

c. Новокаїн

**d. Артикаїн**

е. Лідокаїн

106. Пацієнту віком 26 років лікар-стоматолог встановив діагноз: середнє неактивне ураження карієсом зуба 24. Який метод знеболювання найдоцільніше застосувати під час лікування в цьому разі?

a. Інгаляційний наркоз

**b. Інфільтраційну анестезію**

- c. Провідникову анестезію
- d. Неінгаляційний наркоз
- e. Аплікаційну анестезію

107. Дворічна дівчинка отримала травму зубів. Об'єктивно спостерігається: коронки зубів 51 та 61 коротші від сусідніх на 1/3, слизова оболонка в ділянці цих зубів гіперемована, набрякла. На рентгенограмі періодонтальна щілина в апікальній частині коренів зубів 51 і 61 відсутня. Яка лікувальна тактика буде оптимальною в цьому разі?

- a. Видалення зубів 51, 61
- b. Лігатурне шинування
- c. Репозиція зубів 51 і 61

**d. Диспансерне спостереження**

- e. Реплантація

108. У пацієнта з вогнепальним пораненням обличчя, розривом тканин піднебіння та глотки нарастає дихальна недостатність. Під час дихання звисаючий клапот з рани частково, а іноді й повністю, закриває вхід у гортань. Розвиток якого виду асфіксії можна припустити в цьому разі?

- a. Обтураційної

**b. Клапанної**

- c. Дислокаційної
- d. Стенотичної
- e. Аспіраційної

109. Чоловік віком 32 роки скаржиться на біль та важкість у правій половині обличчя, закладеність носа та густі виділення з правої половини носа, біль у зубах верхньої щелепи праворуч, підвищення температури тіла до 38<sup>o</sup>C. Об'єктивно спостерігається: передня поверхня верхньої щелепи праворуч набрякла, болісна під час пальпації. У порожнині рота виявлено зруйнований зуб 15, перкусія якого болісна. На рентгенограмі виявлено ділянку деструкції кісткової тканини з нечіткими контурами біля верхівки кореня зуба 15 та затемнення гайморової пазухи праворуч. Який імовірний діагноз?

**a. Гострий гнійний одонтогенний гайморит**

- b. Загострення хронічного періодонтиту
- c. Хронічний гранулюючий періодонтит
- d. Гострий гнійний періостит верхньої щелепи
- e. Гострий риногенний гайморит

110. Шестирічній дівчинці показано видалення нижніх молочних центральних різців з приводу зміни прикусу. Зуби рухомі III-го ступеня. Виберіть оптимальний вид місцевого знеболювання.

- a. Інфільтраційне
- b. Провідникове
- c. Інгаляційний наркоз
- d. Внутрішньокісткове

**e. Аплікаційне**

111. У чотирнадцятирічного хлопчика двобічний перелом нижньої щелепи в ділянці ментальних отворів. На тлі перелому нарастає клініка порушення дихання. Яка причина розвитку асфіксії?

**a. Зміщення кореня язика з фрагментом нижньої щелепи дозад**

- b. Наявність сторонніх тіл у порожнині рота
- c. Набряк слизової оболонки порожнини рота
- d. Рясне слиновиділення
- e. Формування гематоми дна порожнини рота

112. Жінка віком 25 років скаржиться на гострі тривалі напади болю в ділянці нижньої щелепи праворуч, що провокуються різними подразниками. Біль виникає також самовільно вночі, іррадіює у праве вухо. Після клінічного обстеження встановлено діагноз гострий дифузний пульпіт зуба 46. Який найпоширеніший шлях проникнення інфекції в пульпу?

- a. Гематогенне інфікування через верхівку кореня зуба
- b. Через дельтоподібні відгалуження кореневого каналу
- c. Ретроградно через апікальний отвір

**d. З каріозної порожнини по дентинних канальцях**

- e. Лімфогенне інфікування через верхівку кореня зуба

113. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на появу болісних висипань на губах. Об'єктивно спостерігається: червона облямівка губ набрякла, гіперемована, укрита тріщинками та численними кров'янистими кірками. На шкірі навколо губ наявні дрібні пухирці з серозним вмістом, що в окремих ділянках зливаються між собою. Спостерігається мацерація та мокнуття шкіри, особливо в кутах рота. Який тип хейліту розвинувся в пацієнтки?

- a. Метеорологічний
- b. Актинічний
- c. Атопічний
- d. Ексфоліативний

**e. Екзематозний**

114. Чоловік віком 56 років скаржиться на біль та припухлість у лівій щічній ділянці, прогресування асиметрії обличчя, яку помітив два місяці тому. Об'єктивно спостерігається: парез м'язів обличчя ліворуч, горбистий інфільтрат без чітких меж у лівій привушно-жувальній ділянці, шкіра над ним стоншена, ціанотичного кольору. Пальпуються збільшені регіонарні лімфовузли з лівого боку. Відкривання рота обмежене до 2,5 см. З протоки лівої привушної залози слина не виділяється. Який попередній діагноз?

- a. Кіста привушної залози
- b. Аденокарцинома**
- c. Хронічний сіалоаденіт
- d. Гострий неепідемічний паротит
- e. Хронічний лімфаденіт

115. У трирічної дівчинки на жувальній поверхні зуба 74 лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину, що розташована в межах плащового дентину. Підриті краї емалі мають матово-білий колір. Дентин каріозної порожнини світлий, м'який, знімається пластинами. Зондування емалево-дентинної межі чутливе. Реакція на холодний подразник болісна, швидко минає після його усунення. Який матеріал доцільно використати для пломбування каріозної порожнини в цьому разі?

- a. ICON
- b. Композитний пломбувальний матеріал
- c. Цинкфосфатний цемент
- d. Амальгаму

**e. Склоіономерний цемент**

116. Пацієнту із частковою відсутністю зубів на верхній щелепі, I клас за Кеннеді, виготовляють бюгельний протез із кламерною фіксацією. Провели зняття відбитків, відлили моделі, визначили та зафіксували центральне співвідношення щелеп. Який лабораторний етап має бути наступним?

- a. Отримання вогнетривкої моделі
- b. Встановлення ливникової системи

**c. Вивчення робочої моделі в паралелометрі**

- d. Дублювання моделі
- e. Розкреслення каркасу протеза

117. Чоловіку віком 75 років виготовляють повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. На етапі перевірки воскової конструкції протеза зі штучними зубами в порожнині рота визначається контакт між бічними зубами та відсутність його на передніх зубах. Якої помилки припустилися в цьому разі?

- a. Помилка під час постановки зубів
- b. Відсутність контакту між прикусними валиками в бічних ділянках
- c. Відсутність контакту між прикусними валиками у фронтальній ділянці

d. Деформація робочої моделі

e. Фіксація передньої оклюзії

118. Пацієнт віком 65 років під час видалення зуба поскаржився на різку слабкість, сильний розпирюючий за грудничний біль, що іррадіює під ліву лопатку. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, ціаноз губ, АТ - 90/60 мм рт. ст., тони серця ритмічні, ослаблені, пульс ниткоподібний. Після триразового прийому нітрогліцерину біль не зменшився. Який стан, імовірно, розвивається в пацієнта?

a. Інфаркт міокарда

b. Напад стенокардії

c. Колапс

d. Кардіогенна форма анафілактичного шоку

e. Гіпертонічний криз

119. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час уживання їжі, неприємний запах з рота, загальну слабкість, головний біль та підвищення температури тіла до  $37,5^{\circ}\text{C}$ , що турбують протягом двох днів. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен верхньої та нижньої щелепи набрякла, яскраво гіперемована, болісна та легко кровоточить від дотику. Ясенні сосочки вкриті нальотом брудно-сірого кольору, після видалення якого залишається ерозована поверхня. Прикус глибокий. Відзначається значне нашарування м'якого зубного нальоту. Регіонарні лімфатичні вузли дещо збільшені, болісні під час пальпації. Установіть клінічний діагноз.

a. Гострий виразковий гінгівіт

b. Генералізований пародонтит

c. Хронічний гіпертрофічний гінгівіт

d. Гострий катаральний гінгівіт

e. Хронічний катаральний гінгівіт

120. Батьки п'ятирічної дівчинки скаржаться на різке підвищення температури тіла в дитини до  $39^{\circ}\text{C}$ , слабкість, біль у горлі, відмову від їжі, висип на тілі. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка порожнини рота суха, язик яскраво-червоного кольору з набряклими сосочками, слизова оболонка мигдаликів, піднебінних дужок та м'якого піднебіння різко гіперемована. Визначається підщелепний лімфаденіт. На шкірі обличчя та шиї, крім носогубного трикутника, виявлено яскраво-червоний дрібний висип, що місцями зливається. Установіть попередній діагноз.

a. Кір

b. Інфекційний мононуклеоз

c. Гострий псевдомембранозний кандидоз

d. Скарлатина

e. Дифтерія

121. Дев'ятирічному хлопчику встановлено діагноз повний вивих зуба 21. З анамнезу відомо: після травми минуло 20 год, дитина хворіє на цукровий діабет. Виберіть доцільну лікувальну тактику.

a. Пломбування кореневого каналу амальгамою, реплантація, фіксація зуба

b. Зуб не підлягає реплантації та збереженню

c. Пломбування кореневого каналу пастою, що містить кальцій, реплантація, фіксація зуба

d. Реплантація, фіксація зуба з наступним спостереженням

e. Резекція верхівки кореня, реплантація, фіксація зуба

122. Пацієнту віком 20 років з початковим активним ураженням карієсом зуба 22 лікар-стоматолог планує провести курс ремінералізувальної терапії. Які препарати найчастіше для цього використовуються?

a. Хлору та натрію

b. Калію та фосфору

c. Кальцію та фтору

d. Магнію та калію

e. Фтору та стронцію



123. Пацієнту планується ендодонтичне лікування зуба 21 через загострення хронічного пульпіту. Лікар-стоматолог вибирає інструменти для лікування. Для чого використовують спредер?

- a. Визначення прохідності кореневих каналів
- b. Видалення пульпи з кореневих каналів
- c. Пломбування кореневих каналів**
- d. Визначення довжини кореневих каналів
- e. Розширення кореневих каналів

124. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль у роті під час їжі, що турбує декілька днів. Об'єктивно спостерігається: на слизовій оболонці перехідної складки у фронтальній ділянці нижньої щелепи дві ерозії овальної форми з облямовкою гіперемії, укриті жовтуватим нальотом, розміром 5 і 7 мм. З анамнезу відомо, що подібні ерозії були рік тому. Який імовірний діагноз?

- a. Афти Сетона
- b. Синдром Бехчета
- c. Афти Беднара
- d. Хронічний рецидивний афтозний стоматит**
- e. Гострий герпетичний стоматит

125. Чоловік віком 47 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність на нижній губі безболісного пухлиноподібного розростання, що з'явилося місяць тому. Об'єктивно спостерігається: на тлі візуально незміненої червоної облямовки нижньої губи утворення до 6 мм у діаметрі та висотою 3 мм, з горбистою поверхнею синюшно-червоного кольору, зверху вкрите сіруватими лусочками. Пальпаторно утворення безболісне, помірно-щільної консистенції, без інфільтрату в основі та по периферії. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Який попередній діагноз?

- a. Бородавчастий передрак червоної облямовки**
- b. Рак нижньої губи
- c. Кератоакантома
- d. Обмежений передраковий гіперкератоз
- e. Піогенна гранульома

126. У дванадцятирічного хлопчика в ділянці зуба 46 виникає тривалий ниючий біль після вживання гарячої їжі. Об'єктивно спостерігається: коронка зуба 46 брудно-сірого кольору з глибокою каріозною порожниною, виповнена розм'якшеним дентином та сполучається з пульповою камерою зуба. Глибоке зондування каріозної порожнини болісне. Тепловий подразник викликає біль, що повільно вщухає. Який діагноз найімовірніший?

- a. Хронічний фіброзний пульпіт
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит
- c. Хронічний глибокий карієс
- d. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- e. Хронічний гангренозний пульпіт**

127. Лікар-стоматолог-ортопед, який має стаж роботи 7 років 6 місяців, відповідно до професійного стандарту, одержав I кваліфікаційну категорію. Яким має бути стаж роботи згідно із затвердженими нормативами для наступної атестації?

- a. 9 років
- b. 12 років
- c. 15 років
- d. 10 років**
- e. 8 років

128. Чоловік віком 26 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на асиметрію обличчя, що виникла через болісну припухлість у лівій привушній ділянці 3 дні тому, підвищення температури тіла до  $37,2^{\circ}\text{C}$ . З анамнезу відомо: два тижні тому пацієнт переніс ГРЗ. Об'єктивно спостерігається: у лівій привушно-жувальній ділянці щільний округлий малорухомий помірно болісний інфільтрат діаметром до 2 см. З протоки привушної слинної залози виділяється прозора слина. Установіть попередній діагноз.

- a. Хвороба Мікуліча
- b. Гострий гнійний паротит
- c. Плеоморфна аденома привушної залози
- d. Загострення хронічного паротиту
- e. Псевдопаротит Герценберга**

129. Який кут бічного суглобового шляху встановлено в середньоанатомічному артикуляторі?

- a.  $40^{\circ}$
- b.  $23^{\circ}$
- c.  $17^{\circ}$**
- d.  $33^{\circ}$
- e.  $110^{\circ}$

130. Пацієнту віком 58 років з дефектом нижнього зубного ряду лікар-стоматолог виготовляє бюгельний протез. Під час планування конструкції кламерів їх жорсткі елементи розташували в зоні між оклюзійною поверхнею та межовою лінією опорного зуба. У якій зоні має розміщуватися опорна частина опорно-утримувального кламера?

- a. Гінгівальній
- b. Оклюзійній**
- c. Ретенційній
- d. Нейтральній
- e. Клапанній

131. У чоловіка віком 32 роки після травмування в ДТП спостерігається обмеження відкривання рота, відчуття оніміння шкіри в підочній ділянці ліворуч, верхньої губи та крила носа, біль у лівій виличній ділянці, що посилюється під час відкривання рота. Пальпаторно визначається симптом "сходінки" по вилицево-щелепному з лівого боку. Який попередній діагноз?

- a. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор II
- b. Перелом виличної дуги
- c. Перелом верхньої щелепи за Ле Фор III
- d. Перелом виличної кістки зі зміщенням**
- e. Перелом виличної кістки без зміщення

132. Батьки десятирічного хлопчика скаржаться на незначну деформацію в ділянках кутів нижньої щелепи в дитини та нічні больові напади, що спостерігаються кілька місяців. Під час огляду виявлено асиметрію обличчя через збільшення об'єму кістки в ділянці кутів нижньої щелепи. Утворення пальпаторно щільні, горбисті, безболісні. На рентгенограмі визначається нерівномірне витончення кортикального шару з просвітленнями кулястої та овальної форми, що нагадують бджолині стільники, розділені щільними кістковими перетинками, відсутність чітких меж зі здорової кісткою. Який попередній діагноз?

- a. Одонтома
- b. Остеосаркома
- c. Фіброзна дисплазія**
- d. Остеїд-остеома
- e. Амелобластома

133. Чотирнадцятирічний хлопець скаржиться на біль у горлі, нежить, підвищення температури тіла до  $38-39^{\circ}\text{C}$ , що спостерігається протягом 5-ти днів. Під час обстеження виявлено ознаки катарального стоматиту, тонзиліту, фарингіту, збільшення лімфатичних вузлів уздовж грудино-ключично-соскоподібного м'яза у вигляді ланцюга, які під час пальпації рухомі та малоболісні. Піднебінні мигдалики різко гіперемовані, укриті нальотом, що легко знімається. Який попередній діагноз?

- a. Скарлатина
- b. Інфекційний моноклеоз**
- c. Дифтерія
- d. Герпетична ангіна
- e. Гострий кандидозний стоматит

134. У дівчини віком 16 років лікар-стоматолог виявив ділянки емалі білого кольору, що втратили природний блиск у пришийкових ділянках зубів 11 та 21. Поверхня емалі під час зондування гладенька, щільна. Термодіагностика негативна. Пошкоджені ділянки забарвлюються 2%-м водним розчином метиленового синього. Для лікування планується застосувати метод інфільтрації. Виберіть матеріал для виконання цієї методики.

a. Гідроксидкальційвмісна паста

**b. ICON**

c. Компомер

d. Склоіономерний цемент

e. Розчин нітрату срібла

135. Чоловік віком 49 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на самовільний, нападоподібний, іррадіюючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч, що періодично виникає протягом останнього року. Напади болю виникають спонтанно, іноді під час нахилу голови, тривають 20-30 хв. Об'єктивно спостерігається: генералізована патологічна стертість зубів I-II ступеня. На жувальній поверхні зуба 46 велика композитна пломба. На рентгенограмі в пульповій камері зуба 46 виявлено щільне утворення розміром 3 мм. Перкусія та термопроба слабопозитивна. ЕОД - 35 мкА. Який імовірний діагноз?

a. Хронічний глибокий карієс

b. Гострий обмежений пульпіт

c. Хронічний фіброзний періодонтит

**d. Хронічний конкрементозний пульпіт**

e. Невралгія III гілки трійчастого нерва

136. Пацієнту віком 57 років із відсутністю бічних зубів на верхній щелепі виготовляють частковий знімний пластинковий протез. Прикус за ортогнатичним типом. На яку висоту з піднебінного боку базис протезу має перекривати коронки фронтальних зубів?

a. На 2/3 висоти коронок

**b. На 1/3 висоти коронок**

c. На всю висоту коронок

d. На 1/2 висоти коронок

e. До рівня шийок

137. Батьки одинадцятирічного хлопчика звернулися до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль та кровоточивість ясен під час їжі в дитини, неприємний запах з рота, підвищення температури тіла до 37,4<sup>o</sup>C. З анамнезу відомо: нещодавно хлопчик перехворів ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен яскраво гіперемована, легко кровоточить від дотику, верхівки ясенних сосочків укриті сіруватим некротичним нальотом, після видалення якого оголюється виразкова поверхня. Велика кількість зубного нальоту. Який імовірний збудник цього захворювання?

a. Вірус герпесу

b. Стафілококи

**c. Анаеробна мікрофлора**

d. Стрептококи

e. Дріжджоподібні гриби

138. Жінка віком 69 років скаржиться на сухість, відчуття печіння в порожнині рота, що турбують декілька тижнів. З анамнезу відомо: протягом останніх двох років пацієнтка користується знімними пластинковими протезами. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка твердого піднебіння та спинки язика яскраво-червоного кольору, гіперемована, набрякла. У межах протезного ложа визначається невелика кількість сіро-білого нальоту, що легко знімається. У кутах рота - тріщинки. Які лікарські засоби використовуються для етіотропного лікування цього захворювання?

**a. Протигрибкові**

b. Противірусні

c. Антигістамінні

d. Антибіотики

е. Антипротозойні

139. До лікаря-стоматолога звернувся чоловік віком 30 років зі скаргами на припухлість у ділянці верхньої губи. З анамнезу відомо: останні три дні турбував сильний біль у передньому верхньому зубі, що посилювався під час накушування. Об'єктивно спостерігається: асиметрія обличчя через набряк верхньої губи, носо-губна складка ліворуч згладжена. У порожнині рота перехідна складка на рівні зубів 11, 21, 22 набрякла, гіперемована, болісна під час пальпації. На рентгенограмі виявлено ознаки деструкції кісткової тканини в ділянці верхівки кореня зуба 21 діаметром 3-4 мм, кореневий канал зуба 21 запломбований на 2/3 довжини. Діагностовано гострий гнійний періостит верхньої щелепи від зуба 21. Виберіть доцільну тактику лікування.

**а. Повторне ендодонтичне лікування зуба 21, періостеотомія, протизапальна терапія**

б. Видалення зубів 11, 21, 22, періостеотомія, протизапальна терапія

с. Повторне ендодонтичне лікування зуба 21, протизапальна терапія

д. Видалення зуба 21, періостеотомія

е. Видалення зуба 21, періостеотомія, протизапальна терапія

140. Пацієнту встановлено попередній діагноз: рецидивний герпетичний стоматит. Наявність яких клітин під час проведення цитологічного методу дослідження підтвердить цей діагноз?

а. Клітин Гоше

б. Клітин Тцанка

с. Атипових мононуклеарів

д. Клітин Німана-Піка

**е. Гігантських багатоядерних клітин**

141. Чоловіку віком 40 років виготовляють металокерамічний мостоподібний протез для верхньої щелепи. Пацієнт з'явився на клінічний етап припасування металевго каркаса конструкції. Який матеріал треба застосувати під час корекції, щоб досягти повного припасування каркаса до опорних зубів?

а. Масу "Ортокор"

б. Копіювальний папір

с. Базову силіконову масу

д. Базисний віск

**е. Кориговальну силіконову масу**

142. Сума поперечних розмірів яких зубів лежить в основі побудови діаграми Хаулея-Гербера-Гербста і взята за радіус АВ?

а. 31, 32, 33

б. 51, 52, 61, 62

**с. 11, 12, 13**

д. 31, 32, 41, 42

е. 11, 12, 21, 22

143. Чоловік віком 37 років скаржиться на наявність на червоній облямівці нижньої губи білястої плями. Об'єктивно спостерігається: на тлі візуально незміненої червоної облямівки нижньої губи посередині між кутом рота і серединною лінією ділянка ураження сірувато-білого кольору, неправильної (полігональної) форми, 7x4 мм, що ледь западає відносно рівня червоної облямівки. Поверхня її вкрита дрібними щільно прикріпленими лусочками. Під час пальпації не виявлено ущільнення основи ураження, а при бічній пальпації ураження відчувається поверхнєве ущільнення. Регіонарні лімфовузли - без змін. Який попередній діагноз?

а. Червоний плоский лишай

**б. Обмежений передраковий гіперкератоз**

с. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті

д. Рак нижньої губи

е. Лейкоплакія, плоска форма

144. Пацієнту планується проведення ортопедичного лікування через часткову відсутність зубів на нижній та верхній щелепах. Що використовують для переносу в артикулятор даних про положення верхньої щелепи відносно шарнірної вісі СНЩС?

**а. Лицьову дугу**

- b. Оклюдатор
- c. Паралелометр
- d. Допоміжні відбитки
- e. Прикусні шаблони

145. Жінка віком 34 роки звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на короткотривалий біль від температурних подразників у ділянці зубів 34, 35. Об'єктивно спостерігається: видимі поверхні зубів 34, 35 інтактні, контактні поверхні не вдається обстежити через щільне розташування зубів. Який із наведених нижче методів дослідження найінформативніший, якщо припускається наявність каріозних порожнин на контактних поверхнях зубів?

- a. Перкусія
- b. Зондування

**с. Рентгендіагностика**

- d. Вітальне фарбування
- e. Електроодонтодіагностика

146. Жінка віком 52 роки скаржиться на косметичні дефекти зубів, які помітила декілька років тому. Об'єктивно спостерігається: на вестибулярних поверхнях у пришийкових ділянках премолярів та різців щілоподібні дефекти в межах плащового дентину, утворені гладенькими, блискучими поверхнями. Шийки зубів оголені, ясна щільні, блідо-рожевого кольору. Зондування дефектів безболісне. Установіть діагноз.

- a. Ерозія твердих тканин зубів
- b. Патологічна стертість зубів

**с. Клиноподібний дефект**

- d. Середнє неактивне каріозне ураження
- e. Некроз твердих тканин зубів

147. Проводиться ендодонтичне лікування зуба 46 з приводу хронічного фіброзного періодонтиту. Кореневі канали вузькі, склерозовані. Який засіб доцільно використати під час розширення корневих каналів для покращення їх механічного оброблення?

- a. Амінокапронову кислоту
- b. Хлоргексидину біглюконат
- c. Гіпохлорит натрію
- d. Ортофосфорну кислоту

**е. ЕДТА**

148. Чоловік віком 31 рік скаржиться на біль у верхній щелепі та рухомість верхніх зубів праворуч. З анамнезу відомо, що періодично з'являються кров'янисті виділення з правої половини носа. Об'єктивно спостерігається: зуби верхньої щелепи з правого боку рухомі, деформація альвеолярного відростка. На рентгенограмі виявлено гомогенне затемнення правої верхньощелепної пазухи, деструкція медіальної кісткової стінки у вигляді "цукру, що тане". Який попередній діагноз?

- a. Хронічний остеомієліт верхньої щелепи
- b. Остеосаркома верхньої щелепи

**с. Рак верхньої щелепи**

- d. Специфічний верхньощелепний синусит
- e. Амелобластома верхньої щелепи

149. Чоловіка віком 43 роки шпиталізовано з приводу виробничої травми правої половини обличчя. З анамнезу відомо: пацієнт травмувався близько 3-х год тому, свідомість не втрачав. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається рана 5х3 см, неправильної форми, з нерівними краями. Якщо розвести краї рани видно нерухомі зуби. З боку порожнини рота - розрив слизової оболонки щоки. Прикус не порушено. Який вид хірургічної обробки треба провести в цьому разі?

- a. Первинну відтерміновану хірургічну обробку
- b. Вторинну хірургічну обробку
- c. Первинну пізню хірургічну обробку

d. Первинну ранню хірургічну обробку

e. -

150. Жінка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на наявність припухлості в ділянці альвеолярного відростка верхньої щелепи з лівого боку, яку виявила випадково. Відкривання рота вільне. Об'єктивно спостерігається: у ділянці альвеолярного відростка верхньої щелепи ліворуч у проєкції коренів зубів 22, 23 деформація у вигляді округлого ущільнення, безболісного під час пальпації. Зуби 22, 23, 24 інтактні. На рентгенограмі виявлено ділянку розрідження кісткової тканини з чіткими межами, розміром до 1 см у діаметрі, розташовану між коренями зубів 22 і 23, періодонтальна щілина їх збережена, корені диверговані. ЕОД у межах норми. Установіть попередній діагноз.

a. Носопіднебінна кіста

b. Цементوما

c. Фолікулярна кіста

d. Амелобластома

e. Глобуломаксилярна кіста