

1. Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта із виразковою хворобою, у якого виник "кинджальний" біль у надчеревній ділянці. Шкіра бліда, живіт дошкоподібний. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Якою має бути тактика фельдшера?

- a. Введення знеболюючих засобів
- b. Введення спазмолітичних засобів
- c. Негайна госпіталізація**
- d. Накладання грілки на епігастральну ділянку
- e. Промивання шлунка

2. Хворий 44-х років зловживає алкоголем. Перебуваючи в соматичному відділенні лікарні з приводу хронічного гепатиту, раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування і часі, в своїй особі орієнтований. Як називається такий стан?

- a. Деліріозний**
- b. Онейроїдний
- c. Аментивний
- d. Сутінковий
- e. Маніакальний

3. На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання. Пульс і артеріальний тиск не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?

- a. Клінічна смерть**
- b. Травматичний шок
- c. Агонія
- d. Колапс
- e. Передагональний стан

4. На заводі будівельних конструкцій столяр підняв дерев'яний брус вагою 60 кг. Раптово у нього з'явився біль у попереково-крижовому відділі, обмежена рухливість, викривлення. Яку допомогу повинен призначити фельдшер?

- a. Антибіотики
- b. Вітамінотерапія
- c. Фізпроцедури
- d. Знеболюючі**
- e. Зігріваючі мазі

5. При визначенні біодози кожен отвір біодозиметра опромінювали 30 секунд, одержали 4 еритемні смужки. Чому дорівнює біодоза?

- a. 3 хвилини
- b. 1 хвилина 30 секунд**
- c. 1 хвилина
- d. 30 секунд
- e. 2 хвилини

6. При черговому огляді вагітної фельдшер ФАПУ звернув увагу на збільшення маси тіла на 4 кг за 10 днів. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пreeклампсія середнього ступеня
- b. Пієлонефрит вагітних
- c. Водянка вагітних**
- d. Пreeклампсія легкого ступеня
- e. Токсикоз I половини вагітності

7. Жінка скаржиться на різкий біль у животі, запаморочення. Остання менструація 2 місяці тому. АТ- 100/60 мм рт.ст. Запідозрена перервана позаматкова вагітність. Які першочергові дії фельдшера?

- a. Ввести анальгетики
- b. Вести спостереження за жінкою
- c. Покласти холод на низ живота

d. Забезпечити венозний доступ. негайно госпіталізувати

e. Ввести спазмолітики

8. Фельдшера ШМД викликали вночі до чоловіка, в якого раптово з'явилась ядуха з утрудненим вдихом, кашель із виділенням рожевого пінистого мокротиння. Пацієнт у положенні ортопное. Дихання шумне. Ps- 100/хв., ритмічний, слабкого наповнення. Над легенями - вологі дрібнопухирчасті хрипи. Виберіть препарат, який необхідно застосувати:

a. Фероплект

b. Есенціале

c. Панангін

d. Лазикс

e. Метопролол

9. Фельдшер швидкої медичної допомоги прибув на виклик до роділлі, у якої 12 годин тому розпочались перейми. Води вилились 3 години тому. Роділля збуджена, кричить, тримається за живіт. Перейми по 50-60 секунд, матка між переймами повністю не розслаблюється. Матка має форму піщового годинника. Очікувана маса плоду 4000 г. Встановіть діагноз:

a. Загроза розриву матки

b. Гіпотонія матки

c. Розрив матки, що відбувся

d. Матка Кувелера (При значительной ретроплацентарной гематоме стенки матки пропитывается кровью (имбибиция))

e. Виворіт матки

10. Після проведення первинного патронажу відомості про дитину слід записати у таку форму:

a. № 063/О

b. № 067/О

c. № 026/О

d. № 112/О

e. № 058/О

11. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка, яка хворіє на гіпертиреоз. Після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла, тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

a. Тиреотоксичний криз

b. Напад стенокардії

c. Напад бронхіальної астми

d. Порушення мозкового кровообігу

e. Гіпертонічний криз

12. У вагітної в 32 тижні вагітності прибавка маси тіла за тиждень становить 700 г, АТ- 170/120 мм рт.ст., виражені набряки нижніх кінцівок та передньої черевної стінки. Раптово розвинувся напад судом. Яку першочергову невідкладну допомогу треба надати вагітній?

a. Ввести спазмолітичні препарати

b. Ввести еуфілін

c. Виміряти тиск

d. Ввести роторозширювач, зафіксувати язик

e. Подати кисень

13. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт, який лікувався в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. При виписці йому рекомендували дотримуватись дієти №10. Що доцільно рекомендувати пацієнту?

a. Споживати каву, какао, шоколад

b. Обмежити споживання мяса (телятина, птиця)

c. Обмежити споживання кухонної солі, рідини

d. Обмежити споживання фруктів, ягід, соків

e. Споживати тістечка, торти

14. Під час першого патронажу мати поскаржилась фельдшеру ФАПУ на збільшення і нагрудання грудних залоз у дитини, появу з них білуватого секрету. Збільшення симетричне, шкіра над грудними залозами не змінена. Загальний стан дитини не змінений. Яке найбільш доцільне втручання повинен здійснити фельдшер?

- a. Вичавити секрет
- b. Накласти стерильну суху повязку**
- c. Накласти олійний компрес
- d. Зробити масаж грудних залоз
- e. Накласти напівспиртовий компрес

15. З пацієнтом, який страждає на цукровий діабет, фельдшер здоров'я пункту проводить бесіду з питань дієтичного харчування. Що з перерахованих продуктів можна рекомендувати пацієнту?

- a. Гречана каша**
- b. Компоти
- c. Солодкий чай
- d. Кондитерські вироби
- e. Варення

16. Для промивання ран в травматологічний пункт надійшов 0,5% розчин хлоргексидину. До якої групи хімічних антисептиків він належить?

- a. Кислоти
- b. Альдегіди
- c. Детергенти**
- d. Окисники
- e. Хіноксокліни

17. При огляді дитини 7-ти років відзначається погіршення стану, підвищення температури тіла, набряк у ділянці привушної слинної залози справа. Дитина відмовляється від їжі. Про яке захворювання слід думати?

- a. Вітряна віспа
- b. Краснуха
- c. Скарлатина
- d. Паротитна інфекція**
- e. Кір

18. Через 2 тижні після перенесеної ангіни дівчинка 10-ти років поскаржилися на біль у серці, підвищену втомлюваність. Об'єктивно: блідість шкіри, задишка, тахікардія, розширення меж серця, глухість серцевих тонів. Що ви запідозрите у дитини?

- a. Ревматичний ендоміокардит**
- b. Пневмонія
- c. Гломерулонефрит
- d. Дифтерія
- e. Мала хорея

19. Фельдшер ФАПУ накриває перев'язувальний стіл. Він підготував себе до роботи, перевінив дату стерилізації бікса, приступив до техніки накривання стола. Яка його перша дія?

- a. Дві стерильні цапки з бікса прикріпити до двох верхніх шарів простирадла
- b. Відкрити бікс і перевірити зміну забарвлення індикатора**
- c. Стіл накрити стерильною клейонкою
- d. Стіл накрити стерильним простирадлом вдвоє
- e. Стіл накрити другим простирадлом в четверо

20. Фельдшера ФАПУ викликали до дитини віком 8-ми років, яка хворіє на вроджену ваду серця. Стан дитини важкий, відмічається задишка, ціаноз, клекотливе дихання, кашель, виділення пінистого мокротиння. Яке положення потрібно надати цій дитині в ліжку?

- a. На правому боці з приведеними до живота ногами
- b. Горизонтальне з повернутою набік головою**

с. Напівлежаче з підвищеним головним кінцем

- d. Горизонтальне з піднятим ніжним кінцем
- e. Колінно-ліктьове

21. У пацієнтки з гіпертонічною хворобою розвинувся гіпертонічний криз. Який препарат слід вибрати фельдшеру ФАПу для надання допомоги?

a. 25% розчин магnezії сульфату

- b. Баралгін
- c. Нітрогліцерин
- d. Преднізолон
- e. Кордіамін

22. Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржиться на серцебиття, відчуття стискання в ділянці серця, запаморочення, задишку, відчуття страху смерті. На ЕКГ - ознаки шлуночкової пароксизмальної тахікардії. Для невідкладної допомоги необхідно використати:

- a. Еуфілін
- b. Баралгін

c. Кордарон

- d. Дигоксин
- e. Ізадрин

23. До фельдшера ФАПу звернулися батьки з дитиною 6-ти років, яка скаржиться на головний біль, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: слизисті виділення з носа, гіперемія кон'юнктиви та шкірних покривів, температура 39°C. Для зниження температури тіла з фізичних методів необхідно застосувати:

a. Оксигенотерапія

b. Прохолодна клізма

- c. Гаряче пиття
- d. Лужна інгаляція
- e. Тепла грілка

24. У хворого в анамнезі рана в ділянці стопи, яка загоїлася. Через тиждень з'явилися судоми по всьому тілу, біль, утруднене ковтання. По медичну допомогу не звернувся. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

a. Правець

- b. Сепсис
- c. Флегмона
- d. Абсцес
- e. Ангіна

25. Жінку під час роботи на присадибній ділянці вжалила бджола. Об'єктивно: непритомна, шкіра її бліда, кінцівки холодні, пульс ниткоподібний, АТ- 70/30 мм рт.ст., дихання поверхневе. Фельдшер ШМД повинен почати невідкладну допомогу з введення розчину такої речовини:

a. Баралгін

b. Адреналін

- c. Промедол
- d. Анальгін
- e. Папаверин

26. На ФАП звернулася жінка, яка пошкодила вену у ділянці варикозно розширеного вузла. Виникла кровотеча, кров темного кольору. Який спосіб тимчасової зупинки кровотечі треба застосувати?

a. Накласти джгут

b. Накласти стискаючу пов'язку

- c. Провести пальцеве притиснення судини
- d. Накласти гіпс
- e. Накласти герметичну пов'язку

27. У дитини 8-ми місяців спостерігається кволість, на огляд реагує слабким плачем, шкіра зморшкувата, з сіруватим відтінком, тургор тканин знижений, толерантність до їжі різко знижена, стул нестійкий. Дефіцит маси тіла складає 41%. На яке захворювання вказують такі симптоми?

- a. Кишковий токсикоз з ексикозом
- b. Гіпервітаміноз D
- c. Гіпотрофія I ступеня
- d. Гіпотрофія III ступеня**
- e. Гіпотрофія II ступеня

28. При проведенні проби Манту у дитини 5-ти років виявлена папула 7 мм. Як оцінюється проба Манту?

- a. Негативна
- b. Віраж туберкулінової проби
- c. Гіперергічна
- d. Позитивна**
- e. Сумнівна

29. Пацієнт 55-ти років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на переймоподібний біль ниючого характеру в правому підребер'ї, нудоту, гіркоту в роті. Погіршення стану пов'язує з вживанням жирної їжі. Об'єктивно: шкіра жовтянична, язик обкладений, температура - 38,2°C, АТ- 115/60 мм рт.ст. При пальпації живота визначається позитивний симптом Грекова-Ортнера. Яке дослідження є обов'язковим при цьому захворюванні?

- a. Лапароскопія
- b. УЗД
- c. Компютерна томографія
- d. Холецистохолангіографія
- e. Дуоденальне зондування з бактеріологічним дослідженням**

30. Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму. Об'єктивно: непритомний, періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менингеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта?

- a. У горизонтальному положенні, фіксує кінцівки лонгетами
- b. У положенні сидячи
- c. У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову у бік**
- d. У горизонтальному положенні, лежачи на животі
- e. У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову у бік

31. До фельдшера ФАПУ звернулась жінка 70-ти років зі скаргами на запаморочення, шум у голові, головний біль, погіршення пам'яті. Про яке захворювання слід думати?

- a. Гостра судинна недостатність
- b. Атеросклероз судин головного мозку**
- c. Гостра серцева недостатність
- d. Ішемічна хвороба серця
- e. Гіпертонічна хвороба

32. Фельдшера викликали до чоловіка 26-ти років, який перебуває у непритомному стані. З дитинства хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: дихання шумне, із запахом ацетону. Шкіра суха, холодна на дотик. Зіниці звужені. Рс- 100/хв., ниткоподібний. Живіт здутий, черевна стінка напружена. Який найімовірніший діагноз?

- a. Уремична кома
- b. Гіперглікемічна кома**
- c. Алкогольна кома
- d. Гіпоглікемічна кома
- e. Печінкова кома

33. Фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства використані інструменти повинен занурити в дезінфекційний розчин на такий час:

a. 60 хвилин

b. 15 хвилин

c. 30 хвилин

d. 45 хвилин

e. 40 хвилин

34. Фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства для приготування 1 л 0,5% розчину хлорантоїну повинен взяти сухої речовини:

a. 15 г

b. 50 г

c. 20 г

d. 10 г

e. 5 г

35. Після інекції інсуліну у дівчинки 12-ти років змінився стан, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, раптово почались судоми. Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворій?

a. Ввести розчин інсуліну 15-20 ОД

b. Ввести в/в розчин глюкози 20%

c. Вести в/в 4% розчин бікарбонату натрію

d. Ввести в/в ізотонічний розчин натрію хлориду

e. Ввести преднізолон

36. Фельдшер ФАП у обстежує дитину на 5-й день хвороби з попереднім діагнозом ГРВІ. Стан хлопчика погіршився за рахунок посилення кашлю, нежиттю та появи плямисто-папульозного висипу спочатку за вухами, потім на шкірі тулуба і кінцівок. Яке захворювання дозволяють запідозрити ці симптоми?

a. Вітряна віспа

b. Скарлатина

c. Кіп

d. Краснуха

e. Менінгококова інфекція

37. Хворий 35-ти років після роботи на складі хімічних речовин відчув запаморочення, знизилась гострота зору, виникли блювання і спастичні болі у животі. Об'єктивно: важкий стан, зіниці різко звужені, реакція на світло відсутня, різка пітливість, виражена слинотеча і виділення великої кількості рідкого харкотиння, ЧСС- 46/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст., часте сечовипускання. Який попередній діагноз?

a. Отруєння етиловим спиртом

b. Отруєння чадним газом

c. Отруєння фосфорорганічними речовинами

d. Отруєння метиловим спиртом

e. Отруєння серцевими глікозидами

38. Постраждалий ремонтував електропроводку. Раптово виникли судомні скорочення м'язів і втрата свідомості. При огляді: у руці постраждалого затиснутий електричний провід. Що необхідно зробити фельдшеру ШМД у першу чергу?

a. Оцінити стан постраждалого

b. Викликати міліцію

c. Забезпечити прохідність дихальних шляхів

d. Припинити дію електричного струму

e. негайно приступити до серцево-легеневої реанімації

39. Пологи I, термінові. II період пологів триває 10 хвилин. Під час чергової потуги роділля зблідла. Почалося блювання. Живіт напружений, спереду і зліва ближче до дна матки з'явилося різко болюче випинання, кров'яністі виділення із пологових шляхів. Серцебиття плода 100/хв. При піхвовому дослідженні: відкриття шийки матки повне, голівка плода малим сегментом у вході в малий таз, стрілоподібний шов - у лівому косому розмірі. Встановіть діагноз:

a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

- b. Повне передлежання плаценти
- c. Загроза розриву матки
- d. Крайове передлежання плаценти
- e. Бічне передлежання плаценти

40. 10-річний хлопчик звернувся на ФАП зі скаргами на нудоту, зниження апетиту і маси тіла, поганий сон, біль у навколопупкової ділянці. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Гельмінтоз**
- c. Дизентерія
- d. Сальмонельоз
- e. Кишкова колька

41. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 35-ти років. З анамнезу відомо, що жінка страждає на цукровий діабет, має одну дитину. Дайте рекомендації щодо методу контрацепції для заміжньої жінки:

- a. Внутрішньоматкова контрацепція**
- b. Монофазна гормональна контрацепція
- c. МЛА
- d. Трифазна гормональна контрацепція
- e. Хірургічна стерилізація

42. Хлопчик 8-ми років скаржиться на почервоніння обох очей впродовж місяця, свербіж повік, виділення слизового характеру, відчуття стороннього тіла в очах. Ці самі скарги були рік тому, також весною. При обстеженні: на слизовій оболонці верхніх повік сосочки, кон'юнктива стовщена, тьмяна, оксамитна на вигляд, симптом "бруківки". Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Стафілококовий кон'юнктивіт
- b. Гонобленорея
- c. Весняний кон'юнктивіт**
- d. Скрофульозний кон'юнктивіт
- e. Кон'юнктивіт Коха-Уікса

43. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 30-ти років зі скаргами на остуду, відчуття голоду, неспокій. В анамнезі: пацієнт страждає на цукровий діабет 1-го типу. Об'єктивно: пацієнт збуджений, шкіра тепла, профузний піт, неадекватна поведінка. Рівень глюкози у крові 2,0 ммоль/л. Назвіть першочергові заходи невідкладної допомоги:

- a. Внутрішньовенне краплинне введення 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду
- b. Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 40% розчину глюкози**
- c. Підшкірне введення 40 ОД інсуліну
- d. Внутрішньовенне струминне введення 5 мл 40% розчину глюкози
- e. Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 5% розчину глюкози

44. У пацієнта, якого звільнили з-під обвалу, спостерігаються блідість шкірних покривів, ціаноз нігтів пальців ноги, вмятини на ділянках найбільшого стиснення; пульсація на нозі різко ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Ниркова недостатність
- b. Облітеруючий ендартеріїт
- c. Гангрена нижньої кінцівки
- d. Синдром тривалого стиснення**
- e. Облітеруючий атеросклероз

45. Народилася здорова доношена дитина за шкалою Апгар 8-10 балів. Коли її вперше прикладуть до грудей матері?

- a. Через 4 години
- b. Через 10-12 годин після народження
- c. Через 6-8 годин після народження
- d. Через добу після народження
- e. В перші 2 години після народження**

46. Фельдшер на ФАПі оглядає пацієнта, який стверджує, що вчора у нього був епілептичний напад. Які ознаки будуть свідчити про перенесений епілептичний напад?

- a. Сонливість
- b. Сліди від укусу на руках
- c. Подряпини на руках
- d. Сліди від прикушування язика**
- e. Рухова загальмованість

47. Лікар призначив пацієнту курс бензилпеніциліну 1 млн ОД внутрішньом'язово. Фельдшер виконав пробу на чутливість до антибіотика на передпліччі пацієнта. Через який час слід оцінювати результат проби?

- a. 15 хвилин**
- b. 1 година
- c. 40 хвилин
- d. 2 години
- e. 1,5 години

48. Фельдшер ШМД оглядає потерпілого з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею. При наданні першої допомоги провів тимчасову зупинку кровотечі за допомогою джгута, ввів потерпілому знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- a. Накладання захисної асептичної пов'язки**
- b. Надання хворому зручного положення
- c. Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
- d. Холод на місце травми
- e. Імобілізація пошкодженої кінцівки

49. Дитині 9-ти років проводиться серцево-легенева реанімація. Який показник буде свідчити про ефективність реанімаційних дій?

- a. Поява пульсу на сонній артерії**
- b. Тремор кінцівок
- c. Синюшність шкірних покривів
- d. Розширення зіниць
- e. Блідість шкіри

50. До ФАПу звернувся робітник зі скаргами на різкий біль у правій здухвинній ділянці. Біль з'явився в епігастрії, потім перемістився в здухвинну ділянку. Хворого турбує нудота, загальна слабкість. Позитивні симптоми Сітковського, Бартоме-Міхельсона. Який попередній діагноз?

- a. Ентероколіт
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гострий панкреатит
- d. Гострий апендицит**
- e. Кишкова непрохідність

51. У молодого чоловіка 20-ти років ножове поранення грудної клітки. Об'єктивно: положення вимушене, праворуч у V міжребер'ї різана рана розміром 3,0x1,0 см, з якої витікає піниста кров, а під час вдиху чути всмоктування повітря. Для попередження розвитку синдрому кардіопульмональних порушень фельдшер на місці події повинен:

- a. Накласти оклюзійну пов'язку, ввести протишокові препарати**
- b. Ушити рану, ввести знеболювальні
- c. Дренувати плевральну порожнину, ввести серцеві препарати
- d. Провести оксигенотерапію і новокаїнову блокаду
- e. Зупинити кровотечу, ввести етамзилат

52. На прийом до ФАПу звернулася першовагітна. Повідомляє, що напередодні вперше відчула ворухіння плоду. Встановіть очікуваний термін вагітності:

- a. 12 тижнів
- b. 20 тижнів**

- c. 18 тижнів
- d. 22 тижні
- e. 16 тижнів

53. Дівчинка 10-ти років звернулась до фельдшера з приводу ниючого болю у правому підребер'ї, поганого апетиту, нудоти, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, періодичне блювання. Біль посилюється після вживання жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. Під час пальпації живота печінка виступає з-під реберної дуги на 2,5 см, щільна і болісна під час пальпації. Позитивні симптоми Ортнера, Кера справа. Вкажіть найімовірніший діагноз?

- a. Гострий панкреатит
- b. Хронічний гастрит
- c. Холецистохолангіт
- d. Виразкова хвороба
- e. Глистяна інвазія

54. На спортивному майданчику під час гри у футбол підліток отримав травму нижньої кінцівки. Викликали швидку допомогу. Хлопчик плаче, скаржиться на біль у нижній третині правої гомілки, що підсилюється під час рухів. Фельдшер здійснив огляд і достовірних ознак перелому не виявив. В якості знеболювання в даному випадку можна застосувати:

- a. Міхур з льодом місцево
- b. 0,5% новокаїн внутрішньом'язово
- c. 5% анальгін внутрішньом'язово
- d. 10% аерозоль новокаїну місцево
- e. 1% морфін підшкірно

55. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: положення плода повздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Визначить місце найкращого вислуховування серцебиття плода:

- a. Ділянка пупка
- b. Справа вище пупка
- c. Зліва нижче пупка
- d. Справа нижче пупка
- e. Зліва вище пупка

56. До фельдшера здоров'я звернувся чоловік 37-ми років, який отримав травму на виробництві. Скаржиться на сильний біль в правій половині грудної клітки, який посилюється при кашлі, диханні та зміні положення тіла. При пальпації визначається біль в ділянці 3-4 ребер по середньоключичній лінії справа, патологічна рухливість та крепітація, наявні садна та крововиливи на шкірі. Який діагноз визначить фельдшер?

- a. Гемоторакс
- b. Забій грудної клітки
- c. Перелом ребер
- d. Закритий пневмоторакс
- e. Відкритий пневмоторакс

57. Фельдшером ШМД госпіталізована до гінекологічного відділення хвора 25-ти років зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5°C, болі внизу живота, гнійні виділення з піхви. Захворіла гостро через тиждень після штучного аборт. Об'єктивно: Ps- 100/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст., живіт м'який, болісний у нижніх відділах. Гінекологічний статус: матка збільшена у розмірах, м'яка, болісна, придатки без змін, склепіння вагіни вільні. Виділення з піхви значні, гноєподібні. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Гострий аднексит
- b. Гострий метроендометрит
- c. Лохіометра
- d. Пельвіоперитоніт
- e. Септицемія

58. На яку глибину необхідно здійснювати натискання грудної клітки при проведенні

непрямого масажу серця дитині 2-х років?

- a. 6 см
- b. 5 см
- c. 2 см**
- d. 3 см
- e. 4 см

59. Хвора 20-ти років знаходиться на лікуванні з приводу гострого лівобічного отиту. Їй призначили УВЧ-терапію на ділянку лівого вуха. За допомогою чого можна перевірити наявність електричного поля під час проведення процедури УВЧ-терапії?

- a. -
- b. Сантиметрова стрічка
- c. Процедурний годинник
- d. Неонова лампа**
- e. Термометр

60. Фельдшер здоров'я пункту надає медичну допомогу пацієнту 56-ти років з нападом стенокардії. Пацієнт сказав, що не переносить нітрогліцерин. Який метод найпростішої фізіотерапії можна застосувати для зняття нападу?

- a. Поставити гірчичники на ділянку серця**
- b. Прикласти грілку на ділянку серця
- c. Покласти холодний компрес на лоб
- d. Поставити банки на ділянку серця
- e. Поставити гірчичники на комірцеву зону

61. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: важкість у боці, підвищення температури, виражена задишка наростаючого характеру?

- a. Сухий плеврит
- b. Рак легень
- c. Пневмонія
- d. Бронхіт
- e. Екссудативний плеврит**

62. У дитини з раннього віку спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Для якого стану характерна така симптоматика?

- a. Ревматизм
- b. Мала хорія
- c. Вроджена вада серця**
- d. Інфекційний міокардит
- e. Вегето-судинна дистонія

63. Хворий 48-ми років порушив дієту, вжив алкоголь. Пацієнт збуджений, у нього оперізувальний біль, нудота, блювання яке не приносить полегшення. Живіт здутий, під час пальпації болючість в проекції підшлункової залози. Яка найбільш характерна клінічна ознака гострого панкреатиту наявна у хворого?

- a. Нападopodobний біль
- b. Безперервне блювання
- c. Жовтушність шкіри і склер
- d. Профузне потовиділення
- e. Оперізувальний біль**

64. У дитини 8-ми років важкий загальний стан, спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які показники аналізу крові супроводжують такий стан:

- a. Еозинофілія
- b. Зсув лейкоцитарної формули вліво
- c. Лейкемічний провал**

- d. Лейкоцитоз
- e. Пойкілоцитоз

65. До ФАПу звернулась мати з 5-річною дитиною, у якої після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, зміна кольору сечі. Сеча стала каламутна, кольору "м'ясних помийів". Об'єктивно: шкірні покриви бліді, пастозні. Відмічається підвищення артеріального тиску. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Хронічна ниркова недостатність
- b. Гостра ревматична гарячка
- c. Інфекційний мононуклеоз
- d. Пієлонефрит
- e. Гострий гломерулонефрит

66. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернулася жінка з травмою зовнішніх статевих органів - невелика гематома, яка не збільшується. Якими повинні бути першочергові дії фельдшера?

- a. Прикласти холод і госпіталізувати
- b. Ввести гемостатичні засоби
- c. Прикласти компрес
- d. Ввести знеболюючі засоби
- e. Ввести спазмолітичні засоби

67. У пацієнта 31-го року після проведення біологічної проби при переливанні крові з'явилися занепокоєння, за грудинний стискаючий біль, страх, холодний піт, блідість шкірних покривів та оперізуючий біль у поперековій ділянці. Якими повинні бути незалежні втручання фельдшера?

- a. Ввести хворому антигістамінні препарати
- b. Дати зволожений кисень пацієнту
- c. негайно припинити переливання крові та викликати лікаря
- d. негайно ввести серцево-судинні засоби
- e. негайно ввести протишокові препарати

68. Фельдшера викликали до дівчинки 1,5 років, що хворіє на ГРВІ. Вночі стан її погіршився, з'явилися осиплість голосу "гавкаючий" кашель. Яку допомогу найдоцільніше надати дитині в домашніх умовах?

- a. Обробити розчином Люголю
- b. Піднести до носа ватку, змочену розчином амоніаку
- c. Подразнювати корінь язика
- d. Провести лужну інгаляцію
- e. Провести зрошення зіву розчином фурациліну

69. Пацієнт 53-х років з хронічною недостатністю кровообігу, який лікується серцевими глікозидами, викликав ШМД з приводу втрати апетиту, нудоти, блювання, "перебоїв" у діяльності серця. Передозування якого препарату, в першу чергу, викликало погіршення самопочуття пацієнта?

- a. Дигітоксин
- b. Аспаркам
- c. Рибоксин
- d. Гіпотіазид
- e. Нітросорбід

70. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до дитини 5-ти місяців, яка хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз обличчя, настала зупинка дихання. Скільки вдихів на хвилину необхідно провести при виконанні штучного дихання "із рота до рота"?

- a. 10
- b. 15
- c. 80
- d. 25
- e. 100

71. У пацієнта скарги на різкий біль у ділянці промежини та відхідного каналу, який посилюється при дефекації, підвищення температури тіла до 38°C, лихоманку. Із анамнезу: впродовж 2-х років страждає на закрепи. Вищезазначені скарги з'явилися 2 дні тому. Стан погіршується. При огляді промежини: зліва від анального отвору гіперемія, набряк, різкий біль під час пальпації. Яку патологію запідозрив фельдшер?

- a. Нориці прямої кишки
- b. Рак прямої кишки
- c. Тріщини відхідника

d. Гострий парапроктит

- e. Аноректальний тромбоз

72. До пацієнтки 20-ти років, яка страждає на наркоманію, виїхала бригада ШМД. При огляді: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардное, брадикардія. Що терміново показано хворій?

a. ШВЛ

- b. Призначення налорфіну
- c. Форсований діурез
- d. Інфузійна терапія
- e. Оксигенотерапія

73. Які засоби порекомендує фельдшер для гігієни порожнини рота у дитини зі здоровими яснами і зубами?

- a. Лікувально-профілактичні зубні еліксири
- b. Зубний порошок
- c. Лікувально-профілактичні зубні пасти

d. Дитячі гігієнічні зубні пасти

- e. Зубочистки

74. Фельдшер прибув на виклик до вагітної, у якої щойно закінчився напад судом. Спостерігаються набряки всього тіла, АТ- 210/130 мм рт.ст, свідомість сплутана. В останній місяць жіночу консультацію не відвідувала. Який засіб потрібно застосувати для профілактики та лікування судом?

- a. Гіпотіазид

b. Магнію сульфат

- c. 5% розчин глюкози
- d. 0,9% розчин натрію хлориду
- e. Еуфілін

75. Хворого вжалила бджола. Скарги на набряк губ, повік, носа. Об'єктивно: стан середньої важкості, притомний, обличчя набрякле, очні щілини вузькі. АТ- 110/70 мм рт.ст. Рс- 70/хв. У легенях - везикулярне дихання, хрипів немає. Встановіть попередній діагноз:

- a. Сироваткова хвороба

b. Набряк Квінке

- c. Кропив'янка
- d. Анафілактичний шок
- e. Системний червоний вівчак

76. Хлопчик 14-ти років страждає на цукровий діабет. Після інекції інсуліну не прийняв їжу. Виникло відчуття голоду, зблідли шкірні покриви, вкрилися холодним потом. Яку невідкладну допомогу необхідно надати дитині?

a. Дати солодкий чай, нагодувати

- b. Ввести внутрішньовенно фізіологічний розчин
- c. Вкласти в ліжку, вкрити ковдрою
- d. Ввести внутрішньовенно 4% розчин натрію гідрокарбонату
- e. Викликати швидку допомогу

77. Фельдшера швидкої допомоги викликали до вагітної. Вагітність 40 тижнів. Скарги на переймоподібні болі внизу живота по 20 секунд через кожні 5-6 хв. Який діагноз та дії фельдшера?

a. Вагітність 40 тижнів, прелімінарний період

b. Вагітність 40 тижнів, I період пологів. Госпіталізація до стаціонару

c. Вагітність 40 тижнів, передвісники пологів

d. Вагітність 40 тижнів, II період пологів. Госпіталізація до стаціонару

e. Вагітність 40 тижнів, III період пологів. Госпіталізація до стаціонару

78. Пацієнтка 22-х років скаржиться на відсутність менструацій впродовж 7-ми місяців. Тест на вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?

a. Аменорея

b. Опсоменорея

c. Дисменорея

d. Олігоменорея

e. Альгоменорея

79. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 52-х років зі скаргами на постійний біль у надчеревній ділянці, втрату апетиту, відразу до мяса, схуднення, загальну слабкість. Шкіра землистого кольору. У лівій надключичній впадині пальпується щільний, неболючий, розміром із горошину лімфатичний вузол. Яким є найімовірніший попередній діагноз?

a. Хронічний гастрит із підвищеною секрецією шлунка

b. Хронічний гастрит зі зниженою секрецією шлунка

c. Рак шлунка

d. Хронічний панкреатит

e. Виразка шлунка

80. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, який скаржиться на кашель впродовж місяця, нічну пітливість, знижений апетит, нудоту, неприємні відчуття в ділянці серця, серцебиття. Які з названих проявів хвороби дають підставу запідозрити у хворого туберкульоз легень?

a. Неприємні відчуття в ділянці серця, серцебиття

b. Нічна пітливість, нудота, серцебиття

c. У хворого немає проявів туберкульозу легень

d. Нудота, неприємні відчуття в ділянці серця

e. Кашель впродовж місяця, нічна пітливість

81. Каретою швидкої допомоги доставлена у пологовий будинок роділля 40 тижнів. Пологової діяльності немає. Дві години тому почалася значна кровотеча, яка продовжується дотепер. Дослідження піхви: шийка згладжена, відкриття на 1 см; внутрішній зів повністю закритий губчастою тканиною, значна кровотеча. Який найбільш вірогідний діагноз?

a. Бічне передлежання плаценти

b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

c. Шийкова вагітність

d. Центральне передлежання плаценти

e. Гіпотонічна кровотеча

82. У пацієнта 47-ми років з гіпертонічною хворобою з'явилися задишка, клекочуче дихання, кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки ціанотичні, частота дихання 40/хв., над легеньми вислуховуються вологі хрипи. Якого положення необхідно надати пацієнтові з метою покращання стану?

a. Горизонтальне з піднятим головним кінцем

b. Ортопное

c. Горизонтальне з припіднятими ногами

d. Лежачи на правому боці

e. Лежачи на лівому боці

83. Дитина 3-х місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до фельдшера ФАПу із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, втрату маси тіла. Що стало найбільш імовірною причиною даного ускладнення?

a. Проста диспепсія

b. Кишковий токсикоз

с. Парентеральна диспепсія

д. Перегодовування

е. Недогодовування

84. Мати викликала фельдшера додому до дитини 5-ти років, у якої підвищилася температура тіла до 38°C, з'явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю - блювання. Щодня кашель частішає і складається із серії видихуваних поштовхів з глибоким свистячим вдихом. Напади кашлю до 10-15 разів на добу. Обличчя дитини набрякле. Крововиливи під склеру очей. Яку хворобу можна запідозрити?

а. Обструктивний бронхіт

б. Стенозуючий ларинготрахеїт

с. Бронхіальна астма

д. Пневмонія

е. Кашлюк

85. Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином перексиду водню. Чим потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

а. 0,5% розчин нашатирного спирту

б. Розчин фурациліну 1:5000

с. Дистильована вода

д. 2% розчин натрію гідрокарбонату

е. Стерильний ізотонічний розчин

86. До ФАПУ звернувся хворий 30-ти років зі скаргами на біль у правій пахвинній ділянці. Вважає себе хворим 3 роки, коли вперше помітив там випинання. Після фізичного навантаження раптово з'явився різкий біль у місці випинання. Об'єктивно: у правій пахвинній ділянці - різко болюче випинання, яке не вправляється. Яке ускладнення найбільш імовірне?

а. Защемлення пахвинної грижі

б. Перитоніт

с. Копростаз

д. Евентрація

е. Гострий апендицит

87. Фельдшер запідозрив у пацієнта двобічний гайморит. Які допоміжні методи обстеження слід провести для встановлення діагнозу?

а. Ларингоскопія

б. Отоскопія

с. Флюорографія органів грудної порожнини

д. Рентгенографія навколоносових пазух

е. Фарингоскопія

88. До фельдшера здоров'я звернулася жінка 30-ти років. В анамнезі три самовільні викидні в терміні 6 тижнів. На яке обстеження слід направити пацієнтку?

а. Кольпоскопічне

б. Медико-генетичне

с. Кольпоцитологічне

д. Бактеріоскопічне

е. Рентгенологічне

89. В МСЧ звернулася пацієнтка 36-ти років із скаргами на загальну слабкість, схуднення, серцебиття, дратівливість, тремтіння кінцівок, безсоння, відчуття "жару" в тілі, підвищену пітливість. Об'єктивно: екзофтальм. Щитоподібна залоза збільшена. ЧСС- 110/хв. Вкажіть найбільш ефективний препарат патогенетичної дії, необхідний для проведення лікування:

а. Дийодтирозин

б. Мерказоліл

с. Тироксин

д. Тиреоїдин

е. Трийодтирозин

90. Дитина 5-ти років захворіла гостро через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:

- a. Менінгококцемія
- b. Геморагічний васкуліт, шкірна форма**
- c. Кір
- d. Хвороба Верльгофа
- e. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма

91. Під час огляду хворого виявлено: набряк рогівки, спазм повік, слезотеча, світлобоязливість, зниження гостроти зору; зіниця неправильної форми, колір її змінений. Ваша думка про діагноз:

- a. Гострий напад глаукоми
- b. Гострий кон'юнктивіт
- c. Гострий іридоцикліт
- d. Гострий поверхневий кератит**
- e. Трахома

92. Хвора 23-х років звернулась на ФАП зі скаргами на інтенсивний біль у поперековій ділянці справа без іррадіації, підвищення температури до 39°C, остуду, нудоту, сухість у роті, часте сечовипускання, виділення каламутної сечі, із пластівцями та осадом. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, АТ- 130/80 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Живіт м'який, безболісний. Симптом Пастернацького позитивний справа. У сечі: білок - 0,68 г/л, лейкоц.- 30-35 в п/з, ер.- 2-3 в п/з, бактерії, слиз. Який попередній діагноз?

- a. Хронічний правобічний пієлонефрит
- b. Хронічний гломерулонефрит
- c. Гострий правобічний пієлонефрит**
- d. Сечокам'яна хвороба
- e. Гострий гломерулонефрит

93. Пацієнтка 24-х років скаржиться на гострий біль у лівій здухвинній ділянці з іррадіацією в пряму кишку, який виник раптово після статевого акту. Остання менструація була 2 тижні тому. При пальпації визначаються біль та позитивні симптоми подразнення очеревини зліва. Який попередній діагноз?

- a. Сальпінгофорит
- b. Розрив маткової труби
- c. Апоплексія лівого яєчника**
- d. Гострий апендицит
- e. Загроза переривання вагітності

94. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернулася хвора 30-ти років зі скаргами на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів, що з'явився декілька днів тому. Об'єктивно: в ділянці правої великої соромітної губи виявлено щільний безболісний, синювато-червоного кольору набряк, при натискуванні пальцем сліду не лишається. Пахвинні регіональні лімфовузли дещо збільшені з одного боку, неболісні. Який попередній діагноз?

- a. Коростяний хід
- b. Шанкриформна піодермія
- c. Генітальний герпес
- d. Рак статевих органів
- e. Сифіліс первинний**

95. Під час транспортування у роділлі 25-ти років у машині ШМД почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хв, тривалістю 50 секунд. Починається прорізування голівки плода. Промежина, висота якої 3 см, зблідла. Яким має бути наступний етап невідкладної допомоги?

- a. Вакуум-екстракція плода
- b. Епізіотомія**
- c. Накладання акушерських щипців

d. Вичікувальна тактика

e. Захист промежини

96. До ФАПу звернулась жінка з проханням оцінити стан її репродуктивного здоров'я. Жінці 20 років, менструації з 14 років, щомісяця по 3-4 дні, безболісні. Зовнішні статеві органи без особливостей, шийка матки чиста, м'яка, щільна, безболісна, рухома, діаметр 5 см, додатки матки з двох боків не пальпуються. Який висновок можна зробити?

a. Хронічний сальпінгоофорит

b. Збоку геніталій патології немає. Практично здорова

c. Параметрит

d. Хронічний двосторонній аднексит

e. Хронічний метрит

97. Фельдшер ФАПу прийшов на виклик до 8-річної дитини і встановив діагноз "кір". У сім'ї є молодша дитина віком 11 місяців, яку не вакциновано проти кору. Які заходи слід вжити для підвищення специфічного імунітету у контактної дитини в першу чергу?

a. Провітрювати приміщення

b. Раціональне харчування

c. Спостереження за характером випорожнень

d. Вологе прибирання

e. Ввести імуноглобулін

98. Фельдшер швидкої допомоги доставив породіллю в пологове відділення. Що необхідно зробити при кровотечі в пологах, якщо плацента відділилась, а послід не виділився?

a. Провести зовнішній масаж матки

b. Наложити шви по Лосицькій

c. Застосувати метод Амбуладзе або Креде-Лазаревича

d. Ввести утеротонічні препарати

e. Провести ручне обстеження порожнини матки

99. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків крові здійснюють за допомогою такого реактиву:

a. Бензидиновий

b. Фенолфталеїновий

c. Азопірамовий

d. Ортотулоїдиновий

e. Амідопіриновий

100. До ФАПу звернувся чоловік 43-х років зі скаргами на помутніння сечі, зміну її кольору на червоний, підвищення температури тіла до 37,8°C. Скарги з'явилися після переохолодження. Що треба зробити, щоб виявити причину скарг?

a. Призначити сечогінні засоби

b. Зробити аналіз сечі, направити до нефролога

c. Вкласти хворого у ліжко

d. Призначити грілку на поперек

e. Заборонити вживати рідину

101. Хворий скаржиться на гострий біль вказівного пальця правої руки. Біль стає нестерпним особливо вночі, дистальна фаланга вказівного пальця різко набрякла. Який попередній діагноз може поставити фельдшер ФАПу?

a. Абсцес

b. Флегмона

c. Панарицій

d. Гідраденіт

e. Тендовагініт

102. Бригада швидкої допомоги викликана до пацієнтки 26-ти років. Скарги на підвищення температури тіла до 39°C, біль у грудній клітці. Перкуторно нижче кута лопатки справа звук

тупий, також прослуховується бронхіальне дихання, крепітація. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Вогнищева пневмонія
- b. Гострий бронхіт
- c. Сухий плеврит
- d. Ексудативний плеврит
- e. Крупозна пневмонія**

103. Фельдшера викликали до чоловіка 47-ми років, який скаржиться на нападоподібний біль у лівій поперековій ділянці з іррадіацією у статеві органи. Пацієнт постійно змінює положення тіла, але полегшення не відчуває. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Лівобічна ниркова колька**
- b. Виразкова хвороба, ускладнена пенетрацією
- c. Гострий панкреатит
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Гострий гломерулонефрит

104. До фельдшера звернувся хворий із скаргами на блювання, часті випорожнення (водянисті, із запахом сирої риби), без болю в животі. Із анамнезу відомо, що 3 дні тому повернувся із Маріуполя. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Харчова токсикоінфекція
- b. Черевний тиф
- c. Холера**
- d. Сальмонельоз
- e. Дизентерія

105. До ФАПу звернулася хвора 48-ми років зі скаргами на рясну кровотечу із статевих шляхів після затримки місячних впродовж 5-ти місяців, слабкість, запаморочення. При гінекологічному обстеженні: тіло матки нормальних розмірів, безболісне, рухоме; придатки з обох боків не визначаються. Який найбільш імовірний діагноз у хворої?

- a. Міома матки
- b. Внутрішній ендометріоз
- c. Перервана вагітність
- d. Аденокарцинома ендометрію
- e. Клімактерична дисфункціональна кровотеча**

106. Фельдшера швидкої допомоги викликали до чоловіка 70-ти років, який скаржиться на сильний біль у сечовому міхурі, неможливість самостійного сечовипускання. Зі слів хворого, страждає цим захворюванням 4 роки, не лікувався. Раніше пацієнта турбували часте сечовипускання, біль внизу живота та в поперековій ділянці. Який попередній діагноз?

- a. Простатит
- b. Цистит
- c. Паранефрит
- d. Сечокам'яна хвороба
- e. Аденома передміхурової залози**

107. До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72-х років зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Останні тижні помітив, що кал набув стрічкову форму. Про яке захворювання можна думати?

- a. Рак прямої кишки**
- b. Геморой
- c. Нориці прямої кишки
- d. Тріщини відхідника
- e. Парапроктит

108. Фельдшер швидкої допомоги доставив жінку до гінекологічного відділення. Діагноз: аборт у ході. Виберіть метод лікування в даному випадку:

- a. Призначення спазмолітичних засобів

b. Накладання швів на шийку матки

c. Холод на низ живота

d. Вишкрібання порожнини матки

e. Призначення утеротонічних засобів

109. При огляді важкохворого пацієнта фельдшер ФАПУ помітив у ділянці крижової кістки почервоніння шкіри, відшарування епідермісу. Яким розчином слід обробити вражену ділянку?

a. Слабкий розчин оцтової кислоти

b. 70% розчин етилового спирту

c. 10% розчин камфорного спирту

d. 5% розчин калію перманганату

e. 1% розчин саліцилового спирту

110. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 70-ти років зі скаргами на біль внизу живота, серозно-гнійні виділення з піхви з неприємним запахом. Під час огляду у дзеркалах на шийці матки виявлене утворення у вигляді "цвітної капусти". Який найбільш імовірний діагноз?

a. Крауроз

b. Еритроплакія

c. Лейкоплакія

d. Рак шийки матки

e. Ерозія шийки матки

111. Фельдшера ШМД викликали до чоловіка 50-ти років, який хворіє на хронічний абсцес правої легені. 2 години тому раптово відмітив різкий біль у правому боці, задишку. Об'єктивно: стан тяжкий, вимушене сидяче положення, ціаноз шкіри, ЧДР- 44/хв., Рс- 108/хв., АТ- 90/55 мм рт.ст. Об'єктивно: відставання правої половини грудної клітки в акті дихання. Перкуторно: притуплений печінковий звук від 4-го ребра донизу. Аускультативно: дихальні шуми над правою легенею не вислуховуються. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

a. Піопневмоторакс

b. Гангрена легенів

c. Абсцес легенів

d. Емпієма плеври

e. Гемопневмоторакс

112. Фельдшером швидкої допомоги доставлена породілля у пологове відділення. У ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок. Що передусім потрібно зробити?

a. Ввести знеболювальні засоби

b. Наладити інфузію розчинів у дві вени

c. Ввести преднізолон

d. Ввести кордіамін

e. Ввести кальцію хлорид

113. У хворого на тлі менінгококового менінгіту розвинувся напад судом. Який препарат слід застосувати для невідкладної допомоги?

a. Анальгін

b. Натрію оксибутират

c. Гепарин

d. Папаверину гідрохлорид

e. Маніт

114. На ФАПі внаслідок передчасних стрімких пологів народилася дитина з масою тіла 1900 г. Стан дитини важкий, крик слабкий, монотонний, відзначається вибухання великого та малого тім'ячок, тремор підборіддя, кінцівок; періодично спостерігається судомна готовність. Який стан слід діагностувати?

a. Гіпокальціємічний синдром

b. Асфіксія новонародженого

c. Незрілість центральної нервової системи

d. Внутрішньоутробне інфікування

е. Внутрішньочерепна пологова травма

115. Хворий 25-ти років скаржиться на гарячку, профузне потовиділення, серцебиття, виражену слабкість і біль у горлі. Об'єктивно: некротична ангіна, збільшення лімфовузлів, печінки. У периферичній крові - бластні клітини. Для якого захворювання характерні дані прояви?

а. Хронічний лімфолейкоз

б. Гострий лейкоз

с. Фолікулярна ангіна

д. Тромбоцитопенія

е. Залізодефіцитна анемія

116. Пацієнт питає фельдшера ФАПУ, як правильно зібрати сечу за Нечипоренко?

а. У стерильну банку 200 мл

б. Вранці одномоментно 200 мл

с. Сечу за добу

д. У будь-який час доби порцію сечі після підмивання

е. Сечу за 3 години

117. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на здуття, розпираючий біль у животі, невідходження газів. Які заходи слід провести для усунення даних проблем?

а. Ввести газовідвідну трубку

б. Застосувати медикаментозну клізму

с. Застосувати знеболювальні препарати

д. Застосувати сифонну клізму

е. Промити шлунок

118. До приймального відділення доставлено хворого з підозрою на перфорацію виразки шлунка. Який із методів діагностики може підтвердити діагноз?

а. Іригоскопія

б. Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні

с. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка з контрастом

д. УЗД черевної порожнини

е. Реографія

119. Дитина віком 4-х років захворіла раптово. З'явився сухий кашель, ЧД- 48/хв., свистячий видих, який чути на відстані, в акті дихання беруть участь допоміжні м'язи. Який попередній діагноз?

а. Напад бронхіальної астми

б. Ларингоспазм

с. Гостра пневмонія

д. Гострий обструктивний бронхіт

е. Хронічна пневмонія

120. У хворого 42-х років виявлено поранення черепа з вибуханням головного мозку. Волосся навколо поранення обстрижене, шкіра оброблена йодонатом, на вибухання накладена стерильна серветка з ізотонічним розчином натрію хлориду. Що необхідно покласти навколо вибухання, щоб не відбулося стиснення головного мозку?

а. Стерильний ватно-марлевий тампон

б. Шину Бакшеєва

с. Шину Крамера

д. Стерильний ватно-марлевий бублик

е. Шину Єланського

121. При виконанні фельдшером швидкої допомоги внутрішньовенного вливання 10% розчину кальцію хлориду пацієнт 53-х років відчув пекучий біль у місці інекції. Що повинен зробити фельдшер?

а. Обколоти місце інекції 0,5% розчином новокаїну

- b. Увести у місце інекції 0,1% розчин адреналіну
- c. Вище місця інекції накласти джгут
- d. Прикласти міхур з льодом
- e. Обколоти місце інекції 2,4% розчином еуфіліну

122. На здоровпункт до фельдшера звернулася пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, задишку, серцебиття, печіння кінчика язика, відчуття повзання "мурашок", прострілюючий біль у кінцівках. Об'єктивно: шкіра бліда з лимонно-жовтим відтінком, язик яскраво-червоний, блискучий, гладенький, ніби лакований. Вторинна профілактика цього захворювання включає введення такого вітаміну:

- a. B1
- b. C
- c. K
- d. B12**
- e. B6

123. Патронаж до новонародженої дівчинки на 7-й день життя. Мати помітила, що у дитини з'явилися кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини та нагрубання молочних залоз. З чим це пов'язано?

- a. Запальні захворювання
- b. Сепсис
- c. Вплив зовнішніх чинників
- d. Реакція на грудне молоко
- e. Статевий криз**

124. У новонародженої дитини спостерігаються: ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхневе нерівномірне дихання, Ps- 56/хв, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців розташовані на груднині дитини. Вкажіть найчастіше ускладнення, яке може виникнути при покладанні рук фельдшера на мечоподібний відросток при здійсненні даної реанімації:

- a. Перелом ребер
- b. Ушкодження печінки**
- c. Відкритий пневмоторакс
- d. Гостра емфізема
- e. Гематома грудної клітки

125. Загальний стан дитини 5-ти років дуже важкий, температура 39,5°C, повторне блювання, на шкірі тулуба з'являються елементи геморагічного висипу, які мають зірчасту форму. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Скарлатина
- b. Дифтерія
- c. Менінгококцемія**
- d. Вітряна віспа
- e. Кір

126. Фельдшер швидкої допомоги доправляє в стаціонар пацієнта з набряком легень. Лікар призначив інгаляційне введення кисню. Чим необхідно здійснити зволоження кисню?

- a. 2% розчин натрію гідрокарбонату
- b. 5% розчин етилового спирту
- c. Дистильована вода
- d. Відвар ромашки
- e. 96% розчин етилового спирту**

127. До ФАПу звернулася жінка 32-х років зі скаргами на тривалі і рясні менструації впродовж півроку, тягнучий біль внизу живота, слабкість. При гінекологічному обстеженні тіло матки збільшене до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. У крові: Hb- 90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

- a. Міома матки**

- b. Рак тіла матки
- c. Дисфункціональна маткова кровотеча
- d. Кістома яєчника
- e. Вагітність

128. Фельдшер ШМД оглядає потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно уламки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Визначте першочергові дії фельдшера:

- a. Ввести знеболюючі
- b. Накласти асептичну пов'язку
- c. Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
- d. Накласти джгут**
- e. Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами

129. До ФАПУ звернувся хворий, у якого 2 дні тому в ділянці лівої гомілки з'явилося почервоніння з чіткими краями, набряк тканин, температура тіла - 39,5°C. При пальпації різка болючість в місці гіперемії. Який попередній діагноз?

- a. Остеомієліт
- b. Карбункул
- c. Бешиха**
- d. Флегмона
- e. Абсцес

130. Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта, який скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що виникли після швидкого зниження температури тіла. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло?

- a. Непритомність
- b. Колапс**
- c. Шок
- d. Марення
- e. Кома

131. Фельдшер швидкої допомоги оглядає дівчину 16-ти років, у якої стався судомний напад після неприємної розмови із вчителем. При огляді: дитина лежить на підлозі, рухи рук і ніг хаотичні, різноманітні, демонстративні. Очі міцно заплющені, протидіє спробі розкриття повік. Мимовільного сечопуску, кров'янистої піни з рота не було, синця від падіння немає. Який попередній діагноз?

- a. Маніакальне збудження
- b. Епілептичний статус
- c. Епілептичний напад
- d. Втрата свідомості
- e. Істеричний напад**

132. До фельдшера ФАПУ звернувся хлопець 17-ти років зі скаргами на заніміння та синюшність пальців рук. Об'єктивно: обидві кисті пастозні, пальці гіпотермічні, бліді, з синюшним відтінком. Пульсація на артеріях передпліччя визначається. З анамнезу: знаходиться на диспансерному обліку з приводу сколіозу. Який попередній діагноз?

- a. Патології судин не виявлено
- b. Відмороження
- c. Атеросклероз
- d. Облітеруючий ендартеріїт
- e. Хвороба Рейно**

133. З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріону. Яка залоза впродовж 4-ох місяців забезпечує цей процес?

- a. Щитоподібна залоза

b. Плацента

c. Жовте тіло вагітності

d. Надниркові залози

e. Гіпофіз

134. Фельдшер надає першу медичну допомогу потерпілому альпіністу, який постраждав під час обвалу. Об'єктивно: відмічається деформація в середній третині стегна, патологічне вкорочення лівої нижньої кінцівки. Які засоби для транспортування потерпілого до травматологічного відділення слід використати?

a. Шина Беллера

b. Спиці Кіршнера

c. Шина Єланського

d. Шина Крамера

e. Шина Дітеріхса

135. До фельдшера здоров'я звернувся пацієнт зі скаргами на біль у правому стегні, який виник після падіння. Фельдшер діагностував забій м'яких тканин і призначив ампліпульстерапію. Що треба зробити для збільшення тривалості знеболювального ефекту ампліпульстерапії?

a. Змінити глибину модуляції

b. Провести ампліпульсфорез місцевих анестетиків

c. Змінити перемінний режим на постійний

d. Збільшити тривалість процедури

e. Збільшити силу струму

136. У хворого в стані клінічної смерті проводиться штучна вентиляція легень методом "з рота до рота" та непрямий масаж серця. Фельдшер звернув увагу на те, що повітря не проходить в дихальні шляхи хворого, а його голова та тулуб знаходяться в одній площині. Яка причина неефективності дихання в даній ситуації?

a. Відсутність зонда в шлунку

b. Маленький рот у хворого

c. Проведення непрямого масажу серця

d. Малий об'єм повітря, що вдихується

e. Западання язика

137. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт із скаргами на зниження чутливості у ділянці тильної поверхні великого пальця правої кисті, неможливість розігнути праву кисть та пальці. Об'єктивно: м'язовий тонус та м'язова сила у правій руці знижені, обсяг рухів обмежений, згинально-ліктьовий рефлекс справа знижений. При витягнутих вперед руках права кисть звисає. В анамнезі - травма правого передпліччя. Який попередній діагноз?

a. Центральний параліч правої руки

b. Невропатія серединного нерва

c. Невропатія ліктьового нерва

d. Невропатія променевого нерва

e. Невропатія великогомілкового нерва

138. У хворій на фоні гарячки 38,8°C спостерігаються біль та гіперемія в ділянці правої великої присінкової залози, флюктуація. Якою буде лікувальна тактика?

a. Антибіотикотерапія, холод

b. Місцеве застосування холоду

c. Хірургічне лікування, дренирування, антибіотики

d. Сидячі теплі ванночки, антибіотики

e. Місцеве застосування тепла, антибіотики

139. До фельдшера звернувся чоловік, який скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, який виник після їзди на велосипеді. Об'єктивно: склери жовтяничні. Живіт болючий у правому підребер'ї, позитивний симптом Ортнера. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Хронічний гепатит
- b. Цироз печінки
- c. Хронічний гастрит
- d. Виразкова хвороба шлунка

e. Жовчнокам'яна хвороба

140. Дівчину 17-ти років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи, під час нападу, буває блювання. Напад триває декілька годин. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- a. Вегето-судинна дистонія
- b. Гіпертонічний криз

c. Мігрень

- d. Транзиторний ішемічний напад
- e. Субарахноїдальна гематома

141. Фельдшер проводить спостереження за розвитком здорової дитини та планує профілактичні щеплення. Для профілактики гемофільної інфекції слід застосувати вакцину:

a. Хіберікс

- b. Інфанрікс
- c. Імовакс Поліо
- d. БЦЖ
- e. Приорікс

142. На ФАП звернувся чоловік 54-х років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного мокротиння, задишку при незначному фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість. Хворіє близько 10-ти років. Робота пов'язана з переохолодженнями. Палить з юнацького віку по 1 пачці цигарок на день. Об'єктивно: грудна клітка діжкоподібної форми. Перкуторно - коробковий звук. Аускультативно - середньопухирчасті хрипи. Яким є найімовірніший попередній діагноз?

a. Хронічний обструктивний бронхіт

- b. Гострий бронхіт
- c. Бронхіальна астма
- d. Бронхоектатична хвороба
- e. Хронічний катаральний бронхіт

143. Дитина 1,5 місяців на змішаному вигодовуванні. Який вид докорму треба призначити дитині?

- a. Каші
- b. Мясний фарш
- c. Соки

d. Адаптовані суміші

- e. Овочеve пюре

144. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 42-х років із скаргами на сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадіння волосся, спотворення смаку (вживає крейду). Для якого синдрому характерні такі ознаки?

- a. Гемолітичний
- b. Геморагічний

c. Сидеропенічний

- d. Анемічний
- e. Пухлинної інтоксикації

145. До фельдшера ФАПу звернулася хвора 25-ти років зі скаргами на задишку, напади ядухи, що виникають уночі, інколи кровохаркання, слабкість. Хворіє на ревматизм. Об'єктивно: ціаноз губ, кінчика носа, румянець на щоках з ціанотичним відтінком. Пульс слабкого наповнення, аритмічний. Перкуторно - межі серця розширені праворуч і вгору. Аускультативно - над верхівкою посилений хлопаючий I тон, діастолічний шум, акцент II тону над легеневою артерією. Наявність якої вади серця слід запідозрити?

- a. Недостатність клапана аорти
- b. Недостатність мітрального клапана
- c. Недостатність трикуспідального клапана
- d. Стеноз устя аорти

e. Мітральний стеноз

146. Хворий 47-ми років доставлений машиною швидкої допомоги з діагнозом "гострий інфаркт міокарда", став відмічати різке погіршення самопочуття: посилюється біль за грудниною, з'явилася задишка, запаморочення. Об'єктивно: Рс- 120/хв., тони серця глухі, рясне потовиділення. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Гостра судинна недостатність
- b. Серцева астма
- c. Стенокардія
- d. набряк легень

e. Кардіогенний шок

147. Фельдшер ФАП у під час проведення непрямого масажу серця відчув характерний хрускіт, що свідчить про перелом ребра. Його подальші дії:

- a. Продовжувати серцево-легеневу реанімацію, змістивши руки до неушкоджених ребер
- b. Перейти до прямого масажу серця
- c. Припинити реанімаційні заходи та застосувати прекардіальний удар
- d. Констатувати біологічну смерть потерпілого

e. Продовжувати непрямий масаж, правильно розташувавши руки на груднині

148. До фельдшера ФАП звернулись рідні лежачого тяжкохворого пацієнта з приводу того, що у нього з'явилося почервоніння на куприку та в ділянці лопаток, яке з кожним днем збільшується. Оглядаючи пацієнта, фельдшер звернув увагу на те, що цілісність шкіри не порушена, почервоніння шкіри інтенсивне, після зміни положення пацієнта та розтирання ділянки 10% розчином камфорного спирту не зникає. Про що це свідчить?

- a. Розвивається дерматит
- b. Алергічна реакція на камфорний спирт
- c. Виникли попірлості
- d. Виникли пролежні 2 ступеня

e. Виникли пролежні 1 ступеня

149. Назвіть вік дитини, коли відбувається перший фізіологічний перехрест у лейкоцитарній формулі крові:

- a. 5 років
- b. 5 тижнів
- c. 1 день

d. 5 днів

e. 5 місяців

150. Вагітна 26-ти років з терміном вагітності 34 тижні звернулася до фельдшера швидкої допомоги зі скаргами на біль у епігастральній ділянці, блювання, миготіння "мушок" перед очима, посмикування м'язів обличчя. Об'єктивно: АТ- 180/120 мм рт.ст. на обох руках, генералізовані набряки. Вкажіть, які анестезіологічні та реанімаційні заходи необхідно провести жінці в першу чергу:

- a. Провести корекцію водно-електролітних порушень
- b. Забезпечити ефективну вентиляцію легень (ШВЛ)
- c. Призначити гіпотензивні засоби

d. Призначити засоби, які попереджують судоми

e. Призначити дезагреганти

151. У дитини 2-х років температура 38,0°C, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Назофарингіт

- b. Гострий ларингіт
- c. Гостра пневмонія**
- d. Бронхіальна астма
- e. Гострий бронхіт

152. У дитини 2-х років гостро розвився набряк по всьому тулубу. АТ120/180 мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в сечі 4,5%, мікрогематурія. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пієлонефрит
- b. Ізольований сечовий синдром
- c. Гострий гломерулонефрит, нефротична форма**
- d. Вроджена вада серця
- e. -

153. Хворий 41-го року зловживає алкоголем більше семи років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу, занепокоєння, почав бачити мух, павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з'явилися кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі та просторі не орієнтований. Який діагноз поставить фельдшер ФАПУ?

- a. Маніакально-депресивний психоз
- b. Шизофренія
- c. Епілептичний психоз
- d. Алкогольний делірій**
- e. Старечий параноїд

154. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 47-ми років, який скаржиться на напади за груднинного болю з іррадіацією в ліву руку, які тривають 2-3 хв, з'являються після фізичного навантаження, знімаються нітрогліцерином. Хворіє 3 роки. Об'єктивно: Рс80/хв., ритмічний. АТ130/70 мм рт.ст., межі серця в нормі. Шумів немає. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Стенокардія напруження**
- b. Гіпертонічна хвороба, ускладнений гіпертонічний криз
- c. Прогресуюча стенокардія
- d. Інфаркт міокарда
- e. Гіпертонічна хвороба, неускладнений гіпертонічний криз

155. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків миючого засобу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства здійснює за допомогою такого реактиву:

- a. Ортотулоїдиновий
- b. Амідопіриновий
- c. Фенолфталеїновий**
- d. Бензидиновий
- e. Азопірамовий

156. До фельдшера здоров'я пункту звернулася пацієнтка, яка хворіє на жовчнокам'яну хворобу, зі скаргами на сильний біль у правому підребер'ї. Які засоби домедикаментозної терапії допоможуть зменшити біль?

- a. Банки на грудну клітку
- b. Зігріваючий компрес
- c. Міхур з льодом
- d. Гірчичники на грудну клітку
- e. Грілка на ділянку правого підребер'я**

157. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народженні 3200 г, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- a. 6000 г
- b. 5400 г**
- c. 4800 г

- d. 5200 г
- e. 5800 г

158. Фельдшер ФАПу оглядає дитину 10-ти років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- a. Кір
- b. Скарлатина
- c. Менінгококова інфекція**
- d. Вітряна віспа
- e. Краснуха

159. До фельдшера ФАПу звернулась вагітна стати на диспансерний облік. Вагітність 10 тижнів. Вузький таз. Яку медичну документацію повинен оформити фельдшер?

- a. Медична карта амбулаторного хворого (ф.025/0)
- b. Контрольна карта диспансерного спостереження (ф.30)
- c. Індивідуальна карта вагітної та породіллі (ф. №111/0) та обмінна карта (ф.113/0)**
- d. Обмінна карта (ф.113/0)
- e. Медична карта стаціонарного хворого (ф.003)

160. Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників, фрезерувальник крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. Об'єктивно: видно затиснутий в руці оголений електричний дріт, який звисає з верстату. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Першочерговість дій фельдшера:

- a. Ввести протигістамінні препарати
- b. Дати вдихнути нашатирний спирт
- c. Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію**
- d. Знеболити, транспортувати в хірургічне відділення
- e. Дефібриляція

161. До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12-ти років, який порізав палець склом. Під час перев'язки, побачивши кров, зблід і раптово втратив свідомість. Об'єктивно: пульс ниткоподібний, кінцівки холодні. Який стан виник у дитини?

- a. Гостра дихальна недостатність
- b. Непритомність**
- c. Гостра серцева недостатність
- d. Геморагічний шок
- e. Колапс

162. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом, стали болючі перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий під час пальпації. Положення плода поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плода приглушене, 16/хв. Яке ускладнення виникло у пологах?

- a. Загроза розриву матки**
- b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- c. Центральне передлежання плаценти
- d. Розрив промежини
- e. Повний розрив матки

163. Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 5 діб. Вчора була виписана з пологового стаціонару. Мати повідомила, що близько 2-х годин тому у дитини піднялась температура тіла до 38,5°C. Об'єктивно: дитина неспокійна, жадібно п'є, відмічається сухість слизових оболонок, гіперемія шкіри. Слизова ротоглотки рожева, дихання над легенями пуерильне. При зважуванні маса тіла дитини 2800 г. Маса тіла одразу після народження 3200 г. З анамнезу відомо, що вагітність і пологи у матері протікали без ускладнень. Яке явище найімовірніше у дитини?

- a. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- b. Транзиторна гіпотермія
- c. Транзиторна гіпертермія**
- d. Гостра кишкова інфекція
- e. Транзиторний катар кишок

164. Фельдшер ФАПУ заповнює медичну документацію на пацієнта 34-х років, який рік тому лікувався в хірургічному відділенні з приводу травми з великою крововтратою. Пацієнт повідомив, що після переливання біля 1000 мл однокрупної резус-сумісної консервованої крові у нього відмічались серцебиття, судоми м'язів, порушення дихання, занепокоєння. Яке ускладнення гемотрансфузії мало місце у хворого?

- a. Постгемотрансфузійний шок
- b. Гострий тромбоз
- c. Геморагічний шок
- d. Анафілактичний шок

e. Цитратний шок

165. До фельдшера здоровпункту звернувся робітник зі скаргами на біль у середній третині передпліччя. Травма дві години тому. Об'єктивно: в середній третині передпліччя відмічається локальний біль, набряк, припухлість, обмеження об'єму рухів у кінцівках, деформація. Якими є межі іммобілізації при наданні першої допомоги?

a. Від пальців кисті до внутрішнього краю здорової лопатки

b. Від пальців кисті до нижньої третини плеча

- c. Від пальців кисті до верхньої третини плеча
- d. Від пальців кисті до верхньої третини передпліччя
- e. Від зап'ястка до ліктя

166. До фельдшера здоровпункту звернулася жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва, затримку менструації, запаморочення, нудоту, блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ90/60 мм рт.ст. Пульс частий, малого наповнення. Яку невідкладну допомогу повинен надати фельдшер?

- a. Промити шлунок
- b. Ввести знеболюючі препарати

c. Покласти холод та госпіталізувати

- d. Направити в жіночу консультацію
- e. Направити на УЗД

167. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 40-ка років, який після переохолодження відчув озноб, біль у грудній клітці справа. Підвищилась температура тіла до 39°C, з'явився кашель із виділенням "іржавого"харкотиння. Хворіє другий день. Після об'єктивного обстеження фельдшер виявив ознаки негоспітальної правобічної лобарної пневмонії. Вкажіть основи етіотропної терапії:

- a. Глюкокортикостероїди
- b. Бронхолітики
- c. Муколітики
- d. Антигістамінні

e. Антибіотики

168. Пацієнтка 27-ми років скаржиться на біль, свербіж, печіння, серозногнійні виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно: набряк зовнішніх статевих органів, гіперемія слизової оболонки. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Вульвовагініт

- b. Аднексит
- c. Ерозія шийки матки
- d. Параметрит
- e. Ендометри

169. Фельдшер повинен пам'ятати, що максимальна кількість розчину ліків, яку можна ввести

одноразово внутрішньом'язово становить:

- a. 2 мл
- b. 5 мл
- c. 10 мл**
- d. 20 мл
- e. 4 мл

170. Хвора 30-ти років скаржиться на біль у поперековій ділянці ліворуч, часте болісне сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,7°C. Захворіла раптово після переохолодження. Живіт м'який, болючий в лівій половині. АТ100/60 мм рт.ст., Рs90/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Які зміни в сечі можна очікувати?

- a. Зниження питомої ваги
- b. Гематурія
- c. Піурія**
- d. Кристалурія
- e. Глюкозурія

171. Дитина народилася передчасно з вагою 1700 г, від першої ускладненої вагітності. Профілактику якого захворювання слід передбачити при складанні плану догляду за недоношеною дитиною?

- a. Гемолітична хвороба
- b. Спазмофілія
- c. Алергічний діатез
- d. Гострий розлад травлення
- e. Анемія**

172. Пацієнт 20-ти років годину тому відчув кинджальний біль у животі, було одноразове блювання. Об'єктивно: положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий гастрит
- b. Загострення виразкової хвороби
- c. Гострий живіт (перитоніт)
- d. Шлунково-кишкова кровотеча
- e. Перфорація виразки**

173. Роділля 24-х років знаходиться в передпологовій палаті. Після 8-ми годин нормальної пологової діяльності, перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився. Яка патологія пологової діяльності?

- a. Патологічний прелімінарний період
- b. Надмірно сильна пологова діяльність
- c. Вторинна слабкість пологової діяльності**
- d. Первинна слабкість пологової діяльності
- e. Дискоординована пологова діяльність

174. У вагітної в 36 тижнів спостерігаються кров'яністі виділення із статевих шляхів, що з'явилися раптово вдома, вночі, серед повного здоров'я. Вкажіть першочерговий захід долікарської допомоги:

- a. Викликати лікарсько-акушерську бригаду**
- b. Визначити групу крові та резус фактор
- c. Ввести в/в 5% розчин амінокапронової кислоти
- d. Ввести в/в 1% розчин вікасолу
- e. Транспортувати в лікарню

175. Фельдшер ШМД виконує внутрішньовенну ін'єкцію 10% р-ну кальцію хлориду. Яке ускладнення може виникнути у разі попадання розчину у підшкірну клітковину?

- a. Некроз**
- b. Абсцес
- c. Інфільтрат

- d. Гематома
- e. Алергійна реакція

176. Фельдшер ФАПу проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції поперечного положення плоду?

- a. Зліва нижче пупка
- b. Справа вище пупка
- c. Справа на рівні пупка
- d. Справа нижче пупка
- e. Зліва на рівні пупка

177. До фельдшера здоровпункту підприємства звернулась жінка 45-ти років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизистогнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37,8оС, загальну слабкість. Хворіє протягом 4-х днів. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: перкуторно ясний легеневий звук, аускультативно вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені. Рентгенологічно ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний бронхіт
- b. Бронхоектатична хвороба
- c. Гостра госпітальна пневмонія
- d. Гострий бронхіт
- e. Гостра негоспітальна пневмонія

178. Хворому з аденомою передміхурової залози фельдшером уведений постійний катетер у сечовий міхур. Яким розчином доцільно промивати сечовий міхур для запобігання висхідної інфекції:

- a. 3% розчином перекису водню
- b. Розчин фурациліну 1:5000
- c. Ізотонічним розчином натрію хлориду
- d. 30% етиловим спиртом
- e. 2% розчином натрію гідрокарбонату

179. Фельдшер швидкої допомоги викликаний до пацієнта 48-ми років, що скаржиться на одноразове блювання, здуття живота, сильний біль у поперековій ділянці справа, що іррадіацією в статеві органи та живіт, часте болюче сечовипускання. Об'єктивно: хворий неспокійний, стогне, шкіра бліда, вкрита рясним потом. Рс90/хв., АТ90/60 мм рт.ст. Симптом Пастернацького позитивний справа. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Кишкова коліка
- b. Печінкова коліка
- c. Ниркова коліка
- d. Гострий апендицит
- e. Кишкова непрохідність

180. Хворий 46-ти років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний біль у правій половині живота, поперековій ділянці справа, який іррадіює в калитку та стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об'єктивно: хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла 36,9оС, Рс92/хв. Живіт здутий, болючий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справа. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний гломерулонефрит
- b. Хронічний пієлонефрит
- c. Гострий гломерулонефрит
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Ниркова колька

181. Потерпілий упав з мотоцикла і вдарився лівим плечем о бордюр. Об'єктивно: плечовий суглоб деформований, кінцівка знаходиться у вимушеному положенні, приведена до тулуба, активні рухи в плечовому суглобі відсутні. На яке ушкодження вказують ці симптоми?

- a. Вивих плеча

- b. Розрив м'язів
- c. Перелом плеча
- d. Забій м'яких тканин
- e. Розтягнення зв'язок суглоба

182. У флаконі 1,0 г цефтриаксону, його розвели 5 мл ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

- a. 2 мл
- b. 4 мл
- c. 5 мл
- d. 1,5 мл**
- e. 3 мл

183. На ФАП звернулась вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперековій ділянці. Об'єктивно: загальний стан не порушений, АТ120/80 мм рт.ст. на обох руках, Рс82/хв., ритмічний. При огляді тіло матки в підвищеному тонусі, чутливе під час пальпації. Який попередній діагноз?

- a. Викидень, що розпочався
- b. Викидень в розпалі
- c. Загроза розриву матки
- d. Загроза викидня**
- e. Загроза передчасних пологів

184. В хірургічне відділення доставлено пацієнта з шлунково-кишковою кровотечею. Призначено переливання однокрупної еритромаси. Під час проведення біологічної проби у пацієнта з'явилися нудота, біль за грудниною і в попереку, пульс і дихання почастишали, артеріальний тиск знизився. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гемотрансфузійний шок під час біологічної проби**
- b. Анафілактичний шок
- c. Гостре розширення серця
- d. Цитратний шок
- e. Пірогенна реакція

185. Хворий 25-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами: на головний біль, набряки на обличчі, сечу кольору "м'ясних помиїв", тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури до 37,4°C. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі. Рс72/хв., ритмічний, напружений. АТ180/110 мм рт.ст. Добова кількість сечі 400 мл. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. Гострий пієлонефрит
- b. Хронічний пієлонефрит
- c. Гіпертонічна хвороба
- d. Гострий гломерулонефрит**
- e. Хронічний гломерулонефрит

186. На прийом до фельдшера ФАПу прийшла мати з дитиною 8-ми років. Відмічається підвищення температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль під час ковтання. Об'єктивно: гіперемія і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Який попередній діагноз?

- a. Стomatит
- b. Епідемічний паротит
- c. Дифтерія**
- d. Ангіна
- e. Скарлатина

187. До фельдшера ФАПу звернулась хвора 35-ти років, зі скаргами на часте сечовипускання, біль у попереку, підвищення температури до 38,6°C. Хворіє 3 дні. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ120/70 мм рт.ст., Рс100/хв., симптом Пастернацького позитивний зліва. У сечі: велика

кількість лейкоцитів та бактерій. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- a. Ниркова колька
- b. Гломерулонефрит
- c. Пієлонефрит**
- d. Цистит
- e. Ниркова недостатність

188. До фельдшера ФАПУ на прийом звернувся хворий зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,0°C, прогресуючу втрату ваги тіла, профузний нічний піт протягом трьох місяців. Об'єктивно: збільшення лімфатичних вузлів на шиї, у ліктьових згинах, під руками більше 1 см в діаметрі. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. ХТІ
- b. ВІЛ-інфекція**
- c. Грип
- d. Чума
- e. Бешиха

189. Пацієнтка 19-ти років скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болючість при сечовипусканні. Об'єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття мазка:

- a. Анальний отвір
- b. Цервікальний канал
- c. Бічне склепіння піхви
- d. Заднє склепіння піхви**
- e. Уретра

190. Чоловік 48-ми років звернувся до фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. Об'єктивно: АТ180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

- a. Гіпертермія
- b. Артеріальна гіпотензія
- c. Артеріальна гіпертензія**
- d. Тахікардія
- e. Брадикардія

191. Фельдшер ШМД госпіталізував хвору 64-х років з матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку з'явилися серозно-водянисті виділення з піхви, які потім стали серозно-кров'яністі, типу "м'ясних помиїв", з'явився біль внизу живота. Яка патологія найбільш імовірна?

- a. Внутрішній ендометріоз
- b. Рак матки**
- c. Міхуровий занесок
- d. Неповний аборт
- e. Хоріонепітеліома

192. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 22-х років зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 39,5°C. Об'єктивно: ЧСС108/хв., АТ120/80 мм рт.ст., живіт помірно здутий, різко болючий у гіпогастральній ділянці. Симптом Щоткина-Блюмберга позитивний в гіпогастрії. Піхове обстеження: матка та додатки не пальпуються внаслідок напруження передньої черевної стінки, заднє склепіння піхви нависає, різко болюче. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий ендометрит
- b. Гострий аднексит
- c. Пельвіоперитоніт**
- d. Позаматкова вагітність
- e. Апоплексія яєчника

193. Хлопчик 12-ти років знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: виразкова хвороба шлунка. Хворіє близько 2-х років. Тиждень тому загальний стан дитини погіршився, був госпіталізований. Яке дієтичне харчування повинна одержувати дитина?

- a. № 9
- b. № 7
- c. № 1a**
- d. № 5
- e. № 15

194. Фельдшер ФАПу викликаний до дитини 8-ми місяців. Зі слів мами дитина раптово знепритомніла, наступила зупинка дихання, дитина посиніла, через 1 хвилину з'явився гучний вдих, схожий на півнячий крик. З анамнезу: дитина з 1-го місяця на штучному вигодовуванні. Голову тримає з 3-х місяців, зубів немає, самостійно не сидить. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Гіпокальціємічний синдром, ларингоспазм**
- b. Гіпокальціємічний синдром, карпопедальний спазм
- c. Гіпокальціємічний синдром, еклампсія
- d. Напад бронхіальної астми
- e. Стенозуючий ларинготрахеїт

195. До фельдшера ФАПу звернулася хвора 37-ми років зі скаргами на серцебиття, підвищену дратівливість, плаксивість, тремтіння тіла, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,0-37,5°C, пронос, схуднення. В анамнезі часті нервові перенапруження впродовж 3-х років. Об'єктивно: зниженого харчування. Шкіра волога, тремор пальців рук. Позитивні очні симптоми. Щитоподібна залоза збільшена. Тахікардія, тони серця звучні. Ps110/хв., АТ160/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хвороба Іценка-Кушинга
- b. Дифузний токсичний зоб**
- c. Гіпотиреоз
- d. Гіпертонічна хвороба
- e. Ендемічний зоб

196. Виклик ШМД до хворого 62-х років, який скаржиться на раптовий напад інтенсивного стискаючого, пекучого за груднинного болю, з характерною іррадіацією. Біль виник під час фізичного навантаження, триває більше 6 хв. Об'єктивно: блідість шкіри та ціаноз губ, холодні кінцівки. Тони серця приглушені, поодинокі екстрасистоли. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?

- a. Діазепам 0,005 г 1 таблетка 2 рази на добу
- b. Нітрогліцерин 1-2 таблетки під язик**
- c. Верапаміл 0,08 г 1 таблетка 4 рази на добу
- d. Анальгін по 0,5 г 3 рази на добу
- e. Корвалол по 15-30 крапель 2-3 рази на добу

197. Жінку 40-ка років збила машина. Скаржиться на болі внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації відмічається різкий біль в проекції лобкового зрощення, лобкових кісток. Позитивний симптом "прилиплої п'яти". Жінці ввели протишокові засоби. Яка транспортна іммобілізація є найбільш правильною?

- a. За допомогою шини Белера
- b. За допомогою шини Дітерікса
- c. На твердих ношах у положенні "жаби"**
- d. На твердих ношах на животі
- e. На ношах, під шию покласти валик

198. Хворий скаржиться на різку болючість у правій здухвинній ділянці. Об'єктивно: температура тіла 37,2°C, нудота, блювання. Позитивні симптоми Щоткіна-Блумберга, Воскресенського, Ровзінга. Який попередній діагноз?

- a. Гострий холецистит**

- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Гострий апендицит**
- e. Виразкова хвороба

199. Дитина фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку лежачи на животі, видає незначні звуки (агукає), посміхається, спить близько 20 годин на добу. Якому віку відповідає нервово-психічний розвиток дитини?

- a. 5-6 місяців
- b. 7-8 місяців
- c. 1-2 місяці**
- d. 4-5 місяців
- e. 4-6 місяців

200. При заборі крові на ФАПі хворий знепритомнів. Яке положення повинен надати фельдшер хворому?

- a. Лежачи на животі
- b. Напівлежачи в ліжку
- c. Лежачи з трохи піднятими ногами**
- d. Лежачи на боці
- e. Сидячи в кріслі

201. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Алергічний діатез**
- b. Гіпотрофія
- c. Пітниця
- d. Рахіт
- e. Анемія

202. У хворої 68-ми років відмічається виділення великої кількості харкотиння (більше 300 мл) "повним ротом", з неприємним запахом. Про яке захворювання можна подумати?

- a. Абсцес легень**
- b. Рак легені
- c. Крупозна пневмонія
- d. Бронхіальна астма
- e. Інфаркт легені

203. У хворого 50-ти років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Об'єктивно: $Ps_{100/xv.}$, аритмічний, екстрасистолія. $AT_{90/60}$ мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз $13,8 \cdot 10^9/л$. ЕКГ інтервал ST у відведеннях III та aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

- a. Гострий інфаркт міокарда**
- b. Гострий холецистит
- c. Харчова токсикоінфекція
- d. Перфорація виразки шлунка
- e. Гострий панкреатит

204. Дитині 6 місяців. Маса тіла 7400 г, отримує материнське молоко. Який продукт необхідно призначити для першого підгодовування?

- a. М'ясний фарш
- b. Молочна каша
- c. Овочеve пюре**
- d. Сир

е. Кефір

205. На III етапі реабілітації пацієнтові з діагнозом хронічний поліартрит призначено радонові ванни. Якою повинна бути тривалість цієї процедури?

а. 20-25хв.

б. 30 хв.

с. 5 хв.

д. 3-7хв.

е. 10-15 хв.

206. На здоровпункті хімічного заводу проводиться забір донорської крові. Чоловік 24-х років раптово зблід і знепритомнів. Зіниці вузькі, реагують на світло, кінцівки холодні. ЧСС55/хв. Діагноз: гостра судинна недостатність (непритомність). Яка невідкладна допомога?

а. Горизонтальне положення, адреналін в/м

б. Горизонтальне положення, ефедрин в/м

с. Напівсидяче положення, дати вдихнути пари нашатирного спирту

д. Сидяче положення, дати вдихнути пари нашатирного спирту

е. Горизонтальне положення, дати вдихнути пари нашатирного спирту

207. З метою реалізації державної науково-технічної програми "Атеросклероз", фельдшер здоровпункту хлібозаводу проводить бесіду із робітниками. Яку пораду дасть фельдшер?

а. Перевіряти рівень холестерину в крові щороку

б. Перевіряти рівень креатиніну в крові щороку

с. Уникати емоційного перенапруження

д. Уникати переохолодження

е. Перевіряти рівень цукру в крові щороку

208. До фельдшера ФАПУ звернулася вагітна 26-27 тижнів з набряками гомілок та передньої черевної стінки. АТ160/105 мм рт.ст., протеїнурія 0,1 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Протеїнурія

б. Гіпертонічна хвороба

с. Еклампсія

д. Прееклампсія II ступеня

е. Нефропатія II ступеня

209. У хворого після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії фельдшера?

а. Ввести 20% розчин кофеїну

б. Ввести еуфілін

с. Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду

д. Покласти грілку

е. Ввести строфантин

210. Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об'єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка більш поширена у природних складках; носо-губний трикутник блідий. Про яке захворювання може подумати фельдшер?

а. Краснуха

б. Вітряна віспа

с. Менінгококова інфекція

д. Кіп

е. Скарлатина

211. У дитини 6-ти років при огляді шкіри фельдшер виявила папули та однокамерні везикули на всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який медичний препарат для

обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування повинен застосувати фельдшер?

- a. 5% розчин йоду
- b. 50% розчин анальгін
- c. 1% спиртовий розчин діамантового зеленого
- d. 30% розчин сульфацилу натрію
- e. 1% розчин димедролу

212. Бригада швидкої допомоги викликана до пацієнта 20-ти років, у якого після вживання несвіжих котлет з'явилися болі в епігастрії, блювання, пронос, підвищилась температура тіла до 37,8°C. Які дії фельдшера?

- a. Промивання шлунка, транспортування до інфекційного відділення
- b. Введення спазмолітиків
- c. Транспортування до терапевтичного відділення
- d. Виклик терапевта додому
- e. Призначення антибіотиків

213. Фельдшер ФАП у дає рекомендації по дієтичному харчуванню пацієнтці 54-х років, що страждає на цукровий діабет. Який стіл застосовують при лікуванні цукрового діабету?

- a. № 10
- b. № 15
- c. № 5
- d. № 7
- e. № 9

214. Хвора 24-х років відзначає відсутність менструації після медичного аборт у протягом 3-х місяців, раніше менструальна функція не порушувалася, гінекологічних захворювань немає. Під час огляду матка і додатки без особливостей. Про яку патологію йдеться?

- a. Синдром склерокістозних яєчників
- b. Ендо метріоз
- c. Аменорея (яєчникова форма)
- d. Синдром Шихана
- e. Аменорея (маткова форма)

215. Фельдшер швидкої допомоги на виклику у жінки 65-ти років з масивною кровотечею з піхви. В анамнезі рак шийки матки. Яка тактика фельдшера?

- a. Ввести кровоспинні засоби
- b. Ввести анальгетики
- c. Покласти холод на низ живота
- d. Провести тугу тампонаду піхви
- e. Ввести скорочуючі засоби

216. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на кашель вранці з виділенням гнійного харкотиння з неприємним запахом (до 200 мл), підвищення температури тіла до 37,8°C. При огляді пальці мають вигляд "барабанних паличок", а нігті "годинникових скелець". Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- a. Бронхоектатична хвороба
- b. Туберкульоз
- c. Пневмококіоз
- d. Плеврит
- e. Пневмонія

217. Фельдшера здоров'я пункту викликали до пацієнта з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки зі скаргами на блювання "кавовою гущею" на тлі посиленого болю. Об'єктивно: на чолі краплини поту. Рс130/хв., АТ70/50 мм рт.ст. Живіт м'який, болючий під час пальпації у надчревні ділянці. Що слід використати для надання невідкладної допомоги?

- a. Анальгін
- b. Папаверин

с. Натрію етамзилат

- d. Солкосерил
- e. Церукал

218. Фельдшер швидкої допомоги оглядає дівчинку 5-ти років. Півгодини тому дівчинку вжалила оса в ділянку шиї. Стан дитини під час огляду вкрай важкий: свідомість пригнічена, дихання поверхневе, ознаки прогресуючого брадикардічного та брадикардії. АТ60/40 мм рт.ст. Препаратом вибору для надання невідкладної допомоги буде:

- a. 20% натрію оксибутират
- b. 50% анальгін
- c. 0,06% корглікон
- d. 1% димедрол

e. 0,1% адреналін

219. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта, який скаржиться на біль у грудях, задишку. З анамнезу: багато років страждає на варикозне розширення вен, двічі був тромбофлебіт. Стан погіршився раптово після фізичного навантаження. Під час спілкування чоловік знепритомнів, не дихає, пульс на сонній артерії не визначається. Фельдшер констатував клінічну смерть і припустив, що причина її:

- a. Спонтанний пневмоторакс
- b. Інфаркт міокарда

с. Тромбоемболія легеневої артерії

- d. Травма грудної клітки
- e. Фібриляція шлуночків

220. У сімейну амбулаторію звернулася пацієнтка 50-ти років, яка впродовж декількох років страждає на цукровий діабет. Лікар призначив хворій підшкірне введення інсуліну в кількості 16 МО (1 мл інсуліну = 40 МО). Яку кількість інсуліну треба ввести пацієнтці?

- a. 0,6 мл
- b. 0,7 мл
- c. 0,9 мл
- d. 0,3 мл

e. 0,4 мл

221. Хвора 28-ми років знаходиться на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми. 1-2 рази на місяць спостерігаються напади ядухи з експіраторною задишкою, сухим кашлем, сльозотечею, нежиттю. Напад закінчується відходженням в'язкого склоподібного мокротиння. Які засоби необхідно призначити для профілактики нападів?

- a. Преднізолон внутрішньо

b. Інгаляції сальбутамолу

- c. Преднізолон внутрішньовенно
- d. Інгаляції фітонцидів
- e. Еуфілін внутрішньовенно

222. Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну D3:

- a. На 2-му місяці життя по 500 МО
- b. З 10-14-го дня по 500-1000 МО**
- c. З 10-го дня по 2000 МО
- d. З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- e. На 2-му тижні по 4000 МО

223. Фельдшер ФАПУ транспортує влітку породіллю. Пологи відбулися дорогою, 40 хвилин тому. Дитина знаходиться на животі матері, вкрита пелюшкою, стан її задовільний. Піднімає голову, відкриває широко рот, шукає груди матері. Яка подальша дія фельдшера буде доцільною?

- a. Провести профілактику офтальмії

b. Здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері

- c. Виміряти температуру тіла новонародженого
- d. Спостерігати за новонародженим
- e. Здійснити клеймування пуповини

224. Пацієнт 42-х років поскаржиться на кашель та виділення харкотиння 3 місяці поспіль. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?

a. Хронічний бронхіт

- b. Крупозна пневмонія
- c. Екссудативний плеврит
- d. Абсцес легенів
- e. Гострий бронхіт

225. Хворого ввечері і вночі турбував сильний свербіж, який супроводжувався появою на шкірі тулуба, шиї, стегон множинних уртикарних висипань. Вранці висипки вже не було.

Напередодні хворий вживав у їжу м'ясні консерви. Для якого захворювання характерні вище зазначені симптоми?

- a. Атопічний дерматит
- b. Себорейний дерматит
- c. Екзема
- d. Дерматит

e. Кропив'янка

226. Фельдшер здоров'я пункту швейної фабрики провів бесіду з робітницями стосовно профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози. Як часто повинна жінка проводити самообстеження молочних залоз?

- a. 1 раз на рік
- b. 1 раз у 3 місяці
- c. 1 раз в тиждень
- d. Кожного дня

e. 1 раз в місяць

227. Хвора 21-го року звернулась до фельдшера здоров'я пункту зі скаргами на підвищення температури тіла до 37,3°C, слабкість, пітливість, серцебиття, біль в ділянці серця, почервоніння та набряк колінних суглобів. Два тижні тому перенесла ангіну. Об'єктивно: на гомілках блідорожева кільцеподібна висипка. АТ110/70 мм рт.ст. Ліва межа серця на 0,5 см назовні від лівої середньоключичної лінії, на верхівці м'який систолічний шум. У крові: лейкоцити 10,2·10⁹/л, ШОЕ35 мм/год. Якою повинна бути вторинна профілактика даного захворювання після проведення курсу лікування у стаціонарі?

a. Аспірин навесні та восени

b. Біцилін-5 впродовж 5-ти років щомісяця

- c. Біцилін-3 при інтеркурентній інфекції
- d. Біцилін-5 впродовж 3-х років щомісяця
- e. Бензилпеніцилін навесні та восени

228. Дитина 10-ти років страждає на цукровий діабет I типу. Після ін'єкції інсуліну не поїла. На другому уроці раптово з'явилося відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала вологою. З чого слід почати надання допомоги на догоспітальному етапі?

- a. Ввести в/в преднізолон
- b. Госпіталізувати

c. Дати цукерку, солодкий чай

- d. Ввести в/м 25% р-н магнію сульфату
- e. Ввести підшкірно 0,1% р-н адреналіну

229. Під час проходження практики студент електромеханічного коледжу поранив передпліччя на токарному верстаті. З рани пульсуючою цівкою витікає кров. Як тимчасово зупинити кровотечу, щоб доставити потерпілого до лікарні?

a. Накласти кровоспинний джгут

- b. Накласти стискаючу пов'язку
- c. Провести тампонаду рани
- d. Накласти міхур з льодом
- e. Провести ПХО рани

230. Вранці при огляді дітей в дитячому садку виявили у 5-річної дівчинки папульозно-везикулярний висип на волосяній частині голови. Про яке захворювання слід подумати?

- a. Вітряна віспа**
- b. Скарлатина
- c. Краснуха
- d. Кір
- e. Менінгококова інфекція

231. У пацієнтки 19-ти років гострий бронхіт. Її турбує сухий кашель, температура тіла 37,2°C. Яку фізіотерапевтичну процедуру доцільно провести для полегшення стану пацієнтки?

- a. Використання міхура із льодом
- b. Застосування гірчичників**
- c. Гірудотерапія
- d. Застосування грілки
- e. Оксигенотерапія

232. До фельдшера ФАПу звернулась молода мати зі скаргами на закидання правого ока у дитини віком 1 місяць. Об'єктивно: слизові виділення з ока, сльозостояння та виділення гною через нижню сльозову крапку при натисканні у місці проекції сльозового мішка. Яка найбільш імовірна патологія зумовила таку клінічну картину?

- a. Дакріоцистит новонароджених**
- b. Блефарит новонароджених
- c. Ячмінь нижньої повіки
- d. Аденовірусний кон'юнктивіт
- e. Бактеріальний кон'юнктивіт

233. Пацієнту 46-ти років із виразковою хворобою шлунка фельдшер призначив ранітидин. До якої групи відноситься цей препарат?

- a. Блокатори протонної помпи
- b. Блокатори гістамінових H₂рецепторів**
- c. М-холіноблокатори
- d. β-адреноблокатори
- e. Симпатолітики

234. У першому періоді пологів роділья скаржиться на сильний біль у животі та попереку, тенезми. Перейми сильні, виникають через короткі проміжки, із частотою 6 впродовж 10 хвилин. Що повинен фельдшер ФАПу запропонувати роділлі до прибуття лікаря?

- a. Прийняти вертикальне положення тіла
- b. Вільне ходіння
- c. Лягти на спину
- d. Лягти на бік, що відповідає позиції плоду
- e. Лягти на бік, протилежний позиції плоду**

235. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, який 15 хвилин тому травмував колінний суглоб без пошкодження шкіри. Що слід використати в цьому випадку?

- a. Зігріваючий компрес
- b. Холодний компрес**
- c. Припарка
- d. Гарячий компрес
- e. Гірудотерапія

236. На ФАП доставлений пацієнт 50ти років з пупковою грижею, у якого після фізичного

навантаження виник раптовий біль у ділянці випинання, збільшення об'єму і напруження грижі, неможливість вправлення грижового вмісту в черевну порожнину. Яка тактика є найбільш доцільною в даному випадку?

- a. Обмежити прийом їжі
- b. Терміново госпіталізувати в хірургічне відділення**
- c. Надати лежачого положення
- d. Спокій
- e. Міхур з льодом на місце випинання

237. У вагітної 38 тижнів, на фоні різкого головного болю, погіршення зору, підвищення тиску до 180/120 мм рт.ст. і виражених набряків, виник напад судом. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пізній гестоз - прееклампсія
- b. Пізній гестоз - еклампсія**
- c. Пізній гестоз - протеїнурія
- d. Пізній гестоз - артеріальна гіпертензія
- e. Пізній гестоз - набряки

238. Фельдшер прийшов на патронаж до дитини віком 3 місяці. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отриманий результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

- a. 800 г
- b. 900 г
- c. 1000 г**
- d. 700 г
- e. 600 г

239. Фельдшеру швидкої допомоги надійшов виклик до хлопчика 4-х років. Об'єктивно: загальний стан порушений, дитина млява, неспокійна, температура тіла 39,7°C, ЧД- 32/хв., ЧСС140/хв. На шкірі спини, сідниць, стегнах, гомілкях спостерігаються геморагічні висипання неправильної "зірчастої" форми з некрозом в центрі. Яку невідкладну допомогу необхідно надати на догоспітальному етапі?

- a. Ввести супрастин, парацетамол, цефтріаксон
- b. Ввести сибазон, лазикс, парацетамол
- c. Ввести піпільфен, бензилпеніцилін, строфантин
- d. Ввести левоміцетин, преднізолон, анальгін**
- e. Ввести анальгін, димедрол, дексаметазон

240. До ФАПУ доставлений потерпілий 27-ми років після травми живота. Скарги на біль у животі, припинення виділення сечі, здуття живота. При пальпації живота відмічається напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. У черевній порожнині наявна рідина, яка переміщується при зміні положення хворого. З чим пов'язана проблема пацієнта?

- a. Гострий цистит
- b. Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура**
- c. Гострий апендицит
- d. Позачеревне ушкодження сечового міхура
- e. Гострий пієліт

241. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора зі скаргами на біль у суглобах кистей рук, "ранкову скутість". Об'єктивно: припухлість суглобів кистей рук, деформація їх у вигляді "ластів моржа". Яке дослідження треба зробити для уточнення діагнозу?

- a. УЗД
- b. Рентгенографія суглобів**
- c. Клінічний аналіз сечі
- d. ЕКГ
- e. Клінічний аналіз крові

242. Вдома у хлопчика 10-ти місяців, на тлі рахіту, при довготривалому плачі виникла зупинка

дихання. Незабаром дихання спонтанно відновилося. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Спазмофілія. Еклампсія
- b. Спазмофілія. Карпопедальний спазм
- c. Спазмофілія. Ларингоспазм**
- d. Гіпервітаміноз D
- e. Повець

243. Хвора 43-х років скаржиться на контактні піхвові кровотечі впродовж останніх 6-ти місяців. Бімануально: шийка матки збільшена у розмірі, обмежена у рухливості. У дзеркалах шийка матки у вигляді "цвітної капусти". Проби Хробака та Шиллера позитивні. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Рак шийки матки**
- b. Шийкова вагітність
- c. Лейкоплакія
- d. Фіброїд, що народжується
- e. Поліп шийки матки

244. До фельдшера звернулася жінка 40-ка років із скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, переймоподібні болі в нижніх відділах живота, мізерні випорожнення більше 10 разів із слизом та кров'ю, тенезми. Хворіє другий день. Об'єктивно: температура 38°C, язик обкладений білим нальотом. Пальпується спазмована болюча сигмоподібна кишка. Який діагноз запідозрить фельдшер?

- a. Сальмонельоз
- b. Іерсиніоз
- c. Диспепсія
- d. Шигельоз**
- e. Ешерихіоз

245. До ФАПУ звернулася пацієнтка 28-ми років, якій призначено напівспиртовий зігрівальний компрес на ліктьовий суглоб. На який час необхідно накласти компрес?

- a. 6-8 годин**
- b. 4-5 годин
- c. 1 година
- d. 2-3 години
- e. 10-12 годин

246. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 29-ти років, який в зв'язку із загостренням хронічного тонзиліту приймав антибіотики. Раптово підвищилась температура тіла, з'явився біль у суглобах, животі, на шкірі з'явилась геморагічна висипка з характерним симетричним розташуванням елементів, особливо на нижніх кінцівках. Відзначає червоний колір сечі. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Амілоїдоз нирок
- b. Геморагічний васкуліт**
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Гострий цистит
- e. Гострий гломерулонефрит

247. Фельдшер ФАПУ спостерігає за осередком туберкульозної інфекції. Дитині 10-ти років проведена туберкулінова проба Манту. Які результати свідчать про позитивну пробу у дитини?

- a. Папула 3 мм
- b. Гіперемія 10 мм
- c. Папула 20 мм
- d. Гіперемія 5 мм
- e. Папула 6 мм**

248. До ФАПУ звернувся потерпілий, який декілька днів тому отримав відмороження ступнів. При обстеженні пацієнта спостерігається некроз усіх шарів шкіри, утворюються пухирі з кров'янистим вмістом. Який це ступінь відмороження?

a. III

b. II

c. IV

d. III 6

e. I

249. На ФАПі дитині 5-ти місяців зроблено щеплення вакциною "пентаксим". Стан дитини різко погіршився. На шкірі з'явилася кропив'янка, пульс слабкий, артеріальний тиск падає. Який препарат фельдшер буде вводити в першу чергу?

a. 3% розчин преднізолону

b. 2,4% розчин еуфіліну

c. 0,1% розчин адреналіну

d. 2% розчин супрастину

e. 10% розчин глюконату кальцію

250. До ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. Об'єктивно: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Визначити подальшу тактику фельдшера:

a. Направити до відділення патології вагітності

b. Направити на УЗД

c. Направити до дільничного гінеколога

d. Направити в гінекологічне відділення

e. Направити до терапевта

251. До пацієнтки 45-ти років, яка скаржиться на головний біль в ділянці потилиці, нудоту, одноразове блювання, що з'явилися після сварки з чоловіком, викликали фельдшера ФАПу. Об'єктивно: збудження, червоні плями на обличчі, шиї, Ps110/хв, АТ180/110 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

a. Гіпертонічний криз II типу

b. Інфаркт міокарда

c. Напад стенокардії

d. Гіпертонічний криз I типу

e. Харчове отруєння

252. Фельдшер ФАПу, прибулий на місце події, діагностував у потерпілого 28-ми років відкритий перелом кісток тазу з ушкодженням сечового міхура. З чого слід почати невідкладну допомогу?

a. Транспортна іммобілізація

b. Введення знеболюючих засобів

c. Катетеризація сечового міхура

d. Проведення туалету рани

e. Накладання асептичної пов'язки

253. У дитини після гри з кішкою на волосистій ділянці голови виникло вогнище, вкрите дрібними лусочками. Волосся повністю обламане на висоті 3-5 мм над рівнем шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

a. Поверхнева трихофітія

b. Псоріаз

c. Себорейна екзема

d. Мікроспорія

e. Парша

254. Хворий 23-х років поскаржився фельдшеру ФАПу на спрагу, слабкість, схуднення, апатію, сонливість, втрату апетиту. В останні дні з'явився свербіж шкіри, запах ацетону з рота. Яке додаткове дослідження допоможе встановити діагноз?

a. Загальний аналіз крові

b. Аналіз калу на яйця глистів

c. Глюкозо-толерантний тест

d. Аналіз крові на цукор натще

e. Загальний аналіз сечі

255. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, якому багаторазово вводили внутрішньовенно ліки. Скаржиться на біль, гіперемію, наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення?

a. Флебїт

b. Інфільтрат

c. Некроз

d. Сепсис

e. Гематома

256. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

a. Лімфангоїт

b. Правець

c. Флегмона

d. Бешиха

e. Лімфаденїт

257. Фельдшера викликали до хворого на бронхіальну астму, у якого вчора почався напад експіраторної задишки. Стан тяжкий. Застосування інгаляторів не дає полегшення. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Гострий бронхіт

b. Крупозна пневмонія

c. Астматичний стан

d. Емфізема легень

e. Серцева астма

258. Під час активного патронажу дівчинки 12-ти місяців мати звернулась із запитанням до фельдшера ФАПу: "Скільки зубів повинно бути у її дитини"? Дайте відповідь:

a. 12

b. 13

c. 4

d. 8

e. 6

259. До фельдшера ФАПу звернулась жінка 60-ти років зі скаргами на маткову кровотечу після 10-ти років менопаузи. На який додатковий метод дослідження слід направити жінку для уточнення діагнозу?

a. УЗД

b. Біопсія шийки матки

c. Діагностичне вишкрібання матки

d. Пункція черевної порожнини

e. Кольпоскопія шийки матки

260. Хвора скаржиться на біль, почервоніння в ділянці лівої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,2°C. В ділянці лівої гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Флегмона

b. Бешиха

c. Лімфангоїт

d. Фурункульоз

e. Гострий тромбофлебїт

261. Фельдшер швидкої медичної допомоги за призначенням лікаря ввів пацієнту в/в

струменево 25% розчин магнію сульфату. Під час венепункції була здійснена наскрізна перфорація вени. Вкажіть можливе ускладнення:

- a. Інфільтрат
- b. Тромбофлебіт
- c. Повітряна емболія
- d. Гематома**
- e. Некроз

262. Фельдшер ШМД бере участь у проведенні непрямого масажу серця дитині 2-х років. Виконує поштовхоподібні натискування на груднину для компресії серця між грудниною та хребтом. Вкажіть, на яку глибину потрібно проводити натискання груднини цій дитині?

- a. 2,5 3 см
- b. 2 2,5 см
- c. 1,5 2 см**
- d. 3 3,5 см
- e. 3,5 4 см

263. Мати з дитиною 5-ти місяців на прийомі у фельдшера ФАПУ. Проведена антропометрія. Дефіцит маси тіла 16%. Підшкірна основа збережена на обличчі та кінцівках. Товщина підшкірної основи в ділянці пупочного кільця складає 0,8 см. Тургор та еластичність шкіри знижені. Сон і апетит незначно порушені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гіпотрофія I ст.**
- b. Гіпотрофія III ст.
- c. Нормотрофія
- d. Паратрофія
- e. Гіпотрофія II ст.

264. Фельдшера ШМД викликали до пацієнта 44-х років, який скаржиться на появу раптового відчуття болю у животі, який він характеризує, як удар ножем. В анамнезі: виразкова хвороба. Об'єктивно: обличчя бліде, на чолі холодний піт. Живіт дещо втягнутий. Під час пальпації: передня черевна стінка різко напружена, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Шлункова кровотеча
- b. Печінкова коліка
- c. Перфоративна виразка**
- d. Стеноз воротаря
- e. Гострий панкреатит

265. У пацієнта 18-ти років, що хворіє на ревматизм з мітральним стенозом, після гри у футбол з'явилися задишка, виділення рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: над легенями вислуховуються дрібнота середньопухирчасті вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Гостра судинна недостатність
- b. Легенева кровотеча
- c. Шлунково-кишкова кровотеча
- d. Гостра лівошлуночкова недостатність**
- e. Гостра дихальна недостатність

266. До фельдшера ФАПУ на чергову явку звернулась вагітна в терміні 34 тижні. Який документ обов'язково повинна мати при собі вагітна?

- a. Індивідуальна карта вагітної і породіллі
- b. Паспорт
- c. Обмінна карта**
- d. Довідка про вагітність
- e. Результати обстеження на ВІЛ/СНІД

267. На сьомий день життя в новонародженій дитині після сечовипускання на памперсі залишилися плями жовтувато-цегляного кольору. Загальний стан дитини задовільний. Який

найбільш імовірний діагноз?

- a. Транзиторний катар кишечника
- b. Транзиторна гарячка
- c. Сечокислий інфаркт нирок**
- d. Токсична еритема
- e. Статевий криз

268. До фельдшера здоров'я звернулася пацієнтка 46-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, з проханням ввести їй інсулін. Яку пораду фельдшер повинен дати хворій після ін'єкції інсуліну?

- a. Спокій
- b. Прийняти заспокійливе
- c. Лужне пиття
- d. Випити відвар шипшини
- e. Прийняти їжу**

269. До ФАПУ звернулася жінка 50-ти років, у якої після вживання смаженої їжі та алкоголю з'явився сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, що супроводжується нудотою, багаторазовим блюванням, яке не приносить полегшення. Симптоматика якого захворювання спостерігається?

- a. Ентероколіт
- b. Виразковий езофагіт
- c. Гострий холецистит
- d. Виразкова хвороба шлунка
- e. Гострий панкреатит**

270. Фельдшер ШМД з лікарем приймального покою визначає групу крові хворого за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Аглютинація не відбулась. Яка група крові у пацієнта?

- a. А (II)
- b. АВ (IV)
- c. Помилка при визначенні
- d. 0 (I)**
- e. В (III)

271. У жінки 25 років маткова кровотеча нез'ясованого походження. АТ90/50 мм рт.ст. Який перший захід невідкладної долікарської допомоги треба провести під час транспортування хворої до стаціонару?

- a. Покласти холод на низ живота**
- b. Мобілізувати вену для інфузії кровозамінників
- c. Ввести скорочуючі матку засоби
- d. Ввести кровоспинні засоби
- e. Ввести хлористий кальцій

272. Фельдшера ШМД викликали на пологи, що відбулися на дому. Роділля народила живого доношеного хлопчика масою 4000 г. Плацента виділилася самостійно, з усіма дольками і оболонками. Крововтрата у пологах близько 200 мл. Матка періодично розслабляється, зі статевої щілини виділяється кров зі згортками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?

- a. Гіпотонічна маткова кровотеча**
- b. Розрив матки
- c. Кровотеча у зв'язку з порушенням зсідання крові
- d. Розрив шийки матки
- e. Атонічна маткова кровотеча

273. Оберіть еубіотики для лікування дисбактеріозу у дитини, хворої на ексудативно-катаральний діатез:

- a. Тазапам, сибазон
- b. Тималін, тимазин

с. Ессенціале, карсил

d. Біфікол, лактобактерин

е. Кларитин, тавегіл

274. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 30-ти років зі скаргами на почервоніння шкіри обличчя та сильний свербіж. Дані скарги з'явилися 12 годин тому, після використання косметичної маски. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Токсикодермія

b. Екзема

с. Дерматит

d. Нейродерміт

е. Псоріаз

275. Фельдшер ФАПУ отримав виклик до пацієнта, у якого розвинулась гіпоглікемічна кома. Який препарат є препаратом вибору для надання невідкладної допомоги?

a. Кордіамін

b. Мезатон

с. Інсулін

d. Астмопент

е. 40% розчин глюкози

276. Фельдшера здоровпункту викликали до слюсаря, який щойно отримав травму лівої кисті на токарному верстаті. Об'єктивно: на долоні лівої кисті рвана рана 3х5 см, сильно кровоточить. Який першочерговий захід треба виконати в даному випадку?

a. Обробити антисептиком

b. Накласти джгут на плече

с. Прикласти холод

d. Накласти джгут на передпліччя

е. Ампутувати кисть

277. Хворий 27-ми років, який упав на витягнуту праву верхню кінцівку, скаржиться на біль і неможливість активних рухів та різке обмеження пасивних рухів у правому плечовому суглобі. Об'єктивно: правий плечовий суглоб деформований, його контури згладжені, є параартикулярний набряк. Кінцівка фіксована у вимушеному положенні (відведена вбік). Ушкоджене плече довше. На місці головки правого плеча западина. Яку іммобілізаційну пов'язку слід накласти на ушкоджену кінцівку?

a. Кільця Дельбе

b. Пращеподібна пов'язка

с. Восьмиподібна пов'язка

d. Шина Крамера

е. Шина Дітерікса

278. Дитина стала дратівливою, млявою, швидко втомлюється, втрачає апетит, худне, температура субфебрильна, реакція Манту з 2 ТО 8 мм. Для клініки якого захворювання характерні ці симптоми?

a. Ревматична лихоманка

b. Рання туберкульозна інтоксикація

с. Позалікарняна пневмонія

d. Аденовірусна інфекція

е. Грип

279. У роділлі яка народжує вдруге, наприкінці I періоду пологів після відходження навколоплідних вод виникли ядуха, кашель, біль за грудниною, страх. Надайте допомогу:

a. Епізіотомія

b. Кесарів розтин

с. Накладання акушерських щипців

d. Перінеотомія

е. Краніотомія

280. Скільки разів на день та впродовж якого часу проводиться кварцування та провітрювання перев'язувального кабінету хірургічного відділення?

- a. 2 рази на день по 15-20 хвилин
- b. 4 рази на день по 15-20 хвилин**
- c. 3 рази на день по 15-20 хвилин
- d. 1 раз на день по 5-10 хвилин
- e. 3 рази на день по 5-10 хвилин

281. Хвора скаржиться на часте і болісне сечовипускання. Захворіла гостро, захворювання пов'язує з переохолодженням. У сечі: лейкоцити, білок, поодинокі еритроцити. Що можна запідозрити у хворой?

- a. Гострий цистит**
- b. Сечокам'яна хвороба
- c. Гідронефроз
- d. Піонефроз
- e. Гострий пієлонефрит

282. Пацієнт 60-ти років з цирозом печінки висловлює скарги на слабкість, холодний піт, запаморочення, випорожнення чорного кольору. Вдома короткочасно знепритомнів. Об'єктивно: Рс102/хв., АТ90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пухлина товстої кишки
- b. Кровотеча з розширених вен стравоходу**
- c. Пухлина шлунку
- d. Виразка дванадцятипалої кишки, що кровоточить
- e. Кровотеча з пухлини легенів у фазі розпаду

283. На ФАП надійшов пацієнт 20-ти років, який отримав удар у нижню щелепу, зі скаргами на біль при відкриванні рота, рясне слиновиділення з домішкою крові. Об'єктивно: прикус порушений. Під час пальпації та перкусії болісність кута нижньої щелепи, набряклість м'яких тканин, обмеження рухів. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Відкритий перелом нижньої щелепи**
- b. Вивих нижньої щелепи
- c. Забій м'яких тканин ділянки нижньої щелепи
- d. Підвивих нижньої щелепи
- e. Закритий перелом нижньої щелепи

284. На ФАП звернувся пацієнт, прооперований у хірургічному відділенні місяць тому з приводу перфоративної виразки 12-палої кишки. Скарги на різкі нападоподібні болі у животі, які тривають близько години, багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт під час нападу. Живіт м'який, болісний у всіх відділах. Стулу не було. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- a. Рецидив виразкової хвороби 12палої кишки
- b. Перитоніт
- c. Абсцес черевної порожнини
- d. Метеоризм
- e. Спайкова кишкова непрохідність**

285. Фельдшера ШМД викликали до хворого, який знаходиться у вкрай важкому стані. Скарги на пронос і блювання протягом 2-х днів. Випорожнення по типу "рисового відвару". Об'єктивно: риси обличчя загострені, очі запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки. Температура 35,5°C, пульс ниткоподібний. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Колі-ентерит
- b. Холера**
- c. Харчова токсикоінфекція
- d. Дизентерія
- e. Сальмонельоз

286. Дитині 10 днів. Періодично відмічається зригування після годування грудьми. Яка

анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

- a. Підвищена секреторна активність шлунку
- b. Знижена секреторна активність шлунку
- c. Підвищена перистальтика шлунку
- d. Слабкість кардіального сфінктера шлунку**
- e. Довга, пухка брижа

287. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 39-ти років зі скаргами на свербіж шкіри, який з'явився одночасно з висипкою і значно посилюється увечері та вночі. З анамнезу: 10 днів тому прибув з відрядження, де проживав у гуртожитку. Об'єктивно: на шкірі живота, сідниць, променевозап'ясткових суглобів та бокових поверхонь пальців рук парні папуловезикулярна висипка із кров'яними кірочкам. Який попередній діагноз?

- a. Короста**
- b. Кропив'янка
- c. Пруриго
- d. Токсикодермія
- e. Екзема

288. До фельдшера ФАПу звернувся постраждалий на 4 добу після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна. Стан постраждалого раптово став погіршуватись. Скарги на розпираючий біль у рані в середній третині стегна. Біль посилюється за останні 12 годин. Набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38,2°C, Ps102/хв. Краї рани зяють, тьмяні, м'язи вибухають у рані, при захваті пінцетом тканини розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані?

- a. Аеробна грампозитивна інфекція
- b. Дифтерія рани
- c. Аеробна грамнегативна інфекція
- d. Гнильна інфекція

e. Анаеробна інфекція

289. Дитині 3 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, розлади сну, погіршення апетиту, часті та болісні сечовипускання, нетримання сечі. Сеча каламутна, з осадом і пластівцями. Першочерговим дослідженням у комплексі діагностичних заходів буде:

- a. Цистоскопія
- b. Мікційна цистографія
- c. Рентгеноурологічне
- d. Екскреторна урографія

e. УЗД нирок

290. На ФАП звернувся хворий 42-х років зі скаргами на гарячку до 39°C, біль у правій половині грудної клітки, який посилюється під час глибокого дихання, кашлю (кашель з виділенням "іржавого"харкотиння), виражену кволість, пітливість. У крові: лейкоцитоз 15,2·10⁹/л, ШОЕ37 мм/год. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Вогнищева пневмонія
- b. Крупозна пневмонія**
- c. Бронхоектатична хвороба
- d. Плеврит
- e. Абсцес легень

291. Після ДТП у потерпілого з носа, носоглотки і вух витікає спинномозкова рідина, позитивний симптом окулярів. Яке ушкодження потрібно запідозрити у хворого?

- a. Перелом основи черепа**
- b. Забій мозку
- c. Перелом склепіння черепа
- d. Стиснення мозку
- e. Струс мозку

292. На ФАП доставлений хворий зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість,

біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому обприскував город хлорофосом. Діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який патогенетичний антидот найдоцільніше застосувати?

a. Розчин атропіну сульфату 0,1%

- b. Розчин тіосульфату 20%
- c. Розчин натрію гідрокарбонату 3%
- d. Антидот Стрижевського
- e. Розчин унітіолу 5%

293. Пацієнт скаржиться на виражений біль та порушення функції вказівного пальця лівої кисті. Захворів 4 дні назад після того, як проколов палець кісткою під час чищення риби. За допомогою не звертався. Біль постійно наростає, а останню ніч позбавив хворого сну. При огляді лівий вказівний палець набряклий, гарячий на дотик, гіперемований, болючий. Яке лікування доцільно провести хворому?

a. Превентивне

b. Оперативне

- c. Фізіотерапевтичне
- d. Консервативне
- e. Комплексне

294. Фельдшера викликали на місце ДТП. Нижні кінцівки потерпілого були придавлені перевернутим автомобілем впродовж години. З якого заходу треба починати надавати першу допомогу?

- a. Транспортна іммобілізація кінцівок
- b. Обкладання кінцівок льодом
- c. Туге бинтування еластичними бинтами від периферії до центру

d. Введення наркотичних анальгетиків та серцевих засобів

e. Накладання асептичних пов'язок на кінцівки

295. Фельдшер ШМД прибув на виклик до вагітної 30-ти років. Вагітність I, 41 тиждень. Яка тактика фельдшера буде найбільш доцільною в даному випадку?

a. Госпіталізація вагітної до обсерваційного відділення пологового будинку

- b. Направити вагітну до гінекологічного відділення
- c. Очікувальна тактика фельдшера
- d. Негайне розродження
- e. Направити вагітну на планове УЗД

296. Хвора на прийомі у фельдшера ФАПу раптово втратила свідомість, впала. З'явилися тонічні судоми, які через 10 секунд змінилися клонічним. Дихання стало хриплим, з рота виділилась піна, відмічається мимовільне сечовипускання. Напад тривав 3 хвилини. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Епілепсія

- b. Епістатус
- c. Пухлина скроневої ділянки
- d. Шизофренія
- e. Істеричний припадок

297. Під час виклику ШМД пацієнту призначено в/в крапельне введення ліків. Фельдшер повинен пам'ятати, що оптимальна температура інфузійного розчину повинна становити:

- a. 15-20°C
- b. 30-35°C
- c. 18-20°C

d. 20-25°C

e. 20-30°C

298. Потерпілий отримав ножове поранення грудної клітки. Об'єктивно: стан важкий, АТ100/60 мм рт.ст., Ps100/хв., задишка, ціаноз. У п'ятому міжребер'ї справа по передній поверхні різана рана розміром 3х2 см., з якої під час видиху виділяється піниста кров. Діагностований відкритий пневмоторакс. Який вид невідкладної допомоги необхідно надати потерпілому на

догоспітальному етапі?

- a. Туга тампонада рани
- b. Спіральна пов'язка
- c. Киснева подушка
- d. Оклюзійна пов'язка**
- e. Кровоспинні препарати

299. Потерпіла 45-ти років була збита автомашиною. Зі слів супроводжуючих, перебувала без свідомості 57 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: обличчя бліде, Рс92/хв., АТ135/85 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Перелом основи черепа
- b. Забій головного мозку
- c. Струс головного мозку**
- d. Перелом склепіння черепа
- e. Здавлення головного мозку

300. Фельдшер на виклику у заміжньої жінки, яка скаржиться на періодичні переймоподібні болі у здухвинній ділянці, затримку менструації. Після фізичного навантаження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

- a. Прогресуюча позаматкова вагітність
- b. Апоплексія яєчника
- c. Порушена позаматкова вагітність**
- d. Перекрут ніжки кісти
- e. Розрив піосальпінкса

301. У дитини 2-х років температура 38°C, кволість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Ці симптоми свідчать про наявність у дитини такого захворювання:

- a. Бронхіальна астма
- b. Гострий бронхіт
- c. Гострий ларингіт
- d. Назофарингіт
- e. Гостра пневмонія**

302. Хворий 41-го року зловживає алкоголем близько 7-ми років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу, занепокоєння, почав бачити мух та павуків, які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з'явилися кури, пацюки, маленькі чоловічки. Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі та просторі не орієнтований. Який стан розвинувся у хворого?

- a. Шизофренія
- b. Епілептичний психоз
- c. Маніакально-депресивний психоз
- d. Старечий параноїд
- e. Алкогольний делірій**

303. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік, який скаржиться на загальну слабкість, безсоння, схуднення, гемороїдальні кровотечі. Шкіра жовтянична. На шкірі живота "голова медузи". Асцит. На ногах набряки. Добовий діурез 500 мл. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- a. Хронічний гепатит
- b. Хронічний ентерит
- c. Хронічний холецистит
- d. Цироз печінки**
- e. Хронічний панкреатит

304. До приймального відділення доставлено хворого з підозрою на перфорацію виразки шлунка. Який із методів діагностики може підтвердити діагноз?

- a. УЗД черевної порожнини
- b. Рентгеноскопія та рентгенографія шлунка з контрастом
- c. Реографія
- d. Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні**
- e. Іригоскопія

305. Яке із захворювань прямої кишки відноситься до передракових станів і підлягає обов'язковому диспансерному спостереженню та лікуванню?

- a. Нориця
- b. Стриктури анального отвору
- c. Тріщини прямої кишки
- d. Геморой
- e. Поліп прямої кишки**

306. Контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет залишків миючого засобу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства здійснює за допомогою такого методу:

- a. Ортотулоїдиновий
- b. Амідопіриновий
- c. Фенолфталеїновий**
- d. Бензидиновий
- e. Азопірамовий

307. На виробництві робітник отримав рану грудної клітки. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, різкий біль в місці ушкодження, задишку, кашель. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, АТ70/60 мм рт.ст. В ділянці рани чути хлюпотіння. Про наявність якого невідкладного стану свідчать ці ознаки?

- a. Відкритий пневмоторакс**
- b. набряк легенів
- c. Закритий пневмоторакс
- d. Кардіогенний шок
- e. Перелом ребер

308. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 1 місяць. Мати скаржиться на зникнення грудного молока. Дитину необхідно перевести на штучне вигодовування. Маса тіла при народженні 2900 гр. Вкажіть добову кількість молока (за об'ємним методом):

- a. 700 мл**
- b. 650 мл
- c. 750 мл
- d. 600 мл
- e. 500 мл

309. Каретою швидкої допомоги доставлена у пологовий будинок роділля 40 тижнів. Пологової діяльності немає. Дві години тому почалася значна кровотеча, яка продовжується дотепер. Дослідження піхви: шийка згладжена, відкриття на 1 см; внутрішній зів повністю закритий губчастою тканиною, значна кровотеча. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гіпотонічна кровотеча
- b. Центральне передлежання плаценти**
- c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- d. Бічне передлежання плаценти
- e. Шийкова вагітність

310. Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників, їх товариш, який працював з електричним обладнанням, крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. Об'єктивно: затиснутий в руці оголений електричний провід, що звисає зі станка. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Першочерговість дій фельдшера:

- a. Дефібриляція**

b. Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію

- c. Ввести протигістамінні препарати
- d. Дати вдихнути нашатирний спирт
- e. Знеболити, транспортувати до хірургічного відділення

311. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом стали болючі перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий під час пальпації. Положення плода поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плода приглушене 16/хв. Яке ускладнення виникло у пологах?

a. Центральне передлежання плаценти

b. Загроза розриву матки

- c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- d. Повний розрив матки
- e. Розрив промежини

312. У хворої 50-ти років із раком шийки матки виникла профузна кровотеча. До хворої викликали фельдшера ФАПу. Яку допомогу потрібно надати?

- a. Перетиснути черевну аорту
- b. Накласти шов на шийку матки

c. Провести тугу тампонаду піхви

- d. Ввести но-шпу внутрішньом'язово
- e. Ввести тампон із ефіром

313. У пацієнта 18-ти років II стадія гарячки. Він збуджений, на щоках рум'янець, марить, температура тіла 40°C, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу потрібно подбати при догляді за хворим?

- a. Надати горизонтального положення хворому
- b. Подати міхур з льодом
- c. Подати грілку
- d. Провітрити палату

e. Створити індивідуальний пост

314. Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим необхідно обробляти елементи висипки?

a. 1-2% спиртовий розчин діамантового зеленого

- b. Дитячий крем
- c. Елементи висипки не обробляють
- d. Переварена вода
- e. 3% розчин перекису водню

315. Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнта 67-ми років. Об'єктивно: у пацієнта відсутні рефлекси на зовнішні подразники, спостерігаються розлади функцій органів дихання та серцево-судинної системи. Назвіть стан пацієнта:

a. Колаптоїдний

b. Коматозний

- c. Сопорозний
- d. Ступорозний
- e. Шоковий

316. У хворого 32-х років сечокам'яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?

a. Помістити в гарячу ванну

- b. Провести катетеризацію
- c. Поставити холодний компрес на гомілки
- d. Поставити гірчичники на гомілки
- e. Помістити в прохолодну ванну

317. У пацієнта 45-ти років спостерігається ранкова скутість у дрібних суглобах кистей рук. Об'єктивно: суглоби деформовані ("ласти моржа"), шкіра над ними набрякла та гіперемована. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Ревматичний артрит
- b. Гонорейний артрит
- c. Деформуючий артроз
- d. Хвороба Бехтерева

e. Ревматоїдний артрит

318. До ФАПу звернувся хворий 55-ти років зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6 місяців. Проноси чергуються із закрепками, незначна кровотеча. В останні дні з'явився біль у промежині. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив горбисте ущільнення, малорухоме під час пальпації. Який попередній діагноз?

- a. Поліп прямої кишки
- b. Конділома прямої кишки
- c. Тріщина прямої кишки
- d. Геморой

e. Рак прямої кишки

319. До фельдшера здоров'я звернулася жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва, затримку менструації, запаморочення, нудоту, блювання. При огляді: шкіра бліда, АТ90/60 мм рт.ст. Пульс частий, слабого наповнення. Яку невідкладну допомогу повинен надати фельдшер?

a. Направити на УЗД

b. Покласти холод та госпіталізувати

- c. Промити шлунок
- d. Ввести знеболюючі препарати
- e. Направити в жіночу консультацію

320. До фельдшера ФАПу звернулася мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання у дитини "фонтаном" без домішки жовчі, погану прибавку маси тіла. Блювання з'явилося з 10-го дня після народження, має кислий характер, за об'ємом більше, ніж висмоктує молока дитина. При огляді живота з'являється симптом "піщового годинника". Яке захворювання у дитини?

a. Пілоростеноз

- b. Диспепсія
- c. Виразкова хвороба
- d. Гострий гастрит
- e. Пілороспазм

321. Фельдшер проводить спостереження за розвитком здорової дитини та планує профілактичні щеплення. Для профілактики гемофільної інфекції слід застосувати вакцину:

- a. Приорікс
- b. Інфанрікс

c. Хіберікс

- d. БЦЖ
- e. Імовакс Поліо

322. Пацієнт 48-ми років звернувся зі скаргами на стискаючий біль у ділянці серця, що виникає на тлі фізичного навантаження, оніміння 4-5 пальців лівої руки. На ЕКГ: зміщення сегменту ST нижче ізолінії, негативний зубець Т. Після больового нападу змін на ЕКГ немає. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Стенокардія

- b. Гостра серцева недостатність
- c. Стенокардія напруги
- d. Гостра судинна недостатність
- e. Інфаркт міокарда

323. У дитини 2-х місяців у пахвинній ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня

шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Пітниця
- b. Везикулопустульоз
- c. Попрілості III ступеня**
- d. Попрілості I ступеня
- e. Пухирчатка новонародженого

324. Пацієнту 70-ти років з аденомою передміхурової залози необхідно промивати постійний катетер Померанцева. Який розчин повинен використати фельдшер з метою запобігання висхідної інфекції?

- a. 3% перекису водню
- b. 0,9% натрію хлориду
- c. 2% гідрокарбонату натрію
- d. Фурациліну 1:5000**
- e. 6% перекису водню

325. В цеху на підприємстві працівник 32-х років 15 хвилин тому поранив ліве передпліччя. З рани фонтаном витікає кров яскраво-червоного кольору. Стан хворого середньої важкості, Рс100/хв., АТ90/60 мм рт.ст. Які першочергові дії фельдшера при наданні невідкладної допомоги?

- a. Накласти міхур з льодом на рану
- b. Накласти тугу стискаючу пов'язку на рану
- c. Провести тугу тампонаду рани
- d. Накласти артеріальний джгут Есмарха на нижню третину плеча**
- e. Лігувати судину в рані

326. Фельдшер ФАПУ проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції поперечного положення плоду?

- a. Зліва на рівні пупка**
- b. Справа нижче пупка
- c. Справа вище пупка
- d. Зліва нижче пупка
- e. Справа на рівні пупка

327. До фельдшера здоров'я пункту підприємства звернулася жінка 45-ти років зі скаргами на кашель із виділенням невеликої кількості слизистогнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37, 8°C, загальну слабкість. Хворіє впродовж 4-х діб. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Перкуторно ясний легеневиий звук; аускультативно вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені. Рентгенологічно ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний бронхіт
- b. Бронхоектатична хвороба
- c. Гостра шпитальна пневмонія
- d. Гострий бронхіт
- e. Гостра позашпитальна пневмонія**

328. На ФАП доставлено хворого 45ти років із скаргами: біль у епігастрії з подальшим переміщенням у праву здухвинну ділянку, нудота, одноразове блювання. Позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга, Сітковського. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий холецистит
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий апендицит**
- d. Защемлена грижа
- e. Гостра кишкова непрохідність

329. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 49-ти років, який скаржиться на підвищення температури тіла, біль у ділянці серця, задишку. Хворіє останні три дні. Захворювання пов'язує

з перенесеною 2 тижні тому ангіною. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові чисті. Мигдалики збільшені, пухкі. Тони серця ритмічні. Систолічний шум на верхівці. Який попередній діагноз?

а. Хронічний тонзиліт, загострення

б. Гостра ревматична лихоманка

с. Ревмокардит

д. Міокардит

е. Перикардит

330. На ФАП звернувся хворий 57-ми років, працює бурильником. Скаржиться на ниючий біль у кистях, який турбує уночі, відчуття "повзання мурашок", мерзлякуватість кистей, головний біль, поганий сон, зниження працездатності. Крім того, зазначає побіління пальців після миття рук холодною водою. Яке захворювання можна запідозрити?

а. Інтотоксикаційна полінейропатія

б. Вібраційна хвороба

с. Діабетична полінейропатія

д. Синдром Рейно

е. Реактивний артрит

331. Потерпілий упав з мотоцикла і вдарився лівим плечем о бордюр. Об'єктивно: плечовий суглоб деформований, кінцівка знаходиться у вимушеному положенні, приведена до тулуба, активні рухи в плечовому суглобі відсутні. На яке ушкодження вказують ці симптоми?

а. Розрив м'язів

б. Розтягнення зв'язок суглоба

с. Вивих плеча

д. Забій м'яких тканин

е. Перелом плеча

332. У флаконі 1,0 г цефтриаксону, його розвели 5 мл. ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

а. 5 мл

б. 1,5 мл

с. 3 мл

д. 2 мл

е. 4 мл

333. На ФАП звернулась вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперекової ділянці. Загальний стан не порушений. АТ120/80 мм рт.ст. на обох руках. Рс82/хв., ритмічний. Об'єктивно: тіло матки в підвищеному тонусі, чутливе під час пальпації. Який попередній діагноз?

а. Загроза розриву матки

б. Загроза викидня

с. Загроза передчасних пологів

д. Викидень, що розпочався

е. Викидень у розпалі

334. Фельдшер ШМД доставив хворого з підозрою на внутрішню кровотечу внаслідок розриву селезінки. Групу крові визначили за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Через 2,53 хвилини оцінили результат: реакція аглютинації відбулась з цоліклоном анти-А, з анти-В відсутня. Яка група крові у хворого?

а. А(II)

б. В(III)

с. Помилка при визначенні групи

д. АВ(IV)

е. 0(I)

335. Фельдшер швидкої допомоги транспортує до стаціонару пацієнтку, в якій почалося блювання у вигляді "кавової гущі". Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнтці?

a. Покласти на епігастральну ділянку міхур з льодом

- b. Промити шлунок
- c. Дати випити теплового чаю
- d. Посадити пацієнтку
- e. Застосувати теплу грілку

336. Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином перексиду водню. Чим потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

a. 0,5% розчин нашатирного спирту

b. Стерильний ізотонічний розчин

- c. Розчин фурациліну 1:5000
- d. Дистильована вода
- e. 2% розчин натрію гідрокарбонату

337. При виконанні фельдшером швидкої допомоги внутрішньовенного вливання 10% розчину кальцію хлориду пацієнт 53-х років відчув пекучий біль у місці ін'єкції. Що повинен зробити фельдшер?

a. Обколоти місце ін'єкції 2,4% розчином еуфіліну

b. Обколоти місце ін'єкції 0,5% розчином новокаїну

- c. Прикласти міхур з льодом
- d. Ввести у місце ін'єкції 0,1% розчин адреналіну
- e. Вище місця ін'єкції накласти джгут

338. У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із переліченого є першочерговим при наданні невідкладної допомоги?

- a. Дати кисень
- b. Виміряти артеріальний тиск

c. Ввести роторозширювач та зафіксувати язик

- d. Дати наркоз
- e. Ввести еуфілін

339. Жителька села звернулась дофельдшера ФАПУ зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри та сухість, схильність до фурункульозу. До якого найбільш інформативного дослідження крові необхідно підготувати хвору?

- a. На вміст сечовини
- b. Печінкові проби
- c. Біохімічний аналіз

d. На вміст глюкози

e. Загальний аналіз

340. Хворий після падіння з дерева відчув сильний біль у правій поперековій ділянці, який іррадіює в статеві органи. При обстеженні виявлено порушення м'язів правої поперекової ділянки, позитивний симптом Пастернацького. Гематурія. Які дії медпрацівника?

- a. Покласти грілку на поперекову ділянку
- b. Заспокоїти хворого
- c. Вести спостереження за станом хворого
- d. Терміново госпіталізувати до урологічного відділення**
- e. Ввести баралгін

341. Пацієнтка 19-ти років скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болісність при сечовипусканні. Об'єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття мазка:

a. Бокове склепіння піхви

b. Заднє склепіння піхви

- c. Уретра
- d. Анальний отвір
- e. Цервікальний канал

342. Фельдшер ШМД госпіталізував хвору 64-х років із матковою кровотечею і анемією. Після 12-річної відсутності менструації 7-8 місяців тому спочатку виникли серозно-водянисті виділення з піхви, потім серознокров'яністі, за типом "м'ясних помиїв", з'явилися болі внизу живота. Яка патологія найбільш імовірна?

- a. Хоріонепітеліома
- b. Внутрішній генеральний ендометріоз
- c. Неповний аборт
- d. Міхуровий занесок
- e. Рак матки**

343. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 22-х років зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 39, 5°C. Об'єктивно: ЧСС108/хв., АТ120/80 мм рт.ст., живіт помірно здутий, різко болючий у гіпогастральній ділянці. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний у гіпогастрії. Піхвове обстеження: матка та додатки не пальпуються внаслідок напруження передньої черевної стінки, заднє склепіння піхви нависає, різко болісне. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий аднексит
- b. Позаматкова вагітність
- c. Апоплексія яєчника
- d. Пельвіоперитоніт**
- e. Гострий ендометрит

344. Дівчину 17-ти років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи, під час нападу, буває блювання. Напад триває декілька годин. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- a. Мігрень**
- b. Субарахноїдальна гематома
- c. Транзиторний ішемічний напад
- d. Гіпертонічний криз
- e. Вегето-судинна дистонія

345. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 42-х років із скаргами на нападopodobний кашель з незначним виділенням слизисто-гнійного харкотиння, яке тяжко відкашлюється, задишку. Об'єктивно: діжкоподібна грудна клітка, аускультативно сухі свистячі хрипи при форсованому видосі. Про яке захворювання можна думати?

- a. Негоспітальна пневмонія
- b. Гострий бронхіт
- c. Хронічний обструктивний бронхіт**
- d. Сухий плеврит
- e. Ексудативний плеврит

346. При дослідженні пульсу у тяжкохворого фельдшер визначив, що його частота дорівнює 50/хв. Як оцінити таку частоту пульсу?

- a. Пароксизмальна тахікардія
- b. Ниткоподібний
- c. Аритмія
- d. Тахікардія
- e. Брадикардія**

347. У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, "півнячий крик". З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- a. Зробити прохолодну клізму
- b. Ввести підшкірно 1% р-н нікотинової кислоти
- c. Ввести внутрішньовенно преднізолон
- d. Натиснути на корінь язика**
- e. Ввести внутрішньом'язово 50% р-н анальгін

348. Фельдшера ФАПУ викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворій

відмічалась слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- a. Тромбоемболія судин мозку
- b. Транзиторна ішемічна атака**
- c. Геморагічний інсульт
- d. Ішемічний інсульт
- e. Субарахноїдальний інсульт

349. Фельдшер ШМД прибув на виклик. Пацієнтка висуває скарги на біль у правому підребер'ї, багаторазове блювання без полегшення, підвищення температури до 39°C. Об'єктивно: живіт болісний у правому підребер'ї, де визначається локальне напруження м'язів, пальпується овальне щільне утворення 6x4 см. Це клінічні ознаки такого захворювання:

- a. Неспецифічний виразковий коліт
- b. Гострий холецистит**
- c. Гострий апендицит
- d. Гострий панкреатит
- e. Хвороба Крона

350. В приймальне відділення доставлено хворого 20-ти років без свідомості. В його кишені знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС105/хв., АТ90/60 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?

- a. 0,9% розчин натрію хлориду
- b. Інсулін**
- c. 0,1% розчин адреналіну
- d. 5% розчин глюкози
- e. Реополіглюкін

351. У хворої 44-х років, що страждає на хворобу Верльгофа, періодично з'являються плямисті геморагії на шкірі і посилюються маткові та носові кровотечі. Що стало найбільш імовірною причиною даного захворювання?

- a. Дефіцит вітаміну А
- b. Дефіцит вітаміну Е
- c. Порушення еритропоезу
- d. Порушення лейкопоезу
- e. Порушення тромбоцитопоезу**

352. У хворого 50-ти років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль у епігастральній ділянці та правому підребер'ї, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Об'єктивно: Рс100/хв., аритмічний, екстрасистолія. АТ90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Пальпаторно: розлите напруження і болючість верхньої половини черевної стінки. Лейкоцитоз 13,8·10⁹/л. ЕКГ інтервал ST у відведеннях III та aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

- a. Гострий холецистит
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий інфаркт міокарда**
- d. Перфорація виразки шлунку
- e. Харчова токсикоінфекція

353. Чоловік 22-х років скаржиться на головний біль, тупий біль у попереку. Тиждень тому переніс ангіну. Об'єктивно: обличчя одутле, сеча кольору "м'ясних помиїв", АТ160/110 мм рт.ст. Прийом бісептолу стан не поліпшив. Діагноз: гострий гломерулонефрит. Які дії фельдшера?

- a. Сульфаніламідні, залишити вдома
- b. Госпіталізація**
- c. Патогенетична терапія, залишити вдома
- d. Симптоматична терапія, залишити вдома

е. Антибіотики, залишити вдома

354. На ФАПі спостерігається першовагітна 20-ти років з анатомічно звуженим тазом II ступеня. В який термін вагітності необхідно її госпіталізувати в пологовий будинок?

а. З початком пологової діяльності

б. 37-38 тижнів

с. 35-36 тижнів

д. 39-40 тижнів

е. У разі злиття навколоплідних вод

355. Яка патологія пологової діяльності розвинулась у роділлі 24-х років, якщо після 8 годин нормальної пологової діяльності перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився?

а. Патологічний преліментарний період

б. Вторинна слабкість пологової діяльності

с. Первинна слабкість пологової діяльності

д. Дискоординована пологова діяльність

е. Надмірно сильна пологова діяльність

356. Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об'єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній у лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природних складках. Носо-губний трикутник блідий. Яке захворювання має місце у дитини?

а. Скарлатина

б. Кір

с. Вітряна віспа

д. Краснуха

е. Менінгококова інфекція

357. На ФАПі закінчився 3% розчин хлораміну для дезінфекції інструментарію. Скільки хлораміну необхідно взяти для приготування 2 л 3% розчину хлораміну?

а. 30 г

б. 20 г

с. 60 г

д. 40 г

е. 90 г

358. На прийомі у фельдшера ФАПу дитина 3-х місяців. Вигодовується грудним молоком, скарг немає. Дефіцит маси тіла 17%, підшкірно-жирова клітковина збережена на обличчі і кінцівках. Товщина підшкірножирового шару на животі 1 см, тургор тканин і еластичність знижені. Це свідчить про наявність у дитини:

а. Гіпотрофії I ст

б. Гіпостатури

с. Паратрофії

д. Гіпотрофії III ст

е. Гіпотрофії II ст

359. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта, який скаржиться на кашель з виділенням вранці гнійного харкотиння з неприємним запахом (до 200 мл), підвищення температури тіла до 37, 8°C. При огляді пальці мають вигляд "барабаних паличок", а нігті "годинникових скелець". Про яке захворювання можна думати?

а. Пневмонія

б. Плеврит

с. Пневмоконіоз

д. Бронхоектатична хвороба

е. Туберкульоз

360. Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта, який скаржиться на біль у ділянці серця стискаючого характеру з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Для невідкладної допомоги фельдшер використає в першу чергу:

- a. Натрію хлорид
- b. Преднізолон
- c. Еуфілін
- d. Димедрол

e. Нітрогліцерин

361. Фельдшер проводить бесіду зі школярами на тему: "Профілактика карієсу". Звертає увагу на те, що захворювання можна попередити, якщо дотримуватись заходів профілактики і пропонує обмежити вживання в їжу:

- a. Овочі, фрукти
- b. Харчова сіль
- c. Молоко, молочні продукти
- d. Риба, м'ясо

e. Цукор, солодоші

362. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, мокнуття, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання запідозрив фельдшер?

- a. Кропив'янка
- b. Токсикодермія
- c. Нейродерміт

d. Екзема

e. Атопічний дерматит

363. Фельдшер ФАПУ обстежує дитину на 5-й день хвороби з попереднім діагнозом ГРВІ. Стан хлопчика погіршився за рахунок посилення кашлю, нежиттю та появи плямистопапульозного висипу спочатку за вухами, потім на шкірі тулуба і кінцівок. Яке захворювання відповідає перерахованим симптомам?

- a. Менінгококова інфекція
- b. Краснуха
- c. Вітряна віспа
- d. Скарлатина

e. Кір

364. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта, який скаржиться на біль у грудях, задишку. Під час обстеження з'ясувалось, що він багато років страждає на варикозне розширення вен, двічі був тромбофлебіт. Стан погіршився раптово після фізичного навантаження. Під час спілкування чоловік знепритомнів, не дихає, пульс на сонній артерії не визначається. Фельдшер констатував клінічну смерть. Що стало причиною смерті?

a. Фібриляція шлуночків

b. Тромбоемболія легеневої артерії

- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Інфаркт міокарда
- e. Травма грудної клітки

365. У хворой 24-х років на другий день після підшкірного введення 2 мл 20% олійного розчину камфори з'явилися біль і ущільнення в ділянці ін'єкції. Яке ускладнення у хворой?

a. Інфільтрат

- b. Абсцес
- c. Некроз
- d. Гематома
- e. Алергійна реакція

366. Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну D3:

- a. З 10-го дня по 2000 МО
- b. З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- c. З 10-14-го дня по 500-1000 МО**
- d. На 2-му тижні по 4000 МО
- e. На 2-му місяці життя по 500 МО

367. Фельдшер ФАПу транспортує влітку породіллю. Пологи відбулися дорогою, 40 хвилин тому. Дитина знаходиться на животі матері, вкрита пелюшкою, стан її задовільний. Дитина піднімає голову, відкриває широко рот, шукає груди матері. Яка подальша дія фельдшера буде доцільною?

- a. Спостерігати за новонародженим
- b. Здійснити клеймування пуповини
- c. Провести профілактику офтальмії
- d. Здійснити перше раннє прикладання дитини до грудей матері**
- e. Виміряти температуру тіла новонародженого

368. Оглядаючи жінку з терміном вагітності 26 тижнів, фельдшер ФАПу діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- a. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- b. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду
- c. Внутрішньовенно гініпрал
- d. Сублінгвально ніфідипін
- e. Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг**

369. У дитини 8-ми років важкий загальний стан, спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які показники аналізу крові супроводжують такий стан?

- a. Еозинофілія
- b. Лейкемічний провал**
- c. Пойкілоцитоз
- d. Лейкоцитоз
- e. Зсув лейкоцитарної формули вліво

370. У дитини 12-ти років важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка, кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для такого захворювання:

- a. набряк Квінке
- b. Дифтерія гортані**
- c. Вогнищева пневмонія
- d. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- e. Обструктивний бронхіт

371. На ФАП звернулася 34-річна жінка зі скаргами на затримку менструації на 1,5 місяця і кров'янисті виділення з піхви. В анамнезі одні пологи. При гінекологічному обстеженні: шийка "бочкоподібна", матка в ante?exio, тіло матки маленьке. Шийка матки розміром з жіночий кулак, цервікальний канал пропускає палець. Придатки не пальпуються. Виділення кров'янисті, густі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Аборт у ході
- b. Ерозія шийки матки
- c. Трубно вагітність
- d. Шийкова вагітність**
- e. Рак шийки матки

372. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 65-ти років зі скаргами на нападоподібний надсадний кашель з виділенням незначної кількості кров'янистого харкотиння, ниючі болі в

правій половині грудної клітки, загальну слабкість, задишку, схуднення. Скарги з'явилися кілька місяців тому. Який попередній діагноз?

- a. Міозит
- b. Пневмонія
- c. Бронхіальна астма
- d. Рак легень**
- e. Хронічний бронхіт

373. На ФАП до фельдшера звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на неможливість статевого життя, відсутність менструації. При обстеженні виявлено, що зовнішні статеві органи розвинуті правильно, пальцем вдається проникнути на 1 см за задню спайку, піхва відсутня. Під час ректального обстеження матка не пальпується, визначається невеликий тяж. Для якої патології характерні такі дані?

- a. Аплазія піхви та матки**
- b. Атрезія піхви
- c. Аплазія піхви
- d. Гіпоплазія піхви та матки
- e. Атрезія дівочої пліви

374. Пацієнтка 30-ти років поскаржилась фельдшеру ФАПу на відсутність місячних впродовж останніх 7 місяців. Вагітності немає. Який попередній діагноз?

- a. Післякастраційний синдром
- b. Аменорея**
- c. Клімактеричний синдром
- d. Гіпоменструальний синдром
- e. Гіперменструальний синдром

375. У пацієнта 32-х років на тлі гіперемованої шкіри в ділянці вусів дрібні гноячки, жовті кірки, свербіж, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Яку патологію варто запідозрити?

- a. Герпес простий
- b. Трихофітія
- c. Туберкульоз шкіри
- d. Сикоз**
- e. Кандидоз

376. Вранці при огляді дітей в дитячому садку у 5-річної дівчинки виявили папульозно-везикулярний висип на волосяній частині голови. Про яке захворювання слід думати?

- a. Вітряна віспа**
- b. Скарлатина
- c. Краснуха
- d. Кіп
- e. Менінгококова інфекція

377. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 75-ти років. Його турбують різкий біль у лівому надпліччі, набряк та деформація в ділянці ключиці. Якою пов'язкою необхідно виконати іммобілізацію при даній травмі?

- a. Дезо**
- b. Хрестоподібна
- c. Колосовидна
- d. Спіральна
- e. Черепашча

378. У дитини при нападі бронхіальної астми поверхнєве дихання з різко утрудненим видихом, наростає ціаноз, акроціаноз. Ефекту від використання сальбутамолу та еуфіліну немає. Що необхідно призначити?

- a. 2% супрастин 1-2 мг/кг
- b. 1% димедрол 1 мг/кг

с. 50% анальгін 0,1 мл/рік життя

d. 3% преднізолон 2-3 мг/кг

е. 5% р-н аскорбінової кислоти 0, 2 мл/кг

379. При обстеженні пацієнтки 23-х років за допомогою піхвових дзеркал виявили, що слизова піхви вкрита серозними нашаруваннями, кровить від дотику. Який попередній діагноз?

a. Гострий кольпіт

b. Гострий цервіцит

с. Гострий метрит

d. Гострий вульвіт

е. Рак піхви

380. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 53-х років, який скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 39, 2°C, кашель із виділенням іржавого харкотиння, болі в нижній частині грудної клітки справа, які посилюються при кашлі, задишку. Об'єктивно: шкіра обличчя гіперемована, синюшність носогубного трикутника. ЧД46/хв. В легенях справа у підлопатковій ділянці: притуплений перкуторний звук; аускультативно дихання з бронхіальним відтінком, вологі дрібнопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Вогнищева пневмонія

b. Трахеїт

с. Крупозна пневмонія

d. Бронхіт

е. Плеврит

381. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 42-х років із скаргами на сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадіння волосся, спотворення смаку (вживає крейду). Для якого синдрому характерні такі ознаки?

a. Сидеропенічний

b. Анемічний

с. Гемолітичний

d. Геморагічний

е. Пухлинної інтоксикації

382. Фельдшер прийшов на патронаж до дитини віком 3 місяці. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отриманий результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

a. 600 г

b. 1000 г

с. 800 г

d. 900 г

е. 700 г

383. При проведенні патронажу новонародженої дитини фельдшер ФАПу помітив на шкірі кінцівок і тулуба лущення та гіперемію. Порекомендуйте лікарську рослину для проведення гігієнічної ванни:

a. Подорожник

b. Череда

с. Мати-й-мачуха

d. Звіробій

е. Липа

384. Фельдшеру швидкої допомоги надійшов виклик до хлопчика 4-х років. Об'єктивно: загальний стан порушений, дитина млява, неспокійна, температура тіла 39, 7°C, ЧД32/хв., ЧСС140/хв. На шкірі спини, сідниць, стегнах, гомілкях спостерігаються геморагічні висипання неправильної "зірчастої" форми з некрозом в центрі. Яку невідкладну допомогу необхідно надати на догоспітальному етапі?

a. Ввести левоміцетин, преднізолон, анальгін

b. Ввести анальгін, димедрол, дексаметазон

- c. Ввести піпольфен, бензилпеніцилін, строфантин
- d. Ввести сибазон, лазикс, парацетамол
- e. Ввести супрастин, парацетамол, цефтріаксон

385. Хвора 34-х років скаржиться на слабкість, швидку втомлюваність, шум у вухах, задишку, бажання їсти крейду. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, тони серця ритмічні, систолічний шум на верхівці, АТ120/70 мм рт.ст. Рс84/хв. У крові: знижені гемоглобін, кольоровий показник. Який препарат треба призначити хворій?

- a. Вітамін С
- b. Вітамін Е
- c. Вітамін А
- d. Вітамін В12

e. Фенюльс

386. До ФАПу звернулася жінка зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли після використання нового прального порошку. Об'єктивно: шкіра кисті та передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикулярні висипи. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Псоріаз
- b. Токсикодермія
- c. Піодермія

d. Алергічно-контактний дерматит

e. Нейродерміт

387. До фельдшера ФАПу звернулася жінка з хлопчиком 9-ти років, якого укусив бродячий собака. В нижній третині правого передпліччя кілька глибоких, неправильної форми ран, які помірно кровоточать, забруднені слиною тварини. Що з переліченого треба зробити в першу чергу?

- a. Ввести правцевий анатоксин
- b. Виміряти артеріальний тиск
- c. Застосувати грілку

d. Промити рану розчином мила

e. Накласти гемостатичну пов'язку

388. Під час огляду хворого виявлено: набряк рогівки, спазм повік, сльозотеча, світлобоязливість, зниження гостроти зору; зіниця неправильної форми, колір її змінений. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Гострий поверхневий кератит

- b. Гострий кон'юнктивіт
- c. Гострий іридоцикліт
- d. Трахома
- e. Гострий напад глаукоми

389. У дівчинки 1,5 років вологий кашель, задишка з утрудненим видихом, ЧДР45/хв, дистанційні хрипи. Аускультативно різнокаліберні вологі та свистячі сухі хрипи. Який препарат найдоцільніше ввести дитині?

- a. Цифран усередину
- b. Розчин седуксену в/м
- c. Розчин строфантину в/в
- d. Ампіцилін в/м

e. Розчин еуфіліну в/в

390. До ФАПу звернулася жінка 32х років зі скаргами на тривалі і рясні менструації впродовж півроку, тягнучий біль внизу живота, слабкість. При гінекологічному обстеженні тіло матки збільшене до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. У крові: Нb90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

a. Міома матки

b. Вагітність

- с. Дисфункціональна маткова кровотеча
- d. Кістома яєчника
- е. Рак тіла матки

391. У пацієнта 51-го року сильний головний біль, дзвін у вухах, нудота, АТ180/110 мм рт.ст. Який синдром спостерігається у пацієнта?

- a. Гострої серцевої недостатності
- b. Хронічної недостатності кровообігу
- с. Гострої судинної недостатності
- d. Гіпертензивний**
- е. Гострої коронарної недостатності

392. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ80/60 мм рт.ст., Рс92/хв. Живіт напружений, болісний більше справа в нижніх відділах. Симптом ЩоткінаБлюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Апоплексія яєчника**
- b. Позаматкова вагітність
- с. Фіброміома
- d. Гострий апендицит
- е. Перекрут ніжки кісти яєчника

393. До фельдшера ФАПУ терміново звернувся хворий, якого вжалила за губу бджола. Скаржиться на ядуху, нудоту, гавкаючий кашель. Об'єктивно: обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична, дихання утруднене, осиплість голосу, артеріальний тиск у нормі. Фельдшер може запідозрити у хворого:

- a. Анафілактичний шок
- b. Набряк Квінке**
- с. Напад бронхіальної астми
- d. Кропивницю
- е. Гострий алергічний риніт

394. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 29-ти років, який у зв'язку із загостренням хронічного тонзиліту приймав антибіотики. Раптово підвищилась температура тіла, з'явився біль у суглобах, животі, на шкірі з'явилась геморагічна висипка з характерним симетричним розташуванням елементів, особливо на нижніх кінцівках. Відзначає червоний колір сечі. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Амілоїдоз нирок
- b. Геморагічний васкуліт**
- с. Гострий пієлонефрит
- d. Гострий цистит
- е. Гострий гломерулонефрит

395. Фельдшер ФАПУ спостерігає за осередком туберкульозної інфекції. Дитині 10-ти років проведена туберкулінова проба Манту. Які результати свідчать про позитивну пробу у дитини?

- a. Папула 20 мм
- b. Папула 3 мм
- с. Гіперемія 10 мм
- d. Папула 6 мм**
- е. Гіперемія 5 мм

396. До пацієнтки 45-ти років, яка скаржиться на головний біль у ділянці потилиці, нудоту, одноразове блювання, що з'явилися після сварки з чоловіком, викликали фельдшера ФАПУ. Об'єктивно: збудження, червоні плями на обличчі, шиї, Рс110/хв., АТ180/110 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- a. Гіпертонічний криз I типу**
- b. Харчове отруєння
- с. Напад стенокардії

- d. Інфаркт міокарда
- e. Гіпертонічний криз II типу

397. Фельдшер ФАПУ обстежує хворого 55-ти років, який скаржиться на погіршення зору, слабкість у ногах і руках, пекучий біль в них, який зменшується при ходінні босоніж. 20 років хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: гіпостезія в руках і ногах, за типом "рукавичок" та "шкарпеток". Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Облітеруючий ендартеріт
- b. Мієліт
- c. Поліомієліт
- d. Діабетична полінейропатія**
- e. Попереково-крижовий радикуліт

398. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте, болісне сечовипускання, сеча каламутна, температура тіла 37, 6°C. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- a. Гострий пієлонефрит
- b. Хронічний гломерулонефрит
- c. Хронічний пієлонефрит**
- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Нирковокам'яна хвороба

399. У дитини після гри з кішкою на волосистій ділянці голови виникло вогнище, вкрите дрібними лусочками. Волосся повністю обламане на висоті 3-5 мм над рівнем шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

- a. Псоріаз
- b. Себорейна екзема
- c. Поверхнева трихофітія
- d. Парша
- e. Мікроспорія**

400. Хворому призначено 32 ОД інсуліну. У фельдшера ФАПУ інсулінового шприца не було. Яку кількість інсуліну потрібно набрати у шприц об'ємом 2 мл?

- a. 0,7 мл
- b. 0,9 мл
- c. 0,8 мл**
- d. 0,5 мл
- e. 0,3 мл

401. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

- a. Лімфаденіт**
- b. Бешиха
- c. Правець
- d. Лімфангоїт
- e. Флегмона

402. При обстеженні хворого фельдшер ФАПУ знайшов симптоми гострого гастриту, які з'явилися у хворого після тривалого вживання низки фармакологічних препаратів. Який з препаратів здатний спричинити такі симптоми?

- a. Валеріана
- b. Корвалол
- c. Но-шпа
- d. Сенаде
- e. Вольтарен**

403. Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- a. Високочастотний
- b. Постійний**
- c. Імпульсний
- d. Змінний
- e. Модульований

404. Під час активного патронажу мати дівчинки 12-ти місяців звернулася із запитанням до фельдшера ФАПу: "Скільки зубів повинно бути у моєї дитини?"

- a. 13
- b. 4
- c. 12
- d. 6
- e. 8**

405. Вагітна 26-ти років з терміном вагітності 34 тижні звернулася до фельдшера швидкої допомоги зі скаргами на біль у епігастральній ділянці, блювання, миготіння "мушок" перед очима, посмикування м'язів обличчя. Об'єктивно: АТ180/120 мм рт.ст. на обох руках, генералізовані набряки. Вкажіть, які анестезіологічні та реанімаційні заходи необхідно провести жінці в першу чергу:

- a. Призначити дезагреганти
- b. Провести корекцію водноелектролітних порушень
- c. Забезпечити ефективну вентиляцію легень (ШВЛ)
- d. Призначити гіпотензивні засоби
- e. Призначити засоби, які попереджують судоми**

406. В школі фельдшером ФАПу діагностовано скарлатину. Дитина госпіталізована. Накладений карантин. Контактні діти обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме спостереження?

- a. 3
- b. 7**
- c. 14
- d. 21
- e. 10

407. Фельдшер швидкої медичної допомоги за призначенням лікаря ввів пацієнту в/в струменево 25% розчин магнію сульфату. Під час венепункції була здійснена наскрізна перфорація вени. Вкажіть можливе ускладнення:

- a. Некроз
- b. Інфільтрат
- c. Гематома**
- d. Тромбофлебіт
- e. Повітряна емболія

408. У новонародженої дитини спостерігаються: ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхневе нерівномірне дихання, Р_с56/хв, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців розташовані на груднині дитини. Вкажіть найчастіше ускладнення, яке може виникнути при покладанні рук фельдшера на мечоподібний відросток при здійсненні реанімаційних заходів:

- a. Відкритий пневмоторакс
- b. Гостра емфізема
- c. Перелом ребер
- d. Гематома грудної клітки
- e. Ушкодження печінки**

409. У пацієнта 18-ти років, що хворіє на ревматизм з мітральним стенозом, після гри у футбол з'явилися задишка, виділення рожевого пінистого харкотиння. Об'єктивно: над легеньми

вислуховуються дрібнота середньопухирчасті вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Гостра дихальна недостатність
- b. Гостра судинна недостатність
- c. Гостра лівошлуночкова недостатність**
- d. Легенева кровотеча
- e. Шлунково-кишкова кровотеча

410. Фельдшера ШМД викликали до хворого 42-х років у якого спостерігаються відчуття голоду, загальна слабкість, виражена вологість шкірних покривів, тремор кінцівок, гіперкінезія. Через декілька хвилин пацієнт знепритомнів. Зіниці розширені, тонус очних яблук збережений, дихання часте, поверхневе. В анамнезі: цукровий діабет. Який стан розвинувся у пацієнта?

- a. Гіпоглікемічна кома**
- b. Напад стенокардії
- c. Гіперглікемічна кома
- d. Гіпертензивний криз
- e. Напад бронхіальної астми

411. Пацієнт 53-х років з хронічною недостатністю кровообігу лікується серцевими глікозидами. Викликав ШМД з приводу втрати апетиту, нудоти, блювання, перебоїв у роботі серця. Передозування якого препарату, в першу чергу, викликало погіршення самопочуття пацієнта?

- a. Рибоксин
- b. Нітросорбід
- c. Дигітоксин**
- d. Аспаркам
- e. Гіпотіазид

412. У пацієнта, який впродовж години знаходився на вулиці при температурі 29С, скарги на оніміння щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна чутливість знижені. Яка першочергова заходи при наданні допомоги?

- a. Розтерти рукою до почервоніння шкіри**
- b. Викликати швидку допомогу та дати гарячий чай
- c. Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ
- d. Накласти на уражені ділянки пов'язки з маззю Вишневського
- e. Протерти спиртом та накласти термоізоляційну пов'язку

413. Проводять обстеження потерпілого, який був збитий вантажівкою. Він знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчать вище перераховані симптоми?

- a. Перелом щелеп
- b. Носова кровотеча
- c. Перелом склепіння черепа
- d. Перелом носа
- e. Перелом основи черепа**

414. У роділлі фізіологічний перебіг післяпологового періоду, друга доба. Вкажіть характер лохій, що відповідатимуть даній ситуації:

- a. Кров'янисті, в помірній кількості**
- b. Серозні
- c. Гнійні
- d. Прозорі
- e. Серозно-кров'янисті

415. Під час транспортування у роділлі 25-ти років у машині ШМД почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хвилини, тривалістю 50 секунд. Починається прорізування голівки плоду. Промежина, висота якої 3 см, зблідла. Яким має бути наступний етап невідкладної допомоги?

- a. Вичікувальна тактика**

b. Епізіотомія

- c. Накладання акушерських щипців
- d. Захист промежини
- e. Вакуум-екстракція плоду

416. Фельдшер швидкої допомоги під час підшкірної ін'єкції олійного розчину камфори виявив, що у пацієнта виник раптовий біль, ціаноз верхньої половини грудної клітки і обличчя. Назвіть ускладнення ін'єкції:

- a. Колапс
- b. Запаморочення
- c. Повітряна емболія
- d. Алергічна реакція

e. Жирова емболія

417. У дівчинки 10-ти років після фізичного навантаження, вживання жирної та смаженої їжі виникає неінтенсивний ниючий біль у ділянці правого підребер'я, що супроводжується нудотою, гіркотою в роті. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Коліт

b. Дискінезія жовчних шляхів

- c. Ентерит
- d. Хронічний гастрит
- e. Виразкова хвороба шлунка

418. Пацієнтка 22-х років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на загальну слабкість, дратівливість, серцебиття, підвищену збудливість, поганий сон. При огляді: витрішкуватість, тремтіння пальців рук, пальпується збільшена щитоподібна залоза, Ps120/хв, АТ160/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Артеріальна гіпертензія
- b. Нецукровий діабет
- c. Мікседема
- d. Ендемічний зоб

e. Тиреотоксикоз

419. Фельдшера ШМД викликали до дитини 4-х місяців. Дитина втратила за добу 800 гр. маси тіла внаслідок блювання та проносу. Рефлекси слабкі, тургор тканин знижений, шкіра суха, сірувато-ціанотична, риси обличчя загострені, стан важкий. Який стан у дитини?

- a. Гіпервітаміноз D
- b. Рахіт
- c. Гіпотрофія
- d. Паратрофія

e. Кишковий токсикоз з ексикозом

420. У дитини 7-річного віку астеничної конституції спостерігаються підвищена нервова збудливість, надмірна вразливість, енурез, періодично виникають напади ацетонемічного блювання. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- a. Алергічний діатез
- b. Лімфатико-гіпопластичний діатез
- c. Ексудативно-катаральний діатез

d. Нервово-артритичний діатез

- e. Геморагічний діатез

421. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка, яка під час консервування облила ліву ногу окропом. Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом "дев'ятки":

- a. 27%
- b. 36%
- c. 9%
- d. 1%
- e. 18%

422. Ви фельдшер ФАП у даєте поради по годуванню дитини 6-ти місяців з функціональним розладом травлення після водно-чайної паузи. Скільки разів на добу доцільно годувати дитину?

- a. 8
- b. 10
- c. 4
- d. 5
- e. 7**

423. На ФАП доставлений хворий у стані алкогольного сп'яніння, який тривалий час пролежав на вулиці у снігу. Об'єктивно: температура тіла знижена до $31 \pm 30^{\circ}\text{C}$, шкіра холодна, мармурово-ціанотична, відсутність миміки, безглуздий погляд потерпілого. Рс32/хв., слабого наповнення. АТ100/60 мм рт.ст. ЧД8/хв., поверхнєве. Температура в прямій кишці знижена $28 \pm 30^{\circ}\text{C}$. Який ступінь замерзання у хворого?

- a. I
- b. II**
- c. IV
- d. III
- e. V

424. При обстеженні пацієнтки виникла підозра на непрохідність маткових труб. Яке дослідження може це підтвердити?

- a. Гістеросальпінгографія**
- b. Зондування матки
- c. Пункція заднього склепіння
- d. Кольпоскопія
- e. Вишкрібання слизової оболонки матки

425. У роділлі 30-ти років через 10 хвилин після народження дитини з'явилися переймоподібні болі внизу живота, бажання тужитися, затискач, накладений на пуповину біля статевої щілини, зміщується донизу, з піхви виділилось 100 мл крові. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Справжнє прирощення плаценти
- b. Гіпотонія матки
- c. Третій період нормальних пологів**
- d. Щільне прикріплення плаценти
- e. Затримка плаценти в порожнині матки

426. У разі судом на фоні спазмофілії треба вводити:

- a. Внутрішньом'язово 1% р-н лазиксу
- b. Внутрішньом'язово фенobarбітал 10 мг/кг
- c. Внутрішньом'язово 25% р-н магнію сульфату
- d. Внутрішньом'язово 0,5% р-н седуксену
- e. Внутрішньовенно 10% р-н кальцію глюконату 0,2 мл/кг**

427. До фельдшера ФАП звернулася жінка, мати двох дітей, яка скаржиться на наявність вузлів м'якоеластичної консистенції по зовнішній поверхні лівого стегна з переходом на гомілку і появи набряку на лівій стопі до кінця робочого дня. Після нічного відпочинку набряк проходить. Початок хвороби пов'язує з вагітністю і пологамі. Користується еластичними панчолами. Сформулюйте попередній діагноз:

- a. Варикозне розширення підшкірних вен лівої гомілки**
- b. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен лівої гомілки
- c. Слоновість лівої нижньої кінцівки
- d. Облітеруючий ендартеріїт лівої нижньої кінцівки
- e. Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої гомілки

428. На ФАП звернувся пацієнт, прооперований у хірургічному відділенні місяць тому з приводу перфоративної виразки 12-палої кишки. Скарги на різкі нападоподібні болі у животі, які тривають близько години, багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт під

час нападу. Живіт м'який, болісний у всіх відділах. Випорожнень не було. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- a. Рецидив виразкової хвороби 12палої кишки
- b. Перитоніт
- c. Абсцес черевної порожнини
- d. Метеоризм
- e. Спайкова кишкова непрохідність**

429. У пацієнта 43-х років після введення внутрішньом'язово біциліну виникли сильний головний біль, шум у вухах, біль за грудниною, відчуття жару, пітливість. Об'єктивно: стан хворого важкий, Ps115/хв., ниткоподібний, АТ70/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу?

- a. Строфантин
- b. Адреналін**
- c. Допамін
- d. Атропін
- e. Мезатон

430. Робітник 39-ти років звернувся до фельдшера здоровпункту зі скаргами на пекучий біль шкіри правої ноги. Під час роботи в лабораторії випадково розлив на ногу сірчану кислоту. З чого треба розпочати надання першої допомоги?

- a. Промивання етиловим спиртом
- b. Промивання струменем холодної води**
- c. Виконання хімічної нейтралізації
- d. Направлення до опікового центру
- e. Накладання пов'язки з фурациліном

431. Фельдшер ШМД оглядає потерпілого з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею. При наданні першої допомоги провів тимчасову зупинку кровотечі за допомогою джгута, ввів потерпілому знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?

- a. Накладання захисної асептичної пов'язки**
- b. Холод на місце травми
- c. Надання хворому зручного положення
- d. Імобілізація пошкодженої кінцівки
- e. Госпіталізація хворого у травматологічне відділення

432. Мати привела на ФАП хлопчика 3-х років, у якого спостерігаються смердючі виділення з правої половини носа та утруднення дихання через праву половину носа, що виникли 2 дні тому на фоні повного здоров'я. Який попередній діагноз?

- a. Озена
- b. Гострий правобічний фронтит
- c. Гострий риніт
- d. Гострий правобічний гайморит
- e. Стороннє тіло правої половини носа**

433. Під час огляду новонароджена дитина млява, адинамічна, природжені рефлексни знижені, крик "мозковий", спостерігається тремор, ністагм, випинання великого тім'ячка. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Фізіологічна жовтяниця
- b. Сепсис новонароджених
- c. Гемолітична хвороба новонароджених
- d. Пневмонія
- e. Внутрішньочерепна пологова травма**

434. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру – 37, 6оС, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі кіста яєчника. Бімануально - матка звичайних розмірів,

щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, тугорухоме. Встановіть діагноз:

- a. Порушена позаматкова вагітність
- b. Гострий аднексит
- c. Розрив капсули кісти яєчника
- d. Перекрут ніжки кісти яєчника**
- e. Апоплексія яєчника

435. На прийомі у фельдшера ФАПу мати із дівчинкою 7 місяців. Дитина перебуває на грудному вигодовуванні. Профілактика рахіту не проводилась. Фруктово-овочеві продукти, соки не отримує. При об'єктивному обстеженні виражені лобні і тім'яні бугри. Велике тім'ячко має розмір 3х3 см, краї його потовщені, на ребрах чотки, виражена м'язова гіпотонія, симптом "жаб'ячого" живота. Дитина погано спирається на ніжки. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Гіпотрофія I ступеня
- b. Гіпотрофія II ступеня
- c. Рахіт I, гострий перебіг
- d. Рахіт II, гострий перебіг
- e. Рахіт II, підгострий перебіг**

436. Хворий 47-ми років доставлений ШМД з діагнозом "гострий інфаркт міокарда", став відмічати різке погіршення самопочуття: посилюється біль за грудниною, з'явилася задишка, запаморочення. Об'єктивно: Рс- 120/хв., тони серця глухі, рясне потовиділення. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Стенокардія
- b. набряк легень
- c. Серцева астма
- d. Гостра судинна недостатність
- e. Кардіогенний шок**

437. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 30-ти років зі скаргами на остуду, відчуття голоду, неспокій. В анамнезі: пацієнт страждає на цукровий діабет 1-го типу. Об'єктивно: пацієнт збуджений, шкіра тепла, профузний піт, неадекватна поведінка. Рівень глюкози у крові 2,0 ммоль/л. Назвіть першочергові заходи невідкладної допомоги:

- a. Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 40% розчину глюкози**
- b. Внутрішньовенне краплинне введення 200 мл 0,9% розчину натрію хлориду
- c. Внутрішньовенне струминне введення 40-60 мл 5% розчину глюкози
- d. Підшкірне введення 40 ОД інсуліну
- e. Внутрішньовенне струминне введення 5 мл 40% розчину глюкози

438. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 45-ти років, який два тижні тому отримав колоту рану правої кисті. Пацієнт скаржиться на слабкість, утруднення ковтання, судом жувальних м'язів, пітливість. При об'єктивному обстеженні фельдшер помітив сіпання м'язів під час доторкання пінцетом до рани, підвищений тонус м'язів кінцівки, підсилення сухожильних рефлексів. Фельдшер запідозрив таке захворювання:

- a. Правець**
- b. Сибірка
- c. Гнильна інфекція
- d. Газова інфекція
- e. Дифтерія рани

439. До фельдшера ФАПу звернувся постраждалий на 4-ту добу після вогнепального кульового поранення м'яких тканин стегна. Стан постраждалого раптово став погіршуватись. Скарги на розпираючий біль у рані в середній третині стегна. Біль посилюється за останні 12 годин. набряк шкіри і підшкірної клітковини швидко збільшується. Температура тіла 38, 2оС, Рс- 102/хв. Краї рани зяють, тьмяні, м'язи вибухають у рані, при захваті пінцетом тканини розпадаються. Який вид інфекції розвинувся в рані?

- a. Аеробна грамнегативна інфекція**

b. Аеробна грампозитивна інфекція

c. Дифтерія рани

d. Анаеробна інфекція

e. Гнильна інфекція

440. Пацієнт 40-ка років скаржиться на відчуття стиснення і болі за грудниною. При кашлі - пінисті виділення яскраво-червоного кольору. Із анамнезу відомо, що хворіє на туберкульоз легень впродовж 10-ти років. Який препарат слід застосувати першочергово?

a. 1% розчин вікасолу, 1,0 мл в/м

b. 10% розчин кальціюхлориду

c. Преднізолон

d. 12,5% розчин етамзілату, 2 мл в/в

e. 5% розчин аскорбінової кислоти

441. До пацієнтки 20-ти років, яка страждає на наркоманію, виїхала бригада ШМД. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардия, брадикардия. Що терміново показано хворій?

a. Форсований діурез

b. Інфузійна терапія

c. Оксигенотерапія

d. Призначення налорфіну

e. ШВЛ

442. Дитині 3 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, розлади сну, погіршення апетиту, часті та болісні сечовипускання, нетримання сечі. Сеча каламутна, з осадом і пластівцями. Першочерговим дослідженням у комплексі діагностичних заходів буде:

a. УЗД нирок

b. Екскреторна урографія

c. Мікційна цистографія

d. Цистоскопія

e. Рентгеноурологічне

443. До фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 3-х років. Зі слів матері, дитина приблизно 45 хвилин тому випадково з'їла 8 таблеток тазепама. Батьками ніякі медичні втручання не проводилися. Якими повинні бути дії фельдшера?

a. Поставити очисну клізму

b. Ввести в/в крапельно 0,9% розчин натріюхлориду

c. Госпіталізувати у відділення інтенсивної терапії

d. Промити шлунок до чистих промивних вод

e. Спостерігати за дитиною

444. Фельдшер проводить серцеволегеневу реанімацію потерпілого, у якого констатовано клінічну смерть. Що з нижчеперерахованого вказує на ефективність закритого масажу серця?

a. Зниження температури тіла

b. Пасивні рухи грудної клітки

c. Відсутність свідомості

d. Пульсація на сонній артерії

e. Розширені зіниці

445. Чоловік 28-ми років звернувся до фельдшера здоров'я із скаргами на підвищення температури тіла, спонтанний біль у ділянці кінчика носа, набряклість навколишніх тканин. При огляді виявлено конусоподібне випинання при вході у ніс, шкіра носа гіперемована, напружена і дуже чутлива. Хворий працює у лабораторії з агресивними хімічними агентами. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

a. Бешиха носа

b. Опік носа

c. -

d. Фурункул носа

e. Відмороження носа

446. Фельдшер на виклику у заміжньої жінки, яка скаржиться на періодичні переймоподібні болі у здухвинній ділянці, затримку менструації. Після фізичного навантаження з'явився різкий біль внизу живота, короточасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

- a. Апоплексія яєчника
- b. Перекрут ніжки кісти
- c. Розрив піосальпінксу
- d. Порушена позаматкова вагітність**
- e. Прогресуюча позаматкова вагітність

447. Фельдшер проводить серцево-легеневу реанімацію потерпілому в стані клінічної смерті. Що з нижче перерахованого буде вказувати на ефективність закритого масажу серця?

- a. Розширені зіниці
- b. Пульсація на сонній артерії**
- c. Відсутність свідомості
- d. Пасивні рухи грудної клітки
- e. Зниження температури тіла

448. До фельдшера ФАПу звернулась вагітна в терміні 16 тижнів зі скаргами на ниючий біль внизу живота та поперековій ділянці. Загальний стан не порушений. АТ-120/80 мм рт.ст. на обох руках. Рс-82/хв., ритмічний. При огляді: тіло матки в підвищеному тонусі, чутливе при пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. Загроза викидня**
- b. Викидень в розпалі
- c. Загроза розриву матки
- d. Викидень, що розпочався
- e. Загроза передчасних пологів

449. В цеху на підприємстві працівник 32-х років 15 хвилин тому поранив ліве передпліччя. З рани фонтаном витікає кров яскраво-червоного кольору. Стан хворого середньої важкості, Рс-100/хв, АТ-90/60 мм рт.ст. Ваші дії при наданні невідкладної допомоги?

- a. Лігувати судину в рані
- b. Накласти артеріальний джгут Есмарха**
- c. Провести тугу тампонаду рани
- d. Накласти тугу тиснучу пов'язку на рану
- e. Накласти міхур з льодом на рану

450. Фельдшера ШМД викликали до чоловіка 32-х років. Годину тому йому ввели протиправцеву сироватку. Вдома раптово з'явилась слабкість, відчуття холоду. Хворий блідий, зіниці розширені. Пульс ниткоподібний. Артеріальний тиск різко знижений. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Анафілактичний шок**
- b. Кропив'янка
- c. Колапс
- d. Кардіогенний шок
- e. Набряк Квінке

451. У постраждалого 35-ти років правосторонній відкритий пневмоторакс. Які першочергові дії фельдшера ШМД?

- a. Ввести антисептик
- b. Госпіталізувати постраждалого до торакального відділення
- c. Ввести знеболюючі
- d. Накласти оклюзійну пов'язку на рану**
- e. Накласти асептичну пов'язку на рану

452. До пацієнта 32-х років, що хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет, викликали ШМД. Висуває скарги на посилення спраги, нудоту, блювання, біль у животі, сонливість. Об'єктивно: шкіра суха; шумне дихання із запахом ацетону. Рс-125/хв., АТ-80/45 мм рт.ст. Яке ускладнення

виникло у хворого?

- a. Кетоацидотична кома
- b. Лактацидемічна кома
- c. Гіперосмолярна кома
- d. Печінкова кома
- e. Гіпоглікемічна кома

453. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ-80/60 мм рт.ст., Рс-92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш ймовірний діагноз?

- a. Позаматкова вагітність
- b. Перекрути ніжки кісти яєчника
- c. Апоплексія яєчника
- d. Фіброміома
- e. Гострий апендицит

454. При проведенні патронажу новонародженої дитини фельдшер помітив на шкірі кінцівок і тулуба дитини лущення та гіперемію. Порекомендуйте лікарську рослину для проведення лікувальної ванни:

- a. Череда
- b. Мати-й-мачуха
- c. Звіробій
- d. Липа
- e. Подорожник

455. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання; сеча каламутна, температура тіла 37,6о

- a. Хронічний гломерулонефрит
- b. Хронічний пієлонефрит
- c. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Ваш попередній діагноз?
- d. Нирковокам'яна хвороба
- e. Гострий пієлонефрит

456. Вранці після сну пацієнт поскаржився на неможливість відкрити очі внаслідок склеювання вій. Теплим розчином якої речовини повинен промити очі фельдшер хворому?

- a. Калію перманганату 1:10000
- b. Перекису водню 3%
- c. Фурациліну 1:5000
- d. Натрію бікарбонату 2%
- e. Натрію хлориду 0,9%

457. У хворого 67-ми років діагностовано початкову стадію старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані?

- a. Медикаментозні
- b. Хірургічні
- c. Лазеротерапія
- d. На цій стадії хвороби лікування не проводиться
- e. Кріодеструкція

458. Фельдшер ФАПУ проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Вкажіть де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції, щоб найкраще вислухати серцебиття плоду:

- a. Справа на рівні пупка
- b. Зліва нижче пупка
- c. Справа нижче пупка
- d. Зліва на рівні пупка

е. Справа вище пупка

459. Під час внутрішньовенної ін'єкції фельдшер випадково ввів пацієнту 10% розчин хлориду кальцію під шкіру. Які першочергові дії фельдшера після припинення введення хлориду кальцію?

а. Накласти джгут вище місця ін'єкції

б. Обколоти місце ін'єкції 0,1% розчином адреналіну

с. В місце ін'єкції ввести 9% розчин натрію хлориду 50-80 мл

д. Покласти міхур з льодом на місце ін'єкції

е. –

460. Пацієнт 60-ти років з цирозом печінки висловлює скарги на слабкість, холодний піт, запаморочення, випорожнення чорного кольору. Вдома короткочасно знепритомнів. Об'єктивно: Рс-102/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Пухлина товстої кишки

б. Виразка дванадцятипалої кишки, що кровоточить

с. Кровотеча з пухлини легенів у фазі розпаду

д. Кровотеча з розширених вен стравоходу

е. Пухлина шлунку

461. Дитина 5-ти років надійшла до інфекційного відділення районної лікарні зі скаргами на підвищену температуру тіла, ознаки інтоксикації, розлади випорожнення. Запідозрена кишкова інфекція. Яке обстеження буде найбільш інформативним:

а. Кров на токсоплазмоз

б. Аналіз крові на цукор

с. Аналіз крові на резус-фактор та групу

д. Аналіз крові на стерильність

е. Бактеріологічне обстеження випорожнень

462. У дитини 8-ми років важкий загальний стан. Спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які найбільш інформативні показники аналізу крові?

а. Пойкілоцитоз

б. Лейкемічний провал

с. Зсув лейкоцитарної формули вліво

д. Еозинофілія

е. Лейкоцитоз

463. Пацієнтка 22-х років звернулась до фельдшера ФАПУ зі скаргами на загальну слабкість, дратівливість, серцебиття, підвищену збудливість, поганий сон. При огляді: витрішкуватість, тремтіння пальців рук, збільшена щитоподібна залоза. Рс-120/хв, АТ-160/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

а. Ендемічний зоб

б. Мікседема

с. Нецукровий діабет

д. Тиреотоксикоз

е. Артеріальна гіпертензія

464. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт, якому багаторазово вводили внутрішньовенно ліки. Він скаржиться на біль, гіперемію, наявність ущільнення по ходу вени. Яке виникло ускладнення у пацієнта?

а. Гематома

б. Флебїт

с. Сепсис

д. Некроз

е. Інфільтрат

465. У пацієнта 18-ти років II стадія гарячки. Він збуджений, на щоках рум'янець, марить,

температура тіла 40°C, губи вкриті кірочками. Про що в першу чергу потрібно подбати при догляді за хворим?

- a. Подати грілку
- b. Провітрити палату

c. Створити індивідуальний пост

- d. Надати горизонтального положення хворому
- e. Подати міхур з льодом

466. У дитини після гри з кішкою на волосистій ділянці голови виникло вогнище, вкрите дрібними лусочками. Волосся повністю обламане на висоті 3-5 мм над рівнем шкіри. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

- a. Поверхнева трихофітія
- b. Псоріаз

c. Мікроспорія

- d. Парша
- e. Себорейна екзема

467. В школі фельдшером ФАПу діагностовано скарлатину. Дитина госпіталізована. Накладений карантин. Контактні обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме карантин?

a. 7

- b. 10
- c. 21
- d. 3
- e. 14

468. У дитини 12-ти років важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка; кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для такого захворювання:

a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

b. Дифтерія гортані

- c. Обструктивний бронхіт
- d. Вогнищева пневмонія
- e. Набряк Квінке

469. У дитини з гемофілією А почалася носова кровотеча. Який препарат доцільно використати для зупинки кровотечі?

- a. Діцинон
- b. Вікасол

c. Кріопреципітат

- d. Вітамін С
- e. Хлористий кальцій

470. У хворого 32-х років сечокам'яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?

- a. Включити кран з водою
- b. Поставити холодний компрес на гомілки
- c. Провести катетеризацію
- d. Поставити гірчичники на гомілки

e. Помістити хворого в гарячу ванну

471. При огляді дитини 12-ти місяців фельдшер ФАПу оцінює місцеву реакцію після вакцинації БЦЖ. Які зміни повинні бути у місці щеплення?

- a. Пустула
- b. Інфільтрат
- c. Виразка

d. Рубчик

е. Везикула

472. У дитини 10-ти років фельдшер ФАПу запідозрив ревматизм. Для підтвердження діагнозу призначені додаткові методи обстеження. Який показник підтвердить попередній діагноз?

а. Підвищення вмісту білірубину в крові

б. Наявність у крові С-реактивного протеїну

с. Збільшення вмісту холестерину крові

д. Гіперглікемія

е. Гіпоглікемія

473. Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться, коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків?

а. В 6-7 років

б. У 2-3 роки

с. В 5-6 років

д. В 1 рік

е. В 4 роки

474. У пацієнта 58-ми років загострення ревматизму. Фельдшер повинен повідомити пацієнту, що аспірин необхідно приймати:

а. У проміжках між їжею

б. За 30 хвилин до сну

с. Після їжі

д. Натще

е. Під час їжі

475. До фельдшера ФАПу звернулась мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання "фонтаном" без домішок жовчі. Блювотні маси мають кислий запах. Дитина погано збільшує масу тіла. При огляді живота з'являється симптом "піщового годинника". Визначить попередній діагноз у дитини:

а. Виразкова хвороба

б. Гострий гастрит

с. Пілороспазм

д. Диспепсія

е. Пілоростеноз

476. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, мокнуття, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально –гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання запідозрив фельдшер?

а. Нейродерміт

б. Екзема

с. Кропив'янка

д. Токсикодермія

е. Атопічний дерматит

477. Оглядаючи вагітну 30-ти тижнів, фельдшер ФАПу діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

а. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду

б. Сублінгвально ніфедипін

с. Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг

д. Внутрішньовенно гініпрал

е. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг

478. До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 45-ти років зі скаргами на ниючий біль у правому підребер'ї, гіркоту в роті, нудоту, блювання. Позитивні симптоми Ортнера та Кера. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Хронічний гастрит
- b. Хронічний ентерит
- c. Хронічний холецистит**
- d. Хронічний гепатит
- e. Хронічний панкреатит

479. Фельдшер на ФАПі приймає строкові нормальні пологи. Народилася жива дитина вагою 4100 г. Через 20 хвилин після народження плоду виділився послід, при огляді якого фельдшер визначив, що всі дольки цілі, але одна судина виходить за край плаценти і сліпо обривається. Про яку можливу патологію плаценти слід думати?

- a. Білий інфаркт плаценти
- b. Подвійна плацента
- c. Хоріонепітеліома
- d. Пухирний занесок
- e. Додаткова долька плаценти**

480. Фельдшера ШМД викликали до потерпілої 35-ти років, яка 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті і епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

- a. Промити шлунок розчином соди через зонд
- b. Промити шлунок розчином перманганату калію
- c. Викликати блювання
- d. Промити шлунок теплою водою
- e. Промити шлунок холодною водою через зонд**

481. До фельдшера ФАПу звернулася мати з 3-річною дитиною, зі слів матері, дитина приблизно 45 хвилин тому випадково з'їла 8 таблеток тазепаму. Батьками ніяких медичних втручань не проводилось. Ваші дії?

- a. Спостереження
- b. Очисна клізма
- c. Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії
- d. Промивання шлунку до чистих промивних вод**
- e. В/в краплинно 0,9% розчин натрію хлориду

482. До пацієнтки 45-ти років, яка скаржиться на головний біль у ділянці потилиці, нудоту, одноразове блювання, що з'явилися після сварки з чоловіком, викликали фельдшера ШМД. Об'єктивно: збудження, червоні плями на обличчі, шиї, Ps-110/хв, АТ-180/110 мм рт.ст. Страждає на гіпертонічну хворобу. Ваш попередній діагноз?

- a. Інфаркт міокарда
- b. Гіпертонічний криз**
- c. Нейроциркуляторна дистонія
- d. Стенокардія напруження
- e. Гострий міокардит

483. На прийом звернулася жінка зі скаргами на переймоподібний біль у попереку зліва, який іррадіює в ногу; часте сечовипускання. При огляді: пацієнтка неспокійна, часто міняє положення тіла внаслідок нестерпного болю. Який симптом з наведених є найбільш інформативний для уточнення діагнозу?

- a. Пастернацького**
- b. Ровзінга
- c. Щоткіна-Блюмберга
- d. Ситковського
- e. Воскресенського

484. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 52-х років, що скаржиться на кашель, слабкість, схуднення, погіршення апетиту, пітливість, особливо вночі. Дані симптоми турбують впродовж місяця. Об'єктивно: $t_{\text{о}}-37^{\circ}\text{C}$, шкіра бліда, АТ-100/70 мм рт.ст. Дихання ослаблене справа над верхівкою, тони серця ритмічні, Ps-90/хв. Що можна запідозрити у хворого?

- a. Гострий бронхіт
- b. Туберкульоз легень**
- c. Сухий плеврит
- d. Бронхоектатична хвороба
- e. Негоспітальна пневмонія

485. При обстеженні хворого фельдшер ФАПу знайшов симптоми хронічного гастриту, які з'явилися у хворого після тривалого вживання препаратів. Який з нижчеперелічених препаратів здатний спричинити такий побічний ефект?

- a. Валеріана
- b. Но-шпа
- c. Корвалол
- d. Сенаде

e. Вольтарен

486. У дитини при нападі бронхіальної астми поверхнєве дихання з різко утрудненим видихом; наростає ціаноз, акроціаноз. Ефекту від використання сальбутамолу та еуфіліну немає. Що необхідно призначити?

- a. 1% димедрол 1 мг/кг
- b. 5% р-н аскорбінової кислоти 0,2 мл/кг
- c. 50% анальгін 0,1 мл/рік життя
- d. 2% супрастин 1-2 мг/кг

e. 3% преднізолон 2-3 мг/кг

487. Фельдшер ШМД доставив хворого у хірургічне відділення з підозрою на внутрішню кровотечу, розрив селезінки. Групу крові визначили за цоліклонами анти-А; анти-В. Через 2,5-3 хвилини реакція аглютинації відбулась з цоліклонами анти-А; з анти-В –відсутня. Яка група крові у хворого за системою АВ0?

- a. 0 (I)
- b. В (III)
- c. АВ (IV)
- d. Повторити дослідження

e. А (II)

488. Дитині 8 місяців. Квола, на огляд реагує слабким плачем; шкіра зморшкувата, з сіруватим відтінком, тургор тканин знижений, толерантність до їжі різко знижена, випорожнення нестійкі. Дефіцит маси тіла складає 41%. На яке захворювання вказують такі симптоми?

- a. Кишковий токсикоз з ексикозом
- b. Гіпотрофія II-го ступеня
- c. Гіпервітаміноз "Д"
- d. Гіпотрофія I-го ступеня

e. Гіпотрофія III-го ступеня

489. До приймального відділення доставлено хворого з підозрою на перфорацію виразки шлунку. Який із методів діагностики може підтвердити діагноз?

- a. Реографія
- b. Іригоскопія

c. Оглядова рентгенографія у вертикальному положенні

- d. Рентгенографія шлунку з контрастом
- e. Ультразвукове дослідження черевної порожнини

490. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 37-ми років зі скаргами на головний біль, загальну слабкість, незначне підвищення температури, набряки на обличчі, зменшення виділення сечі та зміна її кольору –колір "м'ясних помиїв". В анамнезі: 2 тижні тому ангіна. Об'єктивно: блідість шкіри; повіки набряклі. АТ-170/100 мм рт.ст., Ps-90/хв., температура тіла -37,5о

a. Піурія, бактеріурія

b. Симптом Пастернацького позитивний з обох боків. Вкажіть особливості сечового синдрому, які характерні для цієї хвороби:

- c. Лейкоцитурія, протеїнурія
- d. Гематурія, протеїнурія
- e. Поліурія, глюкозурія

491. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка 18-ти років, яка скаржиться на наявність щільного болючого вузлика в лівій підпахвовій ділянці, який утворився на 4 день після гоління волосся. Об'єктивно: в лівій підпахвовій ділянці конусоподібне утворення, багряно-червоного кольору з явищами флюктуації. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?

- a. Променева терапія
- b. Розтин гнояка і дренування**
- c. Поліхіміотерапія
- d. УВЧ
- e. Прикладання мазевих пов'язок

492. Фельдшер ФАПУ спостерігає за пацієнтом з лейкемією у якого раптово з'явилися загальна слабкість, головний біль, пітливість вночі, підвищення температури до 38о

- a. Інтоксикаційний
- b. Геморагічний
- c. Гіперпластичний
- d. Для якого синдрому характерні ці симптоми?**
- e. Анемічний

493. У 6-ти річної дівчинки після прийому ампіоксу гостро розвинулися ознаки медикаментозної алергії у вигляді кропив'янки та набряку Квінке. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ШМД в даному випадку?

- a. Кальцію глюконат
- b. Вітаміни
- c. Глюкокортикостероїди**
- d. Діуретики
- e. Седативні

494. Вагітна 26-ти років, з терміном вагітності 34 тижні, звернулася до фельдшера ШМД зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, блювання, миготіння "мушок" перед очима, посмикування м'язів обличчя. Об'єктивно: артеріальний тиск на обох руках 180/120 мм рт.ст, генералізовані набряки. Вкажіть, які анестезіологічні та реанімаційні заходи необхідно провести жінці в першу чергу:

- a. Провести корекцію водно-електролітних порушень
- b. Призначити гіпотензивні засоби
- c. Призначити засоби , які попереджують судоми**
- d. Призначити дезагреганти
- e. Забезпечити ефективну вентиляцію легень (ШВЛ)

495. Пацієнтка 29-ти років надійшла до гінекологічного відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Скарги на переймоподібний біль у правій клубовій ділянці. Затримка менструації 5 тижнів. Загальний стан середньої важкості, Рс-90/хв., АТ-105/60 мм рт.ст. Пальпаторно: живіт болючий в нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга не виражений. Бімануально: збільшені та болючі додатки справа. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- a. Зондування порожнини матки
- b. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- c. Гістеросальпінгографія
- d. Біопсія ендометрію
- e. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

496. Жінка звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на жовтуваті, з неприємним запахом виділення з піхви. Вкажіть, якими мають бути правильні дії фельдшера для вирішення проблеми пацієнтки?

- a. Взяти мазок на гормональне дзеркало

b. Зробити піхвову ванночку

c. Взяти мазок на цитологію

d. Взяти мазок з піхви на флору

e. Поставити піхвовий тампон

497. Фельдшер ШМД під час підшкірної ін'єкції олійного розчину камфори виявив, що у пацієнта виник раптовий біль, ціаноз верхньої половини грудної клітки і обличчя. Назвіть ускладнення ін'єкції:

a. Колапс

b. Запаморочення

c. Алергічна реакція

d. Повітряна емболія

e. Жирова емболія

498. У вагітної 36 тижнів раптово виник напад еклампсії. Викликана бригада ШМД. Ваші першочергові дії?

a. Ввести роторозширювач і зафіксувати язик

b. Дати інгаляційний наркоз

c. Ввести седативні засоби

d. Ввести гіпотензивні засоби

e. Ввести протисудомні засоби

499. До фельдшера ФАПу звернувся потерпілий, який декілька днів тому отримав відмороження ступнів. При обстеженні: спостерігається некроз усіх шарів шкіри, утворюються пухирі з кров'янистим вмістом. Який це ступінь відмороження?

a. IV

b. V

c. I

d. II

e. III

500. Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту. Зазначте термін початку профілактики та добову дозу вітаміну D3:

a. З 10-20-го дня по 1000-2000 МО

b. З 10-14-го дня по 500-1000 МО

c. З 10-го дня по 2000 МО

d. На 2-му тижні по 4000 МО

e. На 2-му місяці життя по 500 МО

501. У пацієнта 32-х років на тлі гіперемованої шкіри в ділянці вусів дрібні гноячки, жовті кірки, свербіж, збільшені підщелепні лімфатичні вузли. Яку патологію варто запідозрити?

a. Туберкульоз шкіри

b. Трихофітія

c. Сикоз

d. Герпес простий

e. Кандидоз

502. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом виразкова хвороба шлунку. Вдома виникло блювання, виділилось до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ-80/40 мм рт.ст., ЧСС -132/хв., ЧД-24/хв. ЦВТ-0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

a. Гіповолемічний шок

b. Перфорація виразки шлунку

c. Анафілактичний шок

d. Кардіогенний шок

e. Гостре отруєння

503. Фельдшера ШМД викликали до пацієнтки 30-ти років, яка має скарги на напад ядухи з утрудненим видихом. Напад триває понад добу. ЧДР-50/хв., над правою легенею дихання не вислуховується. Вкажіть найімовірніший попередній діагноз:

- a. Бронхоектатична хвороба
- b. Серцева астма

c. Астматичний статус

- d. Госпітальна пневмонія
- e. Обструктивний бронхіт

504. При обстеженні пацієнтки 23-х років за допомогою піхвових дзеркал виявили, що слизова піхви вкрита серозними нашаруваннями. Виділення з піхви рясні, жовтуваті. Який попередній діагноз?

- a. Рак піхви
- b. Гострий цервіцит
- c. Гострий вульвіт
- d. Гострий метрит

e. Гострий кольпіт

505. Хвора 34-х років скаржиться на слабкість, швидку втому, шум у вухах, задишку, бажання їсти крейду. Шкіра бліда, суха, тони серця ритмічні, систолічний шум на верхівці, АТ-120/70 мм рт.ст., Рс-84/хв. У крові знижений гемоглобін та кольоровий показник. Який препарат треба призначити хворій?

- a. Вітамін В12
- b. Вітамін А

c. Фенюльс

- d. Вітамін С
- e. Вітамін В1

506. Фельдшер ШМД обслуговує виклик до пацієнта з бронхіальною астмою. Напад ядухи триває 3 години. Інгаляції сальбутамолу, внутрішньовенне введення еуфіліну ефекту не дали. Об'єктивно: вимушене положення тіла, дистанційні сухі хрипи. Для надання невідкладної допомоги доцільно застосувати:

- a. Лазолван

b. Преднізолон

- c. Астмопент
- d. Вікасол
- e. Фентаніл

507. Молодий чоловік під час прийому їжі раптово схопився за шию, рот відкритий, дихання неможливе, ціаноз, відсутні голос та кашель. Які заходи необхідно провести в першу чергу?

- a. Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- b. Ввести зонд у шлунок
- c. Запрокинути голову доверху
- d. Придати хворому горизонтальне положення

e. Використати метод Геймліха

508. У пацієнта 18-ти років, що хворіє на ревматизм з мітральним стенозом, після гри у футбол з'явилися задишка, виділення рожевого пінистого мокротиння. Об'єктивно: над легенями вислуховуються дрібно-та середньоміхурцеві вологі хрипи. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пацієнта:

- a. Шлунково-кишкова кровотеча
- b. Легенева кровотеча

c. Гостра лівошлуночкова недостатність

- d. Гостра судинна недостатність
- e. Гостра дихальна недостатність

509. Каретою ШМД доставлена у пологовий будинок роділля 40 тижнів. Пологової діяльності немає. Дві години тому почалася значна кровотеча, яка продовжується дотепер. Дослідження

півхи: шийка згладжена, відкриття на 1 см; внутрішнє вічко повністю закрито губчастою тканиною, значна кровотеча. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- b. Бічне передлежання плаценти
- c. Центральне передлежання плаценти**
- d. Гіпотонічна кровотеча
- e. Шийкова вагітність

510. У хворого 50-ти років після надмірного вживання їжі та алкоголю раптово виник інтенсивний біль у епігастральній ділянці, який супроводжувався нудотою, блюванням та здуттям живота. Ps-100/хв, аритмічний, екстрасистолія. АТ-90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Лейкоцитоз -13,8 . 109/л. ЕКГ-інтервал ST у відведеннях III і aVF вище ізолінії на 6 мм. Яка патологія розвинулась у хворого?

- a. Гострий інфаркт міокарда**
- b. Перфорація виразки шлунку
- c. Харчова токсикоінфекція
- d. Гострий холецистит
- e. Гострий панкреатит

511. Фельдшер ШМД прибув на виклик. Пацієнтка пред'являє скарги на біль у правому підребер'ї, багаторазове блювання без полегшення, підвищення температури до 39о

- a. При обстеженні: живіт болісний в правому підребер'ї, де визначається локальне напруження м'язів, пальпується овальне щільне утворення. Клінічні ознаки є характерними для такого захворювання:**
- b. Хвороба Крона
- c. Гострий апендицит
- d. Гострий панкреатит
- e. Гострий холецистит

512. До фельдшера ФАПУ звернувся юнак 20-ти років зі скаргами на кровотечі при незначних травмах. Хворіє з дитинства. Дід по материнській лінії хворів на таке саме захворювання. При огляді: на шкірі гематоми, ліктьові та колінні суглоби деформовані, рухи в них обмежені. Вірогідний попередній діагноз:

- a. Гемолітична анемія
- b. Геморагічний васкуліт
- c. Гемофілія**
- d. Апластична анемія
- e. Гострий лейкоз

513. Фельдшер прийшов на виклик до дитини 5-ти днів. Мати стурбована появою на пелюшці червонуватого забарвлення від сечі. Загальний стан дитини не порушений. Чим це пояснюється?

- a. Статева криза
- b. Дисбактеріоз
- c. Транзиторна лихоманка
- d. Запальне захворювання нирок
- e. Сечокислий інфаркт нирок**

514. Який максимальний об'єм лікувального засобу можна ввести підшкірно пацієнтові одноразово?

- a. 1 мл
- b. 5 мл**
- c. 2 мл
- d. 15 мл
- e. 10 мл

515. Жителька села звернулась до фельдшера ФАПУ зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри та сухість, схильність до фурункульозу. Яке дослідження слід провести для постановки діагнозу?

- a. Аналіз крові на сечовину
- b. Аналіз крові на печінкові проби
- c. Загальний аналіз крові
- d. Аналіз крові на глюкозу**
- e. Біохімічний аналіз крові

516. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для діагностики цієї патології?

- a. Біопсія**
- b. Рентгенологічне дослідження
- c. Пальпація
- d. Комп'ютерна томографія
- e. УЗД

517. Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином перексиду водню. Яким розчином потрібно тричі промити вироби після стерилізації:

- a. 0,5% розчином нашатирного спирту
- b. 2% розчином натрію гідрокарбонату

c. Стерильним ізотонічним розчином

- d. Розчином фурациліну 1:5000
- e. Дистильованою водою

518. У пацієнта, який протягом години знаходився на вулиці при температурі -29°C, скарги на оніміння щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна чутливість знижені. Які першочергові заходи слід вжити при наданні допомоги?

- a. Викликати бригаду ШМД та дати гарячий чай
- b. Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ
- c. Накласти на уражені ділянки пов'язки з маззю Вишневського

d. Розтерти шкіру обличчя рукою до почервоніння шкіри

- e. Протерти шкіру спиртом та накласти термоізоляційну пов'язку

519. У новонародженої дитини спостерігаються: ціаноз шкіри, слабкий крик, поверхневе нерівномірне дихання. Р_с-56/хв, м'язовий тонус знижений, кінцівки зігнуті. При проведенні непрямого масажу серця подушечки двох великих пальців фельдшера розташовані на груднині дитини. Вкажіть найчастіше ускладнення, яке може виникнути при покладанні рук фельдшера на мечоподібний відросток при здійсненні даної реанімації:

- a. Відкритий пневмоторакс
- b. Гостра емфізема
- c. Гематома грудної клітки

d. Ушкодження печінки

- e. Перелом ребер

520. До фельдшера оздоровчого пункту звернувся робітник, який наколов стопу цвяхом. На підшві рана 0,2х0,3 см. Щеплення проти правця проведено 2 роки тому. Який препарат для вакцинації повинен першочергово підготувати фельдшер?

a. ПА 0,5 мл

- b. ПА 1,0 мл
- c. ППС 3000 МО
- d. ППС 3000 МО та ПА 1,0 мл
- e. Щеплення не потрібне

521. До фельдшера здоров'я пункту підприємства звернулася жінка 45-ти років зі скаргами на кашель із виділенням невеликої кількості слизисто-гнійного харкотиння, підвищення температури тіла до 37,8°C, загальну слабкість. Хворіє впродовж 4-х діб. Захворювання пов'язує з переохолодженням. Перкуторно –ясний легеневий звук; аускультативно –вологі хрипи у нижніх відділах лівої легені. Рентгенологічно –ділянки затемнення легеневої тканини діаметром 1-2 см у нижній частці лівої легені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Бронхоектатична хвороба
- b. Гостра шпитальна пневмонія

c. Гостра позашпитальна пневмонія

- d. Гострий бронхіт
- e. Хронічний бронхіт

522. У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, "півнячий крик". З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- a. Зробити прохолодну клізму
- b. Ввести внутрішньовенно преднізолон
- c. Ввести внутрішньом'язово 50% р-н анальгін
- d. Натиснути на корінь язика**
- e. Ввести 1% розчин нікотинової кислоти підшкірно

523. До фельдшера ФАПу звернулась хвора зі скаргами на кашель з виділенням гнійного харкотиння повним ротом, задишку, схуднення. При об'єктивному обстеженні виявлені мозаїчність перкуторного звуку, зміна нігтьових фаланг у вигляді "барабанних паличок" і нігтів у вигляді "годинникових скелець". Яке захворювання вірогідно у хворої?

- a. Ателектаз легенів
- b. Туберкульоз легень
- c. Позагоспітальна пневмонія

d. Бронхоектатична хвороба

- e. Бронхіальна астма

524. У хворой 25-ти років після пологів виникли скарги на висип на обличчі, різку слабкість. Об'єктивно: еритематозний висип на спинці носа і вилицях у вигляді "метелика". Температура тіла -38,0

- a. Кропив'янка
- b. Вузликовий періартеріт
- c. Системний червоний вовчак
- d. Системна склеродермія

e. Аналіз крові: LE-клітини. ШЗЕ-36 мм/год. Клінічна картина характерна для такого захворювання:

525. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- a. Санаторно-курортне лікування
- b. Фізіотерапевтичні методи лікування

c. Диспансерний нагляд

- d. Медикаментозне лікування
- e. Оперативне лікування

526. До фельдшера ФАПу звернулась жінка 28-ми років. Має двох дітей. Найближчим часом народжувати дитину не планує. Соматичної та гінекологічної патології немає. Який метод контрацепції для неї найкращий?

- a. Шийкові ковпачки
- b. Природне планування сім'ї
- c. Комбіновані протизаплідні засоби

d. ВМЗ

- e. Презервативи

527. У роділлі фізіологічний перебіг післяпологового періоду, друга доба. Вкажіть характер лохій, що відповідатимуть даній ситуації:

- a. Гнійні
- b. Прозорі
- c. Кров'янисті, в помірній кількості**
- d. Серозні
- e. Серозно-кров'янисті

528. Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- a. Змінний
- b. Імпульсний
- c. Високочастотний
- d. Модульований
- e. Постійний**

529. Пацієнтка 30-ти років покаржилась фельдшеру ФАПу на відсутність місячних протягом останніх 7-ми місяців. Вагітності немає. Поставте попередній діагноз.

- a. Аменорея**
- b. Клімактеричний синдром
- c. Гіперменструальний синдром
- d. Посткастраційний синдром
- e. Гіпоменструальний синдром

530. До фельдшера ФАПу звернулась вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. При огляді фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- a. На УЗД
- b. До ВПВ
- c. В гінекологічне відділення
- d. До дільничного гінеколога**
- e. До терапевта

531. Ви здійснюєте спостереження за розвитком здорової дитини та плануєте профілактичні щеплення. Для профілактики гемофільної інфекції ви застосуєте вакцину:

- a. БЦЖ
- b. Хіберікс**
- c. Пріорікс
- d. Інфанрікс
- e. Імовакс Поліо

532. В приймальне відділення доставлено хворого 20-ти років без свідомості. В його кишені знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС-105/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно приготувати в першу чергу для надання невідкладної допомоги?

- a. Реополіглюкин
- b. Інсулін**
- c. Адреналін
- d. Глюкоза
- e. Папаверин

533. Хворий 41-го року зловживає алкоголем близько 7-ми років, останні роки похмеляється. На третій день після відміни алкоголю відчув страх, тривогу, занепокоєння, почав бачити "мух та павуків", які повзали по ньому, далі помітив, що у кімнаті з'явилися "кури, пацюки, маленькі чоловічки". Бігав, кричав, ховався. Орієнтація в собі збережена, в часі та просторі не орієнтований. Який стан розвинувся у хворого?

- a. Шизофренія
- b. Алкогольний делірій**
- c. Старечий параноїд
- d. Маніакально-депресивний психоз
- e. Епілептичний психоз

534. Пацієнтка 24-х років звернулася до фельдшера зі скаргами на безплідність упродовж 6-ти років. Із анамнезу: гінекологічні та соматичні захворювання відсутні. Менструальна функція не порушена. Базальна температура двофазна. На гістеросальпінгографії - труби прохідні. Спермограма чоловіка - без патологічних змін. Яка найімовірніша форма безпліддя у цієї

пацієнтки?

- a. Секреторно-ендокринна
- b. Ендокринна
- c. Трубно-перитонеальна
- d. Імунологічна**
- e. Непояснена

535. На виробництві робітник отримав рану грудної клітки. Скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, різкий біль у місці ушкодження, задишку, кашель. При огляді: шкірні покриви бліді, АТ-70/60 мм рт.ст., рана "дихає". Про наявність якого невідкладного стану свідчать ці ознаки?

- a. Закритий пневмоторакс
- b. Кардіогенний шок
- c. Перелом ребер
- d. Відкритий пневмоторакс**
- e. Набряк легенів

536. При обстеженні вагітної фельдшером ФАПу було встановлено нормальні розміри великого тазу. Які саме?

- a. 26-29-32-19 см
- b. 25-28-30-17 см
- c. 24-26-29-14 см
- d. 25-28-31-20 см**
- e. 26-26-29-18 см

537. Хворому призначено 32 ОД інсуліну (1 мл = 40 ОД). У фельдшера ФАПу інсулінового шприца не було. Яку кількість інсуліну потрібно набрати у шприц об'ємом 2 мл?

- a. 0,9 мл
- b. 0,5 мл
- c. 0,7 мл
- d. 0,3 мл
- e. 0,8 мл**

538. Фельдшер ШМД на виклику у дитини 7-ми років. Скарги на остуду, підвищення температури тіла до 39°C, головний біль, кашель. Дитина бліда, тремтить, шкіра "мармурова", кінцівки холодні, сухий кашель, зів гіперемований, тони серця приглушені, тахікардія. Розчин якого лікарського препарату повинен ввести фельдшер у першу чергу?

- a. 2,5% аміназину
- b. 1% димедролу
- c. 20% глюкози
- d. 2,4% еуфіліну
- e. 1% дибазолу**

539. У пацієнта 45-ти років спостерігається ранкова скутість у дрібних суглобах кистей рук. При об'єктивному обстеженні: суглоби деформовані у вигляді "ластів моржа", шкіра над ними набрякла та гіперемована. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Ревматичний артрит
- b. Ревматоїдний артрит**
- c. Хвороба Бехтерева
- d. Гонорейний артрит
- e. Деформуючий артроз

540. Бригада ШМД викликана до хворої 27-ми років. Жінка скаржиться на біль у лівому плечовому суглобі. Годину тому вона впала зі сходів. При огляді: ліва рука відведена в сторону. В ділянці дельтоподібного м'язу спостерігається западина, рух в суглобі неможливий. Якою є невідкладна допомога?

- a. Вправити вивих, пов'язка Дезо, залиши вдома
- b. Вправити вивих, транспортувати до хірургічного відділення**

с. Колосоподібна пов'язка на плечовий суглоб, знеболювання

d. Знеболити, пов'язка Дезо, транспортувати до травмпункту

е. Знеболити, транспортувати до хірургічного відділення

541. До фельдшера ФАПу звернулася жінка зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли після використання нового прального порошку. Об'єктивно: шкіра кисті та передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикулярні висипи. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Нейродерміт

б. Псоріаз

с. Алергічно-контактний дерматит

д. Токсикодермія

е. Піодермія

542. Хвора 48-ми років звернулася до фельдшера здоровпункту із скаргами на сильний головний біль у потиличній ділянці, який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоту, біль у ділянці серця. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, межі серця розширені вліво на 1 см. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. АТ-190/100 мм рт.ст., пульс напружений, ритмічний. Який стан виник у хворої?

а. Стабільна стенокардія напруження

б. Гіпертонічна хвороба, ускладнений гіпертензивний криз

с. Гіпертонічна хвороба, неускладнений гіпертензивний криз

д. Інфаркт міокарда

е. Гостра лівошлуночкова недостатність

543. У дитини 5-ти місяців з внутрішньочерепною пологовою травмою в анамнезі, раптово виник напад судом. Який препарат необхідно ввести?

а. Димедрол

б. Кальцію хлорид

с. Сибазон

д. Парацетамол

е. Анальгін

544. У хлопчика 13-ти років субфебрильна температура, втомлюваність. Зараз стан погіршився, температура тіла 38,5°C, головний біль, блювання, позитивні менінгеальні ознаки, косоокість. Реакція Манту – папула 15 мм. Про що фельдшер повинен думати в першу чергу?

а. Туберкульозний менінгіт

б. Гіпертонічний криз

с. Гостре респіраторне захворювання

д. Менінгококовий менінгіт

е. Забій головного мозку

545. Після ДТП у пацієнта скарги на біль у ділянці таза, промежини, рух нижніх кінцівок обмежений, позитивний симптом "прилиплої п'яти". Як транспортувати потерпілого?

а. На здоровому боці

б. Напівсидячи

с. На спині

д. В позі "жаби"

е. На животі

546. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру тіла – 37,6°C, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі – кіста яєчника. Бімануально: матка звичайних розмірів, щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, малорухоме. Який найбільш вірогідний діагноз?

а. Гострий аднексит

б. Розрив капсули кісти яєчника

с. Порушена позаматкова вагітність

d. Перекрут ніжки кісти яєчника

e. Апоплексія яєчника

547. Ви прийшли на патронаж до дитини віком 3 місяці. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. На день огляду маса тіла 4500 г. Який дефіцит маси тіла у дитини?

a. 600 г

b. 800 г

c. 1000 г

d. 700 г

e. 900 г

548. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 42-х років із скаргами на нападоподібний кашель з незначним виділенням слизисто-гнійного харкотиння, яке тяжко відкашлюється, задишку з утрудненим видихом. Хворіє 5 років. Об'єктивно: діжкоподібна грудна клітка, аускультативно –сухі свистячі та поодинокі вологі хрипи. Про яке захворювання можна думати?

a. Хронічний обструктивний бронхіт

b. Сухий плеврит

c. Негоспітальна пневмонія

d. Ексудативний плеврит

e. Гострий бронхіт

549. У пацієнтки 24-х років на другий день після підшкірного введення 2 мл 20% олійного розчину камфори з'явився біль і ущільнення в ділянці ін'єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

a. Абсцес

b. Гематома

c. Некроз

d. Алергійна реакція

e. Інфільтрат

550. Фельдшер ФАПУ знаходиться на виклику у дитини з підвищеною температурою тіла, кашлем, вологими хрипами в легенях, кількість яких після кашлю зменшується. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз:

a. Гострий бронхіт

b. Астматичний бронхіт

c. Обструктивний бронхіт

d. Гостра пневмонія

e. Бронхіальна астма

551. У стаціонар за направленням фельдшера здоров'я пункту поступив 27-річний робітник зі скаргами на голодні, нічні болі в животі, з переважною локалізацією в епігастральній ділянці. З анамнезу відомо, що з 18-річного віку хворіє хронічним гастритом типу В. Який імовірний діагноз?

a. Хронічний холецистит

b. Хронічний панкреатит

c. Виразкова хвороба 12-палої кишки

d. Гострий ентерит

e. Виразкова хвороба шлунку

552. У хворої 44-х років, що страждає на хворобу Верльгофа, періодично з'являються плямисті геморагії на шкірі та посилюються маткові та носові кровотечі. Що стало найбільш вірогідною причиною даного захворювання?

a. Дефіцит вітаміну А

b. Дефіцит вітаміну Е

c. Порушення лейкопоезу

d. Порушення еритропоезу

e. Порушення тромбоцитопоезу

553. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 55-ти років зі скаргами на порушення акту дефекації останні 6 місяців. Пронosi чергуються із закрепамми, незначна кровотеча. В останні дні з'явився біль у промежині. Помітно втратив вагу. Під час пальцевого дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Ваш попередній діагноз:

- a. Кондилома прямої кишки
- b. Геморой
- c. Тріщина прямої кишки
- d. Поліп прямої кишки

e. Рак прямої кишки

554. У жінки 28-ми років через два дні після переохолодження з'явилося часте і болісне сечовипускання (через кожні 30-40 хв.), кров у сечі на прикінці сечовипускання. Об'єктивно: при пальпації болючість в надлобковій ділянці. Температура тіла 37,0

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Найімовірніший попередній діагноз?**
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Гострий цистит
- e. Нецукровий діабет

555. Назвіть показання для годування пацієнта через шлунковий зонд:

- a. При пухлинах глотки
- b. При опіках стравоходу
- c. Тривала непритомність**
- d. Непрохідність кишок
- e. Після операції на стравоході

556. Фельдшера ФАПУ викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворій відмічалась слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- a. Транзиторна ішемічна атака**
- b. Субарахноїдальний інсульт
- c. Ішемічний інсульт
- d. Геморагічний інсульт
- e. Тромбоемболія судин мозку

557. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 62-х років зі скаргами на розлади уваги, зниження пам'яті, працездатності, поганий сон, схильність до гніву, дратівливість. Холестерин крові –8,5 ммоль/л. Вкажіть ймовірніший діагноз:

- a. Післяінфарктний кардіосклероз
- b. Нейроциркуляторна дистонія
- c. Стабільна стенокардія напруження
- d. Стенокардія, що виникла вперше
- e. Атеросклероз судин головного мозку**

558. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38,0°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

- a. Флегмона
- b. Лімфаденіт**
- c. Прувець
- d. Бешиха
- e. Лімфангоїт

559. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 57-ми років. Працює бурильником. Скаржиться на ниючий біль у кистях, який турбує вночі, відчуття "повзання мурашок", мерзлякуватість кистей, головний біль, поганий сон, зниження працездатності. Крім того, зазначає побіління пальців після миття рук холодною водою. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Реактивний артрит
- b. Діабетична полінейропатія

c. Вібраційна хвороба

- d. Інтоксикаційна полінейропатія
- e. Синдром Рейно

560. У дитини 2-х років температура 38,0°C, в'ялість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Для якого захворювання притаманні ці симптоми?

- a. Гострий ларингіт
- b. Бронхіальна астма
- c. Гострий бронхіт
- d. Назофарингіт

e. Гостра пневмонія

561. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 53-х років зі скаргами на оніміння, парестезії кінцівок, незначне похитування при ходьбі, печіння у кінчику язика, слабкість, адинамію. Вісім років тому – субтотальна резекція шлунку. Об'єктивно: шкіра бліда, із жовтяничним відтінком. Язик яскраво-червоний, "лакований", зниження чутливості кінцівок. У крові: ер.-2,6 · 10¹²/л, Hb-72 г/л, КР-1,3, тільця Жолі. Ваш попередній діагноз?

- a. Хронічний лімфолейкоз
- b. Гемолітична анемія

c. B12-дефіцитна анемія

- d. Гіпопластична анемія
- e. Залізодефіцитна анемія

562. Фельдшер ФАПУ призначив опромінення поперекової ділянки пацієнту з радикулітом. Що першочергово слід зробити фельдшеру перед початком проведення процедури:

- a. Виміряти температуру тіла
- b. Визначити артеріальний тиск
- c. Визначити частоту пульсу

d. Визначити біодозу УФ-опромінення

- e. Оглянути шкіру

563. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з 1,5-річною дитиною, зі скаргами на поганий сон, погіршення апетиту, $t_{\text{о}}=38,0^{\circ}\text{C}$, слинотечу. При огляді: слизова оболонка ротової порожнини гіперемована, з білуватими жовтими пляшками оточеними вінчиком гіперемії. Вкажіть найбільш імовірний діагноз?

- a. Герпетичний стоматит
- b. Виразковий стоматит
- c. Катаральний стоматит
- d. Кандидозний стоматит

e. Афтозний стоматит

564. Фельдшера викликали в цех з приводу нещасного випадку. Зі слів робітників з'ясовано, що їх товариш 5 хвилин тому крикнув, впав, почалися судоми. До моменту приходу фельдшера судоми припинились. При огляді: видно затиснутий в руці оголений електричний провід, що звисає зі станка. Свідомість відсутня. Шкіра бліда. Зіниці на світло не реагують. Якими мають бути першочергові дії фельдшера?

- a. Знеболити, транспортувати в хірургічне відділення
- b. Провести дефібриляцію
- c. Дати вдихнути нашатирний спирт

d. Припинити дію струму, розпочати серцево-легеневу реанімацію

- e. Ввести протигістамінні препарати

565. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 32-х років зі скаргами на тривалі і рясні менструації впродовж півроку, тягнучі болі в нижніх відділах живота, слабкість. При гінекологічному обстеженні: тіло матки збільшено до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. У

крові: Hb–90 г/л. Яку патологію можна запідозрити?

- a. Вагітність
- b. Дисфункціональна маткова кровотеча
- c. Міома матки, постгеморагічна анемія**
- d. Кістома яєчника
- e. Рак тіла матки

566. Породілля з геморагічним шоком у ранньому післяпологовому періоді. Фельдшер ШМД при наданні невідкладної допомоги на догоспітальному етапі повинен зробити:

- a. Ввести кальцію хлорид
- b. Налагодити інфузію розчинів у дві вени**
- c. Ввести преднізолон
- d. Ввести кордіамін
- e. Ввести знеболювальні засоби

567. Пацієнту з гострою серцевою недостатністю проведено кровопускання. З метою попередження якого ускладнення фельдшер повинен слідкувати за дотриманням суворого ліжкового режиму та здійснювати контроль за пульсом та артеріальним тиском?

- a. Ортостатичний колапс**
- b. Напад ядухи
- c. Тромбоемболія
- d. Шок
- e. Непритомність

568. На ФАП до фельдшера звернулася дівчина 17-ти років зі скаргами на неможливість статевого життя, відсутність менструації. При обстеженні виявлено, що зовнішні статеві органи розвинуті правильно, пальцем вдається проникнути на 1 см за задню спайку, піхва відсутня. Під час ректального обстеження матка не пальпується, визначається невеликий тяж. Для якої патології характерні такі дані?

- a. Атрезія піхви
- b. Гіпоплазія піхви та матки
- c. Аплазія піхви
- d. Атрезія дівочої перетинки
- e. Аплазія піхви та матки**

569. Мама викликала фельдшера ФАПу до дитини 7-ми років у якої в анамнезі вірусний міокардит. Дитина скаржиться на серцебиття, виражену слабкість, утруднене дихання. Фельдшер виявив ознаки гострої лівошлуночкової недостатності. В якому положенні потрібно госпіталізувати дитину до лікарні?

- a. На правому боці
- b. З опущеним головним кінцем
- c. Напівсидячи**
- d. Лежачи на щиті
- e. На лівому боці

570. Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

- a. Пухирчатка новонароджених
- b. Везикулопустульоз**
- c. Псевдофурункульоз
- d. Екссфолюативний дерматит Ріттера
- e. Попрілості

571. При огляді хворого фельдшер констатував відсутність свідомості, рухів грудної клітки, відсутність пульсу на сонній артерії, розширені зіниці без реакції на світло. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. Алкогольний делірій**

- b. Агонія
- c. Преагональний період
- d. Клінічна смерть**
- e. Коматозний стан

572. Ви проводите обстеження пацієнта, який був збитий вантажівкою. Він знаходиться без свідомості, з носа та вух витікає ліквор і кров. Про що свідчать вище перераховані симптоми?

- a. Перелом основи черепа**
- b. Перелом склепіння черепа
- c. Перелом щелеп
- d. Носова кровотеча
- e. Перелом кісток носа

573. Дитині 3 роки. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, слабкість, розлади сну, погіршення апетиту, часті сечовипускання, нетримання сечі; дитина збуджена. Сеча каламутна, з осадом і пластівцями. Першочерговим дослідженням у комплексі діагностичних заходів буде:

- a. УЗД нирок**
- b. Рентгеноурологічне
- c. Екскреторна урографія
- d. Мікційна цистографія
- e. Цистоскопія

574. Де спостерігається стоншення підшкірно-жирової клітковини в разі гіпотрофії II ступеня?

- a. На тулубі та кінцівках**
- b. На животі
- c. Тільки на тулубі
- d. На тулубі, кінцівках, обличчі
- e. Тільки на кінцівках

575. До фельдшера ФАПУ звернулась жінка, яка під час консервування облила ліву ногу окропом. Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом "дев'ятки":

- a. 9%
- b. 36%
- c. 18%**
- d. 1%
- e. 27%

576. Пацієнт 25-ти років, із діагнозом грип, перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- a. Вогнищева поточна**
- b. Механічна
- c. Комбінована
- d. Вогнищева заключна
- e. Профілактична

577. На профілактичний прийом до фельдшера прийшла мати з 4 місячною дитиною. Стан задовільний. Психомоторний і фізичний розвиток дитини відповідає віку. Дитина здорова. Проти яких інфекційних захворювань Ви запропонуєте зробити щеплення даній дитині?

- a. Дифтерія, правець, гепатит В, поліомієліт, краснуха
- b. Кір, краснуха, епідемічний паротит, гемофільна інфекція, туберкульоз
- c. Туберкульоз, дифтерія, правець, поліомієліт, гепатит В
- d. Дифтерія, кашлюк правець, поліомієліт, гемофільна інфекція**
- e. Дифтерія, кашлюк правець, поліомієліт, кір

578. Фельдшер прибув на місце автокатастрофи. Один з пасажирів у стані клінічної смерті. Є підозра на перелом хребта в шийній ділянці. Що слід робити в цьому випадку для забезпечення

прохідності дихальних шляхів?

- a. Запрокинути голову потерпілого
- b. Вивести вперед нижню щелепу**
- c. Повернути голову потерпілого
- d. Підкласти валик під лопатки
- e. Опустити голову потерпілого

579. Під час пологів у медичному транспорті у роділлі із вузьким тазом стали болючі перейми. Контракційне кільце на рівні пупка, косо розташоване. Нижній сегмент матки болючий при пальпації. Положення плода поздовжнє, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плода приглушене –16/хв. Про яке ускладнення в пологах може подумати фельдшер?

- a. Повний розрив матки
- b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- c. Розрив промежини
- d. Загроза розриву матки**
- e. Центральне передлежання плаценти

580. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 19-ти років зі скаргами на підвищення температури тіла, біль у ділянці серця, задишку, болі у плечових суглобах. Хворіє останні три дні. Захворювання пов'язує з перенесеною 2 тижні тому ангіною. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові чисті. Мигдалики збільшені, пухкі. Тони серця ритмічні. Ваш попередній діагноз?

- a. Хронічний тонзиліт
- b. Гострий перикардит
- c. Гостра ревматична лихоманка**
- d. Ендокардит
- e. Гострий міокардит

581. При дослідженні мазка піхвового вмісту на визначення ступеню його чистоти, виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слабколужна. Це характерно для такого ступеню чистоти піхви:

- a. –
- b. IV
- c. III**
- d. I
- e. II

582. На консультацію до фельдшера ФАПУ звернулася подружня пара з приводу безпліддя впродовж 2-х років. Контрацептивними засобами не користувались. Який метод обстеження доцільно порекомендувати в першу чергу для з'ясування причини безпліддя?

- a. Мазок з піхви на ступінь чистоти
- b. Гідротубація, пертурбація
- c. Гістеросальпінгографія
- d. Вимірювання базальної температури
- e. Дослідження сперми чоловіка**

583. Під час проходження практики студент електромеханічного коледжу поранив передпліччя на токарському станку. З рани пульсуючою цівкою витікає кров. Як тимчасово зупинити кровотечу, щоб доставити потерпілого до лікарні?

- a. Накласти міхур з льодом
- b. Провести ПХО рани
- c. Накласти давлячу пов'язку
- d. Провести тампонаду рани
- e. Накласти кровоспинний джгут**

584. Ви на виклику у заміжньої жінки, яка скаржиться на періодичні переймоподібні болі у здухвинній ділянці, затримку менструації. Після фізичного навантаження з'явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?

a. Порушена позаматкова вагітність

- b. Прогресуюча позаматкова вагітність
- c. Розрив піосальпінкса
- d. Перекрут ніжки кісти
- e. Апоплексія яєчника

585. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 23-х років зі скаргами на біль у ділянці задньої поверхні шиї, підвищення температури до 37о

a. При обстеженні на задній поверхні шиї визначається припухлість, гіперемія шкіри, болючий інфільтрат в центрі якого видно 3 некротичні стрижні. Про яке захворювання може подумати фельдшер?

- b. Абсцес
- c. Флегмона
- d. Фурункул
- e. Карбункул

586. Дівчину 17-ти років періодично турбують напади головного болю в скроні та ділянці ока. Їм передують зорові порушення, випадіння поля зору. Інколи, під час нападу, буває блювання. Напад триває декілька годин. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

a. Вегето-судинна дистонія

b. Мігрень

- c. Гіпертонічний криз
- d. Транзиторний ішемічний напад
- e. Субарахноїдальна гематома

587. В хірургічному відділенні у пацієнта 40-ка років після проведення біологічної проби при переливанні крові з'явилися оперізуючий біль у поперековій ділянці, почуття страху, серцебиття, загрудниний біль, холодний піт. Які першочергові дії?

a. Негайно ввести преднізолон

- b. Провести кисневу терапію
- c. Негайно ввести спазмолітики
- d. Негайно припинити переливання крові та викликати лікаря
- e. Негайно ввести знеболюючі

588. Фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства для приготування 1 л 0,5% розчину хлорантоїну повинен взяти сухої речовини:

- a. 50 г
- b. 15 г
- c. 20 г
- d. 10 г

e. 5 г

589. У дитини 2-х місяців у паховій ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Попрілості I ступеня
- b. Пітниця
- c. Везикулопустульоз

d. Попрілості III ступеня

e. Пухирчатка новонародженого

590. До ФАПУ поступила хвора 56-ти років зі скаргами на біль оперізуючого характеру, нудоту, багаторазове блювання, здуття живота, наростаючу слабкість. Стан хворої важкий, значна блідість шкіри, язик сухий. Живіт здутий, м'який при пальпації. Симптоми подразнення очеревини слабо позитивні. Про який попередній діагноз можна думати?

- a. Перфоративна виразка шлунку
- b. Гострий холецистит
- c. Гостра спастична кишкова непрохідність
- d. Гострий апендицит

е. Гострий панкреатит

591. У хворого на рак шлунку раптово з'явилося багаторазове блювання. Блювотні маси мають вигляд "кавової гущі". Шкіра бліда. АТ-90/60 мм рт.ст. Рс-100/хв. Яке положення треба надати хворому?

- а. Напівсидячи з опущеними додолу ногами
- б. Положення Симса

с. Горизонтальне на спині, голова повернута набік

- д. На животі
- е. Високе положення Фаулера

592. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий із скаргами на гнійні виділення із очей, відчуття "піску" в очах, набряк вій. При огляді: кон'юнктива вій гіперемована, набрякла. Який попередній діагноз?

- а. Увеїт
- б. Інфільтрат рогівки

с. Кон'юнктивіт

- д. Кератит
- е. Іридоцикліт

593. Фельдшер ФАПУ обстежує хворого 55-ти років, який скаржиться на погіршення зору, слабкість у ногах і руках, пекучий біль в них, який зменшується при ходінні босоніж. 20 років хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: гіпостезія в руках і ногах, за типом "рукавичок" та "шкарпеток". Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- а. Попереково-крижовий радикуліт
- б. Облітеруючий ендартеріїт

с. Діабетична полінейропатія

- д. Мієліт
- е. Поліомієліт

594. Жінку турбує біль тупого характеру в поперековій ділянці справа, який з'явився 2 дні тому. Стан жінки середньої тяжкості, температура тіла нормальна. При пальпації визначається болючість в правому підребер'ї, позитивний симптом Пастернацького справа. Який вірогідний діагноз?

- а. Гострий пієлонефрит
- б. Гострий холецистит
- с. Гострий апендицит

д. Нирково-кам'яна хвороба

- е. Гострий гломерулонефрит

595. До фельдшера ФАПУ звернулася породілля на 6-ту добу післяпологового періоду. Скарги на підвищення температури до 38°C, кров'янисто-гнійні виділення з піхви. Визначте попередній діагноз?

- а. Післяпологовий сепсис

б. Післяпологовий ендометрит

- с. Пельвіоперитоніт
- д. Перитоніт
- е. Трихомоніаз

596. У дівчинки 10-ти років після фізичного навантаження, вживання жирної та смаженої їжі виникає неінтенсивний ниючий біль у ділянці правого підребер'я, що супроводжується нудотою, гіркотою в роті. Про яке захворювання свідчать ці симптоми?

а. Дискінезія жовчних шляхів

- б. Коліт
- с. Виразкова хвороба шлунку
- д. Ентерит
- е. Хронічний гастрит

597. Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином перексиду водню. Яким розчином потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

a. Стерильний ізотонічний розчин

- b. 2% розчин натрію гідрокарбонату
- c. 0,5% розчин нашатирного спирту
- d. Розчин фурациліну 1:5000
- e. Дистильована вода

598. Хвора жінка скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. При обстеженні звертає увагу рівень АТ- 210/110 мм рт.ст. Який препарат треба ввести у даному випадку?

- a. Аналгін 50% - 2,0 в/м
- b. Димедрол 1% - 1,0 в/м
- c. Атропін 0,1% - 0,5 п/шк
- d. Платифілін 0,2% - 1,0 в/м

e. Клофелін 0,01% - 1,0 мл

599. В лікарню після аварії в шахті доставлений шахтар зі скаргами на біль, наявність гематоми, порушення функції кінцівки, набряк м'яких тканин. Виберіть з переліку абсолютну ознаку перелому:

a. Біль

b. Патологічна рухливість в зоні перелому

- c. Наявність гематоми
- d. Порушення функції кінцівки
- e. Набряк м'яких тканин в зоні перелому

600. У 10-річної дитини після загострення тонзиліту з'явилися порушення мови, письма, ходи. До якого дослідження крові потрібно підготувати пацієнта?

- a. Вміст холестерину
- b. Вміст глюкози

c. Ревмопроби

- d. Вміст загального білірубіну
- e. Вміст залишкового азоту

601. Доношена дитина народилася з оцінкою по шкалі Апгар 3 бали. Самостійне дихання нерегулярне, рідкі вдихи, ЧСС- 100/хв. Після народження голівки відсмоктано рідину з носа та рота. Яким має бути перший етап подальшої реанімації?

- a. Непрямий масаж серця
- b. Введення адреналіну
- c. Інтубація трахеї
- d. Введення натрію гідрокарбонату

e. ШВЛ масочним способом

602. Який продукт харчування слід першочергово рекомендувати пацієнтці з діагнозом залізодефіцитної анемії?

a. Манна каша

b. М'ясо

- c. Банани
- d. Квасолю
- e. Лимони

603. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна запідозрити?

- a. Гострий лейкоз
- b. Хронічний мієлолейкоз
- c. Гіпопластична анемія
- d. Лімфогранулематоз

e. Хронічний лімфолейкоз

604. Фельдшер ФАП у під час об'єктивного обстеження пацієнта 53-х років виявив посмикування м'язів і болючість у ділянці рани правої стопи, тризм, дисфагію, ригідність потиличних м'язів (рану отримав 3 дні тому). Зазначте попередній діагноз:

- a. Гангрена
- b. Сепсис
- c. Остеомієліт
- d. Правець**
- e. Сказ

605. Фельдшер швидкої допомоги доставив породіллю в пологове відділення. Що необхідно зробити при кровотечі в пологах, якщо плацента відділилась, а послід не виділився?

- a. Наложити шви за Лосицькій
- b. Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича
- c. Провести зовнішній масаж матки**
- d. Провести ручне обстеження порожнини матки
- e. Ввести утеротонічні препарати

606. Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- a. Постійний**
- b. Імпульсний
- c. Модульований
- d. Високочастотний
- e. Змінний

607. До фельдшера медичного коледжу звернувся студент 16-ти років зі скаргами на біль в колінних суглобах, їх припухлість, температура - 38,8°C. Такий стан після перенесеної ангіни 2 тижня тому. Об'єктивно: шкіра бліда, зниженого харчування, рухи в колінних суглобах різко болісні. Тони серця приглушені, м'який систолічний шум над верхівкою. АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 90/хв. Зів гіперемований, мигдалики пухкі з гнійними пробками. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Інфекційно-алергійний поліартрит
- b. Гострий інфекційний ендокардит
- c. Гострий міокардит
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Гостра ревматична лихоманка**

608. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

- a. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- b. Зондування порожнини матки
- c. УЗД
- d. Кольпоскопія**
- e. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння

609. Потерпілий внаслідок ДТП збуджений, голосно кричить, реально не оцінює свій стан. При огляді виявлено рану середньої третини правої гомілки, в глибині якої видно уламки кісток. Значна артеріальна кровотеча. Що потрібно виконати в першу чергу при наданні першої допомоги потерпілому?

- a. Транспортна іммобілізація
- b. Тимчасове спинення кровотечі**
- c. Боротьба з шоком
- d. Рентгенологічне обстеження
- e. Асептична пов'язка

610. У хворого діагностували відкритий пневмоторакс. Що потрібно зробити в першу чергу для покращення його стану?

а. Накласти оклюзійну пов'язку

- b. Накласти пов'язку Дезо
- c. Накласти хрестоподібну пов'язку
- d. Ввести дихальні аналептики
- e. Накласти спіральну пов'язку

611. Хлопчику 4-х років з відставанням у фізичному розвитку та залізодефіцитною анемією з рівнем гемоглобіну 90 г/л призначено комплексне лікування препаратами заліза. Протягом якого періоду фельдшер ФАПу буде спостерігати за лікуванням дитини?

- a. До нормалізації рівня гемоглобіну
- b. 2 місяці
- c. 6 місяців**
- d. 2 роки
- e. 1 рік

612. Хвора 58-ми років скаржиться на спрагу, сухість у роті, збільшення виділення сечі, слабкість. Хворіє близько року. За останній час значно схудла. Об'єктивно: шкіра суха, на щоках, підборідді рум'янець, нігті ламкі. Тони серця приглушені, Ps- 76/хв., АТ- 140/85 мм рт.ст. Яке обстеження слід призначити першочергово для встановлення діагнозу?

- a. Аналіз крові на глюкозу**
- b. Загальний аналіз крові
- c. Проба за Зимницьким
- d. Загальний аналіз сечі
- e. Аналіз крові на холестерин

613. Фельдшер ШМД прибув на виклик. Пацієнтка пред'являє скарги на біль у правому підребер'ї, багаторазове блювання без полегшення, підвищення температури до 39°C. При обстеженні: живіт болісний в правому підребер'ї, де визначається локальне напруження м'язів, пальпується овальне щільне утворення. Клінічні ознаки є характерними для такого захворювання:

- a. Хвороба Крона
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий апендицит
- d. Гострий холецистит**
- e. Неспецифічний виразковий коліт

614. У вагітної при зовнішньому акушерському дослідженні дно матки визначається на рівні мечоподібного відростку, у правій бічній стороні матки - гладенька, широка частина плода, у лівій - дрібні частини. Передлегла частина крупна, щільна. Серцебиття плода прослуховується справа нижче пупка. Визначте положення і позицію плода:

- a. Поздовжнє положення, перша позиція
- b. Поздовжнє положення, друга позиція**
- c. Поперечне положення, перша позиція
- d. Поперечне положення, друга позиція
- e. Косе положення, перша позиція

615. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства звернувся робітник 30-ти років, який протягом останніх 10-ти років страждає на виразкову хворобу шлунка. Скаржиться на слабкість, запаморочення. Спостерігалось одноразове блювання "кавовою гущею". Об'єктивно: блідість шкіри, живіт м'який, безболісний. Який попередній діагноз?

- a. Рак шлунка
- b. Атрофічний гастрит
- c. Шлунково-кишкова кровотеча**
- d. Виразкова хвороба шлунка
- e. Синдром Мелорі-Вейса

616. Фельдшер ФАПу оглядає пацієнта, який пред'являє скарги на біль в животі, нудоту. При обстеженні: загальний стан важкий. Шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком.

Страждальницький вираз обличчя. Живіт рівномірно роздутий, м'язи напружені, пальпація болісна. Визначається позитивний симптом Блюмберга-Щоткіна. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

a. Гострий перитоніт

- b. Гострий апендицит
- c. Хвороба Крона
- d. Гострий панкреатит
- e. Неспецифічний виразковий коліт

617. До фельдшеру ФАПУ звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилася виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Первинний сифіліс
- b. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

c. Злоякісне новоутворення молочної залози

- d. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- e. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт

618. Пацієнту з гострою серцевою недостатністю проведено кровопускання. З метою попередження якого ускладнення фельдшер повинен слідкувати за дотриманням суворого ліжкового режиму та здійснювати контроль за пульсом та артеріальним тиском?

- a. Непритомність
- b. Напад ядухи

c. Ортостатичний колапс

- d. Тромбоемболія
- e. Шок

619. Мама викликала фельдшера ФАПУ до дитини 7-ми років у якої в анамнезі вірусний міокардит. Дитина скаржиться на серцебиття, виражену слабкість, утруднене дихання. Фельдшер виявив ознаки гострої лівошлуночкової недостатності. В якому положенні потрібно госпіталізувати дитину до лікарні?

a. Напівсидячи

- b. З опущеним головним кінцем
- c. Лежачи на щиті
- d. На лівому боці
- e. На правому боці

620. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на біль в ділянці промежини та відхідного каналу, лихоманку. Біль посилюється при рухах та дефекації. Об'єктивно: справа на 3 см від ануса овальної форми червоне випинання, різко болісне, з розм'якшенням в центрі. Який із лікувальних заходів є найбільш ефективним в даному випадку?

- a. Дезитоксикаційна терапія
- b. УВЧ
- c. Компреси з розчином димексиду та інших медпрепаратів
- d. Масивна антибактеріальна терапія

e. Розтин та дренивання гнояка

621. Чоловік 35-ти років в бійці отримав удар по голові, знепритомнів. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги постраждалий непритомний, в ділянці скроневої кістки забита рана 4x5 см, сильно кровоточить; кровотеча та лімфорей з вух та носа. Який стан визначить фельдшер в діагнозі?

- a. Забій головного мозку
- b. Струс головного мозку
- c. Забита рана м'яких тканин голови
- d. Перелом кісток склепіння черепа
- e. Перелом основи черепа**

622. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 53-х років зі скаргами на оніміння, парестезії кінцівок, незначне похитування при ходьбі, печіння у кінчику язика, слабкість, адинамію. Вісім років тому - субтотальна резекція шлунка. Об'єктивно: шкіра бліда із жовтяничним відтінком. Язик яскраво-червоний, "лакований", зниження чутливості кінцівок. У крові: ер.- 2,61012/л, Hb- 72 г/л, КП- 1,3, тільця Жолі. Який попередній діагноз?

a. Хронічний лімфолейкоз

b. В12-дефіцитна анемія

c. Гемолітична анемія

d. Залізодефіцитна анемія

e. Гіпопластична анемія

623. Хвора 36-ти років звернулася зі скаргою на загальну слабкість, швидку стомлюваність, сухість шкіри, набряки обличчя, закрепи. Місяць тому перенесла стумектомію з приводу тиреотоксикозу. Шкіра бліда, суха. Рс- 58/хв., слабого наповнення, АТ- 90/55 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м'який, безболісний під час пальпації. Діурез 1,2 л за добу. Виберіть препарат для патогенетичного лікування хворої:

a. Йодид калію

b. Ловастатин

c. L-тироксин

d. Мерказоліл

e. Гіпотіазид

624. У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник напад апное, але ціаноз і брадикардія не спостерігаються. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?

a. Розпочати зігрівання

b. Перевірити рівень глюкози в крові

c. Постійно підтримувати правильне положення

d. Тактильна стимуляція вздовж спини

e. негайно розпочати ШВЛ

625. Хвора 48-ми років звернулася до фельдшера здоров'я із скаргами на сильний головний біль у потиличній ділянці, який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоти, біль у ділянці серця. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, межі серця розширені вліво на 1 см. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. АТ- 190/100 мм рт.ст., пульс напружений, ритмічний. Який стан виник у хворої?

a. Стабільна стенокардія напруження

b. Гостра лівошлуночкова недостатність

c. Гіпертонічна хвороба, неускладнений гіпертензивний криз

d. Гіпертонічна хвороба, ускладнений гіпертензивний криз

e. Інфаркт міокарда

626. У хворого відкритий перелом плеча, із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. З чого слід розпочати невідкладну допомогу?

a. Накладання джгута

b. Введення кровоспинних засобів

c. Накладання стискаючої пов'язки

d. Проведення транспортної іммобілізації

e. Введення серцево-судинних засобів

627. До першовагітної у терміні 38 тижнів був викликаний фельдшер ФАПу. Об'єктивно: перейми через 10 хвилин по 30-35 секунд, що розпочалися 3 години тому. Положення плода поздовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділья?

a. Другий

b. Третій

c. Перший

- d. Загроза передчасних пологів
- e. Передвісники пологів

628. У дитини 3-х років висока температура (39°C), кашель, нежить, слезотеча, з'явилася плямисто-папульозний висип на обличчі, дитина неспокійна. Яку невідкладну допомогу має надати фельдшер ШМД?

- a. Ввести 50% розчин анальгіну
- b. Ввести 2,5% розчин аміназину
- c. Ввести 2.0% розчин еуфіліну
- d. Поставити гірчичники
- e. Ввести 10% розчин кальцію глюконату

629. В нормі добова кількість сечі у здорової людини становить:

- a. 2000-2500 мл
- b. 500-1000 мл
- c. 1000-1200 мл
- d. 2500-3000 мл
- e. 1500-2000 мл

630. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- a. Медикаментозне лікування
- b. Санаторно-курортне лікування
- c. Оперативне лікування
- d. Диспансерний нагляд
- e. Фізіотерапевтичні методи лікування

631. Роділля в I періоді пологів. Виникла загроза розриву матки. Вказати першочергові заходи невідкладної долікарської допомоги:

- a. Провести піхве дослідження
- b. З'ясувати причини загрози
- c. Зняти пологову діяльність
- d. Стимулювати пологову діяльність
- e. Ввести спазмолітики

632. До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12-ти років, який скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. В загальному аналізі крові бластні клітини. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Ревматоїдний артрит
- b. Туберкульоз
- c. Геморагічний васкуліт
- d. Системний червоний вівчак
- e. Гострий лейкоз

633. У дитини 12-ти діб почервоніння шкіри та поодинокі ерозії поверхневого шару шкіри в пахових складках. Про яке захворювання може подумати фельдшер?

- a. Вітряна віспа
- b. Попрілості I ступеня
- c. Пітниця
- d. Везикулопустульоз
- e. Попрілості II ступеня

634. До фельдшера ФАПу звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для діагностики цієї патології?

- a. УЗД
- b. Біопсія
- c. Рентгенологічне дослідження

d. Комп'ютерна томографія

e. Пальпація

635. Оглядаючи жінку з терміном вагітності 26 тижнів, фельдшер ФАПу діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

a. Сублінгвально ніфедипін

b. Внутрішньовенно гініпрал

c. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг

d. Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг

e. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду

636. Після проведення туберкулінодіагностики дитині п'яти років фельдшером ФАПу була виявлена вперше позитивна реакція Манту, без клінічних ознак. Якому стану це відповідає?

a. Ревматична хвороба

b. Вроджена вада серця

c. Віраж туберкулінових проб

d. Пневмонія

e. Бронхіальна астма

637. До фельдшера здоровпункту звернувся робітник, який наколов стопу цвяхом. На підошві рана 0,2x0,3 см. Щеплення проти правця проведено 2 роки тому. Який препарат для вакцинації повинен першочергово підготувати фельдшер?

a. ППС 3000 МО

b. ППС 3000 МО та ПА 1,0 мл

c. Щеплення не потрібне

d. ПА 1,0 мл

e. ПА 0,5 мл

638. Фельдшер прибув на виклик до дитини 6-ти років, хворої на бронхіт. Раптово вночі погіршився стан дитини, з'явилася задишка з довгим свистячим видихом. При огляді: шкіра бліда з ціанотичним відтінком, напруження шийних м'язів, переляк в очах, грудна клітка бочкоподібна. Для якого стану характерні такі симптоми?

a. Астматичний

b. Судомний

c. Гіпертермічний

d. Коматозний

e. Ларингоспазм

639. Фельдшер здоровпункту проводить бесіду серед робітниць цукрового заводу. Як слід відповісти на запитання: в якому віці починається клімактеричний період?

a. 52-55 років

b. 65-70 років

c. 40-45 років

d. 45-50 років

e. 60-65 років

640. Працівник лабораторії випадково пролив на кисть 30% сірчану кислоту. Що в першу чергу повинен виконати фельдшер здоровпункту?

a. Накласти мазеву пов'язку

b. Промити проточною водою

c. Ввести анальгетики

d. Обробити антидотом

e. Накласти асептичну пов'язку

641. Чоловіка 76-ти років протягом року турбує часте, особливо вночі, сечовипускання, безболісне, іноді утруднене. Вранці в день звернення до фельдшера ФАПу не зміг помочитися. При огляді над лоном кулеподібне безболісне утворення, перкуторно дає тупий звук. Яка тактика фельдшера?

a. Катетеризація сечового міхура, направлення до уролога

- b. Катетеризація сечового міхура, спостереження
- c. Введення спазмолітиків, виклик швидкої допомоги
- d. Пункція сечового міхура, призначення антибіотиків
- e. Застосування грілки, тактика очікування

642. Фельдшер прибув до дитини 12-ти років, у якої після ін'єкції інсуліну почалися судоми. Об'єктивно: дитина непритомна, шкіра бліда, волога, спостерігається ригідність м'язів. Підберіть препарат для надання допомоги:

- a. Кофеїн
- b. Сибазон**
- c. Еуфілін
- d. Інсулін
- e. Ефедрин

643. Якого основного принципу слід дотримуватися фельдшеру ФАПу в профілактиці інфікування себе СНІДом та вірусним гепатитом?

- a. Обробляти руки антисептиком
- b. Мікротравми шкіри на руках закривати лейкопластирем
- c. Усі маніпуляції проводити в гумових рукавичках**
- d. Усі маніпуляції проводити в масці
- e. Ретельно мити руки з милом

644. Фельдшер ШМД оглянув пацієнта 30-ти років, який упав з висоти 2 метрів на ноги. Об'єктивно: болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшується при навантаженні по вісі хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:

- a. Напівсидячи
- b. На спині**
- c. На правому боці
- d. На лівому боці
- e. У положенні "жаби"

645. У постраждалого 42-х років виявлено поранення черепа вибуханням головного мозку. Волосся навколо поранення обстрижене, шкіра оброблена йодонатом, на вибухання накладена стерильна серветка з ізотонічним розчином натрію хлориду. Що необхідно покласти навколо вибухання, щоб не відбулося здавлення головного мозку?

- a. Ватно-марлевий бублик
- b. Шину Еланського
- c. Шину Крамера
- d. Стерильний ватно-марлевий тампон**
- e. Шину Бакшеева

646. Хворий скаржиться на оперізуючий біль у животі після вживання смаженої їжі та алкоголю, нудоту, метеоризм, пронос. Симптоми спостерігаються протягом року, пов'язані з порушенням дієти. Фельдшер має запідозрити у хворого:

- a. Хронічний холецистит
- b. Хронічний гепатит
- c. Хронічний панкреатит**
- d. Цироз печінки
- e. Хронічний гастрит

647. При огляді шийки матки за допомогою дзеркал фельдшер ФАПу звернув увагу на ціанотичність шийки матки та піхви. Ознакою чого це являється?

- a. Сумнівна ознака вагітності
- b. Імовірна ознака вагітності**
- c. Ознака запального захворювання
- d. Ознака порушення менструального циклу
- e. Вірогідна ознака вагітності

648. Фельдшера ФАПУ викликаний до дитини 1-го року, яка хворіє на парагрип. Вночі стан дитини погіршився: з'явились задишка, шумне дихання з участю допоміжної мускулатури у акті дихання, "гавкаючий" кашель, охриплий голос. Чим ускладнився парагрип?

- a. Ларингоспазм
- b. Вогнищева пневмонія
- c. Напад бронхіальної астми
- d. Серцева недостатність
- e. Стенозуючим ларинготрахеїт**

649. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

- a. Токсикодермія
- b. Алергічний дерматит
- c. Рожевий лишай
- d. Гостра кропив'янка**
- e. Синдром Лайєла

650. У жінки 28-ми років через два дні після переохолодження з'явилося часте і болісне сечовипускання (через кожні 30-40 хв.), кров у сечі наприкінці сечовипускання. Об'єктивно: при пальпації болючість в надлонній ділянці. Температура тіла 37°C. Найімовірніший попередній діагноз?

- a. Нецукровий діабет
- b. Гострий гломерулонефрит
- c. Гострий цистит**
- d. Ниркова колька
- e. Гострий пієлонефрит

651. У хворого 67-ми років діагностовано початкову стадію старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані?

- a. Медикаментозні**
- b. Хірургічні
- c. На цій стадії хвороби лікування не проводиться
- d. Кріодеструкція
- e. Лазеротерапія

652. Пацієнтка 22-х років звернулася до фельдшера здоров'я з приводу попередження небажаної вагітності. Жінка в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено. Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати даній пацієнтці?

- a. Гормональний
- b. Посткоїтальний
- c. Внутрішньоматковий**
- d. Хірургічний
- e. Бар'єрний

653. Пацієнт 25-ти років, із діагнозом грип, перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- a. Механічна
- b. Вогнищева заключна
- c. Профілактична
- d. Вогнищева поточна**
- e. Комбінована

654. Фельдшера ШМД викликали вночі до чоловіка, в якого раптово з'явилась ядуха з утрудненим вдихом, кашель із виділенням рожевого пінистого харкотиння. Пацієнт у положенні ортопное. Дихання шумне. Ps- 100/хв., ритмічний, слабкого наповнення. Над

легенями - вологі дрібнопухирчасті хрипи. Виберіть препарат, який необхідно застосувати?

- a. Фероплект
- b. Ессенціале
- c. Панангін
- d. Метопролол
- e. Лазикс**

655. Хворий 52-х років скаржиться на виражений постійний біль за грудниною, що іррадіює в ліву руку, під ліву лопатку, плече. Хворий збуджений, переляканий, стогне. Біль виник 2 години тому на роботі після нервового перенапруження. Неодноразове вживання нітрогліцерину біль не зняло. Яке захворювання можна запідозрити у хворого?

- a. Ревматизм
- b. Стенокардія
- c. Серцева астма
- d. Інфаркт міокарда**
- e. Гіпертонічна хвороба

656. Жінка 25-ти років на 8-му добу після пологів звернулася до фельдшера зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури. При огляді залоза гіперемована, в верхньо-зовнішньому квадранті пальпується інфільтрат. Що запідозрила акушерка?

- a. Мастопатія
- b. Бешиха
- c. Рак молочної залози
- d. Лактаційний мастит**
- e. Аденома молочної залози

657. У третьому періоді пологів пройшло більше 30-ти хвилин, Ознаки відшарування плаценти позитивні. Зовнішні прийоми видалення посліду неефективні. Яка повинна бути подальша тактика?

- a. Повторно застосувати зовнішні прийоми видалення посліду
- b. Ручне видалення посліду під знеболюванням**
- c. Застосувати препарати які збільшують скорочувальну діяльність матки
- d. Очікування самостійного видалення посліду
- e. Ввести окситоцин

658. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства (наявність проф. шкідливості) звернулася жінка з питанням про терміни проходження профогляду. Яка частота профогляду в даному випадку?

- a. Через 3 місяці
- b. 1 раз на рік
- c. 2 рази на рік**
- d. Через місяць
- e. 1 раз на 2 роки

659. Бригада ШМД Ви надає допомогу на місці автотранспортної аварії. У потерпілої 42-х років ліва гомілка у верхній третині деформована, визначається патологічна рухливість кісток. Який засіб слід використати для іммобілізації кінцівки?

- a. Шина Крамера**
- b. Апарат Ілізарова
- c. Апарат Єдинака
- d. Шина Єланського
- e. Шина Белера

660. Пацієнта укусила бджола. Скарги на ядуху, нудоту. Об'єктивно: обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична, дихання утруднене, охриплість голосу, надсадний кашель. Рс- 88/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

- a. Набряк Квінке**
- b. Кропив'янка

- c. Серцева астма
- d. Сироваткова хвороба
- e. Анафілактичний шок

661. Мати звернулась до фельдшера з дитиною 4-х років зі скаргами на поганий апетит, неспокійний сон, періодичні болі в животі навколо пупка. Ранком спостерігається нудота, блювання, запаморочення. Дитина схудла. Тиждень тому на шкірі була висипка. Визначте попередній діагноз:

- a. Ентеробіоз
- b. Аскаридоз**
- c. Гострий гастроентерит
- d. Гострий панкреатит
- e. Дуоденіт

662. На профілактичний прийом до фельдшера прийшла мати з 4-місячною дитиною. Стан задовільний. Психомоторний і фізичний розвиток дитини відповідає віку. Дитина здорова. Проти яких інфекційних захворювань слід запропонувати зробити щеплення даній дитині?

- a. Туберкульоз, дифтерія, правець, поліомієліт, гепатит В
- b. Дифтерія, кашлюк правець, поліомієліт, кір
- c. Дифтерія, правець, гепатит В, поліомієліт, краснуха
- d. Дифтерія, кашлюк правець, поліомієліт, гемофільна інфекція**
- e. Кір, краснуха, епідемічний паротит, гемофільна інфекція, туберкульоз

663. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка із підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Який з методів найпростішої фізіотерапії доцільно застосувати?

- a. Мішечок з теплим піском
- b. Грілка
- c. Холодний компрес
- d. Холодна ванна
- e. Міхур з льодом**

664. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- a. Гектична**
- b. Ремітуюча
- c. Неправильна
- d. Хвилеподібна
- e. Інтермітуюча

665. Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

- a. 1-1,5 ммоль/л
- b. 2,75-3,0 ммоль/л
- c. 2,25-2,5 ммоль/л**
- d. 1,75-2,0 ммоль/л
- e. 2,5-2,75 ммоль/л

666. Де спостерігається стоншення підшкірно-жирової клітковини в разі гіпотрофії II ступеня?

- a. На тулубі та кінцівках**
- b. На тулубі, кінцівках, обличчі
- c. На животі
- d. Тільки на тулубі
- e. Тільки на кінцівках

667. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання, з'явились задишка, ціаноз носо-губного трикутника. При аускультатії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

a. Міокардит

- b. Сироваткова хвороба
- c. Гломерулонефрит
- d. Вогнищева пневмонія
- e. Набута вада серця

668. Перша допомога фельдшером ФАПу при апное у малюка, хворого на кашлюк, починається з:

- a. Проведення інгаляцій з протеолітичними ферментами
- b. Введення спазмолітичних препаратів
- c. Проведення закритого масажу серця

d. Звільнення ротової порожнини від харкотиння та слизу

- e. Штучна вентиляція легень методом "рот в рот"

669. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 30-ти років. Після вживання великої кількості цитрусових у хворого виник щільний набряк на обличчі, губах, без свербіння, головний біль, "гавкаючий" кашель. Об'єктивно: Рс- 76/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?

- a. Сироваткова хвороба

b. Набряк Квінке

- c. Кропив'янка
- d. Анафілактичний шок
- e. Медикаментозний дерматит

670. Фельдшер ШМД на виклику у дитини 7-ми років. Скарги на озноб, підвищення температури тіла до 39°C, головний біль, кашель. Дитина бліда, тремтить, шкіра "мармурова", кінцівки холодні, сухий кашель, зів гіперемований, тони серця приглушені, тахікардія. Розчин якого лікарського препарату повинен ввести фельдшер у першу чергу?

- a. 2,4% еуфіліну
- b. 2,5% аміназину
- c. 20% глюкози

d. 1% дибазолу

- e. 1% димедролу

671. Вагітна 19-ти років звернулася до фельдшера ФАПу, щоб стати на облік по вагітності. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримані дані: 26-29-30-20. Який таз у жінки?

a. Нормальний

- b. Плоскоракітичний
- c. Чоловічий
- d. Простий плоский
- e. Загальнорівномірнорозвужений

672. Фельдшер ШМД застосував джгут для зупинки артеріальної кровотечі. На який час максимально накладається джгут на кінцівку взимку?

- a. 2 години
- b. 2,5 години
- c. 3 години
- d. 0,5 години

e. 1 година

673. На ФАП доставлений хворий зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому опрыскував город хлорофосом. Встановлено діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидот найдоцільніше застосувати?

a. Розчин атропіну сульфату 0,1%

- b. Антидот Стрижевського
- c. Розчин унітіолу 5%
- d. Розчин тіосульфату 20%
- e. Розчин натрію гідрокарбонату 3%

674. Лікар призначив пацієнту застосування газовідвідної трубки в ранній післяопераційний період, щоб усунути метеоризм. На скільки сантиметрів фельдшеру необхідно ввести газовідвідну трубку?

- a. 7-10 см
- b. 15-18 см
- c. 20-30 см**
- d. 18-20 см
- e. 10-15 см

675. Який з методів ведення пологів слід обрати, якщо у роділлі з кровотечею встановлено діагноз центрального передлежання плаценти?

- a. Накладання акушерських щипців
- b. Поворот плоду на ніжку і витягнення на ніжку
- c. Амніотомія з наступною епізіотомією
- d. Поворот за Архангельським
- e. Кесарів розтин**

676. Фельдшер ШМД оглядає постраждалого на місці ДТП. Пацієнт скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення, одноразове блювання. Зі слів дружини, був непритомний кілька хвилин. Який попередній діагноз?

- a. Синкопальний синдром
- b. Вегетативний криз
- c. Забій головного мозку
- d. Психоемоційний стрес
- e. Струс головного мозку**

677. Повторновагітна народила на дому живу доношену дитину. Після народження дитини пройшло 30 хвилин. Ознаки відділення плаценти відсутні. Кровотечі з пологових шляхів немає. Яка тактика фельдшера ШМД?

- a. Зробити ручну ревізію порожнини матки
- b. Транспортувати у пологовий стаціонар**
- c. Ввести утеротонічні засоби
- d. Покласти холод на низ живота
- e. Зробити ручне відділення та видалення плаценти

678. Виклик фельдшера ФАПу до дитини 4-х років, яка хворіє 5-й день. Скарги на кашель, світлобоязнь, сльозотечу, $t_{0-38,2^{\circ}\text{C}}$. На слизовій оболонці щік білі крапкові плями, на піднебінні червоні плями. Який висип з'явиться у дитини при подальшому розвитку хвороби?

- a. Одномоментний плямисто-папульозний
- b. Поетапний плямисто-папульозний**
- c. Геморагічний
- d. Пустульозний
- e. Поліморфний

679. Фельдшер ФАПу оглядає пацієнтку 47-ми років зі скаргами на біль, почервоніння передньої поверхні правої гомілки, температуру тіла до 39°C , які з'явилися після незначної подряпини шкіри. Об'єктивно: на передній поверхні правої гомілки визначається гіперемія шкіри до 15×10 см з чіткими контурами, незначний набряк. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Фурункул гомілки
- b. Бешиха гомілки**
- c. Абсцес гомілки
- d. Карбункул гомілки
- e. Флегмона гомілки

680. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на різке здуття живота, нестійкий стул, нудоту, яка з'являється після вживання жирної та солодкої їжі. Хворіє близько року. Багато курить, зловживає спиртними напоями. Об'єктивно: шкіра жовтяничного забарвлення; наявність телеангіектазій, гіперемія долонь, асцит. Пальпаторно печінка

збільшена, щільна, край загострений. Про яку найбільш імовірну патологію йдеться?

- a. Виразкова хвороба шлунка
- b. Рак шлунка
- c. Хронічний холецистит
- d. Цироз печінки**
- e. Хронічний гастрит

681. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий апендицит
- b. Позаматкова вагітність
- c. Перекрути ніжки кісти яєчника
- d. Апоплексія яєчника**
- e. Фіброміома

682. Хворий 38-й років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині груднини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Нейроциркуляторна дистонія
- b. ІХС. Гострий інфаркт міокарда
- c. ІХС. Стабільна стенокардія напруження IV ФК
- d. ІХС. Стенокардія, що вперше виникла**
- e. ІХС. Стабільна стенокардія напруження III ФК

683. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, біль та домішки крові під час акту дефекації. При огляді виявлено варикозні вузли в ділянці анального отвору. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Геморой**
- b. Поліпи прямої кишки
- c. Рак прямої кишки
- d. Тріщина заднього проходу
- e. Гострий парапроктит

684. Пацієнт скаржиться на біль в грудній клітці зліва, який посилюється під час кашлю, дихання. Аускультативно: дихання послаблене, шум тертя плеври. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Сухий плеврит**
- b. Ексудативний плеврит
- c. Сухий перикардит
- d. Ексудативний перикардит
- e. Стенокардія вазоспастична

685. Швидку допомогу викликано до залізничної станції, де очікується прибуття потягу з роділлем. Під час огляду роділлі фельдшером діагностовано повне ніжне передлежання плода. Яку допомогу надасть фельдшер в пологах?

- a. Проведе захист промежини
- b. Допомогу за методом Цов'янова I
- c. Виконає зовнішній поворот плода
- d. Проведе епізіотомію
- e. Допомогу за методом Цов'янова II**

686. У дитини часте блювання, біль в епігастії, рідкий стілець до 8 разів на добу з неприємним запахом, зеленуватого кольору, водянистий. Хворіє 3-тю добу, з анамнезу - вживав тістечко з кремом. Яке обстеження потрібно призначити для уточнення діагнозу?

- a. Бактеріологічне дослідження випорожнень**
- b. Загальний аналіз крові

- с. Загальний аналіз сечі
- d. Дослідження випорожнень на яйця гельмінтів
- е. Копрологічне дослідження випорожнень

687. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

- a. Флегмона
- b. Лімфангоїт
- с. Правець
- d. Лімфаденіт**
- е. Бешиха

688. До фельдшера ФАПУ звернулась жінка 25-ти років, яка скаржиться на затримку місячних. В анамнезі 2 пологів. При гінекологічному огляді: шийка "бочкоподібна", матка в anteflexio, тіло матки збільшене до 5 тижнів, безболісне. Придатки не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Аборт в ході
- b. Шийкова вагітність**
- с. Порушення менструального циклу
- d. Рак шийки матки
- е. Ерозія шийки матки

689. На 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте лущення на долонях. Для якого захворювання це характерно?

- a. Кір
- b. Червона висипка
- с. Скарлатина**
- d. Вітряна віспа
- е. Менінгококова інфекція

690. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 28-ти років, зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту одноразове блювання. Об'єктивно: живіт бере участь в акті дихання, при пальпації болючий в правій здухвинній ділянці, є незначне напруження м'язів живота, слабо позитивний симптом Ровзінга, Щоткіна-Блумберга. Які дії фельдшера?

- a. Промивання шлунка
- b. Введення знеболюючих
- с. Введення спазмолітиків
- d. Покласти грілку на живіт
- е. Госпіталізація**

691. Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться, коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків, що народилися доношеними?

- a. В 2-3 роки**
- b. В 4 роки
- с. В 6-7 років
- d. В 5-6 років
- е. В 1 рік

692. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання; сеча каламутна, температура тіла 37,6°C. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- a. Хронічний пієлонефрит**
- b. Нирковокам'яна хвороба
- с. Гострий пієлонефрит
- d. Хронічний гломерулонефрит
- е. Гострий гломерулонефрит

693. Пацієнту 35-ти років призначено внутрішньом'язове введення антибіотика після проби на індивідуальну чутливість. Який розчинник повинен використати фельдшер ФАПУ, розводячи антибіотик для проведення проби?

- a. 5% розчин глюкози
- b. 0,25% розчин новокаїну
- c. Дистильована вода
- d. Ізотонічний розчин хлориду натрію**
- e. 0,5% розчин новокаїну

694. При огляди дитини 10-ти років фельдшер ФАПУ виявив гіпостатуру на тлі вродженої вади серця. Які ознаки є характерними для гіпостатури?

- a. Пропорційне збільшення ваги та довжини тіла
- b. Пропорційне зменшення маси і довжини тіла дитини**
- c. Збільшення обводу голови при дефіциті маси тіла
- d. Надмірна вага при середньому зрості
- e. Дефіцит ваги при високому зрості

695. В школі фельдшером ФАПУ діагностовано скарлатину. Дитина госпіталізована. Накладений карантин. Контактні обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме карантин?

- a. 10
- b. 21
- c. 14
- d. 7**
- e. 3

696. У потерпілого внаслідок ДТП спостерігається відсутність дихання, пульсу на сонній артерії, широкі зіниці. Вкажіть першочергову дію фельдшера:

- a. Розпочати серцево-легеневу реанімацію**
- b. Дати вдихнути нашатирного спирту
- c. Ввести хлористий кальцій
- d. Викликати швидку допомогу
- e. Викликати міліцію

697. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора із скаргами на підвищену подразливість, поганий сон, зниження працездатності, пам'яті, апетиту, відчуття тривоги. Захворювання пов'язує з психічною травмою. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Епілепсія
- b. Неврастенія**
- c. Істерія
- d. Хвороба Альцгеймера
- e. Біполярний психоз

698. Який максимальний об'єм лікувального засобу можна ввести підшкірно пацієнтові одноразово?

- a. 1 мл
- b. 10 мл
- c. 5 мл**
- d. 15 мл
- e. 2 мл

699. Пацієнт 45-ти років скаржиться на сильні болі в поперековій ділянці справа, які іррадіюють вздовж сечоводу в статеві органи. Пацієнт стогне "не знаходить собі місця". Об'єктивно: Рс- 80/хв. АТ- 130/80 мм рт.ст., у сечі - кров. Позитивний симптом Пастернацького справа. Який найбільш імовірний діагноз поставить фельдшер?

- a. Гострий цистит
- b. Хронічно-ниркова недостатність
- c. Гострий гломерулонефрит

d. Гострий пієлонефрит

e. Нирково-кам'яна хвороба

700. До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на різке здуття живота, незначні випорожнення, нудоту, загальну слабкість. Вважає себе хворим близько року. Багато курить, зловживає спиртним. Об'єктивно: на шкірі обличчя і спини - судинні "зірочки". Шкіра суха, помірно бліда, долоні гіперемовані, гомілки і стопи набряклі. Волосся на голові тонке, рідке. Живіт різко збільшений, пупок випнутий. Навколо пупка венозна сітка у вигляді "голови медузи". У черевній порожнині виявлено вільну рідину. Який попередній діагноз у хворого?

a. Хронічний гепатит

b. Рак шлунка

c. Хронічний гастрит

d. Хронічний панкреатит

e. Цироз печінки

701. Фельдшер прибув на місце автокатастрофи. Один з пасажирів у стані клінічної смерті. Є підозра на перелом хребта в шийній ділянці. Що слід робити в цьому випадку для забезпечення прохідності дихальних шляхів?

a. Опустити голову потерпілого

b. Вивести вперед нижню щелепу

c. Підкласти валик під лопатки

d. Запрокинути голову потерпілого

e. Повернути голову потерпілого

702. ШМД викликали до хворого 63-х років. Зі слів родичів хворий впродовж 20-ти років страждає на цукровий діабет. В останні дні був сонливим, скаржився на нудоту, блювання, пив багато рідини, часто мочився. Годину назад неспритомнів. Об'єктивно: хворий в неспритомному стані, шкіра суха. Дихання глибоке, шумне (Кусмауля), в повітрі запах - ацетону. Очні яблука м'які. Рефлекси відсутні. Який стан розвинувся у хворого?

a. Кетоацидотична кома

b. Церебральна кома

c. Уремична кома

d. Гіпоглікемічна кома

e. Печінкова кома

703. Хвора 40-ка років на прийомі у фельдшера раптово втратила свідомість, упала. З'явилися тонічні, а потім клонічні судоми. Із рота виділяється піна з розовим відтінком. Відмічено мимовільне сечовиділення. Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворій?

a. Викликати лікаря

b. Ввести серцеві засоби

c. Притримати хвору за голову і кінцівки, повернути голову набік

d. Виміряти артеріальний тиск

e. Ввести магнію сульфат

704. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворого зі скаргами на біль за грудниною після перенесеного стресу. За об'єктивними ознаками фельдшер припустив стенокардію. Які препарати доцільно застосувати для покращення стану хворого?

a. Строфантин, кофеїн

b. Кордіамін, корглікон

c. Валідол, нітрогліцерин

d. Гепарин, анальгетики

e. Клофелін, дибазол

705. У породіллі на 11-ту добу післяпологового періоду спостерігається гіпертермія 39°C, болі в правій молочній залозі. Загальний стан - середньої важкості. При пальпації виявлено ущільнення в молочній залозі з ділянкою розм'якшення та флюктуації посередині. Яка тактика фельдшера ФАПу?

a. Туге перев'язування грудей, сечогінні

b. Припинення грудного вигодовування, хірургічне втручання

c. Припинення грудного вигодовування, госпіталізація

d. Антибіотики, спостереження

e. Припинення грудного вигодовування, антибіотики

706. На ФАП звернулася жінка 23-х років із затримкою менструації на 2 тижні, кровомажучі виділення з піхви. Фельдшер запідозрив порушену позаматкову вагітність, так як під час огляду пацієнтка втратила свідомість. Яке обстеження підтвердить цей діагноз?

a. Біопсія шийки матки

b. Лапаротомія

c. Пункція через заднє склепіння

d. Бактеріоскопічне дослідження

e. Діагностичне вишкрібання матки

707. Під час виконання внутрішньовенного струминного введення ліків фельдшеру на незахищену шкіру рук потрапила кров пацієнта. Які запобіжні заходи слід виконати?

a. Вимити руки з милом, протерти ватною кулькою, змоченою 70% розчином етилового спирту

b. Обробити руки 3% розчином хлораміну

c. Зняти кров сухою стерильною серветкою

d. Вимити руки з милом, обробити 1% розчином хлораміну

e. Двічі обробити руки 5% спиртовим розчином йоду

708. На ФАП доставлений пацієнт 50-ти років з пупковою грижею, після фізичного навантаження виник раптовий біль у ділянці випинання, збільшення об'єму і напруження грижі. Яка тактика фельдшера є найбільш доцільною в даному випадку?

a. Надання лежачого положення

b. Міхур з льодом на місце випинання

c. Терміново госпіталізувати в хірургічне відділення

d. Обмеження прийому їжі

e. Спокій

709. Фельдшера ШМД викликали до потерпілої 35-ти років, яка 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті і епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

a. Промити шлунок теплою водою

b. Промити шлунок розчином соди через зонд

c. Промити шлунок холодною водою через зонд

d. Промити шлунок розчином перманганату калію

e. Викликати блювання

710. Мати звернулась до фельдшера ФАПу з запитанням, які коливання температури тіла протягом доби допустимі для дітей перших трьох тижнів життя?

a. 0,3-0,5°C

b. 0,5-1,0°C

c. 1,5-2,0°C

d. 1-1,5°C

e. 0,5-0,7°C

711. На ФАП звернувся пацієнт 38-ми років з скаргами на біль у попереку, підвищення температури тіла до 38°C, втрату працездатності. Захворів 5 днів тому. Об'єктивно: у ділянці попереку справа спостерігається набряк, почервоніння, у центрі - щільний різко болючий інфільтрат з декількома гнійними отворами з яких виділяється густий зеленуватий гній. Вкажіть захворювання для якого характерні ознаки:

a. Лімфаденіт

b. Флегмона

c. Карбункул

d. Абсцес

e. Фурункул

712. При дослідженні пульсу фельдшер ФАПУ виявив, що у пацієнта частота пульсу становить 110/хв. Як він повинен оцінити такий пульс?

- a. Ниткоподібний пульс
- b. Гіпертензія
- c. Тахікардія**
- d. Аритмія
- e. Брадикардія

713. Фельдшер ФАПУ спостерігає за пацієнтом з лейкемією у якого раптово з'явилися загальна слабкість, головний біль, пітливість вночі, підвищення температури до 38°C. Для якого синдрому характерні ці симптоми?

- a. Анемічний
- b. Інтотоксикаційний**
- c. Геморагічний
- d. Гіперпластичний
- e. Імунодефіцитний

714. У жінки ниючий біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, гіркий присмак у роті. Хворіє 5 років. Об'єктивно: позитивний симптом Ортнера. Дайте пораду дружині з дієтичного харчування:

- a. Не вживати багато вуглеводів
- b. Не вживати соленої їжі
- c. Вживати йодовмісні продукти
- d. Не вживати багато рідини
- e. Не вживати жирної і смаженої їжі**

715. Фельдшер ШМД прибув до пацієнта 35-ти років. Пацієнт непритомний. Шкіра - жовтянична. Печінка на 2 см випинається з-під краю реберної дуги. Від пацієнта чути специфічний солодкуватий печінковий запах. Оберіть медикаменти для надання невідкладної допомоги:

- a. Глюкоза, ессенціале**
- b. Анальгін, димедрол
- c. Кальцію хлорид, вікасол
- d. Амінокапронова кислота, баралгін
- e. Папаверин, баралгін

716. До фельдшера ФАПУ звернувся юнак 17-ти років, який скаржиться на різкий біль у колінних суглобах, що виник 20 хвилин тому після забиття. Хворіє з дитинства. В анамнезі часті ясенні кровотечі. Дід по материнській лінії хворів на таке саме захворювання. Об'єктивно: на шкірі верхніх та нижніх кінцівок гематоми різних розмірів, болючі при пальпації. Колінні суглоби деформовані. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Геморагічний васкуліт
- b. Гострий лейкоз
- c. Апластична анемія
- d. Гемофілія**
- e. Тромбоцитопенічна пурпура

717. На ФАП звернувся пацієнт із забитою раною носа. Проведено туалет рани. Яку пов'язку слід накласти на ніс?

- a. Хрестоподібна
- b. Пращоподібна**
- c. Восьмиподібна
- d. Вузечка
- e. Бінокулярна

718. У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки. Після цього, протягом останніх 7-ми років, на місці перелому періодично з'являється гостре запалення з утворенням нориці, через яку виділяється гнійний вміст з елементами кісткової тканини. Через

деякий час нориця закривається. Про яке ускладнення перелому слід думати?

- a. Хронічний остеомієліт
- b. Флегмона м'якої тканини
- c. Гострий остеомієліт
- d. Бешиха
- e. Трофічна виразка

719. Пацієнтка 53-х років, доярка, звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на біль у дрібних суглобах кистей рук, "ранкову скутість" даних суглобів. Об'єктивно: дрібні суглоби кистей рук припухлі, деформовані. Кисті рук відхилені у бік ліктя. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- 3,01012/л, лейкоц.- 10109/л, ШОЕ- 45 мм/год, гострофазові показники крові підвищені. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Гонорейний артрит
- b. Ревматичний артрит
- c. Туберкульозний артрит
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Деформуючий артрит

720. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 36-ти років, зі скаргами на гарячку до 39°C, біль у правій половині грудної клітки, який посилюється під час глибокого дихання, кашель з виділенням незначної кількості "іржавого" харкотиння, виражену слабкість. Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз:

- a. Негоспітальна пневмонія
- b. Абсцес легень
- c. Гострий бронхіт
- d. Сухий плеврит
- e. Бронхоектатична хвороба

721. Фельдшера ФАПУ викликали до дитини 9-ти років, у якої на фоні грипозної пневмонії розвинулась легенева кровотеча: з'явилась рожева піна з рота, кашель з виділенням яскраво-червоного пінистого харкотиння. Застосуйте кровоспинний препарат:

- a. Анальгін
- b. Парацетамол
- c. Дицинон
- d. Корглікон
- e. Аспірин

722. До фельдшера ФАПУ звернулась вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. При огляді фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- a. В гінекологічне відділення
- b. На УЗД
- c. До ВПВ
- d. До терапевта
- e. До дільничного гінеколога

723. Пацієнтці лікар призначив сифонну клізму з приводу непрохідності кишок. Яку кількість рідини повинен приготувати фельдшер для проведення цієї процедури?

- a. 10 л
- b. 2 л
- c. 5 л
- d. 3 л
- e. 1,5 л

724. Фельдшер ШМД на виклику у хворої 42-х років. Скарги на сильний головний біль, мерехтіння "мушок" перед очима. Такий стан після сварки з чоловіком. При огляді: хвора збуджена, шкіра в червоних плямах, волога. АТ- 190/100 мм рт.ст., Рс- 92/хв., напружений. Тони серця ритмічні. Ліва межа серця розширена. Часте сечовипускання. Яка невідкладна допомога

необхідна цієї хворобі?

- a. Анальгін 50% - 2,0 мл внутрішньом'язово
- b. Платифілін гідротартрат 0,2% - 1,0 мл підшкірно
- c. Клофелін 0,01% - 1,0 мл внутрішньовенно**
- d. Димедрол 1% - 1,0 мл внутрішньом'язово
- e. Атропіну сульфат 0,1% - 1,0 мл внутрішньом'язово

725. Фельдшер ФАПУ проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Вкажіть, де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції, щоб найкраще вислухати серцебиття плоду:

- a. Справа вище пупка
- b. Справа на рівні пупка
- c. Справа нижче пупка
- d. Зліва нижче пупка
- e. Зліва на рівні пупка**

726. Фельдшер здоров'я щоденно проводить дезінфекцію у приміщенні здоров'я, використаного інструментарію. Як називається такий вид дезінфекції?

- a. Камерна
- b. Вогнищева поточна
- c. Санітарна
- d. Профілактична**
- e. Вогнищева заключна

727. У дитини 10 років під час уроку почалась носова кровотеча. Яку допомогу необхідно надати дитині?

- a. Закрапати в ніс 0,05% розчин нафтизину
- b. Ввести в носові ходи тампони з 3% розчином перекису водню**
- c. Надати дитині горизонтальне положення
- d. Ввести в носові ходи тампони, змочені в розчині фурациліну 1:5000
- e. Ввести кордіамін підшкірно

728. У стаціонар за направленням фельдшера здоров'я поступив 27-річний робітник зі скаргами на голодні, нічні болі в животі, з переважною локалізацією в епігастральній ділянці. З анамнезу відомо, що з 18-річного віку хворіє на хронічний гастрит типу В. Який імовірний діагноз?

- a. Хронічний панкреатит
- b. Гострий ентерит
- c. Виразкова хвороба 12-палої кишки**
- d. Хронічний холецистит
- e. Виразкова хвороба шлунка

729. Фельдшер з'явився додому до хворого 56-ти років, який скаржиться на задишку з утрудненим видихом, напади кашлю з незначною кількістю харкотиння, відчуття стискання в грудях. Хворіє на бронхіальну астму. Які лікувальні заходи доречні?

- a. Накладання міхура з льодом на грудну клітку
- b. Інгаляція сальбутамолу**
- c. Введення папаверину
- d. Введення мезатону
- e. Введення баралгіну

730. Через 6 діб після ін'єкції анальгіну на сидниці у хворої утворився різко болючий інфільтрат з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла 38°C. Відображена картина дозволяє запідозрити:

- a. Карбункул
- b. Фурункул
- c. Бешиха
- d. Флегмона

е. Післяін'єкційний абсцес

731. До фельдшера звернулася жінка 38-ми років, у якої після четвертої вагітності виникло варикозне розширення підшкірних вен обох гомілок. Надайте рекомендації:

- a. Дотримуватись режиму
- b. Приймати антикоагулянти
- c. Накладати зігріваючий компрес

d. Носити еластичні панчохи

- e. Застосовувати гірудотерапію

732. При дослідженні мазка піхвового вмісту на визначення ступеня його чистоти, виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слабколужна. Це характерно для такого ступеню чистоти піхви:

- a. -
- b. IV

c. III

- d. II
- e. I

733. Дитина 2-х місяців, народилась у грудні з масою тіла 3100 г, перебуває на природному вигодовуванні. Зараз маса тіла становить 4500 г, нервово-психічний розвиток відповідає віку. Патології внутрішніх органів немає. Яку профілактику рахіту слід призначити цій дитині?

- a. Аскорбінова кислота по 30 мг з рази на добу
- b. Кальцію глюконат по 400-500 мг на добу
- c. Вітамін D по 200 МО на добу

d. Вітамін D по 500 МО щоденно

- e. Жовток курячого яйця

734. Назвіть показання для годування пацієнта через шлунковий зонд:

- a. Після операції на стравоході
- b. При пухлинах глотки

c. Тривала непритомність

- d. При опіках стравоходу
- e. Непрохідність кишок

735. У дитини 12-ти років гостро розвинувся набряк по всьому тілу, систолічний АТ- 140 мм рт.ст., діурез різко зменшився. Які показники аналізу сечі будуть характерними для такого стану?

- a. Глюкозурія, холестеринурія
- b. Оксалатурія, ацетонурия

c. Макрогематурия, протеїнурия

- d. Піурия, альбумінурия
- e. Піурия, бактеріурия

736. У дитини 12-ти років важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка; кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для такого захворювання:

- a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- b. Вогнищева пневмонія
- c. Набряк Квінке
- d. Обструктивний бронхіт

e. Дифтерія гортані

737. Ви, фельдшер ФАП, прийшли на патронаж до хлопчика 10 місяців. Дитина розвивається гармонійно, фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Скільки зубів повинно бути у дитини?

a. 6

- b. 4
- c. 3

- d. 5
- e. 7

738. На ФАП звернулась мама з 13-річною дочкою. Після ретельного обстеження діагностовано атрезія дівочої пліви. Якою має бути тактика?

- a. Гормональна терапія
- b. Повторний огляд через 3 місяці
- c. Хірургічний розтин пліви**
- d. Повторний огляд через 6 місяців
- e. Симптоматична терапія

739. Бригада ШМД на виклику у пацієнта 42-х років з туберкульозом легень, у якого після кашлю відійшла піниста яскраво-червона кров. Шкірні покриви бліді. АТ- 90/60 мм рт.ст. Які медикаменти слід вибрати фельдшеру для надання невідкладної допомоги?

- a. Анальгін, лазикс
- b. Кордіамін, корглікон
- c. Глюкоза, адреналін
- d. Стрептоміцин, індометацин
- e. Амінокапронова кислота, кальцію хлорид**

740. Фельдшер ФАПу на виклику у пацієнта 22-х років. Скарги на набряки обличчя, болі у попереку з обох боків, головний біль, підвищення температури тіла до 39°C, АТ- 150/90 мм рт.ст. Сеча червонувата. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий цистит
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гострий гломерулонефрит**
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Сечокам'яна хвороба

741. Каретою швидкої допомоги в гінекологічний стаціонар доставлена 23-х річна жінка зі скаргами на різкий біль внизу живота, який іррадіює у пряму кишку. Була втрата свідомості. Біль виник раптово після затримки менструації. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт, пульс частий, слабого наповнення, живіт здутий. Позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Який попередній діагноз?

- a. Апоплексія яєчника
- b. Порушена позаматкова вагітність**
- c. Прогресуюча позаматкова вагітність
- d. Аборт в ході
- e. Перекрут ніжки пухлини

742. Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

- a. Везикулопустульоз**
- b. Ексофоліативний дерматит Ріттера
- c. Пухирчатка новонароджених
- d. Попрілості
- e. Псевдофурункульоз

743. Фельдшер відкрила бікс із перев'язувальним матеріалом, і побачила, що індикатор стерильності не розплавився. Які подальші дії в даній ситуації?

- a. Прокип'ятити в дистильованій воді 45 хвилин
- b. Занурити в дезінфекційний розчин
- c. Використовувати матеріал для роботи
- d. Відправити бікс на повторну стерилізацію**
- e. Відправити матеріал з бікса на бактеріологічне дослідження

744. У хворого 32-х років сечокам'яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД

госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?

- a. Поставити гірчичники на гомілки
- b. Включити кран з водою
- c. Провести катетеризацію
- d. Помістити хворого в гарячу ванну**
- e. Поставити холодний компрес на гомілки

745. До фельдшера ФАПУ звернулася вагітна 26-27 тижнів зі скаргами на набряки гомілок, передньої черевної стінки. АТ- 160/105 мм рт.ст., протеїнурія - 0,1 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гіпертонічна хвороба
- b. Еклампсія
- c. Нефропатія II ступеня
- d. Протеїнурія
- e. Прееклампсія II ступеня**

746. Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углуб слід натискати на груднину?

- a. 3-4
- b. 4-5
- c. 2-3
- d. 0,5-0,8
- e. 1-1,5**

747. До приймального відділення доставили хворого з імовірним гострим панкреатитом. Які з нижченаведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?

- a. Аналіз крові на цукор
- b. Загальний аналіз крові
- c. Аналіз сечі на цукор
- d. Аналіз крові на білірубін
- e. Аналіз сечі на діастазу**

748. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, біль та домішки крові під час акту дефекації. В ході огляду виявлено варикозні вузли в ділянці анального отвору. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Рак прямої кишки
- b. Геморой**
- c. Поліпи прямої кишки
- d. Гострий парапроктит
- e. Тріщина заднього проходу

749. До ФАП звернулася хвора зі скаргами на різкий переймоподібний біль внизу живота. При проведенні дворучного дослідження виявлена справа у малому тазі пухлина круглої форми з рівною поверхнею, рухлива, болюча при подразненні очеревини. Який попередній діагноз фельдшера?

- a. Перекрут ніжки кісти**
- b. Злоякісне переродження пухлини
- c. Порушена позаматкова вагітність
- d. Апоплексія яєчника
- e. Оофорит

750. Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10-ти років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових ділянках тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- a. Менінгококова інфекція**
- b. Краснуха

- c. Кір
- d. Вітряна віспа
- e. Скарлатина

751. До ФАПУ доставлено хворого зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому обприскував город хлорофосом. Встановлено діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидот найдоцільніше застосувати?

- a. Розчин унітіолу 5%
- b. Антидот Стрижевського
- c. Розчин натрію гідрокарбонату 3%
- d. Розчин атропіну сульфату 0,1%**
- e. Розчин тіосульфату 20%

752. Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином перексиду водню. Яким розчином потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

- a. Розчин фурациліну 1:5000
- b. 0,5% розчин нашатирного спирту
- c. Стерильний ізотонічний розчин**
- d. 2% розчин натрію гідрокарбонату
- e. Дистильована вода

753. Хворий 35-ти років скаржиться на слабкість, сухість у роті, часте сечовипускання вночі, свербіння шкіри, погіршення зору. Захворювання нирок спостерігається протягом 20-ти років. Шкіра сіро-бліда, язик сухий, обкладений бурим нальотом, відчувається запах аміаку з рота. Тони серця глухі, акцент II тону на аорті, пульс - 92/хв., АТ- 180/90 мм рт.ст. Яке дослідження сечі необхідно призначити для визначення концентраційної функції нирок?

- a. Проба Зимницького**
- b. Проба Амбурже
- c. Загальний аналіз сечі
- d. Проба Нечипоренка
- e. Проба Аддіса-Каковського

754. Пацієнт 25-ти років з діагнозом "грип" перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- a. Механічна
- b. Комбінована
- c. Вогнищева поточна**
- d. Вогнищева заключна
- e. Профілактична

755. У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до 39°C, порушення загального стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфний висип у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при тяжкому перебігу даного захворювання:

- a. Цефтріаксон
- b. Феністил
- c. Ацикловір**
- d. Брильянтовий зелений
- e. Фулорцин

756. У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:

- a. Природженій ваді серця**
- b. Ревматизмі
- c. Малій хорей
- d. Інфекційному міокардиті

е. Вегетосудинній дистонії

757. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання; сеча каламутна, температура тіла 37,6°C. Вважає себе хворим протягом 2-х років. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- а. Гострий гломерулонефрит
- б. Хронічний гломерулонефрит
- с. Хронічний пієлонефрит**
- д. Гострий пієлонефрит
- е. Нирковокам'яна хвороба

758. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

- а. Еуфілін
- б. Атропін
- с. Анальгін
- д. Лідокаїн**
- е. Верапаміл

759. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- а. Механічна кишкова непрохідність
- б. Перелом основи черепа
- с. Перитоніт**
- д. Інфаркт міокарда
- е. Тромбоз мезентеріальних судин

760. Жінка 45-ти років скаржитися на сезонний біль в епігастральній ділянці, який виникає натще, відрижку кислим, періодичне блювання на висоті болю, печію. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу захворювання?

- а. Рентгенографія шлунку
- б. Загальний аналіз крові
- с. УЗД
- д. Фіброгастроскопія**
- е. Дослідження калу

761. Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углиб слід натискати на грудину?

- а. 4-5
- б. 3-4
- с. 0,5-0,8
- д. 1-1,5**
- е. 2-3

762. Пацієнтка 49-ти років звернулася зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів після статевих зносин. В анамнезі: вагітності - 4; пологів - 2; абортів - 2. Другі пологи ускладнилися розривами шийки матки. Останній раз була у гінеколога 6 років тому. Гінекологічний статус - вульва розвинена правильно. В дзеркалах: стінки піхви чисті. Шийка у вигляді "цвітної капусти", кровить на дотик. В ході дворучного дослідження: тіло матки і придатки без особливостей, інфільтратів і пухлинних утворень у малому тазі немає. Оцініть ситуацію:

- а. Ендоцервіцит
- б. Ендометрит

с. Рак піхви

d. Рак шийки матки

е. Рак матки

763. Чоловік випадково випив 100 мл метилового спирту. Через 2 години відчув нудоту, головний біль, мерехтіння в очах, наростання спраги. Було блювання. Слизові оболонки гіперемовані, з ціанотичним відтінком, зіниці розширені. Який антидот Ви застосуєте?

a. Вікасол

b. Унітіол

с. Етиловий спирт

d. Атропіну сульфат

е. Магнію оксид

764. Пацієнтку доставлено до фельдшера ФАПу зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна припустити у пацієнтки?

a. Рожевий лишай

b. Токсикодермія

с. Алергічний дерматит

d. Синдром Лайєлла

е. Гостра кропив'янка

765. Жінка 27-ми років звернулася до фельдшера ФАПу за консультацією. Скарг немає. Протягом останніх 3-х років приймала протизаплідні гормональні контрацептиви. На даний час припинила їх прийом і намагається завагітніти. Менструальний цикл 34 дні, регулярний. Який день її циклу є найсприятливішим для виникнення вагітності?

a. 12-й день

b. 13-й день

с. 24-й день

d. 20-й день

е. 14-й день

766. До ФАП звернувся чоловік зі скаргами на тяжкість у правому підребер'ї, загальну слабкість. Три роки тому хворів на вірусний гепатит В. Об'єктивно: склери та шкіра жовтяничні. "Судинні зірочки" на шкірі грудної клітки. Печінка збільшена на 3 см. У крові: підвищений рівень білірубину і трансаміназ. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Хронічний гепатит

b. Хронічний панкреатит

с. Хронічний холецистит

d. Дискінезія жовчного міхура

е. Жовчнокам'яна хвороба

767. Хворий 20-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль в ділянці лівої ключиці, який з'явився після падіння на витягнуту руку. Діагностовано закритий перелом лівої ключиці без зміщення. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації:

a. Колосоподібна пов'язка

b. Восьмиподібна пов'язка

с. Зворотна пов'язка

d. Пов'язка Дезо

е. Спіралевидна пов'язка

768. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

a. Пасивне

b. Дренажне

с. Активне

- d. Фаулера
- e. Вимушене

769. До фельдшера звернувся хворий, який скаржиться на печіння, свербіння, відчуття жару, болючість в місці дії подразника - невідомої хімічної речовини. Об'єктивно: спостерігається наявність еритеми, яка з'явилася через 20 хвилин після дії подразника. Яку хворобу можна припустити?

- a. Стрептостафілодермія
- b. Токсикодермія
- c. Екзема
- d. Алергічний контактний дерматит
- e. Простий контактний дерматит

770. До фельдшеру ФАПу звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилася виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- b. Злоякісне новоутворення молочної залози
- c. Первинний сифіліс
- d. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- e. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

771. Фельдшер прийшов на патронаж до 3-місячної дитини. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отримано результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

- a. 1000 г
- b. 600 г
- c. 700 г
- d. 800 г
- e. 900 г

772. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- a. Вікасол
- b. Алохол
- c. Баралгін
- d. Нітрогліцерин
- e. Дицинон

773. До ФАП звернувся хворий 68-ми років зі скаргами на різкий біль у правій стопі, набряк пальців та потемнішання шкіри IV пальця. На цукровий діабет хворіє протягом 15-ти років, лікується нерегулярно. Яке ускладнення цукрового діабету виникло у хворого?

- a. Гематома
- b. Бешиха
- c. Панарицій
- d. Перелом IV пальця правої стопи
- e. Гангрена IV пальця правої стопи

774. У новонародженої дитини, що народилася від патологічних пологів, в ході яких було застосовано накладання щипців, спостерігається згладження складки носогубного трикутника, опущення кута рота і звуження повікової щілини зліва. Загальний стан і акт ссання не порушені. На що вказують дані симптоми?

- a. Неврит трійчастого нерва
- b. Черепно-мозкова пологова травма
- c. Кефалогематома
- d. Пологова пухлина

е. Парез лицьового нерва

775. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Перекрут ніжки кісти яєчника
- б. Гострий апендицит
- с. Позаматкова вагітність

д. Апоплексія яєчника

- е. Фіброміома

776. У хворого на ГРВІ на 4-ту добу стан погіршився, температура підвищилася до 38°C, з'явилася задишка, досі сухий кашель став вологим, з серозно-гнійним харкотинням. В легенях - притуплення перкуторного звуку. Яке ускладнення можна припустити?

- а. Сухий плеврит
- б. Вірусна пневмонія

с. Бактеріальна пневмонія

- д. Гострий бронхіт
- е. Ексудативний плеврит

777. У пологовій залі перебуває породілля, яка годину тому народила живого доношеного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скаржиться на запаморочення, слабкість. Під час огляду: спостерігається блідість шкірних покривів та слизових оболонок, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рс- 96/хв., із статевих шляхів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- а. Гіпоплазія матки
- б. Геморагічний шок
- с. Атонія матки
- д. Розрив пологових шляхів

е. Гіпотонія матки

778. До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною віком 5-ти років з такими скаргами: останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

- а. Антигістаміни

б. Пробіотики

- с. Антибіотики
- д. Сорбенти
- е. Вітаміни

779. Ви - фельдшер ФАПу, оглядаєте 4-денну дитину після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено, що сеча дитини має жовтувато-цегляний колір, на пелюшці залишається червонуватий слід, місцями видно дрібні жовто- червоні кристалики. Який із станів новонароджених спостерігається у дитини?

- а. Статевий криз

б. Сечокислий інфаркт

- с. Транзиторна гіпертермія
- д. Транзиторний дизбактеріоз
- е. Токсична еритема

780. Фельдшер пункту охорони здоров'я промислового підприємства проводить бесіду з жінками. Для прикладу використав наступний випадок: у пацієнтки 32-х років при обстеженні виявлено непрохідність маткових труб. В анамнезі: 2 артіфіціальні аборти. Дітей немає. У шлюбі 3 роки, вагітностей не було, статеве життя регулярне, без контрацепції. Яке з виявлених в анамнезі захворювань може бути причиною безпліддя?

- а. Бартолініт

b. Ожиріння

c. Хронічний аднексит

d. Хронічний гепатит

e. Ерозія шийки матки

781. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

a. Гострий лейкоз

b. Хронічний мієлолейкоз

c. Хронічний лімфолейкоз

d. Лімфогранулематоз

e. Гіпопластична анемія

782. До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на появу виразки на статевих органах. Об'єктивно: виразка розміром 0,5 см у діаметрі, з чіткими кратероподібними краями, вкрита нальотом у вигляді "старого сала", не турбує хворого. Що можна припустити?

a. Гонорея

b. Хламідіоз

c. Сифіліс

d. СНІД

e. Трихомоніаз

783. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Під час огляду: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

a. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

b. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки

c. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки

d. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки

e. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки

784. Чоловік 25-ти років протягом 2-3-х років скаржиться на посилення головного болю, мерзлякуватість, апатію, збільшення ваги, закрепи. Хворий адинамічний, шкіра бліда, суха, холодна, волосся поріділо. Щитоподібна залоза не збільшена. Тони серця глухі, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 55/хв., температура тіла - 35,8°C. Визначте попередній діагноз:

a. Гіпертиреоз

b. Гіпотиреоз

c. Хвороба Іценка-Кушинга

d. Акромегалія

e. Первинний альдостеронізм

785. До фельдшера ШМД звернулася жінка 20-ти років зі скаргами на різкий біль внизу живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Була короточасна втрата свідомості. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., пульс - 91/хв., затримка менструації - 20 днів. Живіт різко болючий у нижніх відділах, симптом Щоткіна- Блюмберга позитивний. Який пріоритетний метод діагностики даної патології?

a. Біопсія шийки матки

b. Пункція заднього склепіння

c. Кульдоскопія

d. Гістеросальпінгографія

e. Діагностична лапароскопія

786. Фельдшер прибув на виклик до дитини 7-ми років зі скаргами на слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури до 39°C, висип. В ході огляду: "палаючий зів", дрібнокрапковий висип по всьому тілі, інтенсивно виражений в природніх складках та на згинальній поверхні кінцівок, блідість носогубного трикутника на тлі гіперемованої шкіри. Поставте діагноз:

- a. Вітряна віспа
- b. Кір
- c. Краснуха
- d. Менінгококцемія

e. Скарлатина

787. В ході профобстеження в ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- a. Медикаментозне лікування
- b. Диспансерний нагляд**
- c. Фізіотерапевтичні методи лікування
- d. Санаторно-курортне лікування
- e. Оперативне лікування

788. У пацієнтки спостерігається порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

- a. Стридорозне дихання
- b. Дихання Біота
- c. Інспіраторна задишка
- d. Дихання Куссмауля

e. Експіраторна задишка

789. Пацієнтка 24-х років, яка хворіє на хронічний гастрит типу "А", скаржиться на слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, ламкість нігтів і випадіння волосся, порушення смаку: їсть крейду. Шкіра бліда, суха. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Пульс - 102/хв., АТ- 90/65 мм рт.ст. Анамнез крові: ер.- 2,7·10¹²/л, Hb- 80 г/л, КП- 0,7, ШОЕ- 18 мм/год, анізоцитоз, пойкилоцитоз. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

- a. В12-фолієводефіцитна анемія
- b. Гемолітична анемія
- c. Гіпопластична анемія
- d. Загострення хронічного гастриту

e. Залізодефіцитна анемія

790. Ви - фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до пацієнта 21-го року, який через декілька хвилин після введення гентаміцину відчув нестачу повітря, свербіння долонь, почервоніння обличчя, запаморочення в голові. АТ знизився до 75/50 мм рт.ст., ЧД- 24/хв., Рс- 105/хв. З якого препарату Ви розпочнете невідкладну допомогу?

a. Гідрокортизон

- b. Гідрокарбонат натрію
- c. Кофеїн
- d. Папаверин
- e. Кордіамін

791. Фельдшера викликали до чоловіка 47-ми років, який скаржиться на нападоподібний біль у лівій поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи. Пацієнт постійно змінює положення тіла, але полегшення не відчуває. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Лівобічна ниркова колька

- b. Виразкова хвороба
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Гострий панкреатит

792. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка, яка хворіє на гіпертиреоз. Після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла, тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

a. Тиреотоксичний криз

- b. Порушення мозкового кровообігу
- c. Напад бронхіальної астми

- d. Гіпертонічний криз
- e. Напад стенокардії

793. Під час будівельних робіт на нижні кінцівки працівника впала бетонна плита. Після звільнення кінцівок з'явилися різкий набряк, біль, обмеження рухів та чутливості. Встановлено діагноз: симптом тривалого стискання. Функція яких органів страждає першочергово при даному синдромі?

- a. Легені
- b. Серце
- c. Печінка
- d. Головний мозок
- e. Нирки**

794. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультції тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- a. Гломерулонефрит
- b. Міокардит**

- c. Сироваткова хвороба
- d. Набута вада серця
- e. Вогнищева пневмонія

795. До фельдшера ФАПу доставлено жінку 36-ти років зі скаргами на блювання, нудоту, печію. Дані симптоми з'явилися після випадкового вживання оцтової кислоти. Назвіть, яку долікарську допомогу повинен надати фельдшер:

- a. Дати вживати надмірну кількість рідини
- b. Промити шлунок розчином гідрокарбонату натрію**
- c. Поставити очисну клізму
- d. Забезпечити доступ свіжого повітря
- e. Промити шлунок розчином перманганату калію

796. Після визначення груп крові, резус-фактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби ці результати заносять до:

- a. Листа інтенсивного нагляду
- b. Амбулаторної картки
- c. Температурного листка
- d. Протоколу переливання крові**
- e. Листка лікарняних призначень

797. В жіночій консультації пацієнтці рекомендували обстеження. Який метод дослідження функціональної активності яєчників пацієнтка може застосувати вдома?

- a. Вимірювання базальної температури**
- b. Визначити рівень гормонів в крові
- c. Кольпоцитологію
- d. Симптом "папороті"
- e. Симптом "зіниці"

798. До ФАП звернувся пацієнт із загостренням хронічного холециститу. Який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю?

- a. Зігрівальний компрес
- b. Грілку**
- c. Холодну примочку
- d. Холодний компрес
- e. Міхур з льодом

799. Фельдшера ШМД викликали до чоловіка, у якого блювання "кавовою гущею", загальна слабкість, шум у вухах, запаморочення, тахікардія, зниження АТ. Який препарат необхідно ввести першочергово?

- a. Преднізолон
- b. Лазикс
- c. Анальгін
- d. Дицинон**
- e. Но-шпа

800. Ви - фельдшер пункту охорони здоров'я промислового підприємства, до вас звернувся хворий з опіком. Вкажіть та сплануйте найефективніший елемент першої медичної допомоги на місці події при обмежених опіках 1-2-го ступеня:

- a. Охолодження протягом 8-10 хвилин під проточною водою**
- b. Застосування масляно-бальзамічної емульсії за А.В. Вишневським
- c. Накладання пов'язки з розчином антисептика
- d. Обробка опікової поверхні вазеліновою олією
- e. Накладання сухої асептичної пов'язки

801. Фельдшера ФАПУ викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворій спостерігалася слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- a. Геморагічний інсульт
- b. Тромбоемболія судин мозку
- c. Ішемічний інсульт
- d. Транзиторна ішемічна атака**
- e. Субарахноїдальний інсульт

802. До пологового будинку надійшла роділля з переймами по 20 секунд через 5- 6 хв. Води не відходили, термін вагітності 38 тижнів. Серцебиття плоду - 130/хв. Через 2 години спостереження перейми стали коротші, по 10-15 секунд, паузи між ними по 8-10 хв. Серцебиття плоду - 180/хв. Яка аномалія пологової діяльності виникла в даному випадку і що необхідно зробити?

- a. Дискоординована пологова діяльність. Введення спазмолітиків
- b. Первинна слабкість пологової діяльності. Стимуляція пологів
- c. II період пологів. Акушерські щипці
- d. Надмірна пологова діяльність. Кесарів розтин
- e. Вторинна слабкість пологової діяльності, дистрес плоду. Кесарів розтин**

803. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народженні 3200 г, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- a. 6000
- b. 5400**
- c. 5800
- d. 5200
- e. 4800

804. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнтки 40-ка років, яку під час роботи на полі вкусила бджола. Хвора знепритомніла, різка блідість шкірних покривів, набряк губ і повік, тони серця глухі, пульс ниткоподібний, АТ- 50/20 мм рт.ст., дихання поверхневе. З чого почне невідкладну допомогу фельдшер ФАПУ?

- a. Ввести адреналін**
- b. Ввести папаверин
- c. Ввести баралгін
- d. Ввести промедол
- e. Ввести коргліконт

805. Фельдшер ФАПУ оглядає пацієнта, який скаржиться на біль в животі, нудоту. В ході обстеження: загальний стан тяжкий. Шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком. Страждальницький вираз обличчя. Живіт рівномірно здутий, м'язи напружені, пальпація

болісна. Визначається позитивний симптом Щоткіна- Блюмберга. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- a. Неспецифічний виразковий коліт
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий перитоніт**
- d. Гострий апендицит
- e. Хвороба Крона

806. У дитини 13-ти років, що перебуває на амбулаторному лікуванні з діагнозом "епідемічний паротит", на 8-й день захворювання виникли різкий біль в ділянці мошонки, гіперемія, набряк, піднялася температура до 39°C, яєчка збільшилися у розмірах. Встановіть діагноз:

- a. Орхіт**
- b. Перитоніт
- c. Пієлонефрит
- d. Цистит
- e. Бешиха

807. Ви працюєте фельдшером ШМД. Виклик до дитини 6-ти років. Під час прийому їжі дитина раптово закашлялася, посиніла, виникло стридорозне дихання. Після відновлення прохідності дихальних шляхів Ви негайно розпочали штучну вентиляцію легень. Якою повинна бути частота вдювань?

- a. 10 за 1 хвилину
- b. 40 за 1 хвилину
- c. 20 за 1 хвилину**
- d. 18 за 1 хвилину
- e. 30 за 1 хвилину

808. Під час дослідження мазку піхвового вмісту на визначення ступеню його чистоти, виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слабколужна. Це характерно для такого ступеню чистоти піхви:

- a. IV
- b. I
- c. III**
- d. II
- e. -

809. На початку II періоду пологів роділля зблідла, пульс - 105/хв., слабкого наповнення, АТ- 85/50 мм рт.ст. Під час огляду: матка в гіпертонусі, різко болюча в ділянці дна матки справа, асиметрична, серцебиття плоду глухе, аритмічне. Води підтікають, забарвленні кров'ю. Про яку патологію йде мова?

- a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**
- b. Крайове передлежання плаценти
- c. Центральне передлежання плаценти
- d. Загроза розриву матки
- e. Емболія навколоплідними водами

810. Дитина народилася недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте початок та добову дозу призначення вітаміну D3:

- a. На 2-му місяці життя по 500 МО
- b. З 10-го дня по 2000 МО
- c. З 10-14-го дня по 500-1000 МО**
- d. З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- e. На 2-му тижні по 4000 МО

811. Машина швидкої допомоги прибула на виклик до дитини 10-ти років, яка скаржиться на сильний біль у лівій гомілці. Захворіла гостро, 6 годин тому. Травми не було. Тиждень тому була ангіна. Під час огляду: стан дитини важкий, t - 38,9°C, ЧДР- 30/хв., АТ- 105/80 мм рт.ст.,

пульс - 120/хв., ритмічний. Ліва кінцівка зігнута у колінному суглобі, рухати нею дитина відмовляється. Шкіра без змін, біль при пальпації, при навантаженні на вісь. Ваш діагноз:

- a. Гострий артрит колінного суглоба
- b. Гострий бурсит колінного суглоба
- c. Забій м'яких тканин гомілки
- d. Контрактура колінного суглоба

e. Гострий гематогенний остеомієліт

812. Фельдшер пункту охорони здоров'я щоденно проводить дезінфекцію приміщення пункту охорони здоров'я та використаного інструментарію. Як називається такий вид дезінфекції?

a. Профілактична

- b. Вогнищева поточна
- c. Камерна
- d. Вогнищева заключна
- e. Санітарна

813. До ФАП звернувся чоловік 44-х років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного мокротиння, задишку під час незначного фізичного навантаження, підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість. Хворіє близько 10-ти років. Робота пов'язана з переохолодженнями. Палить з юнацького віку по 1-й пачці цигарок на день. Грудна клітка діжкоподібної форми. Перкуторно: коробковий звук. Аускультативно: середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший попередній діагноз:

- a. Бронхоектатична хвороба
- b. Гострий бронхіт
- c. Хронічний катаральний бронхіт

d. Хронічний обструктивний бронхіт

e. Бронхіальна астма

814. Дитина 5-ти років захворіла гостро через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:

- a. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- b. Менінгококцемія
- c. Кір

d. Геморагічний васкуліт, шкірна форма

e. Хвороба Верльгофа

815. Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта, який скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що виникли після швидкого зниження температури тіла. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло?

- a. Марення
- b. Непритомність
- c. Кома
- d. Шок

e. Колапс

816. Пацієнт 36-ти років після внутрішньовенного введення ліків скаржиться на біль, гіперемію і наявність ущільнення за ходом вени. Назвіть ускладнення, яке виникло у пацієнта:

- a. Гематома
- b. Некроз

c. Флебіт

- d. Повітряна емболія
- e. Сепсис

817. Фельдшера ШМД викликали до потерпілої 35-ти років, яка 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті й епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

- а. Промити шлунок холодною водою через зонд**
- б. Промити шлунок розчином перманганату калію
- с. Промити шлунок розчином соди через зонд
- д. Промити шлунок теплою водою
- е. Викликати блювання

818. Фельдшер ШМД оглянув пацієнта 30-ти років, який упав з висоти 2-х метрів на ноги. Об'єктивно: болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшується під час навантаження за віссю хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:

- а. Напівсидячи
- б. На лівому боці
- с. На спині**
- д. На правому боці
- е. У положенні "жаби"

819. Дівчинка 10-ти років звернулася до фельдшера з приводу ниючого болю у правому підребер'ї, поганого апетиту, нудоти, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, періодичного блювання. Біль посилюється після вживання жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. Під час пальпації живота печінка виступає з-під реберної дуги на 2,5 см, щільна та болісна. Позитивні симптоми Ортнера, Кера справа в підребер'ї. Вкажіть найімовірніший діагноз:

- а. Виразкова хвороба
- б. Глистна інвазія
- с. Холецистохолангіт**
- д. Хронічний гастрит
- е. Гострий панкреатит

820. Хворий 43-х років скаржиться на головний біль, що виникає періодично протягом 2-х місяців, головним чином під ранок, і супроводжується блюванням. Напади головного болю виникають також під час фізичного навантаження, залежать від положення голови. Для якого захворювання це характерно?

- а. Пухлина головного мозку**
- б. Невралгія трійчастого нерва
- с. Ішемічний інсульт
- д. Гострий менінгіт
- е. Гіпертонічна хвороба

821. З місця аварії доставлено хворого зі скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється під час рухів ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладно. Під час пальпації болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом "прилиплої п'яти". Визначте діагноз:

- а. Вивих стегна
- б. Забій м'яких тканин
- с. Перелом поперекового відділу хребта
- д. Перелом кісток таза**
- е. Перелом стегна

822. Ви - фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся хворий зі скаргами на наявність утворення, яке з'являється в правій пахвинній ділянці при фізичному навантаженні. Об'єктивно: утворення округлої форми діаметром біля 4-х см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції. Утворення розташоване з внутрішнього боку від сім'яного канатика. Який попередній діагноз?

- а. Правостороння стегова грижа
- б. Ліпома правої пахвинної ділянки
- с. Варикозне розширення вен правого стегна
- д. Перелом діафіза бедра
- е. Правостороння пахвинна грижа**

823. Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2

години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потиличні та задньощийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

a. Краснуха

b. Кір

c. Вітряна віспа

d. Менінгококцемія

e. Скарлатина

824. У дитини 1-го року, яка лікується з приводу рахіту на тлі задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. З введення якого препарату слід розпочати надання невідкладної допомоги?

a. Лазикс

b. Діазепам

c. Сібазон

d. Сульфат магнію

e. Глюконат кальцію

825. З метою профілактики СНІДу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства керується нормативним наказом за №:

a. 59

b. 288

c. 955

d. 720

e. 38

826. Під час внутрішньом'язевого введення ампіциліну у дитини 10-ти років з'явилися відчуття жару, нудота, блідість шкіри. Артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

a. набряк Квінке

b. Гостра серцева недостатність

c. Гостра судинна недостатність

d. Кропив'янка

e. Анафілактичний шок

827. До гінекологічне відділення надійшла хвора 24-х років зі скаргами на болі внизу живота, кров'янисті виділення, $t_{0} = 38,2^{\circ}\text{C}$. 4 дні тому було проведено штучне переривання вагітності при терміні в 7-8 тижнів. В ході бімануального обстеження матка збільшена та болюча. Поставте діагноз:

a. Ендометрит

b. Параметрит

c. Кольпіт

d. Аднексит

e. Пельвіоперитоніт

828. Фельдшеру пункту охорони здоров'я необхідно провести оцінювання фізичного розвитку учнів. Фельдшер визначив індекс Кетле. Як його підрахувати?

a. Ділення маси тіла в грамах на зріст у сантиметрах

b. Множення маси тіла на зріст у сантиметрах

c. Сума показників зросту та маси тіла

d. Множення зросту на масу тіла

e. Ділення зросту на масу тіла

829. Фельдшер прибув на виклик до дитини 2-х років, яка хворіє третій день, має хрипкий голос, "гавкаючий" кашель. Вночі з'явилася задишка, шкіра ціанотична, в акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. Якому невідкладному стану відповідають ці симптоми?

a. Ларингоспазм

b. Ларингіт

с. Стенозуючий ларинготрахеїт

- d. Стороннє тіло в дихальних шляхах
- e. Напад бронхіальної астми

830. Мати дитини 6-ти місяців скаржиться фельдшеру ФАПУ, що дитина неспокійна, погано спить, пітніє. В ході об'єктивного обстеження: виражені лобні та тім'яні горби, велике тім'ячко 3-4 см, краї його потовщені. На ребрах "чотки", виражена м'язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про що свідчать дані симптоми?

a. Гіпотрофія

b. Рахіт

- c. Диспепсія
- d. Гіпокальцемічний синдром
- e. Ексудативно-катаральний діатез

831. До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на тупий біль в правій здихвинній ділянці, підвищення температури тіла до 37,2°C, нудоту. Які першочергові дії фельдшера?

a. негайно викликати чергового хірурга

- b. Ввести знеболюючі
- c. Ввести кровоспинні засоби
- d. Холод на живіт
- e. Промивання шлунку

832. Хвора жінка скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. При обстеженні звернено увагу на рівень АТ- 210/110 мм рт.ст. Який препарат треба ввести у даному випадку?

- a. Платифілін 0,2% - 1,0 внутрішньом'язево
- b. Димедрол 1% - 1,0 внутрішньом'язево
- c. Атропін 0,1% - 0,5 підшкірно
- d. Анальгін 50% - 2,0 внутрішньом'язево

e. Клофелін 0,01% - 1,0 мл

833. В ході огляду шийки матки за допомогою дзеркал фельдшер ФАПУ звернув увагу на ціанотичність шийки матки та піхви. Ознакою чого це являється?

a. Імовірна ознака вагітності

- b. Ознака порушення менструального циклу
- c. Ознака запального захворювання
- d. Сумнівна ознака вагітності
- e. Достовірна ознака вагітності

834. У жінки 25-ти років скарги на різкий гострий біль внизу живота, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність негативний. Клінічна картина характерна для:

a. Апоплексії яєчника

- b. Раку яєчника
- c. Апендициту
- d. Хронічного аднекситу
- e. Позаматкової вагітності

835. Фельдшер ФАПУ проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Вкажіть, де він повинен прикласти стетоскоп при першій позиції, щоб найкраще вислухати серцебиття плоду:

a. Зліва на рівні пупка

- b. Справа на рівні пупка
- c. Зліва нижче пупка
- d. Справа нижче пупка
- e. Справа вище пупка

836. Фельдшер ФАПУ оглядає пацієнта, у якого після прийому ципрофлоксацину з'явилися

висип та свербіння шкіри. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тулуба та кінцівок рожевий уртикарний висип, Ps- 78/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Найімовірніший діагноз:

- a. Анафілактичний шок
- b. Системна склеродермія
- c. набряк Квінке
- d. Поліноз
- e. Кропив'янка**

837. Фельдшер ФАПУ оглядає потерпілого 25-ти років який 30 хвилин тому отримав ножове поранення грудної клітки справа. При огляді стан середньої важкості, з рани виділяється піниста кров. Фельдшер припускає пневмоторакс. Який вид пов'язки він має застосувати?

- a. Оклюзійну**
- b. Колосовидну
- c. Гемостатичну
- d. Спіралевидну
- e. Циркулярну

838. Оглядаючи вагітну 30-ти тижнів, фельдшер ФАПУ діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- a. Сублінгвально ніфедипін
- b. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- c. Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг**
- d. Внутрішньовенно гініпрал
- e. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду

839. Фельдшер ФАПУ спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

- a. Анемічний
- b. Сидеропенічний**
- c. Геморагічний
- d. Астеновегетативний
- e. Диспептичний

840. Хворий 36-ти років скаржиться на напади задухи з переважно утрудненим видихом, що відбуваються до 2-3 разів на день та знімаються інгаляціями в2- адреноміметиків. Хворіє протягом 10-ти років. Грудна клітка розширена, над легенями коробковий перкуторний тон. Під час аускультції: жорстке дихання з подовженим видихом. В аналізі харкотиння багато еозинофілів, кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Який попередній діагноз?

- a. Бронхіальна астма**
- b. Пневмонія
- c. Серцева астма
- d. Хронічний обструктивний бронхіт
- e. Спонтанний пневмоторакс

841. До ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у лівому колінному суглобі, який посилюється під час ходьби, обмеження рухів. Фельдшер призначив вологий зігрівальний компрес. Вкажіть тривалість процедури:

- a. 1-2 години
- b. 40-60 хвилин
- c. 8-10 годин**
- d. 4-6 годин
- e. 2-4 години

842. До фельдшера пункту охорони здоров'я звернувся пацієнт зі скаргами на розпиральний біль голови, шум у вухах, стискальний біль у ділянці серця, АТ- 180/110 мм рт.ст. Які медикаменти доцільно буде обрати фельдшеру для надання невідкладної допомоги?

- a. Кокарбоксілаза, анальгін, еуфілін**

б. Но-шпа, анальгін, папаверин

с. Дибазол, клофелін, лазикс

д. Преднізолон, нітрогліцерин, димедрол

е. Кальцію глюконат, АТФ, калію оротат

843. У хворой 30-ти років 4 години тому виник біль в епігастральній ділянці, було одноразове блювання. М'язи в правій здухвинній ділянці напружені, виражені симптоми подразнення очеревини. Ваш попередній діагноз:

а. Гострий апендицит

б. Гострий холецистит

с. Правостороння ниркова колька

д. Печінкова колька

е. Гострий аднексит

844. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом "виразкова хвороба шлунку". Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

а. Гіповолемічний шок

б. Кардіогенний шок

с. Анафілактичний шок

д. Перфорація виразки шлунку

е. Гостре отруєння

845. У пологовий будинок бригадою швидкої допомоги доставлено непритомну жінку після трьох нападів судом при терміні вагітності 32 тижні. Стан тяжкий, АТ- 180/120 мм рт.ст., анурія. Серцебиття плода глухе, 142/хв. Шийка матки відхилена дозад, щільна, канал шийки матки закритий, води не виливалися. Яка тактика ведення вагітної?

а. Плодорушівна операція

б. Вичікувальна тактика

с. Розродження впродовж 48-ми годин

д. Розродження впродовж 24-х годин

е. Термінове розродження

846. Бригада ШМД прибула до навчального закладу. Студент зі страхом в очах тримався за шию. Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, утруднене. Припущено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?

а. Застосувати прийом Геймліха

б. Вставити товсту голку в трахею

с. Провести трахеостомію

д. Ввести спазмолітики

е. Ввести знеболювальні

847. Під час патронажу новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природніх складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

а. Попрілості

б. Ексфоліативний дерматит Ріттера

с. Псевдофурункульоз

д. Пухирчатка новонароджених

е. Везикулопустульоз

848. Хворий 38-ми років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині грудни, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Нейроциркуляторна дистонія

б. ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІ ФК

с. ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІV ФК

d. ІХС. Стенокардія, що вперше виникла

e. ІХС. Гострий інфаркт міокарда

849. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

a. Флегмона

b. Правець

c. Лімфаденіт

d. Лімфангоїт

e. Бешиха

850. Дівчинка 12-ти років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на біль у ділянці промежини, кровотечу зі статевих шляхів. З анамнезу: 12 годин тому забилася, впавши з велосипеда. Об'єктивно: у ділянці правої малої соромітної губи наявна рана, що слабко кровоточить, пальпаторно - до 3 мм завглибшки, 2 см завдовжки. Встановіть діагноз:

a. Метроендометрит

b. Передчасне статеве дозрівання

c. Травма зовнішніх статевих органів

d. Дисфункційна маткова кровотеча

e. Позаматкова вагітність

851. До фельдшера звернувся чоловік, який скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, який виник після їзди на велосипеді. Об'єктивно: склери жовтяничні. Живіт болючий у правому підребер'ї, позитивний симптом Ортнера. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Жовчнокам'яна хвороба

b. Цироз печінки

c. Хронічний гепатит

d. Виразкова хвороба

e. Хронічний гастрит

852. Ви - фельдшер ШМД. У дитини 2-х років гостра кишкова інфекція, яка супроводжується токсико-ексикозом II ступеню. Яку кількість рідини з розрахунку на кг маси тіла треба призначити дитині для проведення I етапу регідратаційної терапії?

a. 140-160 мл

b. 110-130 мл

c. 170-200 мл

d. 60-100 мл

e. 30-50 мл

853. Визначте, який термін гестації вагітної є періодом ризику для розвитку природженої вади серця і судин у разі дії несприятливих чинників навколишнього середовища:

a. 38-40 тижнів вагітності

b. 35-37 тижнів вагітності

c. 10-12 тижнів вагітності

d. 2-8 тижнів вагітності

e. 20-24 тижні вагітності

854. До приймального відділення гінекологічного стаціонару бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 28-ми років зі скаргами на різкий біль внизу живота, короточасну втрату свідомості вдома, незначні кров'яністі виділення із статевих шляхів. Затримка менструації - 7 днів. До якого додаткового методу потрібно підготувати жінку для уточнення діагнозу?

a. Діагностичне вишкрібання

b. Мазок на цитологію

c. Мазок на ступінь чистоти

d. УЗД

e. Кольпоскопія

855. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йде мова?

- a. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- b. Синусова аритмія
- c. Синусова тахікардія
- d. Миготлива аритмія**
- e. Екстрасистолічна аритмія

856. До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72-х років зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Протягом останніх тижнів помітив, що кал набув стрічкової форми. Яке захворювання можна припустити?

- a. Рак прямої кишки**
- b. Тріщини відхідника
- c. Нориці прямої кишки
- d. Геморой
- e. Парапроктит

857. У хворого на середньоважку форму черевного тифу на 18-й день хвороби різко знизилася температура тіла, артеріальний тиск впав до 60/30 мм рт.ст., прискорився пульс до 120/хв., з'явилися різка слабкість, запаморочення. Який ще симптом буде свідчити про серйозне ускладнення?

- a. Мелена**
- b. Галюцинації
- c. Апатія
- d. Адинамія
- e. Закреп

858. Фельдшера швидкої допомоги викликано до роділлі, яка скаржиться на сильні болючі перейми. При огляді неспокійна, контракційне кільце високо і косо розміщене, матка у формі піщаного годинника, зовнішні статеві органи набряклі. Яке ускладнення можна припустити?

- a. Розрив промежини
- b. Загроза розриву матки**
- c. Надмірно сильна пологова діяльність
- d. Розрив шийки матки
- e. Розрив матки

859. В ході огляду пацієнта 47-ми років Ви встановили діагноз "проривна виразка шлунку". Вкажіть характерну симптоматику болю при цій патології:

- a. Оперізувальний біль
- b. Інтенсивний біль з іррадіацією в плече і лопатку
- c. Переймоподібний біль
- d. Тупий біль
- e. Кинджальний біль**

860. До Вас на ФАП звернулися родичі тяжкохворого з проханням оглянути його з приводу здуття живота. В ході огляду Ви з'ясували, що в пацієнта метеоризм. На яку відстань фельдшер введе газовивідну трубку до прямої кишки?

- a. На 40-45 см
- b. На 20-25 см
- c. На 45-50 см
- d. На 35-40 см
- e. На 20-30 см**

861. Хлопець 20-ти років під час бійки зазнав удару в обличчя. Скаржиться на виділення крові з порожнини носа у кількості до 50 мл. Загальний стан задовільний, АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку допомогу слід надати постраждалому?

- a. Припікання трихлороцтовою кислотою

б. Перев'язка привідних артеріальних судин

с. Ввести вікасол 1 мл внутрішньом'язово

д. Передня тампонада 3% перекисом водню, холод на ніс

е. Ввести амінокапронову кислоту внутрішньом'язово

862. У дитини 2-х років з гіпертермічним синдромом, спостерігається блідість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

а. Холод на проекцію великих судин

б. Оцтові обгортання

с. Парацетамол всередину

д. Папаверин 2% внутрішньом'язово

е. Анальгін 50% внутрішньом'язово

863. До ФАП звернувся пацієнт, провідник потягу, на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, підвищення температури тіла. Обличчя гіперемоване, набрякле, на перехідній складці кон'юнктиви петехії. Під ключицями, на бічних поверхнях грудної клітки рясний розеолезно-петехіальний висип. Спостерігається симптом Говорова-Годельє. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Сказ

б. Лептоспіроз

с. Грип

д. Черевний тиф

е. Висипний тиф

864. У новонародженої дитини спостерігається пухлина в ділянці кісток черепа. Пухлина не виходить за межі шва. Різко відмежована від нормальної кістки ущільненим і трохи піднятим над її рівнем валиком. Яку пологову травму можна припустити?

а. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія

б. Кефалогематома

с. Гіпоксично-травматична енцефалопатія

д. Пологова пухлина

е. Внутрішньочерепна пологова травма

865. Пацієнтка, 45-ти років звернулася до ФАП. Скарги на кров'яністі виділення з піхви протягом 3-х тижнів, що виникли після 1,5-місячної затримки менструації. Турбують припливи жару. Менструації з 12-ти років, встановилися за 1 рік, по 4 дні, через 28 днів, помірні, безболісні. Протягом останніх 8-ми місяців спостерігалися затримки менструацій, після чого відновилися, але стали рясними й тривалими. В ході гінекологічного дослідження: змін не виявлено. Оцініть ситуацію:

а. Гіпоталамічний синдром

б. Анемічний синдром

с. Клімактеричний синдром

д. Геморагічний синдром

е. Аденогенітальний синдром

866. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на різке здуття живота, нестійкі випорожнення, нудоту, яка з'являється після вживання жирної та солодкої їжі. Хворіє близько року. Багато палить, зловживає спиртними напоями. Об'єктивно: шкіра жовтяничного забарвлення, наявність телеангіектазій, гіперемія долонь, асцит. Пальпаторно: печінка збільшена, щільна, край загострений. Про яку найбільш імовірну патологію йде мова?

а. Цироз печінки

б. Виразкова хвороба шлунку

с. Хронічний гастрит

д. Рак шлунку

е. Хронічний холецистит

867. Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться, коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків?

a. У 2-3 роки

- b. В 6-7 років
- c. В 5-6 років
- d. В 4 роки
- e. В 1 рік

868. Хвора 23-х років звернулася на прийом до жіночої консультації зі скаргами на виділення з піхви з неприємним запахом, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. В ході гінекологічного огляду: слизова оболонка піхви гіперемована, на дотик кровоточить, виділення біло-зелені, піністі, значні. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Трихомоніаз

- b. Хламідіоз
- c. Сифіліс
- d. Гонорея
- e. Кандидоз

869. Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- a. Імпульсний
- b. Модульований
- c. Високочастотний
- d. Змінний

e. Постійний

870. У дитини 4-х років з'явилися лихоманка до 39°C, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка пальпується у вигляді тонкого тяжа. Яке захворювання можна припустити?

- a. Сальмонельоз
- b. Ешерихіоз
- c. Токсична диспепсія

d. Дизентерія

e. Холера

871. Фельдшера викликали до чоловіка 26-ти років, який був у непритомному стані. З дитинства хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: дихання шумне, із запахом ацетону. Шкіра суха, холодна на дотик. Зіниці звужені. Пульс - 100/хв., ниткоподібний. Живіт здутий, черевна стінка напружена. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Гіпоглікемічна кома

b. Гіперглікемічна кома

- c. Алкогольна кома
- d. Печінкова кома
- e. Уремична кома

872. Вас викликали до пацієнта, який вдарився головою, був непритомний 5 хвилин, скаржиться на сильний головний біль, неодноразове блювання. На МРТ: патології не виявлено. Поставте попередній діагноз:

a. Струс головного мозку

- b. Здавлення головного мозку
- c. Менінгіт
- d. Забій головного мозку
- e. Енцефаліт

873. До фельдшера пункту охорони здоров'я металургійного підприємства звернувся працівник зі скаргами на головний біль, запаморочення, стомлюваність, солодкий присмак у роті, переймоподібні болі у животі, не пов'язані з вживанням їжі, закрепи. В ході об'єктивного обстеження: шкіра землисто-бліда, бузково-сіра смужка навколо ясен та зубів, нижній край печінки +4 см з-під краю реберної дуги, АТ- 150/100 мм рт.ст., Рс- 98/хв. Отруєння якою

токсичною речовиною ви припустите у пацієнта?

- a. Алкоголем
- b. Хлором
- c. Фосфором
- d. Свинцем**
- e. Миш'яком

874. Після виконання маніпуляції інструменти потрібно занурити у дезінфікуючий розчин, потім промити під проточною водою. Назвіть наступний етап у проведенні передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення?

- a. Висушування та стерилізація в автоклаві
- b. Промивання у дистильованій воді
- c. Контроль якості передстерилізаційного очищення
- d. Стерилізація
- e. Занурення у мийний засіб**

875. До фельдшера звернувся хворий 20-ти років зі скаргами на пігментацію шкіри, яка виникла недавно (золотисто-коричневого кольору), потемнішання волосся, відсутність апетиту, нудоту, діарею, біль у животі, схуднення. Дихання везикулярне, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рс- 60/хв. Аускультативно: тони серця послаблені. Живіт при пальпації болісний в епігастрії. Ніктурія. Зниження функції статевих залоз. Яке захворювання виникло у пацієнта?

- a. Хвороба Іценко-Кушинга
- b. Панкреатит
- c. Подагра
- d. Ожиріння
- e. Хвороба Аддісона**

876. Ви - фельдшер ФАП. У дитини 10-ти років після перенесених двох нападів ревматизму, сформувалася вада серця. Протягом якого терміну необхідно проводити вторинну профілактику біциліном-5?

- a. 5 років
- b. 3 роки
- c. 1 рік
- d. Пожиттєво**
- e. 10 років

877. Фельдшер ШМД на виклику у дитини 7-ми років. Скарги на остуду, підвищення температури тіла до 39 °С, головний біль, кашель. Дитина бліда, тремтить, шкіра "мрамурова", кінцівки холодні, сухий кашель, зів гіперемований, тони серця приглушені, тахікардія. Розчин якого лікарського препарату повинен ввести фельдшер у першу чергу?

- a. 1% дибазолу**
- b. 2,4% еуфіліну
- c. 2,5% аміназину
- d. 1% димедролу
- e. 20% глюкози

878. До фельдшера ФАП звернулася мати з дитиною 3-х місяців зі скаргами на асиметрію шкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання припустить фельдшер?

- a. Застарілий вивих стегна
- b. Звичний вивих стегна
- c. Травматичний вивих стегна
- d. Патологічний вивих стегна
- e. Природжений вивих стегна**

879. До фельдшера ФАП звернулася вагітна в терміні 36 тижнів, у якої з'явилися набряки на нижніх кінцівках. Об'єктивно: АТ- 160/100 мм рт.ст., виражені набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці, в сечі білок. Чим ускладнився перебіг даної вагітності?

- a. Протеїнурією вагітних

b. Прееклампсією середнього ступеню

- c. Прееклампсією легкого ступеню
- d. Артеріальною гіпертензією вагітних
- e. Набряками вагітних

880. Фельдшера швидкої невідкладної допомоги викликано до вагітної у якої проходять пологи вдома. Потуги через 2-3 хвилини, по 45-50 сек. В ході обстеження прийомом Піскачека голівка легко досягається на відстані 2-2,5 см від статевої щілини. Яку тактику має обрати фельдшер для подальшого ведення родів?

a. негайно госпіталізувати до пологового відділення у власному супроводі

b. Закінчити роди вдома з подальшою госпіталізацією

- c. Доставити до ФАП
- d. Викликати акушерку
- e. Ввести промедол, анальгін, димедрол для зупинки родів

881. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, який розповів, що 7 діб тому він наступив на цвях. До лікаря не звертався, рану обробив йодом. В даний час його турбують тягнучі болі в рані, сіпання м'язів навколо рани. Що можна припустити у першу чергу?

a. Облітеруючий ендартеріїт

b. Пращець

- c. Бешиха
- d. Сказ
- e. Газова гангрена

882. Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта?

a. У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами

b. У положенні сидячи

c. У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого набік

- d. У горизонтальному положенні лежачи на животі
- e. У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову хворого набік

883. В ході дослідження пульсу пацієнта з високою температурою тіла виявлено частоту серцевих скорочень 98/хв. Родичам пацієнта фельдшер повинен пояснити, що підвищення температури тіла на 1°C прискорює пульс на:

a. 3-4 удари на хвилину

b. 8-10 ударів на хвилину

- c. 1-2 удари на хвилину
- d. 5-6 ударів на хвилину
- e. Понад 20 ударів на хвилину

884. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: положення плода повздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Визначте місце найкращого вислуховування серцебиття плода:

a. Справа нижче пупка

b. Справа вище пупка

c. Ділянка пупка

d. Зліва нижче пупка

e. Зліва вище пупка

885. До фельдшера ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

a. До ВПВ

b. До дільничного гінеколога

- c. До терапевта
- d. На УЗД

е. До гінекологічного відділення

886. Фельдшер ФАПу оглядає дитину з метою оцінки нервово-психічного розвитку. Дитина стежить і повертає голову за рухами яскравого предмету, у напрямку звуку, добре утримує голову у вертикальному положенні. Якому віку відповідають дані показники?

- а. 9 місяців
- б. 1 місяць
- с. 1 рік
- д. 3 місяці**
- е. 6 місяців

887. Для очисної клізми фельдшер ФАПу найчастіше використовує воду, оптимальна температура якої:

- а. 28-32°C**
- б. 24-26°C
- с. 16-18°C
- д. 20-22°C
- е. 10-12°C

888. Хвора 40-ка років звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на різке почервоніння, закисання правого ока, що з'явилося сьогодні вранці після сну. Об'єктивно: слизова оболонка повік та очного яблука різко гіперемована, набрякла, рясні гнійні виділення. Поставте діагноз:

- а. Хронічний дакриоцистит
- б. Гострий приступ глаукоми
- с. Герпетичний деревовидний кератит
- д. Міопія середнього ступеню
- е. Гострий кон'юнктивіт правого ока**

889. Мати звернулася до фельдшера з дитиною 4-х років зі скаргами на поганий апетит, неспокійний сон, періодичні болі в животі навколо пупка. Вранці спостерігаються нудота, блювання, запаморочення. Дитина схудла. Тиждень тому на шкірі був висип. Визначте попередній діагноз:

- а. Гострий гастроентерит
- б. Аскаридоз**
- с. Гострий панкреатит
- д. Дуоденіт
- е. Ентеробіоз

890. У хворого 67-ми років діагностовано початкову стадію старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані?

- а. Хірургічні
- б. Медикаментозні**
- с. Кріодеструкція
- д. На цій стадії хвороби лікування не проводиться
- е. Лазеротерапія

891. Бригаду швидкої допомоги викликали до пацієнта 47-ми років, який скаржиться на інтенсивний стискальний біль в ділянці серця, загальну слабкість, запаморочення, нудоту, задишку в спокої. Стан тяжкий, блідість шкірних покривів, акроціаноз. АТ- 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв., ЕКГ: ознаки гострого інфаркту міокарда. Який препарат слід використати фельдшеру для корекції АТ?

- а. Кофеїн
- б. Адреналін
- с. Мезатон
- д. Сульфоксамфокаїн
- е. Допамін**

892. Пацієнт 20-ти років годину тому відчув "кинджальний" біль в животі, було одноразове

блювання. Під час обстеження: положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Що з пацієнтом?

a. Гострий гастрит

b. Перфорація виразки

c. Загострення виразкової хвороби

d. Шлунково-кишкова кровотеча

e. Гострий живіт (перитоніт)

893. В ході профілактичного огляду хворого на шкірі виявлено папули і бляшки вкриті сріблястими лусочками. Феномени "стеаринова пляма", "точкова кровотеча" різко позитивні. Яке захворювання у пацієнта?

a. Псоріаз

b. Червоний вовчак

c. Нейродерміт

d. Сифіліс

e. Червоний плескатий лишай

894. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, поприлість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

a. Атопічний дерматит

b. Токсикодермія

c. Нейродерміт

d. Кропив'янка

e. Екзема

895. Дитину 2-х років у праву долоню вкусила комаха. На місці укусу з'явилося почервоніння, поширився набряк тканин. Температура тіла підвищилася до 38°C. Такий стан діагностують у разі:

a. Сінної лихоманки

b. Анафілактичного шоку

c. Молочного струпу

d. Кропив'янки

e. Набряку Квінке

896. Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

a. 2,5-2,75 ммоль/л

b. 2,75-3,0 ммоль/л

c. 1-1,5 ммоль/л

d. 1,75-2,0 ммоль/л

e. 2,25-2,5 ммоль/л

897. Пацієнт скаржиться на озноб, підвищення температури тіла до 39°C, біль у попереку зліва. Хворіє 2-й день. Загальний аналіз сечі: густина - 1008, каламутна, білок - 0,3 г/л, лейкоцити - 35-40 у полі зору, еритроцити - 1-2 у полі зору, бактерії. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Нирковокам'яна хвороба

b. Хронічний гломерулонефрит

c. Гострий гломерулонефрит

d. Хронічний пієлонефрит

e. Гострий пієлонефрит

898. До фельдшера звернувся чоловік 33-х років, який скаржиться на загальну слабкість, пітливість, підвищення температури тіла до 37,6°C, вологий кашель. Такий стан триває останні 3 місяці. У колективі нещодавно працював колега, у якого пізніше був діагностований туберкульоз легень. Найімовірніший попередній діагноз:

- a. Гострий бронхіт
- b. Рак легень
- c. Гостра пневмонія

d. Туберкульоз легень

- e. Хронічний бронхіт

899. До фельдшера звернувся чоловік 38-ми років, який скаржиться на кашель з виділенням гнійного мокротиння неприємного запаху до 300 мл за добу, переважно вранці, задишку при фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,2°C, хворіє з 10 років.

Об'єктивно: губи ціанотичні. Пальці у вигляді барабаних паличок. Частота дихальних рухів - 24/хв. Аускультативно: над правою легенню вислуховуються середньопухирчасті вологі хрипи, які зменшуються після відкашлювання мокротиння. Найімовірніший попередній діагноз:

- a. Емфізема легень
- b. Абсцес легень

c. Бронхоектатична хвороба

- d. Гостра пневмонія
- e. Хронічний бронхіт

900. На ФАП звернувся чоловік 28-ми років, який скаржиться на різку загальну слабкість, біль у горлі, кістках, підвищення температури тіла до 39,6°C. Хворіє 2 тижні. Загальний стан тяжкий. Шкіра бліда. Загальний аналіз крові: еритроцити - $1,4 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 70 г/л, колірний показник - 1,0, лейкоцити - $22,3 \cdot 10^9/л$, паличкоядерні - 3%, сегментоядерні - 8%, лімфоцити - 5%, моноцити - 3%, бластні клітини - 75%, швидкість осідання еритроцитів - 47 мм/год. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Гострий лейкоз

- b. Хронічний лімфолейкоз
- c. Лімфогранулематоз
- d. Хронічний мієлолейкоз
- e. Залізодефіцитна анемія

901. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 32-х років, який скаржиться на інтенсивний біль у правій половині грудної клітки, що посилюється при кашлі, глибокому диханні, сухий кашель, підвищення температури тіла до 37,4°C. Захворів 2 дні тому після переохолодження.

Об'єктивно: лежить на правому боці. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання.

Справа на тлі везикулярного дихання вислуховується шум тертя плеври. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Сухий плеврит

- b. Рак легень
- c. Ексудативний плеврит
- d. Гостра пневмонія
- e. Гострий бронхіт

902. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 22-х років, у якого 2 дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помій, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі. Пульс - 62/хв., ритмічний, напружений. Артеріальний тиск 170/120 мм рт.ст., добова кількість сечі 300 мл. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Гострий гломерулонефрит

- b. Хронічний пієлонефрит
- c. Гіпертонічна хвороба
- d. Хронічний гломерулонефрит
- e. Гострий пієлонефрит

903. До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги:

a. Ревматична хвороба

- b. Остеоартроз
- c. Подагра
- d. Остеохондроз
- e. Ревматоїдний артрит

904. Хвора, що хворіє на ІХС, викликала швидку допомогу. Скаржиться на серцебиття, що з'явилося раптово, після того як відчула поштовх у груди. Загальний стан середньої важкості. Частота дихальних рухів - 28/хв., пульс - 168/хв., ритмічний, тони серця приглушені. На ЕКГ: частота серцевих скорочень - 166/хв., комплекс QRS розширений і змінений. Ви діагностували напад пароксизмальної тахікардії. Які з названих препаратів Ви оберете для надання допомоги?

- a. Димедрол
- b. Фенігидин
- c. Диклофенак
- d. Ізадрин

e. Анаприлін

905. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки 37-ми років, яка страждає на мітральний стеноз. Вночі раптово погіршився стан - швидко зростає задишка, дихання "клекочуче", кашель із виділенням пінистого рожевого харкотиння. Які ваші першочергові дії?

- a. Гірчичник на ділянку серця
- b. Інгаляції сальбутамолу
- c. ЕКГ

d. Інгаляції піногасниками

e. Гірчичник на потилицю

906. Хворий 35-ти років, скаржиться на часте похолодання стоп, біль в литкових м'язах, що посилюється при ходьбі. Вважає себе хворим останні 3 роки. Палить. При огляді - шкіра на ступнях холодна, бліда. Пульсація артерій стоп послаблена на обох ногах. Про що свідчать дані симптоми:

- a. Облітеруючий атеросклероз
- b. Варикозне розширення вен

c. Облітеруючий ендартеріт

- d. Бешиха
- e. Хвороба Рейно

907. Дитині 3 роки. Мати звернулася до фельдшера зі скаргами на часте дихання, кашель, кволість дитини, підвищення температури тіла до 39°C. При огляді: стан важкий, шкіра бліда, ціаноз носогубного трикутника. При перкусії вкорочення перкуторного звуку паравертебрально, при аускультатії - велика кількість крепітуючих хрипів. Про що свідчать дані симптоми?

a. Хронічна пневмонія

b. Гостра пневмонія

- c. Гострий бронхіт
- d. Бронхіальна астма
- e. Гострий ларинготрахеїт

908. Фельдшер здоров'я оглядає дитину 4-х років. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, висипання на шкірі, кволість. При огляді: дитина квола, шкіра бліда, на волосистій частині голови, обличчі, тулубі поліморфний висип у вигляді плям, папул, везикул, наповнених прозорою рідиною. Дитина до захворювання відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину в даному випадку:

- a. 5 днів
- b. 14 днів
- c. 25 днів

d. 21 день

e. 9 днів

909. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хлопчика 4-х місяців. Скарги матері на підвищення температури тіла до 39°C, неспокій, плач. При огляді: стан хлопчика важкий, шкіра суха, гаряча на дотик, гіперемія кон'юнктив та слизової оболонки зів, утруднене дихання через ніс. Який невідкладний стан виник у дитини?

- a. Анафілактичний шок
- b. Гіпертермічний синдром**
- c. Судомний синдром
- d. Астматичний стан
- e. Ларинготрахеїт

910. Фельдшера швидкої допомоги викликали до роділлі: I період пологів, передбачувана маса плода - 4500 г, на висоті болючих перейм виник різкий біль, пологова діяльність припинилась. Роділля бліда. Якій патології відповідає дана клінічна картина?

- a. Розрив плідного міхура
- b. Розрив матки, що відбувся**
- c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- d. Розрив шийки матки
- e. Передлежання плаценти

911. До першовагітної у терміні 38 тижнів був викликаний фельдшер ФАПу. Об'єктивно: перейми через 10 хвилин по 3035 секунд, що розпочалися 3 години тому. Положення плода позовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?

- a. Передвісники пологів
- b. Загроза передчасних пологів
- c. Другий період
- d. Третій період
- e. Перший період**

912. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернулася робітниця 36-ти років із скаргами на загальну слабкість, біль і відчуття розпирання у правій статевій губі. Об'єктивно: температура - 37,5°C; зовнішні статеві органи гіперемовані, права велика статеві губа набрякла, гіперемована, болюча. Виділення із піхви гнійні. Із приводу якого захворювання необхідно скерувати пацієнтку у гінекологічне відділення?

- a. Гострий вульвовагініт
- b. Гематома правої статевої губи
- c. Кіста бартолінової залози
- d. Гострий бартолініт**
- e. Рак вульви

913. У породіллі 30-ти років у ранньому післяпологовому періоді виявлено кровотечу із зовнішніх статевих органів. Жінка народила дівчинку вдома - 4540 г. Пологи були повторні, стрімкі, розрив промежини при перших пологах. В анамнезі: кандидозні кольпіти. При об'єктивному дослідженні фельдшером ФАПу виявлено: розрив слизової піхви і розрив промежини до ануса. Вкажіть степінь розриву промежини:

- a. IV
- b. -
- c. I
- d. III
- e. II**

914. На ФАП звернулася вагітна, 20-ти років в терміні вагітності 20 тижнів, зі скаргами на набряки на нижніх кінцівках, животі, головний біль, погіршення зору. Об'єктивно: загальний стан важкий, артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст. на обох руках, білок сечі - 5,0 г/л. Під час огляду з'явився напад судом. Про яку патологію ви подумали?

- a. Пієлонефрит вагітних
- b. Преєклампсія легкого ступеня**

с. Гіпертонічна хвороба

д. Набряки вагітних

е. Еклампсія

915. У дитини 2-х років з гіпертермічним синдромом, спостерігається блідість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

а. Анальгін 50% внутрішньом'язово

б. Оцтові обгортання

с. Папаверин 2% внутрішньом'язово

д. Холод на проекцію великих судин

е. Парацетамол всередину

916. Ви - фельдшер ФАП, оглядаєте дитину віком 6 діб після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено набрякання грудних залоз, виділення з них незначної кількості рідини кольору молока. Забарвлення шкіри над залозами не змінене. Який із перехідних станів новонароджених спостерігається у дитини?

а. Транзиторний дисбактеріоз

б. Статева криза

с. Сечокислий інфаркт

д. Токсична еритема

е. Транзиторна гіпертермія

917. Ви - фельдшер ФАП, проводите антропометрію дитині 2-х місячного віку, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Якою є належна маса тіла дитини, якщо її маса тіла одразу після народження становила 3200 г?

а. 4600 г

б. 3750 г

с. 4000 г

д. 5400 г

е. 5600 г

918. Ви - фельдшер ФАП, проводите патронаж дитини віком 10-ти днів. Об'єктивно: легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей, шкіра бліда, акроціаноз. Під час аускультатії серця вислуховується грубий систолічний шум. З анамнезу стало відомо, що мати в перші місяці вагітності перенесла вітряну віспу. Яку хворобу Ви запідозрите у дитини?

а. Асфіксію

б. Бронхіт

с. Спазмофілію

д. Рахіт

е. Природжену ваду серця

919. До фельдшера швидкої допомоги звернувся чоловік 35-ти років, у якого впродовж 12-ти років при контакті з квітковим пилом розвивалася ядуха. При зверненні: дихання за участю додаткових м'язів, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання 30/хв., при аускультатії з обох боків - ділянки "німих легень". Введення яких медикаментозних препаратів фельдшером доцільне в даній ситуації?

а. Бета-адреноміметиків

б. Спазмолітиків

с. Антибіотиків

д. Бета-адреноблокаторів

е. Глюкокортикостероїдів

920. Пацієнт 36-ти років, доставлений в приймальне відділення машиною швидкої допомоги. Скарги: раптовий біль в епігастрії і за грудиною протягом 2 годин. Впродовж року мав подібні болі без зв'язку з навантаженням, що самостійно зникали. Пацієнт блідий, стогне, холодний піт. Частота серцевих скорочень - 100/хв., екстрасистолія, артеріальний тиск - 90/65 мм рт.ст. Живіт болючий, напружений. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

a. Рентгенографію шлунка

b. Електрокардіографію

c. Фіброгастродуоденоскопію

d. Загальний аналіз крові

e. Рентгенографію ОГК

921. Бригаду швидкої допомоги викликали до пацієнта 47-ми років, який скаржиться на інтенсивний стискальний біль в ділянці серця, загальну слабкість, запаморочення, нудоту, задишку в спокої. Стан тяжкий, блідість шкірних покривів, акроціаноз. Артеріальний тиск - 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв. ЕКГ: ознаки гострого інфаркту міокарда. Який препарат слід використати фельдшеру для корекції артеріального тиску?

a. Кофеїн

b. Допамін

c. Адреналін

d. Мезатон

e. Сульфокамфокаїн

922. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПу зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37, 6°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

a. Токсикодермія

b. Гостра кропив'янка

c. Алергічний дерматит

d. Рожевий лишай

e. Синдром Лайєла

923. Чоловік 42-х років, звернувся на ФАП зі скаргами на біль, деформацію і порушення функції правої кінцівки після падіння на витягнуту руку. При обстеженні: рука знаходиться у відведеному положенні, пошкоджене плече опущене, хворий тримає руку зігнутою в лікті, передпліччя підтримує здоровою рукою. Під дзьобоподібним відростком пальпується вивихнута голівка. Визначте діагноз:

a. Перелом плечової кістки

b. Розтягнення зв'язок плечового суглоба

c. Перелом акроміального відростка лопатки

d. Вивих правого плеча

e. Забій плечового суглоба

924. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

a. Дифтерія глотки

b. Виразково-плівчаста ангіна

c. Катаральна ангіна

d. Лакунарна ангіна

e. Фолікулярна ангіна

925. Жінка 22-х років, що годує груддю, звернулася на ФАП зі скаргами на підвищену температуру тіла до 39°C, біль у грудній залозі, слабкість, головний біль. Об'єктивно: грудна залоза збільшена в об'ємі, шкіра гіперемована, пальпаторно - болюча, збільшені підпахвові лімфатичні вузли. Ваш діагноз:

a. Рак Педжета

b. Мастит лактаційний

c. Мастопатія

d. Рак молочної залози

e. Фібroadенома

926. На ФАП звернувся пацієнт зі скаргами на тягнучий біль у рані, сіпання м'язів навколо рани правої ступні. Зі слів хворого захворів гостро: з'явилась значна стомлюваність жувальних м'язів і їх напруження. З анамнезу - 4 дні назад отримав колото-різану рану правої ступні. За допомогою не звертався. Що з хворим?

а. Сказ

б. Повець

с. Газова гангрена

д. Гостра гнійна інфекція

е. Дифтерія рани

927. До вас на ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, озноб. При обстеженні: права гомілка набрякла, почервоніння шкіри з чіткими межами, місцями пухирі різної величини, наповнені серозним ексудатом. Ваш діагноз:

а. Флебіт

б. Бешиха, бульозна форма

с. Еризипеліод

д. Бешиха, еритематозна форма

е. Бешиха, некротична форма

928. Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнтки з нападом бронхіальної астми. Пацієнтка сидить, спираючись руками в край ліжка. Як називається таке положення пацієнтки?

а. Фаулера

б. Вимушене

с. Пасивне

д. Активне

е. Сімса

929. Фельдшер ФАПу оглядає дитину 8ми років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, дрібноточковий висип на гіперемованій шкірі, підвищення температури тіла до 38°C. При огляді: у зіві яскрава гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідість носо-губного трикутника, язик обкладений білим нальотом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

а. Атопічного дерматиту

б. Вітряної віспи

с. Кору

д. Скарлатини

е. Краснухи

930. На профілактичний огляд до фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 1-го місяця. Який режим годування повинен призначити фельдшер?

а. За вимогою дитини

б. Кожні 3 години

с. Кожні 5 годин

д. Кожні 3,5 години

е. Кожні 2 години

931. При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 38 тижнів фельдшер ФАПу визначив над входом в малий таз округлу, помірної щільності балотуючу частину плода. Спинка плода зліва. Яка це позиція та передлежання плода?

а. II позиція, сідничне передлежання

б. II позиція, головне передлежання

с. I позиція, головне передлежання

д. I позиція, сідничне передлежання

е. Косе положення плода

932. Пацієнтка 15-ти років. Менархе в 13 років. Статеві контакти заперечує. Менструації у дівчинки нерегулярні, з затримками. Чергова кровотеча більш рясна, триває 16 днів, настала після 3-х тижневої затримки. При огляді дівчинка бліда, Нb70 г/л. З піхви рясні кров'яністі

виділення з дрібними згустками. При ректальному дослідженні визначається маленька матка, безболісна, рухома. Придатки не пальпуються. Визначте тип кровотечі:

- a. Викидень
- b. Рак шийки
- c. Клімактерична кровотеча
- d. Ювенільна кровотеча**
- e. Фіброміома матки

933. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- a. Медикаментозне лікування
- b. Диспансерний нагляд за хворою**
- c. Санаторно-курортне лікування
- d. Оперативне лікування
- e. Фізіотерапевтичні методи лікування

934. Ви фельдшер ФАПу. До вас звернувся пацієнт. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, затримку газів, стілець. При огляді ви запідозрили перитоніт. Яку надати долікарську допомогу?

- a. Знеболити, спостерігати за пацієнтом
- b. Обмежити прийом їжі та води
- c. Знеболити, покласти холод на живіт
- d. Знеболити, покласти грілку на живіт
- e. Покласти холод на живіт, викликати швидку допомогу**

935. Повторновагітна, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на ниючі болі внизу живота і кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Піхове дослідження: канал шийки матки пропускає палець, в ньому визначаються елементи плодового яйця. Величина матки не відповідає терміну вагітності. Придатки матки не визначаються. Кровотеча рясна. Оцініть ситуацію:

- a. Неповний аборт**
- b. Передчасні пологи
- c. Міхуровий занесок
- d. Передлежання плаценти
- e. Саркома матки

936. До фельдшера ФАПу звернулась мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання "фонтаном" без домішок жовчі. Блювотні маси мають кислий запах. Дитина погано збільшує масу тіла. При огляді живота з'являється симптом "пісочного годинника". Визначить попередній діагноз у дитини:

- a. Пілороспазм
- b. Гострий гастрит
- c. Виразкова хвороба
- d. Пілоростеноз**
- e. Диспепсія

937. У третьому періоді пологів пройшло більше 30-ти хвилин, ознаки відшарування плаценти позитивні. Зовнішні прийоми видалення посліду неефективні. Яка повинна бути подальша тактика?

- a. Повторно застосувати зовнішні прийоми видалення посліду
- b. Очікування самостійного видалення посліду
- c. Ручне видалення посліду під знеболюванням**
- d. Застосувати препарати які збільшують скорочувальну діяльність матки
- e. Ввести окситоцин

938. Пацієнтка 45-ти років, викликала фельдшера ФАПу додому. Скаржиться на сильний напад болю у правому підребер'ї, який з'явився після прийому надто жирної їжі. Біль віддає у праву руку. В анамнезі: жовчнокам'яна хвороба. Об'єктивно: шкіра звичайного забарвлення, температура тіла - 36,7°C, позитивний симптом Ортнера, Кора. Сеча і кал звичайного

забарвлення. Вкажіть найімовірніший попередній діагноз:

- a. Хронічний гепатит
- b. Гострий гастрит
- c. Напад ниркової кольки
- d. Напад печінкової коліки**
- e. Цироз печінки

939. Дитина 5-ти років отруїлась невідомою речовиною. Фельдшер ШМД для негайного промивання шлунку використає воду, одноразова кількість якої складає:

- a. 40-50 мл
- b. 300-350 мл**
- c. 150-180 мл
- d. 100-110 мл
- e. 200-250 мл

940. До фельдшера звернувся хлопчик 10ти років зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного забарвлення. Лунка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна запідозрити?

- a. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)**
- b. Гемофілія
- c. Гемолітична анемія
- d. Гострий лейкоз
- e. Геморагічний васкуліт

941. У дитини 7-ми місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом: менінгококова інфекція. Які першочергові дії при наданні невідкладної допомоги?

- a. Зігріти дитину грілками
- b. Подразнювати корінь язика
- c. Провести профілактику западання язика**
- d. Повісити міхур з льодом до голови
- e. Провести ШВЛ, закритий масаж серця

942. Жінка 25-ти років на 8-му добу після пологів звернулася до фельдшера зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури. При огляді залоза гіперемована, в верхньо-зовнішньому квадранті пальпується інфільтрат. Що запідозрила акушерка?

- a. Мастопатія
- b. Рак молочної залози
- c. Лактаційний мастит**
- d. Аденома молочної залози
- e. Бешиха

943. Пацієнт 20-ти років годину тому відчув "кинджальний" біль в животі, було одноразове блювання. Під час обстеження: положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Що з пацієнтом?

- a. Гострий гастрит
- b. Загострення виразкової хвороби
- c. Гострий живіт (перитоніт)
- d. Шлунково-кишкова кровотеча
- e. Перфорація виразки**

944. У передпологовій палаті знаходиться першороділля 22-х років з нормальною пологовою діяльністю. Стан роділлі і плода задовільний. Положення плода поздовжнє. Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка розташована до лівого боку матки. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода:

- a. Нижче пупка праворуч
- b. Вище пупка праворуч

с. Вище пупка ліворуч

d. Нижче пупка ліворуч

е. На рівні пупка

945. Хвора 42 роки, звернулась зі скаргами на біль внизу живота, нудоту, блювання, що з'явилися після різких рухів. Об'єктивно: напруження м'язів черевної стінки, симптоми подразнення очеревини позитивні. Вагінальне обстеження: матка не збільшена, ліворуч від матки пальпується утвір 7-8 см в діаметрі, округлої форми, щільно-еластичної консистенції, різко болючий при зміщенні. Який діагноз є найбільш ймовірний?

а. Апоплексія яєчника

b. Перекрут ніжки пухлини

с. Позаматкова трубна вагітність

d. Розрив піоксальнікса

е. Гострий аднексит

946. Хвора 68-ми років, з діагнозом рак шийки матки скаржиться на значну кровотечу зі статевих шляхів. При огляді в дзеркалах виявлено: шийка матки збільшена, деформована, на її піхвовій частині визначається кратероподібна виразка, що кровоточить. Що необхідно зробити в першу чергу при наданні долікарської допомоги?

а. Ввести кровоспинні засоби

b. Ввести утеротоніки

с. Провести тугу тампонаду піхви

d. Покласти холод на низ живота

е. Провести біопсію шийки матки

947. Фельдшер ФАП, не з'ясувавши алергологічного анамнезу у пацієнта, виконав ін'єкцію вітаміну B6. Після ін'єкції у пацієнта з'явилося виражене збудження, стиснення в грудях, загальне почервоніння шкіри, напад кашлю, погіршення ритму дихання, зниження артеріального тиску. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

а. Колапс

b. Повітряна емболія

с. Медикаментозна емболія

d. Пірогенна реакція

е. Анафілактичний шок

948. У дитини з гемофілією А почалася носова кровотеча. Який препарат доцільно використати для зупинки кровотечі?

а. Вітамін С

b. Кріопреципітат

с. Вікасол

d. Діцинон

е. Хлористий кальцій

949. Фельдшер здоров'я пункту проводить бесіду серед робітниць цукрового заводу. Як слід відповісти на запитання: в якому віці починається клімактеричний період?

а. 60-65 років

b. 65-70 років

с. 52-55 років

d. 40-45 років

е. 45-50 років

950. Лікар призначив пацієнту застосування газовідвідної трубки в ранній післяопераційний період, щоб усунути метеоризм. На скільки сантиметрів фельдшеру необхідно ввести газовідвідну трубку?

a. 20-30 см

b. 15-18 см

с. 7-10 см

d. 10-15 см

е. 18-20 см

951. Під час виклику фельдшера хворий скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що відчув хворий після швидкого зниження температури. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

а. Колапс

б. Шок

с. Марення

д. Кома

е. Непритомність

952. До фельдшера ФАПУ звернулась пацієнтка 40-ка років зі скаргами на виділення калу чорного кольору. З анамнезу відомо, що пацієнтка знаходиться на "Д" обліку з виразковою хворобою 12-ти палої кишки. До якого обстеження слід підготувати пацієнтку?

а. Копрологічне дослідження калу

б. Кал на бактеріологічне дослідження

с. Загальний аналіз калу

д. Кал на приховану кров

е. Кал на яйця гельмінтів

953. Пацієнт 60-ти років, госпіталізований каретою швидкої допомоги до приймального відділення зі скаргами на головний біль у потиличній ділянці, підвищений артеріальний тиск - 170/95 мм рт.ст., мерехтіння мушок перед очима. На яку ділянку тіла фельдшер повинен накласти гірчичники?

а. Грудину

б. Поперекову ділянку

с. Спину

д. Потиличну

е. Серце

954. Чоловік 48-ми років, звернувся до фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: артеріальний тиск - 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

а. Брадикардія

б. Артеріальна гіпертензія

с. Гіпертермія

д. Артеріальна гіпотензія

е. Тахікардія

955. До фельдшера ФАПУ звернулась повторно вагітна в терміні 30 тижнів вагітності зі скаргами на мажучі кров'яністі виділення зі статевих шляхів, болі не турбують. Відзначається високе стояння передлежачої частини плода над площиною входу в малий таз. Запідозрено передлежання плаценти. Яка подальша тактика фельдшера?

а. Термінова госпіталізація в акушерський стаціонар

б. Подальше спостереження в жіночій консультації

с. Амніоскопія

д. Проведення піхвового дослідження в умовах жіночої консультації

е. Госпіталізація в стаціонар у плановому порядку

956. Пацієнтка 24-х років скаржиться на гострий біль у лівій здухвинній ділянці з іррадіацією в пряму кишку, який виник раптово після статевого акту. Остання менструація була 2 тижні тому. При пальпації визначаються біль та позитивні симптоми подразнення очеревини зліва. Який попередній діагноз поставить фельдшерШМД?

а. Розрив маткової труби

б. Сальпінгоофорит

с. Загроза переривання вагітності

d. Трубний аборт

e. Апоплексія лівого яєчника

957. Фельдшер ФАПу обстежував жінку з терміном вагітності 24 тижні. Запідозрив багатоплідну вагітність. Який метод обстеження підтвердить діагноз?

a. Вимірювання розмірів таза

b. Вимірювання ОЖ, ВДМ

c. Вимірювання артеріального тиску та пульсу жінки

d. Вислуховування серцебиття плода в одній точці

e. Вислуховування серцебиття плода в двох точках

958. У чоловіка 57-ми років, що протягом 10-ти років страждає на стабільну стенокардію напруження, раптово виник інтенсивний здавлюючий біль за грудниною, відчуття нестачі повітря. Після прийому 3-х таблеток нітрогліцерину біль зменшився, але не пройшов, через 30 хвилин став нестерпним, наростала задишка. Об'єктивно: блідість шкіри, гіпергідроз. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск 100/60 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

a. ІХС. Прогресуюча стенокардія

b. Нейроциркуляторна дистонія

c. Тромбоемболія легеневої артерії

d. ІХС. Гострий інфаркт міокарда

e. Гострий перикардит

959. До фельдшера звернулася жінка 42х років зі скаргами на кровотечі із носа, ясен, різнокольорові геморагії на тілі, які локалізуються під гумками панчів, у місцях тертя одягу. Об'єктивно: "шкіра леопарда", позитивні симптоми щипка та джгута. Найімовірніший попередній діагноз?

a. Гострий лейкоз

b. Гемофілія А

c. Тромбоцитопенічна пурпура

d. Гемолітична анемія

e. Залізодефіцитна анемія

960. Вкажіть об'єм долікарської допомоги при кровотечі із шийки матки, зумовленої злоякісною пухлиною:

a. Термінова госпіталізація

b. Обробити йодом

c. Провести піхвову ванночку

d. Ввести гінекологічний тампон

e. Провести тампонаду піхви

961. Роділля 25-ти років народила живого доношеного хлопчика вагою - 3600 г. Прошло 15 хвилин послідового періоду, ознак відокремлення посліду немає. Вкажіть, яка максимальна тривалість послідового періоду?

a. 40 хвилин

b. 30 хвилин

c. 60 хвилин

d. 15 хвилин

e. 2 години

962. На виклику фельдшер ШМД встановив, що у дитини 5-ти років блювання, болі в животі, були рідкі випорожнення, температура - 38,0°C, хворий 4 години. Батько пов'язує захворювання з тим, що дитина їла в кафе тістечко. Хлопчик неспокійний, шкіра блідо-землиста, тахікардія, живіт болючий. Симптоми гострого живота негативні. З чого потрібно почати надання допомоги?

a. Ввести 50% розчин анальгін

b. Почати інфузійну терапію

c. Ввести антибіотик

d. Ввести антигістамінні препарати

е. Промити шлунок і кишечник

963. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на нападоподібний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку, нудоту, блювання, гіркий присмак у роті. Пацієнт неспокійний, живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для невідкладної допомоги фельдшер приготує:

а. Кордіамін

б. Ренальган

с. Маалокс

д. Холензим

е. Альмагель

964. Фельдшер ФАПУ оглядає хлопчика 12-ти років. Мати пояснює, що дитина скаржиться на біль в правому підребер'ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, швидку втомлюваність. При огляді: печінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати?

а. Вірусний гепатит В

б. Дискінезія жовчовивідних шляхів

с. Лейкоз

д. Залізодефіцитна анемія

е. Гострий холецистит

965. До фельдшера здоров'я звернувся робітник, який наколов стопу цвяхом. На підошві рана - 0,2х0,3 см. Щеплення проти правця проведено 2 роки тому. Який препарат для вакцинації повинен першочергово підготувати фельдшер?

а. ППС 3000 МО та ПА 1,0 мл

б. ППС 3000МО

с. ПА 0,5 мл

д. ПА 1,0 мл

е. Щеплення не потрібне

966. У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник напад апное, але ціаноз і брадикардія не спостерігаються. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?

а. Перевірити рівень глюкози в крові

б. Постійно підтримувати правильне положення

с. Негайно розпочати ШВЛ

д. Розпочати зігрівання

е. Тактильна стимуляція вздовж спини

967. На травмпункт доставлений чоловік 25-ти років, що з ним сказати не може, рот широко відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?

а. Остеомієліт нижньої щелепи

б. Остеома нижньої щелепи

с. Перелом нижньої щелепи

д. Перелом верхньої щелепи

е. Вивих нижньої щелепи

968. Під час патронажу новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

а. Пухирчатка новонароджених

б. Псевдофурункульоз

с. Везикулопустульоз

д. Ексфоліативний дерматит Ріттера

е. Попрілості

969. На ФАП привезли хворого з черепномозковою травмою. Свідомість відсутня, крововилив у навколоочну клітковину, з носа виділяється кров та ліквор, з вух витікання ліквору.

Артеріальний тиск 100/60 мм рт.ст., пульс - 50/хв. Поставте попередній діагноз:

- a. Перелом кісток носа
- b. Перелом кісток склепіння черепа
- c. Струс мозку
- d. Стиснення мозку

e. Перелом основи черепа

970. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

- a. На животі**
- b. На правому боці
- c. Сидячи
- d. На спині
- e. На лівому боці

971. До фельдшера ФАПу звернулась жінка 35-ти років з скаргами на сіпаючий біль в II пальці лівої кисті, яка 3 дні тому поранила палець при чистці риби. Останню ніч жінка не спала внаслідок нестерпного болю. При огляді: нігтьова фаланга лівої кисті різко набрякла, гіперемована. Яке захворювання у жінки?

- a. Бурсит
- b. Остеомієліт
- c. Пароніхія
- d. Артрит

e. Панарицій

972. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., пульс - 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Крок М Лікувальна справа (україномовний варіант) 2017 рік 10 лах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Позаматкова вагітність
- b. Перекрут ніжки кісти яєчника

c. Апоплексія яєчника

- d. Гострий апендицит
- e. Фіброміома

973. До фельдшера ФАПу звернулась жінка, яка отримала 20 хвилин тому опік лівої кисті та передпліччя гарячою водою. При огляді на ураженій ділянці пухирі, наповнені прозорою рідиною, шкіра гіперемована. Яке втручання повинен здійснити фельдшер?

- a. Накласти оцтовий компрес
- b. Накласти мазеву пов'язку

c. Промити холодною водою

- d. Покласти грілку
- e. Промити етиловим спиртом

974. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна запідозрити?

- a. Лімфогранулематоз
- b. Хронічний лімфолейкоз**
- c. Гострий лейкоз
- d. Хронічний мієлолейкоз
- e. Гіпопластична анемія

975. До фельдшера ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході

огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- a. До терапевта
- b. До дільничного гінеколога**
- c. До ВПВ
- d. На УЗД
- e. До гінекологічного відділення

976. Фельдшер ШМД прибув по виклику до пацієнта 50-ти років, який скаржиться на головокружіння, слабкість, блювання за типом "кавової гущі", рідкий чорного кольору кал. При обстеженні: пульс 120/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Що з пацієнтом?

- a. Проривна виразка шлунку
- b. Гострий геморагічний панкреатит
- c. Гострий холецистит
- d. Шлунково-кишкова кровотеча**
- e. Гостра кишкова непрохідність

977. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

- a. Правець
- b. Лімфаденіт**
- c. Бешиха
- d. Флегмона
- e. Лімфангоїт

978. Після важкої фізичної роботи, хворий цукровим діабетом раптово втратив свідомість, з'явилися судоми, при пальпації шкірні покриви вологі, очні яблука тверді. Ваш попередній діагноз:

- a. Уремична кома
- b. Гіпоглікемічна кома**
- c. Колапс
- d. Непритомність
- e. Гіперглікемічна кома

979. Потерпілий непритомний, у правій його руці обірваний електричний провід, наявне судорожне посмикування тіла. Проведено знестремлення. Об'єктивно: дихання та пульс на магістральних артеріях відсутні, на долонній поверхні кисті продовгувата припухлість з обвугленням. Встановіть попередній діагноз:

- a. Тромбоз легеневої артерії
- b. Ларингоспазм
- c. Епілептичний напад
- d. Інфаркт міокарда
- e. Електротравма**

980. Фельдшера ШМД викликали до потерпілої 35-ти років, яка 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті й епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

- a. Промити шлунок розчином перманганату калію
- b. Промити шлунок холодною водою через зонд**
- c. Не промивати шлунок
- d. Викликати блювання
- e. Промити шлунок розчином соди через зонд

981. Пацієнту хворому на цукровий діабет призначено підшкірне введення інсуліну в кількості 20 МО (1 мл інсуліну = 100 МО). Вкажіть, яку кількість інсуліну (в мл) необхідно набрати в шприц ємністю 2 мл:

- a. 0,5 мл

- b. 0,6 мл
- c. 0,3 мл
- d. 0,4 мл
- e. 0,2 мл**

982. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт із скаргами на зниження чутливості у ділянці тильної поверхні 4 і 5 пальців правої кисті, неможливість зігнути 4 і 5 пальці. При огляді: м'язовий тонус та м'язова сила у правій руці знижені, обсяг рухів обмежений, згинально-ліктьовий рефлекс справа знижений. В анамнезі травма правого передпліччя. Встановіть попередній діагноз:

- a. Невропатія ліктьового нерву**
- b. Невропатія серединного нерву
- c. Невропатія великогомілкового нерву
- d. Центральний параліч правої руки
- e. Невропатія променевого нерву

983. Вас викликали до хворого. Пацієнт збуджений, тремтить, не спить, бачить під ліжком "маленьких пацюків", струшує простирadlo і подушку. Зі слів родичів зловживає алкоголем. Який діагноз поставить фельдшер ФАПУ?

- a. Маніакально-депресивний психоз
- b. Шизофренія
- c. Епілептичний психоз
- d. Алкогольний делірій**
- e. Старечий параноїд

984. Для якого елемента висипки характерні раптовий початок, нетривале існування, безплідне зникнення, свербіж:

- a. Вузла
- b. Уртикарного елемента**
- c. Вузлика
- d. Плями
- e. Везикули

985. У хворого на ГРВІ на 4-ту добу стан погіршився, температура підвищилася до 38°C, з'явилася задишка, досі сухий кашель став вологим, з серозно-гнійним харкотинням. В легенях - притуплення перкуторного звуку. Яке ускладнення можна припустити?

- a. Бактеріальна пневмонія**
- b. Вірусна пневмонія
- c. Сухий плеврит
- d. Ексудативний плеврит
- e. Гострий бронхіт

986. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез по центральному типу та гемігіперестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

- a. Пухлина мозку
- b. Ішемічний інсульт**
- c. Транзиторна ішемічна атака
- d. Геморагічний інсульт
- e. Епідуральна гематома

987. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

- a. Кoproлогічне дослідження випорожнень
- b. Бактеріологічне дослідження випорожнень**

с. Фіброгастродуоденоскопія

d. Зіскоб з періанальних складок

е. Дуоденальне зондування

988. При відвідуванні ФАПу мати Змісячної дитини поскаржилась на неспокій дитини, пітливість. При огляді: на шкірі елементи пітниці, в ділянці потилиці облісіння, краї переднього тім'ячка м'які. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:

a. Рахіт

b. Ексудативно-катаральний діатез

с. Лімфатико-гіпопластичний діатез

d. Нервово-артритичний діатез

е. Гіпокальціємічний синдром

989. Дитині 2 роки. Скарги батьків на раптове підвищення температури тіла до 39°C, млявість, неспокій, блювання, судоми. Об'єктивно: на спині, сідницях, бокових частинах тулуба, задній поверхні стегон висип у вигляді геморагічних зіркоподібних елементів. Вкажіть найбільш ймовірне захворювання:

a. Менінгококова інфекція

b. Краснуха

с. Вітряна віспа

d. Скарлатина

е. Кір

990. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані, відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

a. Брадипное

b. Трахіпное

с. Дихання Куссмауля

d. Дихання Біота

е. Дихання Чейн-Стокса

991. Ви фельдшер ФАПу. До вас звернулась пацієнтка зі скаргами на нудоту, сухість в роті. Ввечері відмічала двоїння предметів, "туман в очах", розлади ковтання. При огляді було виявлено: $t^{\circ}37,2^{\circ}\text{C}$, птоз, мідріаз, анізокорію. Оберіть захворювання, на яке вказують зазначені ознаки:

a. Отруєння блідою поганкою

b. Ботулізм

с. Вірусний менінгоенцефаліт

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

е. Герпетичний менінгоенцефаліт

992. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психопатологічний синдром:

a. Невротичний

b. Астенічний

с. Корсакова

d. Маніакальний

е. Кандинського-Клерамбо

993. Пацієнтка, прокинувшись уночі, не змогла встати з ліжка через слабкість в правих кінцівках, хотіла покликати на допомогу, але не змогла сказати ні слова. До ранку всі ці явища зникли. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Вкажіть, який патологічний стан розвинувся у хворої:

a. Гіпертонічний криз

- b. Геморагічний інсульт
- c. Субарахноїдальний крововилив
- d. Транзиторна ішемічна атака**
- e. Ішемічний інсульт

994. Фельдшер проводить передстерилізаційну обробку медичного інструментарію. На затискач наносить кілька крапель 1% р-ну фенолфталеїну. Вкажіть, про що свідчить рожеве забарвлення на інструменті?

- a. Наявність залишків жиру
- b. Наявність залишків мийного розчину**
- c. Наявність залишків дезактину
- d. Наявність залишків крові
- e. Наявність залишків дезоксону

995. Фельдшер ФАПу виконав внутрішньом'язову ін'єкцію, попередньо підігрітого олійного розчину, але не перевінив, чи не потрапив у судину. Вкажіть ускладнення, яке може виникнути у даному випадку:

- a. Інфільтрат
- b. Алергічна реакція
- c. Повітряна емболія
- d. Медикаментозна емболія**
- e. Некроз

996. Фельдшер ШМД проводить ін'єкцію антибіотика. Попередньо була проведена проба на чутливість до розчинника - новокаїну. Проба дала позитивний результат. Назвіть, який розчинник можна використовувати для розведення антибіотика?

- a. 0,5% розчин новокаїну
- b. 0,1% розчин натрію хлориду
- c. 10% розчин натрію хлориду
- d. 0,25% розчин новокаїну
- e. 0,9% розчин натрію хлориду**

997. До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на почервоніння і закисання очей, різь в очах. Під час обстеження - гіперемія кон'юнктиви, наявність гнійних виділень. Який попередній діагноз можна поставити?

- a. Керотит
- b. Склерит
- c. Блефарит
- d. Ячмінь
- e. Кон'юнктивіт**

998. Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потиличні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

- a. Менінгококцемія
- b. Вітряна віспа
- c. Кіп
- d. Скарлатина
- e. Краснуха**

999. До Вас на ФАП звернувся хворий 63-х років, який скаржиться на поступове зниження гостроти зору правого ока. Протягом півроку за призначенням офтальмолога закапував вітамінні краплі. При огляді під капсулою кришталика видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру зіниці. Вкажіть імовірний діагноз:

- a. Катаракта**
- b. Кон'юнктивіт
- c. Дакріoadеніт

- d. Блефарит
- e. Глаукома

1000. У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до 39°C, порушення загального стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфний висип у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при тяжкому перебігу даного захворювання:

- a. Фулорцин
- b. Феністил
- c. Брильянтовий зелений
- d. Цефтріаксон
- e. Ацикловір**

1001. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки, яка втратила свідомість в переповненій маршрутці. Об'єктивно: виражена блідість шкіри, пульс 90/хв., артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст. Назвіть заходи, які необхідно надати пацієнтці:

- a. Надати положення з опущеними ногами
- b. Надати положення Фаулера
- c. Посадити на стілець, розстебнути стискаючий одяг
- d. Надати положення Сімса
- e. Надати положення лежачи, з припіднятим ніжним кінцем**

1002. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

- a. Активне
- b. Вимушене
- c. Фаулера
- d. Дренажне**
- e. Пасивне

1003. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

- a. Строфантін, адреналін, тавегіл
- b. Кордіамін, супрастин, анальгін
- c. Седуксен, димедрол, аміназін**
- d. Цефазолін, манітол, еуфілін
- e. Ефедрин, алулент, атропін

1004. Після виконання маніпуляції інструменти потрібно занурити у дезінфікуючий розчин, потім промити під проточною водою. Назвіть наступний етап у проведенні передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення:

- a. Промивання у дистильованій воді
- b. Висушування та стерилізація в автоклаві
- c. Занурення у миючий засіб**
- d. Контроль якості передстерилізаційного очищення
- e. Стерилізація

1005. Ви -фельдшер ФАПУ. При обстеженні породіллі виявили: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

- a. Лактостаз**
- b. Мастит
- c. Лактопоез
- d. Лактогенез
- e. Гіпогалактія

1006. Роділля у терміні пологів, доставлена у першому періоді пологів з матковою кровотечею. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Шийка матки згладжена, відкрита на 6 см. На всьому протязі вічка визначається плацентарна тканина. Кровотеча підсилюється. Яка тактика ведення пологів?

- a. Консервативне ведення пологів
- b. Рання амніотомія
- c. Накладення порожнинних акушерських щипців
- d. Кесарів розтин**
- e. Стимуляція пологової діяльності

1007. У дитини 2-х років - IV ступінь гострого стенозуючого ларинготрахеїту. Який метод невідкладної допомоги найдоцільніший в цьому випадку?

- a. Антигістамінні засоби
- b. Парові інгаляції
- c. Подавання зволоженого кисню
- d. Відволікальна терапія
- e. Трахеотомія**

1008. Ви фельдшер швидкої допомоги, приїхали на виклик до потерпілої, яка випадково вилила на себе окуп. При обстеженні: потерпіла кричить від болю, передня поверхня обох нижніх кінцівок яскраво-гіперемована, вкрита пухирцями з серозним вмістом. Яка ступень та площа опіка у потерпілої?

- a. III А ст., 18%**
- b. III Б ст., 45%
- c. III А ст., 27%
- d. I ст., 9%
- e. II ст., 36%

1009. До фельдшера здоров'я пункту заводу звернувся робітник, який скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38°C, наявність болючого інфільтрату на задній поверхні шиї. При огляді: наявність інфільтрату синюшно-багрового кольору з кількома гнійними крапками. Відмічається збільшення та болючість потиличних лімфовузлів. Який попередній діагноз?

- a. Карбункул**
- b. Абсцес
- c. Бешиха
- d. Флегмона
- e. Фурункул

1010. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 45-ти років, скаржиться на загальну слабкість, неприємні відчуття в ділянці серця, утруднене дихання, ковтання. Протягом 40-ка років жила на Закарпатті. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, волога. Щитоподібна залоза збільшена, пульс - 72/хв., артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- a. Гіпотеріоз
- b. Дифузний токсичний зоб
- c. Нецукровий діабет
- d. Ендемічний зоб**
- e. Акромегалія

1011. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 63-х років зі скаргами на затруднене сечовипускання, особливо вночі. Хворий відзначає, що цівка сечі стала слабкою, час від часу переривається. Яке обстеження проведе фельдшер для уточнення діагнозу?

- a. Хромоцистоскопію
- b. Цистоскопію
- c. Пальцеве дослідження прямої кишки**
- d. Іригоскопію
- e. Ректороманоскопію

1012. Фельдшера ФАПУ запросили оглянути пацієнта 43-х років, який після вживання алкоголю

скаржитися на оперізувальний біль, нудоту, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення. Об'єктивно: пацієнт збуджений, живіт здутий, при пальпації - болючість в проекції підшлункової залози. Які лікарські препарати застосує фельдшер при наданні першої допомоги?

- a. Гепарин, фібринолізин
- b. Дицинон, етамзілат
- c. Но-шпу, гордокс**
- d. Прозерін, ацеклідін
- e. Сибазон, димедрол

1013. Після визначення груп крові, резусфактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби їх результати заносять до:

- a. Температурного листка
- b. Листа інтенсивного нагляду
- c. Протоколу переливання крові**
- d. Листка лікарняних призначень
- e. Амбулаторної картки

1014. До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х місяців зі скаргами на асиметрію шкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання припустить фельдшер?

- a. Природжений вивих стегна**
- b. Застарілий вивих стегна
- c. Патологічний вивих стегна
- d. Звичний вивих стегна
- e. Травматичний вивих стегна

1015. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у лобовій ділянці, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- a. Гострий фронтит**
- b. Гострий риніт
- c. Гострий сфеноїдит
- d. Гострий гайморит
- e. Гострий етмоїдит

1016. Дитину, яка народилася на 38-му тижні вагітності з довжиною тіла - 45 см і масою - 2500, обвід голови - 34 см треба рахувати як:

- a. Доношену**
- b. Недоношену I ступеню
- c. Недоношену III ступеню
- d. Недоношену II ступеню
- e. Переношену

1017. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 25-ти років, зі скаргами на свербіж, печію в піхві, що з'явилися після випадкового статевого акту. Об'єктивно: слизова оболонка піхви гіперемована, набрякла, з точковими геморагіями. Виділення пінисті, з неприємним запахом. Ваш ймовірний діагноз:

- a. Мікозний кольпіт
- b. Ендометрит
- c. Цервіцит
- d. Трихомонадний кольпіт**
- e. Хламідіоз

1018. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера,

Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- a. Вікасол
- b. Алохол
- c. Нітрогліцерин
- d. Баралгін**
- e. Дицинон

1019. До фельдшера ФАПу принесли дитину 7 днів зі скаргами на блідість шкіри і слизових оболонок. Загальний стан задовільний. В загальному аналізі крові знижена кількість еритроцитів та Hb, Rh (+), у матері Rh (-). На яке захворювання вказують дані симптоми?

- a. Гіпохромна анемія
- b. Залізодефіцитна анемія
- c. Гемолітична хвороба, жовтянична форма
- d. Гемолітична хвороба, набрякова форма
- e. Гемолітична хвороба, анемічна форма**

1020. Ви фельдшер ФАПу, берете на облік вагітну. Остання менструація була 2 місяці тому. Дно матки на 2 пальці вище лона, виділення з піхви кров'яні з міхурцями. У жінки набряки на ногах та передній черевній стінці, артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., пульс - 60/хв. Що Ви запідозрити у вагітної? Ваші дії?

- a. Вагітність, що замерла. Госпіталізація
- b. Міхуровий занесок. Негайна госпіталізація**
- c. 8 тижнів вагітності. Аборт, що розпочався
- d. 12 тижнів вагітності. Направити в жіночу консультацію
- e. Хоріонепітеліома. Госпіталізація

1021. Фельдшер проводить санітарноосвітню лекцію на підприємстві з питань профілактики онкозахворювань. Що повинен відповісти фельдшер на питання: "Як часто жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз?"

- a. 1 раз на рік
- b. 1 раз на тиждень
- c. 1 раз на місяць**
- d. 2 рази на рік
- e. 2 рази на тиждень

1022. До ФАП звернувся пацієнт із загостренням хронічного холецистити. Який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю?

- a. Міхур з льодом
- b. Холодну примочку
- c. Зігрівальний компрес
- d. Грілку**
- e. Холодний компрес

1023. Ви фельдшер ШМД. Проводите серцево-легеневу реанімацію дитини 15ти днів. На яку глибину повинна прогинатися грудина під час виконання закритого масажу серця?

- a. 3 см
- b. 2-2,5 см
- c. 0,5 см
- d. 2 см
- e. 1-1,5 см**

1024. Фельдшер ШД виїхав на місце ДТП, хворий з відкритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У нього діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:

- a. 2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії**
- b. 6-те міжребер'я по задньопухвовій лінії
- c. Проекція плеврального синуса

- d. 7-ме міжребер'я по лопатковій лінії
- e. Місце найбільшої тупості, визначеної під час перкусії

1025. Фельдшер ФАПу спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

- a. Диспептичний
- b. Сидеропенічний**
- c. Геморагічний
- d. Анемічний
- e. Астеновегетативний

1026. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. При огляді: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

- a. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- b. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки**
- c. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки
- d. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- e. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки

1027. На ФАП звернулась дівчинка 14-ти років зі скаргами на болі в суглобах та підвищення температури тіла до 37,5°C. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому перехворіла на ангіну. Після обстеження дитини фельдшер поставив попередній діагноз: ревматизм. Які із великих критеріїв ревматизму підтверджують діагноз?

- a. Поліартрит, кардит, хорея**
- b. Анемія, збільшення швидкості осідання еритроцитів, підвищення артеріального тиску
- c. Зміни ЕКГ, анемія, гіпертермія
- d. Анемія, лейкопенія, артралгія
- e. Гіпертермія, анемія, артралгія

1028. Діагностика перфоративної виразки шлунку базується на головних ознаках (тріада Мондора):

- a. "Кинджальний" біль, "дошкоподібний" живіт, виразковий анамнез**
- b. Головний біль, запаморочення, загальна слабкість
- c. Зниження артеріального тиску, тахікардія, втрата свідомості
- d. Кровотеча, зіяння країв рани, порушення функції
- e. Нудота, блювання, затримка стулу

1029. Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, головокружіння, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: лице бліде, пульс - 90/хв., частота дихання - 16/хв., артеріальний тиск - 130/80 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. Синдром здавлення головного мозку
- b. Забій головного мозку
- c. Струс головного мозку**
- d. Перелом основи черепа
- e. Перелом склепіння черепа

1030. Ви фельдшер ФАПу. До Вас звернулась пацієнтка, якій було проведено струмектомію. У неї виявлені проблеми: в'ялість, загальна слабкість, зниження працездатності, зниження пам'яті, мерзлякуватість, сонливість вдень, шкіра суха, лущиться, не береться в складку, сухість, ламкість, випадіння волосся. Про яке захворювання можна подумати?

- a. Цукровий діабет
- b. Гіпертироз
- c. Гіпотиреоз**
- d. Атеросклероз
- e. Акромегалія

1031. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. Артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., пульс - 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- a. Механічна кишкова непрохідність
- b. Перелом основи черепа
- c. Тромбоз мезентеріальних судин

d. Перитоніт

- e. Інфаркт міокарда

1032. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

- a. Синусова тахікардія
- b. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- c. Синусова аритмія

d. Миготлива аритмія

- e. Екстрасистолічна аритмія

1033. До фельдшера звернувся чоловік 45ти років, зі скаргами на ожиріння обличчя, тулуба, стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевої функції. На рентгенограмі черепа - турецького сідла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

- a. Гіпофізарний нанізм

b. Хвороба Іценко-Кушинга

- c. Нецукровий діабет
- d. Акромегалія
- e. Хвороба Аддісона

1034. До фельдшера звернувся хворий 20-ти років зі скаргами на пігментацію шкіри, яка виникла недавно (золотистокоричневого кольору), потемнішання волосся, відсутність апетиту, нудоту, діарею, біль у животі, схуднення. Дихання везикулярне, артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., пульс - 60/хв. Аускультативно: тони серця ослаблені. Живіт при пальпації болісний в епігастрії. Ніктурія. Зниження функції статевих залоз. Яке захворювання виникло у пацієнта?

- a. Хвороба Іценко-Кушинга
- b. Панкреатит
- c. Ожиріння

d. Хвороба Аддісона

- e. Подагра

1035. Дитина народилась від ВІЛінфікованої матері з оцінкою за шкалою Апгар - 8 балів, масою тіла - 3200 г, довжиною - 50 см. Загальний стан задовільний. Антиретровірусна терапія не проводилась. Через який час можна визначити методом ІФА наявність ВІЛ-інфекції у дитини?

- a. Через 12 місяців
- b. У перші 6 місяців
- c. У 2 роки

d. Через 18 місяців

- e. У перші дні після народження

1036. Ви фельдшер ФАПУ. У доношеної клінічно здорової дитини на третю добу після народження виникла блювота із домішками крові, мелена. Який препарат потрібно було ввести для профілактики геморагічної хвороби новонароджених на другу добу життя?

- a. Вітамін D
- b. Амінокапронову кислоту
- c. Препарати заліза

d. Вітамін К

e. Етамзилат

1037. Ви фельдшер ФАП. Виклик до дитини 4-х років. Скарги на розлад сну, втрату апетиту, блювання, болі в кінцівках. Об'єктивно: дитина млява, голова мокра від поту, гіперестезія шкіри. При спробі посадити дитину в ліжку - дитина плаче, скаржиться на біль в спині, заводять руки за спину та спирається на них ("симптом триніжка"). Профілактичні щеплення не проводились. Встановіть попередній діагноз:

a. Менінгококова інфекція

b. Грип

c. Поліомієліт

d. Гемофільна інфекція

e. Нейротоксикоз

1038. Пацієнтка 25-ти років звернулася із скаргами на часте, болісне сечовипускання малими порціями, болі в надлобковій ділянці, субфебрильну температуру тіла, порушення сну, які з'явилися після переохолодження. Який ймовірний діагноз поставите?

a. -

b. Гострий цистит

c. Сечокам'яна хвороба

d. Гострий гломерулонефрит

e. Гострий апендицит

1039. Хворий 72-х років скаржиться на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, появу набряків на ногах, тяжкість у правому підребер'ї. Хворіє на гіпертонічну хворобу. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку такого стану?

a. Хронічний гепатит

b. Хронічна серцева недостатність

c. Бронхіальна астма

d. Анемія

e. Набута вада серця

1040. Хворий скаржиться фельдшеру ФАП на оперізуючий біль в надчеревній ділянці, в лівому та правому підребер'ях, нудоту, метеоризм, бурчання в животі, рідкі випорожнення, які мають кашкоподібний вигляд, жирні, блискучі. Симптоми спостерігаються протягом року. Який попередній діагноз?

a. Хронічний гепатит

b. Хронічний холецистит

c. Цироз печінки

d. Хронічний гастрит

e. Хронічний панкреатит

1041. Хвора 35-ти років звернулася до фельдшера ФАП зі скаргами на загальну слабкість, різкий біль у великих суглобах, підвищення температури тіла до 38,2°C, пітливість. З анамнезу відомо, що два тижні тому хвора перенесла стрептококовий фарингіт. Об'єктивно: блідість шкіри, артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Гомілкові-ступневі та колінні суглоби гарячі на дотик, червоні, набряклі. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Ревматичний ендокардит

b. Ревматична хорея

c. Ревматичний міокардит

d. Ревматичний поліартрит

e. Ревматичний перикардит

1042. На ФАП звернувся хворий 22-х років, на 2-й день захворювання з профузним проносом і блюванням, судомами м'язів нижніх кінцівок. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 35,8°C. Шкіра бліда, акроціаноз. Риси обличчя загостренні, очі та щоки запалі. Голос сиплий. Задишка - 32/хв. Тони серця глухі, пульс - 130/хв., слабого наповнення і напруження, артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт запалий, пальпація безболісна.

Випорожнення водянисті без кольору і запаху. Під час огляду - блювота "фонтаном". Протягом останніх 24 годин виділив 350 мл сечі. Три дні тому приїхав з Криму, де відпочивав з родиною. Члени родини здорові. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз:

- a. Сальмонельоз. Зневоднення III ступеню
- b. Дизентерія
- c. Колі-інфекція
- d. Холера. Зневоднення III ступеню**
- e. Харчова токсикоінфекція. Зневоднення III ступеню

1043. Хворий 28-ми років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°C, загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: $L30 \cdot 109/\text{л}$, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

- a. Мозковий інсульт
- b. Радикуліт
- c. Неврит
- d. Абсцес головного мозку**
- e. Менінгіт

1044. До фельдшера з'явився хворий 45ти років, який скаржиться на наявність висипу на грудній клітці. Об'єктивно: на правій половині грудної клітки в міжреберних проміжках виявляються згруповані міхури з серозним та каламутним вмістом. З анамнезу: впродовж 3-х днів до появи висипу відмічалось підвищення температури, головний біль, невралгічний біль у зоні майбутнього висипу. Встановіть діагноз:

- a. Оперезувальний герпес**
- b. Стафілострептодермія
- c. Себорея
- d. Бешиха
- e. Герпес простий

1045. Фельдшеру здоров'я пункту необхідно провести оцінювання фізичного розвитку учнів. Фельдшер визначив індекс Кетле. Як його розраховувати?

- a. Множення маси тіла на зріст у сантиметрах
- b. Множення зросту на масу тіла
- c. Сума показників зросту та маси тіла
- d. Ділення маси тіла в грамах на зріст у сантиметрах**
- e. Ділення зросту на масу тіла

1046. ?1. "Кинджальний біль", виразковий анамнез, напруження м'язів передньої черевної стінки це:

- a. Тріада Крисчена
- b. Тріада Лаффіте
- c. Тріада Мондора**
- d. Тріада Огюстена
- e. Тріада Кондора

1047. До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці скарги:

- a. Остеохондроз
- b. Подагра
- c. Ревматоїдний артрит
- d. Остеоартроз
- e. Ревматична хвороба**

1048. Одноразові медичні вироби відразу після використання підлягають:

- a. Передстерилізаційній обробці

b. Дезінфекції

- c. Сортунню
- d. Утилізації
- e. Стерилізації

1049. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПу зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

a. Гостра кропив'янка

- b. Алергічний дерматит
- c. Токсикодермія
- d. Синдром Лайєла
- e. Рожевий лишай

1050. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

- a. Лакуарна ангіна
- b. Катаральна ангіна

c. Фолікулярна ангіна

- d. Дифтерія глотки
- e. Виразково-плівчаста ангіна

1051. До ФАПу машиною швидкої допомоги терміново доставили пацієнта 20-ти років, у якого блювотні маси мають вигляд "кавової гущі". Вкажіть, про що це свідчить:

- a. Стеноз ворота шлунка
- b. Легенева кровотеча

c. Шлункова кровотеча

- d. Анорексія
- e. Кровотеча з розширених вен стравоходу

1052. Фельдшер ФАПу оглядає дитину 8-ми років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, дрібноточковий висип на гіперемованій шкірі, підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно: у зіві яскрава гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідість носо-губного трикутника, язик обкладений білим нальотом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Кір

b. Скарлатина

- c. Краснуха
- d. Атопічний дерматит
- e. Вітряна віспа

1053. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- a. Медикаментозне лікування

b. Диспансерний нагляд

- c. Санаторно-курортне лікування
- d. Оперативне лікування
- e. Фізіотерапевтичні методи лікування

1054. До фельдшера звернувся хлопчик 10-ти років зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного забарвлення. Комірка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна запідозрити?

- a. Гемофілія

б. Геморагічний васкуліт

с. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

д. Гострий лейкоз

е. Гемолітична анемія

1055. Хвора 36-ти років звернулася зі скаргами на загальну слабкість, швидку стомлюваність, сухість шкіри, набряки обличчя, закрепи. Місяць тому перенесла струментоміоз приводу тиреотоксикозу. Шкіра бліда, суха. Рс- 58/хв., слабого наповнення, АТ- 90/55 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м'який, безболісний під час пальпації. Діурез 1,2 л за добу. Виберіть препарат для патогенетичного лікування хворої:

а. Йодид калію

б. Гіпотіазид

с. L-тироксин

д. Мерказоліл

е. Ловастатин

1056. Дитина 3-х місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулася до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, за місяць набрала в масі 400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

а. Перегодовування

б. Просту диспепсію

с. Парентеральну диспепсію

д. Недогодовування

е. Кишковий токсикоз

1057. Хвора 23-х років звернулася на прийом до жіночої консультації зі скаргами на виділення з піхви з неприємним запахом, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. В ході гінекологічного огляду: слизова оболонка піхви гіперемована, на дотик кровоточить, виділення біло-зелені, пінисті, значні. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Хламідіоз

б. Сифіліс

с. Кандидоз

д. Трихомоніаз

е. Гонорея

1058. Фельдшер під час дезінфекції шприців та голок випадково направив струмінь дезрозчину собі в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

а. Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря

б. Промити очі перевареною водою

с. Накласти на очну щілину асептичну пов'язку

д. Промити очі струменем проточної води

е. Промити очі 3% розчином перексиду водню

1059. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультатії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

а. Сироваткова хвороба

б. Набута вада серця

с. Вогнищева пневмонія

д. Гломерулонефрит

е. Міокардит

1060. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. При проведенні проби Манту у дитини 5-ти років виявлена папула 7 мм. Як оцінюється проба Манту?

а. Сумнівна проба Манту

б. Віраж туберкулінової проби

с. Негативна проба Манту

д. Гіперергічна проба Манту

е. Позитивна проба Манту

1061. Дівчина 14-ти років скаржиться на болі у животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: жовтушність шкірних покривів, збільшення печінки, ахолічні випорожнення, сеча кольору "пива". Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий гастрит
- b. Гострий холецистит

с. Вірусний гепатит

- d. Інфекційний моноклеоз
- e. Жовчнокам'яна хвороба

1062. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 26-ти років, зі скаргами на кашель з виділенням незначної кількості "іржавого" мокротиння, біль в грудній клітці справа під лопаткою, який посилюється на вдиху та при кашлі, різку слабкість. Захворів два дні тому після переохолодження. Об'єктивно: $t_{\text{о}} -39^{\circ}\text{C}$, стан тяжкий, шкірні покриви бліді, рум'янець на щоках, дихання поверхневе, задишка. У легенях - при перкусії притуплено - тимпанічний звук, при аускультії крепітація на висоті вдиху. $\text{Ps} 100/\text{хв.}$, ЧД- 30/хв. Який найбільш ймовірний діагноз?

- a. Ексудативний плеврит

b. Негоспітальна пневмонія

- c. Інфаркт легені
- d. Гострий бронхіт
- e. Сухий плеврит

1063. Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

- a. Артеріальна гіпертензія
- b. Відсутність блювання

с. Виділення пінистої крові яскравочервоного кольору при кашлі

- d. Блювання "кавовою гущею"
- e. Кров, що виділяється, має темне забарвлення

1064. Вагітна звернулась на ФАП до фельдшера зі скаргами на головну біль, нудоту, 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, АТ- 180/110 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 175/105 мм рт.ст. $\text{Ps}- 88/\text{хв.}$ Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв. Яке виникло ймовірне ускладнення?

- a. Набряки під час вагітності
- b. Прееклампсія легкий ступінь

с. Прееклампсія тяжкий ступінь

- d. Гіпертонічний криз
- e. Ранній гестоз вагітних

1065. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гіпотрофія
- b. Анемія

с. Алергічний діатез

- d. Рахіт
- e. Пітниця

1066. Хворий 38-ми років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині груднини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС- 82/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

a. ІХС. Стенокардія, що вперше виникла

- b. ІХС. Стабільна стенокардія напруження III ФК
- c. Нейроциркуляторна дистонія
- d. ІХС. Стабільна стенокардія напруження IV ФК

е. ІХС. Гострий інфаркт міокарда

1067. Після автомобільної аварії потерпілий скаржиться на біль у грудній клітці, неможливість глибокого вдиху, задишку. Об'єктивно: обличчя бліде, в лівій половині грудної клітки рана, з якої при видиху виділяється піниста кров. Вкажіть попередній діагноз:

- а. Поранення серця
- б. Відкритий перелом ребер
- с. Пневмоторакс**
- д. Поранення м'яких тканин
- е. Поранення легені

1068. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на нападоподібний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку, нудоту, блювання, гіркий присмак у роті. Пацієнт неспокійний, живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для невідкладної допомоги фельдшер приготує:

- а. Ренальган**
- б. Маалокс
- с. Кордіамін
- д. Альмагель
- е. Холензим

1069. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 65-ти років, який скаржиться на кашель, наявність прожилків крові в мокротинні, задишку, загальну слабкість, швидку втомлюваність, поганий апетит. Ці симптоми з'явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу: курить з 20-ти років, за останні 6 місяців схуд на 10 кг. Який діагноз передбачить фельдшер?

- а. Абсцес легень
- б. Хронічний гастрит
- с. Рак легень**
- д. Гангрена легень
- е. Емпієма плеври

1070. Пацієнт 25-ти років із діагнозом грип перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- а. Вогнищева поточна**
- б. Профілактична
- с. Комбінована
- д. Механічна
- е. Вогнищева заключна

1071. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

- а. На правому боці
- б. На лівому боці
- с. На животі**
- д. На спині
- е. Сидячи

1072. Пацієнтка 29-ти років надійшла до гінекологічного відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Скарги на переймоподібний біль у правій клубовій ділянці. Затримка менструації 5 тижнів. Загальний стан середньої важкості, Рс- 90/хв., АТ- 105/60 мм рт.ст. Пальпаторно: живіт болючий в нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга невиявлений. Бімануально: збільшені та болючі додатки справа. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

- а. Зондування порожнини матки
- б. Гістеросальпінгографія
- с. Біопсія ендометрію
- д. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння**

е. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

1073. Ви прийшли на патронаж до дитини 1 місяць. Оцініть поствакцинальні зміни на місці введення вакцини БЦЖ:

- а. Лімфаденіт
- б. Везикула
- с. Кірочка
- д. Рубець

е. Інфільтрат

1074. До фельдшеру ФАПУ звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилася виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- б. Злоякісне новоутворення молочної залози**
- с. Первинний сифіліс
- д. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- е. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт

1075. Які головні реанімаційні заходи проводять при клінічній смерті?

- а. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- б. Закритий масаж серця, штучна вентиляція легень**
- с. Штучна вентиляція легень
- д. Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання
- е. Переведення на апаратне дихання

1076. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом ЩоткінаБлюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Перекрути ніжки кісти яєчника
- б. Гострий апендицит
- с. Фіброміома
- д. Апоплексія яєчника**
- е. Позаматкова вагітність

1077. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

- а. УЗД
- б. Кольпоскопія**
- с. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- д. Зондування порожнини матки
- е. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

1078. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернувся хворий, який годину тому отримав травму правого плечового суглоба. При огляді правий плечовий суглоб деформований, відмічається суглобова западина, рухи в суглобі різко обмежені, болючі, носять пружинячий характер. При пальпації головка плечової кістки знаходиться в пахвовій ямці. Назвіть попередній діагноз:

- а. Розрив м'язів правого плеча
- б. Перелом правої плечової кістки
- с. Вивих правого плеча**
- д. Перелом ключиці
- е. Розрив зв'язок плечового суглоба

1079. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий

лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

- a. Гострий лейкоз
- b. Хронічний мієлолейкоз
- c. Хронічний лімфолейкоз**
- d. Гіпопластична анемія
- e. Лімфогранулематоз

1080. До фельдшера ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- a. До дільничного гінеколога**
- b. До ВПВ
- c. До терапевта
- d. До гінекологічного відділення
- e. На УЗД

1081. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта. При огляді було виявлено відсутність серцевої та дихальної діяльності, звуження зіниць у вигляді "котячого ока", трупні плями на спині, охолодження тіла. Ці ознаки характерні для:

- a. Агонального стану
- b. Біологічної смерті**
- c. Коми
- d. Клінічної смерті
- e. Непритомності

1082. У чоловіка раптово розвинувся напад гострого абдомінального болю з іррадіацією у ліву поперекову і пахову ділянки, що супроводжуються нудотою, пітливістю частим сечовипусканням. Хворий неспокійний, метушиться у ліжку. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Ретроперитонеальний крововилив
- b. Герпес Зостера
- c. Дивертикул сигмоподібної кишки
- d. Перекрут лівого яєчка
- e. Лівобічна ниркова колька**

1083. До хворого з підозрою на інфаркт міокарда викликана ШМД. Була надана допомога - нітрогліцерин під язик, в/в анальгін з димедролом. В машині ШМД знову з'явився виражений біль. Який з препаратів доцільно ввести хворому?

- a. Баралгін
- b. Но-шпу
- c. Морфіну гідрохлорид**
- d. Папаверину гідрохлорид
- e. Спазмалгон

1084. Дитина 5-ти місяців після введення вакцини АКДП зблідла, вкрилася холодним потом, знепритомніла. Про яке ускладнення йдеться?

- a. Анафілактичний шок**
- b. Епісиндром
- c. Непритомність
- d. Еклампсія
- e. Ларингоспазм

1085. На ФАП звернулася жінка 42-х років, котра 2 хвилини тому отримала травму розбитим склом під час прибирання в шафі. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча рана 4x0,9 см з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:

- a. Стискаюча пов'язка
- b. Підвищене положення кінцівки**

с. Накладання джгута

- d. Максимальне згинання в суглобі
- e. Тампонада рани

1086. У дитини 5-ти років важкий стан. При огляді зіву збільшення та гіперемія мигдаликів, на яких виявлено щільний фібринозний сірувато-білий наліт, при знятті його спостерігається кровоточивість слизової оболонки. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Фолікулярна ангіна
- b. Дифтерія мигдаликів**
- c. Скарлатина
- d. Катаральна ангіна
- e. Лакунарна ангіна

1087. Визначте дату пологів, якщо дата останньої менструації 5 жовтня:

- a. 7 червня
- b. 15 серпня
- c. 17 червня
- d. 12 липня**
- e. 1 травня

1088. Ви фельдшер ШМД. Виклик до хворого зі скаргами на гострий біль в правому підребер'ї, який виник після прийому смаженої їжі, іррадіація болю під праву лопатку, у праве плече, гіркоту в роті, блювання жовчу. Хворий збуджений. Ваш попередній діагноз:

- a. Виразкова хвороба шлунка
- b. Печінкова коліка**
- c. Цироз печінки
- d. Хронічний гастрит
- e. Хронічний панкреатит

1089. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- a. Хвилеподібна
- b. Інтермітуюча
- c. Неправильна
- d. Ремітуюча
- e. Гектична**

1090. Потерпіла лежить на спині, бліда, байдужа до присутніх, на питання не відповідає. Шкіра покрита холодним липким потом, пульс - 130/хв., слабкого наповнення і напруження, ниткоподібний, АТ- 85/50 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність серця ритмічна. На внутрішній поверхні лівого стегна різана рана розміром 10х15 см, із якої поштовхами витікає кров яскраво червоного кольору. Який вид кровотечі у потерпілого?

- a. Артеріальна**
- b. Паренхіматозна
- c. Ювенільна
- d. Капілярна
- e. Венозна

1091. У дитини 5-ти років температура тіла - 38,2°C, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болючий при пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який попередній діагноз?

- a. Ешерихіоз
- b. Стафілококовий ентероколіт
- c. Сальмонельоз
- d. Колі-ентерит
- e. Дизентерія**

1092. Хворий 20-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль в ділянці лівої ключиці, який з'явився після падіння на витягнуту руку. Діагностовано закритий перелом лівої ключиці без зміщення. Вкажіть найбільш оптимальний метод транспортної іммобілізації:

- a. Спіралеподібна пов'язка
- b. Восьмиподібна пов'язка
- c. Зворотня пов'язка
- d. Колосоподібна пов'язка

e. Пов'язка Дезо

1093. Перелом якої з наданих кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

a. Плечової

- b. Променевої
- c. П'яткової
- d. Надколінка
- e. Великогомількової

1094. У першороділлі 24-х років з початку регулярних перейм минуло 4 години. АТ120/80 мм рт.ст. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття плода - 140/хв. Піхове дослідження: шийка матки вкорочена до 1,5 см, відкриття 3 см. Плідний міхур цілий, напружений. Голівка плода притиснута до входу у малий таз. Назвіть період пологів:

a. I період пологів

- b. Прелімінарний період
- c. Початок II періоду пологів
- d. III період пологів
- e. Передвісники пологів

1095. Хворому 36-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової приналежності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалася в краплях із сироватками 0(I) і B(III) і не спостерігалася - з сироваткою A(II). Еритроцитарну масу якої групи потрібно перелити пацієнтові?

a. A(II)

- b. 0(I)
- c. —
- d. B(III)
- e. AB(IV)

1096. У пацієнта 33-х років туберкульоз легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Які дії фельдшера?

a. Покласти міхур із льодом на грудну клітку

- b. Поставити банки
- c. Поставити гірчичники на грудну клітку
- d. Дати зволожений кисень
- e. Зробити масаж грудної клітки

1097. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

a. Стерильна вазелінова олія

- b. Антисептичний розчин
- c. Розчин фурациліну
- d. Вазелін
- e. Гліцерин

1098. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилася нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125/хв., АТ - 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

а. Печінкова кома

б. Кетоацидотична кома

с. Гіперлактацидемічна кома

д. Гіперосмолярна кома

е. Уремична кома

1099. До фельдшера ФАПУ звернулася хвора, яка годує дитину груддю із скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5°C, біль в правій молочній залозі. При огляді - залоза збільшена, при пальпації болючість. Який попередній діагноз?

а. Гострий мастит

б. Мастопатія

с. Гіпермастія

д. Фібroadенома правої молочної залози

е. Фурункул правої молочної залози

1100. На ФАПі вагітна в терміні 36 тижнів поскаржилася на різкий головний біль, погіршення зору, біль у ділянці черевного сплетіння. Об'єктивно: артеріальний тиск - 170/110 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Який препарат Ви оберете для надання невідкладної допомоги вагітній?

а. 2 мл 50% анальгіну

б. 40 мг лазиксу

с. 2 мл 1% промедолу

д. 16 мл 25% магніюсульфат

е. 150 мг кокарбоксилази

1101. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру тіла - 37,6°C, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі - кіста яєчника. Бімануально: матка звичайних розмірів, щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, малорухоме. Який найбільш вірогідний діагноз?

а. Апоплексія яєчника

б. Порушена позаматкова вагітність

с. Перекрут ніжки кісти яєчника

д. Гострий аднексит

е. Розрив капсули кісти яєчника

1102. За викликом прибув фельдшер ШМД до хворого 62-х років, який скаржиться на стискаючий сильний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Хворий прийняв нітрогліцерин, але біль не вщухає вже 2 години. ЧДР- 20/хв., пульс - 85/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Температура тіла - 37°C. Тони серця приглушені. Вкажіть ймовірний діагноз:

а. Набряк легень

б. Стабільна стенокардія напруження

с. Кардіогенний шок

д. Стенокардія спокою

е. Гострий інфаркт міокарда

1103. Під час будівельних робіт на нижні кінцівки працівника впала бетонна плита. Після звільнення кінцівок з'явилися різкий набряк, біль, обмеження рухів та чутливості. Встановлено діагноз: симптом тривалого стискання. Функція яких органів страждає першочергово при даному синдромі?

а. Печінка

б. Легені

с. Головний мозок

д. Нирки

е. Серце

1104. Хвора бліда, АТ- 95/60 мм рт.ст., частота пульсу - 100/хв. Який із нижче перерахованих попередніх діагнозів можна встановити жінці зі скаргами на короткочасну втрату свідомості

після раптового гострого болювнизу живота, затримку місячних на 5 тижнів?

- a. Рак матки
- b. Загроза раннього викидня
- c. Позаматкова вагітність**
- d. Запальний процес додатків матки
- e. Виразка шлунка

1105. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, поприлість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

- a. Нейродерміт
- b. Екзема**
- c. Атопічний дерматит
- d. Кропив'янка
- e. Токсикодермія

1106. Фельдшер швидкої медичної допомоги приїхав на виклик до хворого 50-ти років, який скаржиться на ядуху, що триває близько 2-х годин. Об'єктивно: вимушене положення, хворий сидить нахилившись вниз і спираючись ліктями на край ліжка. Дихання - 34/хв. Чутні дистанційні сухі хрипи. Пульс - 84/хв.; АТ- 130/80 мм рт.ст. Інгаляції астмопентом, в/в введення еуфіліну ефекту не дали. Доцільно застосувати препарат:

- a. Преднізолон**
- b. Сальбутамол
- c. Атропін
- d. Лазолван
- e. Папаверин

1107. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом "виразкова хвороба шлунка". Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

- a. Гіповолемічний шок**
- b. Анафілактичний шок
- c. Гостре отруєння
- d. Перфорація виразки шлунка
- e. Кардіогенний шок

1108. В якій дозі вводять преднізолон у разі інфекційно-токсичного шоку II-го ступеня у дитини з менінгококцемією?

- a. 2-3 мг/кг
- b. 0,5-1 мг/кг
- c. 30 мг
- d. 10 мг/кг**
- e. 3-5 мг/кг

1109. Чому НЕ ДОЦІЛЬНО закапувати в очі більш 1-2 крапель лікарських розчинів?

- a. Велика кількість препарату шкідливо впливає на зір
- b. У кон'юнктивальній порожнині не утримується більш 1 краплі розчину**
- c. Велика кількість рідини шкодить кон'юктиві
- d. Очні краплі містять сильнодіючі речовини
- e. Велика кількість крапель може викликати алергію

1110. Пацієнт, що звернувся до фельдшера ФАПу скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. Об'єктивно: "судинні" зірочки на грудях, печінкові долоні, "голова медузи" на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан ймовірний у пацієнта?

а. Рак шлунка

б. Цироз печінки

с. Виразкова хвороба шлунка

д. Хронічний гастрит

е. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки

1111. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 28-ми років, у якої 3 дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помиїв, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: шкіра бліда. Набряки на обличчі. Пульс - 82/хв, ритмічний, напружений. АТ- 175/125 мм рт.ст., добова кількість сечі - 350 мл. Найімовірніший попередній діагноз:

а. Хронічний пієлонефрит

б. Гострий пієлонефрит

с. Гострий гломерулонефрит

д. Хронічний гломерулонефрит

е. Гіпертонічна хвороба

1112. Вкажіть, за допомогою якого реактиву фельдшер здійснює контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет виявлення залишків миючого засобу:

а. Бензидиновий

б. Фекел-2

с. Судан-3

д. Азопірамовий

е. Фенолфталеїновий

1113. Дівчина 15-ти років звернулася до фельдшера зі скаргами на біль по всьому животі, який з'явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 38°C. Живіт болісний при пальпації у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом ЩоткінаБлюмберга. Які дії слід виконати в першу чергу?

а. Терміново госпіталізувати

б. Викликати маму

с. Промити шлунок

д. Відпустити додому

е. Спостерігати

1114. До Вас звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зіняння шкіри з незначною кровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

а. Закритий перелом

б. Розтягнення зв'язок

с. Розрив зв'язок

д. Відкритий перелом

е. Вивих

1115. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез за центральним типом та гемігіперестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

а. Геморагічний інсульт

б. Епідуральна гематома

с. Пухлина мозку

д. Ішемічний інсульт

е. Транзиторна ішемічна атака

1116. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

- а. Бактеріологічне дослідження випорожнень
- б. Фіброгастродуоденоскопія
- в. Копрологічне дослідження випорожнень
- г. Дуоденальне зондування

е. Зіскоб з періанальних складок

1117. Чоловік 23-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на загальну слабкість, нездужання, головний біль. Підвищення температури тіла до 37,5°C, сухий кашель. Хворіє другий день. Об'єктивно: температура тіла - 37,2°C. Загальний стан задовільний. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Перкуторний звук над легеньми ясний. Дихання жорстке, розсіяні сухі свистячі хрипи. ЧДД- 16/хв. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС- 72/хв. АТ120/80 мм рт.ст. Ваш діагноз:

- а. Бронхіальна астма
- б. ХОЗЛ

в. Гострий бронхіт

- г. Вогнищева пневмонія
- е. Ексудативний плеврит

1118. Хворий 36-ти років, звернувся до фельдшера зі скаргами на гострі болі в животі, які виникають через 30 хвилин після прийому їжі. Апетит збережений, але через появу болю після їжі хворий обмежує її прийом. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану відмічає в осінньо-весняний період. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Легені та серце без патології. Язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота відмічається болючість в епігастральній ділянці. Ваш діагноз:

- а. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- б. Хронічний панкреатит
- в. Хронічний ентерит

г. Виразкова хвороба шлунка

- е. Хронічний холецистит

1119. Після народження плода у роділлі через 10 хвилин з'явилися незначні кров'янисті виділення. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

- а. Ознака Штрассмана

б. Ознака Шредера

- в. Ознака Альфельда
- г. Ознака Кюстнера-Чукалова
- е. Ознака Клейна

1120. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані, відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

а. Дихання Куссмауля

- б. Брадипное
- в. Дихання Чейна-Стокса
- г. Дихання Біота
- е. Трахіпное

1121. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психопатологічний синдром:

- а. Корсакова

b. Невротичний

c. Астенічний

d. Кандинського-Клерамбо

e. Маніакальний

1122. Вагітна 25-ти років поступила в пологовий будинок у терміні 40 тижнів вагітності. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ- 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плода повздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода приглушене - 160/хв. Перейми, які почались 6 годин тому, болючі. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пологах:

a. Повний розрив матки

b. Кінець I періоду пологів

c. Емболія навколоплідними водами

d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

e. Загроза розриву матки

1123. Ви фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся хворий із скаргами на оперізуючі болі в животі, нудоту, блювання. Зі слів хворого зловживає алкоголем та жирною їжею. При пальпації живіт болючий, особливо посередині живота на 6-7 см вище пупка та в лівих відділах живота. Позитивний симптом Мейо-Робсона. Вкажіть, яке захворювання можна запідозрити у хворого:

a. Гострий апендицит

b. Гострий холецистит

c. Гострий панкреатит

d. Кишкова непрохідність

e. Защемлена кила

1124. До фельдшера ФАПУ звернулась пацієнтка 32-х років зі скаргами на задишку з утрудненим видихом. При огляді грудна клітка в положенні максимального вдиху, при перкусії визначається коробковий звук, аускультативно - дихання послаблене, розсіяні свистячі хрипи. Поставте попередній діагноз:

a. Бронхіальна астма

b. Емфізема легень

c. Гострий бронхіт

d. Серцева астма

e. Пневмонія

1125. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернувся працівник зі скаргами на болі в епігастральній ділянці і правому підребер'ї. При обстеженні виявлені позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі. Вкажіть, про яке захворювання можна думати:

a. Виразкова хвороба шлунка

b. Холецистит

c. Пієлонефрит

d. Панкреатит

e. Гастрит

1126. Назвіть протипоказання до проведення промивання шлунка:

a. Отруєння ліками

b. Харчова токсикоінфекція

c. Алкогольна інтоксикація

d. Шлунково-кишкова кровотеча

e. Отруєння концентрованими кислотами

1127. Бригада ШМД прибула у навчальний заклад. Студент зі страхом в очах тримався за шию. Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, утруднене. Запідозрено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?

a. Ввести спазмолітики

b. Застосувати прийоми Геймліха

c. Вставити товсту голку в трахею

- d. Ввести знеболюючі
- e. Провести трахеостомію

1128. Хвора 25-ти років, госпіталізована зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, було одноразове блювання. Температура тіла - 37,5°C. При пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, Ровзінга, Сітковського, Воскресенського. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:

- a. Гострий правобічний аднексит
- b. Гостру кишкову непрохідність
- c. Гострий апендицит**
- d. Правобічний приступ ниркової коліки
- e. Гострий холецистит

1129. Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: обличчя бліде, Рс- 90/хв., ЧДР16/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний характер ушкоджень?

- a. Забій головного мозку
- b. Перелом склепіння черепа
- c. Струс головного мозку**
- d. Стиснення головного мозку
- e. Перелом основи черепа

1130. Фельдшер оглядає дитину 6-ти років, в якій підвищилась температура тіла до 39,5°C, з'явився висип на шкірі обличчя, волосистій частині голови, тулубі, кінцівках у вигляді папул, пухирців із гнійним вмістом. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- a. Стрептодермія
- b. Вітряна віспа пустульозна форма**
- c. Ексфоліативний дерматит Ріттера
- d. Строфулюс
- e. Натуральна віспа

1131. У новонародженої дитини спостерігається пухлина в ділянці кісток черепа. Пухлина не виходить за межі шва. Різко відмежована від нормальної кістки ущільненим і трохи піднятим над її рівнем валиком. Яку пологову травму можна припустити?

- a. Гіпоксично-травматична енцефалопатія
- b. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія
- c. Пологова пухлина
- d. Внутрішньочерепна пологова травма
- e. Кефалогематома**

1132. Ви проводите перший етап оральної регідrataції дитині 2-х років з діареєю та зневодненням І-го ступеня. Яким розчином і в якій кількості порекомендуєте матері це робити?

- a. Гемодез 30 мл/кг
- b. Реополіглюкін 50 мл/кг
- c. Сік 100 мл після кожної дефекації
- d. Солодкі газовані напої 100 мл/кг
- e. Регідрон 50 мл/кг**

1133. Виклик фельдшера ШМД до хворого. Стан середньої тяжкості. Скарги на сильний головний біль у потиличній ділянці, шум у вухах, нудоту, біль у ділянці серця. Об'єктивно: АТ- 220/110 мм рт.ст., пульс 82/хв. Попередній діагноз:

- a. Інфаркт міокарда
- b. Стенокардія напруження
- c. Гостра лівошлуночкова недостатність
- d. Гіпертонічний криз**
- e. Стеноз мітрального отвору

1134. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту, біль в епігастральній ділянці живота оперізувального характеру, проноси, здуття живота. Об'єктивно: дефіцит ваги 10 кг, при пальпації болючість в епігастральній ділянці живота та лівому підребер'ї. Який попередній діагноз фельдшера?

- a. Хронічний гастрит
- b. Хронічний ентерит
- c. Хронічний коліт
- d. Хронічний панкреатит**
- e. Хронічний гепатит

1135. Хворому, який знаходиться на "Д" обліку з приводу гіпертонічної хвороби, призначені препарати з групи інгібіторів АПФ та діуретиків. Вкажіть цюпару препаратів:

- a. Атенолол, корвалол
- b. Енап, кордарон
- c. Коринфар, фуросемід
- d. Каптоприл, фуросемід**
- e. Ніфедипін, нітрогліцерин

1136. До фельдшера ФАП звернулась вагітна зі скаргами на болісні незначні кров'яністі виділення які з'явилися вночі. Тактика фельдшера:

- a. Ввести но-шпу
- b. Провести піхвове дослідження
- c. Оглянути шийку в дзеркалах
- d. Мобілізувати вену, негайно госпіталізувати**
- e. Ввести окситоцин

1137. У 12-річного хлопчика, хворого на гемофілію, температура - 39,5°C. Який з жарознижувальних препаратів ПРОТИПОКАЗАНИЙ?

- a. Но-шпа
- b. Ацетилсаліцилова кислота**
- c. Парацетамол
- d. Анальгін
- e. Піпільфен

1138. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

- a. Анальгін
- b. Лідокаїн**
- c. Еуфілін
- d. Верапаміл
- e. Атропін

1139. Яка ознака відрізняє еклампсію від інших видів пізнього гестозу?

- a. Судоми**
- b. Набряки
- c. Блювання
- d. Прибавка у вазі
- e. Головний біль

1140. Виклик фельдшера до дитини 8-ми років. Скарги на нудоту, блювання, біль в епігастральній ділянці. Блювотні маси містять частково перетравлену їжу. Дані симптоми з'явилися через 2 години після вживання великої кількості м'ясного салату з майонезом. Які першочергові дії фельдшера?

- a. Залишити хворого дома
- b. Назначити дієту і залишити дома
- c. Обмежити їжу і пиття
- d. Промити шлунок і госпіталізувати**

е. Дати протиблювотні ліки

1141. Під час чергового огляду у лікаря жіночої консультації у вагітної в терміні 33 тижні виникли судоми з короткочасною втратою свідомості. АТ- 170/100 мм рт.ст. Генералізовані набряки. В сечі: білок - 3 г/л, гіалінові циліндри. Встановіть ймовірний діагноз:

- а. Артеріальна гіпертензія вагітних
- б. Епілепсія
- с. Еклампсія**
- д. Судомний синдром
- е. Прееклампсія

1142. Фельдшера ФАПУ викликали до хлопчика 5-років з нападом судом. Який препарат слід ввести дитині?

- а. Р-н димедролу 0,1%
- б. Р-н лазиксу 0,1%
- с. Р-н еуфіліну 2,4%
- д. Р-н відехолу 0,125%
- е. Р-н сибазону 0,5%**

1143. У новонародженої дитини на 2-й день життя з'явилась помірна жовтяниця шкіри та склер. Загальний стан задовільний, сон і апетит не порушені. З анамнезу: дитина від II вагітності, у матері - A(II), Rh(+), у дитини A(II), Rh(+). Який стан виник у новонародженого?

- а. Сепсис
- б. Гепатит
- с. Гемолітична хвороба
- д. Пологова травма
- е. Фізіологічна жовтяниця**

1144. Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потиличні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

- а. Вітряна віспа
- б. Краснуха**
- с. Скарлатина
- д. Кір
- е. Менінгококцемія

1145. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців, мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6°C, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- а. Дизентерія
- б. Колі-інфекція
- с. Ротавірусна інфекція
- д. Гострий розлад травлення функціонального походження**
- е. Сальмонельоз

1146. До фельдшера ФАПУ, звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

- а. Мастопатія
- б. Передменструальний синдром
- с. Алюгодисменорея**
- д. Посткастраційний синдром
- е. Вірильний синдром

1147. У пацієнтки спостерігається порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і

дуже тривалий. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

a. Дихання Куссмауля

b. Експіраторна задишка

c. Дихання Біота

d. Стридорозне дихання

e. Інспіраторна задишка

1148. Який препарат вводять із метоюранньої діагностики туберкульозу?

a. Стрептоміцин

b. Туберкулін

c. Фтивазид

d. БЦЖ

e. Рифампіцин

1149. В місті виник спалах кишкової інфекції. Скарги пацієнтів на часті випорожнення без болю, без тенезмів. Багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, язик обкладений. Живіт не болючий. Випорожнення у вигляді рисового відвару 10-15 разів на добу. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Черевний тиф

b. Сальмонельоз

c. Ботулізм

d. Холера

e. Шигельоз

1150. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

a. Цефазолін, манітол, еуфілін

b. Ефедрин, алупент, атропін

c. Кордіамін, супрастин, анальгін

d. Строфантин, адреналін, тавегіл

e. Седуксен, димедрол, аміназин

1151. Після обстеження пацієнтки 25-ти років виявлено: скарги на відсутність менструації; пігментацію шкіри на обличчі та білої лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

a. Вагітність позаматкова

b. Ендометріоз матки

c. Ендометрит

d. Вагітність маткова

e. Пухлина матки

1152. При обстеженні породіллі виявлено: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

a. Лактостаз

b. Мастит

c. Лактопоез

d. Лактогенез

e. Гіпогалактія

1153. На виробництві чоловік отримав удар електрострумом кілька хвилин тому. Без свідомості, обличчя бліде, зіниці розширені, пульс на сонній артерії не визначається. Які Ваші першочергові дії?

a. негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

b. Вкрити постраждалого ковдрою

c. Чекати приїзду карети ШМД

- d. Підняти ноги та опустити голову
- e. Приготувати все необхідне для дефібриляції

1154. Після визначення груп крові, резусфактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби ці результати заносять до:

- a. Протоколу переливання крові
- b. Температурного листка
- c. Амбулаторної картки
- d. Листка лікарняних призначень
- e. Листа інтенсивного нагляду

1155. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців зі скаргами на асиметрію шкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання припустить фельдшер?

- a. Природжений вивих стегна
- b. Застарілий вивих стегна
- c. Патологічний вивих стегна
- d. Звичний вивих стегна
- e. Травматичний вивих стегна

1156. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у ділянці лоба, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- a. Гострий етмоїдит
- b. Гострий гайморит
- c. Гострий сфеноїдит
- d. Гострий фронтит
- e. Гострий риніт

1157. У дитини віком 1 рік, яка другий день хворіє на ГРЗ, виник гавкаючий кашель, хриплий голос, вночі з'явилася задишка. При огляді фельдшер виявив, що загальний стан середньої тяжкості, дихання шумне, виражені задишка інспіраторного характеру, участь допоміжних м'язів в акті дихання, блідість шкіри, пероральний ціаноз. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Обструктивний бронхіт
- b. Гострий назофарингіт
- c. Сегментарна пневмонія
- d. Стенозуючий ларинготрахеїт
- e. Вогнищева пневмонія

1158. Ви фельдшер здоров'я пункту школи. У учня 6-го класу, який хворіє на цукровий діабет на 5-му уроці розвинулась слабкість, запаморочення, втрата свідомості, дитина стала бліда, вкрилась холодним потом, появився тремор кінцівок. Який стан розвинувся у дитини?

- a. Гіперглікемічна кома
- b. Колапс
- c. Ацетонемічний синдром
- d. Гіпоглікемічна кома
- e. Непритомність

1159. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- a. Баралгін
- b. Дицинон
- c. Нітрогліцерин
- d. Алохол

е. Вікасол

1160. До фельдшера ФАПу із поля, яке оброблене фосфорорганічними отрутохімікатами, доставили пацієнта 35-ти років. Свідомість пацієнта потьмарена, спостерігаються слинотеча, нудота, блювання, порушення дихання, брадикардія, звуження зіниць. Який препарат необхідно застосувати як антидот у даному випадку?

- а. Унітіол
- б. Адреналін
- с. Атропін
- д. Прозерин
- е. Пентацин

1161. Фельдшер проводить санітарноосвітню лекцію на підприємстві з питань профілактики онкозахворювань. Що повинен відповісти фельдшер на питання: "Як часто жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз?"

- а. 1 раз на тиждень
- б. 2 рази на тиждень
- с. 2 рази на тиждень
- д. 1 раз на місяць
- е. 1 раз на рік

1162. Дівчину 12-ти років витягнуто з холодної води через 15 хвилин після утоплення без ознак життя. Які першочергові заходи необхідно проводити фельдшеру при наданні долікарської допомоги?

- а. Ввести кордіамін 1,0 в/м
- б. Звільнити дихальні шляхи від води і почати серцево-легеневу реанімацію
- с. Транспортувати дитину в найближчий лікувальний заклад
- д. Не проводити реанімаційних заходів
- е. Розпочати серцево-легеневу реанімацію

1163. Фельдшер ШМД оглядає роділлюв терміні 38-39 тижнів вагітності. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено: положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, II позиція, передній вид. Де найкраще вислуховується серцебиття плоду?

- а. Зліва нижче пупка
- б. Справа на рівні пупка
- с. Зліва вище пупка
- д. Справа нижче пупка
- е. Справа вище пупка

1164. Ви фельдшер ФАПу. Проводите взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менінгокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в баклабораторію:

- а. 2 години
- б. 3 години
- с. 6 годин
- д. 30 хвилин
- е. 1 година

1165. У потерпілої 20-ти років констатовано клінічна смерть. Проводиться серцеволегенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- а. Пульсація на сонній артерії
- б. Зниження температури тіла
- с. Відсутність свідомості
- д. Розширені зіниці
- е. Пасивні рухи грудної клітки

1166. При обстеженні хворої фельдшер ФАПу виявив: схуднення на 10 кг за 2 місяці, дратівливість, витрішкуватість, тахікардію навіть у спокої. Для гіперфункції якої ендокринної

залози характерні дані симптоми?

- a. Паращитоподібні
- b. Яєчники
- c. Підшлункова
- d. Надниркові

e. Щитоподібна

1167. Виклик ШМД до жінки зі скаргами на сильний ріжучий біль у правому підребер'ї, який віддає у праве плече, шию, щелепу, повторне блювання. Живіт здутий, болісний у ділянці правого підребер'я. Больовий напад почався після повернення з автобусної екскурсії. Які лікарські препарати слід застосовувати в даній ситуації?

- a. Фестал, бісептол
- b. Карсил, ентеросгель
- c. Анальгін, алохол
- d. Но-шпа, фуросемід

e. Папаверин, баралгін

1168. Ви - фельдшер ФАП, оглядаєте 4денну дитину після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено, що сеча дитини має жовтувато-цегляний колір, на пелюшці залишається червонуватий слід, місцями видно дрібні жовточервоні кришталіки. Який із станів новонароджених спостерігається у дитини?

- a. Статевий криз
- b. Токсична еритема

c. Сечокислий інфаркт

- d. Транзиторна гіпертермія
- e. Транзиторний дисбактеріоз

1169. Робітник 25-ти років раптово знепритомнів і впав на спину. Об'єктивно: шкіра обличчя стала блідою з ціанотичним відтінком. З'явилися спочатку тонічні, а потім клонічні судоми, піна з рота, забарвлена кров'ю, мимовільне сечовипускання. Який невідкладний стан може запідозрити фельдшер?

- a. Гіперглікемічна кома
- b. Гіпокальціємічна кома
- c. Істеричний напад
- d. Геморагічний інсульт

e. Епілептичний напад

1170. До фельдшера ФАП звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Об'єктивно: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпигментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

a. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки

- b. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки
- c. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- d. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- e. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки

1171. На ФАП звернулася жінка 25-ти років, зі скаргами на утруднене носове дихання і ковтання, які з'явилися після укусу оси. Обличчя, слизова оболонка носа, гортані та язик набрякли. Фельдшер виставив діагноз: набряк Квінке і ввів в/м димедрол. Стан хворої не покращився. Який з перерахованих препаратів потрібно ввести для покращення стану?

a. Баралгін

b. Преднізолон

- c. Мезатон
- d. Кофеїн
- e. Кордіамін

1172. В дитячому садочку виявлена дитина, що захворіла на скарлатину. Які профілактичні заходи необхідно провести в вогнищі інфекції?

a. Карантин на 7 днів, огляд контактних

- b. Поточна дезінфекція, обстеження контактних на менінгокок
- c. Проведення щеплення контактним
- d. Поточна дезінфекція, обстеження на стафілокок
- e. Карантин на 21 день

1173. Скільки см дорівнює акушерська кон'югата:

- a. 13 см
- b. 12 см

c. 11 см

- d. 21 см
- e. 25 см

1174. III-й період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одномоментно виділилося 400 мл крові, кровотеча продовжується. Під час огляду встановлено відсутність однієї часточки. Яка тактика акушерки при затримці часток плаценти в матці?

- a. Зовнішній масаж матки
- b. В/в введення утеротонічних засобів
- c. Ручне обстеження порожнини матки і видалення часточки плаценти**
- d. В/в введення інгібіторів фібринолізу
- e. Випускання катетером сечі

1175. До ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у лівому колінному суглобі, який посилюється під час ходьби, обмеження рухів. Фельдшер призначив вологий зігрівальний компрес. Вкажіть тривалість процедури:

- a. 4-6 годин
- b. 8-10 годин**

- c. 1-2 години
- d. 40-60 хвилин
- e. 2-4 години

1176. До Вас у медпункт заводу доставили потерпілого 42-х років, який внаслідок необережності отримав сильний удар у праву поперекову ділянку. Непокоїть біль у поперековій ділянці з іррадіацією сечовід, травмований помочився сечею кольору м'ясних помиїв. При огляді блідий, пульс - 90/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку першу допомогу Ви надасте?

- a. Ввести катетер у сечовий міхур
- b. Холод на поперекову ділянку, викликати швидку допомогу**
- c. Покласти спиртовий компрес на поперекову ділянку, викликати терапевта
- d. Тепло на поперекову ділянку, направити хворого до хірурга
- e. Розтерти поперекову ділянку маззю "Рятівник"

1177. Ви фельдшер ШМД. На вулиці знепритомнів хворий на цукровий діабет (в кишені знайдена картка хворого на інсулінозалежний цукровий діабет). При огляді: шкіра волога, високий тонус м'язів, судоми, високі сухожильні рефлекси, розширені зіниці. Дихання звичайне, запаху ацетону з рота немає. Пульс - 80/хв. АТ- 120/80 мм рт.ст. Ваші дії:

- a. Ввести глюкокортикостероїди
- b. В/в струменево ввести 40-60 мл 40% глюкози**
- c. Ввести кордіамін
- d. Ввести інсулін короткої дії
- e. Зачекати аналізу рівня глюкози в крові

1178. Ви виїхали на виклик до потерпілого з переломом основи черепа. Виберіть основний симптом цієї травми:

- a. Кровотеча з ліквореєюз носа та вуха**
- b. Набряк шиї
- c. Кровотеча з рани на голові
- d. Головний біль
- e. Наявність крововиливу на потилиці

1179. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

a. Тромбоз мезентеріальних судин

b. Перитоніт

c. Інфаркт міокарда

d. Механічна кишкова непрохідність

e. Перелом основи черепа

1180. Який метод дослідження найдодіельніший для встановлення діагнозу раку шийки матки?

a. Кольпоскопія

b. Мазок на онкоцитологію

c. Огляд шийки матки в дзеркалах

d. Проба Шиллера

e. Гістологічне дослідження

1181. Хвора з кістомою яєчника обстежується для планового оперативного лікування. Після різких рухів виник біль внизу живота, нудота, блювання. З яким діагнозом фельдшер КШД госпіталізував пацієнтку?

a. Порушена позаматкова вагітність

b. Розрив кісти яєчника

c. Гострий холецистит

d. Гострий апендицит

e. Перекрут ніжки субсерозного фіброматозного вузла

1182. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йде мова?

a. Синусова аритмія

b. Миготлива аритмія

c. Екстрасистолічна аритмія

d. Синусова тахікардія

e. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

1183. Дитина народилась від ВІЛінфікованої матері з оцінкою за шкалою Апгар - 8 балів, масою тіла - 3200 г, довжиною - 50 см. Загальний стан задовільний. Антиретровірусна терапія не проводилась. Через який час можна визначити методом ІФА наявність ВІЛ-інфекції у дитини?

a. Через 12 місяців

b. У перші 6 місяців

c. У 2 роки

d. Через 18 місяців

e. У перші дні після народження

1184. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною віком 5 років. Останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

a. Пробіотики

b. Сорбенти

c. Антигістаміни

d. Антибіотики

e. Вітаміни

1185. До Вас звернулася пацієнтка 60-ти років зі скаргами на біль внизу живота серозно-гнійні виділення із статевих шляхів. На шийці матки виявлено утворення яке має вигляд кольорової капусти, яка кровоточить. Ваш діагноз:

a. Поліп шийки матки

b. Крауроз

c. Рак шийки матки

d. Ерозія шийки матки

e. Лейкоплакія

1186. Хвора, 35-ти років, скаржиться на часті водянисті випорожнення, блювання, спрагу, слабкість та запаморочення. Об'єктивно: $t_{\text{о}} - 36,0^{\circ}\text{C}$, відмічається сухість слизових оболонок, тургор шкіри знижений, АТ- 80/50 мм рт.ст., живіт м'який, неболючий, діурез знижений. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика з боку фельдшера ШМД?

a. Введення преднізолону

b. Введення адреналіну

c. Регідратаційна терапія

d. Введення ентеросорбентів

e. Введення сечогінних препаратів

1187. Вкажіть клінічні ознаки струсу головного мозку:

a. Апраксія, атаксія, розлади мови

b. Розлади мови, втрата свідомості, парези та паралічі

c. Парези та паралічі, головний біль, блювання

d. Головний біль, блювання, апраксія

e. Втрата свідомості, головний біль, блювання

1188. До ФАПу звернувся хворий зі скаргами на нудоту, блювання, рідкі випорожнення 2-3 рази на добу світло-жовтого кольору. Об'єктивно: температура - $37,2^{\circ}\text{C}$, порушення зору (косоокість, двоїння в очах, сітка перед очима), порушення ковтання. З анамнезу: хворіє 2 дні, після вживання консервованих грибів. Яке захворювання може бути у цього хворого?

a. Отруєння грибами

b. Сальмонельоз

c. Холера

d. Ботулізм

e. Шигельоз

1189. На прийом до фельдшера ФАПу привели хворого 52-х років, який зловживає алкоголем. Фельдшер помітив, що хворий збуджений, відмічається тремтіння всього тіла. Хворий заглядає під кушетку, щось ніби ловить там. Ваш попередній діагноз:

a. Параноїд

b. Депресивний стан

c. Алкогольний делірій (біла гарячка п'яниць)

d. Маніакальний стан

e. Реактивний стан

1190. До хворого, що повернувся із Африки викликана ШМД. Скарги хворого на раптове підвищення температури тіла до $39,9^{\circ}\text{C}$. При огляді шкіра гіперемійована, слизові оболонки сухі. Язик обкладений білим нальотом. Тони серця приглушені, тахікардія. Відмічається гепатоспленомегалія. Зі слів дружини 2 дні тому також був напад гарячки, який закінчився рясним потовиділенням. Яке захворювання можна запідозрити?

a. Пневмонія

b. Грип

c. Туберкульоз

d. Малярія

e. Черевний тиф

1191. Хворий 28-ми років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°C , загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: $L - 30 \cdot 10^9/\text{л}$, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

a. Абсцес головного мозку

b. Менінгіт

c. Неврит

d. Радикуліт

e. Мозковий інсульт

1192. Основні ознаки менінгіту:

a. Ригідність потиличних м'язів, симптоми Брудзинського, Керніга, зміни ліквору

b. Запаморочення, судоми тіла, блювання, підвищення температури тіла

c. Марення, судоми, жар, сопор

d. Лихоманка, слабкість, нудота, симптоми Нері, Ласега

e. Підвищення температури тіла, блювання, жар, пітливість

1193. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Під час огляду: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації шкіри нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

a. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки

b. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки

c. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки

d. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки

e. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

1194. Перед першим введенням антибіотика фельдшер визначає пробу на індивідуальну чутливість організму до препарату Назвіть розчинник, який підготує фельдшер для розведення антибіотика:

a. 1 % розчин лідокаїну

b. 0,9% розчин натрію хлориду

c. 5% розчин глюкози

d. 0,5% розчин новокаїну

e. 0,25% розчин новокаїну

1195. До хворого з підозрою на інфаркт міокарда викликана ШМД. Була надана допомога: нітрогліцерин під язик, в/в анальгін з димедролом. В машині ШМД знову з'явився виражений біль. Який з препаратів доцільно ввести хворому?

a. Спазмалгон

b. Баралгін

c. Папаверину гідрохлорид

d. Морфіну гідрохлорид

e. Но-шпа

1196. Фельдшера ФАПУ викликали до роділлі додому. По приїзду фельдшера у роділлі триває III період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одночасно виділилося 400 мл крові, кровотеча триває. Під час огляду материнської поверхні плаценти встановлено відсутність однієї дольки. Яка допомога повинна бути надана в такій ситуації?

a. Огляд пологових шляхів в дзеркалах

b. Ручне обстеження порожнини матки

c. Притиснення черевної аорти кулаком

d. Зовнішній масаж матки

e. В/в введення утеротонічних засобів

1197. ШМД приїхала на виклик до хворого 63-х років. Об'єктивно: стан важкий, шкіра бліда, пульс - 124/хв. АТ- 85/60 мм рт.ст. Язик сухий, живіт напружений, болісний. Виявлено позитивний синдром Валя, шум плеску. Яку патологію можна запідозрити у даного хворого?

a. Кишкова непрохідність

b. Гострий панкреатит

c. Асцит

d. Гострий апендицит

e. Гострий перитоніт

1198. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 22-х років. Два дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помиїв, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: обличчя одутле, набряки повік, незначні набряки на кінцівках і тулубі. Над легенями в нижніх відділах вологі хрипи. Пульс - 82/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, акцент II тону над аортою. АТ- 160/100 мм рт.ст. Живіт м'який, печінка біля краю реберної дуги. Симптом Пастернацького - позитивний з обох боків. Добовий діурез - 300 мл. Який попередній діагноз у хворого?

а. Нирковокам'яна хвороба

б. Гострий гломерулонефрит

с. Гострий пієлонефрит

д. Хронічний гломерулонефрит

е. Гіпертонічна хвороба

1199. Ви - фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся пацієнт 20-ти років, який скаржиться на загальну слабкість, кровотечу із носа і ясен, крововиливи на шкірі, біль у горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 39°C, збільшення лімфовузлів. У загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

а. Постгеморагічна анемія

б. Гострий лейкоз

с. Гемолітична анемія

д. В12 -дефіцитна анемія

е. Тромбоцитопенічна пурпура

1200. Потерпілий 32-х років після падіння скаржиться на біль в лівому плечі в ділянці ключиці. При обстеженні: стан задовільний, шкіра в ділянці травми не ушкоджене, деформація відсутня. При пальпації: визначається локальна болісність та кісткова крепітація у середній третині лівої ключиці. Вкажіть оптимальну транспортну іммобілізацію при даній травмі:

а. Шиною Дітерікса

б. Пов'язкою Дезо

с. Колосоподібною пов'язкою на плечовий суглоб

д. Комірцем Шанца

е. Хрестоподібною пов'язкою

1201. На ФАП з'явилася вагітна жінка зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота та кров'янисті виділення зі статевих шляхів. При вагінальному дослідженні шийка матки відкрита. В ділянці зовнішнього вічка визначається нижній полюс плодового яйця. Попередній діагноз:

а. Аборт в ходу

б. Кримінальний аборт

с. Аборт що почався

д. Неповний аборт

е. Повний аборт

1202. Ви фельдшер ФАПУ. При обстеженні вагітної, яку треба взяти на облік, встановили: термін вагітності 30 тижнів, положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Розміри тазу: 24-26-28-18. При піхвовому дослідженні мис досягається, діагональна кон'югата 11 см. Про який таз йдеться?

а. Плоскорохітичний таз

б. Нормальний таз

с. Загальнозвужений плоский таз

д. Загальнорівномірнорозвужений таз

е. Простий плоский таз

1203. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез за центральним типом та ге мі гіпестезія. Який найбільш ймовірний

діагноз?

- a. Транзиторна ішемічна атака
- b. Пухлина мозку
- c. Епідуральна гематома
- d. Геморагічний інсульт

e. Ішемічний інсульт

1204. В дитячому садочку виявлена дитина, що захворіла на скарлатину. Які профілактичні заходи необхідно провести в вогнищі інфекції?

- a. Проведення щеплення контактним
- b. Карантин на 7 днів, огляд контактних**
- c. Поточна дезінфекція, обстеження контактних на менінгокок
- d. Карантин на 21 день
- e. Поточна дезінфекція, обстеження на стафілокок

1205. У складі бригади швидкої допомоги Ви прибули на місце події. Лікар виявив у потерпілого закритий перелом стегна. Ви набрали у шприц 20 мл 0,25% розчину новокаїну, який лікар ввів у ділянку перелому. Який метод знеболювання застосовано?

- a. Блокада місця перелому**
- b. Інфільтраційна анестезія
- c. Хімічне знеболювання
- d. Стовбурова блокада
- e. Провідникова анестезія

1206. До фельдшера здоров'я звернувся пацієнт, який скаржиться на серцебиття та періодично виникаючий короточасний колючий біль в ділянці серця. Які властивості пульсу визначає фельдшер?

- a. Ритм, швидкість, наповнення, висоту
- b. Частоту, висоту, напруження, наповнення
- c. Пульсові коливання, наповнення, напруження
- d. –

e. Ритм, частоту, наповнення, напруження

1207. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Анемія
- b. Пітниця
- c. Рахіт

d. Алергічний діатез

e. Гіпотрофія

1208. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 34-х років, який отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3 см. Краї рани зіяють, кровоточать. Кров витікає пульсуючим струменем, яскраво-червоного кольору. Визначте обсяг першої допомоги:

- a. Накладання оклюзійної пов'язки
- b. Застосування гемостатичної губки
- c. Накладання стискаючої пов'язки
- d. Імобілізація шиною Дітерікса

e. Накладання джгута

1209. Пацієнтці призначено ввести 20 МО інсуліну, 1 мл дорівнює 100 МО. У шприц набрано 0,5 мл. Яке ускладнення може виникнути у пацієнтки?

- a. Гіперглікемічна кома
- b. Ліподистрофія
- c. Гіпоглікемічний стан**
- d. Колапс

е. Анафілактичний шок

1210. Швидка допомога приїхала на виклик до хворого 35-ти років. Об'єктивно: положення вимушене - сидить у ліжку, впираючись руками в край, на віддалі від хворого, особливо під час видиху, чути свистячі хрипи. Спостерігаються ціаноз губ, кашель з утрудненим виділенням в'язкого харкотиння. Грудна клітка діжкоподібна. Перкуторно визначають коробковий звук. Аускультативно - ослаблене дихання, розсіяні, сухі хрипи. Пульс - 92/хв. АТ- 120/70 мм рт.ст. Який препарат треба призначити?

а. Анальгін

б. Баралгін

с. Еуфілін

д. Строфантин

е. Цефазолін

1211. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на свербіж шкіри, який з'явився одночасно з висипанням і значно посилюється увечері та вночі. З анамнезу з'ясовано, що 10 днів тому він прибув з відрядження, де проживав у гуртожитку. Об'єктивно: на шкірі живота, сідниць, променево-зап'ясткових суглобів та бокових поверхонь пальців рук - парні папуло-везикулярні розчухи з кров'яними кірочками. Встановіть попередній діагноз:

а. Короста

б. Кропив'янка

с. Токсикодермія

д. Екзема

е. Пруриго

1212. Ви фельдшер ФАПу, надаєте невідкладну допомогу хворому в стані клінічної смерті. Вкажіть, яке співвідношення дихання та закритого масажу серця слід проводити хворому?

а. 30:2

б. 15:2

с. 15:3

д. 5:1

е. 10:2

1213. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

а. Вимушене

б. Активне

с. Дренажне

д. Пасивне

е. Фаулера

1214. Хворий 40-ка років скаржиться на біль стискаючого характеру за грудинною з іррадіацією в ліву руку. Після прийому нітрогліцерину приступ припинився. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

а. Вада серця

б. Стенокардія

с. Ревматизм

д. Гіпертонічна хвороба

е. Інфаркт міокарда

1215. Хворий 58-ми років, яка скаржиться на біль в ділянці серця, фельдшер ШМД провів ЕКГ-дослідження. Результати електрокардіографії: глибокий, поширений зубець Q, зміщення вище ізоїнії інтервалу ST, симптом прапорця, глибокий негативний зубець T. Ваш ймовірний діагноз:

а. Повна атріовентрикулярна блокада

б. Інфаркт міокарда

с. Гіпертонічна хвороба II ст.

- d. Блокада лівої ніжки пучка Гіса
- e. Стенокардія

1216. Хворий 58-ми років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово під час психоемоційного збудження втратив свідомість. Об'єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя, пульс - 100/хв., напружений, АТ- 230/110 мм рт.ст. Опущений правий кут рота, дихання шумне, щока "вітрилить". Підняті праві кінцівки падають "як батиги", м'язовий тонус в них та рефлексі низькі, на лівих кінцівках збережені, симптом Бабінського справа. Який попередній діагноз?

- a. Субарахноїдальний крововилив
- b. Гіпертонічний криз
- c. Ішемічний інсульт
- d. Геморагічний інсульт**
- e. Менінгіт

1217. ШМД приїхала на виклик до хворого 32-х років у якого раптово виникло блювання "кавовою гущею", слабкість, втрата свідомості. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка. При обстеженні шкірні покриви бліді, холодний, липкий піт, АТ- 90/70 мм рт.ст., пульс - 104/хв. Який препарат слід застосувати?

- a. Анальгін
- b. Атропін
- c. Етамзилат**
- d. Платифілін
- e. Баралгін

1218. Хворий 43-х років, працівник м'ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на головний біль, високу температуру, відчуття печіння в очах, біль у м'язах, особливо литкових, попереку, жовтяничний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, пальпуються збільшені печінка та селезінка. Олігурія. Температура тіла - 37,8°C, пульс - 100/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні дані клінічні симптоми?

- a. Черевний тиф
- b. Висипний тиф
- c. Бруцельоз
- d. Вірусний гепатит
- e. Лептоспіроз**

1219. Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри, кровоточивість, жовтяницю, збільшення живота. При обстеженні виявлено: судинні зірочки на шкірі, еритему долонь, ксантоми, асцит. У крові: білірубінемія, збільшення ліпідів. Для якого захворювання це характерно?

- a. Жовчнокам'яна хвороба
- b. Хронічний холецистит
- c. Цироз печінки**

- d. Виразкова хвороба шлунка
- e. Хронічний панкреатит

1220. У новонародженої дитини діагностовано гіпотиреоз: потворне набрякле обличчя з товстими губами збільшеним язиком, вузькі очні щілини, широке перенісся, велика голова, коротка товста шия; шкіра дуже суха, холодна на дотик. Що спричинює розвиток даного захворювання?

- a. Дефіцит інсуліну
- b. Підвищення продукції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози
- c. Знижена функція кори наднирників
- d. Зниження продукції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози**
- e. Підвищена функція кори наднирників

1221. Хворий 36-ти років звернувся до фельдшера зі скаргами на гострі болі в животі, які виникають через 30 хвилин після прийому їжі. Апетит збережений, але через появу болю після їжі хворий обмежує її прийом. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану відмічає в осінньо-весняний період. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Легені та серце без

патології. Язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота відмічається болючість в епігастральній ділянці. Ваш діагноз:

- a. Хронічний ентерит
- b. Хронічний холецистит
- c. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- d. Хронічний панкреатит
- e. Виразкова хвороба шлунка**

1222. Пацієнт 35-ти років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на зниження зору, "туман" перед очима, двоїння предметів, які виникли напередодні. Голос гугнявий. При об'єктивному обстеженні виявлено: мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. За 3 дні до захворювання вживав консервовану свинину. Яке захворювання може запідозрювати фельдшер?

- a. Ботулізм**
- b. Розлади мозкового кровообігу
- c. Отруєння метиловим спиртом
- d. Отруєння молоком
- e. Стовбуровий енцефаліт

1223. Роділля 20-ти років з терміном вагітності 41 тиждень транспортована фельдшером ШМД до пологового стаціонару. У другому періоді пологів серцебиття плода стало аритмічним з частотою 68-84/хв., не відновлюється між потугами; на тазовому дні знаходяться сіднички плода. Вкажіть втручання, яке повинно бути здійснене:

- a. Накладання акушерських щипців
- b. Проведення плодоруйнівної операції
- c. Проведення комбінованого повороту плода
- d. Екстракція плода за тазовий кінець**
- e. Кесарів розтин

1224. Ви фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся хворий із пораненням грудної клітки. При огляді рани фельдшер відмітив, що під час видиху із рани виділяється піниста кров, під час вдиху у рану засмоктується повітря. Турбує виражений біль та задишка. Вкажіть, яку пов'язку слід накласти хворому:

- a. Оклюзійна**
- b. Клейова пов'язка
- c. Пов'язка Дезо
- d. Асептична пов'язка
- e. Циркулярна пов'язка на грудну клітку

1225. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- a. Вогнищева пневмонія
- b. Гломерулонефрит
- c. Сироваткова хвороба
- d. Міокардит**
- e. Набута вада серця

1226. Ви фельдшер ШМД, прибули на виклик до пацієнта 40-ка років, який скаржиться на гострий біль в животі, що з'явився раптово після фізичного навантаження. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Живіт дошко- подібний, болючий при пальпації. Симптом Щоткіна-Блюмберга різко позитивний. Визначте, яке ускладнення розвинулось у хворого:

- a. Кровотеча
- b. Пенетрація
- c. Перфорація**
- d. Малігнізація

е. Пілоростеноз

1227. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на появу виразки на статевому члені та неволю утворення в паху. Хворий мав незахищений статевий акт близько 6-7 тижнів тому. При огляді на слизовій оболонці головки статевого члена виявлено виразку округлої форми, 0,5-0,7 см в діаметрі, безболісну, яка має гладеньке, червоне, блискуче дно. В пахвинній ділянці виявлено збільшений, безболісний лімфовузол близько 2-х см в діаметрі. Вкажіть який період сифілісу відповідає такій клінічній картині?

- а. Первинний**
- б. Хронічний
- с. Інкубаційний
- д. Вторинний
- е. Третинний

1228. Фельдшера вночі викликали до пацієнта, який скаржиться на ядуху з утрудненим вдихом. Кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Пацієнт у положенні ортопное. Дихання - шумне, "клетотливе" Пульс - 100/хв., ритмічний. Над легеньми - вологі середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший діагноз:

- а. Ендокардит
- б. Набряк легень**
- с. Бронхіальна астма
- д. Міокардит
- е. Ексудативний перикардит

1229. Вам необхідно доставити кал до паразитологічної лабораторії у теплому вигляді. Якого збудника можна визначити ЛИШЕ за умови теплих випорожнень?

- а. Трихінели
- б. Гострики
- с. Лямблії**
- д. Ехінококи
- е. Аскариди

1230. Транспортування потерпілого з переломом хребта за відсутності щита проводиться в положенні:

- а. На животі**
- б. На спині
- с. На правому боці
- д. На лівому боці
- е. Сидячи

1231. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

- а. Лімфаденіт**
- б. Правець
- с. Бешиха
- д. Флегмона
- е. Лімфангоїт

1232. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців, мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6°C, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- а. Дизентерія
- б. Колі-інфекція
- с. Ротавірусна інфекція
- д. Сальмонельоз
- е. Гострий розлад травлення функціонального походження**

1233. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у лобовій ділянці, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньовнутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

- a. Гострий сфеноїдит
- b. Гострий риніт
- c. Гострий фронтит**
- d. Гострий етмоїдит
- e. Гострий гайморит

1234. Хворий 40-ка років, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на сильні болі в правій половині живота, поперековій ділянці справа, які віддають в пах, стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об'єктивно: хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла - 36,9°C. Пульс - 92/хв. Живіт здутий, болючий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справа. Ваш ймовірний діагноз:

- a. Правобічна ниркова колька**
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Хронічний гломерулонефрит
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Гострий гломерулонефрит

1235. У хворого 47-ми років з інфарктом міокарда при транспортуванні в стаціонар раптово виник приступ інспіраторної ядухи, сухий кашель, відчуття стискання у грудях, холодний піт. Яке ускладнення інфаркту міокарда у хворого?

- a. ТЕЛА
- b. Бронхіальна астма
- c. Кардіогенний шок
- d. Серцева астма**
- e. Аневризма аорти

1236. На ФАП звернувся хворий із скаргами на постійний ниючий біль в правому підребер'ї, пов'язаний з прийомом їжі, загальну слабкість. Об'єктивно: шкіра жовтушного кольору. Живіт м'який, болючий в правому підребер'ї, печінка виступає з-під правого краю реберної дуги на 2 см, при пальпації болюча. Про яке захворювання можна подумати?

- a. Хронічний панкреатит
- b. Хронічний гепатит**
- c. Жовчнокам'яна хвороба
- d. Хронічний холецистит
- e. Гострий холецистит

1237. ШМД приїхала на місце ДТП - потерпілого збив автомобіль. При огляді: свідомість відсутня, зіниці реагують на світло. Шкіра бліда, дихання сповільнене, поверхневе, пульс частий, слабкий, АТ- 80/60 мм рт.ст., зовнішніх пошкоджень нема. З носа, вух та рота витікає кров. Яке пошкодження слід запідозрити?

- a. Перелом склепіння черепа
- b. Здавлення головного мозку
- c. Струс головного мозку
- d. Забій головного мозку
- e. Перелом основи черепа**

1238. Ви фельдшер ШМД. З'явилися на виклик до вагітної, у якої раптово з'явилась кровотеча з піхви. При обстеженні з'ясувалось: вагітність 35 тижнів. Скарг жінка не пред'являє, матка в нормотонусі, безболісна при пальпації, положення плода поздовжнє, І позиція, передній вид, головне передлежання. Серцебиття плода - 120/хв. Виділення з піхви кров'яні, помірні. Пульс - 110/хв. АТ- 110/70 мм рт.ст. Попередній діагноз, тактика фельдшера:

- a. Передчасні пологи. Госпіталізація**

b. Загроза розриву матки. Госпіталізація

c. Передлежання плаценти. Негайна госпіталізація

d. Передчасне відшарування плаценти. Кровоспинні

e. Мимовільний аборт. Госпіталізація

1239. Дитину, яка народилася на 38-му тижні вагітності з довжиною тіла - 45 см і масою - 2500 г, обвід голови - 34 см треба рахувати як:

a. Недоношену III ступеню

b. Недоношену II ступеню

c. Недоношену I ступеню

d. Переношену

e. Доношену

1240. Хвора 50-ти років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на рясні контактні кровотечі, біль внизу живота. При огляді в дзеркалах: шийка матки має вигляд "цвітної капусти". Після огляду кровотеча посилилась. Які першочергові дії фельдшера?

a. Покласти холод на низ живота

b. Капіталізувати у супроводі фельдшера

c. Провести тугу тампонаду матки

d. Ввести кровоспинні препарати

e. Викликати бригаду ШМД

1241. До фельдшера звернувся чоловік 45-ти років, зі скаргами на ожиріння обличчя, тулуба, стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевої функції. На рентгенограмі черепа - турецького сідла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

a. Гіпофізарний нанізм

b. Нецукровий діабет

c. Хвороба Іценко-Кушинга

d. Акромегалія

e. Хвороба Аддісона

1242. У дитини 9-ти років, яка часто хворіє на респіраторні вірусні інфекції, раптово у ночі погіршився стан: з'явився сухий кашель, під час якого мокротиння майже не виділяється, задишка експіраторного характеру з довгим свистячим видихом, який чути на відстані, блідість шкіри з ціанотичним відтінком. Визначте для якого стану характерні дані симптоми?

a. Гострий трахеїт

b. Гострий стенозуючий ларингіт

c. Бронхіальна астма

d. Обструктивний бронхіт

e. Кашлюк

1243. У пацієнта скарги на ниючий біль у правому підребер'ї, який іррадіює в праву лопатку і виник після психоемоційного стресу. Склери суб'єктеричні, язик обкладений жовтуватим нальотом, при пальпації живота позитивний симптоми Кера, Ортнера. Яке захворювання виникло у пацієнта?

a. Хронічний холецистит

b. Хронічний коліт

c. Хронічний гепатит

d. Виразкова хвороба шлунка

e. Цироз печінки

1244. Через 6 діб після ін'єкції у пацієнтки утворився різко болючий інфільтрат з гіпе-ремією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла - 37,8°C. Що у пацієнтки?

a. Панарицій

b. Бешихове запалення

с. Карбункул

d. Постін'єкційний абсцес

е. Флегмона

1245. Фельдшер ФАПу проводить вагінальне дослідження жінці 38-ми років, яка звернулася з приводу появи гнійних виділень з неприємним запахом з піхви. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу кісти яєчника. Під час бімануального дослідження з'явився гострий різкий біль внизу живота. Виникнення цього стану пов'язане з:

a. Збільшення кісти

b. Гідросальпінкс

с. Малігнізація кісти

d. Розрив кісти яєчника

е. Піосальпінкс

1246. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилися нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125/хв., АТ - 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

a. Уремична кома

b. Гіперлактацидемічна кома

с. Кетоацидотична кома

d. Печінкова кома

е. Гіперосмолярна кома

1247. Фельдшер ФАПу виявив у пацієнта блювання "кавовою гущею" дьогтеподібні випорожнення, слабкість. Який попередній діагноз?

a. Перфоративна виразка

b. Гастрит

с. Шлунково-кишкова кровотеча

d. Геморой

е. Апендицит

1248. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на біль в промежині. Впродовж останніх 6 місяців у хворого порушення акту дефекації, проноси чергуються з закрепками, незначна кровотеча, помітно втратив вагу. Під час пальцевого ректального дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Який попередній діагноз?

a. Поліп прямої кишки

b. Рак прямої кишки

с. Анальна тріщина

d. Геморой

е. Парапроктит

1249. У вагітної жінки з вузьким тазом другого ступеня виникла ситуація загрози розриву матки. Назвіть першочергові дії фельдшера:

a. Стимуляція пологової діяльності

b. Акушерські щипці

с. Зняти пологову діяльність

d. Епісіотомія

е. Кесарів розтин

1250. Ви фельдшер ШМД. Хворий після ДТП має відкритий перелом стегна. Першочергові догоспітальні дії фельдшера полягають в:

a. Знеболенні, введенні антибіотиків

b. Зупинці кровотечі, знеболюванні, транспортній іммобілізації

с. Виклику швидкої допомоги

d. Накладанні джгута, транспортуванні в лікарню

е. Зупинці кровотечі, проведенні імобілізації

1251. У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?

а. Перший період р

b. Другий період

c. –

d. Передвісники пологів

е. Третій період

1252. До фельдшера ФАПу звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

a. Мастопатія

b. Вірильний синдром

c. Передменструальний синдром

d. Альгодисменорея

е. Посткастраційний синдром

1253. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали К — Е різної тривалості, хвилі /. Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

a. Синусова аритмія

b. Екстрасистолічна аритмія

c. Синусова тахікардія

d. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

е. Миготлива аритмія

1254. До Вас звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зіняння шкіри з незначною кровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

a. Вивих

b. Розтягнення зв'язок

c. Закритий перелом

d. Розрив зв'язок

е. Відкритий перелом

1255. До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на застуду, підвищення температури тіла до 39,5°C, болі в правій половині грудної клітки, пов'язані з актом дихання, сухий кашель, головний біль. Захворів гостро. Об'єктивно: рум'янець на щоках. Частота дихання - 28/хв. Під час пальпації - посилене голосове тремтіння справа, перкуторно - притуплення перкуторного звука справа. Аускультативно - крепітація справа. Пульс - 96/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Який попередній діагноз у хворого?

a. Сухий плеврит

b. Туберкульоз легенів

c. Рак легенів

d. Гострий бронхіт

е. Негоспітальна пневмонія

1256. У новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Зазначте, для якого стану характерні дані симптоми:

a. Обтураційної жовтяниці

b. Фізіологічної жовтяниці новонароджених

c. Аномалій розвитку гепатобіліарної системи

- d. Вірусного гепатиту
- e. Гемолітичної хвороби новонароджених

1257. Учень 5-го класу після уроку фізкультури звернувся до фельдшера медпункту із скаргами на інтенсивний переймоподібний біль у ділянці правого підребер'я, який іррадіює в праве плече, праву лопатку. При пальпації живота відмічається болючість у точці проекції жовчного міхура. Про яке захворювання можна подумати?

- a. Дуоденіт
- b. Дискінезія жовчних шляхів по гіпотонічному типу
- c. Виразкова хвороба 12-палої кишки
- d. Дискінезія жовчних шляхів по гіпертонічному типу**
- e. Виразкова хвороба шлунка

1258. У дитини 1,5 року, яка лікується з приводу рахіту на фоні задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. Який препарат застосовують для надання невідкладної допомоги?

- a. Сибазон 0,5%**
- b. Аміназин
- c. Лазикс
- d. Сульфат магнію 25%
- e. Діазепам 0,5%

1259. Фельдшер ФАПУ виставив діагноз інфаркт міокарда. Які препарати він використає для профілактики тромбоемболічних ускладнень при інфаркті міокарда?

- a. Лідокаїн
- b. Строфантин
- c. Гепарин**
- d. Дофамін
- e. Новокаїнамід

1260. Перелом якої з перерахованих нижче кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

- a. Променевої
- b. Плечової**
- c. Надколінка
- d. Великогомількової
- e. П'яткової

1261. Жінка 20-ти років скаржиться на затримку місячних впродовж 8-ми тижнів, інтенсивний біль унизу живота. При вагінальному дослідженні справа пальпується пухлиноподібне утворення, збільшення матки. Визначається позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Які першочергові дії фельдшера на догоспітальному етапі?

- a. Ввести заспокійливі засоби
- b. Провести тест на вагітність
- c. Порекомендувати звернутись до лікаря гінеколога
- d. Покласти холод на низ живота і госпіталізувати в гінекологічний стаціонар**
- e. Ввести знеболюючі засоби

1262. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані, відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

- a. Брадипное
- b. Дихання Чейн-Стокса
- c. Тахіпное
- d. Дихання Біота
- e. Дихання Куссмауля**

1263. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження

треба використати для підтвердження діагнозу?

- a. Ультразвукове дослідження (УЗД)
- b. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- c. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- d. Кольпоскопія**
- e. Зондування порожнини матки

1264. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

- a. Лімфогранулематоз
- b. Гострий лейкоз
- c. Гіпопластична анемія
- d. Хронічний мієлолейкоз
- e. Хронічний лімфолейкоз**

1265. Пацієнту призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Вкажіть, протягом якого часу збирається кожна порція:

- a. Через кожні 2 години
- b. Через кожні 3 години**
- c. Порція зібрана за 10 годин
- d. Ранкова та вечірня порції
- e. Через 6 годин

1266. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

- a. Стерильна вазелінова олія**
- b. Розчин перекису водню
- c. Гліцерин
- d. Розчин фурациліну
- e. Антисептичний розчин

1267. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- a. Інтермітуюча
- b. Ремітуюча
- c. Хвилеподібна
- d. Гектична**
- e. Неправильна

1268. При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?

- a. Кефалогематома**
- b. Пухирчатка новонародженого
- c. Пологова пухлина
- d. Внутрішньочерепна травма
- e. Септикопіємія

1269. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена ШМД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рз-120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

- a. Механічна кишкова непрохідність
- b. Перелом основи черепа
- c. Тромбоз мезентеріальних судин

d. Інфаркт міокарда

e. Перитоніт

1270. Через 10 хвилин після народження дитини з'явилися незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Ознаки відокремлення посліду позитивні. Крововтрата 280 мл. Яка подальша тактика ведення пологів?

a. Ввести окситоцин

b. Запропонувати роділлі потужитись

c. Провести зовнішній масаж матки

d. Виділити плаценту зовнішніми прийомами

e. Провести ручне відокремлення плаценти

1271. У дитини 2-х років з гіпертермічним синдромом спостерігається блідість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

a. Холод на проекцію великих судин

b. Анальгін 50% внутрішньом'язово

c. Оцтові обгортання

d. Папаверин 2% внутрішньом'язово

e. Парацетамол перорально

1272. Хворий 45-ти років скаржиться на біль, почервоніння в ділянці правої нижньої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,5°C. В ділянці правої ступні та гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці скарги:

a. Гострий тромбоемболіт

b. Бешиха

c. Гострий артрит

d. Лімфангоїт

e. Флегмона

1273. До фельдшера ФАПУ звернулась мати 5-річної дитини. Скарги: у дитини раптово підвищилась температура тіла до 40°C, дитина млява, малорухлива, на шкірі з'явилась висипка геморагічного характеру, зірчастої форми, підвищується над поверхнею шкіри, не зникає після натискання. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Краснуха

b. Вітряна віспа

c. Менінгококцемія

d. Кір

e. Скарлатина

1274. Під час піхвового дослідження у роділлі встановлено: шийка матки згладжена, відкриття 7 см. Плодовий міхур відсутній, голівка притиснута до входу в малий таз. Визначається передній кут великого тім'ячка, надперенісся, надбрівні дуги, очні западини. Визначте передлежання плода:

a. Лобне передлежання

b. Потиличне, передній вид

c. Передньоголовне передлежання

d. Потиличне, задній вид

e. Лицьове, задній вид

1275. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого, який кілька тижнів тому повернувся з відрядження до Африки. Хвороба розпочалася з підвищення температури тіла до 37,6°C і сильного ознобу, який переріс у жар: температура тіла різко підвищилась до 40°C. Турбував сильний головний біль, болі в підребер'ях, спрага. Через деякий час температура різко знизилась до нормальної. Хворий сильно спітнів і заснув. При огляді: пальпуються збільшені та болючі печінка та селезінка. Яку хворобу слід запідозрити?

a. Грип

- b. Лептоспіроз
- c. Бруцельоз
- d. Малярія**
- e. Черевний тиф

1276. Після народження дитини у роділлі через 10 хвилин з'явилися незначні кров'яністі виділення. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

a. Ознака Кюстнера-Чукалова

b. Ознака Шредера

- c. Ознака Клейна
- d. Ознака Альфельда
- e. Ознака Штрассмана

1277. Після вживання великої кількості недозрілих ягід у дитини 5-ти років з'явилася нудота, біль у животі, блювання. З'явився головний біль, слабкість. При огляді: язик сухий, апетит знижений, випорожнення не стійкі. На шкірі тулуба виявлені елементи алергійного висипання. Що першочергово повинен зробити фельдшер при наявності у дитини даних симптомів:

- a. Ввести анальгін
- b. Надати хворому кисневу подушку
- c. Покласти грілку на живіт

d. Промивання шлунка

e. Шлункове зондування

1278. При наданні невідкладної допомоги на здоров'я пацієнта з гострим харчовим отруєнням під час введення товстого шлункового зонда раптово з'явилися синюшність обличчя, кашель, втрата голосу. Що є імовірною причиною даного ускладнення?

- a. Невідповідність діаметру зонда для даного пацієнта
- b. Травма стравоходу
- c. Травма шлунка
- d. Потрапляння зонда в дванадцятипалу кишку

e. Потрапляння зонда в дихальні шляхи

1279. Вкажіть заходи, які необхідно надати пацієнту у перший період гарячки:

- a. Організувати індивідуальний пост
- b. Накласти холодний компрес на чоло
- c. Часто змінювати натільну і постільну білизну

d. Вкрити пацієнта, прикласти грілку до ніг

e. Давати багато прохолодного пиття

1280. До фельдшера ФАПУ звернулись батьки з дитиною 2-х років, що хворіла на ГРВІ. Вночі раптово дихання стало гучним, його чути на відстані, з'явився приступоподібний, гавкаючий кашель. Про яке ускладнення можна думати?

- a. Назофарингіт
- b. Гострий бронхіт

c. Гострий стенозуючий ларингіт

- d. Обструктивний бронхіт
- e. Гострий трахеїт

1281. Хворого 28-ми років привезли в лікарню зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°C, загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: лейкоцити – $30 \cdot 10^9/\text{л}$, швидкість осідання еритроцитів – 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

- a. Неврит
- b. Менінгіт
- c. Мозковий інсульт

d. Абсцес головного мозку

е. Радикуліт

1282. Фельдшер ФАПу спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

а. Диспептичний

б. Анемічний

с. Сидеропенічний

д. Астеновегетативний

е. Геморагічний

1283. При дослідженні мокротиння виявлені: еозинофіли, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?

а. Бронхіальна астма

б. Сухий плеврит

с. Туберкульоз легень

д. Гострий бронхіт

е. Негоспітальна пневмонія

1284. Вагітна знаходиться в палаті патології вагітності. Вагітність перша, 38 тижнів, положення плода повздожне, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, II позиція. Де найкраще вислухати серцебиття плода?

а. Справа нижче пупка

б. В ділянці пупка

с. Справа вище пупка

д. Зліва вище пупка

е. Зліва нижче пупка

1285. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до 7-ми річної дитини, у якої під час гри з дрібними іграшками раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свідомості. Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання відсутнє. Що слід фельдшеру виконати в першу чергу?

а. Прийом Геймліха

б. Штучну вентиляцію легенів

с. Непрямий масаж серця

д. Прекардіальний удар

е. Прямий масаж серця

1286. Фельдшера ФАПу викликали до хворого зі скаргами на переймоподібний біль у животі, підвищення температури тіла до 39,5°C, водянисті випорожнення, зеленуватого кольору з домішками слизу. Такі симптоми свідчать про:

а. Неспецифічний виразковий коліт

б. Сальмонельоз

с. Дизентерія

д. Черевний тиф

е. Холера

1287. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

а. Бактеріологічне дослідження випорожнень

б. Дуоденальне зондування

с. Кoproлогічне дослідження випорожнень

д. Фіброгастроудоденоскопія

е. Зіскоб з періанальних складок

1288. Після народження дитини на 1-й хвилині життя ЧСС становить менше 100/хв., дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлексії слабкі, тонус м'язів знижений. Синюшність шкіри обличчя, стоп і кистей. Якому патологічному стану відповідає симптоматика?

- a. Гостра судинна недостатність
- b. Внутрішньочерепна пологова травма
- c. Сепсис новонародженого
- d. Асфіксія новонародженого**
- e. Вроджена вада серця

1289. До фельдшера ФАПу звернулася хвора, яка годує дитину груддю із скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5°C, біль в правій молочній залозі. При огляді - залоза збільшена, при пальпації болючість. Який попередній діагноз?

- a. Фібroadенома правої молочної залози
- b. Фурункул правої молочної залози
- c. Гострий мастит**
- d. Гіпермастія
- e. Мастопатія

1290. Вагітна звернулася на ФАП до фельдшера зі скаргами на головний біль, нудоту, мерехтіння мушок перед очима. 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, АТ- 200/120 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 190/115 мм рт.ст. Рз- 88/хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв. Яке виникло ймовірне ускладнення?

- a. Набряки під час вагітності
- b. Гіпертонічний криз
- c. Преєклампсія легкий ступінь
- d. Ранній гестоз вагітних
- e. Преєклампсія тяжкий ступінь**

1291. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена" вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

- a. Кардіогенний шок
- b. Перфорація виразки шлунка
- c. Анафілактичний шок
- d. Гостре отруєння
- e. Гіповолемічний шок**

1292. Ви працюєте на ФАПі. Для профілактичного огляду звернулася мати з дитиною, якій виповнився один рік. Останні три місяці не хворіла. Профілактичні щеплення на першому році життя проводились згідно з календарним планом. Вкажіть, що необхідно призначити дитині:

- a. Ревакцинацію проти туберкульозу
- b. Вакцинацію проти дифтерії
- c. Вакцинацію проти кору, краснухи, паротиту**
- d. Вакцинацію проти поліомієліту
- e. Ревакцинацію проти епідемічного паротиту

1293. На 43-му тижні вагітності народилася дитина в стані апное, в'яла, шкіра бліда, слизові оболонки різко ціанотичні, тонус м'язів знижений, рефлексів немає, серцева діяльність майже цілком пригнічена. Які дії по оживленню дитини треба провести в першу чергу:

- a. Відсмоктати слиз із верхніх дихальних шляхів**
- b. Провести ШВЛ через маску
- c. Ввести 5% розчин альбуміну
- d. Провести ШВЛ через інтубаційну трубку
- e. Ввести розчин адреналіну 1:10000

1294. Жінка 24-х років звернулася на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4-5 ребер зліва відмічається гематома, набряк м'яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. При пальпації в ділянці 4-5 ребер різка болючість, відчувається хруст. Визначте діагноз:

- a. Струс грудної клітки
- b. Перелом ключиці
- c. Перелом груднини
- d. Перелом 4-5 ребер**
- e. Стиснення грудної клітки

1295. Вас, фельдшера ШМД, викликали до хворого, який знаходиться у вкрай важкому стані. Риси обличчя загострені, очі запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки. Скарги на пронос, блювання протягом 2-х днів. Випорожнення по типу "рисового відвару". Температура - 37,5°C. Пульс ниткоподібний. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Колі-ентерит
- b. Сальмонельоз
- c. Дизентерія
- d. Харчова токсикоінфекція
- e. Холера**

1296. Фельдшер швидкої медичної допомоги прибув на виклик до пацієнтки 18-ти років, яка раптово втратила свідомість. Зі слів родичів відомо, що страждає на цукровий діабет, отримує інсулін короткої дії. Пацієнтка без свідомості. Шкіра волога, судоми м'язів верхніх та нижніх кінцівок. Пульс - 110/хв., АТ- 110/60 мм рт.ст. Із введення яких препаратів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

- a. Інсулін пролонгованої дії
- b. 5% розчин глюкози
- c. 40% розчин глюкози**
- d. 10% розчин глюкози
- e. Інсулін короткої дії

1297. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки 35-ти років. При огляді: свідомість відсутня, шкіра суха, дихання шумне, запах ацетону з рота. Частота дихання - 28/хв., пульс - 98/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Зі слів родичів жінка тривалий час хворіє на цукровий діабет. Після перенесеної застуди стан її погіршився: посилилась спрага, з'явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Про яке ускладнення можна подумати?

- a. Церебральна кома
- b. Гіперглікемічна кома**
- c. Гіпоглікемічна кома
- d. Печінкова кома
- e. Гіперосмолярна кома

1298. Жінка 30 хвилин тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирі, заповнені світло-жовтою рідиною. Яка площа опіку та його ступінь?

- a. 2%, I ступінь
- b. 15%, IIIB ступінь
- c. 9%, II ступінь**
- d. 5%, IIIA ступінь
- e. 25%, IV ступінь

1299. Фельдшер після проведення проби Манту дітям 7-ми років перед ревакцинацією БЦЖ повинен знати, що інтервал між проведенням проби Манту і ревакцинацією має становити:

- a. Не менше ніж 2 дні і не більше ніж 2 тижні
- b. Не менше ніж 1 день і не більше ніж 3 тижні
- c. Не менше ніж 3 дні і не більше ніж 2 тижні**
- d. Не менше ніж 2 дні і не більше ніж 3 тижні
- e. Не менше ніж 3 дні і не більше ніж 3 тижні

1300. Вагітна 25-ти років поступила в пологовий будинок у терміні 40 тижнів вагітності. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ - 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плода повздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода приглушене - 160/хв. Перейми, які

почались 6 годин тому, болючі. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пологах:

- a. Емболія навколоплідними водами
- b. Повний розрив матки
- c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- d. Загроза розриву матки**
- e. Кінець I періоду пологів

1301. Після обстеження пацієнтки 25-ти років виявлено: скарги на відсутність менструації; пігментацію шкіри на обличчі та білої лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене, м'яко- еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- a. Ендометрит
- b. Вагітність позаматкова
- c. Вагітність маткова**
- d. Ендометріоз матки
- e. Пухлина матки

1302. Фельдшер швидкої допомоги під час дослідження пульсу пацієнта виявив, що його частота складає 42/хв. Назвіть стан пацієнта:

- a. Екстрасистолія
- b. Брадикардія**
- c. Аритмія
- d. Тахікардія
- e. Дефіцит пульсу

1303. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, поприлість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

- a. Екзема**
- b. Атопічний дерматит
- c. Токсикодермія
- d. Кропив'янка
- e. Нейродерміт

1304. Ви фельдшер ФАПу, оглядаєте дитину 6-ти років з скарлатиною. Перевіряєте симптом "щипка". Про що свідчить позитивний симптом?

- a. Це фізіологічний стан шкіри
- b. Про підвищену ламкість судин шкіри**
- c. Про гіпотонус периферичних судин
- d. Про знижений тургор шкіри
- e. Про гіпертонус периферичних судин

1305. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хворої 60-ти років, у якої після стресової ситуації раптово виникли головний біль, запаморочення і серцебиття. Об'єктивно: пульс - 120/хв., АТ- 210/120 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- a. Інфаркт міокарда
- b. Кардіогенний шок
- c. Напад бронхіальної астми
- d. Гіпертонічний криз**
- e. Приступ стенокардії

1306. У пологовій залі перебуває породілля, яка годину тому народила живого доношеного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скаржиться на запаморочення, слабкість. Під час огляду: спостерігається блідість шкірних покривів та слизових оболонок, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рз- 96/хв., із статевих шляхів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у породіллі?

a. Гіпоплазія матки

b. Гіпотонія матки

c. Розрив пологових шляхів

d. Геморагічний шок

e. Атонія матки

1307. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною віком 5-ти років з такими скаргами: останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

a. Сорбенти

b. Антибіотики

c. Антигістамінні

d. Пробіотики

e. Вітаміни

1308. Акушерка оглядає вагітну жінку. Дно матки знаходиться на рівні пупка. Який термін вагітності?

a. 24 тижні

b. 20 тижнів

c. 28 тижнів

d. 32 тижні

e. 16 тижнів

1309. В гінекологічне відділення доставлена хвора зі скаргами на переймоподібні болі в лівій здухвинній ділянці, незначні кров'янисті виділення із статевих шляхів, що з'явилися після 8-тижневої затримки менструації, запаморочення. АТ- 85/55 мм рт.ст. Симптом Щоткіна-Блюмберга слабо позитивний. Матка збільшена до 5 тижнів вагітності, ліва труба збільшена, болюча. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

a. Гістероскопія органів малого таза

b. Кульдоскопія органів малого таза

c. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння

d. Метросальпінгографія

e. Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки

1310. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворі 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

a. Верапаміл

b. Еуфілін

c. Анальгін

d. Лідокаїн

e. Атропін

1311. У хворого після поранення шиї раптово виникла різка блідість шкіри, сильний біль і свистячий звук в рані. На ваших очах зупинились серце та дихання. Що трапилось з хворим?

a. Повітряна емболія

b. Шок

c. Асфіксія

d. Гостра анемія

e. Жирова емболія

1312. Хворому, з приводу кровотечі, розпочато переливання крові. Через 5 хвилин стан хворого погіршився, з'явився біль у попереку, потемніння в очах, мерехтіння "мушок", вкрився холодним потом. Виникло відчуття страху. Пульс - 110/хв., ниткоподібний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

a. Гостре порушення мозкового кровообігу

b. Повторна шлункова кровотеча

с. Гемотрансфузійний шок

- d. Анафілактичний шок
- е. Пірогенна реакція на переливання крові

1313. При відвідуванні хворої дитини 4-х років фельдшер виявив: температура тіла до 39,0°C, біль у горлі при ковтанні, головний біль, нудота. На гіперемійованому фоні шкіри дрібноточковий, яскраво-червоний висип, при натисканні шкіра блідне. Висип почався з обличчя та шиї. Носогубний трикутник блідий. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

а. Скарлатина

- b. Краснуха
- с. Кір
- d. Вітряна віспа
- е. Сироваткова хвороба

1314. В поліклініку на прийом звернулася мати з дитиною 3-х років. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, надсадний кашель, який посилюється з кожним днем, має приступоподібний характер і супроводжується блюванням, наявна в'ялість і втрата апетиту. З анамнезу відомо, що таких приступів у дитини 15-20 на добу, хворіє протягом 5 днів. Що з дитиною?

- а. Ангіна
- b. Бронхіт

с. Кашлюк

- d. Пневмонія
- е. ГРВІ

1315. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

- а. Ефедрин, алупент, атропін
- b. Цефазолін, манітол, еуфілін
- с. Строфантин, адреналін, тавегіл

d. Седуксен, димедрол, аміназин

- е. Кордіамін, супрастин, анальгін

1316. У дитини 5-ти років температура тіла - 38,2°C, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болючий при пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який попередній діагноз?

- а. Колі-ентерит
- b. Стафілококовий ентероколіт
- с. Ешерихіоз

d. Дизентерія

- е. Сальмонельоз

1317. У дитини 5-ти років на 8-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла та везикульозною висипкою, з'явилися сильний головний біль, блювання, загальмованість, тремор кінцівок. У дитини діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого інфекційного захворювання може бути енцефаліт?

а. Вітряна віспа

- b. Краснуха
- с. Кір
- d. Скарлатина
- е. Ентеровірусна інфекція

1318. Потерпілий внаслідок ДТП збуджений, голосно кричить, реально не оцінює свій стан. При огляді виявлено: рану середньої третини правої гомілки, в глибині якої видно уламки кісток.

Значна артеріальна кровотеча. Що потрібно виконати в першу чергу при наданні першої допомоги потерпілому?

a. Тимчасова зупинка кровотечі

- b. Транспортна іммобілізація
- c. Рентгенологічне обстеження
- d. Боротьба з шоком
- e. Асептична пов'язка

1319. Які головні реанімаційні заходи проводять при клінічній смерті?

- a. Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання
- b. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- c. Штучна вентиляція легень
- d. Переведення на апаратне дихання

e. Закритий масаж серця, штучна вентиляція легень

1320. Дитині 7 місяців, на штучному вигодовуванні (коров'яче молоко, манна каша). Поступила в стаціонар з підвищеною температурою до 37,8°C, короткочасними приступами тоніко-клонічних судом, ознаками рахіту II ступеня. Позитивні симптоми Ерба, Труссо, Маслова. Зазначте патологічний стан, що став причиною судом:

- a. Епілепсія
- b. –
- c. Менінгоенцефаліт

d. Спазмофілія

e. Ниркова еклампсія

1321. При обстеженні вагітної, фельдшер визначив, що поздовжня вісь плода і матки перетинається під прямим кутом. Серцебиття плода вислуховується зліва на рівні пупка до 140/хв., ясне, ритмічне. Яке положення та позиція плода?

- a. Косе, I позиція
- b. Поздовжнє, II позиція
- c. Поздовжнє, I позиція
- d. Поперечне, II позиція

e. Поперечне, I позиція

1322. ШМД приїхала на місце ДТП. Потерпілого збив автомобіль. Він скаржиться на біль, відсутність рухів в правій верхній кінцівці. Об'єктивно: в середній третині правого передпліччя при пальпації відмічається біль, крепітація, патологічна рухомість. Яке ушкодження отримав потерпілий?

- a. Вивих
- b. Забій
- c. Розтягнення
- d. Розрив

e. Перелом

1323. Пацієнта 40-ка років, готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Яку клізму необхідно застосувати для підготовки пацієнта?

- a. Емульсійну
- b. Поживна

c. Очисну

- d. Гіпертонічну
- e. Олійну

1324. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргою на різку болючість в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 37,2°C, нудота, блювання. Позитивні симптоми: Іцоткіна-Блумберга, Воскресенського, Ровзінга. Який попередній діагноз?

- a. Виразкова хвороба
- b. Гострий холецистит
- c. Гострий апендицит**

- d. Гострий панкреатит
- e. Гострий пієлонефрит

1325. Ви фельдшер ФАПу. Проводите взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менінгокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в бак лабораторію:

- a. 2 години
- b. 30 хвилин
- c. 3 години
- d. 6 годин
- e. 1 година

1326. У хворого на бронхіальну астму напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу, в/в введення еуфіліну ефекту не дали. Вимушене положення тіла, частота дихання - 36/хв., кашель з незначним виділенням харкотиння. Рс- 84/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Дистанційні сухі хрипи. Який препарат найбільш доцільно приготувати?

- a. Астмопент
- b. Ефедрин
- c. Преднізолон
- d. Адреналін
- e. Морфін

1327. У пацієнта який звернувся на ФАП виявили туберкульоз та транспортували до спеціалізованого закладу. Який вид дезінфекції буде проведений на ФАПі?

- a. Механічна
- b. Генеральне прибирання
- c. Профілактична
- d. Вогнищева заключна
- e. Поточна

1328. До пацієнтки 38-ми років приїхала на виклик ШМД. Жінка поскаржилася, що прокинулася вночі від раптового, різкого, швидко наростаючого болю у правому підребер'ї, який іррадіював у праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою і повторним блюванням. Позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі. Який препарат підготує фельдшер в цій ситуації?

- a. Димедрол
- b. Анестезин
- c. Алохол
- d. Церукал
- e. Атропін

1329. Фельдшера викликано до пацієнта з гострою затримкою сечовипускання після ниркової коліки. Є підозра на сечокам'яну хворобу. Яку першочергову долікарську допомогу повинен надати фельдшер?

- a. Застосувати міхур з льодом
- b. Ніжні гарячі ванни
- c. Поставити постійний катетер
- d. Застосувати сечогінні засоби
- e. Сидячу теплу ванну

1330. Повторно народжуюча, в терміні пологів, з регулярною пологовою діяльністю. В анамнезі: кесарів розтин. Під час перейм відчула розлитий біль в ділянці післяопераційного рубця. При піхвовому дослідженні: відкриття шийки матки 5 см. Які подальші дії?

- a. Очікувальна тактика ведення пологів
- b. Накладання акушерських щипців
- c. Пологи через природні статеві шляхи
- d. Стимуляція пологової діяльності
- e. Кесарів розтин

1331. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який

виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

- a. Дицинон
- b. Баралгін**
- c. Вікасол
- d. Алохол
- e. Нітрогліцерин

1332. До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги:

- a. Остеоартроз
- b. Подагра
- c. Ревматоїдний артрит
- d. Остеохондроз
- e. Ревматична хвороба**

1333. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий, раптовий біль внизу живота справа, нудота, блювання, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс-92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Фіброміома
- b. Гострий апендицит
- c. Перекрут ніжки кісти яєчника
- d. Позаматкова вагітність
- e. Апоплексія яєчника**

1334. На ФАП прийшла вагітна. При огляді над входом в малий таз пальпується неправильної форми передлегла частина м'якої консистенції, яка не балотує. У дні матки визначається голівка. Визначте передлежання плоду:

- a. Косе
- b. Ніжне
- c. Головне
- d. Тазове**
- e. Поперечне

1335. При ознайомленні з лабораторними дослідженими загального аналізу сечі виявлено наступні показники: лейкоцити - 5-6 в полі зору, епітелій -1-2 в полі зору, еритроцити - 40-50 в полі зору, циліндри -1-2 в полі зору. Як слід трактувати такі зміни в сечі?

- a. Піурія
- b. Лейкоцитурія
- c. Протеїнурія
- d. Гематурія**
- e. Глюкозурія

1336. Мати з 6-ти річною дитиною звернулася до фельдшера ФАПу, що її дитину в області обличчя вкусила комаха. При огляді фельдшер виявив еластичну припухлість на щоках, повіках, охриплість голосу. Дитина неспокійна, температура - 38°C. Такий стан відповідає:

- a. Сінній лихоманці
- b. Еклампсії
- c. Кропив'янці
- d. Гнейсу
- e. набряку Квінке**

1337. При обстеженні породіллі виявлено: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

- a. Лактопоез
- b. Лактогенез
- c. Гіпогалактія

d. Лактостаз

- e. Мастит

1338. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з головку шпильки. Визначте діагноз:

a. Фолікулярна ангіна

- b. Катаральна ангіна
- c. Виразково-плівчаста ангіна
- d. Дифтерія глотки
- e. Лакунарна ангіна

1339. Фельдшер ШМД виїхав на місце ДТП, хворий з відкритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У нього діагностовано: правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:

- a. Проекція плеврального синуса
- b. 6-те міжребер'я по задньопаховій лінії
- c. Місце найбільшої тупості, визначеної під час перкусії
- d. 2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії**
- e. 7-ме міжребер'я по лопатковій лінії

1340. Під час критичного зниження температури тіла пацієнт відчув різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Назвіть ускладнення, яке виникло у пацієнта:

- a. Шок
- b. Сопор
- c. Колапс**
- d. Марення
- e. Кома

1341. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психо-патологічний синдром:

a. Кандинського-Клерамбо

- b. Невротичний
- c. Астенічний
- d. Маніакальний
- e. Корсакова

1342. Бригаду ШМД викликали до дівчинки 8-ми років, яка після введення самостійно ін'єкцій інсуліну швидко знепритомніла. При огляді: шкіра, слизові оболонки, язик вологі, тризм жувальних м'язів. Для надання невідкладної медичної допомоги фельдшеру необхідно ввести 20% розчин глюкози. Вкажіть найдоцільніший шлях і метод введення даного препарату:

a. Внутрішньовенно струминно

- b. Внутрішньовенно краплинно
- c. Підшкірно повільно
- d. Внутрішньом'язово дробно
- e. У ротову порожнину поступово