

1. Алгоритм MARCH є ключовим компонентом концепції TCCC (Tactical Combat Casualty Care) і використовує:
 - a. Ліквідація будь-яких порушень дихання, усунення гіпотермії, оцінка та забезпечення стабільного кровообігу
 - b. Оцінка та забезпечення стабільного кровообігу, усунення гіпотермії, ліквідація будь-яких порушень
 - c. Усунення масивної кровотечі, оцінка та контроль прохідності дихальних шляхів, ліквідація будь-яких порушень
 - d. -
 - e. Усунення гіпотермії, оцінка та контроль прохідності дихальних шляхів, ліквідація будь-яких порушень
2. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги проводить серцево-легеневу реанімацію потерпілого:
 - a. Рівень сатурації менше 50%
 - b. Збільшення ціанозу обличчя
 - c. Звуження зіниць
 - d. Збільшення ціанозу кінцівок
 - e. Рівень сатурації - 75%
3. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги терміново шпиталізувала до пологового будинку жінку з вагітністю 36 тижнів:
 - a. Провести ЕКГ-дослідження
 - b. Провести катетеризацію сечового міхура
 - c. Увести нітрогліцерин внутрішньовенно
 - d. Виміряти висоту стояння дна матки та окружність живота
 - e. Виміряти АТ та зафіксувати час звернення
4. В якому підрозділі медичної установи доцільно проводити лікування пацієнта з загостренням хронічного бронхіту:
 - a. Відділенні медичної реабілітації
 - b. Відділенні соціотерапії
 - c. Денному стаціонарі терапевтичного профілю
 - d. Спеціалізованому диспансері
 - e. Стаціонарному відділенні лікарні цілодобово
5. В якому розділі бізнес-плану приватної медичної організації розглядається ринковий ризик, ризик конкуренції:
 - a. 10
 - b. 9
 - c. 8
 - d. 2
 - e. 5
6. В інфекційному відділенні на лікуванні перебуває пацієнт із діагнозом: вірусний гепатит В. Які з симптомів характерні для цього захворювання:
 - a. Гарячка, головний біль, блювання
 - b. Блювання, діарея, зневоднення
 - c. Головний біль, світлобоязнь, нежить
 - d. Жовтяниця шкіри та склер, потемніння сечі
 - e. Озноб, кашель, слюзотеча
7. Вкажіть важливу проблему становлення практики менеджменту в Україні:
 - a. Неосвіченість підприємців
 - b. Високі показники економіки
 - c. Недостатня розвиненість сучасної культури організації
 - d. Корупція
 - e. Наявність культури інновацій
8. Вкажіть вид артриту, що часто супроводжується нефролітіазом:
 - a. Ревматоїдний
 - b. Псоріатичний
 - c. Септичний
 - d. Остеоартрит
 - e. Подагричний
9. Вкажіть вид гарантованої державою доступної соціальної первинної лікувально-профілактичної допомоги:
 - a. Екстрена (швидка)
 - b. Медична реабілітація
 - c. Санітарно-епідеміологічна
 - d. Первинна медико-санітарна
 - e. Вторинна лікувально-профілактична
10. Вкажіть вид добровільного медичного страхування.

- a. Внутрішньогалузеве
- b. Групове
- c. Туристичне

d. Колективне

- e. Міжгалузеве

11. Вкажіть вид жіночого безпліддя, що зумовлене утворенням антиспермальних антитіл.

- a. Психогенне

b. Імунологічне

- c. Ендокринне
- d. Трубно-перитонеальне
- e. Маткове

12. Вкажіть головні функції неформальних лідерів.

- a. Впливи на зміну рішень формальних лідерів
- b. Вплив на ротацію функцій між її членами
- c. Вплив на якість соціальної взаємодії в середині організації
- d. Передбачення виникнення конфліктних ситуацій

e. Досягання поставленої мети та зміцнення організації

13. Вкажіть групу якостей менеджера, що включає високу професійність, стратегічне мислення, генеративність.

- a. Соціально-психологічні
- b. Адміністративно-організаційні

c. Професійно-ділові

- d. Людські
- e. Моральні

14. Вкажіть групу якостей менеджера, що включає патріотизм, національну свідомість, інтелігентність, моральність.

a. Моральні

- b. Людські
- c. Професійно-ділові
- d. Соціально-психологічні
- e. Адміністративно-організаційні

15. Вкажіть дослідження, яке необхідно проводити пацієнтам після 40 років з метою скринінгу глауком.

- a. Офтальмоскопія
- b. Периметрія

c. Тонометрія

- d. Візометрія
- e. Кампіметрія

16. Вкажіть комплекс заходів, спрямованих на знищення комах та інших членистоногих, що можуть бути переносниками інфекції.

a. Дезінсекція

- b. Дератизація
- c. Поточна дезінфекція
- d. Стерилізація
- e. Заключна дезінфекція

17. Вкажіть локалізацію болю під час типового перебігу апендициту.

- a. -

b. Права здухвинна ділянка

- c. Ліве підребер'я
- d. Праве підребер'я
- e. Ліва здухвинна ділянка

18. Вкажіть лікарський засіб, що використовується для дегідратаційної терапії набряку легень.

- a. Альбумін
- b. Преднізолон
- c. Дигоксин

d. Фуросемід

- e. Інсулін

19. Вкажіть лікарський засіб, що використовується для лікування гіпертермії у дітей на догоспітальному етапі.

- a. Діазепам

- b. Супрастин
- c. Ацетилсаліцилова кислота

d. Ібупрофен

- e. Кальцію глюконат

20. Вкажіть лікарський засіб, що використовується для усунення мускариноподібної дії (гіперсалівації)

- a. Налоксон
- b. Етиловий спирт
- c. Адреналіну гідрохлорид

d. Атропіну сульфат

- e. Лідокаїну гідрохлорид

21. Вкажіть медичний заклад особливого типу, до функцій якого входить надання медичної допомоги

- a. Диспансер
- b. Перинатальний центр
- c. Поліклініка
- d. Клініка

e. Хоспіс

22. Вкажіть медичний заклад, що надає медичну допомогу з багатьох лікарських спеціальностей у межах

- a. Станція переливання крові
- b. Санітарна станція

c. Поліклініка

- d. Хоспіс

- e. Перинатальний центр

23. Вкажіть метод визначення гостроти зору.

- a. Біомікроскопія
- b. Офтальмоскопія
- c. Периметрія
- d. Тонометрія

e. Візометрія

24. Вкажіть метод контрацепції, недоліками якого є незворотність та відсутність захисту від захворюв

- a. Природні методи планування сім'ї
- b. Сперміциди

c. Добровільна хірургічна стерилізація

- d. Гормональна контрацепція
- e. Внутрішньоматкова контрацепція

25. Вкажіть назву лікарського засобу, що підвищує рівень глюкози в крові, пригнічує синтез білка, чи

a. Дексаметазон

- b. Інсулін
- c. Аскорбінова кислота
- d. L-тироксин
- e. Німесулід

26. Вкажіть назву системи охорони здоров'я (за автором), що ґрунтується на організації та фінансуван

- a. Ейтховена
- b. Хехста
- c. Бісмарка

d. Семашка

- e. Беверіджа

27. Вкажіть найефективніший чинник, що впливає на формування менеджера.

- a. Зовнішній вигляд
- b. Вища освіта
- c. Генетичні особливості
- d. Особисте життя

e. Активний саморозвиток

28. Вкажіть об'єм розведеної вакцини проти туберкульозу, який вводиться здоровим новонародженим д

- a. 0,5 мл
- b. 2 мл

c. 0,1 мл

d. 0,2 мл

e. 1 мл

29. Вкажіть одну з основних причин інфаркту міокарда.

a. Ревмокардит

b. Тромбоз коронарної артерії

c. Дихальна недостатність

d. Аневризма аорти

e. Серцева недостатність

30. Вкажіть орієнтовний вік дитини, яка добре фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку,

a. 2 місяці

b. 8 місяців

c. 7 місяців

d. 5 місяців

e. 4 місяці

31. Вкажіть орієнтовну належну масу тіла здорової п'ятирічної дитини.

a. 15 кг

b. 22 кг

c. 26 кг

d. 20 кг

e. 24 кг

32. Вкажіть основну причину розвитку ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворювання легень).

a. Алергія

b. Атеросклероз

c. Часті вірусні захворювання

d. Паління цигарок

e. Спадковий фактор

33. Вкажіть основні аспекти організації як функції управління.

a. Розробка довгострокових цілей та напрямів діяльності організації, а також встановлення стратегій

b. Розробка управлінських рішень щодо досягнення мети організації як суб'єкта

c. Складання планів організації як суб'єкта

d. Проектування структури організації, розподіл та координація робіт із метою досягнення мети організації

e. -

34. Вкажіть передумови визначення мети організації.

a. Аналіз ситуації, опис проблеми, стратегічне планування

b. Аналіз ситуації, визначення проблеми

c. Аналіз ситуації, опис проблеми, формування стратегії

d. Узгодженість із місцевою владою

e. Реєстрація індикаторів проблем, аналіз ситуації, опис проблеми

35. Вкажіть посаду керівника недержавної форми власності, який відповідає за раціональну фінансово-

a. Ординатор

b. Старша сестра медична

c. Завідувач відділення

d. Директор

e. Головна сестра медична

36. Вкажіть правильну послідовність етапів життєвого циклу розвитку будь-якої організації.

a. Народження, юність, дитинство, зрілість, старіння, банкрутство (відновлення)

b. Банкрутство (відновлення), народження, дитинство, юність, зрілість, старіння

c. Народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, банкрутство (відновлення)

d. Народження, дитинство, юність, зрілість, банкрутство (відновлення)

e. Народження, дитинство, юність, старіння, зрілість, банкрутство (відновлення)

37. Вкажіть провідний негативний фактор, що сприяє розвитку кишкових інфекцій у зонах стихійних лих

a. -

b. Обмежений доступ до медичних послуг

c. Перевантаженість медичних систем

d. Вплив хімічних речовин на функціонування організму

e. Виробництво продуктів харчування, що не відповідає санітарним стандартам

38. Вкажіть симптом гострого апендециту, що характеризується болем в епігастральній ділянці з його

a. Бартом'є-Міхельсона

b. Щоткіна-Блюмберга

c. Ровзінга

d. Кохера-Волковича

e. Образцова

39. Вкажіть симптом гострого апендициту (за автором), що характеризується появою болю в епігастральній ділянці

a. Ровзінга

b. Образцова

c. Щоткіна-Блюмберга

d. Бартом'є-Міхельсона

e. Кохера-Волковича

40. Вкажіть спосіб введення туберкуліну під час проведення проби Манту.

a. Сублінгвально

b. Перорально

c. Внутрішньом'язово

d. Внутрішньошкірно

e. Підшкірно

41. Вкажіть тактику сестри медичної на догоспітальному етапі у разі виявлення у пацієнта ознак відмо

a. Розтерти кінцівку снігом

b. Накласти суху асептичну пов'язку на уражену ділянку

c. Занурити кінцівку в гарячу воду

d. Накласти мазеву пов'язку на уражену ділянку

e. Надати кінцівці підвищеного положення

42. Вкажіть термін ефективного використання медичних масок.

a. 7--8 годин

b. 2 доби

c. 3--4 години

d. 5--6 годин

e. 24 години

43. Вкажіть технічний нормативний документ, який визначає вимоги до надання медичної допомоги па

a. Комплексні стандарти

b. Рецепт

c. Формуляр

d. Технологічні стандарти

e. Клінічний протокол

44. Вкажіть ускладнення гіпертермічного синдрому, що виникає переважно у дітей раннього віку.

a. Фебрильні судоми

b. Шлункова кровотеча

c. Анафілактичний шок

d. Нападopodobний кашель

e. Пневмонія

45. Вкажіть форму первинної медико-санітарної допомоги, надаючи яку, лікар загальної практики опіку

a. Екстрена (швидка)

b. Педіатрична

c. Спеціальна

d. Консультативна

e. Сімейна

46. Вкажіть форму соціального медичного страхування в країнах із розвинутою системою охорони здоров'я

a. Обов'язкове

b. Приватне

c. Добровільне

d. Змішане

е. Державне

47. Вкажіть частоту компресій на грудну клітку за 1 хв під час проведення серцево-легеневої реанімації

a. 100-120

b. 130-140

c. 60-70

d. 80-90

e. 70-80

48. Восьмирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до $38,6^{\circ}\text{C}$, переймоподібний

a. Холери

b. Шигельозу

c. Сальмонельозу

d. Ботулізму

e. Черевного тифу

49. Головна сестра медична перинатального центру аналізує його діяльність. Вона виділила внутрішні

a. PEST-аналіз

b. PESTEL-аналіз

c. BSC-аналіз

d. SWOT-аналіз

e. ANPO-аналіз

50. Головна сестра медична перинатального центру аналізує його діяльність. Вона знайшла внутрішні

a. PEST-аналіз

b. ANPO-аналіз

c. SWOT-аналіз

d. PESTEL-аналіз

e. BSC-аналіз

51. Головна сестра медична розробила заходи, які заклад охорони здоров'я має виконати за рік, вказал

a. Сервісне блокування

b. Організаційний аналіз

c. Стратегічний менеджмент

d. Оперативне планування

e. Функціональне блокування

52. Дайте визначення епідемічному осередку у районах стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.

a. Територія, на якій відбулося зараження людей збудниками інфекційних хвороб, що мають пандемічні

b. Територія, на якій відбулося зараження людей збудниками інфекційних хвороб, що ще не мають масо

c. Територія, на якій у певних часових і просторових межах відбулося зараження людей збудниками інф

d. Територія, на якій у певних просторових межах відбулося зараження людей збудниками інфекційних

e. Територія, на якій у певних часових межах відбулося зараження людей збудниками інфекційних хвор

53. Дев'ятимісячна дитина народилася від другої доношеної вагітності з масою тіла --- 3200 г, зросто

a. Спазмофілія, ларингоспазм

b. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

c. Спазмофілія, карпопедальний спазм

d. Гіпервітаміноз вітаміну D

e. Спазмофілія, еклампсія

54. Десятирічна дитина з діагнозом: цукровий діабет 1-го типу, після ін'єкції інсуліну не поїла. Чер

a. негайно шпиталізувати дитину до стаціонару

b. Увести в/м 25%-й розчин магнію сульфату

c. Дати легкозасвоювані вуглеводи (цукор, солодкий чай)

d. Увести п/ш 0,182%-й розчин адреналіну

e. Увести в/м дексаметазон

55. Десятирічна дитина під час змагань раптово втратила свідомість. Під час огляду не реагує на звуко

a. Покласти міхур із льодом на обличчя

b. Провести непрямий масаж серця

c. Увести атропін 20 мкг/кг маси тіла

d. Провести дефібриляцію із початковою енергією 4 Дж/кг маси тіла

e. Провести електрокардіоверсію із початковою енергією 1 Дж/кг маси тіла

56. Десятирічному хлопчику встановлено попередній діагноз: пролапс мітрального клапана. До якого об'єкта дослідження слід направити пацієнта?

- a. Велоергометрії
- b. Електрокардіографії
- c. Рентгенографії органів грудної клітки
- d. Фонокардіографії
- e. Ехокардіографії

57. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла - 3300 г, довжиною тіла - 50 см

- a. 30 хв
- b. Не менше 2 год
- c. Протягом доби
- d. 1 год
- e. Перші 2-3 дні

58. Дитина після народження не кричить, шкіра ціанотична, ЧСС --- 80 уд./хв, рефлекси та тонус м'язів відсутні

- a. Розширення зіниць
- b. Відновлення дихання
- c. Відсутність пульсу на сонних артеріях
- d. Арефлексія
- e. Брадикардія

59. Дитину на вулиці покусав вуличний собака. З яких заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

- a. Ретельно промити укушену рану мильним розчином
- b. Заспокоїти дитину, увести знеболюючі засоби
- c. Накласти гемостатичну пов'язку на рану
- d. Обробити рану антисептиком
- e. Накласти асептичну пов'язку на рану

60. Для виявлення яких із нижченаведених захворювань проводиться неонатальний скринінг усім новонародженим?

- a. Туберкульозу, гепатиту
- b. Гепатиту, краснухи
- c. Кору, краснухи
- d. Поліомієліту, паротиту
- e. Фенілкетонурії, гіпотиреозу

61. Для фракційного вишкрібання порожнини матки сестра медична підготувала: гінекологічні дзеркала

- a. Кульові щипці
- b. Шприц Брауна
- c. Голкотримач
- d. Конхотом
- e. Скальпель

62. Для якого варіанта жіночого безпліддя є характерним виявлення специфічних ізоантител до сперми?

- a. Ендокринного
- b. Маткового
- c. Трубно-перитонеального
- d. Імунологічного
- e. Психогенного

63. Для якого виду гельмінтозу характерні такі клінічні прояви: загальна слабкість, субфебрильна температура, нудота, діарея?

- a. Ранньої стадії опісторхозу
- b. Міграційної стадії аскаридозу
- c. Кишкової стадії аскаридозу
- d. Пізньої стадії опісторхозу
- e. -

64. Для якої стадії стенозу гортані характерні такі клінічні прояви: тяжкий загальний стан пацієнта, виражені порушення дихання, синюшність шкіри?

- a. II
- b. III
- c. -
- d. I
- e. IV

65. До лікарні шпиталізовано працівника складу отрутохімікатів. Загальний стан пацієнта тяжкий, спостерігаються

a. Фосфорорганічними сполуками

- b. Ртутьорганічними сполуками
- c. Арсеновмісними сполуками
- d. Метиловим спиртом
- e. Карбаматами

66. До пологового відділення шпиталізовано жінку віком 21 рік у терміні вагітності 38--39 тижнів. На

- a. Парентеральний
- b. Трансмисивний
- c. Аерозольний
- d. Контактний

e. Вертикальний

67. До пологового відділення шпиталізовано жінку віком 32 роки у терміні вагітності 28 тижнів (вагіт

- a. Знеболювання

b. Профілактика респіраторного дистрес-синдрому у плода

- c. Пригнічення скорочувальної активності матки
- d. Симптоматична терапія
- e. Профілактика Rh-імунізації у плода під час вагітності

68. До пологового відділення шпиталізовано роділлю зі слабкою пологовою діяльністю. Їй призначено г

- a. Спинення післяпологової маткової кровотечі

b. Збільшення ритмічних скорочень матки

- c. Підвищення артеріального тиску
- d. Зниження артеріального тиску
- e. Збільшення тонічних скорочень матки

69. До приймального відділення пологового будинку шпиталізовано жінку у терміні вагітності 37 тижнів

- a. Епілепсії
- b. Геморагічного інсульту
- c. Гіпертонічного кризу

d. Еклампсії

- e. Ниркової коліки

70. До приймального відділення пологового будинку шпиталізовано жінку у терміні вагітності 37 тижнів

- a. Моніторинг артеріального тиску
- b. Проведення гіпотензивної терапії
- c. Уведення протисудомних препаратів
- d. Проведення оксигенотерапії

e. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

71. До приймального відділення шпиталізовано пацієнта у непритомному стані. Об'єктивно спостерігає

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Печінкова кома

c. Діабетична (гіперглікемічна) кома

- d. Гіпоглікемічна кома
- e. Анафілактичний шок

72. До пульмонологічного відділення шпиталізовано пацієнта, який упродовж 8 років лікується з привод

- a. Цефтріаксон
- b. Сальбутамол
- c. Лоратадин

d. Пульмікорт

- e. Еуфілін

73. До розвитку якого патологічного стану схильні пацієнти з астенічним типом тілобудови?

a. Артеріальної гіпотензії

- b. Гіпоглікемічної коми
- c. Ожиріння
- d. Артеріальної гіпертензії
- e. Гіперглікемічної коми

74. До якого виду документів відноситься положення?

- a. Фінансово-розрахункових

b. Організаційних

- c. Інформаційних
- d. Розпорядчих
- e. Наказових

75. Діяльність менеджерів спрямована на управління людьми для досягнення конкретних результатів.

- a. Розвиток людських ресурсів

b. Самоспостереження, самооцінка та інтерпретація отриманої інформації

- c. Засвоєння принципів ефективного лідерства
- d. Використання аналітичних підходів до рішення проблем
- e. Користування соціальними мережами

76. Епідемічна та екологічна безпека залежить від правильної утилізації лікарняних відходів. До якої

- a. Категорії C

b. Категорії B

- c. Категорії A
- d. Категорії D
- e. Категорії E

77. Жінка віком 22 роки на 7-у добу після пологів скаржиться на біль у лівій молочній залозі, підвищ

- a. Аденоми грудної залози
- b. Бешихи

c. Лактаційного маститу

- d. Мастопатії
- e. Раку грудної залози

78. Жінка віком 25 років годину тому отримала опік лівої кисті окропом. Об'єктивно спостерігається:

- a. Накласти пов'язку з антисептиком на уражену ділянку
- b. Накласти мазеву пов'язку на уражену ділянку
- c. Проколоти пухирі та накласти пов'язку

d. Охолодити місце опіку прохолодною проточною водою

- e. Обробити місце опіку спиртом

79. Жінка віком 25 років скаржиться на різкий біль унизу живота справа, що триває впродовж години, т

- a. Апоплексії яєчника
- b. Гострого правобічного аднекситу
- c. Розриву фолікулярної кісти правого яєчника
- d. Гострого апендициту

e. Порушеної ектопічної вагітності

80. Жінка віком 28 років скаржиться на відсутність менструації. З анамнезу відомо, що у неї 5 місяці

- a. Опсоменорея

b. Лактаційна аменорея

- c. Олігоменорея
- d. Первинна аменорея
- e. Менометрорагія

81. Жінка віком 28 років скаржиться на слабкість, серцебиття та задишку під час фізичних навантажень

- a. Реакція Грегерсена
- b. Визначення кислотності шлункового соку
- c. Проба Кумбса
- d. Копрограма

e. Дослідження рівня феритину

82. Жінка віком 29 років скаржиться на свербіж і печіння у ділянці зовнішніх статевих органів, диско

a. Трихомоніазу

- b. Бактеріального вагінозу
- c. Хламідіозу
- d. Аеробного вагініту
- e. Кандидозного вульвовагініту

83. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 32 тижні скаржиться на недостатнє відчуття рухів плода

- a. 150-200 уд./хв
- b. -

с. 120-190 уд./хв

d. 110-170 уд./хв

е. 60-80 уд./хв

84. Жінка віком 34 роки перебуває на 35-му тижні вагітності. У зв'язку з діагностованою тяжкою преек

a. Негайно

b. Протягом 2-3 год

с. Упродовж наступних 24 год

d. Упродовж наступних 72 год

е. Упродовж наступних 48 год

85. Жінка віком 35 років, перебуваючи в задушливому приміщенні, раптово знепритомніла. Об'єктивно с

a. Лежачи на лівому боці

b. Горизонтальне, з трохи піднятими нижніми кінцівками

с. Лежачи на правому боці

d. Лежачи на животі

е. Горизонтальне, з піднятим на 30° головним кінцем ліжка

86. Жінка віком 44 роки перебуває в непритомному стані. Зі слів родичів з'ясувалося, що жінка хворіє

a. 5%-й розчин глюкози

b. Інсулін короткої дії

с. 0,1%-й розчин адреналіну

d. Інсулін тривалої дії

е. 40%-й розчин глюкози

87. Жінка віком 48 років скаржиться на загальну слабкість, задишку, що часто виникає вночі, відчуття

a. Рентгенографія ОГК

b. Електрокардіографія

с. Коронарографія

d. Ехокардіоскопія

е. Спірометрія

88. Жінка віком 53 роки, яка хворіє на артеріальну гіпертензію, за призначенням лікаря приймає комбі

a. Периндоприл та індапамід

b. Каптоприл та індапамід

с. Периндоприл і гідрохлортіазид

d. Каптоприл і гідрохлортіазид

е. Еналаприл і гідрохлортіазид

89. Жінка віком 58 років скаржиться, що 8 годин тому відчула різку слабкість у лівій руці та нозі, п

a. Транзиторної ішемічної атаки

b. Субарахноїдального крововиливу

с. Епідурального крововиливу

d. Геморагічного інсульту

е. Ішемічного інсульту

90. Жінка віком 61 рік після емоційного перенавантаження відчула нападopodobний пекучий біль за гру

a. Гідазепам

b. Фуросемід

с. Каптоприл

d. Нітрогліцерин

е. Ібупрофен

91. Жінка віком 64 роки скаржиться на біль у кульшових суглобах, обмеження рухів, порушення ходи (к

a. Індометацин

b. Мелоксикам

с. Диклофенак

d. Метамізол

е. Напроксен

92. Жінка віком 85 років раптово зблідла та втратила свідомість. Під час запису ЕКГ зафіксовано AV-б

a. Внутрішньовенне введення атропіну

b. Внутрішньовенне введення аденозину

с. Вагусні проби

d. -

e. Екстрена електрокардіоверсія

93. Жінці в терміні вагітності 34 тижні діагностовано тяжку преєклампсію. Для профілактики якого пат

a. Відшарування плаценти в пологах

b. Геморагічного шоку

c. Крововтрати в пологах

d. Передчасних пологів

e. Судом

94. За яких із нижченаведених умов групу людей можна вважати організацією?

a. Наявності підконтрольної та контрольованої систем

b. Наявності хоча б однієї людини, у якої є певна мета та ресурси для її досягнення

c. Наявності не менше двох осіб і хоча б однієї спільної мети, яку всі учасники групи прагнуть досяг

d. Наявності людей зі спільними цілями та ресурсами

e. Наявності відповідальності та деякого рівня автономії

95. За якою формулою вираховується приблизна маса тіла дитини віком 2--11 років? (n --- кількість ро

a. $80 + 2n$

b. $75 + 5n$

c. $37 + 2n$

d. $10 + 2n$

e. $11 + 2n$

96. Завдяки якій експертизі якості сестра медична-керівник має можливість оцінити ефективність прий

a. Міжгалузевій

b. Міжнародній

c. Зовнішній

d. Внутрішній

e. Незалежній

97. Залежність від зовнішнього середовища --- це одна з найважливіших характеристик медичної орган

a. Екологічна ситуація та природно-кліматичні умови

b. Демографічна ситуація та норми поведінки людей

c. Міжнародні події та політична ситуація в країні

d. Споживачі, конкуренти, постачальники ресурсів

e. Стан економіки та науково-технічний прогрес

98. Калій відіграє важливу роль у роботі серцевого м'яза та регулюванні серцевого ритму. Які з нижче

a. М'ясо, печінка

b. Макаронні вироби, хліб

c. Банани, сухофрукти

d. Морква, буряк

e. Молоко, вершки

99. Керівники повинні розвивати в собі якості, що забезпечують і формують ефективний стиль роботи. Я

a. Лідерськими здібностями

b. Чесністю

c. Авторитаризмом

d. Високою професійністю

e. Внутрішнім контролем

100. Класифікуйте вид відходів, відповідно до наказу МОЗ України № 325, що утворюються внаслідок ви

a. Специфічні

b. Побутові

c. Синтетичні

d. Неспецифічні

e. Медичні

101. Кому з нижченаведених пацієнтів показане лікування в денному стаціонарі медичного центру?

a. Пацієнту віком 49 років із загостренням хронічного холециститу

b. Пацієнтці віком 78 років із IV стадією раку шлунка

c. Пацієнту віком 56 років із термінальною стадією цирозу печінки

d. Пацієнту віком 67 років із гострим порушенням мозкового кровообігу

е. Пацієнтці віком 27 років, якій показаний остеосинтез

102. Конфліктом вважається суперечність поглядів або інтересів двох або більше людей, груп, організацій

а. Консерватизм і надмірні емоційні прояви членів організації

б. Психологічна несумісність, низька культура та низький рівень професійної підготовки

с. Рисова відмінність лідерів групи

д. Низькі моральні якості та цінності членів групи

е. Наявність у групі однотипних членів негативних лідерів та осіб із вираженими акцентуаціями характеру

103. На другу добу життя у новонародженої дитини спостерігається виділення сечі жовтувато-цегляного кольору

а. Фізіологічної еритеми

б. Фізіологічної жовтяниці

с. Токсичної еритеми

д. Фізіологічної гіпертермії

е. Сечокислого інфаркту

104. На четвертий день життя у доношеної новонародженої дівчинки з'явилися кров'янисто-слизові виділення з піхви

а. Гнійного маститу

б. Сечокислого інфаркту

с. Статевого кризу

д. Катарального омфаліту

е. Вульвовагініту

105. На четвертій стадії структури процесу управління проводиться коригування та координація процесу управління

а. Не зміниться за жодних обставин

б. Може змінюватися

с. Проходить етап додаткового аналізу

д. Регулюється наміченим планом

е. Переходить на наступний етап

106. На якому етапі проводиться оцінка прохідності верхніх дихальних шляхів згідно протоколу MARCH

а. H

б. C

с. R

д. M

е. A

107. На якому з етапів процесу управління організацією відбувається проєктування та планування управління

а. 4

б. 3

с. 1

д. 5

е. 2

108. На якому рівні менеджменту визначаються цілі та можливі результати діяльності медичної організації

а. Тактичному

б. Оперативному

с. Стратегічному

д. Функціональному

е. Технічному

109. Нефротичний синдром - це клініко-лабораторний симптомокомплекс, що може розвиватися внаслідок

а. α -амілази

б. Сироваткового заліза

с. Холестерину

д. Натрію

е. Глюкози

110. Новонароджена дитина народилася від переношеної вагітності з масою тіла 5 кг із проведенням реанімації

а. 2%-й розчин еуфіліну

б. Преднізолон

с. 0,5%-й розчин сібазону

д. Дексаметазон

е. 20%-й розчин глюкози

111. Обґрунтуйте мету призначення ціанокобаламіну у разі гіперхромної (мегалобластної) анемії.

a. Стимулює еритропоез

b. Підвищує згортання крові

c. Стимулює лейкопоез

d. Виявляє антикоагуляційні властивості

e. Виявляє антиагрегантні властивості

112. Одинадцятирічна дівчинка скаржиться на інтенсивний тривалий біль у верхній частині живота та п

a. Загальний аналіз сечі

b. Езофагогастродуоденоскопію

c. Аналіз калу на приховану кров

d. Ультразвукове дослідження ОЧП

e. Копрологічне дослідження калу

113. Одразу після народження дитини у породіллі виникла рясна кровотеча зі статевих шляхів та почал

a. 20%

b. 30%

c. 10%

d. 15%

e. 50%

114. Організована сукупність документів та інформації, комп'ютеризована технологія обробки інформації

a. Збір інформації, аналіз даних, синтез даних, систематизація інформації

b. Пошук і систематизація інформації, зберігання та організація даних

c. Накопичення інформації, зберігання, накопичення, пошук і передача даних, систематизація інформації

d. Збір інформації, збереження, накопичення, обробка даних, планування та організація системи

e. Збирання та зберігання інформації

115. Основною формою медсестринської комунікації є спілкування сестри медичної та пацієнта, успішні

a. Виникнення комунікативних бар'єрів

b. Пасивність учасників комунікації

c. Відсутність спільного комунікативного простору

d. Неправильність думки співрозмовника та відповідна реакція на неї

e. Формування, отримання, перероблення інформації та розвиток стосунків

116. П'ятирічна дитина перебуває у непритомному стані. Вкажіть тривалість перевірки дихання у неї за

a. Впродовж 60 с

b. Не більше 2 хв

c. Впродовж 30 с

d. Впродовж 5 хв

e. Не більше 10 с

117. Паліативний пацієнт віком 74 роки, у якого 14 днів тому розвинулося гостре порушення мозкового

a. Нортон

b. Бартела

c. Глазго

d. Берга

e. Ватерлоу

118. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праву лопатку. Напе

a. Гострого панкреатиту

b. Гострого холециститу

c. Гострого апендициту

d. Перфоративної виразки шлунку

e. Кишкової непрохідності

119. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,5°C, симетричний мігрук

a. Тропоніну

b. alpha-1-антитрипсину

c. Ревматоїдного фактора

d. Серумукоїду

e. Антистрептолізину-O

120. Пацієнт віком 26 років, в присутності якого сестра медична виконувала ін'єкцію іншому пацієнту,

- a. Прикласти грілки до кінцівок
- b. Зробити ін'єкцію кордіаміну
- c. Надати сидяче положення
- d. Прикласти міхур із льодом до потиличної ділянки

e. Надати горизонтальне положення з припіднятими нижніми кінцівками

121. Пацієнт віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$

- a. Пікфлоуметрію
- b. Флюорографію ОГК
- c. Спірометрію

d. Рентгенографію ОГК

e. Бронхографію

122. Пацієнт віком 29 років упродовж 2,5 тижнів скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки,

- a. Емпієми плеври
- b. Ексудативного плевриту

c. Абсцесу легені

- d. Сухого плевриту
- e. Гострого бронхіту

123. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на блювання та різкий <<кинджальний>> біль у надчеревній ді

- a. Пенетрація
- b. Пілоростеноз

c. Перфорація

- d. Кровотеча
- e. Малігнізація

124. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, субфебрильну температуру тіла, набряки під очим

- a. Аналіз сечі за Зимницьким
- b. Аналіз сечі на глюкозу

c. Аналіз сечі за Нечипоренко

- d. Загальний аналіз крові
- e. Біохімічний аналіз крові

125. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, шум у вухах, відчуття жа

- a. Набутої вади серця
- b. Апластичної анемії

c. Справжньої поліцитемії

- d. Гемофілії
- e. Кропив'янки

126. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у грудній клітці зліва, що посилюється під час диханн

a. Гострого бронхіту

b. Сухого плевриту

- c. Бронхіальної астми
- d. Бронхоектатичної хвороби
- e. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту

127. Пацієнт віком 45 років скаржиться на тривалий кашель, втрату маси тіла, загальну слабкість, ніч

- a. Позитивна проба Манту
- b. Лейкоцитоз

c. Виявлення збудника туберкульозу в мокротинні

- d. Позитивний квантифероновий тест
- e. Рентгенологічні зміни органів грудної клітки

128. Пацієнт віком 49 років скаржиться на серцебиття, задишку, запаморочення та інтенсивний загрудн

a. Фонокардіографію

b. Електрокардіографію

- c. Томографію
- d. Доплерографію
- e. Ехокардіографію

129. Пацієнт віком 55 років скаржиться на пекучий біль за грудниною, відчуття нестачі повітря та стр

a. Нітрогліцерин

b. Морфін

c. Сіднофарм

d. Ніфедипін

e. Верапаміл

130. Пацієнт віком 56 років упродовж 10-ти років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень

a. Конічна

b. Астенічна

c. Паралітична

d. Гіперстенічна

e. Бочкоподібна

131. Пацієнт віком 61 рік скаржиться на біль у ділянці серця стискального характеру, що іррадіює у л

a. Анальгін

b. Корвалол

c. Еналаприл

d. Нітрогліцерин

e. Преднізолон

132. Пацієнт віком 61 рік скаржиться на нападоподібний біль у ділянці серця (за грудниною) стискаючо

a. Дексаметазон

b. Анальгін

c. Преднізолон

d. Нітрогліцерин

e. Еналаприл

133. Пацієнт віком 62 роки з діагнозом: синусова тахіаритмія, приймає анаприлін у дозі 10 мг 3 рази

a. Бронхоспазм

b. Тахікардія

c. набряк легень

d. Артеріальна гіпертензія

e. Утворення виразок

134. Пацієнт віком 68 років скаржиться на відчуття тяжкості та тупий біль у правому підребер'ї, нудо

a. Хронічного панкреатиту

b. Цирозу печінки

c. Хронічного холангіту

d. Жовчнокам'яної хвороби

e. Хронічного холециститу

135. Пацієнт віком 68 років скаржиться на відчуття тяжкості та тупий біль у правому підребер'ї, нудо

a. Синдрому холестазу

b. Хронічного панкреатиту

c. Цирозу печінки

d. Жовчнокам'яної хвороби

e. Хронічного некалькульозного холециститу

136. Пацієнт гематологічного відділення скаржиться на слабкість, виражену пітливість, свербіж шкіри,

a. Залізодефіцитної анемії

b. Апластичної анемії

c. Хвороба Годжкіна

d. Хронічної постгеморагічної анемії

e. Хвороби Верльгофа

137. Пацієнт лікується в гастроентерологічному відділенні з діагнозом: цироз печінки. Які клінічні с

a. Асцит, <<голова медузи>>, збільшення печінки

b. Нудота, блювання, закрепи

c. Шкірний свербіж, зміна кольору сечі та випорожнень

d. Носові кровотечі, крововиливи, <<шкіра леопарда>>

e. Телеангіоектазії, печінкові долоні, жовтяниця, гінекомастія, лихоманка

138. Пацієнт самостійно обрав страхову компанію для медичного страхування та уклав із нею угоду. Як

a. Вигодонабувача

b. Застрахованої особи

с. Страхувальника

d. -

e. Страховика

139. Пацієнт скаржиться на біль у ділянці шлунку, пов'язаний із прийманням їжі. Лікар припускає у нь

a. Фіброезофагогастроуденоскопія

b. Рентгеноскопія шлунку

с. Загальний аналіз крові

d. Магнітно-резонансна томографія

e. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

140. Пацієнт скаржиться на стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та лопатку, що вин

a. Міжреберної невралгії

b. Дрібновогнищевого не Q-інфаркту міокарда

с. Великовогнищевого Q-інфаркту міокарда

d. Стенокардії напруження

e. Стенокардії спокою

141. Пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки скаржиться на слабкість, задишк

a. Апластична анемія

b. Залізодефіцитна анемія

с. Справжня поліцитемія (хвороба Вакеза)

d. Гемолітична анемія

e. Еритремія

142. Пацієнт із циркулярною гіпсовою пов'язкою на нижній кінцівці скаржиться на сильний біль у нозі.

a. Розрізати гіпсову пов'язку

b. Надати кінцівці підвищеного положення

с. Зняти гіпсову пов'язку

d. Застосувати холод на кінцівку

e. Увести знеболюючі та спазмолітичні засоби

143. Пацієнта віком 34 роки шпиталізовано до гематологічного відділення з припущенням на хронічний

a. Спленомегалія

b. Трофічні виразки на нижніх кінцівках

с. Набряки на нижніх кінцівках

d. Лімфаденопатія

e. Виразково-некротична ангіна

144. Пацієнта віком 37 років шпиталізовано до лікарні в непритомному стані. В анамнезі: цукровий діа

a. 0,1%-й розчин адреналіну

b. 0,9%-й розчин натрію хлориду

с. 2,5%-й розчин гідрокортизону

d. 40%-й розчин глюкози

e. 5%-й розчин глюкози

145. Пацієнта шпиталізовано до лікарні у непритомному стані. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда

a. Холестаз

b. Печінкова кома

с. Септичний шок

d. Гіпоглікемічна кома

e. Гіперглікемічна кома

146. Пацієнта шпиталізовано до терапевтичного відділення із симптомами сечокам'яної хвороби. Під ча

a. Екскреторна урографія

b. Ультразвукове дослідження

с. Уретроцистоскопія

d. Оглядова урографія

e. Магнітно-резонансна томографія

147. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на відсутність менструації упродовж 4-х місяців. Під час ла

a. Алопуринол

b. Гідазепам

с. Каптоприл

d. Домперидон

e. Каберголін

148. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,5°C, відчуття серцебиття

a. Псоріазу

b. Кропив'янки

c. Системного червоного вовчака

d. Гострої ревматичної гарячки

e. Простого контактного дерматиту

149. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на рясні виділення зі статевих шляхів із неприємним "рибним

a. Генітального герпесу

b. Хламідіозу

c. Кандидозного вульвовагініту

d. Трихомоніазу

e. Бактеріального вагінозу

150. Пацієнтка віком 25 років, яка 2 тижні тому перехворіла на гострий тонзиліт, скаржиться на тупий

a. Гострого гломерулонефриту

b. Гострого циститу

c. Гострого пієлонефриту

d. Хронічного пієлонефриту

e. Сечокам'яної хвороби

151. Пацієнтка віком 25 років, яка хворіє на хронічний гастрит, скаржиться на дискомфорт в епігастра

a. Шлункової диспепсії

b. Ахілії

c. Підвищеної секреції шлунку

d. Целіакії

e. Мальабсорбції

152. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на дратівливість, слабкість, поганий сон, тремор та пітливі

a. Артеріальної гіпертензії

b. Гіпертиреозу

c. Ендемічного зобу

d. Цукрового діабету

e. Гіпотиреозу

153. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на задишку, помірний кашель із виділенням невеликої кількості

a. Бронхоектатичної хвороби

b. Ексудативного плевриту

c. Міжреберної невралгії

d. Абсцесу легені

e. Пневмонії

154. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на напад серцебиття, що виник уперше на тлі повного здоров'я

a. Вагусних проб

b. Уведення аміодарону

c. Уведення АТФ

d. Застосування метапрололу

e. Кардіоверсії

155. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на бурчання та відчуття переливання в животі, вздуття, част

a. Ліпідограма

b. Коагулограма

c. Протеїнограма

d. Іонограма

e. Копрограма

156. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на постійний біль у ділянці серця, задишку, перебої в роботі

a. Ехокардіографія

b. Коронарографія

c. Електрокардіографія

d. Велоергометрія

е. Рентгенографія органів грудної клітки

157. Пацієнтка віком 48 років після вживання надмірно гострої та жирної їжі відчула різкий, нападопо

- a. Кишкової коліки
- b. Гострого панкреатиту

с. Печінкової коліки

- d. Ниркової коліки
- e. Гострого апендициту

158. Пацієнтка віком 49 років після фізичного перенавантаження відчула раптове часте серцебиття, ди

- a. Дефібриляція
- b. Черезстравохідна електростимуляція
- c. Катетерна абляція
- d. Електрична дефібриляція

е. Проба Вальсальви

159. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на напади серцебиття, що раптово починаються і раптово за

- a. Синусової аритмії
- b. Передсердної екстрасистолії

с. Пароксизмальної тахікардії

- d. Синусової брадикардії
- e. Синусової тахікардії

160. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на слабкість, біль у ділянці правого підребер'я, пожовтіння

- a. Печінкової
- b. -

с. Механічної

- d. Гемолітичної
- e. Паренхіматозної

161. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на головний біль у потиличній ділянці, запаморочення, нудоту

- a. Напад миготливої аритмії

b. Гіпертонічний криз

- c. Напад стенокардії
- d. Порушення мозкового кровообігу
- e. Гостра судинна недостатність

162. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на дратівливість, плаксивість, емоційну лабільність, прискор

- a. Гіпотиреозу

b. Гіпертиреозу

- c. Синдрому Іценко-Кушинга
- d. Гіпертонічного кризу
- e. Аддісонового кризу

163. Пацієнтка віком 55 років перебуває в непритомному стані. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий

- a. Кардіогенний шок
- b. Анафілактичний шок
- c. Гіпертонічний криз

d. Гіпоглікемічна кома

- e. Гіперглікемічна кома

164. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на зниження фізичної активності, сухість та лущення шкіри,

- a. Вузлового токсичного зоба
- b. Гострого тиреоїдиту
- c. Тиреотоксикозу
- d. Хронічного тиреоїдиту

е. Гіпотиреозу

165. Пацієнтка віком 58 років хворіє на артеріальну гіпертензію впродовж 6-ти років. Після психоемоц

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Ішемічний інсульт
- c. Геморагічний інсульт
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Гіпертензивний криз

166. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на пощипування язика, зниження апетиту, втрату смакових

- a. Гіпопластичної
- b. Апластичної
- c. Вітамін В₁₂-дефіцитної
- d. Постгеморагічної
- e. Залізодефіцитної

167. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на різкий пульсуючий головний біль у потиличній ділянці, шу

- a. Нітрогліцерин
- b. Бісопролол
- c. Амлодипін
- d. Еналаприл
- e. Каптоприл

168. Пацієнтка скаржиться на виникнення спонтанних крововиливів на шкірі, маткові кровотечі, загаль

- a. Глюкокортикостероїди
- b. Антикоагулянти
- c. Кровоспинні
- d. Антибіотики
- e. Десенсибілізуючі

169. Пацієнтку віком 74 роки, яка хворіє на цукровий діабет, шпиталізовано до лікарні в непритомному

- a. Гіперлактацидемічна
- b. Гіперкетонемічна
- c. Гіперосмолярна
- d. -
- e. Кетоацидотична

170. Пацієнту встановлено діагноз: бронхіальна астма. Який прилад йому доцільно використовувати з м

- a. Небулайзер
- b. Спірометр
- c. Кишеньковий інгалятор
- d. Пульсоксиметр
- e. Пікфлуометр

171. Пацієнту встановлено діагноз: гострий іридоцикліт. Який із нижченаведених лікарських засобів ви

- a. 1%-й розчин атропіну сульфату у формі очних крапель
- b. Розчин фурациліну (промивання ока)
- c. Спиртовий розчин календули (змащування шкіри повіки)
- d. 1%-й розчин пілокарпіну у формі очних крапель
- e. Тетрациклінова мазь (закладання за повіку)

172. Пацієнту встановлено попередній діагноз: гострий лейкоз - та з діагностичною метою призначено

- a. Груднина
- b. Плечова кістка
- c. Хребець
- d. Потилічна кістка
- e. Ребро

173. Пацієнту встановлено попередній діагноз: шигельоз. Який специфічний лабораторний метод діагн

- a. Бактеріологічний
- b. Біохімічний аналіз крові
- c. Біологічний
- d. Аналіз крові на глюкозу
- e. Загальний аналіз крові

174. Пацієнту віком 34 роки у складі комплексної терапії захворювання дихальних шляхів, що супровод

- a. Мукалтин
- b. Амброксол
- c. Глауцин
- d. Ацетилцистеїн
- e. Еуфілін

175. Пацієнту віком 43 роки встановлено попередній діагноз: залізодефіцитна анемія. Сукупність яких

- a. Блідість шкіри із зеленкуватим відтінком, сухість і стоншення шкіри, спотворення смаку, "географі
- b. Блідість шкіри, кровоточивість слизових оболонок (ясен), гарячка не пов'язана з інфекцією, збільш
- c. Блідість шкіри з лимонним відтінком, іктеричність склер, спленомегалія, глосит, порушення чутливо
- d. Блідість шкіри, геморагічні висипання зірчастої форми, подекуди з некрозами шкіри, гарячка, біль
- e. Блідість шкіри, збільшення лімфатичних вузлів, гарячка, гепатоспленомегалія

176. Пацієнту віком 65 років, який хворіє на хронічну серцеву недостатність, сестра медична за призн

a. Гіпермагніємія

b. Гіпокаліємія

c. Гіпернатріємія

d. Гіпокальціємія

e. Гіперкаліємія

177. Пацієнту віком 67 років із діагнозом: хронічна серцева недостатність призначено дигоксин. З яки

a. Глюконатом кальцію

b. Панагіном

c. Гідрохлортіазидом

d. Парацетамолом

e. Еуфіліном

178. Пацієнту з діагнозом: холера, призначено регідратаційну терапію. Вкажіть вплив цього виду терап

a. Відновлює водно-електролітний баланс

b. Бактеріостатично діє на збудника

c. Бактерицидно діє на збудника

d. Чинить протиалергічну дію

e. Позбавляє проявів інтоксикації

179. Пацієнту з діагнозом: інфаркт міокарда, призначено 2500 ОД гепарину 4 рази на добу підшкірно. Я

a. 0,4 мл

b. 0,2 мл

c. 0,3 мл

d. 0,5 мл

e. 0,1 мл

180. Пацієнту інфекційного стаціонару встановлено діагноз: дифтерія ротоглотки - та з лікувальною

a. Знищенні збудника інфекції

b. Забезпеченні седативного ефекту

c. Стимуляції імунної системи

d. Нейтралізації токсину

e. Стабілізації гемодинаміки

181. Пацієнтці призначено комплексне лікування декомпенсованої хронічної серцевої недостатності. Як

a. Еналаприл

b. Аспаркам

c. Фуросемід

d. Верошпірон

e. Карведилол

182. Посадова інструкція визначає організаційно-правовий стан працівника в структурному підрозділі т

a. Основні завдання працівника, що базуються на певних навичках і повноваженнях

b. Перелік інструкцій до виконання завдань для кожного працівника

c. Основні завдання, обов'язки, функції та якості працівника

d. Загальні положення основних засад роботи організації

e. Права та обов'язки управлінця та працівника

183. Потерпілому внаслідок ДТП чоловіку віком 44 роки проведено ургентне оперативне втручання з пр

a. Тонкого кишечника

b. Підшлункової залози

c. Селезінки

d. Печінки

e. Шлунка

184. Працівник керамічного цеху скаржиться на неприємний смак у роті, переймоподібний біль у живот

a. Свинцем

- b. Чотирихлористим вуглецем
- c. Бензолом
- d. Марганцем
- e. Ртуттю

185. Під час виконання бойового завдання солдат зазнав травматичної ампутації кінцівки. Спостерігаєт

- a. MARCH-E
- b. MARCH-PAWS
- c. MARCH-ABC
- d. MARCH-DE
- e. MARCH-ELS

186. Під час виконання професійних обов'язків сестра медична робила фотофіксацію своєї роботи на те

- a. Дисциплінарна
- b. Адміністративна
- c. Кримінальна
- d. Матеріальна
- e. Цивільна

187. Під час внутрішньом'язової ін'єкції цефтріаксону у дитини раптово погіршився загальний стан, н

- a. Гіпоглікемічної коми
- b. Астматичного стану
- c. Алергічного дерматиту
- d. Анафілактичного шоку
- e. Гіперглікемічної коми

188. Під час огляду постраждалого внаслідок вибуху на виробництві чоловіка віком 35 років виявлено:

- a. Трахеотомія
- b. Ларингеальна маска
- c. Комбітюр
- d. Конікопункція
- e. Вентиляція мішком Амбу

189. Під час огляду та обстеження дитини (вік - 3 місяці), яка народилася з великою масою тіла (по

- a. Муковісцидозу
- b. Первинного гіпогонадізму
- c. Гіпофізарного нанізму
- d. Вродженого гіпотиреозу
- e. Рахіту

190. Під час проведення зовнішнього акушерського обстеження жінки у терміні вагітності 36 тижнів з'я

- a. Поперечне положення, I позиція, передній вид
- b. Поздовжнє положення, II позиція, передній вид, тазове передлежання
- c. Поздовжнє положення, II позиція, задній вид, тазове передлежання
- d. Поздовжнє положення, I позиція, задній вид, тазове передлежання
- e. Поздовжнє положення, II позиція, передній вид, головне передлежання

191. Під час профілактичного огляду у десятирічної дівчинки виявлено асиметрію кутів лопаток та надп

- a. Підгострої стадії рахіту
- b. Лордозу грудного відділу хребта
- c. Сколіозу грудного відділу хребта
- d. Кіфозу грудного відділу хребта
- e. Хондродистрофії

192. Під час хірургічного втручання з приводу розлитого перитоніту операційна медсестра прокола пал

- a. 12 год
- b. 48 год
- c. 72 год
- d. 96 год
- e. 24 год

193. Після роботи з інсектицидним розчином без засобів індивідуального захисту у чоловіка виникла за

- a. 5%-й розчин пентаміну
- b. 0,2%-й розчин ацеклідину

с. 1%-й розчин пілокарпіну гідрохлориду

d. 0,1%-й розчин атропіну сульфату

е. 0,05%-й розчин прозерину

194. Робітник сільського господарства після оброблення зерна хлорорганічними сполуками для боротьби з шкідниками

a. Дати випити лужний розчин

b. Увести глюкозу

с. Увести спазмолітики

d. Промити шкіру та слизові оболонки

е. Увести аскорбінову кислоту

195. Роділля хворіє на тяжку форму цукрового діабету. Після операції кесаревого розтину знепритомніла

a. Повітряна емболія

b. Кетоацедотична кома

с. Емболія навколоплідними водами

d. Гостре порушення мозкового кровообігу

е. Напад еклампсії

196. Сестра медична за призначенням лікаря надає невідкладну допомогу пацієнту із гіпертонічним кризом

a. Раунатин, анальгін

b. Седуксен, допегіт

с. Гепарин, фенігідин

d. Ізоптин, резерпін

е. Ніфедипін, фуросемід

197. Сестра медична онкологічного стаціонару під час роботи в колективі демонструє психологічну гнучкість

a. Асертивність

b. Девіантність

с. Інтелігентність

d. Перцептивність

е. Стресостійкість

198. Сестра медична під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов'язки, інфікувалася коронавірусом

a. У 150-кратному розмірі середньої заробітної плати

b. У не менш ніж 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму

с. У не менш ніж 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму

d. У 500-кратному розмірі середньої заробітної плати

е. У не менш ніж 200-кратному розмірі прожиткового мінімуму

199. Скільки існує етапів (фаз) у структурі процесу управління організацією, що взаємопов'язані між собою

a. 5

b. 3

с. 7

d. 6

е. 4

200. Старша сестра медична амбулаторії складає графік роботи підлеглих працівників. Вкажіть норми навантаження

a. 800 осіб у місті, 400 осіб у сільській місцевості

b. 900 осіб у місті, 800 осіб у сільській місцевості

c. 750 осіб у місті, 600 осіб у сільській місцевості

d. 450 осіб у місті, 150 осіб у сільській місцевості

е. 1500 осіб у місті, 1200 осіб у сільській місцевості

201. Старша сестра медична амбулаторії складає графік роботи підлеглих працівників. Укажіть норми навантаження

a. 450 осіб у місті, 150 осіб у сільській місцевості

b. 800 осіб у місті, 400 осіб у сільській місцевості

c. 750 осіб у місті, 600 осіб у сільській місцевості

d. 900 осіб у місті, 800 осіб у сільській місцевості

е. 1500 осіб у місті, 1200 осіб у сільській місцевості

202. Старша сестра медична відділення проводить контроль за реалізацією попередньо визначених завдань

a. Створення організаційної структури контролю

b. Перевірка фактичних даних, зіставлення із запланованими та виявлення відхилень

с. Оцінка професійних знань та навичок працівників

- d. Формування нових завдань для відділення
- e. Корекція стандартів

203. Страхова компанія самостійно регулює вартість страхового поліса за певних умов. Кому з нижчена

- a. Водію віком 23 роки
- b. Продавцю віком 72 роки
- c. Спортсмену віком 19 років
- d. Педагогу віком 54 роки
- e. Лікаря віком 44 роки

204. Сімейний лікар встановив пацієнту попередній діагноз: гіпотиреоз - та скерував його на консул

- a. Невідкладну
- b. Третинну

- c. Вторинну
- d. Первинну
- e. Екстрену

205. Сімейний лікар встановив пацієнту попередній діагноз: гіпотиреоз, та скерував його на консульта

- a. Екстрену
- b. Первинну

- c. Третинну
- d. Невідкладну
- e. Вторинну

206. Три члени сім'ї з різних вікових груп скаржаться на запаморочення, шум у вухах, нудоту, блюванн

- a. Кишкової інфекції
- b. Отруєння діоксидом вуглецю
- c. Теплового удару

- d. Отруєння монооксидом вуглецю
- e. Отруєння ФОС

207. У вагітної жінки віком 23 роки спостерігаються підвищення температури тіла, гіркота у роті, біл

- a. Ретроградна панкреатохолангіографія
- b. Внутрішньовенна холецистографія
- c. Компютерна томографія

- d. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- e. Пероральна холецистографія

208. У восьмимісячної дитини з діагнозом: рахіт, раптово під час плачу виник напад ларингоспазму, що

- a. 0,1%-го розчину адреналіну
- b. 2%-го розчину супрастину
- c. 10%-го розчину кальцію глюконату
- d. 50%-го розчину анальгіну
- e. 20%-го розчину глюкози

209. У восьмирічної дитини спостерігається підвищення температури тіла до $38,6^{\circ}\text{C}$, переймоподібний

- a. Сальмонельозу
- b. Ботулізму

- c. Шигельозу
- d. Ротавірусної інфекції
- e. Черевного тифу

210. У двомісячного хлопчика, починаючи з 3-го тижня життя, виникає повторне щоденне блювання вел

- a. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
- b. Пілороспазму
- c. Гострого гастриту
- d. Виразкової хвороби шлунку

- e. Пілоростенозу

211. У двомісячної дитини під час прогулянки на вулиці раптово виник ціаноз обличчя, шкіра вкрилася

- a. 40%-й розчин глюкози
- b. 25%-й розчин магнію сульфату
- c. 10%-й розчин кальцію глюконату
- d. 4%-й розчин гідрокарбонату натрію

е. 5%-й розчин глюкози

212. У дворічної дитини, яка протягом п'яти днів хворіє на ГРВІ, раптово вночі з'явилися хриплий гол

а. Гострий обструктивний бронхіт

б. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

с. Паратонзиллярний абсцес

д. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом

е. Напад бронхіальної астми

213. У десятирічної дитини, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, раптово з'явилися відчуття голо

а. 2%-й розчин папаверину

б. 1%-й розчин димедролу

с. 25%-й розчин магнію сульфату

д. 40%-й розчин глюкози

е. 10%-й розчин кальцію глюконату

214. У десятирічної дівчинки спостерігаються підвищення температури тіла до 38,8°C, озноб, загальна

а. Терміново шпиталізувати до хірургічного відділення

б. Встановити амбулаторне спостереження

с. Терміново шпиталізувати до інфекційного відділення

д. Прикласти міхур із льодом на низ живота

е. Прикласти медичну грілку на ділянку правого підребер'я

215. У десятирічної дівчинки спостерігаються тривалий субфебрилітет, зменшення маси тіла. Під час об

а. Гідраденіту

б. Еритремії

с. Гострого лейкозу

д. Анемії Фанконі

е. Інфекційного мононуклеозу

216. У дитини внаслідок аерозольного надходження алергену розвинувся набряк Квінке. Який антигіста

а. 2%-й розчин папаверину

б. 40%-й розчин глюкози

с. 1%-й розчин мезатону

д. 2%-й розчин супрастину

е. 50%-й розчин анальгіну

217. У дитини віком 10 років діагностовано коматозний стан, що супроводжується підвищенням м'язево

а. Увести 1 мл преднізолону внутрішньом'язово

б. Увести 20 ОД інсуліну підшкірно

с. Увести 10 ОД інсуліну підшкірно

д. Увести 40 мл 20%-го розчину глюкози внутрішньовенно

е. Увести 0,3 мл 0,1%-го розчину адреналіну підшкірно

218. У дитини грудного віку, яка хворіє на пневмонію, на тлі надмірної інфузійної терапії розвинулис

а. Лежачи на правому боці

б. Горизонтальне, з трохи піднятими нижніми кінцівками

с. Лежачи на лівому боці

д. Сидяче, напівсидяче

е. Лежачи на животі

219. У дитини на тлі перебігу менінгіту розвинулися судоми. Який протисудомний лікарський засіб вик

а. 10%-й розчин кальцію глюконату

б. 40%-й розчин глюкози

с. 2%-й розчин супрастину

д. 0,5%-й розчин діазепаму

е. 2%-й розчин папаверину

220. У дитини через місяць після народження під час обстеження кульшових суглобів виявлено: обмеж

а. Вродженого вивиху стегна

б. Хондропатії

с. Клишоногості

д. Хондродистрофії

е. Дисплазії кульшових суглобів

221. У дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, спостерігається підвищення температури тіла д

- a. 5 днів
- b. 9 днів
- c. 17 днів
- d. 22 дні
- e. 3 дні

222. У дитини, яка народилася з масою тіла 5200 г, об'єктивно спостерігається: щільні набряки на тил

- a. Калію йодид (йодомарин)
- b. Левотироксин (L-тироксин)
- c. Гідрокортизон
- d. Преднізолон
- e. Седуксен (діазепам)

223. У дитячій поліклініці на обліку перебуває 500 дітей. Протягом попереднього року захворіло 125 д

- a. 60
- b. 300
- c. 2,5
- d. 200
- e. 85

224. У доношеної новонародженої дитини з 3-го дня життя з'явилися випорожнення з домішками крові

- a. A
- b. C
- c. K
- d. B₆
- e. D

225. У доношеної новонародженої дитини на 4-й день життя виник жовтяничний колір шкіри. Стан дити

- a. Фізіологічна жовтяниця
- b. Токсична еритема
- c. Фізіологічна еритема
- d. Патологічна жовтяниця
- e. Статевий криз

226. У дівчини віком 15 років після вживання в їжу м'ясних консервів домашнього приготування з'явили

- a. Шигельозу
- b. Холери
- c. Ботулізму
- d. Правця
- e. Харчової токсикоінфекції

227. У жінки в терміні вагітності 28 тижнів діагностовано прееклампсію середнього ступеня тяжкості.

- a. Магнію сульфат
- b. Ніфедипін
- c. Фуросемід
- d. Каптоприл
- e. Еналаприл

228. У жінки від першої вагітності та своєчасних пологів народилося дитина з масою тіла 3300 г та зр

- a. Відразу після перев'язування пуповини
- b. Після проведення профілактики офтальмії
- c. Упродовж другої доби після народження
- d. Після завершення контакту "шкіра до шкіри" в пологовій залі
- e. Через 5 хв після народження

229. У жінки віком 27 років у терміні вагітності 9-10 тижнів раптово виникли сильний біль унизу живо

- a. Аборт, що не відбувся
- b. -
- c. Загрозливий аборт
- d. Аборт, що розпочався
- e. Аборт у ході

230. У жінки віком 30 років у терміні вагітності 32 тижні розвинувся напад еклампсії. З яких заходів

- a. Виміряти сатурацію
- b. Виміряти артеріальний тиск
- c. Забезпечити захист жінки від ушкоджень
- d. Провести катетеризацію периферичної вени
- e. Стимулювати пологи

231. У жінки віком 37 років після надмірного вживання кави раптово виник напад прискореного серцебиття.

- a. Нітрогліцерин сублінгвально
- b. Внутрішньовенне введення атропіну
- c. Внутрішньовенне введення адреналіну

d. Вагусні проби

- e. Навантажувальні проби

232. У жінки віком 37 років після надмірного вживання кави раптово виник напад прискореного серцебиття.

- a. Нітрогліцерин сублінгвально
- b. Внутрішньовенне введення атропіну
- c. Навантажувальні проби
- d. Внутрішньовенне введення адреналіну

e. Вагусні проби

233. У жінки, яка перебуває на 30-му тижні вагітності, спостерігаються такі зміни показників крові:

- a. Тяжкої прееклампсії

b. HELLP-синдрому

- c. Помірної прееклампсії
- d. Поєднаної прееклампсії
- e. Еклампсії

234. У жінки, яка перебуває на 32-му тижні вагітності, перебіг вагітності ускладнився тяжкою прееклампсією.

- a. Систолічний АТ де 140 мм рт. ст., діастолічний АТ де 90 мм рт. ст.
- b. Систолічний АТ де 130 мм рт. ст., діастолічний АТ де 80 мм рт. ст.
- c. Систолічний АТ де 160 мм рт. ст., діастолічний АТ де 110 мм рт. ст.
- d. Систолічний АТ де 120 мм рт. ст., діастолічний АТ де 80 мм рт. ст.
- e. Систолічний АТ де 150 мм рт. ст., діастолічний АТ де 100 мм рт. ст.

235. У закладі охорони здоров'я за наказом МОЗ створено відділ, до складу якого увійшли: лікар-епіде

- a. Епідеміологічний

b. Інфекційного контролю

- c. Особливо небезпечних інфекцій
- d. Профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
- e. Інфекційних захворювань

236. У здорової дитини першого року життя під час огляду та оцінювання нервово-психічного розвитку

a. 1-2 місяці

- b. 6 місяців
- c. 3 місяці
- d. 4-5 місяців
- e. 8 місяців

237. У лікарні проводять страхування життя співробітників. Які з нижченаведених факторів можуть впливати на рішення?

- a. Спосіб життя страхувальника
- b. Матеріальний стан застрахованої особи

c. Вік застрахованої особи

- d. Стан здоров'я страхувальника
- e. Професія страхувальника

238. У медичних установах і системах охорони здоров'я менеджмент відіграє важливу роль у забезпеченні

a. Процес прийняття управлінських рішень з метою досягнення мети організації

- b. Процес впливу на моральну відповідальність медичного персоналу
- c. Алгоритм стандартів, спрямованих на забезпечення соціальної відповідальності медичного персоналу
- d. Система правил, спрямованих на регулювання фінансової діяльності організації
- e. Процедура керування лікарською діяльністю

239. У медичному закладі розраховано узагальнений якісний показник, що характеризує результативність

- a. Клініко-експертна оцінка

- b. Уніфікований клінічний протокол
- c. Стандартна операційна процедура

d. Модель кінцевих результатів

- e. Стандарт медичної допомоги

240. У новонародженої дитини (віком 1 місяць) виявлено холодний абсцес у ділянці верхньої третини лівої щелепи.

- a. Умов асептики
- b. Дози імунобіологічного препарату

c. Способу введення вакцини

- d. Вибору ділянки вакцинації

- e. Терміну вакцинації

241. У новонародженої дитини на 3-й день життя на шкірі сідниць, грудей і довкола суглобів з'явилися висипи.

- a. Статевого кризу
- b. Транзиторної еритеми
- c. Фізіологічної жовтяниці

d. Токсичної еритеми

- e. Сечокислого інфаркту

242. У новонародженої дитини на 4-у добу життя упродовж 3-х годин спостерігалось підвищення температури тіла.

- a. Статевого кризу
- b. Транзиторної гіпотермії

c. Транзиторної гіпертермії

- d. Сечокислого інфаркту

- e. Фізіологічної жовтяниці

243. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови та природних складок з'явилися пухирі з прозорим вмістом.

a. Везикулопустульозу

- b. Пітвиці

- c. Попрілості

- d. Вітряної віспи

- e. Пухирчатки новонароджених

244. У новонародженої дитини під час проведення загального аналізу крові виявлено такі показники: еритроцити - 4,5 трлн/л.

a. Першого

- b. П'ятнадцятого

- c. П'ятого

- d. Дванадцятого

- e. Десятого

245. У новонародженої дитини розвинулася анафілактична реакція після введення вакцини. Сестра медсестри повинна викликати лікаря.

a. Звуженні кровоносних судин

- b. Послабленні моторики кишечника

- c. Розслабленні скелетних м'язів

- d. Посиленні скорочень міокарда

- e. Розслабленні мускулатури бронхів

246. У новонародженої дитини, яка народилася в терміні гестації 35 тижнів, на першій хвилині життя з'явилися дихальні звуки.

- a. 8 балів

- b. 5 балів

c. 6 балів

- d. 7 балів

- e. 9 балів

247. У п'ятирічної дитини розвинувся анафілактичний шок, зумовлений ужаленням бджолою. Укажіть ліки для лікування.

- a. Но-шпа (дротаверин)

- b. Діазепам (седуксен)

- c. Хлоропірамін (супрастин)

d. Епінефрин (адреналін)

- e. Метамізол натрію (анальгін)

248. У п'ятирічної дитини розпочалася носова кровотеча. З яких заходів необхідно розпочати надання першої допомоги?

a. Надати дитині положення напівсидячи з трохи опущеною донизу головою

- b. Викликати ЛОР-лікаря

- с. Увести кровоспинні засоби внутрішньовенно
- д. Прикласти грілку на перенісся та потилицю
- е. Закрапати в ніс 20%-й розчин сульфацилу натрію

249. У пацієнта внаслідок отруєння фосфорорганічними сполуками розвинулися такі симптоми: слинотеча

- а. Ацетилцистеїн та метіонін
- б. Кальцію глюконат та етанол
- с. Атропіну сульфат та дипіроксим
- д. Натрію тіосульфат та натрію нітрит
- е. Глюкагон та налоксон

250. У пацієнта віком 24 роки тяжка черепно-мозкова травма. Об'єктивно спостерігається: свідомість

- а. Провести аускультацию у 2-х точках (права та ліва легені)
- б. Інтубаційна трубка встановлюється завжди правильно і не потребує оцінювання правильності постановки
- с. ---
- д. Правильність постановки оцінюється ефективною екскурсією грудної клітки
- е. Провести аускультацию у 3-х точках (епігастрій, права легеня, ліва легеня)

251. У пацієнта віком 28 років діагностовано бронхіальну астму. Вкажіть типове потенційне ускладнення

- а. Рак легень
- б. Емфізема легень
- с. Сухий плеврит
- д. Екссудативний плеврит
- е. Абсцес легень

252. У пацієнта віком 30 років діагностовано дифтерію. Який основний профілактичний захід запобігає

- а. Спостереження за контактними упродовж 10 днів
- б. Уведення АКДП-вакцин та анатоксинів
- с. Ізоляція хворих пацієнтів, госпіталізація та лікування
- д. Поточна та заключна дезінфекція в осередку інфекції
- е. Уведення антитоксичної сироватки та антибіотиків

253. У пацієнта віком 30 років після введення інсуліну розвинулися судоми, він знепритомнів, спостер

- а. Гіпоглікемічна кома
- б. Гіперглікемічна кома
- с. Колапс
- д. Гіпертонічний криз
- е. Епілептичний напад

254. У пацієнта віком 34 роки, який хворіє на сечокам'яну хворобу, після фізичного навантаження вини

- а. Увести трамадол в/м
- б. Увести фуросемід в/м
- с. Занурити нижні кінцівки у гарячу воду
- д. Покласти міхур із льодом на поперекову ділянку
- е. Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку

255. У пацієнта віком 37 років після ін'єкції антибіотика раптово з'явилися виражена загальна слабкі

- а. Медикаментозна кропив'янка
- б. Ангіоневротичний набряк
- с. Епідермальний некроліз
- д. Анафілактичний шок
- е. Кардіогенний шок

256. У пацієнта віком 37 років після ін'єкції антибіотика раптово з'явилися виражена загальна слабкі

- а. Анафілактичний шок
- б. Епідермальний некроліз
- с. Кардіогенний шок
- д. Кропив'янка
- е. Ангіоневротичний набряк

257. У пацієнта віком 38 років із діагностованим цирозом печінки розвинулися надмірна сонливість, де

- а. Бактеріальний перитоніт
- б. Кровотеча
- с. Печінкова енцефалопатія

- d. Гіперспленізм
- e. Гепато-ренальний синдром

258. У пацієнта віком 42 роки за 52 години після апендектомії з'явилися симптоми пневмонії: загальна

- a. Аспіраційна
- b. Атипова
- c. Бронхопневмонія

d. Нозокоміальна

- e. Пневмонія в осіб зі зниженим імунітетом

259. У пацієнта віком 42 роки, який хворіє на хронічний гепатит, спостерігаються ендокринні порушення

- a. Біліарної дискінезії
- b. Демпінг-синдрому
- c. Імунного запалення

d. Печінкової недостатності

- e. Больового

260. У пацієнта віком 45 років раптово вночі з'явилися задишка, нападоподібний кашель та відчуття ст

- a. Стенокардії
- b. Інфаркту міокарда
- c. набряку легень

d. Бронхіальної астми

- e. Серцевої недостатності

261. У пацієнта віком 48 років після психоемоційного перенавантаження виникли головний біль та біль

- a. Раміприл
- b. Карведилол

c. Каптоприл

- d. Лерканідипін
- e. Нітрогліцерин

262. У пацієнта віком 50 років, який отримав відкрите механічне ушкодження верхньої кінцівки в ділян

- a. Увести знеболюючі засоби

b. Накласти тиснучу пов'язку на рану

- c. Прикласти холод до місця травми
- d. Надати психологічну підтримку
- e. Провести іммобілізацію травмованої кінцівки

263. У пацієнта віком 52 роки після швидкого ходіння чи підйому сходами виникає біль за грудниною ст

a. Велоергометрія

- b. Спірометрія
- c. Ехокардіографія
- d. Пульсоксиметрія
- e. Електрокардіографія

264. У пацієнта віком 55 років раптово з'явилися задишка, кашель із виділенням рожевого пінистого мо

- a. Лежаче, з припіднятими нижніми кінцівками

b. Напівсидяче, з опущеними нижніми кінцівками

- c. Ортопное
- d. На лівому боці
- e. На правому боці

265. У пацієнта віком 60 років припущення на хронічне обструктивне захворювання легень. Який неінва

a. Спірометрія

- b. Флюорографія
- c. Бронхографія
- d. Бронхоскопія
- e. Пікфлуометрія

266. У пацієнта віком 63 роки, який понад 15 років хворіє на артеріальну гіпертензію, розвинулися си

- a. Ударного об'єму лівого шлуночка
- b. Кінцевого діастолічного об'єму лівого шлуночка

c. Фракції викиду лівого шлуночка

- d. Кінцевого систолічного об'єму лівого шлуночка

е. Фракції викиду правого шлуночка

267. У пацієнта гематологічного відділення попередній діагноз: хронічний лімфолейкоз. Вкажіть найхар

а. Артралгія

б. Лімфаденопатія

с. Жовтяниця

д. Анасарка

е. Гемартроз

268. У пацієнта діагностовано закриту травму грудної клітки, напружений (клапанний) пневмоторакс. В

а. Дренування плевральної порожнини

б. Накладання тиснучої пов'язки

с. ШВЛ

д. Торакотомія

е. Трахеостомія

269. У пацієнта діагностовано паралітичну кишкову непрохідність. Який лікарський засіб використовуєт

а. Дімедрол

б. Діазепам

с. Прозерин

д. Дротаверин

е. Супрастин

270. У пацієнта з діагнозом: туберкульоз легень, розвинулася легенева кровотеча. Яке положення тіла

а. Фаулера

б. Колінно-ліктьове

с. Тренделенбурга

д. Сімса

е. Ортопное

271. У пацієнта з нападом бронхіальної астми розвинулася резистентність до бронхолітичних препараті

а. Кардіогенний шок

б. Набряк легень

с. Респіраторний дистрес-синдром

д. Астматичний статус

е. Анафілактичний шок

272. У пацієнта на тлі перебігу сепсису раптово розвинулися виражена слабкість, адинамія, блювання,

а. Гіпотиреоїдна кома

б. Інфаркт міокарда

с. Адреналовий криз

д. Гіпоглікемічна кома

е. Гіпопітуїтаризм

273. У пацієнта на тлі інфаркту міокарда розвинувся напад серцевої астми. Який метод невідкладної до

а. Масаж комірцевої зони

б. Прикладання міхура з льодом на литкові м'язи

с. Оксигенотерапія

д. Накладання венозних джгутів на нижні кінцівки

е. Проведення лужних інгаляцій

274. У пацієнта нефрологічного відділення спостерігаються ознаки хронічної ниркової та серцевої недо

а. Гемодіаліз

б. Катетеризацію сечового міхура

с. Застосування сечогінних засобів

д. Моніторингу водного балансу

е. УЗД нирок та сечовивідних шляхів

275. У пацієнта попередній діагноз: дифтерія зіву. З яких ділянок проводиться забір патологічного ма

а. Із ротоглотки та носа

б. Із задньої стінки глотки

с. З-під язика

д. Із ротоглотки

е. Із носа

276. У пацієнта під час транспортування виникла регургітація. Що означає цей медичний термін?

- a. Переміщення шлункового вмісту до ротової порожнини без зусиль та рефлексів, характерних для блювоти
- b. ---
- c. Раптовий викид шлункового вмісту через рот внаслідок сильних спазмів м'язів живота та грудної клітки
- d. Неприємне, безболісне, суб'єктивне відчуття потреби у блюванні
- e. Раптовий викид шлункового вмісту через рот внаслідок болючих спазмів шлунку та стравоходу

277. У пацієнта після стресу з'явилися різка слабкість, біль у ділянці серця з іррадіацією у ліве плече

- a. Папаверин
- b. Парацетамол
- c. Ніфедипін
- d. Аспірин
- e. Атенолол

278. У пацієнта після ін'єкції препарату з групи гангліоблокаторів раптово виникли запаморочення, відсутність пульсу

- a. Астматичний статус
- b. Кардіогенний шок
- c. Інфаркт міокарда
- d. Непритомність
- e. Колапс

279. У пацієнта реанімаційного відділення віком 35 років об'єктивно спостерігається: загальний стан погіршився, шкіра бліда, холодна, волога, пульс не визначається

- a. Алкогольної коми
- b. Гіпоглікемічної коми
- c. Гіперглікемічної коми
- d. Аддісонового кризу
- e. Уремичної коми

280. У пацієнта спостерігається сильна слинотеча, опіки навколо рота, хриплий голос, займає «пихате» положення

- a. Перокисом водню
- b. Оцтом
- c. Перманганатом калію
- d. Метанолом
- e. Етанолом

281. У пацієнта терапевтичного відділення під час парентерального введення антибіотика цефалоспоринового ряду виникли набряк легень, підвищення артеріального тиску

- a. Анафілактичний шок
- b. Набряк легень
- c. Напад стенокардії
- d. Напад бронхіальної астми
- e. Колапс

282. У пацієнта терапевтичного відділення розвинувся ортостатичний колапс. Який лікарський засіб необхідно ввести?

- a. 1%-й розчин мезатону
- b. 2%-й розчин дротаверину
- c. 50%-й розчин анальгіну
- d. 2%-й розчин папаверину
- e. 0,2%-й розчин платифіліну

283. У пацієнта, який отримує препарат серцевих глікозидів --- дигоксин, погіршився загальний стан, знизився артеріальний тиск

- a. Зниження артеріального тиску
- b. Вживання недоброякісних продуктів
- c. Недостатнє дозування серцевих глікозидів
- d. Передозування серцевими глікозидами
- e. Підвищення артеріального тиску

284. У пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні з діагнозом: пневмонія, після швидкого перебігу захворювання виникли різкі біль у грудях, підвищення артеріального тиску

- a. Інфаркт міокарда
- b. Гіпоглікемія
- c. Колапс
- d. Набряк легень
- e. Анафілактичний шок

285. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, температура тіла впродовж кількох годин швидко знижилася, з'явилася різка слабкість

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Гіпертонічний криз
- c. Гостра серцева недостатність
- d. Гостра дихальна недостатність
- e. Гостра судинна недостатність

286. У пацієнта, який хворіє на туберкульоз легень, після фізичного навантаження раптово з'явилося в

- a. Шлункова кровотеча
- b. Легенева кровотеча

- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Носова кровотеча
- e. Відкритий пневмоторакс

287. У пацієнтки віком 18 років зріст --- 185 см, розмір ноги --- 44-й. Визначення рівня якого лаборатор

- a. Вазопресину
- b. Глюкози крові
- c. Білка крові

- d. Соматотропного гормону
- e. 17-кетостероїдів

288. У пацієнтки віком 25 років сестра медична сільської амбулаторії виявила симптоми порушеної екто

- a. Скерувати пацієнтку до жіночої консультації
- b. Увести кровоспинні препарати

- c. негайно шпиталізувати пацієнтку до лікарні

- d. Скерувати пацієнтку на УЗД
- e. Увести знеболюючі препарати

289. У пацієнтки віком 38 років спостерігаються симптоми тиреотоксикозу. Дослідження рівня якого гор

- a. Інсуліну
- b. Адренокортикотропного
- c. Соматотропного
- d. Кортизолу

- e. Тиреотропного

290. У пацієнтки віком 45 років після вживання гострої та жирної їжі з'явилися оперізуючий біль у ве

- a. Глюкози
- b. Сечовини
- c. Білірубін
- d. Креатиніну

- e. alpha-амілази

291. У пацієнтки віком 56 років діагностовано бронхіальну астму. Вкажіть лікарський засіб, що викори

- a. Амброксол
- b. Мукалтин

- c. Сальбутамол

- d. Нітрогліцерин
- e. Цефтріаксон

292. У пацієнтки віком 60 років після фізичного навантаження з'явився стискаючий біль у ділянці серц

- a. Стенокардії

- b. Міжреберної невралгії
- c. Гострого перикардиту
- d. Міокардиту
- e. Інфаркту міокарда

293. У пацієнтки віком 65 років із діагнозом: бронхіальна астма, раптово погіршився загальний стан,

- a. Увести 30 мг преднізолону в/в
- b. Увести 0,5 мл 0,182%-го розчину адреналіну в/м

- c. Провести інгаляцію з сальбутамолом

- d. Провести інтубацію трахеї
- e. Увести 5 мл 2%-го розчину еуфіліну в/в

294. У пацієнтки віком 72 роки з виразковою хворобою в анамнезі раптово виникли нудота та блювання

- a. Перфорація

b. Пілоростеноз

c. Шлунково-кишкова кровотеча

d. Гостра судинна недостатність

e. Перитоніт

295. У пацієнтки віком 72 роки раптово виникли блювання "кавовою гущею", запаморочення. В анамнезі

a. Пенетрація

b. Пілоростеноз

c. Перфорація

d. Кровотеча

e. Перитоніт

296. У пацієнтки з діагнозом: \$B_{12}\$-дефіцитна анемія, спостерігається порушення ходи, атрофія м'язів

a. Фунікулярний мієлоз

b. Остеопороз

c. Атеросклероз

d. Поліартрит

e. Міопатія

297. У пацієнтки на тлі гіпертонічного кризу з'явилися ознаки гострої серцевої лівошлуночкової недостатності

a. Рекомендувати обстеження у сімейного лікаря

b. негайно госпіталізувати пацієнтку

c. Увести антигіпертензивні засоби внутрішньом'язово

d. Надати сидячого положення з опущеними нижніми кінцівками

e. Надати горизонтального положення з піднятими нижніми кінцівками

298. У пацієнтки, яка хворіє на ревматоїдний артрит та впродовж року приймає глюкокортикоїди, з'явилися

a. Томографія

b. Термографія

c. Ангіографія

d. Денситометрія

e. Артропневмографія

299. У потерпілого внаслідок ДТП чоловіка об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, дихання слабке

a. Надати потерпілому стабільне (безпечне) бокове положення

b. Розпочати проведення серцево-легеневої реанімації

c. Вивести нижню щелепу вперед та догори

d. Виміряти артеріальний тиск

e. Очистити ротову порожнину та перевірити прохідність дихальних шляхів

300. У півторарічної дитини вночі з'явилися <<гавкаючий>> кашель, неспокій, охриплий голос. Об'єктивно

a. Бронхіальної астми

b. Туберкульозу легень

c. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту

d. Гострого обструктивного бронхіту

e. Негоспітальної пневмонії

301. У п'ятирічного хлопчика розвинувся анафілактичний шок на внутрішньом'язове введення антибіотика

a. 0,5%-й розчин новокаїну

b. 0,9%-й розчин натрію хлориду

c. 1%-й розчин дімедролу

d. 0,1%-й розчин адреналіну

e. 50%-й розчин анальгіну

302. У п'ятирічної дитини, на тлі перебігу ГРВІ, раптово вночі розвинулися охриплість голосу, <<гавк

a. Гострої судинної недостатності

b. Астматичного статусу

c. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту

d. Набряку легень

e. Нападу бронхіальної астми

303. У разі якого типу управління його ланки, в основному, відповідають ланкам виробничого процесу,

a. Лінійного

b. Лінійно-штабного

- с. Функціонального
- d. Дивізійного
- е. Матричного

304. У разі якого типу управління управлінські рішення компетентні, але управлінський процес розділяється на функції управління?

- a. Лінійно-штабного
- b. Функціонального**
- с. Лінійного
- d. Матричного
- е. Дивізійного

305. У ревматологічному відділенні лікується пацієнт із ревматичною лихоманкою. Під час обстеження пацієнта лікар планує провести:

- a. Електрокардіографія
- b. Ехокардіографія**
- с. Рентгенографія органів грудної клітки
- d. Велоергометрія
- е. Фонокардіографія

306. У семирічної дитини спостерігається утруднене носове дихання, сукроваті виділення із носа. Під час обстеження пацієнта лікар планує провести:

- a. Гострого гаймориту
- b. Гострого риніту
- с. Дифтерії гортані
- d. Алергічного риніту
- е. Дифтерії носа**

307. У тримісячної дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, за результатами антропометричних досліджень виявлено:

- a. Визначення пульсу та його властивостей
- b. Вимірювання довжини тіла дитини
- с. Контрольне зважування дитини**
- d. Вимірювання окружності голови та грудної клітки
- е. Перевірка наявності й симетричності сухожильних рефлексів

308. У трирічної дитини після гри з дрібними предметами спостерігаються напади тривалого болючого кашлю.

- a. Глотки
- b. Порожнини носа
- с. Бронхів
- d. Гортані
- е. Трахеї**

309. У трирічної дитини розвинулося захворювання, що має такі клінічні прояви: гострий бурхливий початок, підвищення температури тіла, кашель, набряк гортані.

- a. Протисудомні
- b. Пробиотики
- с. Антибактеріальні**
- d. Спазмолітики
- е. Гепатопротектори

310. У трирічної дитини, яка хворіє на ГРВІ, раптово вночі погіршився загальний стан: дитина стала нерухомою, температура тіла підвищилася.

- a. Набряк Квінке
- b. Стенозуючий ларинготрахеїт**
- с. Астматичний статус
- d. Напад бронхіальної астми
- е. Спазмофілія

311. У трирічної дівчинки захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла та появи дрізкого кашлю.

- a. Краснухи**
- b. Вітряної віспи
- с. Кору
- d. Скарлатини
- е. Менінгококцемії

312. У хірургічному відділенні перебуває пацієнт після резекції шлунку. В анамнезі --- хронічний бронхіт.

- a. Призначення антибіотиків
- b. Накладання еластичних бинтів
- с. Проведення дихальної гімнастики**

- d. Часте провітрювання палати
- e. Дотримання суворого ліжкового режиму

313. У центрі СНІДу ВІЛ-інфікованому пацієнту надали інформацію про шляхи передачі інфекції та небез

a. Лікар-куратор, пацієнт або його законний представник

b. Головний лікар, завідувач відділення, лікар-куратор

c. -

d. Лікар-куратор, завідувач відділення, медсестра

e. Завідувач відділення, законний представник пацієнта

314. У чоловіка віком 29 років після тряскої їзди раптово з'явився сильний нападopodobний біль у поп

a. Гострого холецистити

b. Защемленої пахової кили

c. Печінкової коліки

d. Гострого апендициту

e. Ниркової коліки

315. У чоловіка віком 37 років, який хворіє на цукровий діабет 1-го типу та після ін'єкції інсуліну

a. Надати горизонтальне положення з трохи піднятими нижніми кінцівками

b. Забезпечити доступ свіжого повітря, провести лужну інгаляцію

c. Запропонувати вжити глюкозовмісні харчові продукти (воду з цукром, грудочку цукру, сік)

d. Зігріти пацієнта, розмасажувати периферичні ділянки тіла

e. Запропонувати випити гіпертонічний розчин кухонної солі

316. У чоловіка віком 40 років виявлено симптоми отруєння сполуками миш'яку. Оберіть комплекс антид

a. Норадреналін, мезатон (фенілефрин)

b. Препарати унітіолу, тетацін кальцію

c. Натрію нітрит, натрію тіосульфат

d. Ацетилцистеїн, метіонін

e. Атропіну сульфат, дипіроксим

317. У чоловіка віком 42 роки діагностовано вивих нижньої щелепи. Який вид пов'язки накладається піс

a. Хрестоподібна

b. Пращоподібна

c. Чепець

d. Неаполітанська

e. Вузлова

318. У чоловіка віком 47 років після емоційного перенавантаження розвинувся інтенсивний пекучий сти

a. Гостре порушення мозкового кровообігу

b. Гостра судинна недостатність

c. Фібриляція передсердь

d. Гіпертензивний криз

e. Гострий коронарний синдром

319. У чоловіка віком 54 роки після фізичного навантаження виникли інтенсивний пекучий біль за грудн

a. Розширення комплексу QRS

b. Елевація сегмента ST

c. Збільшення амплітуди зубця R

d. Подовження інтервалу PQ

e. Збільшення амплітуди зубця P

320. У чоловіка віком 54 роки раптово вночі розвинувся напад задишки, що супроводжувався утруднени

a. Амброксол

b. Сальбутамол

c. Адреналін

d. Папаверин

e. Глауцин

321. У чоловіка віком 55 років раптово виникли сильний головний біль, запаморочення, блювання, онімі

a. Неврит лицевого нерва

b. Гострий менінгіт

c. Гостре порушення мозкового кровотоку

d. Мігреновий статус

е. Гіпертензивний криз

322. У чоловіка віком 55 років раптово вночі виникли нападоподібний біль у поперековій ділянці, що і

а. Спазмолітики, анальгетики

б. Спазмолітики, глюкокортикоїди

с. Анальгетики, антигістамінні

д. Сечогінні, антигістамінні

е. Сечогінні, глюкокортикоїди

323. У чоловіка віком 56 років об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, шкіра жовтушна, зін

а. Тиреотоксична

б. Печінкова

с. Гіперглікемічна

д. Гіпоглікемічна

е. Уремична

324. У чоловіка під час фізичних навантажень часто виникають синкопальні стани та задишка. В анамнезі

а. Недостатності тристулкового клапана

б. Недостатності мітрального клапана

с. Дефекту міжшлуночкової перегородки

д. Стенозу мітрального клапана

е. Недостатності аортального клапана

325. У чоловіка після емоційного перенавантаження раптово виник різкий "кинджальний" біль в епігастр

а. Гострого калькульозного холециститу

б. Гострого апендициту

с. Гострого панкреатиту

д. Перфоративної виразки шлунка

е. Шлунково-кишкової кровотечі

326. У чоловіка після укусу бджоли з'явився набряк губ, повік та носа. Об'єктивно спостерігається: ст

а. Набряк Квінке

б. Сироваткова хвороба

с. Анафілактичний шок

д. Кропив'янка

е. Системний червоний вовчак

327. У чотирирічної дитини виникла носова кровотеча. Який із нижченаведених заходів невідкладної до

а. Надати дитині горизонтального положення

б. Запрокинути голову дитини назад

с. Провести лужну інгаляцію

д. Прикласти тепло на ділянку перенісся

е. Притиснути пальцем крило носа до його перегородки

328. У чотирирічної дитини за результатами лабораторного дослідження зішкрібка з періанальних скла

а. Цефікс (цефіксим)

б. Фуцис (флуконазол)

с. Ворміл (альбендазол)

д. Ніфуроксазид

е. Лоратадин

329. У чотирирічної дитини спостерігається гарячка, інтенсивний головний біль, повторне блювання, гі

а. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

б. Доплерографію судин головного мозку

с. Реоенцефалографію

д. Електроенцефалографію

е. Люмбальну пункцію

330. У чотирирічної дитини спостерігається: гарячка, сильний головний біль, повторне блювання, гіпер

а. Реоенцефалографію

б. Доплерографію судин головного мозку

с. Комп'ютерну томографію голови

д. Електроенцефалографію

е. Люмбальну пункцію

331. У шестимісячної дитини спостерігаються неспокій, поганий сон, підвищена пітливість голови (особ

a. Початкового

b. Рахітичної тетанії

c. Залишкових явищ

d. Реконвалесценції

e. Розпалу

332. У шестимісячної дитини спостерігаються неспокій, поганий сон, підвищена пітливість голови (особ

a. Рахітичної тетанії

b. Реконвалесценції

c. Залишкових явищ

d. Початкового

e. Розпалу

333. У шестирічної дитини після парентерального введення антибіотику раптово розвинулися ознаки м

a. Седативні

b. Антибактеріальні

c. Глюкокортикостероїди

d. Діуретики

e. Вітаміни

334. У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$. Який лікарський засіб ка

a. -

b. Парацетамол

c. Ацетилсаліцилова кислота

d. Мефенамінова кислота

e. Ібупрофен

335. У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$. Який лікарський засіб кате

a. Ібупрофен

b. Мефенамінова кислота

c. -

d. Парацетамол

e. Ацетилсаліцилова кислота

336. У шестирічної дитини спостерігаються симптоми бронхіальної астми. Яке дослідження доцільно пр

a. УЗД легень

b. Бронхоскопію

c. Рентгенографію ОГК

d. Пікфлоуметрію

e. Бронхографію

337. У якому віці проводиться перше планове щеплення дітей проти кору, краснухи та епідемічного пар

a. 3 місяці

b. 14 років

c. 2 місяці

d. 12 місяців

e. 3-5 днів

338. У якому терміні вагітності проводиться скринінг на гестаційний цукровий діабет усім вагітним жі

a. 3-5 тижнів

b. 11-13 тижнів

c. 18-22 тижнів

d. 28-32 тижнів

e. 24-28 тижнів

339. Укажіть етап теплового ланцюжка, що запобігає уникненню втрати тепла у новонародженої дитини

a. Перебування в індивідуальній пологовій палаті з комфортним температурним режимом

b. Негайне обсушування дитини

c. Забезпечення дитини належним (теплим) одягом

d. Перебування дитини в кувезі

e. Контакт "шкіра до шкіри"

340. Укажіть клінічні прояви неврологічного синдрому, що розвивається на тлі перебігу вітамін B₁₂-д

- a. Пощипування язика
- b. Нудота та блювання

c. Парестезія кистей та стоп

- d. Іктеричність склер
- e. Підвищення температури тіла

341. Укажіть кровоспинний препарат, що використовується для профілактики та лікування капілярних

a. Етамзилат (діцинон)

- b. Фуросемід
- c. Ацетилсаліцилова кислота (аспірин)
- d. Гідрокортизон
- e. Парацетамол

342. Укажіть лікарський засіб, що використовується сублінгвально під час надання невідкладної допомоги

a. Нітрогліцерин

- b. Верапаміл
- c. Ніфедипін
- d. Анаприлін
- e. Папаверин

343. Укажіть назву структурного підрозділу медичного центру, в якому надається кваліфікована медична

- a. Санаторій
- b. Хоспіс
- c. Шпиталь

d. Денний стаціонар

e. Профілакторій

344. Укажіть назву шкали, що використовується для об'єктивного оцінювання стану свідомості пацієнта

- a. Апгар
- b. Нортон
- c. Бартел

d. Глазго

e. Франкель

345. Укажіть найефективнішу діагностичну методику для виявлення асцитів.

- a. Спіральна комп'ютерна томографія
- b. Електрокардіографія
- c. Рентгенографія органів черевної порожнини
- d. Ректороманоскопія

e. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

346. Укажіть найпростішу структуру управління, яка характеризується тим, що кожен підрозділ організації

a. Горизонтальна

b. Лінійна

- c. Матрична
- d. Пряма
- e. Функціональна

347. Укажіть одну з управлінських функцій менеджменту в медсестринстві, яка сприяє забезпеченню

a. Оцінка та контроль здоров'я населення

b. Ефективне спілкування, вирішення конфліктів, управління ресурсами та формування команди

- c. Надання послуг із медичного обслуговування
- d. Проведення профілактичних заходів та диспансерне спостереження за станом здоров'я населення
- e. -

348. Укажіть основний клінічний симптом, що характерний для сухого плевритів.

- a. Кровохаркання
- b. Дистанційні свистячі хрипи

c. Біль у грудній клітці під час дихання

- d. Експіраторна задишка
- e. Виділення склоподібного мокротиння

349. Укажіть основний метод контролю якості медичної допомоги на рівні закладу охорони здоров'я.

a. Аналіз фінансових звітів медичних закладів

- b. Оцінка рівня задоволеності пацієнтів
- c. Моніторинг кількості медичних працівників
- d. Проведення соціологічних опитувань

e. Аналіз медичної документації

350. Укажіть основний принцип організації медико-санітарної допомоги населенню.

- a. Комплексність періодичної медичної допомоги
- b. Скринінг як система первинного обстеження

c. Комплексність амбулаторної та стаціонарної, лікувальної та профілактичної допомоги

- d. Диспансеризація та активний нагляд за станом здоров'я населення
- e. Комплексність постійної медичної допомоги

351. Укажіть систему охорони здоров'я, в якій закладено принцип соціальної солідарності ("здоровий п

a. Державна

b. Страхова

- c. -
- d. Змішана
- e. Приватна

352. Укажіть тип конфлікту, що виникає між конкретною особою та її організацією, коли їхні дії взаєм

a. Міжособистий

b. Внутрішньогруповий

- c. Адміністративний
- d. Міжгруповий
- e. Внутрішньоособистий

353. Укажіть типові клінічні прояви деформуючого остеоартрозу.

- a. Переміжна кульгавість
- b. Симетричний біль та набряк дрібних суглобів
- c. Раптовий інтенсивний напад болю в I пальці стопи
- d. Мігруючий біль у суглобах

e. "Стартовий біль", "блокада" ураженого суглоба

354. Укажіть три основних типи поведінки керівника в залежності від стилю лідерства.

- a. Авторитарний, демократичний, ліберальний
- b. Анархічний, авторитарний, партотаричний
- c. Демократичний, ліберальний, охлократичний
- d. Демократичний, монархічний, партотаричний
- e. Партотаричний, монархічний, ліберальний

355. Унаслідок неповного закупорення стороннім тілом гортані у потерпілого виникла часткова непрохі

- a. Надати дренажне положення
- b. Надати стабільне бічне положення
- c. Застосувати прийом Сафара

d. Застосувати прийом Геймліха

e. Провести штучну вентиляцію легень

356. Чоловік віком 28 років скаржиться на біль за грудниною, відчуття серцебиття, задишку під час фі

- a. Недостатності клапана легеневої артерії
- b. Недостатності тристулкового клапана

c. Недостатності аортального клапана

- d. Пролапсу мітрального клапана
- e. Недостатності мітрального клапана

357. Чоловік віком 30 років під час вживання їжі раптово схопився за шию, спостерігається ціаноз, не

- a. Трахеотомію
- b. Інтубацію трахеї
- c. Пальцеву ревізію ротової порожнини
- d. Конікотомію

e. Прийом Геймліха

358. Чоловік віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,7^oC, біль у грудній к

- a. Негоспітальної пневмонії
- b. Ексудативного плевриту

- с. Абсцесу легені
- d. Аспіраційної пневмонії
- е. Сухого плевриту

359. Чоловік віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,7°C, біль у грудній кліт

- a. Абсцесу легені
- b. Бронхіальної астми
- с. Ексудативного плевриту**
- d. Пневмонії
- е. Сухого плевриту

360. Чоловік віком 42 роки під час бійки отримав поранення грудної клітки гострим предметом. Під час

- a. Увести знеболюючі засоби
- b. Провести серцево-легеневу реанімацію
- с. Накласти асептичну пов'язку
- d. Негайно направити до лікаря
- е. Накласти оклюзійну пов'язку**

361. Чоловік віком 42 роки, який упродовж 8 років хворіє на артеріальну гіпертензію, після перенесен

- a. Гіпертензивний криз**
- b. Ішемічний інсульт
- с. Геморагічний інсульт
- d. Діабетична (гіперглікемічна) кома
- е. Гіпоглікемічна кома

362. Чоловік віком 56 років випадково травмував пухлиноподібне утворення, що розміщене у правій під

- a. Загальний аналіз крові
- b. УЗД
- с. МРТ
- d. Гістологічний**
- е. Рентгенологічний

363. Чоловік віком 57 років скаржиться на різкий головний біль, що супроводжується нудотою та блюва

- a. Менінгококового менінгіту
- b. Субарахноїдального крововиливу**
- с. Гіпертензивного кризу
- d. Симпато-адrenalового кризу
- е. ---

364. Чоловік віком 57 років скаржиться на біль у ділянці серця стискаючого характеру з іррадіацією у

- a. Ендокардиту
- b. Інфаркту міокарда**
- с. Ревматичної хвороби серця
- d. Перикардиту
- е. Міокардиту

365. Чоловік віком 60 років раптово відчув загальну слабкість та знепритомнів. З анамнезу відомо: мі

- a. Уведення аміодарону
- b. Синхронізованої кардіоверсії
- с. Вагусних проб
- d. Черезшкірної електркардіостимуляції**
- е. Уведення атропіну

366. Чоловік віком 73 роки скаржиться на задишку та відчуття серцебиття, що виникають під час незна

- a. I
- b. -
- с. IIA
- d. II
- е. IIB**

367. Чоловік під час вживання їжі раптово схопився за шию. Об'єктивно спостерігається: вираз обличчя

- a. Прекардіальний удар
- b. Прийом Сафара
- с. Парентеральне введення 2%-го розчину еуфіліну

d. Прийом Геймліха

e. Оксигенотерапію

368. Чоловіку віком 47 років для лікування артеріальної гіпертензії та дисліпідемії призначено терап

a. Індапамід

b. Аторвастатин

c. Периндоприл

d. Ацетилсаліцилова кислота

e. Амлодипін

369. Чотирирічна дитина хворіє на кір. На 3-й день від початку висипань стан дитини погіршився, розв

a. IV --- стадія асфіксії

b. II --- стадія субкомпенсованого стенозу

c. II --- стадія некомпенсованого стенозу

d. ---

e. I --- стадія компенсації

370. Шестирічна дитина під час лабораторного обстеження знепритомніла. Яке положення тіла необхід

a. Лежаче, з припіднятим головним кінцем ліжка

b. На правому боці

c. Лежаче, з припіднятими нижніми кінцівками

d. На лівому боці

e. Напівсидяче, з опущеними нижніми кінцівками

371. Шестирічній дитині з масою тіла 20 кг призначено парацетамол. Сироп парацетамолу для дітей міс

a. 2 мл

b. 3 мл

c. 12 мл

d. 5 мл

e. 10 мл

372. Що включає в себе комунікація в управлінській діяльності?

a. Передачу інформації від одного об'єкта до іншого

b. Зв'язок між членами формального колективу

c. Комунальні мережі

d. Зв'язок між посадовими особами

e. Зв'язок між людьми

373. Що з нижченаведеного треба виконати насамперед на догоспітальному етапі під час надання неві

a. Накласти асептичну пов'язку на рану

b. Провести транспортну іммобілізацію кінцівки

c. Накласти артеріальний джгут на кінцівку

d. Надати кінцівці горизонтального положення

e. Провести інфузію кровозамінників

374. Що лежить в основі поділу розвитку теорії менеджменту на етапи?

a. Певні історичні періоди

b. Етапи виділено штучно без будь-якого підґрунтя

c. Рівні проміжки часу

d. Період створення певних наукових шкіл управління

e. Дати життя авторів цих теорій

375. Що означає організація як функція управління?

a. Розробка стратегічного плану

b. Складання планів організації як суб'єкта

c. Розробка управлінських рішень, щодо досягнення мети організації як суб'єкта

d. Організація не є функцією управління

e. Процес створення структури та розподілу ресурсів в організації з метою досягнення поставлених ціл

376. Що таке стандарт медичної допомоги, і яке його значення для практичної діяльності в медичному

a. Документ, що дозволяє здійснення медичної діяльності в медичних установах

b. Угода між пацієнтом та медичним закладом щодо умов та обсягу медичного обслуговування

c. Документ інформаційного характеру

d. Звіт про діяльність закладу, що включає інформацію про виконані медичні процедури

е. Сукупність прийнятих норм та нормативів, що визначають якість та обсяг медичних послуг
377. Що являє собою організація, як об'єкт менеджменту?

- а. Сукупність людей, ресурсів і процесів, які працюють разом для досягнення спеціальних цілей
- б. Фінансову структуру
- в. Підприємство, що працює на прибуток
- г. Заклад, що створений із певною метою
- е. Статутний об'єкт

378. Що є економічною основою керованої моделі медичної допомоги?

- а. Стратегічне і поточне планування фінансових ресурсів
- б. Раціональне використання обмежених ресурсів
- в. Диференціація фінансових ресурсів, збільшення частки коштів на надання медичної допомоги
- г. Фінансування комплексу медичних закладів на основі подушного нормативу в обсязі певних соціальних потреб
- е. Формування з боку споживачів медичних послуг оптимального обсягу і структури медичної допомоги

379. Юнак віком 16 років отримав травму під час падіння з висоти. Скаржиться на біль у животі, більш

а. Терміново шпиталізувати до лікарні

- б. Увести знеболюючі засоби
- в. Увести спазмолітики
- г. Провести ШВЛ
- е. Увести наркотичні анальгетики

380. Як називаються помилкові або неадекватні дії медичного працівника, що були виконані з профілак

- а. Медична помилка
- б. Лікарська помилка
- в. Упущення
- г. Лікарська недбалість

е. Ятрогенія

381. Як називається графічне відображення результатів динамічного спостереження під час пологів за

- а. Індивідуальна карта вагітної та породіллі
- б. Обмінна карта

в. Партограма

- г. Кардіотокографія
- е. Гравідограма

382. Як називається національний документ, що засвідчує право на здійснення медичної діяльності з до

а. Закон

б. Ліцензія

- в. Припис
- г. Постанова
- е. Розпорядження

383. Як називається особа, яка звертається по медичну допомогу або скористалася нею, незалежно від

а. Пацієнт

- б. Споживач
- в. Реципієнт
- г. Суб'єкт
- е. Об'єкт

384. Як називається програма, що визначає перелік та обсяг медичних послуг, лікарських засобів і мед

а. Програма розвитку системи охорони здоров'я

б. Програма медичних гарантій

- в. Програма про додаткове медичне страхування
- г. Медична субвенція
- е. Стратегічний план розвитку лікарні

385. Як називається процес офіційного визнання статусу закладу охорони здоров'я, наявності в ньому у

- а. Санація
- б. Стандартизація

в. Акредитація

- г. Ліцензування
- е. Апробація

386. Як називається упорядкована сукупність відносин в організації в плані передачі управлінських функцій?

- a. Процес комунікації
- b. Вироблений етикет
- c. Управлінська вертикаль
- d. Виконавча дисципліна
- e. Структура управління

387. Як часто потрібно проводити оцінку загального стану роділлі, зокрема, вимірювання артеріального тиску?

- a. Кожні 150 хв
- b. Кожні 30 хв
- c. Кожні 15 хв
- d. Кожні 60 хв
- e. Кожні 120 хв

388. Яка галузь фармакології вивчає закономірності всмоктування, розподілу, метаболізму та виведення лікарських засобів?

- a. Фармакокінетика
- b. Фармакогенетика
- c. Фармакогнозія
- d. Фармакотерапія
- e. Фармакодинаміка

389. Яка мета стратегічного планування?

- a. Поєднати внутрішні сильні сторони організації зі сприятливими можливостями зовнішнього середовища
- b. Тримати організацію в стані відповідності змінному зовнішньому середовищу, а також розуміти поточні тенденції
- c. Отримати прогностичні результати діяльності
- d. Забезпечити нововведення в достатній мірі
- e. Забезпечити нововведення в достатній мірі поєднання із відповідним змінним зовнішнім середовищем

390. Яка ознака виробничо-господарської організації визначає дії її членів та покладена в основу розподілу ресурсів?

- a. Організаційна культура
- b. Цілеспрямованість
- c. Виконання певних видів діяльності
- d. Наявність структури
- e. Наявність певної кількості учасників

391. Яка основна мета закладів охорони здоров'я, як організації?

- a. ---
- b. Дотримання державних стандартів
- c. Лікування хворих пацієнтів
- d. Відтворення здоров'я населення
- e. Економія ресурсів

392. Яка система фінансування охорони здоров'я, з точки зору організаційно-фінансових особливостей, є найбільш ефективною?

- a. Китайська
- b. Німецька
- c. Англійська
- d. Українська
- e. Американська

393. Яка спеціальна транспортна шина використовується для іммобілізації кінцівки у разі перелому стегна?

- a. Фільберга
- b. Гіпсова пов'язка
- c. Еланського
- d. Крамера
- e. Дітеріхса

394. Яка температура повітря має підтримуватися в інкубаторі впродовж перших 10-ти днів після народження пташенят?

- a. 32°C
- b. 33°C
- c. 35°C
- d. 34°C
- e. 30°C

395. Яка теорія менеджменту стверджує, що зовнішнє середовище організації має свої правила, норми та цінності?

- a. Популяційної екології
- b. Ситуаційної зумовленості
- c. Залежності від ресурсів

d. Інституційна

- e. Концепція стратегічного управління

396. Яка форма медичного страхування, згідно з Законом України <<Про страхування>>, діє в Україні с

- a. Некомерційне

b. Добровільне

- c. Обов'язкове

d. Спеціальне

- e. Загальне

397. Яка формула використовується для орієнтовного оцінювання кількості постійних зубів у дитини не

- a. $4n + 20$

b. $4n - 20$

- c. $10 + (2 \cdot n)$

d. $75 + (5 \cdot n)$

- e. $80 \cdot n$

398. Яка функція управління включає в себе сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників (намірів, потр

- a. Комунікаційна

b. Мотиваційно-стимулююча

- c. Планувальна

d. Організаційна

- e. Контрольно-оцінна

399. Яке з нижченаведених джерел права гарантує право громадян України на охорону здоров'я?

- a. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

b. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

- c. Закон України "Про систему громадського здоров'я"

d. Цивільне законодавство України

e. Конституція України

400. Яке з нижченаведених захворювань потребує детального збору відомостей про сімейний анамнез

a. Гемофілія

- b. Геморагічний васкуліт

c. Цироз печінки

d. Вітамін B₁₂-дефіцитна анемія

- e. Залізодефіцитна анемія

401. Яке ураження нирок типове для системного червоного вовчака?

- a. Нефролітіаз

b. Пієлонефрит

- c. Цистит

d. Амілоїдоз

e. Гломерулонефрит

402. Який антидот використовується у разі отруєння метанолом?

- a. Глюкокортикостероїди

b. Глюкоза

c. Етиловий спирт (етанол)

- d. Ацетилцистеїн

e. Тіосульфат натрію

403. Який безумовний рефлекс, що властивий для новонародженої дитини, проявляється відкриванням

a. Бабкіна

- b. Куссмауля

c. Моро

d. Бауера

- e. Ландау

404. Який безумовний рефлекс, що властивий для новонародженої дитини, проявляється розведенням

- a. Галанта

b. Переса

c. Моро

d. Бабкіна

e. Керніга

405. Який вид клізми застосовується для декомпресії шлунково-кишкового тракту у разі консервативного лікування?

a. Поживна

b. Мікроклізма

c. Очисна

d. Сифонна

e. Лікувальна

406. Який вид медико-санітарної допомоги передбачає консультацію лікаря загальної практики (сімейного лікаря)?

a. Високоспеціалізована

b. Первинна

c. Спеціалізована

d. Екстрена

e. Паліативна

407. Який вид міоми матки потребує невідкладного хірургічного втручання?

a. Підслизовий вузол, що народжується

b. Підслизовий вузол на широкій основі

c. Субсерозний вузол на широкій основі

d. Інтрамуральна міома матки

e. Багатовузлова міома матки

408. Який вид розгортання діяльності утворює рівні управління?

a. Координаційний

b. Вертикальний

c. Прямий

d. Горизонтальний

e. Непрямий

409. Який етап життєвого циклу розвитку організації пов'язаний із задоволенням потреб нового споживача?

a. Дитинство

b. Народження

c. Відновлення

d. Юність

e. Зрілість

410. Який заклад охорони здоров'я у межах своєї діяльності забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів?

a. Дільнична лікарня

b. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

c. Хоспіс

d. Диспансер

e. Консультативна поліклініка міської лікарні

411. Який лікарський засіб призначають для профілактики геморагічної хвороби новонароджених усім з народження?

a. Вітамін B₁₂

b. Вітамін C

c. Вітамін K

d. Вітамін A

e. Вітамін D

412. Який метод дослідження внутрішніх органів відноситься до основних об'єктивних методів обстеження?

a. Біохімічний аналіз крові

b. УЗД ОЧП

c. Рентгеноскопія шлунку

d. Перкусія

e. Загальний аналіз крові

413. Який метод контрацепції доцільно порекомендувати жінці, у якої відбувся незахищений (без використання контрацепції) статевий акт?

a. Лактаційної аменореї

b. Календарний

с. Посткоїтальний

d. Симптотермальний

е. Бар'єрний

414. Який основний клінічний симптом характерний для сухого плевриту?

a. Експіраторна задишка

b. Біль у грудній клітці, що посилюється під час дихання та кашлю

с. Виділення склоподібного мокротиння під час кашлю

d. Сухий кашель, що супроводжується нежиттю та сльозотечею

е. Кровохаркання

415. Який препарат використовується для активного ведення третього періоду пологів з метою зниження

a. Окситоцин

b. Віданол

с. Рицинова олія

d. Фолікулін

е. Гемотран

416. Який принцип визначення пріоритетності справ у загальному вигляді полягає в тому, що всередині

a. Ейзенхауера

b. Парето

с. Автоматизації

d. АБВ-аналізу

е. Помодоро

417. Який принцип управління порушує старша сестра медична, якщо під час роботи в колективі вона і

a. Рефлексивність

b. Колегіальність

с. Аналітичність

d. Системність

е. Прозорість

418. Який принцип управління порушує старша сестра медична, якщо під час роботи в колективі вона і

a. Аналітичність

b. Рефлексивність

с. Колегіальність

d. Системність

е. Прозорість

419. Який радіаційний метод діагностики спричиняє найбільше променеве навантаження на пацієнта?

a. Магнітно-резонансна томографія

b. Цифрова рентгенографія

с. Цифрова флюорографія

d. СКТ (спіральна комп'ютерна томографія)

е. Ультразвукове дослідження

420. Який специфічний антидот використовується для надання невідкладної допомоги пацієнту у разі о

a. Преднізолон

b. Етанол

с. Еуфілін

d. Аміназин

е. Метиловий спирт

421. Який стиль керівництва ґрунтується на колегіальності прийняття рішень, врахуванні думок і, за м

a. Бюрократичний

b. Синтетичний

с. Авторитарний

d. Демократичний

е. Ліберальний

422. Який структурний метод запобігання конфліктам передбачає розроблення або уточнення цілей дл

a. Визначення організаційних цілей

b. Координаційні механізми

с. Роз'яснення вимог до роботи

- d. Система винагород
- e. Формування інтеграційних механізмів

423. Який структурний підрозділ поліклініки включає такий перелік приміщень: кабінет завідувача відділення

- a. Відділення хірургії одного дня
- b. Профілактичне відділення
- c. Клініко-діагностична лабораторія

d. Денний стаціонар

- e. Відділення відновлювального лікування

424. Який тип управління характерний для постреформеного періоду системи охорони здоров'я в Україні?

- a. Матричний
- b. Ринковий
- c. Централізований

d. Децентралізований

- e. Одноосібний

425. Який фактор може спричинити нерівномірний розподіл робочого навантаження між виконавцями?

- a. Недостатня фінансова мотивація працівників
- b. Упереджене ставлення керівника
- c. Нерівнозначність завдань

d. Відсутність обґрунтованих нормативів

- e. Симпатії до окремих працівників

426. Який із нижченаведених аспектів характерний для децентралізованого управління у сфері охорони здоров'я?

- a. Усі медичні заклади підпорядковані центральному органу влади
- b. Рішення про фінансування та розвиток медичних послуг приймаються центральним органом управління
- c. Рішення щодо безпосередньої діяльності медичних закладів приймаються централізовано
- d. Управління здійснюється за єдиною нормативною базою для всіх регіонів

e. Автономія регіонів у прийнятті рішень про фінансування та розвиток медичних послуг

427. Який із нижченаведених заходів є пріоритетним під час надання невідкладної допомоги пацієнту з травмою живота?

- a. Забезпечення зручного положення тіла
- b. Введення в раціон калійвмісних продуктів харчування
- c. Катетеризація сечового міхура

d. Зменшення болю

- e. Седативна терапія

428. Який із нижченаведених лікарських засобів використовується для базисної фармакотерапії ревматоїдного артриту?

- a. Диклофенак
- b. Ципрофлоксацин
- c. Колхіцин

d. Метотрексат

- e. Преднізолон

429. Який із нижченаведених методів найефективніший для лікування інфаркту міокарда у пацієнтів з коронарною хворобою?

- a. Нітрати

b. Стентування

- c. Тромболітична терапія

d. ---

- e. Антиагреганти в комбінації з антикоагулянтами

430. Який із нижченаведених препаратів використовується для консервативного лікування дифузного токсичного збільшення щитовидної залози?

- a. Алопуринол
- b. L-тироксин

c. Мерказоліл

- d. Метформін

- e. Метотрексат

431. Який із нижченаведених станів є транзиторним (перехідним) для новонародженої дитини?

- a. Гемолітична жовтяниця

b. Фізіологічна втрата маси тіла

- c. Серцево-судинна недостатність
- d. Ниркова недостатність

е. Дихальна недостатність

432. Який із нижченаведених факторів може спричинити дефіцит заліза в організмі людини?

а. Роздільне харчування

б. Раціональне харчування

с. Незбалансоване харчування (веганство)

д. Кетогенна дієта

е. Сироїдіння

433. Який імунобіологічний препарат використовується для щеплення новонароджених дітей проти туб

а. Вакцина КПК

б. Вакцина БЦЖ

с. Анатоксин правцевий

д. Вакцина АКДП

е. Анатоксин дифтерійно-правцевий

434. Яким суб'єктом насамперед визначається організаційна структура закладу охорони здоров'я?

а. Власником закладу

б. Генеральним директором

с. Трудовим колективом

д. МОЗ України

е. Виконавчим директором

435. Яким чином оцінюється якість медичної допомоги?

а. Хімічним методом

б. Шляхом аналізу та порівняння

с. Балансовим методом

д. Шляхом спостереження та експериментально

е. Витратним методом

436. Якими якостями менеджера володіє керівник організації, якщо він виявляє вміння розподіляти завд

а. -

б. Професійно-діловими

с. Соціально-психологічними

д. Моральними

е. Адміністративно-організаційними

437. Яку допомогу потрібно надати породіллі у III періоді пологів, якщо плацента не відокремилася пі

а. Спостерігати за кровотечею

б. Підготувати роділлю до лапаротомії

с. Ушити розриви промежини

д. Провести ручне відділення та виділення посліду

е. Оглянути пологові шляхи на цілісність

438. Яку форму первинної облікової документації потрібно заповнити сестрі медичній реєстратури поло

а. 003-1/о

б. 096/о

с. 111/о

д. 113/о

е. 025/о

439. Які елементи менеджменту в медицині забезпечують впровадження стратегічних планів та досягн

а. Ресурси для медичних досліджень

б. Принципи, методи та засоби управління для реалізації мети

с. Клінічні протоколи та регуляторні вимоги

д. Медичні послуги та їх якість

е. Медичні навчальні програми для студентів

440. Які з нижченаведених навичок належать до "м'яких" (soft skills) та є ключовими для успішного ке

а. Висока медична кваліфікація та володіння іноземними мовами

б. Висока медична кваліфікація та знання мов програмування

с. Агресивність та конкурентність

д. Самостійність та ініціативність

е. Комунікабельність та здатність до співпраці

441. Які з нижченаведених симптомів найхарактерніші для холери?

- a. Переймоподібний біль у животі, діарея, зниження гостроти зору, порушення ковтання
- b. Рідкі випорожнення з домішками слизу та прожилками крові, температура тіла 39^oC, біль у животі
- c. Нудота, блювання, жовтяниця, біль у литкових м'язах
- d. Надмірні, пінисті, смердючі випорожнення зеленуватого кольору, гарячка, багаторазове блювання
- e. Рясні, часті (20--30 разів на добу) випорожнення у вигляді <<рисового відвару>>, температура тіла 38^oC

442. Які основні невідкладні заходи проводяться у разі спалаху особливо небезпечної інфекції для кон

a. Ізоляція хворого пацієнта та забезпечення необхідною медичною допомогою

b. Лабораторна діагностика захворювання

c. Встановлення озброєної охорони по периметру карантинної ділянки

d. ---

e. Збір проб ґрунту, повітря, води, продуктів харчування, заражених ділянок місцевості та різних об'

443. Які основні нормативи забезпечують якість медичної допомоги в закладах охорони здоров'я?

a. Стандарти у сфері охорони здоров'я

b. Закони про захист прав споживачів

c. Технічні характеристики медичних обладнань

d. Трудове законодавство для медичних працівників

e. Програми підвищення кваліфікації медичних працівників

444. Які основні ресурси використовує організація?

a. Людські ресурси, капітал, матеріали та інформацію

b. Людські ресурси, матеріали, технології та інформацію

c. Людські ресурси, капітал, матеріали та технології

d. Людські та матеріальні ресурси і технології

e. Людські ресурси, капітал, матеріали, технології та інформацію

445. Які основні функції управління?

a. Аналіз, планування, організація, контроль

b. Збір інформації, розробка стратегії аналіз, контроль

c. Стратегічне планування, організація, мотивація, контроль

d. Аналіз, планування, організація, мотивація

e. Аналіз, прийняття рішення, організація виконання, контроль

446. Які продукти харчування потрібно виключити з раціону харчування пацієнта за 3-5 днів до дослідж

a. Овочі

b. М'ясо

c. Солодощі

d. Хліб

e. Яйця

447. Які протизаплідні засоби використовують в дерматології для лікування акне?

a. Однокомпонентні оральні контрацептиви

b. -

c. Сперміциди

d. Комбіновані оральні контрацептиви

e. Ін'єкційні контрацептиви

448. Які ресурси належать до загальних характеристик організації?

a. Економічні умови, громадські організації, міжнародні події, законодавчі акти, конкуренти тощо

b. Горизонтальний розподіл праці (встановлення конкретних завдань)

c. Унікальні технології, ексклюзивний доступ до ринків, інтелектуальна власність

d. Люди, капітал, матеріали, фінанси, технології, обладнання тощо

e. Вертикальний розподіл праці