

1. Батьки дворічної дитини звернулися на консультацію до дитячого гінеколога зі скаргами, що під час
- a. -
  - b. Синдром Моріса
  - c. Атрезія піхви
  - d. Синехії малих статевих губ
  - e. Гіпофізарний нанізм
2. Батьки дворічної дитини звернулися на консультацію до дитячого гінеколога зі скаргами, що під час
- a. Синдром Моріса
  - b. Синехії малих статевих губ
  - c. Атрезія піхви
  - d. -
  - e. Гіпофізарний нанізм
3. Вагітна жінка віком 33 роки перебуває в пологовій залі в II періоді пологів. Діагноз: вагітність
- a. Розпочати родопідсилення розчином окситоцину
  - b. Очікувальна тактика протягом 30-40 хв
  - c. Провести амніотомію та продовжити консервативне розродження як при сідничному передлежанні п
  - d. Перейти до розродження шляхом кесаревого розтину, враховуючи сідничне передлежання плода
  - e. Спробувати зробити поворот плода
4. Вагітна жінка віком 33 роки перебуває в пологовій залі в II періоді пологів. Діагноз: вагітність
- a. Розпочати родопідсилення розчином окситоцину
  - b. Очікувальна тактика протягом 30-40 хв
  - c. Перейти до розродження шляхом кесаревого розтину, враховуючи сідничне передлежання плода
  - d. Спробувати зробити поворот плода
  - e. Провести амніотомію та продовжити консервативне розродження як при сідничному передлежанні п
5. Вагітна жінка віком 34 роки скаржиться на періодичний біль унизу живота впродовж 2,5 год. В анамнезі
- a. Амніотична емболія
  - b. Розрив матки по рубцю
  - c. Вторинна слабкість пологової діяльності
  - d. Інфаркт міокарда
  - e. Тромбоемболія легеневої артерії
6. Вагітна жінка віком 34 роки скаржиться на періодичний біль унизу живота впродовж 2,5 год. В анамнезі
- a. Амніотична емболія
  - b. Інфаркт міокарда
  - c. Вторинна слабкість пологової діяльності
  - d. Розрив матки по рубцю
  - e. Тромбоемболія легеневої артерії
7. Вагітна жінка віком 38 років засмучена, періодично плаче. Під спостереженням лікаря акушера-гінеко
- a. 10 балів
  - b. 4 бали
  - c. 8 балів
  - d. 12 балів
  - e. 6 балів
8. Вагітна жінка віком 38 років засмучена, періодично плаче. Під спостереженням лікаря акушера-гінеко
- a. 4 бали
  - b. 10 балів
  - c. 6 балів
  - d. 12 балів
  - e. 8 балів
9. Вагітну жінку віком 29 років скаржиться на переймоподібний біль унизу живота, який турбує протягом
- a. Шпиталізація. Введення розчину магнію сульфату протягом 3-5 днів
  - b. Перевести до пологового відділення та очікувати прогресування пологової діяльності
  - c. Шпиталізувати до пологового відділення, провести амніотомію
  - d. Шпиталізація. Профілактика РДС плода розчином дексаметазону. Токолітична терапія протягом 48 го
  - e. Шпиталізувати до пологового відділення та розпочати введення розчину окситоцину
10. Вагітну жінку віком 29 років скаржиться на переймоподібний біль унизу живота, який турбує протягом

- a. Шпиталізувати до пологового відділення та розпочати введення розчину окситоцину
- b. Шпиталізація. Введення розчину магнію сульфату протягом 3-5 днів
- c. Шпиталізувати до пологового відділення, провести амніотомію
- d. Перевести до пологового відділення та очікувати прогресування пологової діяльності

e. Шпиталізація. Профілактика РДС плоду розчином дексаметазону. Токолітична терапія протягом 48 го

11. Вагітну жінку віком 18 років шпиталізовано зі скаргами на рясні водянисті виділення із статевих

a. Шпиталізація, ургентний кесарів розтин на фоні антибактеріальної терапії (макроліди + пеніциліни)

b. Шпиталізація, магнезійальна терапія + антибактеріальна терапія

c. Шпиталізація, призначення глюкокортикостероїдів

d. Шпиталізація, профілактика РДС, індукція пологів

e. Шпиталізація, антибактеріальна терапія

12. Вагітну жінку віком 18 років шпиталізовано зі скаргами на рясні водянисті виділення із статевих

a. Шпиталізація, профілактика РДС, індукція пологів

b. Шпиталізація, магнезійальна терапія + антибактеріальна терапія

c. Шпиталізація, ургентний кесарів розтин на фоні антибактеріальної терапії (макроліди + пеніциліни)

d. Шпиталізація, призначення глюкокортикостероїдів

e. Шпиталізація, антибактеріальна терапія

13. Вагітну жінку віком 36 років шпиталізовано зі скаргами на регулярну пологову діяльність протягом

a. Лобне вставлення голівки

b. Передньоголовне вставлення голівки

c. Асинклітичне вставлення голівки

d. Лицеве вставлення голівки

e. Поперечне положення плода

14. Вагітну жінку віком 36 років шпиталізовано зі скаргами на регулярну пологову діяльність протягом

a. Асинклітичне вставлення голівки

b. Лобне вставлення голівки

c. Лицеве вставлення голівки

d. Передньоголовне вставлення голівки

e. Поперечне положення плода

15. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль унизу живота, збільшення об'єму живота, втрату маси

a. Консультація лікаря-хірурга

b. -

c. Провести тести на пухлині маркери раку яєчників

d. Зробити КТ черевної порожнини

e. Направити на УЗД дослідження

16. Дванадцятирічна дівчинка скаржиться на біль унизу живота, збільшення об'єму живота, втрату маси

a. Провести тести на пухлині маркери раку яєчників

b. Консультація лікаря-хірурга

c. Направити на УЗД дослідження

d. -

e. Зробити КТ черевної порожнини

17. До приймального відділення звернулася жінка віком 28 років у терміні вагітності 9 тижнів із знач

a. Шпиталізація, терапія на збереження вагітності, УЗД, консультація лікаря-хірурга

b. Шпиталізація, катетеризація кубітальної вени, УЗД, виклик лікаря-анестезіолога, інструментальна р

c. Шпиталізація до гематологічного відділення, консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-хі

d. Шпиталізація, протизапальна терапія, УЗД, консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-гемат

e. Гемостатична терапія, терапія на збереження вагітності, консультація лікаря-гематолога, УЗД у пла

18. До приймального відділення звернулася жінка віком 28 років у терміні вагітності 9 тижнів із знач

a. Шпиталізація, терапія на збереження вагітності, УЗД, консультація лікаря-хірурга

b. Шпиталізація, катетеризація кубітальної вени, УЗД, виклик лікаря-анестезіолога, інструментальна р

c. Шпиталізація, протизапальна терапія, УЗД, консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-гемат

d. Гемостатична терапія, терапія на збереження вагітності, консультація лікаря-гематолога, УЗД у пла

e. Шпиталізація до гематологічного відділення, консультація лікаря-терапевта, консультація лікаря-хі

19. Дівчина віком 15 років скаржиться на відсутність менструації. Об'єктивно спостерігається: феноти

a. Синдром Маєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера

- b. Синдром Шерешевського-Тернера
- c. Синдром Моріса
- d. -
- e. Синдром Морганьї-Стюарта-Мореля

20. Дівчина віком 15 років скаржиться на відсутність менструації. Об'єктивно спостерігається: феноти

- a. Синдром Морганьї-Стюарта-Мореля
- b. -
- c. Синдром Шерешевського-Тернера
- d. Синдром Маєра-Рокітанського-Кюстера-Гаузера
- e. Синдром Моріса

21. Дівчина віком 15 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 9-т

- a. Монофазні КОК у контрацептивному режимі
- b. Ібупрофен по 200 мг 3 рази на добу
- c. Транексамову кислоту по 0,5 г перорально тричі на добу 4-5 днів
- d. Транексамову кислоту 10 мг/кг внутрішньовенно краплинно 1 раз на добу 4-5 днів
- e. Ібупрофен по 400 мг 4 рази на добу

22. Дівчина віком 15 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 9-т

- a. Транексамову кислоту 10 мг/кг внутрішньовенно краплинно 1 раз на добу 4-5 днів
- b. Ібупрофен по 200 мг 3 рази на добу
- c. Транексамову кислоту по 0,5 г перорально тричі на добу 4-5 днів
- d. Монофазні КОК у контрацептивному режимі
- e. Ібупрофен по 400 мг 4 рази на добу

23. Жінка віком 20 років через 12 днів після пологів скаржиться на значну локальну болісність, почер

- a. Інфільтративний мастит
- b. Гнійний мастит
- c. Абсцес молочної залози
- d. Серозний мастит
- e. Лактостаз

24. Жінка віком 20 років через 12 днів після пологів скаржиться на значну локальну болісність, почер

- a. Серозний мастит
- b. Гнійний мастит
- c. Абсцес молочної залози
- d. Лактостаз
- e. Інфільтративний мастит

25. Жінка віком 21 рік у терміні вагітності 32 тижні проходить плановий огляд. Скарг не має. За оста

- a. Призначити beta-адреноблокатори
- b. УЗД плода з доплерометрією
- c. Призначити гіпотензивну терапію
- d. Призначити загальний аналіз сечі
- e. Провести ЕКГ

26. Жінка віком 21 рік у терміні вагітності 32 тижні проходить плановий огляд. Скарг не має. За оста

- a. Провести ЕКГ
- b. Призначити гіпотензивну терапію
- c. Призначити beta-адреноблокатори
- d. Призначити загальний аналіз сечі
- e. УЗД плода з доплерометрією

27. Жінка віком 22 роки в терміні вагітності 25 тижнів скаржиться на швидку втомлюваність. Об'єктивн

- a. Набута гемолітична анемія
- b. Хоріоамніоніт
- c. В<sub>12</sub>-дефіцитна анемія
- d. Залізодефіцитна анемія
- e. Гострий лейкоз

28. Жінка віком 22 роки в терміні вагітності 25 тижнів скаржиться на швидку втомлюваність. Об'єктивн

- a. Хоріоамніоніт
- b. Залізодефіцитна анемія

- c. Набута гемолітична анемія
- d. Гострий лейкоз
- e. B<sub>12</sub>-дефіцитна анемія

29. Жінка віком 22 роки в терміні вагітності 8 тижнів скаржиться на блювання до 10-15 разів на день,

- a. Аналіз сечі на кетонів тіла
- b. Проба за Зимницьким
- c. Коагулограма
- d. Проведення печінкових проб

e. Аналіз крові на визначення рівня калію, натрію, глюкози та креатиніну в крові

30. Жінка віком 22 роки в терміні вагітності 8 тижнів скаржиться на блювання до 10-15 разів на день,

- a. Коагулограма
- b. Проба за Зимницьким
- c. Проведення печінкових проб

d. Аналіз крові на визначення рівня калію, натрію, глюкози та креатиніну в крові

e. Аналіз сечі на кетонів тіла

31. Жінка віком 23 роки в терміні вагітності 9-10 тижнів скаржиться на загальну слабкість, головний

a. Вітряна віспа

b. Краснуха

- c. Парвовірусна інфекція
- d. Цитомегаловірусна інфекція
- e. Кір

32. Жінка віком 23 роки в терміні вагітності 9-10 тижнів скаржиться на загальну слабкість, головний

- a. Кір
- b. Цитомегаловірусна інфекція
- c. Вітряна віспа
- d. Парвовірусна інфекція

e. Краснуха

33. Жінка віком 23 роки скаржиться на затримку менструації протягом 3-х місяців, збільшення молочних

a. Пухирний занос

- b. Позаматкова вагітність
- c. Передлежання плаценти
- d. Спонтанний аборт
- e. Завмерла вагітність

34. Жінка віком 23 роки скаржиться на затримку менструації протягом 3-х місяців, збільшення молочних

a. Передлежання плаценти

b. Пухирний занос

- c. Завмерла вагітність
- d. Спонтанний аборт
- e. Позаматкова вагітність

35. Жінка віком 24 роки в терміні вагітності 20 тижнів скаржиться на біль у животі, багаторазове блю

a. Гострий панкреатит

b. Гострий апендицит

- c. Загроза пізнього викидня
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Гострий холецистит

36. Жінка віком 24 роки в терміні вагітності 20 тижнів скаржиться на біль у животі, багаторазове блю

a. Гострий пієлонефрит

b. Гострий апендицит

- c. Гострий панкреатит
- d. Загроза пізнього викидня
- e. Гострий холецистит

37. Жінка віком 24 роки звернулася до лікаря-гінеколога на профілактичний огляд. Менструальний цик

- a. -
- b. Ексцизійна біопсія шийки матки
- c. Кольпоскопія

d. Ендоцервікальний кюретаж

e. Повторна цитологія через 6-12 місяців

38. Жінка віком 24 роки звернулася до лікаря-гінеколога на профілактичний огляд. Менструальний цикл

a. Ендоцервікальний кюретаж

b. Кольпоскопія

c. Повторна цитологія через 6-12 місяців

d. Ексцизійна біопсія шийки матки

e. -

39. Жінка віком 24 роки перебуває в пологовій залі з діагнозом: вагітність I, 41 тиждень, пологи I,

a. Інфузійна терапія розчином магнію сульфату

b. Продовжити спостереження протягом 30 хв

c. Негайне розродження шляхом кесаревого розтину

d. Продовжити спостереження протягом 1 год

e. Розпочати посилення пологової діяльності шляхом введення розчину окситоцину

40. Жінка віком 24 роки перебуває в пологовій залі з діагнозом: вагітність I, 41 тиждень, пологи I,

a. Інфузійна терапія розчином магнію сульфату

b. Продовжити спостереження протягом 30 хв

c. Продовжити спостереження протягом 1 год

d. Розпочати посилення пологової діяльності шляхом введення розчину окситоцину

e. Негайне розродження шляхом кесаревого розтину

41. Жінка віком 25 років звернулася на консультацію до лікаря акушера-гінеколога. Із анамнезу відомо

a. Визначення титру резус-антитіл з подальшою анти-D імунопрофілактикою в 28 тижнів вагітності

b. УЗД з доплерометрією, шпиталізація, токолітична терапія

c. УЗД з доплерометрією та рентгенографія органів черевної порожнини

d. Визначення біофізичного профілю плода

e. Анти-D імунопрофілактика для резус-негативних жінок у 13 тижнів вагітності

42. Жінка віком 25 років звернулася на консультацію до лікаря акушера-гінеколога. Із анамнезу відомо

a. Визначення біофізичного профілю плода

b. УЗД з доплерометрією, шпиталізація, токолітична терапія

c. Визначення титру резус-антитіл з подальшою анти-D імунопрофілактикою в 28 тижнів вагітності

d. УЗД з доплерометрією та рентгенографія органів черевної порожнини

e. Анти-D імунопрофілактика для резус-негативних жінок у 13 тижнів вагітності

43. Жінка віком 25 років на другу добу після пологів скаржиться на підвищення температури тіла 37,8°С

a. Зціджування грудного молока

b. Кровоспинні препарати

c. Нестероїдні протизапальні засоби

d. Антибіотикотерапія

e. Глюкокортикостероїди

44. Жінка віком 25 років на другу добу після пологів скаржиться на підвищення температури тіла 37,8°С

a. Нестероїдні протизапальні засоби

b. Кровоспинні препарати

c. Глюкокортикостероїди

d. Антибіотикотерапія

e. Зціджування грудного молока

45. Жінка віком 25 років скаржиться на нерегулярні менструації, надмірне оволосіння тіла. Відомо, що

a. Комбіновані оральні контрацептиви

b. Дидрогестерон по 10 мг на добу з 5 по 25 день циклу

c. Ввести левоноргестрел-вміщуючий ВМК

d. Метформін по 500 мг через 12 год

e. Дидрогестерон по 10 мг на добу з 11 по 25 день циклу

46. Жінка віком 25 років скаржиться на нерегулярні менструації, надмірне оволосіння тіла. Відомо, що

a. Дидрогестерон по 10 мг на добу з 11 по 25 день циклу

b. Ввести левоноргестрел-вміщуючий ВМК

c. Дидрогестерон по 10 мг на добу з 5 по 25 день циклу

d. Метформін по 500 мг через 12 год

**е. Комбіновані оральні контрацептиви**

47. Жінка віком 26 років народжує через природні пологові шляхи. В анамнезі: кесарів розтин 3 роки т

а. Ургентний кесарів розтин

**б. Накладання вихідних акушерських щипців. Ручне відділення плаценти та видалення посліду**

с. Родопідсилення довенним краплинним введенням окситоцину. Ручне відділення плаценти та видалення посліду

d. Вакуум-екстракція плода

е. Порожнинні акушерські щипці. Ручне відділення плаценти та видалення посліду

48. Жінка віком 26 років народжує через природні пологові шляхи. В анамнезі: кесарів розтин 3 роки т

а. Ургентний кесарів розтин

б. Порожнинні акушерські щипці. Ручне відділення плаценти та видалення посліду

**с. Накладання вихідних акушерських щипців. Ручне відділення плаценти та видалення посліду**

d. Родопідсилення довенним краплинним введенням окситоцину. Ручне відділення плаценти та видалення посліду

е. Вакуум-екстракція плода

49. Жінка віком 26 років скаржиться на періодичні незначні кров'янисті виділення з піхви протягом 3-

а. Визначення рівня прогестерону в сироватці крові

**б. Трансвагінальне ультразвукове дослідження органів малого таза**

с. Визначення рівня пролактину в сироватці крові

d. Гістероскопія

е. Визначення рівня хоріонічного гонадотропіну людини в сироватці крові

50. Жінка віком 26 років скаржиться на періодичні незначні кров'янисті виділення з піхви протягом 3-

а. Визначення рівня пролактину в сироватці крові

б. Визначення рівня прогестерону в сироватці крові

**с. Трансвагінальне ультразвукове дослідження органів малого таза**

d. Визначення рівня хоріонічного гонадотропіну людини в сироватці крові

е. Гістероскопія

51. Жінка віком 26 років у терміні вагітності 39 тижнів перебуває в пологовій залі. У неї триває акт

а. 30 хв

б. 60 хв

с. 3 год

d. 2 год

**е. 4 год**

52. Жінка віком 26 років у терміні вагітності 39 тижнів перебуває в пологовій залі. У неї триває акт

а. 60 хв

б. 30 хв

с. 3 год

d. 2 год

**е. 4 год**

53. Жінка віком 27 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на відсутність вагітності. У

а. Визначення гормонального балансу репродуктивної системи

б. Гістеросальпінгографія

с. Вимірювання базальної температури

**d. Спермограма чоловіка**

е. Лапароскопія

54. Жінка віком 27 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на відсутність вагітності. У

а. Гістеросальпінгографія

**б. Спермограма чоловіка**

с. Лапароскопія

d. Визначення гормонального балансу репродуктивної системи

е. Вимірювання базальної температури

55. Жінка віком 27 років звернулася до сімейного лікаря. Об'єктивно спостерігається: конституція тіл

**а. Термін 28 тижнів. Виконання всіх обстежень першого візиту. Заповнення анкети соціальних потреб**

б. Термін 30 тижнів. Визначення біофізичного профілю плода

с. Термін 30 тижнів. УЗД з доплерометрією, шпиталізація

d. Термін 26 тижнів. Стандартне обстеження вагітної з ультразвуковим скринінгом у 32 тижні

е. Термін 24 тижні. Шпиталізація для дообстеження та токолітична терапія



56. Жінка віком 27 років звернулася до сімейного лікаря. Об'єктивно спостерігається: конституція тіл
- a. Термін 26 тижнів. Стандартне обстеження вагітної з ультразвуковим скринінгом у 32 тижні
  - b. Термін 30 тижнів. Визначення біофізичного профілю плода
  - c. Термін 30 тижнів. УЗД з доплерометрією, шпиталізація
  - d. Термін 28 тижнів. Виконання всіх обстежень першого візиту. Заповнення анкети соціальних потреб
  - e. Термін 24 тижні. Шпиталізація для дообстеження та токолітична терапія
57. Жінка віком 27 років у терміні вагітності 17-18 тижнів скаржиться на відчуття тяжкості внизу жив
- a. Гестаційний пієлонефрит
  - b. Загроза пізнього самовільного викидня
  - c. Гострий цистит
  - d. Копростаз
  - e. Істміко-цервікальна недостатність
58. Жінка віком 27 років у терміні вагітності 17-18 тижнів скаржиться на відчуття тяжкості внизу жив
- a. Гострий цистит
  - b. Копростаз
  - c. Істміко-цервікальна недостатність
  - d. Гестаційний пієлонефрит
  - e. Загроза пізнього самовільного викидня
59. Жінка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , гній
- a. Тубоваріальний абсцес ліворуч
  - b. Кіста лівого яєчника
  - c. Пароваріальна кіста ліворуч
  - d. Лівобічний оофорит
  - e. Лівобічний сальпінгіт
60. Жінка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ , гній
- a. Лівобічний сальпінгіт
  - b. Лівобічний оофорит
  - c. Пароваріальна кіста ліворуч
  - d. Кіста лівого яєчника
  - e. Тубоваріальний абсцес ліворуч
61. Жінка віком 28 років стала на облік до сімейного лікаря в терміні вагітності 9 тижнів. Об'єктивн
- a. Ацетилсаліцилова кислота по 100-150 мг 1 раз на день з 12 до 36 тижнів вагітності
  - b. Седативний фітопрепарат на весь період вагітності
  - c. Ацетилсаліцилова кислота по 75 мг 1 раз на день з 12 до 40 тижнів вагітності
  - d. Низькомолекулярні гепарини з 20 тижнів вагітності
  - e. Зміна способу життя, харчування, вітамінотерапія
62. Жінка віком 28 років стала на облік до сімейного лікаря в терміні вагітності 9 тижнів. Об'єктивн
- a. Зміна способу життя, харчування, вітамінотерапія
  - b. Низькомолекулярні гепарини з 20 тижнів вагітності
  - c. Ацетилсаліцилова кислота по 100-150 мг 1 раз на день з 12 до 36 тижнів вагітності
  - d. Ацетилсаліцилова кислота по 75 мг 1 раз на день з 12 до 40 тижнів вагітності
  - e. Седативний фітопрепарат на весь період вагітності
63. Жінка віком 29 років скаржиться на тривалі та рясні менструації протягом останніх 3-х місяців, щ
- a. Аномальна маткова кровотеча
  - b. Хронічний сальпінгоофорит
  - c. Лейоміома матки
  - d. Хронічний ендометрит
  - e. Синдром полікістозних яєчників
64. Жінка віком 29 років скаржиться на тривалі та рясні менструації протягом останніх 3-х місяців, щ
- a. Хронічний ендометрит
  - b. Синдром полікістозних яєчників
  - c. Аномальна маткова кровотеча
  - d. Хронічний сальпінгоофорит
  - e. Лейоміома матки
65. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 37-38 тижнів скаржиться на головний біль, закладеність

a. Гестаційна гіпертензія

**b. Тяжка прееклампсія**

c. Еклампсія

d. Помірна прееклампсія

e. Артеріальна гіпертензія I ступеня

66. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 37-38 тижнів скаржиться на головний біль, закладеність

a. Гестаційна гіпертензія

b. Еклампсія

**c. Тяжка прееклампсія**

d. Помірна прееклампсія

e. Артеріальна гіпертензія I ступеня

67. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 39-40 тижнів шпиталізовано з пологовою діяльністю. Роз

a. Емболія навколоплідними водами

b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

**c. Загроза розриву матки**

d. Передлежання плаценти

e. Повний розрив матки

68. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 39-40 тижнів шпиталізовано з пологовою діяльністю. Роз

a. Емболія навколоплідними водами

b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

c. Повний розрив матки

**d. Загроза розриву матки**

e. Передлежання плаценти

69. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 5-6 тижнів скаржиться на швидку стомлюваність, зміни н

a. Визначення лейкоцитарного антигену людини (HLA)

b. Тестування на антинуклеарні антитіла (ANA)

c. Скринінг на антифосфоліпідні антитіла

**d. Скринінг щитоподібної залози (ТТГ, АТПО)**

e. Визначення рівня пролактину

70. Жінка віком 29 років у терміні вагітності 5-6 тижнів скаржиться на швидку стомлюваність, зміни н

a. Тестування на антинуклеарні антитіла (ANA)

b. Скринінг на антифосфоліпідні антитіла

c. Визначення лейкоцитарного антигену людини (HLA)

**d. Скринінг щитоподібної залози (ТТГ, АТПО)**

e. Визначення рівня пролактину

71. Жінка віком 30 років у терміні вагітності 38 тижнів скаржиться на прозорі виділення без запаху з

**a. Терміновий допологовий розрив плідних оболонок**

b. Перший період пологів

c. Передчасний допологовий розрив плідних оболонок

d. Хибні перейми

e. Ранній розрив плідних оболонок

72. Жінка віком 30 років у терміні вагітності 38 тижнів скаржиться на прозорі виділення без запаху з

a. Ранній розрив плідних оболонок

**b. Терміновий допологовий розрив плідних оболонок**

c. Передчасний допологовий розрив плідних оболонок

d. Перший період пологів

e. Хибні перейми

73. Жінка віком 32 роки звернулася до лікаря акушера-гінеколога у зв'язку зі зменшенням рухової акти

a. Амніоцентезу

b. МРТ плода

c. Кардіотокографії

d. Рентгенографії ОЧП

**e. Ультразвукової фетоплацентометрії**

74. Жінка віком 32 роки звернулася до лікаря акушера-гінеколога у зв'язку зі зменшенням рухової акти

a. Рентгенографії ОЧП



b. Кардіотокографії

c. Амніоцентезу

d. Ультразвукової фетоплацентометрії

e. МРТ плода

75. Жінка віком 32 роки скаржиться на рясні менструації, біль під час статевого акту. В анамнезі: но

a. Екзоцервіцит

b. Ектропіон шийки матки

c. Ендометріоз шийки матки

d. Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (плоского епітелію)

e. Лейкоплакія шийки матки

76. Жінка віком 32 роки скаржиться на рясні менструації, біль під час статевого акту. В анамнезі: но

a. Ектропіон шийки матки

b. Ендометріоз шийки матки

c. Лейкоплакія шийки матки

d. Екзоцервіцит

e. Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (плоского епітелію)

77. Жінка віком 33 роки скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 10-ти днів.

a. Поліпектомія шляхом гістероскопії

b. Очікувальна тактика

c. Екстерпація матки з придатками

d. Кюретаж порожнини матки

e. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

78. Жінка віком 33 роки скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 10-ти днів.

a. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

b. Поліпектомія шляхом гістероскопії

c. Кюретаж порожнини матки

d. Очікувальна тактика

e. Екстерпація матки з придатками

79. Жінка віком 34 роки 1 годину тому народила живий доношений плід чоловічої статі масою тіла 3600

a. Затримка в матці частин плаценти та оболонок

b. Прирощення плаценти

c. Повне щільне прикріплення плаценти

d. Часткове щільне прикріплення плаценти

e. Защемлення плаценти, що відділилася

80. Жінка віком 34 роки 1 годину тому народила живий доношений плід чоловічої статі масою тіла 3600

a. Часткове щільне прикріплення плаценти

b. Повне щільне прикріплення плаценти

c. Затримка в матці частин плаценти та оболонок

d. Защемлення плаценти, що відділилася

e. Прирощення плаценти

81. Жінка віком 35 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 10-ти

a. Гістерорезектоскопія

b. Лапароскопія, супрацервікальна гістеректомія

c. Лапароскопічна гістеректомія

d. Фракційне вишкрібання цервікального каналу та порожнини матки

e. Лапаротомія, гістеректомія

82. Жінка віком 35 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 10-ти

a. Лапароскопічна гістеректомія

b. Фракційне вишкрібання цервікального каналу та порожнини матки

c. Гістерорезектоскопія

d. Лапаротомія, гістеректомія

e. Лапароскопія, супрацервікальна гістеректомія

83. Жінка віком 35 років у терміні вагітності 12 тижнів звернулася до лікаря для спостереження по ва

a. Ацетилсаліцилову кислоту

b. Калію йодид

- c. Фолієву кислоту
- d. Магнію сульфат
- e. Холекальциферол

84. Жінка віком 35 років у терміні вагітності 12 тижнів звернулася до лікаря для спостереження по ва

a. Ацетилсаліцилову кислоту

- b. Магнію сульфат
- c. Фолієву кислоту
- d. Калію йодид
- e. Холекальциферол

85. Жінка віком 36 років перебуває в пологовому відділенні з діагнозом: вагітність IV, 39 тижнів, по

a. ДВЗ-синдром

b. Інфаркт міокарда

c. Емболія навколоплідними водами

- d. Повітряна емболія
- e. ТЕЛА

86. Жінка віком 36 років перебуває в пологовому відділенні з діагнозом: вагітність IV, 39 тижнів, по

a. ТЕЛА

b. Повітряна емболія

c. Емболія навколоплідними водами

- d. ДВЗ-синдром
- e. Інфаркт міокарда

87. Жінка віком 38 років у терміні вагітності 25-26 тижнів скаржиться на спрагу, часте сечовипусканн

a. Нецукровий діабет

b. Маніфестний цукровий діабет, вперше виявлений

c. Цукровий діабет 2-го типу

d. Цукровий діабет 1-го типу

e. Гестаційний діабет

88. Жінка віком 38 років у терміні вагітності 25-26 тижнів скаржиться на спрагу, часте сечовипусканн

a. Цукровий діабет 1-го типу

b. Нецукровий діабет

c. Цукровий діабет 2-го типу

d. Гестаційний діабет

e. Маніфестний цукровий діабет, вперше виявлений

89. Жінка віком 45 років хворіє на тяжку форму передменструального синдрому та глибокий інфільтрат

a. Тотальна гістеректомія з двобічною сальпінгооваріоектомією

b. Тотальна гістеректомія з двобічною сальпінгоектомією

c. Двобічна оваріоектомія

d. Тотальна гістеректомія з двобічною оваріоектомією

e. Надпіхвова ампутація матки без придатків

90. Жінка віком 45 років хворіє на тяжку форму передменструального синдрому та глибокий інфільтрат

a. Тотальна гістеректомія з двобічною оваріоектомією

b. Двобічна оваріоектомія

c. Надпіхвова ампутація матки без придатків

d. Тотальна гістеректомія з двобічною сальпінгооваріоектомією

e. Тотальна гістеректомія з двобічною сальпінгоектомією

91. Жінка віком 47 років скаржиться на появу кров'янистих виділень із піхви мажучого характеру з неп

a. Гіперплазія ендометрія

b. Поліп ендометрія

c. Субмукозна лейоміома

d. Рак ендометрія

e. Хронічний ендометрит

92. Жінка віком 47 років скаржиться на появу кров'янистих виділень із піхви мажучого характеру з неп

a. Хронічний ендометрит

b. Рак ендометрія

c. Гіперплазія ендометрія

- d. Поліп ендометрія
- e. Субмукозна лейоміома

93. Жінка віком 48 років скаржиться на нетримання сечі та дискомфорт під час статевого акту. В анамнезі

- a. Неповний матково-вагінальний пролапс. Цистоцеле. Ректоцеле
- b. Повний матково-вагінальний пролапс. Ректоцеле. Ентероцеле піхви
- c. Уретероцеле

**d. Цистоцеле**

- e. Пролапс відсутній

94. Жінка віком 48 років скаржиться на нетримання сечі та дискомфорт під час статевого акту. В анамнезі

- a. Неповний матково-вагінальний пролапс. Цистоцеле. Ректоцеле
- b. Уретероцеле
- c. Повний матково-вагінальний пролапс. Ректоцеле. Ентероцеле піхви
- d. Пролапс відсутній

**e. Цистоцеле**

95. Жінка віком 48 років скаржиться на рясні нерегулярні маткові кровотечі, біль унизу живота та збі

- a. Аденоміоз
- b. Рак ендометрія

**c. Саркома матки**

- d. Лейоміома матки
- e. Гіперплазія ендометрія

96. Жінка віком 48 років скаржиться на рясні нерегулярні маткові кровотечі, біль унизу живота та збі

- a. Рак ендометрія

**b. Саркома матки**

- c. Аденоміоз
- d. Лейоміома матки
- e. Гіперплазія ендометрія

97. Жінка віком 58 років скаржиться на неконтрольоване підтікання сечі під час кашлю, чхання, сміху,

**a. Стресове нетримання сечі**

- b. Ургентне нетримання сечі (гіперактивний сечовий міхур)
- c. Змішане нетримання сечі
- d. Рецидивуючий цистит
- e. Міхурово-вагінальна нориця

98. Жінка віком 58 років скаржиться на неконтрольоване підтікання сечі під час кашлю, чхання, сміху,

- a. Ургентне нетримання сечі (гіперактивний сечовий міхур)
- b. Міхурово-вагінальна нориця

**c. Стресове нетримання сечі**

- d. Рецидивуючий цистит
- e. Змішане нетримання сечі

99. Жінку віком 18 років шпиталізовано до пологового будинку в тяжкому стані після пологів на дому.

**a. Повний виворіт матки**

- b. Розрив матки
- c. Матка Кувелера
- d. Розрив шийки матки
- e. Дефект плаценти

100. Жінку віком 18 років шпиталізовано до пологового будинку в тяжкому стані після пологів на дому.

**a. Повний виворіт матки**

- b. Розрив матки
- c. Розрив шийки матки
- d. Дефект плаценти
- e. Матка Кувелера

101. Жінку віком 19 років шпиталізовано з аномальною матковою кровотечею. Соматично здорова. Мен

**a. Комбіновані гормональні контрацептиви**

- b. Антифібринолітики
- c. Дилатація та кюретаж
- d. Агоністи гонадотропін-рилізінг гормона

e. Нестероїдні протизапальні засоби

102. Жінку віком 19 років шпиталізовано з аномальною матковою кровотечею. Соматично здорова. Менструації регулярні.

a. Антифібринолітики

b. Нестероїдні протизапальні засоби

c. Агоністи гонадотропін-рилізінг гормону

d. Дилатація та кюретаж

e. Комбіновані гормональні контрацептиви

103. Жінку віком 24 роки в терміні вагітності 39 тижнів шпиталізовано зі скаргами на регулярний перебіг вагітності.

a. Продовжити консервативне ведення пологів

b. Ургентний кесарів розтин

c. Розпочати стимуляцію пологів

d. -

e. Амніотомія

104. Жінку віком 24 роки в терміні вагітності 39 тижнів шпиталізовано зі скаргами на регулярний перебіг вагітності.

a. Розпочати стимуляцію пологів

b. Амніотомія

c. Ургентний кесарів розтин

d. -

e. Продовжити консервативне ведення пологів

105. Жінку віком 24 роки шпиталізовано до акушерського відділення через 4 год після початку регулярних менструацій.

a. Перший період пологів, латентна фаза

b. Другий період пологів, рання фаза

c. Хибні пологи

d. Перший період пологів, активна фаза

e. Другий період пологів, пізня (потужна) фаза

106. Жінку віком 24 роки шпиталізовано до акушерського відділення через 4 год після початку регулярних менструацій.

a. Хибні пологи

b. Перший період пологів, латентна фаза

c. Другий період пологів, пізня (потужна) фаза

d. Перший період пологів, активна фаза

e. Другий період пологів, рання фаза

107. Жінку віком 25 років у терміні вагітності 36 тижнів шпиталізовано зі скаргами на постійний сильний біль у нижній частині живота.

a. Дискоординована пологова діяльність

b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

c. Прелімінальний період

d. Перший період пологів, латентна фаза

e. Передлежання плаценти

108. Жінку віком 25 років у терміні вагітності 36 тижнів шпиталізовано зі скаргами на постійний сильний біль у нижній частині живота.

a. Перший період пологів, латентна фаза

b. Прелімінальний період

c. Дискоординована пологова діяльність

d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

e. Передлежання плаценти

109. Жінку віком 32 роки в терміні вагітності 40 тижнів шпиталізовано з регулярною пологовою діяльністю.

a. Другий період, пізня фаза

b. Другий період, рання фаза

c. Перший період, латентна фаза

d. Прелімінальний період

e. Перший період, активна фаза

110. Жінку віком 32 роки в терміні вагітності 40 тижнів шпиталізовано з регулярною пологовою діяльністю.

a. Перший період, латентна фаза

b. Перший період, активна фаза

c. Другий період, рання фаза

d. Другий період, пізня фаза

e. Прелімінальний період

111. Жінку віком 32 роки в терміні вагітності 42 тижні шпиталізовано до пологового будинку. Об'єктив

a. Гіперстимуляція матки

b. Передчасне відшарування плаценти

c. Випадіння петель пуповини

d. Анафілактична реакція

e. Розрив матки

112. Жінку віком 32 роки в терміні вагітності 42 тижні шпиталізовано до пологового будинку. Об'єктив

a. Розрив матки

b. Анафілактична реакція

c. Випадіння петель пуповини

d. Гіперстимуляція матки

e. Передчасне відшарування плаценти

113. Жінку віком 33 роки в терміні вагітності 39 тижнів шпиталізовано зі спонтанним початком перейм

a. Вакуум-екстракція плода

b. Ургентний кесарів розтин

c. Накладання акушерських щипців

d. Амніотомія

e. Епізіотомія

114. Жінку віком 33 роки в терміні вагітності 39 тижнів шпиталізовано зі спонтанним початком перейм

a. Накладання акушерських щипців

b. Вакуум-екстракція плода

c. Ургентний кесарів розтин

d. Епізіотомія

e. Амніотомія

115. Жінку віком 34 роки шпиталізовано в терміні вагітності 36 тижнів. За результатами УЗД виявлено:

a. Вагінальні пологи

b. Кесарів розтин з початком пологової діяльності

c. Плановий кесарів розтин у 40 тижнів вагітності

d. Плановий кесарів розтин у 38 тижнів вагітності

e. Плановий кесарів розтин у 37 тижнів вагітності

116. Жінку віком 34 роки шпиталізовано в терміні вагітності 36 тижнів. За результатами УЗД виявлено:

a. Плановий кесарів розтин у 38 тижнів вагітності

b. Плановий кесарів розтин у 40 тижнів вагітності

c. Кесарів розтин з початком пологової діяльності

d. Вагінальні пологи

e. Плановий кесарів розтин у 37 тижнів вагітності

117. Жінку віком 39 років з терміном вагітності 39 тижнів шпиталізовано до пологового відділення в а

a. 5 хв

b. 30 хв

c. 45 хв

d. 10 хв

e. 15 хв

118. Жінку віком 39 років з терміном вагітності 39 тижнів шпиталізовано до пологового відділення в а

a. 30 хв

b. 15 хв

c. 5 хв

d. 45 хв

e. 10 хв

119. Жінку віком 43 роки шпиталізовано до пологового стаціонару в терміні вагітності 37-38 тижні. В

a. Додаткова профілактична доза антибіотика (цефалоспорины 1 покоління) через 3-4 години після поч

b. Цефалоспорины 2 покоління однократно

c. Антибіотикотерапія цефалоспоринами 2 покоління протягом 7 днів

d. Кліндаміцин однократно

e. Цефалоспорины 3 покоління протягом 5 днів

120. Жінку віком 43 роки шпиталізовано до пологового стаціонару в терміні вагітності 37-38 тижні. В

- a. Цефалоспорины 2 покоління однократно
  - b. Кліндаміцин однократно
  - c. Антибіотикотерапія цефалоспоринами 2 покоління протягом 7 днів
  - d. Додаткова профілактична доза антибіотика (цефалоспорины 1 покоління) через 3-4 години після початку прийому
  - e. Цефалоспорины 3 покоління протягом 5 днів
121. Жінці віком 29 років у терміні вагітності 18 тижнів після перенесеної гострої респіраторної інфекції
- a. Парвовірусу B19
  - b. Сифілісу
  - c. Генітального герпесу
  - d. ВІЛ-інфекції
  - e. Краснухи
122. Жінці віком 29 років у терміні вагітності 18 тижнів після перенесеної гострої респіраторної інфекції
- a. Краснухи
  - b. ВІЛ-інфекції
  - c. Парвовірусу B19
  - d. Сифілісу
  - e. Генітального герпесу
123. Жінці віком 43 роки встановлено діагноз: тяжка преєклампсія, передчасне відшарування плаценти
- a. Переривчаста пневматична компресія (ППК) під час операції
  - b. Тромбопрофілактика НМГ щонайменше протягом 7-ми днів
  - c. Механічні заходи профілактики під час операції та впродовж перших 3-х діб післяопераційного періоду
  - d. Тромбопрофілактика НМГ щонайменше протягом 6-ти тижнів
  - e. Тромбопрофілактика НМГ протягом усього періоду шпиталізації
124. Жінці віком 43 роки встановлено діагноз: тяжка преєклампсія, передчасне відшарування плаценти
- a. Тромбопрофілактика НМГ щонайменше протягом 7-ми днів
  - b. Переривчаста пневматична компресія (ППК) під час операції
  - c. Механічні заходи профілактики під час операції та впродовж перших 3-х діб післяопераційного періоду
  - d. Тромбопрофілактика НМГ протягом усього періоду шпиталізації
  - e. Тромбопрофілактика НМГ щонайменше протягом 6-ти тижнів
125. На обліку в жіночій консультації перебуває жінка віком 22 роки в терміні вагітності 9-10 тижнів
- a. 28-34 тижні
  - b. 16-18 тижні
  - c. 10-14 тижні
  - d. 35-36 тижні
  - e. 18-24 тижні
126. На обліку в жіночій консультації перебуває жінка віком 22 роки в терміні вагітності 9-10 тижнів
- a. 18-24 тижні
  - b. 35-36 тижні
  - c. 28-34 тижні
  - d. 10-14 тижні
  - e. 16-18 тижні
127. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на відсутність менструації, росту грудних залоз та відсутні ознаки статевого дозрівання
- a. Каріотипування
  - b. Рентгенографію кистей
  - c. УЗД органів малого таза та наднирників
  - d. Визначення рівнів СТГ, ТТГ та пролактину
  - e. Визначення рівнів ФСГ, ЛГ та естрадіолу
128. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на відсутність менструації, росту грудних залоз та відсутні ознаки статевого дозрівання
- a. Визначення рівнів СТГ, ТТГ та пролактину
  - b. УЗД органів малого таза та наднирників
  - c. Каріотипування
  - d. Визначення рівнів ФСГ, ЛГ та естрадіолу
  - e. Рентгенографію кистей
129. Пацієнтка віком 21 рік звернулася до сімейного лікаря зі скаргою на затримку менструації протягом 3 місяців
- a. При відсутності соматичної патології направлення на перший візит в жіночу консультацію через 8 тижнів

b. -

c. Визначення біофізичного профілю плода, спостереження і ведення сімейним лікарем

d. При відсутності соматичної патології спостереження та ведення сімейним лікарем

e. УЗД з доплерометрією, спостереження та ведення сімейним лікарем

130. Пацієнтка віком 21 рік звернулася до сімейного лікаря зі скаргою на затримку менструації протяг

a. -

b. При відсутності соматичної патології спостереження та ведення сімейним лікарем

c. Визначення біофізичного профілю плода, спостереження і ведення сімейним лікарем

d. УЗД з доплерометрією, спостереження та ведення сімейним лікарем

e. При відсутності соматичної патології направлення на перший візит в жіночу консультацію через 8 тижнів

131. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на нерегулярні менструації з менархе, збільшення маси тіла н

a. Ультразвукове дослідження органів малого таза

b. Дослідження рівнів естрадіолу та прогестерону

c. Дослідження рівнів ФСГ та ЛГ

d. Оцінювання за шкалою Феримана-Галвея

e. Дослідження індексу вільного тестостерону та рівня дегідроепіандростерону сульфату

132. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на нерегулярні менструації з менархе, збільшення маси тіла н

a. Оцінювання за шкалою Феримана-Галвея

b. Ультразвукове дослідження органів малого таза

c. Дослідження індексу вільного тестостерону та рівня дегідроепіандростерону сульфату

d. Дослідження рівнів естрадіолу та прогестерону

e. Дослідження рівнів ФСГ та ЛГ

133. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,8^{\circ}\text{C}$ , ниючий біль уни

a. Трансвагінального ультразвукового дослідження

b. КТ органів малого таза

c. Бактеріологічного дослідження цервікальних виділень

d. Тесту на вагітність

e. Кольпоскопії

134. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,8^{\circ}\text{C}$ , ниючий біль уни

a. Трансвагінального ультразвукового дослідження

b. Кольпоскопії

c. Тесту на вагітність

d. Бактеріологічного дослідження цервікальних виділень

e. КТ органів малого таза

135. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , біль унизу живо

a. Гострий аднексит

b. Післяабортний ендометрит

c. Гострий апендицит

d. Перфорація матки

e. Пельвіоперитоніт

136. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , біль унизу живо

a. Гострий аднексит

b. Гострий апендицит

c. Пельвіоперитоніт

d. Післяабортний ендометрит

e. Перфорація матки

137. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на нерегулярні менструації та неможливість завагітніти прот

a. Індукція овуляції

b. Призначення метформіну

c. Рекомендація ЕКЗ

d. Призначення гормональної замісної терапії

e. Проведення лапароскопії з оваріальним дрінгом

138. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на нерегулярні менструації та неможливість завагітніти прот

a. Індукція овуляції

b. Рекомендація ЕКЗ



- с. Проведення лапароскопії з оваріальним дрилінгом
- д. Призначення гормональної замісної терапії
- е. Призначення метформіну

139. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на ниючий біль унизу живота протягом 2-х тижнів. На момент

- а. Кіста жовтого тіла
- б. Серозна кіста яєчника
- с. Параоваріальна кіста яєчника
- д. Фолікулярна кіста яєчника**
- е. Дермоїдна кіста

140. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на ниючий біль унизу живота протягом 2-х тижнів. На момент

- а. Параоваріальна кіста яєчника
- б. Фолікулярна кіста яєчника**
- с. Дермоїдна кіста
- д. Серозна кіста яєчника
- е. Кіста жовтого тіла

141. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота, більше праворуч, що посилюється під ч

- а. Лейоміома матки, хронічний аднексит
- б. Лейоміома матки, правобічний гідросальпінкс
- с. Функціональна кіста правого яєчника
- д. Аденоміоз, ендометріоїдна кіста правого яєчника**
- е. Гіперплазія ендометрія

142. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота, більше праворуч, що посилюється під ч

- а. Функціональна кіста правого яєчника
- б. Лейоміома матки, правобічний гідросальпінкс
- с. Лейоміома матки, хронічний аднексит
- д. Аденоміоз, ендометріоїдна кіста правого яєчника**
- е. Гіперплазія ендометрія

143. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$

- а. Параметрит
- б. Гострий ендометрит
- с. Гострий сальпінгоофорит**
- д. Цервіцит
- е. Пельвіоперитоніт

144. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль унизу живота, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$

- а. Параметрит
- б. Гострий ендометрит
- с. Цервіцит
- д. Пельвіоперитоніт
- е. Гострий сальпінгоофорит**

145. Пацієнтка віком 29 років на 8-му добу після операції кесаревого розтину скаржиться на біль униз

- а. Патронаж у жіночій консультації
- б. Направлення на УЗД органів малого таза
- с. Екстрена шпиталізація до гінекологічного відділення**
- д. Призначення антибактеріальної терапії в умовах жіночої консультації
- е. Шпиталізація до гінекологічного стаціонару після обстеження

146. Пацієнтка віком 29 років на 8-му добу після операції кесаревого розтину скаржиться на біль униз

- а. Призначення антибактеріальної терапії в умовах жіночої консультації
- б. Патронаж у жіночій консультації
- с. Шпиталізація до гінекологічного стаціонару після обстеження
- д. Направлення на УЗД органів малого таза
- е. Екстрена шпиталізація до гінекологічного відділення**

147. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на біль у ділянці таза, ясну болісну менструацію. В анамне

- а. Лейоміома матки
- б. Первинна дисменорея
- с. Аномальна маткова кровотеча

**d. Аденоміоз**

e. Саркома матки

148. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на біль у ділянці тазу, різну болісну менструацію. В анамнезі

a. Первинна дисменорея

b. Лейоміома матки

c. Саркома матки

**d. Аденоміоз**

e. Аномальна маткова кровотеча

149. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на нагрудання обох грудних залоз, що з'являється за декілька

a. Галакторея

**b. Циклічна мастодинія**

c. Доброякісна дисплазія грудних залоз

d. Фіброаденоз грудних залоз

e. Передменструальний синдром

150. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на нагрудання обох грудних залоз, що з'являється за декілька

a. Фіброаденоз грудних залоз

b. Галакторея

c. Доброякісна дисплазія грудних залоз

**d. Циклічна мастодинія**

e. Передменструальний синдром

151. Пацієнтка віком 30 років звернулася до лікаря-гінеколога для підбору контрацепції. Відомо, що в

a. Вагінальне кільце

**b. Гормональна внутрішньоматкова система з левоноргестрелом**

c. Контрацептивний пластр

d. Комбіновані оральні контрацептиви

e. Хірургічна стерилізація

152. Пацієнтка віком 30 років звернулася до лікаря-гінеколога для підбору контрацепції. Відомо, що в

a. Контрацептивний пластр

b. Комбіновані оральні контрацептиви

**c. Гормональна внутрішньоматкова система з левоноргестрелом**

d. Вагінальне кільце

e. Хірургічна стерилізація

153. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів після затримки

a. Апоплексія яєчника

b. Пухирний занос

**c. Аборт, що розпочався**

d. Аномальна маткова кровотеча

e. Позаматкова вагітність

154. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів після затримки

a. Позаматкова вагітність

b. Апоплексія яєчника

c. Аномальна маткова кровотеча

d. Пухирний занос

**e. Аборт, що розпочався**

155. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на мізерні гнійні виділення з піхви, печію, дискомфорт під

**a. Аеробний вагініт**

b. Генітальний герпес

c. Бактеріальний вагіноз

d. Урогенітальний кандидоз

e. Трихомоніаз

156. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на мізерні гнійні виділення з піхви, печію, дискомфорт під

**a. Аеробний вагініт**

b. Урогенітальний кандидоз

c. Трихомоніаз

d. Бактеріальний вагіноз

е. Генітальний герпес

157. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на мізерні менструації, відсутність вагітності впродовж 6-т

a. Синдром полікістозних яєчників

b. Хронічний сальпінгоофорит

c. Фолікулярні кісти яєчників

d. Кісти жовтого тіла

е. Рак яєчників

158. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на мізерні менструації, відсутність вагітності впродовж 6-т

a. Хронічний сальпінгоофорит

b. Фолікулярні кісти яєчників

c. Кісти жовтого тіла

d. Рак яєчників

е. Синдром полікістозних яєчників

159. Пацієнтка віком 32 роки в терміні вагітності 32 тижні раптово втратила свідомість у приймальному

a. Негайно розпочати компресії грудної клітки, забезпечуючи нахил пацієнтки ліворуч під кутом 15-30°

b. Негайно провести ургентний кесарів розтин без виконання серцево-легеневої реанімації, бо це знизить

c. Провести дефібриляцію та розпочати серцево-легеневу реанімацію через 5 хв після оцінки стану

d. Розпочати компресії грудної клітки на спині без зміщення матки, щоб не втрачати час

е. Забезпечити прохідність дихальних шляхів та виконати інтубацію трахеї

160. Пацієнтка віком 32 роки в терміні вагітності 32 тижні раптово втратила свідомість у приймальному

a. Провести дефібриляцію та розпочати серцево-легеневу реанімацію через 5 хв після оцінки стану

b. Негайно розпочати компресії грудної клітки, забезпечуючи нахил пацієнтки ліворуч під кутом 15-30°

c. Розпочати компресії грудної клітки на спині без зміщення матки, щоб не втрачати час

d. Негайно провести ургентний кесарів розтин без виконання серцево-легеневої реанімації, бо це знизить

е. Забезпечити прохідність дихальних шляхів та виконати інтубацію трахеї

161. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до акушера-гінеколога для планового огляду. Вона була на огл

a. Ймовірний термін вагітності 24 тижні, токолітична терапія

b. Ймовірний термін вагітності 28 тижнів, визначення біофізичного профілю плода

c. Ймовірний термін вагітності 28 тижнів, УЗД з доплерометрією

d. Ймовірний термін вагітності 20 тижнів, ультразвуковий скринінг

е. Ймовірний термін вагітності 24 тижні, визначення біофізичного профілю плода

162. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до акушера-гінеколога для планового огляду. Вона була на огл

a. Ймовірний термін вагітності 28 тижнів, визначення біофізичного профілю плода

b. Ймовірний термін вагітності 24 тижні, визначення біофізичного профілю плода

c. Ймовірний термін вагітності 20 тижнів, ультразвуковий скринінг

d. Ймовірний термін вагітності 24 тижні, токолітична терапія

е. Ймовірний термін вагітності 28 тижнів, УЗД з доплерометрією

163. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря-репродуктолога зі скаргами на неможливість завагіт

a. Кріоконсервація яйцеклітин

b. Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)

c. Стимуляція овуляції

d. Інсемінація спермою чоловіка

е. Перенесення зиготи в маткову трубу (ZIFT)

164. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря-репродуктолога зі скаргами на неможливість завагіт

a. Перенесення зиготи в маткову трубу (ZIFT)

b. Інсемінація спермою чоловіка

c. Стимуляція овуляції

d. Екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ)

е. Кріоконсервація яйцеклітин

165. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, нездужання, підвищення температури

a. Катетеризація сечоводу

b. Призначення діуретиків

c. Паранефральна нефростомія

d. Черезшкірна нефректомія

е. Емболізація артерій нирок

166. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, нездужання, підвищення температури

a. Черезшкірна нефректомія

b. Призначення діуретиків

c. Катетеризація сечоводу

d. Паранефральна нефростомія

e. Емболізація артерій нирок

167. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на кров'яністі виділення між менструаціями, тягнучий біль у нирках

a. Міома матки

b. Гіперплазія ендометрія

c. Хронічний салінгоофорит

d. Поліп ендометрія

e. Кіста яєчника

168. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на кров'яністі виділення між менструаціями, тягнучий біль у нирках

a. Міома матки

b. Хронічний салінгоофорит

c. Гіперплазія ендометрія

d. Кіста яєчника

e. Поліп ендометрія

169. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на періодичні кров'яністі виділення після статевого акту. В анамнезі: гіпертензія, цукровий діабет 2 типу.

a. Діатермоконізація шийки матки

b. Радикальна гістеректомія

c. Проведення консервативної терапії антибактеріальними засобами

d. Негайна хіміотерапія

e. Спостереження з повторним оглядом через 6 місяців

170. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на періодичні кров'яністі виділення після статевого акту. В анамнезі: гіпертензія, цукровий діабет 2 типу.

a. Негайна хіміотерапія

b. Радикальна гістеректомія

c. Спостереження з повторним оглядом через 6 місяців

d. Діатермоконізація шийки матки

e. Проведення консервативної терапії антибактеріальними засобами

171. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на ниючий біль унизу живота, рясні, болючі менструації. В анамнезі: гіпертензія, цукровий діабет 2 типу.

a. Кістома яєчника

b. Ендометріоз

c. Вагітність

d. Вузлово-фіброзна міома матки

e. Пухлина нирки

172. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на ниючий біль унизу живота, рясні, болючі менструації. В анамнезі: гіпертензія, цукровий діабет 2 типу.

a. Пухлина нирки

b. Кістома яєчника

c. Вузлово-фіброзна міома матки

d. Ендометріоз

e. Вагітність

173. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на виділення із сосків, порушення сну, неприємні відчуття при напруженні грудних м'язів.

a. Відмінити антигіпертензивні препарати на 3 дні, дослідити рівень молекулярних форм пролактину

b. Відмінити антигіпертензивні препарати на 3 дні, дослідити рівень пролактину в розведенні 1:100

c. Відмінити антигіпертензивні препарати на 5 днів, дослідити рівень молекулярних форм пролактину

d. На фоні триваючої терапії дослідити рівень молекулярних форм пролактину

e. На фоні триваючої терапії дослідити рівень загального пролактину

174. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на виділення із сосків, порушення сну, неприємні відчуття при напруженні грудних м'язів.

a. Відмінити антигіпертензивні препарати на 3 дні, дослідити рівень пролактину в розведенні 1:100

b. На фоні триваючої терапії дослідити рівень загального пролактину

c. Відмінити антигіпертензивні препарати на 5 днів, дослідити рівень молекулярних форм пролактину

d. На фоні триваючої терапії дослідити рівень молекулярних форм пролактину

e. Відмінити антигіпертензивні препарати на 3 дні, дослідити рівень молекулярних форм пролактину

175. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на відчуття тривоги, дратівливості, перепади настрою, здуття живота.

- a. Передменструальне загострення
- b. Передменструальний дисфоричний розлад
- c. Прогестаген-індукований передменструальний розлад
- d. Передменструальний синдром

**e. Передменструальний розлад із відсутністю менструації**

176. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на відчуття тривоги, дратівливості, перепади настрою, здуття

- a. Передменструальний синдром
- b. Передменструальний розлад із відсутністю менструації**

- c. Передменструальне загострення
- d. Передменструальний дисфоричний розлад
- e. Прогестаген-індукований передменструальний розлад

177. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на ниючий біль унизу живота, підвищення температури тіла д

**a. Видалити ВМС після початку антибактеріальної, дезінтоксикаційної, інфузійної терапії**

- b. Видалення ВМС, вишкрібання слизової матки та антибактеріальна, дезінтоксикаційна, інфузійна терапія
- c. Видалення ВМС, гістероскопія та антибактеріальна, дезінтоксикаційна, інфузійна терапія
- d. Гістеректомія з матковими трубами та антибактеріальна, дезінтоксикаційна, інфузійна терапія
- e. Проведення антибактеріальної, дезінтоксикаційної, інфузійної терапії без видалення ВМС

178. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на ниючий біль унизу живота, підвищення температури тіла д

- a. Видалення ВМС, гістероскопія та антибактеріальна, дезінтоксикаційна, інфузійна терапія
- b. Видалити ВМС після початку антибактеріальної, дезінтоксикаційної, інфузійної терапії**

- c. Гістеректомія з матковими трубами та антибактеріальна, дезінтоксикаційна, інфузійна терапія
- d. Видалення ВМС, вишкрібання слизової матки та антибактеріальна, дезінтоксикаційна, інфузійна терапія
- e. Проведення антибактеріальної, дезінтоксикаційної, інфузійної терапії без видалення ВМС

179. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на порушення менструального циклу, що проявляється трива

**a. Поліп ендометрія**

- b. Гіперплазія ендометрія
- c. Субмукозна лейоміома
- d. Стороннє тіло в порожнині матки
- e. Гострий ендометрит

180. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на порушення менструального циклу, що проявляється трива

- a. Стороннє тіло в порожнині матки
- b. Гострий ендометрит

**c. Поліп ендометрія**

- d. Гіперплазія ендометрія
- e. Субмукозна лейоміома

181. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на біль унизу живота, блювання, підвищення температури тіл

**a. Пельвіоперитоніт. Некроз міоматозного вузла**

- b. Пельвіоперитоніт. Апоплексія яєчника
- c. Хоріоамніоніт
- d. Порушена позаматкова вагітність
- e. Гострий апендицит

182. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на біль унизу живота, блювання, підвищення температури тіл

**a. Пельвіоперитоніт. Некроз міоматозного вузла**

- b. Хоріоамніоніт
- c. Порушена позаматкова вагітність
- d. Пельвіоперитоніт. Апоплексія яєчника
- e. Гострий апендицит

183. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на наявність безболісного утворення в правій грудній залозі

- a. Контрастну мамографію
- b. Мамографію
- c. УЗД грудної залози
- d. Рентгенографію ОГК

**e. Пункційну біопсію новоутворення**

184. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на наявність безболісного утворення в правій грудній залозі

- a. Мамографію

- b. УЗД грудної залози
- c. Контрастну мамографію

d. Пункційну біопсію новоутворення

- e. Рентгенографію ОГК

185. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на аномальні маткові кровотечі на тлі лейоміоми матки. За ре

- a. Призначення КОК з дієногестом

b. Вагінальна міомектомія

- c. Призначити гестагени в циклічному режимі
- d. Лапароскопічна резекція міоматозного вузла
- e. Емболізація маткових судин

186. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на аномальні маткові кровотечі на тлі лейоміоми матки. За ре

- a. Призначення КОК з дієногестом
- b. Емболізація маткових судин
- c. Призначити гестагени в циклічному режимі
- d. Лапароскопічна резекція міоматозного вузла

e. Вагінальна міомектомія

187. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на відчуття стороннього тіла в піхві під час фізичного наван

- a. Трофічна виразка шийки матки

b. Порушення сечовипускання

- c. Порушення менструального циклу
- d. Хронічний тазовий біль
- e. Гострий цистит

188. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на відчуття стороннього тіла в піхві під час фізичного наван

- a. Хронічний тазовий біль
- b. Порушення менструального циклу

c. Порушення сечовипускання

- d. Трофічна виразка шийки матки
- e. Гострий цистит

189. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на нерегулярні кровотечі та біль унизу живота. В анамнезі: 3

- a. Проведення хіміопроменевої терапії
- b. Лазерна вапоризація шийки матки
- c. Спостереження з повторною біопсією через 6 місяців
- d. Радикальна гістеректомія з тазовою лімфаденектомією

e. Конусоподібна ексцизія шийки матки

190. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на нерегулярні кровотечі та біль унизу живота. В анамнезі: 3

- a. Спостереження з повторною біопсією через 6 місяців
- b. Проведення хіміопроменевої терапії
- c. Лазерна вапоризація шийки матки
- d. Конусоподібна ексцизія шийки матки

e. Радикальна гістеректомія з тазовою лімфаденектомією

191. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на припливи жару, нічну пітливість, дратівливість та безсонн

- a. Ультразвукове дослідження щитовидної залози
- b. Аналіз крові на фолікулостимулюючий гормон, пролактин, тиреотропний гормон

c. Комп'ютерна томографія органів малого таза з контрастом

- d. Кольпоскопія розширена
- e. Аналіз крові на лютеїнізуючий гормон, пролактин, тестостерон

192. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на припливи жару, нічну пітливість, дратівливість та безсонн

- a. Ультразвукове дослідження щитовидної залози
- b. Кольпоскопія розширена
- c. Комп'ютерна томографія органів малого таза з контрастом

d. Аналіз крові на фолікулостимулюючий гормон, пролактин, тиреотропний гормон

e. Аналіз крові на лютеїнізуючий гормон, пролактин, тестостерон

193. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на біль унизу живота та загальну слабкість. Під час гінекол

- a. Аналіз крові на онкомаркер СА19-9
- b. Комп'ютерну томографію органів малого таза



с. Ультразвукове дослідження з контрастом

d. Патологогістологічне дослідження новоутворення яєчника

е. Пункцію заднього склепіння піхви

194. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на біль унизу живота та загальну слабкість. Під час гінеколог

а. Ультразвукове дослідження з контрастом

б. Аналіз крові на онкомаркер СА19-9

с. Патологогістологічне дослідження новоутворення яєчника

d. Комп'ютерну томографію органів малого таза

е. Пункцію заднього склепіння піхви

195. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів, контактні кров

а. Рак шийки матки

б. -

с. Дисплазія шийки матки

d. Рак тіла матки

е. Ектопія шийки матки

196. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів, контактні кров

а. Рак тіла матки

б. -

с. Дисплазія шийки матки

d. Рак шийки матки

е. Ектопія шийки матки

197. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на нерегулярні маткові кровотечі протягом останніх 3-х міся

а. Гістероскопія з біопсією ендометрія

б. Кольпоскопія

с. Дилатація та кюретаж матки

d. Лапароскопія

е. Ендоцервікальний кюретаж

198. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на нерегулярні маткові кровотечі протягом останніх 3-х міся

а. Кольпоскопія

б. Лапароскопія

с. Гістероскопія з біопсією ендометрія

d. Ендоцервікальний кюретаж

е. Дилатація та кюретаж матки

199. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на періодичний біль у лівій грудній залозі, який з'являєтьс

а. Провести променеви терапію

б. Спостерігати в динаміці протягом 6 місяців

с. Призначити гормональну терапію комбінованими оральними контрацептивами, контроль через 6 міся

d. Провести тонкоголкову аспіраційну біопсію

е. Скерувати на мамографію та ультразвукове дослідження грудних залоз

200. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на періодичний біль у лівій грудній залозі, який з'являєтьс

а. Спостерігати в динаміці протягом 6 місяців

б. Призначити гормональну терапію комбінованими оральними контрацептивами, контроль через 6 міся

с. Провести тонкоголкову аспіраційну біопсію

d. Провести променеви терапію

е. Скерувати на мамографію та ультразвукове дослідження грудних залоз

201. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на рясні слизові виділення з піхви, іноді з домішками крові

а. Проведення кольпоскопії з біопсією

б. Проведення тільки УЗД органів малого таза

с. Негайна хірургічна екстирпація матки

d. Призначення антибіотиків і спостереження

е. Консервативне лікування гормональними препаратами

202. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на рясні слизові виділення з піхви, іноді з домішками крові

а. Призначення антибіотиків і спостереження

б. Негайна хірургічна екстирпація матки

с. Проведення кольпоскопії з біопсією



- d. Проведення тільки УЗД органів малого таза
- e. Консервативне лікування гормональними препаратами

203. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на безсоння, приливи жару, дратівливість, збільшення маси тіла

- a. Монофазна комбінована терапія (естрогени з прогестагенами) у безперервному режимі
- b. Комбінована (естрогени з прогестагенами) терапія в циклічному режимі
- c. Монотерапія естрогенами
- d. Монотерапія прогестагенами
- e. Менопаузальну гормонотерапію не призначати

204. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на безсоння, приливи жару, дратівливість, збільшення маси тіла

- a. Монотерапія прогестагенами
- b. Менопаузальну гормонотерапію не призначати
- c. Монотерапія естрогенами
- d. Монофазна комбінована терапія (естрогени з прогестагенами) у безперервному режимі
- e. Комбінована (естрогени з прогестагенами) терапія в циклічному режимі

205. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на постійне нетримання сечі, що посилюється під час кашлю,

- a. Направити до лікаря-психолога для корекції психосоматичних аспектів
- b. Рекомендувати обмеження фізичної активності
- c. Продовжити консервативне лікування шляхом виконання вправ Кегеля
- d. Розглянути оперативне лікування (підслизовий слінг)
- e. Призначити заспокійливі препарати

206. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на постійне нетримання сечі, що посилюється під час кашлю,

- a. Рекомендувати обмеження фізичної активності
- b. Розглянути оперативне лікування (підслизовий слінг)
- c. Продовжити консервативне лікування шляхом виконання вправ Кегеля
- d. Призначити заспокійливі препарати
- e. Направити до лікаря-психолога для корекції психосоматичних аспектів

207. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на раптову появу непереборного бажання до сечовипускання

- a. Обмежити вживання кофеїну
- b. Обмежити вживання рідини
- c. Збільшити вживання протеїнів
- d. Збільшити вживання фітоестрогенів
- e. Обмежити фізичні навантаження

208. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на раптову появу непереборного бажання до сечовипускання

- a. Обмежити вживання рідини
- b. Обмежити вживання кофеїну
- c. Збільшити вживання фітоестрогенів
- d. Збільшити вживання протеїнів
- e. Обмежити фізичні навантаження

209. Пацієнтка віком 52 роки прийшла на профілактичний огляд. У родинному анамнезі не було випадків

- a. Мамографія кожні 2 роки
- b. Генетичне тестування на наявність мутацій BRCA-1 або BRCA-2
- c. Тонкоголкова біопсія грудної залози
- d. Ультразвукове дослідження грудних залоз щороку
- e. Магнітно-резонансна томографія грудних залоз щороку

210. Пацієнтка віком 52 роки прийшла на профілактичний огляд. У родинному анамнезі не було випадків

- a. Магнітно-резонансна томографія грудних залоз щороку
- b. Тонкоголкова біопсія грудної залози
- c. Ультразвукове дослідження грудних залоз щороку
- d. Генетичне тестування на наявність мутацій BRCA-1 або BRCA-2
- e. Мамографія кожні 2 роки

211. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на неприємні відчуття в ділянці промежини, випинання, що боляче

- a. Пролапс матки III ступеня
- b. Пролапс матки I ступеня
- c. Ректоцеле
- d. Пролапс матки II ступеня

е. Цистоцеле

212. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на неприємні відчуття в ділянці промежини, випинання, що зб

а. Пролапс матки ІІІ ступеня

б. Пролапс матки І ступеня

с. Цистоцеле

д. Ректоцеле

е. Пролапс матки ІІ ступеня

213. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на печіння, сухість у ділянці вульви, болісні сечовипускання

а. Плоскоклітинна карцинома вульви

б. Склероатрофічний ліхен вульви

с. Ендометріоз

д. Лейкоплакія вульви

е. Атрофічний вульвовагініт

214. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на печіння, сухість у ділянці вульви, болісні сечовипускання

а. Плоскоклітинна карцинома вульви

б. Атрофічний вульвовагініт

с. Склероатрофічний ліхен вульви

д. Ендометріоз

е. Лейкоплакія вульви

215. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на водянисті виділення з піхви з домішками крові. В анамнез

а. Діагностична лапароскопія

б. Аналіз крові на онкомаркер СА-125

с. МРТ органів малого таза

д. Мазок із піхви на флору

е. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

216. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на водянисті виділення з піхви з домішками крові. В анамнез

а. Мазок із піхви на флору

б. Діагностична лапароскопія

с. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

д. Аналіз крові на онкомаркер СА-125

е. МРТ органів малого таза

217. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 7 днів

а. Діагностична гістероскопія

б. ПАП-тест на основі рідинної цитології

с. МРТ органів малого таза з контрастом

д. МРТ органів малого таза

е. Пайпель-біопсія ендометрія

218. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на кров'яністі виділення зі статевих шляхів протягом 7 днів

а. МРТ органів малого таза з контрастом

б. Діагностична гістероскопія

с. Пайпель-біопсія ендометрія

д. ПАП-тест на основі рідинної цитології

е. МРТ органів малого таза

219. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на появу новоутворення в лівій грудній залозі. Із анамнезу

а. УЗД грудних залоз

б. Біопсію пухлини

с. Мамографію

д. МРТ грудних залоз

е. Дослідження онкологічних маркерів

220. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на появу новоутворення в лівій грудній залозі. Із анамнезу

а. УЗД грудних залоз

б. Дослідження онкологічних маркерів

с. Мамографію

д. Біопсію пухлини

е. МРТ грудних залоз

221. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на значне випинання тканин із піхви, відчуття стороннього т  
a. Обмеження фізичної активності та спостереження в динаміці  
b. Пластика передньої та задньої стінок піхви  
c. Оперативне лікування - підслизовий слінг  
d. Оперативне лікування в об'ємі трансвагінальної гістеректомії з пластикою передньої та задньої сті  
e. Подальше використання вагінального песарію
222. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на значне випинання тканин із піхви, відчуття стороннього т  
a. Оперативне лікування - підслизовий слінг  
b. Пластика передньої та задньої стінок піхви  
c. Обмеження фізичної активності та спостереження в динаміці  
d. Подальше використання вагінального песарію  
e. Оперативне лікування в об'ємі трансвагінальної гістеректомії з пластикою передньої та задньої сті
223. Пацієнтка віком 74 роки скаржиться на збільшення живота, загальну слабкість, різке схуднення. І  
a. -  
b. Кісти яєчників  
c. Піовар  
d. Рак матки  
e. Рак яєчників
224. Пацієнтка віком 74 роки скаржиться на збільшення живота, загальну слабкість, різке схуднення. І  
a. Піовар  
b. -  
c. Рак яєчників  
d. Рак матки  
e. Кісти яєчників
225. Пацієнтка з синдромом полікістозних яєчників та олігоменореєю, має індекс маси тіла - 28,8 кг/м  
a. Загальний аналіз крові, рівень феритину  
b. Рівні кальцію та вітаміну D у крові  
c. Біохімічні показники функції печінки та нирок  
d. Коагулограма, D-димер  
e. Інсулінорезистентність, ліпідний профіль
226. Пацієнтка з синдромом полікістозних яєчників та олігоменореєю, має індекс маси тіла - 28,8 кг/м  
a. Коагулограма, D-димер  
b. Загальний аналіз крові, рівень феритину  
c. Біохімічні показники функції печінки та нирок  
d. Інсулінорезистентність, ліпідний профіль  
e. Рівні кальцію та вітаміну D у крові
227. Подружня пара звернулася до лікаря зі скаргами на безпліддя протягом 3-х років. У жінки віком 2  
a. Визначення рівня пролактину в жінки  
b. Проведення гістросальпінгографії жінці  
c. Повторна спермограма чоловіка через 3 місяці  
d. Призначення стимуляції овуляції жінці  
e. Проведення гормонального скринінгу жінці
228. Подружня пара звернулася до лікаря зі скаргами на безпліддя протягом 3-х років. У жінки віком 2  
a. Визначення рівня пролактину в жінки  
b. Проведення гістросальпінгографії жінці  
c. Призначення стимуляції овуляції жінці  
d. Проведення гормонального скринінгу жінці  
e. Повторна спермограма чоловіка через 3 місяці
229. Під час гормонального обстеження пацієнтки з безплідністю виявлено: підвищення рівнів тестосте  
a. Гіпергонадотропна аменорея  
b. Гіпергонадотропний гіпогонадизм  
c. Синдром полікістозних яєчників  
d. Гіперпролактинемія  
e. Надниркова гіперандрогенія
230. Під час гормонального обстеження пацієнтки з безплідністю виявлено: підвищення рівнів тестосте

- a. Гіпергонадотропний гіпогонадизм
- b. Гіпергонадотропна аменорея
- c. Синдром полікістозних яєчників

d. Наднирникова гіперандрогенія

- e. Гіперпролактинемія

231. Під час огляду жінки віком 32 роки в терміні вагітності 38 тижнів виявлено: положення плода пов

a. Пробні вагінальні пологи

- b. Ургентний кесарів розтин
- c. Акушерські щипці для виключення II періоду пологів
- d. Плановий кесарів розтин
- e. Вакуум-екстракція плода під час II періоду пологів

232. Під час огляду жінки віком 32 роки в терміні вагітності 38 тижнів виявлено: положення плода пов

- a. Ургентний кесарів розтин
- b. Плановий кесарів розтин
- c. Акушерські щипці для виключення II періоду пологів
- d. Вакуум-екстракція плода під час II періоду пологів

e. Пробні вагінальні пологи

233. Соматично здорова жінка віком 45 років звернулася до лікаря-гінеколога з метою призначення гор

a. КОК (естрадіола валерат/дієногест)

- b. КОК (етинілестрадіол/дієногест)
- c. КОК (етинілестрадіол/дроспиренон)
- d. КОК (етинілестрадіол/ципротерону ацетат)
- e. КОК (етинілестрадіол/хлормадинону ацетат)

234. Соматично здорова жінка віком 45 років звернулася до лікаря-гінеколога з метою призначення гор

- a. КОК (етинілестрадіол/ципротерону ацетат)
- b. КОК (етинілестрадіол/дієногест)
- c. КОК (етинілестрадіол/дроспиренон)

d. КОК (естрадіола валерат/дієногест)

- e. КОК (етинілестрадіол/хлормадинону ацетат)

235. У вагітної жінки віком 30 років 14 годин тому розпочалася пологова діяльність. Другий період по

a. Вакуум-екстракція плода

- b. Накладання вихідних акушерських щипців
- c. Консервативне ведення пологів
- d. Накладання порожнинних акушерських щипців
- e. Кесарів розтин

236. У вагітної жінки віком 30 років 14 годин тому розпочалася пологова діяльність. Другий період по

- a. Консервативне ведення пологів
- b. Кесарів розтин
- c. Накладання порожнинних акушерських щипців
- d. Накладання вихідних акушерських щипців

e. Вакуум-екстракція плода

237. У вагітної жінки віком 32 роки під час обстеження виявлено залізодефіцитну анемію середнього ст

a. 21 день

- b. 14 днів
- c. 1 місяць
- d. 1 тиждень
- e. 3 місяці

238. У вагітної жінки віком 32 роки під час обстеження виявлено залізодефіцитну анемію середнього ст

a. 1 тиждень

b. 21 день

- c. 3 місяці
- d. 1 місяць
- e. 14 днів

239. У вагітної жінки віком 33 роки пологи розпочалися 10 год тому. Пологова діяльність активна, пер

a. Записати КТГ плода

b. -

c. Провести перидуральну анестезію

d. Продовжувати консервативне ведення пологів

e. Розпочати стимуляцію пологів

240. У вагітної жінки віком 33 роки пологи розпочалися 10 год тому. Пологова діяльність активна, пер

a. Розпочати стимуляцію пологів

b. Записати КТГ плода

c. Провести перидуральну анестезію

d. Продовжувати консервативне ведення пологів

e. -

241. У жінки віком 20 років у I триместрі вагітності двічі з інтервалом 10 днів проведено бактеріоло

a. Окситоцин

b. Прогестерон

c. Естрадіол

d. beta-хоріонічний гонадотропін

e. Пролактин

242. У жінки віком 20 років у I триместрі вагітності двічі з інтервалом 10 днів проведено бактеріоло

a. Пролактин

b. Естрадіол

c. beta-хоріонічний гонадотропін

d. Окситоцин

e. Прогестерон

243. У жінки віком 22 роки на 3-4 добу після пологів з'явилися скарги на болісність, набряк молочних

a. Серозний мастит

b. Гнійний мастит

c. Інфільтративний мастит

d. Лактостаз

e. Змішаний мастит

244. У жінки віком 22 роки на 3-4 добу після пологів з'явилися скарги на болісність, набряк молочних

a. Серозний мастит

b. Змішаний мастит

c. Інфільтративний мастит

d. Лактостаз

e. Гнійний мастит

245. У жінки віком 25 років діагностовано тяжку форму передменструального дисфоричного розладу. Р

a. КОК з етинілестрадіолом, дроспіреноном та левомефолатом кальцію

b. Ввести левоноргестрел-вміщуючий ВМК

c. Дуфастон по 10 мг з 5 по 25 день менструального циклу

d. Будь-який КОК та вітаміномінеральний комплекс

e. КОК з етинілестрадіолом та левоноргестрелом

246. У жінки віком 25 років діагностовано тяжку форму передменструального дисфоричного розладу. Р

a. КОК з етинілестрадіолом та левоноргестрелом

b. Дуфастон по 10 мг з 5 по 25 день менструального циклу

c. Будь-який КОК та вітаміномінеральний комплекс

d. КОК з етинілестрадіолом, дроспіреноном та левомефолатом кальцію

e. Ввести левоноргестрел-вміщуючий ВМК

247. У жінки віком 26 років на 4 добу після пологів температура тіла підвищилася до  $39,3^{\circ}\text{C}$ . Об'єкти

a. Ендометрит

b. Пельвіоперитоніт

c. Післяпологова виразка

d. Сальпінгоофорит

e. Параметрит

248. У жінки віком 26 років на 4 добу після пологів температура тіла підвищилася до  $39,3^{\circ}\text{C}$ . Об'єкти

a. Післяпологова виразка

b. Ендометрит

- c. Сальпінгоофорит
- d. Пельвіоперитоніт
- e. Параметрит

249. У жінки віком 27 років у терміні вагітності 32-33 тижнів у I періоді пологів з'явилися скарги на

- a. Гарячка невизначеної етіології
- b. Передчасне відшарування плаценти
- c. Дистрес плода

**d. Хоріоамніоніт**

- e. Емболія амніотичною рідиною

250. У жінки віком 27 років у терміні вагітності 32-33 тижнів у I періоді пологів з'явилися скарги на

- a. Передчасне відшарування плаценти
- b. Дистрес плода
- c. Емболія амніотичною рідиною
- d. Гарячка невизначеної етіології

**e. Хоріоамніоніт**

251. У жінки віком 28 років відбулися перші термінові пологи. На 2-у добу з'явився біль у ділянці си

- a. Гіпсова пов'язка на ділянку таза

**b. Імобілізація в гамаку, знеболювальні засоби**

- c. Металоостеосинтез
- d. -

- e. Носіння корсету впродовж 6-ти місяців

252. У жінки віком 28 років відбулися перші термінові пологи. На 2-у добу з'явився біль у ділянці си

- a. Металоостеосинтез

b. -

- c. Носіння корсету впродовж 6-ти місяців

- d. Гіпсова пов'язка на ділянку таза

**e. Імобілізація в гамаку, знеболювальні засоби**

253. У жінки віком 29 років у терміні вагітності 33-34 тижнів з'явився переймоподібний біль унизу жи

- a. Очікувати початку пологів

- b. Ургентний кесарів розтин

- c. Призначити внутрішньовенне введення сульфату магнію, ввести 6 мг дексаметазону

**d. Призначити токоліз антагоністами кальцію, ввести 6 мг дексаметазону**

- e. Призначити токолітики, внутрішньовенне введення сульфату магнію

254. У жінки віком 29 років у терміні вагітності 33-34 тижнів з'явився переймоподібний біль унизу жи

- a. Призначити токолітики, внутрішньовенне введення сульфату магнію

- b. Призначити внутрішньовенне введення сульфату магнію, ввести 6 мг дексаметазону

- c. Ургентний кесарів розтин

**d. Призначити токоліз антагоністами кальцію, ввести 6 мг дексаметазону**

- e. Очікувати початку пологів

255. У жінки віком 30 років після пологів триває кровотеча. Об'єктивно спостерігається: АТ - 120/80

- a. Зовнішній сфінктер прямої кишки

**b. Передня стінка прямої кишки**

- c. Шкіра промежини

- d. Задня спайка та стінка піхви

- e. М'язи промежини

256. У жінки віком 30 років після пологів триває кровотеча. Об'єктивно спостерігається: АТ - 120/80

- a. М'язи промежини

- b. Задня спайка та стінка піхви

**c. Передня стінка прямої кишки**

- d. Шкіра промежини

- e. Зовнішній сфінктер прямої кишки

257. У жінки віком 31 рік у терміні вагітності 36 тижнів розпочалися пологи. Відомо, що вагітність I

- a. Внутрішньовенне введення макролідів під час пологів

- b. Плановий кесарів розтин

**c. Внутрішньовенне введення пеніциліну під час пологів**

- d. Очікувальна тактика
- e. Повторне дослідження на стрептокок

258. У жінки віком 31 рік у терміні вагітності 36 тижнів розпочалися пологи. Відомо, що вагітність I

- a. Повторне дослідження на стрептокок
- b. Внутрішньовенне введення пеніциліну під час пологів**

- c. Очікувальна тактика
- d. Внутрішньовенне введення макролідів під час пологів
- e. Плановий кесарів розтин

259. У жінки віком 31 рік через 20 хв після народження посліду розпочалася кровотеча. Крововтрата ст

- a. Карбетоцин внутрішньом'язово
- b. Дексаметазон внутрішньовенно
- c. Фенілефрин внутрішньовенно

**d. Окситоцин внутрішньовенно**

- e. Мізопростол ректально

260. У жінки віком 31 рік через 20 хв після народження посліду розпочалася кровотеча. Крововтрата ст

- a. Мізопростол ректально
- b. Карбетоцин внутрішньом'язово
- c. Дексаметазон внутрішньовенно

**d. Окситоцин внутрішньовенно**

- e. Фенілефрин внутрішньовенно

261. У жінки віком 32 роки на 3 добу після кесаревого розтину стан різко погіршився: з'явилися гикав

- a. Тубооваріальний абсцес
- b. Пельвіоперитоніт

**c. Розлитий перитоніт**

- d. Септичний шок
- e. Гострий ендометрит

262. У жінки віком 32 роки на 3 добу після кесаревого розтину стан різко погіршився: з'явилися гикав

- a. Тубооваріальний абсцес
- b. Септичний шок
- c. Гострий ендометрит
- d. Пельвіоперитоніт

**e. Розлитий перитоніт**

263. У жінки віком 32 роки пологи закінчилися 30 хв тому. Об'єктивно спостерігається: стан жінки зад

- a. Кожні 120 хв протягом 4 год
- b. Кожні 15 хв протягом 2 год**
- c. Кожні 60 хв протягом 3 год
- d. Кожні 10 хв протягом 1 год
- e. Кожні 30 хв протягом 1 год

264. У жінки віком 32 роки пологи закінчилися 30 хв тому. Об'єктивно спостерігається: стан жінки зад

- a. Кожні 60 хв протягом 3 год
- b. Кожні 120 хв протягом 4 год
- c. Кожні 15 хв протягом 2 год**
- d. Кожні 10 хв протягом 1 год
- e. Кожні 30 хв протягом 1 год

265. У жінки віком 33 роки в терміні вагітності 38 тижнів після сильного головного болю, порушення з

- a. Правець
- b. Гіпертонічний криз

**c. Еклампсія**

- d. Епілепсія
- e. Тяжка прееклампсія

266. У жінки віком 33 роки в терміні вагітності 38 тижнів після сильного головного болю, порушення з

- a. Тяжка прееклампсія
- b. Правець
- c. Гіпертонічний криз
- d. Епілепсія



е. Еклампсія

267. У жінки віком 33 роки з гестаційним цукровим діабетом розпочалися пологи в терміні вагітності 4

а. Операція кесаревого розтину в ургентному порядку

б. Застосувати маневр Мак-Робертса

с. Застосувати обертальний маневр Вуда

д. Симфізіотомія

е. Застосувати прийом Заванеллі

268. У жінки віком 33 роки з гестаційним цукровим діабетом розпочалися пологи в терміні вагітності 4

а. Операція кесаревого розтину в ургентному порядку

б. Симфізіотомія

с. Застосувати маневр Мак-Робертса

д. Застосувати обертальний маневр Вуда

е. Застосувати прийом Заванеллі

269. У жінки віком 35 років за результатами гістероскопії з прицільною біопсією ендометрія виявлено

а. Гістероскопія з абляцією ендометрія

б. Дидрогестерон по 10 мг на добу з 11 по 25 день циклу

с. Введення левоноргестрел-вміщуючого ВМК

д. КОК з етинілестрадіолом та дезогестрелом

е. Дидрогестерон по 20 мг на добу з 5 по 25 день циклу

270. У жінки віком 35 років за результатами гістероскопії з прицільною біопсією ендометрія виявлено

а. Дидрогестерон по 10 мг на добу з 11 по 25 день циклу

б. Дидрогестерон по 20 мг на добу з 5 по 25 день циклу

с. КОК з етинілестрадіолом та дезогестрелом

д. Введення левоноргестрел-вміщуючого ВМК

е. Гістероскопія з абляцією ендометрія

271. У жінки віком 35 років у терміні вагітності 30 тижнів під час ультразвукового дослідження виявл

а. ОлігогіDRAMніон

б. ПолігіDRAMніон

с. Сповільнений кровоплин в артерії пуповини

д. Оцінка біофізичного профілю плода 7 балів

е. Оцінка біофізичного профілю плода 5 балів

272. У жінки віком 35 років у терміні вагітності 30 тижнів під час ультразвукового дослідження виявл

а. Сповільнений кровоплин в артерії пуповини

б. Оцінка біофізичного профілю плода 7 балів

с. ПолігіDRAMніон

д. ОлігогіDRAMніон

е. Оцінка біофізичного профілю плода 5 балів

273. У жінки віком 60 років за результатами гістероскопії з прицільною біопсією ендометрія виявлено

а. Надпіхвова ампутація матки без придатків

б. Екстирпація матки з придатками

с. Гістероскопія з абляцією ендометрія

д. Екстирпація матки без придатків

е. Надпіхвова ампутація матки з придатками

274. У жінки віком 60 років за результатами гістероскопії з прицільною біопсією ендометрія виявлено

а. Надпіхвова ампутація матки з придатками

б. Гістероскопія з абляцією ендометрія

с. Надпіхвова ампутація матки без придатків

д. Екстирпація матки без придатків

е. Екстирпація матки з придатками

275. У жінки з монохоріальною біамніотичною двійнею під час УЗД у 37 тижнів вагітності виявлено: пер

а. Синдром селективної затримки росту одного з плодів

б. Синдром затримки росту плодів

с. Синдром анемії-поліцитемії

д. Синдром фето-фетальної трансфузії

е. Синдром зворотної артеріальної перфузії

276. У жінки з монохоріальною біамніотичною двійнею під час УЗД у 37 тижнів вагітності виявлено: пер

- a. Синдром анемії-поліцитемії
- b. Синдром фето-фетальної трансфузії
- c. Синдром зворотньої артеріальної перфузії
- d. Синдром селективної затримки росту одного з плодів
- e. Синдром затримки росту плодів

277. У жінки на 5 добу після пологів загальний стан задовільний. Об'єктивно спостерігається: темпера

- a. Кров'янисті
- b. Світлі, рідкі, без домішок крові
- c. Серозно-сукровичні
- d. Гнійні
- e. Яскраво-червоні, зі згустками

278. У жінки на 5 добу після пологів загальний стан задовільний. Об'єктивно спостерігається: темпера

- a. Кров'янисті
- b. Світлі, рідкі, без домішок крові
- c. Яскраво-червоні, зі згустками
- d. Серозно-сукровичні
- e. Гнійні

279. У жінки, що виношує вагітність двійнею, яка настала в результаті екстракорпорального запліднення

- a. Еноксапарин по 40 мг/добу
- b. Дальтепарин 7500 МО/добу
- c. Еноксапарин по 80 мг/добу
- d. Тинзапарин 7000 МО/добу
- e. Дальтепарин 10000 МО/добу

280. У жінки, що виношує вагітність двійнею, яка настала в результаті екстракорпорального запліднення

- a. Еноксапарин по 40 мг/добу
- b. Тинзапарин 7000 МО/добу
- c. Дальтепарин 10000 МО/добу
- d. Дальтепарин 7500 МО/добу
- e. Еноксапарин по 80 мг/добу

281. У пацієнтки віком 30 років під час гінекологічного огляду в дзеркалах виявлено поліп цервікальн

- a. Динамічне спостереження з кольпоцитологічним контролем 1 раз у 2 місяці
- b. Поліпектомія з подальшим роздільним діагностичним вишкрібанням матки
- c. Кріодеструкція поліповидного утворення
- d. Очікувальна тактика
- e. Консервативне лікування

282. У пацієнтки віком 30 років під час гінекологічного огляду в дзеркалах виявлено поліп цервікальн

- a. Кріодеструкція поліповидного утворення
- b. Консервативне лікування
- c. Поліпектомія з подальшим роздільним діагностичним вишкрібанням матки
- d. Динамічне спостереження з кольпоцитологічним контролем 1 раз у 2 місяці
- e. Очікувальна тактика

283. У пацієнтки віком 34 роки після пологів через 2 тижні з'явився біль у лівій кінцівці, ліве стег

- a. Ілеофеморальний тромбоз
- b. Гострий тромбоз глибоких вен
- c. Облітеруючий ендартеріїт
- d. Попереково-крижовий радикуліт
- e. Гострий тромбоз поверхневих вен

284. У пацієнтки віком 34 роки після пологів через 2 тижні з'явився біль у лівій кінцівці, ліве стег

- a. Облітеруючий ендартеріїт
- b. Попереково-крижовий радикуліт
- c. Гострий тромбоз поверхневих вен
- d. Гострий тромбоз глибоких вен
- e. Ілеофеморальний тромбоз

285. У першонароджуючої пацієнтки з гестаційним діабетом розпочалася пологова діяльність середньо

- a. Дискоординована пологова діяльність
- b. Вторинна слабкість пологової діяльності

c. Клінічно вузький таз

- d. Розгинальне вставлення голівки
- e. Дистрес плода в пологах

286. У першонароджуючої пацієнтки з гестаційним діабетом розпочалася пологова діяльність середньою

- a. Дистрес плода в пологах
- b. Дискоординована пологова діяльність
- c. Вторинна слабкість пологової діяльності
- d. Розгинальне вставлення голівки

e. Клінічно вузький таз

287. У післяпологовому періоді в жінки виявлено кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час по

a. Гіпотонічна маткова кровотеча

- b. Атонічна кровотеча
- c. Розрив матки
- d. Емболія навколоплідними водами
- e. ДВЗ-синдром

288. У післяпологовому періоді в жінки виявлено кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час по

- a. ДВЗ-синдром
- b. Розрив матки

c. Гіпотонічна маткова кровотеча

- d. Емболія навколоплідними водами
- e. Атонічна кровотеча

289. У якому випадку методи абляції протипоказані при лікуванні уражень шийки матки високого ступе

a. Ураження покриває понад 25% площі поверхні ектоцервіксу

b. При підозрі на рак шийки матки

- c. Ураження не поширюється на цервікальний канал
- d. Ураження покриває понад 50% площі поверхні ектоцервіксу
- e. Перехідна зона або верхня межа будь-якого ураження візуалізуються повністю

290. У якому випадку методи абляції протипоказані при лікуванні уражень шийки матки високого ступе

- a. Ураження покриває понад 50% площі поверхні ектоцервіксу
- b. Ураження не поширюється на цервікальний канал

c. При підозрі на рак шийки матки

- d. Перехідна зона або верхня межа будь-якого ураження візуалізуються повністю
- e. Ураження покриває понад 25% площі поверхні ектоцервіксу

291. У якому терміні гестації всім вагітним жінкам проводять діагностику гестаційного цукрового діаб

a. Між 24 і 28-м тижнями вагітності

- b. Під час прегравідарної підготовки
- c. При взятті на облік
- d. У 20 та 36 тижнів вагітності
- e. У 20 тижнів вагітності

292. У якому терміні гестації всім вагітним жінкам проводять діагностику гестаційного цукрового діаб

a. У 20 та 36 тижнів вагітності

b. Між 24 і 28-м тижнями вагітності

- c. Під час прегравідарної підготовки
- d. При взятті на облік
- e. У 20 тижнів вагітності

293. Укажіть терапію першої лінії в пацієнтки з передменструальними дисфоричними розладами, за ум

a. Препарати, що містять Vitex agnus castus

- b. Комбіновані оральні контрацептиви в стандартному режимі
- c. Прогестини в циклічному режимі
- d. Терапія супутніх патологічних станів
- e. Препарати магнію, вітамін D

294. Укажіть терапію першої лінії в пацієнтки з передменструальними дисфоричними розладами, за ум

a. Препарати магнію, вітамін D

b. Препарати, що містять *Vitex agnus castus*

c. Терапія супутніх патологічних станів

d. Комбіновані оральні контрацептиви в стандартному режимі

e. Прогестини в циклічному режимі

295. Що є основним з варіантів вибору для припинення тяжкої та помірної кровотечі у дівчат-підлітків

a. Монофазні препарати з вмістом етинілестрадіолу не менше 30-35 мкг

b. Прогестини

c. Комбіновані оральні контрацептиви з динамічними дозуваннями гормонів

d. Хірургічні методи лікування

e. Монофазні препарати з вмістом етинілестрадіолу не більше 20 мкг

296. Що є основним з варіантів вибору для припинення тяжкої та помірної кровотечі у дівчат-підлітків

a. Хірургічні методи лікування

b. Прогестини

c. Монофазні препарати з вмістом етинілестрадіолу не менше 30-35 мкг

d. Комбіновані оральні контрацептиви з динамічними дозуваннями гормонів

e. Монофазні препарати з вмістом етинілестрадіолу не більше 20 мкг

297. Який вид аменореї притаманний загальній постстресовій реакції організму?

a. Аменорея при гіперпролактинемії

b. Гіпергонадотропна аменорея

c. Функціональна гіпоталамічна аменорея

d. Аменорея при гіперандрогенії

e. Гіпергонадотропний гіпогонадизм

298. Який вид аменореї притаманний загальній постстресовій реакції організму?

a. Гіпергонадотропний гіпогонадизм

b. Аменорея при гіперпролактинемії

c. Гіпергонадотропна аменорея

d. Функціональна гіпоталамічна аменорея

e. Аменорея при гіперандрогенії

299. Які додаткові фактори ризику виникнення раку ендометрія у пацієнток з гіперплазією ендометрія

a. Лейоміома матки

b. Багатокамерна кістома яєчника

c. Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія

d. Метаболічний синдром

e. Хронічний аутоімунний тиреоїдит

300. Які додаткові фактори ризику виникнення раку ендометрія у пацієнток з гіперплазією ендометрія

a. Хронічний аутоімунний тиреоїдит

b. Багатокамерна кістома яєчника

c. Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія

d. Метаболічний синдром

e. Лейоміома матки