

1. Якої тактики необхідно дотримуватися для запобігання некрозу тканин під час внутрішньовенного введення гіпертонічного розчину?

- a. Перевірити кут і глибину введення голки
- b. Змінювати місце введення лікарського засобу
- c. Ретельно мити руки перед процедурою
- d. Не допускати потрапляння розчину в паравенозний простір**
- e. Перед застосуванням розчин потрібно підігріти

2. Пацієнтці віком 35 років діагностовано недостатність мітрального клапана. Яке захворювання в анамнезі є однією з основних причин розвитку набутих вад серця?

- a. Гостра ревматична гарячка**
- b. Поліомієліт
- c. Інфекційний моновірусоз
- d. Туберкульоз
- e. Грип

3. Пацієнт звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на сльозотечу, почервоніння очей та відчуття стороннього тіла ("піску") в очах. Лікар встановив діагноз: кон'юнктивіт - та призначив закрапувати в очі два лікарські засоби. Який оптимальний інтервал потрібно витримувати між застосуванням препаратів для ефективного лікування?

- a. 60 хв
- b. 30 хв
- c. 10-15 хв**
- d. 3-5 хв
- e. 1-2 хв

4. Пацієнт віком 56 років скаржиться на появу висипань на відкритих ділянках тіла (долонях, обличчі). Ці прояви турбують його протягом останніх 3-х років. Під час опитування з'ясувалося, що пацієнт працює на хімічному заводі, також він зазначає, що в неробочі дні шкірні симптоми зменшуються. Пацієнту встановлено діагноз: контактний дерматит - та рекомендовано оптимізувати умови праці. Який основний шкідливий виробничий фактор потрібно усунути для покращення стану пацієнта?

- a. Вплив холоду та низьких температур
- b. Контакт із фарбами та лаками**
- c. Роботу на автоматизованій виробничій лінії
- d. Вплив ароматизаторів у повітрі робочої зони
- e. Контакт із паперовими матеріалами

5. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього патологічного стану?

- a. Червоний**
- b. Безбарвний
- c. Жовтувато-зеленуватий
- d. Прозорий
- e. Каламутний

6. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рідини в животі. Для якого виду диспепсії характерні ці клінічні прояви?

- a. Шлункової
- b. Кишкової (ентерогенної)**
- c. Печінкової (гепатобіліарної)
- d. -
- e. Панкреатогенної

7. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей візуалізуються численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні "симптом стружки" (лущення плям у разі пошкрябування)

та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Дерматиту
- b. Висівкоподібного лишаю**
- c. Екземи
- d. Токсикодермії
- e. Мікроспорії

8. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати якої групи порушують процеси росту, розвитку та механізми поділу всіх клітин організму, включаючи злоякісні?

- a. Антибіотики
- b. Гепатопротектори
- c. Цитостатики**
- d. Кардіопротектори
- e. Протівірусні

9. У пацієнта раптово підвищилася температура тіла, з'явилася болючість шкіри. З анамнезу відомо, що він приймає антибіотики. Під час об'єктивного обстеження на шкірі тулуба виявлено множинні бульозні елементи та яскраво-червоні ерозії. Також спостерігається позитивний симптом Нікольського. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Герпетичного дерматиту Дюрінга
- b. Алергічного контактного дерматиту
- c. Токсичного епідермального некролізу**
- d. Фіксованої медикаментозної еритеми
- e. Простого контактного дерматиту

10. Сестра медична проводить запис електрокардіограми пацієнту кардіологічного відділення. Якому грудному відведенню відповідає електрод, встановлений у п'ятому міжребер'ї по лівій середньоключичній лінії?

- a. V2
- b. V3
- c. V4**
- d. V5
- e. V1

11. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово розвинулася шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігатимуться у разі виникнення цього невідкладного стану?

- a. Брадикардія, підвищення АТ
- b. Брадикардія, зниження АТ
- c. Аритмія, АТ не змінюється
- d. Тахікардія, підвищення АТ
- e. Тахікардія, зниження АТ**

12. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання у руках, судоми в м'язах кистей. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом 10-ти років працює забійником у шахті. Об'єктивно спостерігається: кисті ціанотичні, холодні на дотик, зниження больової чутливості за типом "рукавичок". Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Пневмоконіозу
- b. Цукрового діабету
- c. Системної склеродермії
- d. Вібраційної хвороби**
- e. Ревматоїдного артриту

13. Для механічного видалення (вимивання) сірчаної пробки з вуха пацієнта необхідно підготувати оснащення, що включає: шприц Жане, лоток, стерильні марлеві серветки та 0,02 р-н фурациліну. Який із нижченаведених станів є протипоказанням до проведення процедури механічного вимивання сірчаної пробки?

a. Перфорація барабанної перетинки

b. Відмороження вушної раковини

c. Зовнішній отит

d. Звуження слухових проходів

e. Опік вушної раковини

14. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: "маскоподібне обличчя", кисетоподібні складки навколо рота, синдром Рейно?

a. Червоного системного вовчака

b. Гострої ревматичної гарячки

c. Системної склеродермії

d. Вузликового періартеріїту

e. Ревматоїдного артриту

15. Укажіть основний метод пренатальної інвазивної діагностики для виявлення генетичної патології у плода, ДНК-діагностики, каріотипування на ранніх термінах гестації шляхом біопсії плаценти.

a. Амніоцентез

b. Ультразвукове дослідження

c. -

d. Кордоцентез

e. Дослідження ворсин хоріона

16. Пацієнту після гастректомії в післяопераційному періоді призначено парентеральне харчування. Який спосіб введення білкових розчинів потрібно обрати в цьому разі?

a. Пероральний

b. Внутрішньом'язовий

c. Внутрішньовенний

d. Ректальний

e. Інгаляційний

17. У породіллі на 4-ту добу після пологів з'явилися ознаки гіпогалакції, грудне молоко виділяється в незначній кількості. Дитина неспокійна, погано спить. Яка тактика є найдоцільнішою для стимуляції лактації?

a. Збільшити частоту прикладань дитини до грудей

b. Призначити дитині адаптовану молочну суміш

c. Запропонувати лише нічні годування

d. Порекомендувати фітозасоби для підвищення лактації

e. Обмежити кількість прикладань до грудей до 3 разів на добу

18. У чоловіка віком 35 років після контакту із хлорофосом під час польових робіт з'явилися такі симптоми: слюзотеча, посилене слиновиділення, нудота та блювання, біль у животі, діарея, зниження гостроти зору. Об'єктивно спостерігається: пацієнт перебуває у стані психомоторного збудження, мовлення ускладнене, зіниці звужені, пульс - 48/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні вказані симптоми? Отруєння якою речовиною, найімовірніше, спричинило появу вказаних симптомів?

a. Метанолом

b. Ртуттю

c. Фосфорорганічними сполуками

d. Хлорорганічними сполуками

e. Нітратами

19. У пацієнта, який хворіє на рак легень, розвинулася легенева кровотеча. Медична сестра надає йому долікарську допомогу. Яке положення тіла потрібно забезпечити пацієнту, надаючи долікарську допомогу?

a. Тренделенбурга

b. Низьке Фаулера

c. Високе Фаулера

- d. Сімса
- e. Лежачи на животі

20. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для цього захворювання?

- a. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік
- b. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
- c. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння
- d. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, "повним ротом"
- e. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв

21. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилився біль у серці, виникла різка слабкість. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, акроціаноз, холодний липкий піт, АТ - 70/30 мм рт. ст., пульс - 110/хв, слабкого наповнення. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- a. Кардіогенний шок
- b. Нестабільна стенокардія
- c. набряк легень
- d. Серцева астма
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

22. Чоловік віком 35 років після падіння з висоти скаржиться на виражений біль у ділянці правого плеча. Під час об'єктивного обстеження медичний працівник виявив абсолютні об'єктивні ознаки (симптоми) перелому кістки. Укажіть одну з них.

- a. Гіперемія шкіри
- b. Локальний біль
- c. Кісткова крепітація
- d. Блідість шкіри
- e. набряк шкіри

23. Пацієнта віком 65 років шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом: неспецифічний виразковий коліт. Яка діагностична процедура найдоцільніша для підтвердження діагнозу?

- a. Лапароскопія
- b. Цистоскопія
- c. Колоноскопія
- d. Холецистографія
- e. Фіброгастроскопія

24. У пацієнтки віком 52 роки після фізичного навантаження виник напад стенокардії. Який основний клінічний прояв цього захворювання?

- a. Експіраторна задишка
- b. Інспіраторна задишка
- c. Кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння
- d. Стискальний біль за грудниною
- e. набряки на нижніх кінцівках

25. У пацієнтки на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився стан: з'явилися задишка, кашель із виділенням рожевого пінистого мокротиння, клекітливое дихання. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда, пульс - 86/хв, слабкого наповнення, АТ - 100/60 мм рт. ст. Укажіть першочерговий захід невідкладної допомоги в цьому разі.

- a. Фізіотерапевтичні процедури
- b. Інгаляція сальбутамолу
- c. Інгаляційне введення гормональних препаратів
- d. Киснева терапія
- e. Антибіотикотерапія

26. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл/хв. До якої лікувальної процедури необхідно підготувати пацієнта в цьому разі?

- a. Лапароцентезу
- b. Літотрипсії
- c. Шунтування
- d. Фонофорезу
- e. Гемодіалізу**

27. До гастроентеролога звернулася пацієнтка віком 65 років, яка довгий час хворіє на виразкову хворобу шлунка. Пацієнтка скаржиться на відчуття розпирання і тяжкості в ділянці шлунка, відрижку, що виникає після вживання м'ясної їжі, загальну слабкість і швидку втомлюваність, значне зниження маси тіла (за два місяці - на 10 кг). У периферичній крові виявлено ознаки анемії. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Хронічного холециститу
- b. Раку шлунка**
- c. Гострого гастроентероколіту
- d. Раку нирки
- e. Гострого панкреатиту

28. Сестра медична інструктує пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму, щодо користування індивідуальним аерозольним інгалятором. Яку дію має виконати пацієнт перед тим, як натиснути на дно інгалятора і вдихнути лікарський засіб, щоб забезпечити його кращу ефективність?

- a. Очистити носову порожнину
- b. Затримати дихання
- c. Зайняти горизонтальне положення
- d. Глибокий видих (поза інгалятор)**
- e. Глибокий вдих

29. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- a. Бронхоскопія
- b. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- c. Шкірні алергологічні тести
- d. Спірографія**
- e. УЗД легенів

30. Пацієнтці, яка хворіє на хронічну недостатність кровообігу, для зменшення набряків призначено сечогінні лікарські засоби. Який із нижченаведених методів є найбільш інформативним для оцінки ефективності дії призначених сечогінних препаратів?

- a. Вимірювання нічного діурезу
- b. -
- c. Визначення водного балансу**
- d. Вимірювання артеріального тиску
- e. Підрахунок кількості сечовипускань за добу

31. Пацієнту віком 50 років, у якого триває затяжне і тяжке загострення бронхіальної астми, призначено інгаляційне введення лікарських засобів. Який із нижченаведених пристроїв використовується для забезпечення ефективного введення ліків, спрямовуючи їх безпосередньо у верхні та нижні дихальні шляхи?

- a. Спірометр
- b. Пікфлоуметр
- c. Небулайзер**
- d. Пневмотахометр
- e. Пульсоксиметр

32. Жінка віком 19 років, яка перебуває на 37-му тижні вагітності, цікавиться методом епідуральної аналгезії для полегшення болю під час фізіологічних пологів. Проінформуйте жінку щодо можливих наслідків, які можуть виникнути у разі застосування цього методу знеболювання.

- a. Негативний вплив на серцебиття плода
- b. Збільшення ризику розвитку прееклампсії
- c. Гіперстимуляція яєчників
- d. Подовження другого періоду пологів**
- e. Збільшення ризику розвитку еклампсії

33. У жінки віком 55 років раптово виник напад стенокардії. Для зняття нападу вона застосувала препарат, після приймання якого у неї виникли головний біль, почервоніння обличчя та тахікардія. Для якого препарату характерні такі побічні ефекти?

- a. Нітрогліцерину**
- b. Розувастатину
- c. Торасеміду
- d. Метапрололу
- e. Верапамілу

34. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести для видалення патологічного вмісту (зайвої рідини) з черевної порожнини?

- a. Плевральну
- b. Стернальну
- c. Люмбальну
- d. Абдомінальну**
- e. -

35. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата досягла 500 мл і продовжується. Пацієнтка скаржиться на слабкість, пітливість. Об'єктивно спостерігається: слизові оболонки бліді, пульс - 95/хв, слабого наповнення, АТ - 100/60 мм рт. ст. Під час пальпації матки через передню черевну стінку визначається, що вона щільна, дно розташоване на рівні пупка. Укажіть причину вторинної (пізньої) післяпологової кровотечі.

- a. Порушення згортальної системи крові
- b. Розрив промежини
- c. Затримка частин плаценти в порожнині матки**
- d. Розрив матки
- e. Розрив шийки матки

36. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу в лівій пахвовій ділянці щільного болючого утворення багряно-червоного кольору, озноб, головний біль, підвищення температури тіла. Під час пальпації утворення спостерігається симптом флюктуації. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Сикозу
- b. Гідраденіту**
- c. Фурункулу
- d. Остеомієліту
- e. Карбункулу

37. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток у пацієнта синдрому холестазу?

- a. Біль у кістках
- b. Свербіж шкіри**
- c. Шум у вухах
- d. Екзофтальм
- e. Тризм жувальних м'язів

38. Вагітна жінка віком 25 років перебуває на обліку в жіночій консультації. Вагітність перша,

протікає без ускладнень. На 38-му тижні вагітності, вона помітила, що зі статевих шляхів відійшов згусток в'язкого тягучого слизу, і негайно звернулася до жіночої консультації. Укажіть подальшу тактику ведення цієї пацієнтки.

a. Спостерігати за станом вагітної жінки в оглядовому кабінеті жіночої консультації впродовж години

b. Порекомендувати продовжити планові візити до жіночої консультації до настання регулярних перерв

c. Виписати направлення для шпиталізації до хірургічного відділення

d. Негайно шпиталізувати до пологового відділення

e. Забезпечити лікування в денному стаціонарі

39. Який із нижченаведених факторів має найбільший вплив на стан дихальних шляхів і може значно зменшити ризик загострень хронічного бронхіту у пацієнта та покращити його загальне самопочуття?

a. Нормалізація маси тіла

b. Підвищення фізичної активності

c. Використання засобів для чищення повітря

d. Зволоження повітря в приміщенні

e. Відмова від тютюнопаління

40. У жінки на 35-му тижні вагітності з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс - 100/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття плода ритмічне, 160/хв. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

a. Розрив матки, що відбувся

b. Неповне передлежання плаценти

c. Загроза розриву матки

d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

e. Аборт у ході

41. Пацієнтка віком 56 років після вживання гострої їжі відчула різкий біль у правому підребер'ї, що супроводжувався нудотою, блюванням і здуттям живота. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс - 100/хв, АТ - 110/70 мм рт. ст., язик сухий, вкритий білим нальотом, живіт помірно здутий, болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Орнтера і Кера. Яка група препаратів використовується для полегшення стану пацієнтки?

a. Гепатопротектори

b. Спазмолітики

c. Антиагреганти

d. Антибіотики

e. Снодійні

42. Пацієнт скаржиться на часткову втрату чутливості в правій нижній кінцівці після внутрішньом'язового введення лікарського засобу у правий сідничний м'яз. Яка анатомічна структура, найімовірніше, зазнала ушкодження внаслідок порушення техніки виконання ін'єкції?

a. Стегнова артерія

b. Стегновий нерв

c. Сідничний нерв

d. Зовнішня клубова артерія

e. Клубова кістка

43. У пацієнта з діагнозом: цироз печінки - виникла кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Який із нижченаведених медичних приладів використовується для досягнення гемостазу у разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та кардіального відділу шлунка?

a. Гудзиківий зонд

b. Зонд Блекмора

- c. Діатермокоагулятор
- d. Шлунковий зонд
- e. Катетер Фолея

44. Жінці віком 48 років після комплексного обстеження встановлено діагноз: ендемічний зоб. Укажіть найпоширеніший фактор розвитку цього захворювання.

- a. Дефіцит кальцію в продуктах харчування
- b. Надлишкове споживання харчових продуктів, що містять йод
- c. Надлишкове споживання кухонної солі
- d. Недостатнє надходження заліза до організму
- e. Недостатнє споживання йоду з їжею та водою

45. Укажіть групу лікарських засобів, що використовується у лікуванні пацієнтів, які хворіють на атеросклероз, з метою зниження рівня холестерину в крові та нормалізації ліпідного профілю.

- a. Антиагреганти
- b. Інгібітори АПФ
- c. Антикоагулянти
- d. Статини
- e. β -адреноблокатори

46. Для якого захворювання характерні такі результати аналізу сечі пацієнта: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (концентрація білка менше 1 г/л)?

- a. Хронічного гломерулонефриту
- b. Гострої ниркової недостатності
- c. Сечокам'яної хвороби
- d. Гострого пієлонефриту
- e. Гострого гломерулонефриту

47. У вагітної жінки віком 28 років раптово розпочався судомний напад. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, АТ - 170/110 мм рт. ст., сатурація - 90. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: висота стояння дна матки визначається на рівні, що відповідає 37-му тижню вагітності. Яке положення тіла треба надати пацієнтці після стабілізації стану під час транспортування до лікувального закладу?

- a. На спині
- b. На правому боці
- c. На лівому боці
- d. На животі
- e. Сидячи

48. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховується у діагностиці (визначенні ступеня звуження) анатомічно вузького таза?

- a. Зовнішня кон'югата
- b. Справжня кон'югата
- c. Міжостьова відстань
- d. Міжгребенева відстань
- e. Міжвертлюгова відстань

49. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападopodobний біль у ділянці правого підребер'я, що іррадіює в праву ключицю та плече, гіркоту в роті, нудоту, блювання жовчу. В анамнезі: жовчнокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, іктеричність склер та шкірних покривів, пульс - 82/хв, ритмічний, АТ - 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. Гострий панкреатит
- b. Ниркова коліка
- c. Печінкова коліка
- d. Кишкова коліка

е. Гострий гастрит

50. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий, дуже інтенсивний ("кинджальний") біль в епігастрії, що швидко поширився по всьому животу. Загальний стан важкий, шкіра бліда, вкрита холодним потом. Живіт напружений, дошкоподібний, різко болючий при пальпації, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. В анамнезі: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Яке ускладнення виразкової хвороби, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- a. Пенетрація виразки
- b. Малігнізація виразки
- c. Стеноз пілоричної частини шлунка
- d. Шлунково-кишкова кровотеча

е. Перфорація виразки

51. Який метод дослідження дає можливість провести трансервікальний огляд нижнього полюса плодового міхура, визначати характер навколоплідних вод, особливостей плодових оболонок і стану плода?

a. Лапароскопія

b. Амніоскопія

c. Цервікоскопія

d. Кольпоскопія

е. Гістероскопія

52. Чоловіка вкусив пес, який, імовірно, був хворий на сказ. Який із нижченаведених симптомів може спостерігатися у пацієнта вже в продромальному періоді захворювання?

a. Гіперсалівація

b. Фотофобія

c. Аерофобія

d. Гіперестезії

е. Паралічі

53. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності - 39 тижнів, вагітність II, пологи II. Як часто потрібно вислуховувати серцебиття для оцінки стану плода?

a. Кожні 30 хв

b. 3 інтервалом 20 хв

c. Кожні 15 хв

d. 3 інтервалом 10 хв

е. Раз на 1 год

54. У пацієнта віком 35 років спостерігаються симптоми туберкульозу: тривалий кашель, субфебрильна температура тіла, зниження маси тіла, нічна пітливість. Укажіть інноваційний молекулярно-генетичний тест, що забезпечує швидкий автоматизований результат у виявленні генів збудника туберкульозу.

a. GeneXpert

b. Sanger sequencing

c. Western blot

d. ELISA

е. FISH

55. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на задишку, колючий біль та відчуття скутості в грудній клітці, кашель із виділенням гнійного мокротиння, загальну слабкість. З анамнезу відомо, що пацієнт довгий час працює у гірничорудній промисловості з видобутку корисних копалин, що залягають у породі, яка містить кварц. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,2^oC, ЧД - 26/хв, пульс - 90/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. Перкуторно у легенях визначаються ділянки коробкового та притупленого звуку. Аускультативно вислуховується ослаблене везикулярне дихання та дрібнопухирчасті вологі хрипи. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Сухого плевриту
- b. Антракозу
- c. Гострого бронхіту
- d. Силікозу**
- e. Пневмонії

56. У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна амплітуди дихання з паузами між хвилями 40-50 с. Укажіть патологічний тип дихання.

- a. Біота
- b. Тахіпноє
- c. Чейна-Стокса**
- d. Гаспінг
- e. Куссмауля

57. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, утруднення дихання, відчуття страху смерті, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, вкрита холодним потом, дихання часте, поверхнєве, пульс - 120/хв, слабкого наповнення, АТ - 70/30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. Анафілактичний шок**
- b. Напад бронхіальної астми
- c. Кардіогенний шок
- d. Гіповолемічний шок
- e. набряк Квінке

58. Який метод лікування доцільно запропонувати пацієнтці з неускладненою формою жовчнокам'яної хвороби, у якої під час обстеження виявлено одиничні невеликі холестеринові камені в жовчному міхурі, придатні для руйнування без ризику обструкції?

- a. Жовчогінну терапію
- b. Гепатопротекторну терапію
- c. Електрофорез жовчного міхура з магнію сульфатом
- d. Холецистектомію
- e. Ударно-хвильову літотрипсію**

59. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період фізіологічних пологів. Під час прорізування голівки після потуги зареєстровано, що частота серцевих скорочень плода становить 80/хв. Укажіть подальшу тактику ведення пологів у цьому разі.

- a. Провести епізіотомію під місцевою анестезією**
- b. Продовжити очікувальну тактику
- c. Накласти акушерські щипці
- d. негайно провести кесарів розтин
- e. Увести епінефрин 0,01 мг/кг

60. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- a. Кольпоскопія
- b. Гістероскопія
- c. Пертубація
- d. Гідротубація**
- e. Лапароскопія

61. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс - 110/хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

- a. Шкідливі звички
- b. Переохолодження

с. Психотравма

- d. Порушення дієти
- e. Куріння

62. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно заповнити для обліку цього захворювання?

a. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

- b. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів
- c. Медичну карту стаціонарного хворого
- d. Контрольну карту диспансерного нагляду
- e. Медичну карту амбулаторного хворого

63. Пацієнт віком 60 років скаржиться на пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву лопатку, що виник годину тому. Двічі приймав нітрогліцерин, проте біль не минув. Об'єктивно спостерігається: пацієнт перебуває у стані психомоторного збудження, наляканий, шкіра бліда, пульс - 88/хв, ритмічний, АТ - 130/70 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- a. Колапсу
- b. Гіпертензивного кризу
- c. Нападу стенокардії

d. Інфаркту міокарда

- e. Кардіогенного шоку

64. Для якого ендокринного захворювання характерна поява у пацієнта таких очних симптомів: екзофтальм, рідке моргання (симптом Штельвага), відставання верхньої повіки від райдужки під час переведення погляду вгору (симптом Грефе), блиск очей (симптом Крауса)?

- a. Гіпотиреозу
- b. Цукрового діабету

с. Дифузного токсичного зоба

- d. Аутоімунного тиреоїдиту
- e. Нецукрового діабету

65. В якому терміні вагітності доцільно шпиталізувати жінку до акушерського закладу охорони здоров'я для попередження переношування вагітності, за умови неускладненого її перебігу?

- a. 42 тижні
- b. 41 тиждень**

- c. 35 тижнів
- d. 39 тижнів
- e. 37 тижнів

66. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: хронічний пієлонефрит. Яка з нижченаведених лікарських рослин має сечогінні властивості та може використовуватися як фітотерапевтичний засіб для лікування інфекцій сечовивідних шляхів?

- a. Ехінацея пурпурова
- b. Мати-й-мачуха
- c. Меліса лікарська

d. Хвощ польовий

- e. Подорожник великий

67. У пацієнтки напад бронхіальної астми минув після застосування інгаляційного глюкокортикоїдного препарату та завершився виділенням в'язкого мокротиння. Укажіть характер мокротиння в цьому разі.

- a. "Іржаве"
- b. У вигляді "малинового желе"
- c. Гнійне

d. Склоподібне

- e. Із прожилками крові

68. Під час внутрішньовенного введення розчину антибіотика у пацієнта раптово виникли такі

симптоми: відчуття жару та стиснення в грудях, задишка. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, рясна пітливість, АТ - 80/60 мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Який лікарський засіб потрібно застосувати насамперед для надання невідкладної допомоги пацієнту?

a. Епінефрин

- b. Парацетамол
- c. Цетиризин
- d. Лоратадин
- e. Хлоропірамін

69. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, "гавкаючий кашель", утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра обличчя ціанотична, повіки та губи набряклі, щільні на дотик, свербіжу немає, пульс - 84/хв, ритмічний, АТ - 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

a. Набряк Квінке

- b. Кропив'янка
- c. Анафілактичний шок
- d. Дифтерійний круп
- e. Аспірація стороннього тіла

70. Операційна сестра медична комплектує стерилізаційний бікс та укладає все необхідне (операційну білизну, халати, перев'язувальний матеріал та ін.) для роботи перев'язувального кабінету або малої операційної протягом одного робочого дня. Як називається такий вид укладки?

- a. Видова
- b. Спеціалізована
- c. -
- d. Цілеспрямована

e. Універсальна

71. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Яке співвідношення денного діурезу до нічного в нормі?

a. 3:1

- b. -
- c. 1:4
- d. 1:1
- e. 1:3

72. Чоловік віком 49 років скаржиться на біль у грудній клітці та утруднене дихання. Після первинного обстеження встановлено попередній діагноз: ексудативний плеврит. Яка діагностична процедура найдоцільніша для підтвердження діагнозу та подальшого планування лікування?

a. Торакоцентез

- b. Стернальна пункція
- c. Спірометрія
- d. Бронхоскопія
- e. Абдомінальна пункція

73. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниження фізичної активності. Об'єктивно спостерігається: симетричні згинальні контрактури дрібних суглобів. На рентгенограмі кисті й зап'ястка - ерозії та виражений остеопороз безпосередньо прилеглих до суглоба кісток, анкілоз. Для якого захворювання це характерно?

a. Деформуючого остеоартрозу

b. Ревматоїдного артриту

- c. Системного червоного вовчака
- d. Системного васкуліту
- e. Ревматичного поліартриту

74. Пацієнтка, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність, скаржиться на наростаючу

задишку під час звичайних фізичних навантажень, часте серцебиття, підвищену втомлюваність та знижену працездатність. Добовий діурез становить 400 мл. На якій частині тіла насамперед виникатимуть набряки у пацієнтки?

a. Нижніх кінцівок

- b. Животі
- c. Поперековій ділянці
- d. Обличчі
- e. Кистях рук

75. До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу висипань на кистях рук. Після обстеження їй встановлено діагноз: справжня екзема в стадії мокнуття. Яка лікарська форма (форма випуску) препаратів рекомендована для місцевого лікування цього захворювання?

- a. Крем
- b. Паста
- c. Гель

d. Розчин

- e. Мазь

76. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність сухого кашлю і прогресуючої задишки?

- a. Ангінозного
- b. Гастралгічного

c. Астматичного

- d. Церебрального
- e. Аритмічного

77. Пацієнту віком 65 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія. Підвищення рівня якого біохімічного показника в крові може свідчити про ураження одного з органів-мішеней у разі цього захворювання?

- a. Загальних ліпідів

b. Креатиніну

- c. Загального білірубіну
- d. Глюкози
- e. Лужної фосфатази

78. Пацієнту, який страждає на цукровий діабет 1-го типу, сестра медична пояснює методи та способи інсулінотерапії. Який медичний пристрій забезпечує безперервне підшкірне введення інсуліну в автоматичному режимі?

a. Інсулінова помпа

- b. Шприц-дозатор
- c. Інфузомат
- d. Внутрішньокісткова канюляція
- e. Інсулінова ручка

79. У жінки віком 42 роки, яка впродовж 10-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію, після емоційного перенавантаження виникли головний біль, почуття тривоги, сухість у роті. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, тремор рук, гіперемія обличчя, підвищена вологість шкіри, рухових розладів не виявлено, АТ - 220/120 мм рт. ст., пульс - 110/хв. Глюкоза крові - 4,7 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Геморагічний інсульт

d. Гіпертензивний криз

- e. Ішемічний інсульт

80. Пацієнт відчув раптовий біль за грудниною та стиснення у грудях. Сестра медична, надаючи невідкладну допомогу, звільнила його від тиснучого одягу, порекомендувала

прийняти під язик таблетку нітрогліцерину, викликала лікаря. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Колапс
- b. Кардіогенний шок
- c. Гіпертензивний криз
- d. Напад стенокардії**
- e. Напад бронхіальної астми

81. Сестра медична готує доповідь щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ). Який найпоширеніший шлях передачі ВЛІ?

- a. Контактний**
- b. Статевий
- c. Трансмісивний
- d. Внутрішньоутробний
- e. Трансплацентарний

82. Укажіть період пологів, який починається з моменту повного розкриття шийки матки і закінчується народженням плоду через природні пологові шляхи.

- a. Другий**
- b. -
- c. Третій
- d. Перший
- e. Четвертий

83. Пацієнту віком 30 років встановлено діагноз: псоріаз. Який специфічний клінічний прояв вказуватиме на стадію (фазу) захворювання?

- a. Кільцеподібна еритема
- b. Висип у вигляді "метелика"
- c. Симптом Нікольського
- d. Симптом Кебнера**
- e. Плями Бельського-Філатова-Копліка

84. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичною метою призначено спинномозкову пункцію. Який медичний інструмент треба підготувати сестрі медичній для проведення цієї процедури?

- a. Голку Дюфо
- b. Біопсійну голку
- c. Голку Касирського
- d. Голку Біра**
- e. Троакар

85. У чоловіка віком 40 років унаслідок падіння з висоти стався перелом кісток передпліччя. Укажіть одне з ранніх ускладнень, що може виникнути у разі закритих переломів довгих трубчастих кісток.

- a. Жирова емболія**
- b. Анкілоз
- c. Контрактури
- d. Некроз кістки
- e. Укорочення кінцівки

86. Під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції сестра медична ввела голку шприца в м'яз на всю довжину, внаслідок чого вона зламалася так, що навіть не видно її кінчика. Оберіть найоптимальніший метод видалення голки з м'яза в цьому разі.

- a. Прикласти мазь Вишневського до місця уколу
- b. Спробувати витягнути голку пальцями
- c. Видалити голку за допомогою хірургічного пінцета
- d. Провести хірургічне втручання для видалення голки**
- e. Спробувати витягнути голку, скориставшись магнітом

87. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинутися у пацієнта під час внутрішньовенного введення 1-го розчину нікотинової кислоти.

- a. Порушення зору
- b. Відчуття жару в тілі**
- c. Закреп
- d. Сонливість
- e. Брадикардія

88. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні на 5-ту добу захворювання зі скаргами на сильний біль у м'язах, підвищення температури тіла до 39°C , головний біль, пожовтіння шкіри. Об'єктивно спостерігається: язик сухий, обкладений білим нальотом, пульс - 120/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., тони серця приглушені, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3,5 см. Результати загального аналізу крові: лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Спостерігається зменшення добового об'єму сечі. З анамнезу з'ясувалося, що 2 тижні тому купався в озері. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- a. Бешихи
- b. Малярії
- c. Гепатиту
- d. ВІЛ-інфекції
- e. Лептоспірозу**

89. Пацієнту терапевтичного відділення з діагностичною метою проводять дуоденальне зондування. На етапі отримання жовчі порції В йому прикладають медичну грілку під праве підребер'я. Яка основна мета її застосування в цьому разі?

- a. Зменшення продукції шлункового соку для зниження кислотності
- b. Зігрівання пацієнта для покращення загального стану
- c. Розширення жовчних протоків для покращення відтоку жовчі**
- d. Звуження кровоносних судин для запобігання кровотечі
- e. Зменшення чутливості в ділянці правого підребер'я

90. У пацієнтки, якій призначено накладання гірчичників, на момент проведення процедури спостерігається підвищення температура тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$. Як потрібно вчинити сестрі медичній у цьому разі?

- a. Накладати гірчичники не можна**
- b. До місця накладання гірчичників попередньо прикласти холодний компрес
- c. Обмежити час накладання гірчичників до 5 хв
- d. Накласти гірчичники і запропонувати прийняти жарознижувальний засіб
- e. Накласти гірчичники, не зважаючи на обставини

91. Жінка віком 20 років скаржиться на сильний переймоподібний біль унизу живота та попереку, кров'яністі виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після падіння. Із анамнезу відомо, що остання менструація була 4 місяці тому. Порушення менструального циклу та гінекологічні захворювання в минулому заперечує, статеве життя регулярне, без контрацепції. Об'єктивно спостерігається: дно матки визначається посередині між лобковим симфізом та пупком, матка в гіпертонусі. Виділення зі статевих шляхів кров'яністі, значні, зі згустками. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся у жінки?

- a. Апоплексія яєчника
- b. Аборт у ході**
- c. Передчасні пологи
- d. Загроза переривання вагітності
- e. Альгодисменорея

92. Укажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- a. Ліва нога**
- b. -
- c. Ліва рука
- d. Права рука

е. Права нога

93. У пацієнта віком 45 років під час огляду та об'єктивного обстеження виявлено збільшення розмірів щитоподібної залози. Укажіть основний метод дослідження, що проводиться для визначення її функції.

- a. Загальноклінічний аналіз сечі
- b. УЗД щитоподібної залози
- c. Аналіз крові на глюкозу
- d. Аналіз крові на тиреоїдні гормони**
- e. Загальноклінічний аналіз крові

94. Медичний працівник проводить запис електрокардіограми пацієнту, в якого виник напад стенокардії, та виконує послідовний аналіз отриманих параметрів. Які зубці на ЕКГ в нормі є завжди негативними (від'ємними)?

- a. -
- b. R та T
- c. P та T
- d. R та P
- e. Q та S**

95. Пацієнтка віком 18 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на часте і болісне сечовипускання, біль у надлобковій ділянці, підвищення температури тіла до $37,4^{\circ}\text{C}$. Симптоми з'явилися після переохолодження. У сечі: лейкоцитурія, еритроцити - 20-30 в полі зору мікроскопа. Для якого захворювання найхарактерніші вказані клініко-лабораторні показники?

- a. Полікістозу нирок
- b. Гострого циститу**
- c. Гострого пієлонефриту
- d. Сечокам'яної хвороби
- e. Гострого аднекситу

96. П'ятирічна дитина каталася на самокаті і впала. На місці забою виникла гематома без пошкодження шкірних покривів. Які дії зменшать зону крововиливу?

- a. -
- b. Прикладання медичної грілки
- c. Застосування гірчичників
- d. Застосування міхура з льодом**
- e. Накладання зігрівального компресу

97. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$, набряк і почервоніння правої щоки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається інфільтрат, болючий під час пальпації, шкіра над ним напружена, гіперемована, у центрі інфільтрату візуалізується стрижень у вигляді сіро-зелених мас. Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- a. Фурункул**
- b. Карбункул
- c. Гідраденіт
- d. Абсцес
- e. Флегмона

98. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- a. Бактеріологічний**
- b. Інструментальний
- c. Візуальний
- d. Хімічний
- e. Фізичний

99. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри

промежини довжиною 1 см, м'язи промежини неушкоджені. Укажіть ступінь розриву промежини.

- a. II
- b. IV
- c. -
- d. III
- e. I

100. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість та біль у правій половині тулуба. Під час огляду на шкірі грудної клітки виявлено множинні везикули, розташовані групами вздовж VII ребра в міжреберному проміжку. Для якого з нижченаведених захворювань характерні вказані симптоми?

- a. Токсикодермії
- b. Справжньої екземи
- c. Оперізувального герпесу
- d. Імпетиго
- e. Простого герпесу

101. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток цієї патології?

- a. Гіперемія шкірних покривів
- b. Підвищення температури тіла
- c. Запах аміаку з рота
- d. Підвищення апетиту
- e. Збільшення лімфатичних вузлів

102. На машинобудівному заводі проводиться позапланова перевірка у зв'язку з зафіксованим збільшенням захворюваності на пневмоконіоз серед працівників. Під час обстеження виявлено підвищену концентрацію кварцового пилу в повітрі робочої зони. Який із нижченаведених заходів є найефективнішим для зменшення ризику захворюваності співробітників на пневмоконіоз?

- a. Проведення позапланового інструктажу для працівників
- b. Скорочення тривалості робочої зміни
- c. Зменшення запиленості в повітрі робочої зони
- d. Оптимізація температурних умов робочої зони
- e. Надання додаткових днів відпустки

103. У дитячому дошкільному закладі зареєстровано спалах кору. Укажіть характер елементів висипу у разі типового перебігу періоду висипань кору.

- a. Плямисто-папульозний
- b. Везикулярний
- c. Геморагічно-зірчастий
- d. Уртикарний
- e. Петехіальний

104. У пацієнта після проведення скарифікаційної шкірної проби через 15 хв у місці нанесення алергену утворилася папула діаметром 5 мм, оточена ділянкою гіперемії. Проаналізуйте результат проби.

- a. Сумнівна
- b. -
- c. Гіперергічна
- d. Позитивна
- e. Негативна

105. У жінки віком 28 років після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явилися висипання, що супроводжуються свербіжем, схожі на опіки кропивою. Об'єктивно спостерігається: на шкірі візуалізуються пухирі червоного кольору різних розмірів, температура тіла - 37,5^oC, пульс - 78/хв, АТ - 120/80 мм рт. ст. Яка група лікарських засобів

використовується для лікування цього патологічного стану?

- a. Антидепресанти
- b. Антигістамінні**
- c. Антиагреганти
- d. Антибіотики
- e. Антациди

106. Укажіть особливість приймання ферментних препаратів.

- a. За 2 год до вживання їжі
- b. Через 1 год після вживання їжі
- c. Натщесерце
- d. Під час вживання їжі**
- e. Через 2 год після вживання їжі

107. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика з групи цефалоспоринов III покоління. У флаконі міститься 1000 мг діючої речовини. Скільки мілілітрів розчину антибіотика потрібно ввести дитині, якщо застосувати стандартне розведення?

- a. 5 мл
- b. 1,5 мл
- c. 35 мл
- d. 3,5 мл**
- e. 10 мл

108. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігастрії з'являється натщесерце, вночі або через 3-4 год після останнього вживання їжі та зникає навіть після незначного вживання будь-яких продуктів харчування?

- a. Виразкової хвороби шлунка
- b. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки**
- c. Хронічного панкреатиту
- d. Хронічного холециститу
- e. Хронічного атрофічного гастриту

109. Пацієнту віком 42 роки встановлено попередній діагноз: гостра ниркова недостатність. Рівень яких біохімічних показників потрібно визначити в крові для дослідження функції нирок?

- a. Креатиніну, сечовини**
- b. α -амілази, трипсину
- c. Загального білка та його фракцій
- d. Білірубіну, трансаміназ
- e. С-реактивного білка, сіалових кислот

110. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спостерігалися тривала жовтяниця, пізні відпадання пупкового канатика та повільне загоєння пупкової ранки, зниження фізіологічних рефлексів, гіпотрофія м'язів, щільні набряки на тильних поверхнях кистей та стоп, непропорційно велика голова, збільшення губ і язика. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Дифузного токсичного зоба
- b. Вродженого гіпотиреозу**
- c. Рахіту
- d. Вродженої вади серця
- e. Акромегалії

111. У пацієнта терапевтичного відділення під час об'єктивного обстеження виявлено випинання надключичних ямок. Перкуторно над легеньми визначається коробковий звук. Аускультативно вислуховується жорстке дихання та сухі свистячі хрипи на видиху. Для якого захворювання характерні ці результати об'єктивного обстеження?

- a. Бронхіальної астми**
- b. Ексудативного плевриту

- c. Раку легень
- d. Пневмонії
- e. Гострого бронхіту

112. Пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції. Лікар призначив введення постійного катетера Фолея для моніторингу та забезпечення дренування сечі. Для його правильної фіксації необхідно заповнити балон катетера ізотонічним розчином натрію хлориду. Яку кількість ізотонічного розчину натрію хлориду потрібно ввести в балон катетера Фолея?

- a. 8 мл
- b. 2 мл
- c. 6 мл
- d. 10 мл
- e. 1 мл

113. Який ендоскопічний метод дослідження сечового міхура використовується для діагностики захворювань, виконання біопсії, забору біологічного матеріалу та проведення лікувальних маніпуляцій?

- a. Цистоскопія
- b. Ультразвукове дослідження
- c. Холецистографія
- d. Колоноскопія
- e. Цистографія

114. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом мокротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Пневмосклерозу
- b. Раку легень
- c. Гострого бронхіту
- d. Абсцесу легень
- e. Вогнищевої пневмонії

115. Сестра медична, виконуючи призначення лікаря, вводить лікарський засіб пацієнту внутрішньом'язово. Укажіть рекомендовану швидкість введення ін'єкційного розчину в м'яз для оптимального розподілу препарату в тканинах та мінімізації ризику ускладнень.

- a. 1 мл за 10 с
- b. 1 мл за 5 с
- c. 0,5 мл за 5 с
- d. 1 мл за 1 с
- e. 0,5 мл за 10 с

116. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується в II періоді гарячки для полегшення стану пацієнта?

- a. Медична грілка
- b. Зігрівальний компрес
- c. Міхур із льодом
- d. Медичні банки
- e. Гірчичники

117. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Укажіть метод, спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

- a. Механотерапія
- b. Вісцеральна терапія
- c. Міостимуляція
- d. Вакуумний масаж
- e. Пневмопресинг

118. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів?

- a. Біологічна
- b. Електролітична
- c. Термічна
- d. -
- e. Магнітна

119. У пацієнта виразкова хвороба шлунка ускладнилася шлунково-кишковою кровотечею. Який вигляд матимуть калові маси в цьому разі?

- a. Мутнувато-білого кольору, водянисті
- b. Чорного кольору, дьогтеподібні
- c. Коричневого кольору, нормальної консистенції
- d. Знебарвлені, пастоподібні
- e. Зеленого кольору, водянисті

120. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий інтенсивний біль у поперековій ділянці, що іррадіює в промежину і статеві органи, супроводжується нудотою та частими позивами до сечовипускання. Біль з'явився після тривалої тряскої їзди. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка перебуває у стані психомоторного збудження, шкіра бліда, надмірно волога, пульс частий і слабкий. У загальному аналізі сечі: свіжі еритроцити та кристали солей. Для якого патологічного стану характерні вказані клінічні прояви?

- a. Жовчної (печінкової) коліки
- b. Гострого апендициту
- c. Перитоніту
- d. Гострого аднекситу

e. Ниркової коліки

121. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження температури тіла із $39,5^{\circ}\text{C}$ до 37°C , раптово виникли загальна слабкість, запаморочення, відчуття холоду, серцебиття. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, апатичний, із зусиллям відповідає на запитання. Шкірні покриви та слизові оболонки бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, пульс - 98/хв, слабого наповнення, АТ - 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. набряк легень
- b. Анафілактичний шок
- c. Астматичний статус

d. Колапс

e. Кардіогенний шок

122. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пацієнта в стаціонарі закладу охорони здоров'я та фіксації відомостей про медикаментозне лікування, методів обстеження, фізіотерапевтичних процедур тощо?

- a. Консультативний висновок спеціаліста
- b. Температурний листок
- c. Журнал обліку процедур

d. Листок лікарських призначень

e. Реєстраційна генетична карта

123. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на біль у правому підребер'ї, що іррадіює в епігастральну ділянку та під праву лопатку, підвищення температури тіла. Під час опитування з'ясувалося, що жінка хворіє впродовж 3-х років, останнє загострення спровоковане вживанням жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: біль у ділянці проєкції жовчного міхура під час пальпації, позитивний френікус-симптом. За результатами дуоденального зондування в порції B виявлено значну кількість лейкоцитів та епітеліальних клітин. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви та результати додаткового методу дослідження?

a. Виразкової хвороби шлунка

b. Жовчнокам'яної хвороби

- c. Геморагічного коліту
- d. Вірусного гепатиту
- e. Гострого пієлонефриту

124. Старша сестра медична навчає медичний персонал її підрозділу правилам гігієни рук. Який тип нагадування на робочому місці є найліпшим для активізації уваги?

- a. Інформаційні плакати
- b. Аудіоповідомлення
- c. Конференції
- d. Санбюлетні
- e. Накази

125. Яку процедуру потрібно провести медичному працівнику після контакту з потенційно інфікованим матеріалом та зняття медичних рукавичок?

- a. Висушування рук
- b. Миття рук із милом
- c. Гігієнічну обробку рук
- d. Одягання нових рукавичок
- e. Хірургічну обробку рук

126. Пацієнту віком 37 років встановлено попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба. Який рентгенологічний метод дослідження застосовується для оцінки стану жовчного міхура та виявлення патологічних змін у ньому з використанням контрастної речовини?

- a. Іригоскопія
- b. Холецистографія
- c. Урографія
- d. Цистографія
- e. Гастрографія

127. Для зменшення інтенсивності спастичного болю, що супроводжує перебіг хронічного холециститу, пацієнту рекомендовано використання медичної грілки. Якою має бути температура води для заповнення грілки в цьому разі?

- a. 80^oC
- b. 50^oC
- c. 60^oC
- d. 90^oC
- e. 40^oC

128. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягнути поршень шприца назад після проколу шкіри перед введенням препарату?

- a. Інфільтрату
- b. Повітряної емболії
- c. Гематоми
- d. Медикаментозної емболії
- e. Некрозу

129. Під час вимірювання артеріального тиску пацієнтці сестра медична звернула увагу на те, що різниця між систолічним та діастолічним тиском становить 30 мм рт. ст. Як називається цей показник?

- a. Центральний тиск
- b. Хвилинний об'єм крові
- c. Пульсовий тиск
- d. Капілярний пульс
- e. Систолічний об'єм крові

130. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа). Які зміни в загальному аналізі крові є найхарактернішими для цього захворювання?

- a. Лейкопенія

- b. Еозинофілія
- c. Ретикулоцитопенія
- d. Тромбоцитопенія
- e. Еритроцитоз

131. У жінки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну з'явилися загальна слабкість, головний біль, відчуття голоду, тривожність, пітливість, тремтіння рук. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, пульс - 92/хв, ритмічний, АТ - 100/60 мм рт. ст. Укажіть заходи домедичної допомоги в цьому разі.

- a. Увести інсулін
- b. Увести кордіамін
- c. Дати вжити глюкозовмісні харчові продукти (воду з цукром, грудочку цукру, сік)
- d. Провести інгаляцію киснем
- e. Надати пацієнтці горизонтальне положення та підняти ноги вище рівня голови

132. Пацієнт перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 2 дні тому. У ділянці стегна, в місці забою, утворилася гематома. Укажіть оптимальну лікувальну тактику, що сприятиме розсмоктуванню гематоми.

- a. Застосування гірчичників
- b. Прикладання міхура з льодом
- c. Накладання зігрівального компресу
- d. Імобілізація кінцівки
- e. Накладання охолоджувального компресу

133. Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хронічного пієлонефриту?

- a. Антибактеріальні
- b. Діуретики
- c. Антитромботичні
- d. Нестероїдні протизапальні
- e. Антигістамінні

134. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, задишку під час фізичних навантажень, відчуття "повзання мурашок" по шкірі та утруднення під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри з лимонним відтінком, іктеричність склер, яскраво-червоний глянцеви́й язик з атрофією сосочків. У крові: гемоглобін - 70 г/л, колірний показник - 1,4, макроцитоз еритроцитів. В анамнезі: атрофічний гастрит. Для якого виду анемії характерні ці клінічні прояви та показники гемограми?

- a. Залізодефіцитної
- b. Гіпопластичної
- c. Постгеморагічної
- d. Апластичної
- e. Вітамін В₁₂-дефіцитної

135. Пацієнт, у якого триває І стадія гарячки, скаржиться на головний біль, м'язове тремтіння, мерзлякуватість, біль у м'язах, загальне нездужання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, холодна на дотик, набула вигляду "гусячої". Який найпростіший метод фізіотерапії доцільно застосовувати в І стадії гарячки для полегшення стану пацієнта?

- a. Прикладання міхура з льодом
- b. Застосування медичної грілки
- c. Накладання охолоджувального компресу
- d. Прикладання мішечків із сухим льодом на ділянку великих судин шиї
- e. Застосування гірчичників

136. Породіллі після народження плода введено 10 ОД окситоцину, процес народження посліду проведено шляхом контрольованої тракції за пуповину з контртракцією на матку. Укажіть ще один стандартний компонент повноцінного активного ведення третього періоду фізіологічних пологів.

- a. Пункція заднього склепіння піхви
- b. Інструментальна ревізія порожнини матки
- c. Масаж матки через передню черевну стінку
- d. -
- e. Балонна тампонада матки

137. Під час дослідження пульсу пацієнтки сестра медична з'ясувала, що після притискання променевої артерії до променевої кістки пульсація не припинилася. Проаналізуйте цей параметр пульсу.

- a. Напружений (твердий)
- b. М'який
- c. Нормального наповнення
- d. Слабкого наповнення
- e. Ниткоподібний

138. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом, інколи "повним ротом", задишку, періодичне підвищення температури тіла та зниження працездатності. Мокротиння розшароване, гнійно-слизового характеру. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Негоспітальної пневмонії
- b. Сухого плевриту
- c. Ексудативного плевриту
- d. Гострого бронхіту
- e. Бронхоектатичної хвороби

139. Для лікування подагричного артрити в стадії загострення препаратами першої лінії є швидкодіючі НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) у високих дозах. Укажіть особливість приймання лікарських засобів цієї групи, що дозволяє запобігти розвитку побічних ефектів на шлунково-кишковий тракт.

- a. Після вживання їжі
- b. Запивати невеликою кількістю води
- c. Натщесерце
- d. Незалежно від вживання їжі
- e. За 2 год до вживання їжі

140. Який із нижченаведених продуктів рекомендовано виключити з раціону харчування пацієнтки, яка хворіє на хронічну форму кропив'янки, для запобігання загострень хвороби?

- a. Шоколад
- b. Кабачки
- c. Броколі
- d. Картопля
- e. Вівсянку

141. У п'ятирічної дитини упродовж 2-х діб спостерігаються підвищення температури тіла до 38^oC, рідкі випорожнення зеленуватого кольору з прожилками крові, часті болючі позиви на випорожнення (тенезми). Живіт під час пальпації болючий, переважно в лівій здухвинній ділянці за ходом сигмоподібної кишки. Для якого інфекційного захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Лептоспірозу
- b. Холери
- c. Ротавірусної інфекції
- d. Шигельозу
- e. Сальмонельозу

142. Під час догляду за пацієнтом, який хворіє на інфекційне захворювання, медичний працівник поєднує декілька засобів індивідуального захисту. Який предмет індивідуального захисту потрібно одягати останнім?

- a. Маску

b. Рукавички

- c. Респіратор
- d. Захисні окуляри
- e. Хірургічний костюм

143. Які з нижченаведених лікарських засобів найчастіше викликають медикаментозну алергію?

- a. Ентеросорбенти
- b. Сечогінні

c. Антибіотики

- d. Проносні
- e. Гіпотензивні

144. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти діб спостерігаються часті рідкі випорожнення (до 15 разів на добу) світло-жовтого кольору зі шматочками неперетравленої їжі. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, апатію, спрагу, значну втрату маси тіла. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

- a. Дефіцит заліза
- b. Дефіцит вітаміну D
- c. Гіпергідратація (затримка води)

d. Зневоднення (дегідратація)

- e. Гіпокальціємія

145. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики стенокардії?

- a. Аудіометрія
- b. Нейроміографія
- c. Енцефалографія
- d. Спірографія

e. Велоергометрія

146. Укажіть засіб, яким потрібно промити неушкоджену шкіру, у разі потрапляння на неї крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин.

a. Водою з милом

- b. Фізіологічним розчином
- c. Етиловим спиртом
- d. Дезінфікуючим розчином
- e. Антисептиком

147. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на біль у поперековій ділянці, часте сечовипускання, озноб, підвищення температури до $38,5^{\circ}\text{C}$. Під час об'єктивного обстеження виявлено позитивний симптом Пастернацького. З боку інших органів патології не виявлено. Які зміни в загальному аналізі сечі, найімовірніше, спостерігатимуться в цьому разі?

- a. Глюкозурія
- b. Гематурія (сеча кольору "м'ясних помиїв")
- c. Міоглобінурія

d. Лейкоцитурія (піурія)

- e. Парапротеїнурія

148. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної обробки рук перед виконанням внутрішньовенної ін'єкції?

- a. 5 мл

b. 3 мл

- c. 9 мл
- d. 6 мл
- e. 1 мл

149. Маніпуляційна сестра медична контролює термін стерильності матеріалу в біксі, який не

був розкритий. Протягом якого часу зберігається його стерильність?

a. 3-х діб

b. 1-го тижня

c. 1-го дня

d. 8-ми год

e. 6-ти днів

150. Для якого захворювання сечостатевої системи характерний такий симптомокомплекс: підвищення артеріального тиску, набряки, олігурія та гематурія (сеча кольору "м'ясних помиїв"?)

a. Гострого уретриту

b. Хронічного пієлонефриту

c. Гострого гломерулонефриту

d. Сечокам'яної хвороби

e. Гострого циститу