

1. Дитині 7р. поставлено попередній діагноз мікроспорія волосистої частини голови. Який метод лабораторної діагностики потрібно використати для підтвердження діагнозу?

a. -

b. Мікроскопію ураженого волосся і лусочок шкіри

c. Серологічне дослідження

d. Мазки-відбитки з місця ураження

e. Біологічний

2. У пацієнта вперше, на шкірі тулуба виявлені міхурі, болючі мокнучі ерозії. Яке діагностичне дослідження необхідно провести для підтвердження звичайної міхурчатки?

a. Цитологічне

b. Виявлення тріади феноменів зіскрібання

c. Бактеріологічне

d. Виявлення ізоморфної реакції

e. Шкірну пробу з йодом

3. Пацієнт на 2-й день після повернення з відпустки скаржиться на інтенсивний свербіж в ділянці волосистої частини голови. Яке захворювання можна запідозрити?

a. Псоріаз

b. Нейродерматит

c. Педикульоз

d. Шкірний свербіж

e. Коросту

4. Пацієнт звернувся зі скаргами на шкірний висип. Об'єктивно: на ліктях та колінах червоні бляшки, вкриті сріблястими лусочками. Діагностичний тест: "стеаринова пляма", "термінальна плівка", "точкова кровотеча" - різко позитивні. Якому захворюванню відповідає клінічна картина та діагностичний тест?

a. Псоріазу

b. Червоному плоскому лишая

c. Мікроспорії

d. Екземи

e. Червоному вовчаку

5. У хворого скарги на появу невеликої ерозії в ділянці головки статевого члена, діаметром до 1 см, збільшений у паху щільний, неболиючий лімфовузол. Яке захворювання можна запідозрити?

a. Дерматит

b. Імпетиго

c. Сифіліс

d. Екзему

e. Еритему

6. Пацієнту поставлено діагноз червоний плоский лишай. Який діагностичний симптом є характерним?

a. Твердий шанкр

b. Сітка Уїкхема

c. Материнська пляма

d. Феномен "стеаринової плями"

e. Намисто Венери

7. У хлопчика 12 років виявлено тріаду Гетчинсона. Для якого захворювання це характерно?

a. Хламідіозу

b. Гарднерельозу

c. Гонореї

d. Трихомонозу

e. Пізнього вродженого сифілісу

8. Хворому поставлений попередній діагноз первинний сифіліс. В лабораторію доставлено кров на реакцію Вассермана. Коли серологічні реакції стають позитивними після появи твердого шанкру?

- a. 1-2 місяці
- b. 3-4 місяці
- c. 7-8 тижнів
- d. 5-6 тижні

e. 3-4 тижні

9. В мазках-відбитках з пухирів на шкірі пацієнта виявлені акантолітичні клітини Тцанка. Про яке захворювання свідчать ці результати

a. Вульгарна пухирчатка

- b. Стрептодермія
- c. Герпес генітальний
- d. Короста
- e. Гострий дерматит

10. У пацієнта К., 36 років підозрюється первинний серонегативний сифіліс. Мікроскопічне дослідження на бліду трепонеми слід проводити

- a. Із додаванням луги
- b. Із забарвленням гематоксиліном-еозіном

c. В темному полі зору

- d. Із забарвленням по Граму
- e. Недоцільно проводити

11. У пацієнта на шкірі кистей, передпліч, бокових поверхонь тулуба – множинні парні везикуло-папульозні елементи висипки. Яке дослідження потрібно провести

a. Поверхневий зріз на виявлення коростяного кліща

- b. Бактеріологічне дослідження
- c. Дослідження на наявність еозинофілів
- d. Дослідження на клітини Тцанка
- e. Мікологічне дослідження

12. В мазках з виділень піхви у пацієнтки виявлені “ключові клітини”, лейкоцити -до 25 у полі зору. Про яке захворювання свідчать результати

- a. Уреаплазмоз
- b. Хламідіоз

c. Гарднерельоз

- d. Гонорея
- e. Трихомоніаз

13. Пацієнт скаржиться на появу безболісної виразки після статевих контактів. Об'єктивно: на голівці прутня округла виразка діаметром 1 см кольору свіжого м'яса з блискучим дном і щільними припіднятими краями. Пахвинні лімфатичні вузли збільшені. В мазках знайдено бліді трепонеми. Реакція Вассермана негативна, РІФ – позитивна. Поставте діагноз?

- a. Герпес генітальний
- b. Рак статевого прутня
- c. Сифіліс первинний серопозитивний
- d. Сифіліс третинний активний

e. Сифіліс первинний серонегативний

14. Пацієнт звернувся до лікаря-дерматолога. При огляді шкіри на зовнішній поверхні передпліччя ділянка гіперемії невеликого розміру. Після проведеного огляду лікар зробив зішкріб з пошкодженої ділянки. При мікроскопії були виявлені тільки клітини з роговими лусочками - мертвими кератиноцитами, з'єднаними інтердигітаціями їх цитолем. Лікар заспокоїв пацієнта і сказав, що це запалення поверхневого шару шкіри. Який це шар:

a. Роговий

- b. Шипуватий

- c. Блискучий
- d. Зернистий
- e. Базальний

15. На лікування в шкірно-венерологічний диспансер поступив пацієнт з діагнозом: “Сикоз”.
Яка переважна зона локалізації на тілі пацієнта?

- a. Голова
- b. Живіт
- c. Спина
- d. Борода, вуса**
- e. Лоб