

1. У пацієнта діагностовано раптову зупинку кровообігу. На ЕКГ реєструється фібриляція шлуночків. Проводиться комплекс заходів базової підтримки життя. Які лікарські засоби необхідно ввести після третьої послідовної дефібриляції?

- a. Атропін та аміодарон
- b. Адреналін та аміодарон**
- c. Адреналін та аденозин
- d. Адреналін та атропін
- e. Атропін та аденозин

2. Яку допомогу необхідно надати потерпілому з проникаючим пораненням грудної клітки, що спричиняє відкритий пневмоторакс?

- a. Проводити оксигенотерапію потерпілому
- b. Здійснити декомпресію грудної клітки
- c. Заклеїти місце поранення пов'язкою з плівки**
- d. Накласти асептичну пов'язку на рану
- e. Провести плевральну пункцію за Бюлау

3. Який шлях введення епінефрину гідрохлориду під час зупинки серцевої діяльності?

- a. Внутрішньотрахеальний
- b. Не показаний під час зупинки серцевої діяльності
- c. Внутрішньосерцевий
- d. Внутрішньосерцевий і внутрішньотрахеальний
- e. Внутрішньовенний**

4. Чоловік під час ДТП вдарився грудною кліткою об кермо автомобіля. Протягом 1 години наростали задишка, загальна слабкість. При аускультатії легень з правого боку - дихання відсутнє, з лівого - везикулярне. Пульс - 110/хв, ритмічний. АТ - 110/70 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Забій грудної клітки праворуч
- b. Правобічний закритий пневмоторакс**
- c. Правобічний гемоторакс
- d. Перелом ребер праворуч
- e. Кардіальний шок

5. На трамвайній зупинці дівчина знепритомніла. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, пульс на сонній артерії не визначається. негайно розпочато комплекс серцево-легеневої реанімації. Що з нижченаведеного свідчить про ефективність реанімаційних заходів?

- a. Перелом ребер
- b. Зниження температури тіла
- c. Пульсація на сонній артерії**
- d. Аспірація вмістом шлунка
- e. Розширені зіниці

6. Яка дія є першочерговою під час надання допомоги потерпілому внаслідок падіння з висоти, в якого виявлено відкритий перелом верхньої третини стегнової кістки?

- a. Контроль критичної кровотечі**
- b. Оксигенотерапія
- c. Інфузійна терапія
- d. Стабілізація шийного відділу хребта
- e. Введення транексамової кислоти

7. При наданні допомоги дитині з тяжким нападом бронхіальної астми (первинна маніфестація) всі етапи медикаментозної терапії були неефективні. Виберіть препарат запасу для лікування даного невідкладного стану, шлях та дозу введення.

- a. Метилпреднізолон 2 мг/кг в/в струминно
- b. Дексаметазон 0,6 мг/кг в/м або в/в
- c. Еуфілін 2,4% 6 мг/кг за 10 хвилин в/в

- d. Сальбутамол 100 мкг (1 інгаляція) протягом 5 хв
e. Магnezія сульфат 25% 40 мг/кг за 20-60 хвилин в/в

8. З поля, обробленого отрутохімікатами, доставлено чотирирічну дитину. Свідомість сплутана, відмічається гіперсалівація та бронхорея, зіниці вузькі. Який препарат необхідно використати як антидот у цьому разі?

- a. Хромосмон
b. Унітіол
c. Атропін
d. Адреналін
e. Прозерин

9. До відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні звернулися батьки із п'ятирічною дитиною зі скаргами на раптове погіршення її стану. При огляді дитини: ЧСС - 196/хв, АТ - 100/55 мм рт. ст., аускультативно - над легенями дихання везикулярне, без хрипів, сатурація - 97%, свідомість ясна, комплекси QRS на ЕКГ регулярні, тривалістю 0,06 с. З чого слід розпочати лікування дитини?

- a. З електричної кардіоверсії
b. Із внутрішньовенного введення верапамілу
c. Із вагусних маневрів
d. Із в/в введення аденозину
e. Із внутрішньовенного введення аміодарону

10. Чоловік віком 48 років, який лікувався в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об'єктивно спостерігається: зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато компресію грудної клітини та вентиляцію легень. На ЕКГ-моніторі реєструється електрична активність без пульсу. Які подальші дії лікаря в цьому разі?

- a. Ввести в/в атропін після 3-го розряду
b. Ввести в/в аміодарон
c. Негайна дефібриляція
d. Ввести в/в епінефрин
e. Ввести в/в атропін

11. Чоловік віком 60 років скаржиться на головокружіння, загальну слабкість, оніміння правої верхньої кінцівки. Об'єктивно спостерігається: асиметрія обличчя, слабкість правої руки, порушення мовлення. Який тест необхідно провести для оцінки ймовірного інсульту в пацієнта?

- a. GCS
b. APGAR
c. FAST
d. MARCH
e. AVPU

12. Жінка віком 63 роки доставлена до приймального відділення після ураження блискавкою. Під час огляду: свідомість ясна, шкіра рожева, суха, зовнішніх ушкоджень немає, але спостерігається ціаноз губ, акроціаноз. АТ - 150/90 мм рт. ст., пульс 104/хв, ЧД - 18/хв. До якого відділення необхідно шпиталізувати пацієнтку?

- a. Кардіологічного
b. Реанімаційного
c. Опікового
d. Виписати додому
e. Неврологічного

13. На хімічному підприємстві під час техногенної катастрофи відбулося руйнування ємності з токсичною речовиною. Для найефективнішого надання допомоги найбільшій кількості потерпілих використовується система медичного сортування "START". Що передбачає ця система насамперед?

- a. Оцінку самостійного дихання і спонтанного кровообігу

- b. Оцінку рівня свідомості та психічного стану
- c. Заповнення реєстраційних форм про надзвичайну ситуацію
- d. Зупинку кровотечі потерпілим, які цього потребують
- e. Оцінку можливості самостійно пересуватися**

14. У чоловіка під час прийому їжі раптово розвинулися напад кашлю, задишка, ціаноз шкірних покривів, втрата свідомості. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Стороннє тіло дихальних шляхів**
- b. Інфаркт міокарда
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Пневмоторакс
- e. Інфаркт легені

15. Після спортивної травми потерпілий скаржиться на біль у ділянці основи носа. Пальпація виявила чутливість стінок носових ходів і рухомість носових кісток. Носові ходи виповнені кров'яними згустками. Яка невідкладна допомога?

- a. Транспортування до клініки
- b. Холод на ділянку носа, дренаж гематоми носової перегородки (за необхідності), контроль болю**
- c. Холод на ділянку носа
- d. Тампонада носових ходів
- e. Репозиція уламків, контроль болю

16. Укажіть дозування епінефрину під час проведення реанімаційних заходів новонародженому.

- a. 0,1-0,3 мг/кг
- b. 0,01-0,03 мкг/кг
- c. Від 1 до 3 мг/кг розчину 1:1000
- d. 0,01 до 0,03 мг/кг**
- e. 0,5-1,0 мл

17. Який препарат необхідно ввести пацієнту в разі отруєння опіоїдами?

- a. Натрію гідрокарбонат
- b. Налоксон**
- c. Флумазеніл
- d. Кофеїн
- e. Кальцію глюконат

18. У жінки віком 40 років, на 25 тиждень вагітності, раптово погіршився стан із втратою свідомості. Констатовано зупинку кровообігу та дихання. З анамнезу: гіпертонічна хвороба. Що може сприяти ефективній серцево-легеневій реанімації в цій ситуації?

- a. Залишити пацієнтку горизонтально з валиком під лопатками
- b. Підняти головний кінець на 30° для кращого доступу
- c. Повернути тулуб вагітної жінки на правий бік
- d. Відтиснути ручним способом вагітну матку ліворуч**
- e. Підняти нижні кінцівки для централізації кровообігу

19. На місці ДТП - чоловік віком 35 років, без свідомості, пульс на сонних артеріях не визначається, зіниці широкі, самостійно перестав дихати за кілька хвилин до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Клінічна смерть**
- b. Агонія
- c. Біологічна смерть
- d. Термінальна пауза
- e. Преагонія

20. Через який проміжок часу можна припинити реанімаційні заходи трирічній дитині у зв'язку з їх неефективністю?

- a. 3-5 хв

b. 10-15 хв

c. 30-45 хв

d. 5-10 хв

e. 20-25 хв

21. Що застосовують для лікування пацієнтів із бронхоспазмом, які зазнали токсичного впливу хлору?

a. Магнію сульфат у формі спрею

b. Аерозольні бронходилататори

c. Киснево-гелієві суміші

d. Седативні препарати

e. Гірчичники

22. У дитини на ЕКГ-мониторі зареєстровано шлуночкову тахікардію без пульсу. Яку першочергову дію має виконати лікар під час СЛР у цій ситуації?

a. Проведення дефібриляції енергією 1Дж/кг

b. Проведення кардіоверсії енергією 1 Дж/кг

c. Проведення кардіоверсії енергією 4 Дж/кг

d. Проведення дефібриляції енергією 8 Дж/кг

e. Проведення дефібриляції енергією 4 Дж/кг

23. У чоловіка віком 23 роки після ДТП виявлено переломом правої стегнової кістки в середній третині. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги наклав тракційну шину Дітеріхса. З якою метою лікар здійснив цю маніпуляцію?

a. Зменшення больових відчуттів у потерпілого

b. Попередження травмування судин, нервів та м'яких тканин

c. Щоб кінцівка не заважала при транспортуванні

d. З метою відновлення фізіологічного положення кінцівки

e. Попередження жирової емболії кістковим мозком

24. Унаслідок вибуху на хімічному заводі є загиблі та поранені, понад 50 осіб з опіками, механічними травмами та отруєннями. Укажіть основні елементи, які передбачає лікувально-евакуаційне забезпечення населення у цьому разі.

a. Надання медичної допомоги, евакуацію, ізоляцію

b. Сорткування, відновлення, рятування

c. Сорткування, надання медичної допомоги, евакуацію

d. Сорткування, евакуацію, лікування

e. Ізоляцію, рятування, відновлення

25. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги прибула на виклик з приводу утоплення 5 осіб, що евакуювалися за допомогою катера. У 3 із них виникло утоплення та була проведена успішна серцево-легенева реанімація. Із наявних симптомів: виражена задишка у стані спокою, ціаноз, пінисте мокротиння та загальна слабкість. Який вид утоплення виник у пацієнтів?

a. Гіпервентиляційний

b. Справжній

c. Блідий

d. Синкопальний

e. Асфіктичний

26. Який "золотий стандарт" діагностики ТЕЛА?

a. УЗД серця

b. Спірографію

c. Комп'ютерна томографічна ангіографія

d. Рентгеноскопія органів грудної клітки

e. Бронхоскопію

27. Під час медичного сорткування виявлено, що потерпілий не може самотійно пересуватися, не співпрацює з медичним персоналом, дезорієнтований, ЧД - 30/хв, пульс на периферіях визначається. До якої сортувальної групи належить пацієнт?

- a. Чорної
- b. Фіолетової
- c. Червоної
- d. Жовтої
- e. Зеленої

28. Пацієнт доставлений до приймального відділення лікарні без свідомості. Під час огляду виявлено: за шкалою ком Глазго - 4 бали з відсутністю реакції на подразники, широкими зіницями та вираженим пригніченням дихання. Які першочергові дії має виконати лікар у цьому разі?

- a. Потрійний прийом Сафара
- b. Допоміжна вентиляція мішком "Амбу"
- c. Трахеотомія
- d. Інтубація трахеї та ШВЛ
- e. Конікотомія

29. Які критерії включає алгоритм START при сортуванні постраждалих під час масових надходжень?

- a. Стан притомності, наявність та частота дихання, стан перфузії, результати інструментальних досліджень
- b. Стан притомності, наявність та частота дихання, стан перфузії
- c. Швидкий огляд потерпілого, результати лабораторних та інструментальних досліджень
- d. Стан притомності, стан перфузії, результати лабораторних досліджень
- e. Стан притомності, наявність та частота дихання, стан перфузії, результати лабораторних досліджень

30. Який алгоритм первинного огляду потерпілого використовується на місці ДТП?

- a. Шкала AVPU
- b. CABCDE
- c. Шкала ком Глазго
- d. Шкала APACHE
- e. Шкала SOFA

31. При обстеженні пацієнтки віком 24 роки зі скаргами на ниючий біль у животі, загальну слабкість, запаморочення та сонливість з'ясували, що загальний стан задовільний, основні показники життєдіяльності в межах норми. Згідно зі збором анамнезу за схемою SAMPLE, відомо про скарги, відсутність алергії, постійний прийом медикаментів (фолієвої кислоти), останній прийом їжі - 3 год тому, причина виникнення болю в животі невідома. Які додаткові опитування необхідно провести для повноцінного збору анамнезу за шкалою SAMPLE?

- a. З'ясувати місце роботи пацієнтки та вплив шкідливих факторів
- b. З'ясувати, чи вона не є вагітною, виявити супутні (перенесені) захворювання, травми
- c. З'ясувати, коли було останнє вживання їжі або напоїв
- d. Зібрати інфекційний анамнез дитячого віку
- e. Зібрати загальний алергологічний анамнез

32. Які ознаки характерні для гіперкаліємії та реєструється на ЕКГ-моніторі при краш-синдромі?

- a. Бігеменія, відсутність Р-хвиль, наявність пікових Т-хвиль
- b. Вузькі комплекси QRS (більш ніж 0,12 с), відсутність Р-хвиль, наявність пікових Т-хвиль
- c. Випадіння комплексів QRS, наявність пікових Т-хвиль
- d. Вузькі комплекси QRS (більш ніж 0,12 с), надшлуночкові екстрасистоли, тахікардія
- e. Широки комплекси QRS (більш ніж 0,12 с), відсутність Р-хвиль, наявність пікових Т-хвиль

33. Укажіть вид травми, яка включає декілька пошкоджень у межах однієї анатомо-функціональної ділянки.

- a. Комбінована
- b. Множинна
- c. Поєднана
- d. Ізольована

е. Травматизм

34. Жінку віком 45 років шпиталізовано до лікарні після ДТП. Об'єктивно спостерігається: свідомість - ступор, пульс - 66/хв, АТ - 160/90 мм рт. ст., анізокорія, мимовільні рухи в лівих кінцівках обмежені. Сухожильні рефлексy S>D, симптом Бабінського ліворуч, ригідність м'язів потилиці, позитивний симптом Керніга. На краніограмах - перелом правої тім'яної кістки, ліквор - із домішками крові. Який вид черепно-мозкової травми у пацієнта?

- a. Струс головного мозку
- b. Дифузне аксональне ураження головного мозку

c. Забій головного мозку

- d. Стиснення головного мозку
- e. Забій м'яких тканин голови

35. Хлопчика, що хворіє на цукровий діабет протягом 10 років, шпиталізовано у зв'язку зі швидким погіршенням стану: загальна слабкість, поліурія, полідипсія, нудота, блювання, загальмованість, сонливість. Спостерігається: дихання Куссмауля, запах ацетону у видихнутому повітрі. У сечі наявна значна кількість цукру та кетонів. Яке ускладнення цукрового діабету, найімовірніше, виникло у пацієнта?

- a. Печінкова кома
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Гіпоглікемічна кома
- d. Лактоацидотична кома

e. Кетоацидотична кома

36. Який основний патогенетичний механізм розвитку шоку в дітей?

- a. Коагулопатія
- b. Гіповолемія

c. Порушення перфузії тканин

- d. Зниження скоротливості міокарда
- e. Травма

37. У десятирічного хлопчика із діагнозом: бронхіальна астма з інтермітуючим перебігом, відзначається напад задухи середнього ступеня тяжкості. Якому препарату слід надати перевагу на початковому етапі невідкладної терапії?

- a. Норадреналіну
- b. Фліксотиду
- c. Адреналіну

d. Сальбутамолу

e. Інталу

38. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано дитину віком 14 років із масою тіла 48 кг у непритомному стані із судомами, що тривають. Забезпечено прохідність дихальних шляхів та внутрішньовенний доступ. Яку максимальну разову внутрішньовенну дозу діазепаму необхідно призначити дитині в цьому разі?

- a. 12 мг
- b. 10 мг
- c. 24 мг
- d. 5 мг
- e. Діазепам можна застосовувати тільки після 16 років

39. Який антидот необхідно застосувати під час отруєння грибами, що містять фалотідини і аманітини (бліда поганка)?

- a. Натрію тіосульфат
- b. Атропін
- c. Налоксон
- d. Прозерин

e. Бензилпеніцилін

40. Яку функцію виконує лідер бригади, що першою прибула на місце події з масовим

ураженням людей?

- a. Відповідального за транспорт
- b. Відповідального за розгортання медичного пункту
- c. Відповідального за вчасне прибуття додаткових служб
- d. Медичного координатора**
- e. Сортувальника

41. Укажіть критичне раннє ускладнення краш-синдрому.

- a. Гіперкаліємія**
- b. Ниркова недостатність
- c. Коагулопатія
- d. Поліорганна недостатність
- e. Сепсис

42. У жінки віком 27 років із синдромом подовженого інтервалу QT виник пароксизм шлуночкової тахікардії типу пірует. Який препарат необхідно ввести у цьому разі?

- a. Ізопреналін
- b. Аміодарон, прокаїнамід
- c. Магнію сульфат**
- d. Лідокаїн
- e. Метопролол

43. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 43 роки з діагнозом: перелом правої стегнової кістки. Із анамнезу відомо: пацієнтка впродовж 3-х місяців приймає варфарин 5 мг/добу. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 15 балів, ЧД - 18/хв, SpO₂ - 98% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 3 л/хв, АТ - 135/90 мм рт. ст., ЧСС - 106/хв, Hb - 90г/л, еритроцити - $2,8 \cdot 10^{12}/л$, МНО - 3,5, ПТІ - 40%. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- a. Вітамін К, концентрат протромбінового комплексу**
- b. Тромбоконцентрат, транексамова кислота 3 г/добу
- c. Транексамова кислота 3 г/добу
- d. Транексамова кислота 2 г/добу, кальцію хлорид 1000 мг
- e. Транексамова кислота 2 г/добу, трансфузія еритроцитарного компоненту крові

44. Який показник не враховується під час оцінки стану за шкалою Апгар?

- a. Частота скорочень серця
- b. М'язовий тонус

c. Температура тіла

- d. Стан зовнішнього дихання
- e. Колір шкіри

45. Чоловік віком 37 років під час їжі раптово підвівся на ноги схопившись за шию. У нього розвинулися напад кашлю та задишка, ціаноз шкірних покривів. Діагностовано стороннє тіло дихальних шляхів. Яку невідкладну допомогу потрібно надати пацієнтові у цьому разі?

- a. Штучна вентиляція легень
- b. Закритий масаж серця

c. Прийом Геймліха

- d. Потрійний прийом Сафара
- e. Прекардіальний удар

46. Пацієнтці після зупинки кровообігу проводиться серцево-легенева реанімація, після виконання електричної дефібриляції на ЕКГ-моніторі з'явилися ознаки відновлення синусового ритму, проте пульсація на сонних та стегнових артеріях відсутні. Які подальші дії має виконати лікар?

- a. Припинити реанімаційну акцію
- b. Ввести в/в 1 мг адреналіну
- c. Продовжити масаж серця та штучну вентиляцію легень**
- d. Ретельно виміряти артеріальний тиск

е. Повторити розряд дефібрилятора

47. Як розрахувати ЦПР (центральный перфузійний тиск) при закритій черепномозковій травмі?

- а. ЦПТ = середній артеріальний тиск + 1/2 пульсового
- б. ЦПТ = діастолічний тиск - внутрішньочеревний тиск
- с. ЦПТ = систолічний тиск + 1/2 пульсового
- д. ЦПТ = систолічний тиск + 1/3 пульсового

е. ЦПТ = середній артеріальний тиск - внутрішньочеревний тиск

48. Чоловік віком 40 років під час споживання шашлику раптово вибіг із-за столу, почав метушитися обхоплювати себе руками за шию. На запитання присутніх відповісти нічого не може, при вдиху відзначається інспіраторна задишка. Друзі розпочали проводити прийоми Геймліха, однак звільнити дихальні шляхи від стороннього тіла не вдалося. Потерпілий різко зблід, почав втрачати свідомість. Яка подальша тактика?

- а. Негайно провести інтубацію трахеї
- б. Негайно ввести ларингеальну маску

с. Негайно провести конікотомію

- д. Дістати стороннє тіло пальцями
- е. Негайно провести трахеостомію

49. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує пацієнта з гострим коронарним синдромом. Лікар раптово помітив, що пацієнт не реагує на подразники. На ЕКГ-моніторі ритм, який може дати пульс. Укажіть першочергові дії лікаря?

а. Ввести гліцерил тринітрат 0,4 мг сублінгвально

б. Перевірити пульс на сонній артерії

с. Розпочати інфузійну терапію

д. Ввести 1 мг адреналіну в/в

е. Провести негайну дефібриляцію

50. Дитина через 30 хвилин після початку гри в теніс раптово втратила свідомість. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий діабет, тяжка форма. Об'єктивно спостерігається: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Пульс - 80/хв, ритмічний. АТ - 110/70 мм рт. ст. ЧД - 28/хв, ритмічне. Менінгеальні симптоми відсутні. Який патологічний стан виник у дитини?

- а. Лактацидотична кома
- б. Діабетична кетоацидотична кома
- с. Гіперглікемічна кома

д. Гіпоглікемічна кома

е. Діабетична гіперосмолярна кома

51. Пацієнту під час серцево-легеневої реанімації проведено інтубацію трахеї. Яким стане співвідношення компресій та штучних вдихів?

а. Кожну 6-ту секунду, асинхронно

б. 5:1

с. 30:2

д. 15:2

е. 3:1

52. Потерпілий на підприємстві отримав термічний опік II ступеня тяжкості, уражено 20% поверхні тіла. Госпіталізація на який рівень надання комбустіологічної допомоги показана?

а. На третій рівень

б. На другий рівень

с. -

д. Амбулаторне лікування під наглядом лікаря-хірурга або лікаря-комбустіолога

е. На перший рівень

53. Під час проведення СЛР у дитини 8 років, якою буде енергія першого розряду для дефібриляції у разі наявності на моніторі фібриляції шлуночків або шлуночкової тахікардії без пульсу?

а. 0,5 Дж/кг

b. 2 Дж/кг

c. 4 Дж/кг

d. 6 Дж/кг

e. 1 Дж/кг

54. У пацієнта діагностовано раптову зупинку кровообігу. Свідомість відсутня, дихання не визначається, пульс на сонній артерії не пальпується. На ЕКГ реєструються нерегулярні, неоднакової форми та амплітуди хвилі. Комплекс QRS, сегмент ST і зубець T не розпізнаються. Яку першочергову дію має виконати лікар під час СЛР у цій ситуації?

a. Електричну дефібриляцію

b. Внутрішньовенне введення атропіну

c. Внутрішньовенне введення адреналіну

d. Зовнішній масаж серця

e. Відновлення прохідності дихальних шляхів

55. У шестимісячної дитини під час огляду спостерігається: виражена дихальна недостатність, синюшний носогубний трикутник у спокої, значні виділення з носа, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Дитина неспокійна, плаче, спостерігалось апное протягом 4 с. Сатурація - 87%, ЧД - 40/хв, допоміжна участь мускулатури в акті дихання. Яка тактика лікаря в цьому разі?

a. Постановка носових канюль, налагодження подачі кисню

b. Забезпечення нейтрального положення голови, подача кисню через маску

c. Санація ВДШ, налагодження подачі кисню

d. негайно ввести парацетамол для зняття жару

e. Помістити дитину під кисневий ковпак

56. Під час проведення розширених реанімаційних заходів у пацієнта визначалося п'ять дефібриляційних ритмів поспіль. Яке дозування аміодарону необхідно ввести після п'ятої послідовної дефібриляції?

a. 600 мг в/в

b. 450 мг в/в

c. 900 мг в/в

d. 300 мг в/в

e. 150 мг в/в

57. Який діапазон балів за шкалою ком Глазго необхідний для постановки діагнозу: кома?

a. 0-2

b. 10-15

c. 9-10

d. 0

e. 3-8

58. До жінки віком 57 років викликали бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Зранку, на тлі повного благополуччя, виник сильний біль в правій половині грудної клітки, з'явилась задишка. Об'єктивно спостерігається: ЧД - 30/хв, грудна клітка - асиметрична, перкуторно - тимпаніт праворуч, аускультативно - відсутність дихальних шумів з правого боку. Із анамнезу відомо, що 5 років тому лікувався з приводу туберкульозу легень. Який патологічний стан виник у пацієнта?

a. Відкритий пневмоторакс

b. Забій грудної клітки

c. Гострий інфекційний плеврит

d. Патологічний перелом ребра праворуч

e. Спонтанний пневмоторакс

59. Унаслідок техногенної ядерної катастрофи, доставлено чоловіка 40 років до відділення інтенсивної терапії. У чоловіка скарги на помірно виражений головний біль, запаморочення, однократна блювота. Об'єктивно у потерпілого: ясна свідомість, орієнтується у місці та часі, шкіра звичайного кольору, пульс - 80/хв, тони серця звучні, АТ - 120/80 мм рт. ст.,

аускультативно - дихання везикулярне, температура тіла - 36,2^oC. Дані індивідуального дозиметру дорівнюють 1,2 Гр. Встановіть попередній діагноз?

- a. Гостра променева хвороба IV ступеня тяжкості
- b. Гостра променева хвороба I ступеня тяжкості**
- c. Гостра променева хвороба V ступеня тяжкості
- d. Гостра променева хвороба II ступеня тяжкості
- e. Гостра променева хвороба III ступеня тяжкості

60. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 32 роки. Діагностовано: закритий перелом правого і лівого стегна, розрив селезінки. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 16/хв, SpO₂ - 98% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 112/хв, Hb - 40г/л, еритроцити - 1,6г/л. Планується проведення масивної трансфузії компонентів крові. Який об'єм компонентів крові необхідно ввести потерпілому на ранньому госпітальному етапі?

- a. Заміна 25% об'єму циркулюючої крові за 3-4 год
- b. Заміна 50% об'єму циркулюючої крові за 3-4 год**
- c. Трансфузія 2 одиниць за 1 год
- d. Трансфузія 5 одиниць протягом 24 год
- e. Заміна 20% об'єму циркулюючої крові за 3-4 год

61. Під час медичного сортування у потерпілого при обстеженні визначено стан свідомості за шкалою ком Глазго - 8 балів, пульс на периферійних судинах відсутній. До якої сортувальної групи слід перевести потерпілого?

- a. Фіолетової
- b. Жовтої
- c. Зеленої
- d. Чорної
- e. Червоної**

62. Жінці віком 47 років зворотною причиною раптової зупинки серця є гіпоксія. Які дії має виконати лікар для усунення цього патологічного стану?

- a. Забезпечити оксигенотерапію 100%-им киснем 15 л/хв за допомогою назальних канюль
- b. Вентилювати за показниками капнографа, дотримуючись 35-45 мм рт. ст.
- c. Відновити прохідність дихальних шляхів складним надгортанним пристроєм або інтубація, вентилювати на кожну 5 с, під'єднати 100%-ий кисень**
- d. Відновити прохідність дихальних шляхів орофарингеальною трубкою, вентилювати на кожну 15 с, під'єднати 100%-ий кисень
- e. Забезпечити оксигенотерапію 100%-им киснем 15 л/хв за допомогою нереверсивної маски

63. До потерпілого внаслідок електротравми викликано бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Під час огляду спостерігається: пацієнт непритомний, самостійне дихання та пульс відсутні. негайно розпочато проведення серцево-легеневої реанімації. На кардіомоніторі - фібриляція шлуночків. Проведено 2 дефібриляції. Під час третьої переоцінки ритму - фібриляція шлуночків. Якою буде подальша тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- a. Продовжувати серцево-легеневу реанімацію
- b. Епінефрин 1 мг в/в, аміодарон 600 мг в/в
- c. Електрична дефібриляція, епінефрин 1 мг в/в, аміодарон 300 мг в/в**
- d. Електрична дефібриляція і продовження серцево-легеневої реанімації
- e. Епінефрин 1 мг в/в, електрична кардіоверсія

64. Які показники включає трикутник педіатричної оцінки?

- a. Зовнішній вигляд, дихання, кровообіг**
- b. Свідомість, частота серцевих скорочень, артеріальний тиск
- c. Свідомість, частота серцевих скорочень, колір шкіри
- d. Частота серцевих скорочень, дихання, колір шкіри
- e. Артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, колір шкіри

65. У чоловіка віком 46 років на ЕКГ-моніторі діагностована фібриляція шлуночків. Які

першочергові реанімаційні заходи необхідно надати пацієнту?

- a. Введення епінефрину гідрохлориду
- b. Введення аміодарону
- c. Електричну дефібриляцію**
- d. Введення допаміну
- e. Введення лідокаїну гідрохлориду

66. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує чоловіка віком 42 роки до лікарні, який з метою суїциду випив 50 г хлорофосу, розвівши його в склянці з водою. Стан пацієнта різко погіршився: виникла брадикардія - 42/хв, слинотеча, слюзотеча, над легенями вологі поодинокі різнокаліберні хрипи. Який лікарський засіб необхідно застосувати, щоб стабілізувати стан пацієнта?

- a. Хлористий кальцій 10%
- b. Фізіологічний розчин 0,9%
- c. Еуфілін 2,4%
- d. Атропін сульфат 0,1%**
- e. Епінефрину 0,1%

67. Пацієнт знаходиться в стані клінічної смерті, на ЕКГ-моніторингу визначається фібриляція шлуночків. Укажіть, який антиаритмічний засіб і після якої неуспішної спроби дефібриляції доречно застосувати.

- a. Метопролол, після другої неефективної спроби
- b. Аміодарон, після третьої неефективної спроби**
- c. Лідокаїн, після першої неефективної спроби
- d. Метопролол, після третьої неефективної спроби
- e. Аміодарон, після першої неефективної спроби

68. Який відсоток кисню необхідно дати пацієнту під час проведення серцево-легеневої реанімації?

- a. Максимально можливий відсоток кисню**
- b. Вентилювати необхідно атмосферним повітрям
- c. 40% кисню
- d. 50% кисню
- e. 80% кисню

69. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 59 років. Діагностовано: правобічний гемоторакс (1000 мл), закритий перелом правого стегна. Геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 15 балів, ЧД - 26/хв, SpO₂ - 95% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 6 л/хв, АТ - 90/55 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв, Hb - 65г/л, еритроцити - $2,1 \cdot 10^{12}/л$. Яке співвідношення компонентів крові необхідно ввести потерпілому на ранньому госпітальному етапі?

- a. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 1:3
- b. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 3:1
- c. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 1:1**
- d. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 2:2
- e. Еритроцитарний компонент крові та плазма свіжозаморожена у співвідношенні 1:2

70. Який патологічний тип дихання розвивається у пацієнтів під час діабетичної (кетоацидотичної) коми?

- a. Чейн-Стокса
- b. Брадипное
- c. Біота
- d. Тахіпное
- e. Куссмауля**

71. Який об'єм інфузійної терапії кристалоїдами необхідно ввести дитині під час анафілаксії?

- a. 30 мл/кг
- b. 50 мл/кг

с. 500-1000 мл

d. 10 мл/кг

е. 100 мл/кг

72. Чоловік віком 78 років доставлений бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги у відділення реанімації та інтенсивної терапії через 30 хвилин після раптового виникнення порушення мовлення та слабкості у правій верхній та нижній кінцівках. Під час огляду виявлено параліч та гіперестезію правої сторони, позитивний симптом Бабінського праворуч, нерозбірливе мовлення. На комп'ютерній томографії голови показує гіперденсивність лівої середньої мозкової артерії та відсутність ознак внутрішньочерепної кровотечі. Стан пацієнта швидко покращується після початку фармакотерапії, а слабкість повністю зникає. Який із нижченаведених препаратів, найімовірніше, був застосований?

a. Альтеплаза

b. Ривароксабан

с. Празугрель

d. Варфарин

е. Гепарин

73. Хлопчик народився в стані важкої асфіксії. ЧСС - 80/хв, дихання аритмічне, поодинокі дихальні рухи, дифузний ціаноз шкіри, знижений тонус м'язів. Лікар вирішив приступити до реанімаційних заходів. Яке положення повинна займати голова новонародженої дитини під час надання первинних реанімаційних заходів?

a. Голова сильно закинута назад

b. Голова повернута вправо

с. Голова нахилена вперед

d. Голова повернута вліво

е. Голова злегка закинута назад

74. Жінка віком 27 років годину тому послизнулася на вулиці і впала лівим боком на бордюр. Самостійно прийшла додому, але стан погіршувався і чоловік викликав бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Під час огляду лікаря пацієнтка притомна, шкірні покриви бліді, вологі, холодні. Пульс на променевій артерії не визначається. АТ - 80/40 мм рт. ст. ЧСС - 120/хв. Дихання везикулярне над усією поверхнею грудної клітки. ЧД - 18/хв. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

a. Забій грудної клітки

b. Внутрішня кровотеча, геморагічний шок

с. Закрита черепно-мозкова травма

d. Спонтанний пневмоторакс

е. Перелом тазу

75. До відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні звернулися батьки із п'ятирічною дитиною зі скаргами на раптове погіршення її стану. При огляді дитини: ЧСС - 196/хв, АТ - 70/35 мм рт. ст., аускультативно - над легеньми дихання везикулярне, без хрипів, сатурація - 93%, свідомість пригнічена (13 балів за шкалою ком Глазго), комплекси QRS на ЕКГ регулярні, тривалістю 0,06 с. З чого розпочати лікування дитини?

a. В/в введення аміодарону

b. Вагусних маневрів

с. Електричної кардіоверсії

d. В/в введення сульфату магнію

е. В/в введення верапамілу

76. Під час виконання протоколу розширених заходів реанімації, один із рятувальників помітив різке підняття PetCO₂. Про що це може свідчити ?

a. Відновлення спонтанного кровообігу

b. Зміщення інкубаційної трубки в правий бронх

с. Некоректне проведення вентиляції

d. Неефективне проведення компресій грудної клітки

е. Прогностично неблагоприємна ознака з відновлення спонтанного кровообігу

77. Укажіть складники, що входять до алгоритму збору анамнезу SAMPLE)

- a. Симптоми, алергія, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- b. Симптоми, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- c. Алергія, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища
- d. Симптоми, алергія, прийом ліків, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини
- e. Симптоми, алергія, попередня історія хвороб, останнє споживання їжі/рідини, фактори зовнішнього середовища

78. У чоловіка віком 85 років раптово з'явився біль у грудній клітці, задишка, покашлювання. Об'єктивно спостерігається: здуття шийних вен, у легенях визначається коробковий перкуторний звук, у нижніх відділах з правого боку - притуплення, акцент II тону над легеневою артерією. На обох ногах - варикозна хвороба вен нижніх кінцівок. У нижній третині стегна правої ноги припухлість, відзначається локальна гіперемія. Рентгенографічно: у нижній частині правої легені - затемнення. Яке ускладнення, найбільш вірогідно, виникло у пацієнта?

- a. Астматичний стан
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Інфаркт міокарда
- d. Пневмонія
- e. Пневмоторакс

79. Чоловіка віком 35 років після травми грудної клітки шпиталізовано у тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: порушення свідомості, АТ - 80/40 мм рт. ст., пульс аритмічний 100-120/хв, тони серця не прослуховуються, ціаноз, аускультативно дихання ліворуч відсутнє, наявна асиметрія грудної клітки, тимпаніт, девіація трахеї вправо. Який патологічний стан у пацієнта?

- a. Напружений пневмоторакс ліворуч
- b. Гемоторакс ліворуч
- c. Забій головного мозку
- d. Інфаркт міокарда
- e. Перелом груднини

80. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 37 років. Діагностовано: правобічний гемоторакс (крововтрата - 1000 мл), закритий перелом лівої стегнової кістки, травматичний шок II ст. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 28/хв, SpO₂ - 94% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 8 л/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 116/хв, Hb - 70г/л, еритроцити - $2,2 \cdot 10^{12}/л$. Що повинна включати інтенсивна терапія контролю пошкоджень?

- a. Профілактика синдрому жирової емболії
- b. Профілактика й усунення летальної тріади
- c. Профілактика венозного тромбоемболізму
- d. Профілактика гіпертермії і метаболічного алкалозу
- e. Профілактика гіпертермії, гіперкоагуляції та алкалозу

81. У жінки віком 46 років, незважаючи на проведену дезінтоксикаційну терапію з приводу отруєння етиленгліколем, уже другу добу спостерігаються: анурія, добовий діурез <50 мл, пастозність обличчя, калій плазми крові - 7,5 ммоль/л, наявні екстрасистолі на ЕКГ. Який із методів еферентної терапії буде ефективним по щодо елімінації калію з плазми?

- a. Перфузійний
- b. Діалізний
- c. Гравітаційний
- d. Фільтраційний
- e. Сорбційний

82. Чоловіку віком 67 років проводяться розширені реанімаційні заходи. Із анамнезу відомо, що пацієнт проходить сеанси гемодіалізу. Рівень калію в плазмі крові становить 7 ммоль/л. Який

препарат та в якому дозуванні необхідно ввести пацієнту з кардіопротективною дією?

- a. Аміодарон 150 мг
- b. Кальцію глюконат 10% 30 мл
- c. Лідокаїн 1 мг/кг в/в
- d. Магнію сульфат 2 г в/в
- e. Адреналін 0,1% 1 мл в/в

83. Чоловіку віком 49 років із відновленням спонтанного кровообігу, у якого зворотною причиною раптової зупинки кровообігу була гіповолемія, проводиться інфузійна терапія. При повторному огляді аускультативно - вологі хрипи, частота дихання - 4 за 10 сек, синусова тахікардія на моніторі, АТ - 80/40 мм рт. ст. Які подальші дії в наданні допомоги цьому пацієнту?

- a. Ввести норадреналін в/в
- b. Інгаляційно дати сальбутамол
- c. Ввести препарати нітрогліцерину
- d. Припинити проведення інфузійної терапії
- e. Зменшити дозу інфузії

84. Які дії насамперед має виконати лікар пацієнту із зареєстрованою на ЕКГ асистолією?

- a. Введення кортикостероїдів
- b. Інфузію поліглюкіну
- c. Закритий масаж серця
- d. Введення β -адреноблокаторів
- e. Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрію

85. Які ліки є альтернативними, за неможливості ввести аміодарон, при фібриляції шлуночків, під час проведення розширених реанімаційних заходів?

- a. Норадреналін
- b. Новокаїнамід
- c. Дигоксин
- d. Лідокаїн
- e. Соталол

86. У чоловіка з цукровим діабетом поступово з'явилися почуття голоду, загальна слабкість, гіпергідроз, психомоторне збудження, втрата свідомості. АТ - 130/80 мм рт. ст., тахікардія. Яке лабораторне дослідження необхідно першочергово провести у цьому разі?

- a. Загальний аналіз крові
- b. Загальний аналіз сечі
- c. Комп'ютерна томографія головного мозку
- d. Визначення вмісту глюкози крові
- e. Люмбальна пункція

87. Які ритми належать до недефібриляційних при зупинці кровообігу в педіатрії відносяться?

- a. Асистолія, безпульсова електрична активність, фібриляція шлуночків
- b. Асистолія, безпульсова електрична активність, брадикардія <60/хв
- c. Фібриляція шлуночків, фібриляція предсердь
- d. Фібриляція шлуночків, безпульсова шлуночкова тахікардія
- e. Асистолія, безпульсова шлуночкова тахікардія, брадикардія <60/хв

88. Чоловік віком 52 роки лікується амбулаторно з приводу негоспітальної пневмонії. На фоні нападу кашлю виник біль у грудній клітці ліворуч. Об'єктивно спостерігається: АТ - 130/90 мм рт. ст., пульс - 90/хв. Під час аускультатії відсутні дихальні шуми з лівого боку. З анамнезу відомо, що у пацієнта часті пневмонії. Який патологічний стан призвів до погіршення стану пацієнта?

- a. Розрив абсцесу легені
- b. Ятрогенний пневмоторакс
- c. Спонтанний (вторинний) пневмоторакс
- d. Перелом ребер з лівого боку

е. Посттравматичний пневмоторакс

89. У п'ятирічної дитини діагностовано анафілаксію. Яку дозу епінефрину необхідно ввести пацієнтці?

- a. 300 мкг в/м
- b. 200 мкг в/м
- c. 150 мкг в/м
- d. 100 мкг в/м
- e. 500 мкг в/м

90. У дворічної дитини після отруєння таблетками "від мігрені" визначається загальмованість, брадикардія, А-V блокада, артеріальна гіпотензія, бронхоспазм. Який препарат необхідно призначити пацієнтці для лікування?

- a. Серцеві глікозиди
- b. Норадреналін
- c. Допамін
- d. Атропіну сульфат
- e. Добутамін

91. Одинадцятирічна дівчинка спекотної погоди раптово поскаржилася на слабкість, пульсуючий головний біль, нудоту, було однократне блювання. Об'єктивно спостерігається: кінцівки теплі, гіперемія обличчя, рясне потовиділення та порушення координації, пульс до 100/хв, ритмічний, температура тіла - 38^oC. Яка оптимальна тактика екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- a. Фізичні методи охолодження
- b. Парацетамол в/в+ібупрофен+фізичні методи
- c. Метамізол натрію в/м
- d. Ібупрофен 200 мг всередину одноразово
- e. Парацетамол в/в крапельно

92. У жінки віком 52 роки, яка хворіє на епілепсію, розвинувся великий судомний напад тривалістю 2 хв. Через 3 хв після нападу свідомість не відновилася, виникли повторні тоніко-клонічні судоми. Яка тактика надання допомоги на догоспітальному етапі?

- a. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія, діазепам 0,3 мг/кг в/в
- b. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія, пропофол 1,5мг/кг в/в
- c. Пульсоксиметрія, тіопентал натрію 5 мг/кг в/в
- d. Забезпечити прохідність дихальних шляхів, оксигенотерапія, кетамін 2 мг/кг в/в
- e. Оцінити перфузію, діазепам 0,1 мг/кг в/в

93. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 34 роки. Діагностовано: розрив селезінки (крововтрата - 2000 мл). Геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 20/хв, SpO₂ - 95% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 7 л/хв, АТ - 70/40 мм рт. ст., ЧСС - 126/хв, Hb - 55г/л, еритроцити - 1,5г/л. У пацієнта: група крові В (III) Rh (-). На станції переливання крові еритроцитарних компонентів крові В (III) Rh (-) немає. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- a. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові АВ (IV) Rh (-)
- b. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові А (II) Rh (-)
- c. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові О (I) Rh (+), дексаметазон 8 мг
- d. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові О (I) Rh (-)
- e. Трансфузія еритроцитарних компонентів крові АВ (IV) Rh (+)

94. Яким антисептиком необхідно обробити ділянку навколо рани при пораненні?

- a. 90%-им розчином етилового спирту
- b. Розчином фурациліну
- c. Розчином перекису водню
- d. 40%-им розчином етилового спирту
- e. 70%-им розчином етилового спирту

95. За якою шкалою визначається стан свідомості пацієнта на догоспітальному етапі?

- a. SAMPLE
- b. AVPU**
- c. ATMIST
- d. TRAUMA
- e. ETHANE

96. Яке лікування суправентрикулярної тахікардії із нестабільною гемодинамікою у дітей?

- a. Негайна дефібриляція
- b. Ввести АТФ
- c. Ввести аміодарон
- d. Ввести допамін
- e. Негайна кардіоверсія**

97. У чоловіка віком 73 років на тлі гострого тромбофлебіту лівої стегнової вени з'явилися болі в правій половині грудної клітки, які посилюються при глибокому вдиху та кашлі, кровохаркання. Праворуч, у нижніх відділах, вислуховується шум тертя плеври. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Правосторонній пневмоторакс
- b. Правосторонній ексудативний плеврит
- c. Правосторонній сухий плеврит
- d. Тромбоемболія легеневої артерії**
- e. Пневмонія

98. Які показники визначають церебральний перфузійний тиск у дітей різних вікових груп?

- a. рН та рівень глюкози крові
- b. Рівень глюкози у крові та внутрішньочерепний тиск
- c. Рівень лактату крові та внутрішньочерепний тиск
- d. Рівень калію та глюкози крові
- e. Середній артеріальний тиск та внутрішньочерепний тиск**

99. Пацієнту віком 72 роки констатовано раптову зупинку кровообігу та розпочато розширені реанімаційні заходи. Більше 40 хвилин реанімаційних заходів у пацієнта спостерігається стійка асистолія, усі зворотні причини раптової зупинки кровообігу виключені. Показник CO₂ нижче 10 мм рт. ст. Визначте подальшу тактику бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- a. Проведення дефібриляції 120 Дж
- b. Проведення електричної кардіоверсії
- c. Переривання реанімаційних заходів на декілька хвилин
- d. Припинення реанімаційних заходів**
- e. Проведення реанімаційних заходів упродовж 40 хв, зважаючи на стійку асистолію

100. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 42 роки. Діагностовано: розрив селезінки (крововтрата - 2000 мл), закритий перелом лівої стегнової кістки, геморагічний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 13 балів, ЧД - 22/хв, SpO₂ - 95% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 70/50 мм рт. ст., ЧСС - 126/хв, Hb - 55г/л, еритроцити - $1,5 \cdot 10^{12}/л$, МНО - 1,8, ПТІ - 60%, фібриноген - 1г/л. Яка тактика лікаря на ранньому госпітальному етапі?

- a. Концентрат протромбінового комплексу, транексамова кислота 3 г/добу
- b. Кріопреципітат 4 дози, транексамова кислота 3 г/добу
- c. Транексамова кислота 3 г/добу, плазма свіжозаморожена
- d. Трансфузія свіжозамороженої плазми
- e. Проведення трансфузії донорської крові**

101. У семирічної дитини спостерігається виражена слабкість, млявість, бліді шкірні покриви, набряки на нижніх кінцівках. Раптово втратила свідомість. Дихання спонтанне, ЧД - 18/хв, на ЕКГ-моніторі брадикардія з елевацією зубця Т. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Гіперкаліємія**
- b. Гіпоглікемія

- c. Гіперкальціємія
- d. Гіпокаліємія
- e. Гіперглікемія

102. У пацієнта після зупинки кровообігу проводять серцево-легеневу реанімацію. Під час накладання електродів дефібрилятора на ЕКГ-мониторі визначаються широкі комплекси QRS із частотою 20-30/хв, що не супроводжується наявністю пульсацій сонних та стегнових артерій. Які подальші дії має виконати лікар?

- a. Припинити реанімаційні заходи
- b. Ввести в/в 500 мкг атропіну сульфату
- c. Ввести в/в 300 мг аміодарону
- d. Продовжити СЛР та якнайшвидше ввести в/в 1мг епінефрину
- e. Виконати електричну дефібриляцію

103. Новонароджена дівчинка від других передчасних пологів, із гестаційним віком 33-34 тижні, масою тіла 2000 г. Об'єктивно спостерігається: дихання відсутнє, ЧСС - 60/хв, виражений генералізований ціаноз, на подразники не реагує, реакція зіниць на світло слабо виражена. Які дії насамперед має виконати лікар?

- a. Розпочати інфузійну терапію
- b. Забезпечити тепловий режим
- c. Оцінити за шкалою Апгар
- d. Провести тактильну стимуляцію
- e. Розпочати реанімаційні заходи

104. У жінки віком 35 років шпиталізованої до приймального відділення, раптово виникла зупинка серцевої діяльності. На ЕКГ-мониторі реєструється фібриляція шлуночків. негайно розпочато дефібриляцію. Укажіть силу першого розряду дефібрилятора.

- a. 360 Дж біфазним дефібрилятором
- b. 250 Дж біфазним дефібрилятором
- c. 150 Дж монофазним дефібрилятором
- d. 200 Дж біфазним дефібрилятором
- e. 150 Дж біфазним дефібрилятором

105. Із чого починається серцево-легенева реанімація у пацієнтів з обструкцією дихальних шляхів стороннім тілом на догоспітальному етапі?

- a. Абдомінальних поштовхів
- b. 5-ти рятівних вдихів
- c. Огляду ротової порожнини
- d. Компресій
- e. Вентиляцій

106. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги прибула на місце ДТП. У водія одного з транспортних засобів виявлено садно на шиї та патологічне викривлення шийного відділу хребта. Виражена болючість у місці ураження. Яку допомогу потрібно надати потерпілому?

- a. Утримуючи руками голову потерпілого, витягнути з автомобіля та покласти на носі в кареті екстреної (швидкої) медичної допомоги
- b. Пропальпувати місце ураження та переконатися, чи немає крепітації, перед транспортуванням до лікувального закладу
- c. Накласти жорсткий шийний комірці відповідного розміру та помістити потерпілого на тверду поверхню в положенні на спині
- d. Знеболити місце ураження, допомогти потерпілому вийти з автомобіля та лягти на носі
- e. Положити потерпілого на тверді носі, зафіксувати ремнями та доправити каретою екстреної (швидкої) медичної допомоги до лікувального закладу

107. Укажіть обсяг допомоги при черепно-мозковій травмі на догоспітальному етапі.

- a. Призначення діуретиків
- b. Підтримання САТ на рівні 100 мм рт. ст. у молодих пацієнтів та 110 мм рт. ст. у пацієнтів похилого віку, сатурації не менше 90%, капнографії в межах 35-40 мм рт. ст.

- с. Транспортування пацієнта на жорстких ношах із піднятим ножним кінцем
- д. Підтримання темпу діурезу не менше ніж 150 мл на год
- е. Інфузійна терапія - 20 мл/кг/год

108. Під час транспортування пацієнта віком 50 років із болем за грудниною на кардіомоніторі з'явився такий ритм: шлуночкова тахікардія. Яку дію повинен виконати медичний працівник?

- а. Перевірити пульс на сонній артерії за відсутності, провести синхронізовану кардіоверсію з енергією розряду 150 Дж
- б. Провести дефібриляцію 200 Дж
- с. Перевірити пульс на сонній артерії за відсутності, провести дефібриляцію розрядом 150 Дж
- д. Перевірити пульс на сонній артерії за відсутності, провести дефібриляцію розрядом, передбаченим мануалом дефібрилятора
- е. Провести дефібриляцію 150 Дж

109. У пацієнта після пункції і катетеризації підключичної вени значно погіршився загальний стан. Об'єктивно: задишка, SpO₂ - 78%, ЧСС - 120/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., діагностований напружений пневмоторакс на боці пункції. Які невідкладні дії має виконати лікар?

- а. Інтубацію трахеї, оксигенотерапію
- б. Провести пункцію і дренування плевральної порожнини на боці пневмотораксу
- с. Негайно перевести пацієнта на ШВЛ
- д. Оксигенотерапію
- е. Негайно перевести пацієнта на ШВЛ і розпочати інфузію норадреналіну

110. У пацієнта на ЕКГ-моніторі зареєстровано фібриляцію шлуночків та негайно проведено дефібриляцію розрядом 150 Дж. Які подальші дії лікаря?

- а. Виконати прекардіальний удар
- б. Оцінити ритм та перевірити пульс
- с. Негайно ввести 1 мг адреналіну в/в
- д. Негайно розпочати СЛР 30:2
- е. Провести повторну дефібриляцію 200 Дж без перерви

111. До травмованого внаслідок ДТП водія викликали бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Об'єктивно спостерігається: крепітація кісткових фрагментів II-V ребер, шкіра обличчя - ціанотична, виражена емфізема на шиї та обличчі, вени на шиї напружені, дихання з лівого боку не вислуховується, тони серця - приглушені, АТ - 140/80 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- а. Перелом ребер і закритий пневмоторакс
- б. Відкритий пневмоторакс
- с. Закритий пневмоторакс
- д. Гемоторакс
- е. Перелом груднини

112. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 24 роки. Діагностовано: перелом кісток тазу, закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок II ступеня. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 20/хв, SpO₂ - 96% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 6 л/хв, АТ - 85/55 мм рт. ст., ЧСС - 106/хв, Hb - 75г/л, еритроцити - $2,3 \cdot 10^{12}/л$. Які компоненти інтенсивної терапії контролю пошкоджень є доцільними на ранньому госпітальному етапі?

- а. Активне зігрівання потерпілого, інфузійна терапія, раннє використання компонентів крові, рання корекція коагулопатії
- б. Ліберальний режим інфузійної терапії
- с. Максимально швидка зупинка кровотечі, кінцева хірургічна корекція пошкоджень
- д. Ліберальний режим інфузійної терапії, максимально швидка зупинка кровотечі, кінцева хірургічна корекція пошкоджень
- е. Ліберальний режим інфузійно-трансфузійної терапії

113. У пацієнта віком 36 років множинні переломи ребер, гостра дихальна недостатність. Під час проведення інтубації трахеї та переходу на штучну вентиляцію легень спостерігається

збільшення ціанозу, зниження артеріального тиску. Яка причина виникнення цього стану?

- a. Ішемічний інсульт
- b. Гіпертонічний криз
- c. Напружений пневмоторакс
- d. Пневмонія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

114. Працівник меблевої фабрики, працюючи за столярним станком, через необережність отримав різану рану плеча в середній третині із сильною кровотечею. Колега накладає турнікет з метою зупинки кровотечі. Яке правильне місце накладання турнікета в цьому разі?

- a. Нижче за рану на 5-7 см при знятому одязі
- b. Безпосередньо над радою, що кровить
- c. Максимально високо на плечі
- d. На 5-7 см вище ніж рана при знятому одязі
- e. У середній третині плеча

115. Пацієнт віком 27 років отримав сильний удар кермом автомобіля в живіт. Скаржиться на біль у ділянці пупка. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда та волога. АТ - 90/50 мм рт. ст., пульс - 120/хв. Який найімовірніший діагноз?

- a. Стиснення внутрішніх органів
- b. Розрив порожнистих органів, перитоніт
- c. Забій передньої черевної стінки
- d. Забій грудної клітки, перелом ребер
- e. Геморагічний шок, внутрішня кровотеча

116. Що є альтернативним лікарським засобом аміодарону при протипоказах до його застосування?

- a. Магнію сульфат
- b. Прокаїнамід
- c. Дигоксин
- d. Лідокаїн
- e. Метапролол

117. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано жінку віком 64 років. Із анамнезу відомо: 20 хв. тому раптово втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 8 балів, лівобічна геміплегія, ЧД - 7/хв, SpO₂ - 85% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 8 л/хв, АТ - 160/110 мм рт. ст., ЧСС - 102/хв. Планується проведення комп'ютерної томографії головного мозку. Які першочергові заходи необхідно провести на ранньому госпітальному етапі?

- a. Інтубацію трахеї, респіраторну підтримку, транспортування для проведення нейровізуалізації
- b. Негайне транспортування пацієнтки для проведення нейровізуалізації
- c. Стабілізацію стану впродовж 48 годин
- d. Оксигенотерапію, транспортування для проведення нейровізуалізації
- e. Встановлення ларингеальної маски, ШВЛ мішком Амбу, транспортування для проведення нейровізуалізації

118. У пацієнта із травмою грудної клітки проводиться апаратна ШВЛ. На манометрі реєструється збільшення тиску на вдиху до 50 см вод. ст. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Немає приводів для хвилювань, це нормальні параметри для вентиляції на етапі транспортування
- b. Прогресування черепно-мозкової травми
- c. Розвиток пневмотораксу
- d. Розвиток геморагічного шоку
- e. Розвиток внутрішньочеревної кровотечі

119. До відділення інтенсивної терапії шпиталізовано пацієнта віком 62 роки. Діагностовано:

розрив печінки (крововтрата - 1500 мл), закритий перелом обох кісток лівої гомілки. Об'єктивно спостерігається: свідомість за ШКГ - 14 балів, ЧД - 20/хв, SpO₂ - 96% при самостійному диханні з інсуфляцією кисню зі швидкістю потоку 5 л/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., ЧСС - 116/хв, Hb - 60г/л, еритроцити - $2,0 \cdot 10^{12}$ /л, МНО - 1,2, ПТІ - 80%, фібриноген - 0,8 г/л. Чим повинна бути доповнена гемостатична терапія?

а. Тромбоконцентрат

б. Кріопреципітат

с. Концентрат протромбінового комплексу

д. Транексамова кислота 3 г/добу

е. Транексамова кислота 2 г/добу

120. У жінки віком 25 років після укусу бджоли через 20 хвилин розвинувся анафілактичний шок. Який препарат необхідно ввести насамперед?

а. Епінефрин

б. Дексаметазон

с. Фамотидин

д. Норепінефрин

е. Димедрол

121. П'ятирічна дитина під час прийому їжі несподівано закашлялася, з'явилося утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: періодичний кашель, утруднений видих, відставання грудної клітки в акті дихання. Аускультативно вислуховується послаблене дихання над легеньми праворуч, перкуторно - тимпаніт, рентгенологічно - зміщення органів середостіння вліво. Який метод лікування необхідно виконати пацієнту?

а. Трахеотомія

б. Торакотомія

с. Езофагоскопія

д. Бронхоскопія, видалення стороннього тіла

е. Протинабрякові ендоларингеальні інгаляції

122. Яка кількість балів за шкалою ком Глазго необхідна для постановки діагнозу: кома І?

а. 15

б. 10

с. 1

д. 8

е. 3

123. У жінки віком 52 роки після успішних реанімаційних заходів ЧСС - 36/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст. Що необхідно призначити пацієнтці насамперед?

а. Ввести в/в 150 мг аміодарону

б. Атропіну сульфат в/в у дозі 500 мкг

с. Налагодити в/в інфузію адреналіну

д. Ввести в/в 20 мг дексаметазону

е. Ретельний електрокардіографічний моніторинг

124. У відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги надійшла дворічна дівчинка. Діагностовано раптову зупинку кровообігу, розпочато реанімаційні заходи та грудні компресії. Визначте правильну глибину натискання на грудну клітку пацієнта, враховуючи вікові особливості.

а. 1/4 передньо-заднього розміру грудної клітки

б. 1/3 передньо-заднього розміру грудної клітки

с. 1/5 передньо-заднього розміру грудної клітки

д. 1/6 передньо-заднього розміру грудної клітки

е. 1/2 передньо-заднього розміру грудної клітки

125. При проведенні розширених реанімаційних заходів на ЕКГ-моніторі виявлено ритм, який може дати пульс. При оцінці: пульс на центральній артерії наявний, збігається з монітором, ЧСС - 140/хв, самостійне дихання відсутнє, SpO₂ - не визначається. Які наступні дії має

виконати лікар?

- a. Подати кисень 100% через носові канюлі
- b. Вентиляція мішком АМБУ 1 раз на кожні 5 с**
- c. Екстубувати пацієнта
- d. Подати 100% кисень через нереверсивну маску
- e. Відновити прохідність дихальних шляхів орофарингеальним повітроводом

126. Який критерій оцінки периферичної перфузії при проведенні медичного сортування за алгоритмом START дозволяє зарахувати постраждалого до "червоної" категорії?

- a. >2 с**
- b. <2 с
- c. >10 с
- d. >30 с
- e. >5 с

127. Які ознаки вказують на наявність у потерпілого напруженого пневмотораксу?

- a. Розвиток підшкірної емфіземи
- b. Біль у грудній клітці, тахікардія
- c. Блискавично наростаюча задишка, порушення гемодинаміки, відхилення трахеї вбік**
- d. Виділення кров'янистого кольору пухирців повітря з рани
- e. Ослаблення везикулярного дихання на стороні ураження

128. Який стан не належить до зворотних причин смерті?

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Напружений пневмоторакс
- c. Гіпоксія
- d. Внутрішньомозковий крововилив у стовбур головного мозку**
- e. Гіпокаліємія

129. Де проводиться перший етап медичного сортування?

- a. Безпосередньо на місці виникнення надзвичайної ситуації
- b. Під час транспортування до лікувального закладу
- c. На місці завантаження до евакуаційного транспорту
- d. У приймальному відділенні лікувального закладу
- e. Поряд з місцем виникнення надзвичайної ситуації, але на безпечній відстані від дії її факторів ураження**

130. Семирічна дитина після перегріву на сонці пірнула у морську воду. Її витягнули з води через 4 хв. Шкіра бліда, самостійне дихання відсутнє, пульс на сонній артерії не визначається. Які невідкладні дії у цьому разі?

- a. Розпочати серцево-легеневу реанімацію**
- b. Виконати прекардіальний удар
- c. Знайти рятувальника на пляжі
- d. Покликати батьків
- e. Викликати екстрену (швидку) медичну допомогу

131. У жінки віком 30 років, що надійшла до приймального відділення, раптово виникла зупинка серцевої діяльності. Медичною бригадою розпочато серцево-легеневу реанімацію, що триває 20 хв. Назвіть об'єктивну причину для припинення реанімаційних заходів.

- a. Перелом ребер та груднини
- b. Ціаноз шкіри верхніх кінцівок
- c. Ціаноз шкіри нижніх кінцівок
- d. Поява ознак біологічної смерті**
- e. Аспірація вмістом шлунка

132. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги приїхала на місце ДТП. Під час оцінки місця подій помічають потерпілого з деформованим передпліччям. До якої категорії за системою медичного сортування належить цей пацієнт?

- a. Жовтої

- b. Червоної
- c. Зеленої
- d. Чорної
- e. Фіолетової

133. До відділення невідкладної допомоги дитячої лікарні звернулися батьки із п'ятирічною дитиною зі скаргами на раптове погіршення її стану. При огляді дитини: ЧСС - 196/хв, АТ - 100/55 мм рт. ст., аускультативно над легенями дихання везикулярне, без хрипів, сатурація 97%, свідомість ясна, комплекси QRS на ЕКГ регулярні, тривалістю 0,06 с. Вагусні маневри - без успіху. Яким повинен бути наступний крок у лікуванні дитини?

- a. В/в введення аміодарону
- b. Електрична кардіоверсія
- c. В/в введення верапамілу
- d. В/в введення аденозину
- e. В/в введення сульфату магнію

134. Під час обробки плодівих дерев у промислових садах інсектицидами у багатьох працівників одночасно з'явилися скарги на виражену загальну слабкість, запаморочення, нудоту, блювоту та появу надсадного кашлю. З чого необхідно розпочати надання невідкладної медичної допомоги в осередку ураження?

- a. Застосувати метод START та попросити легкоуражених відійти до майданчика призначеного для "зелених" пацієнтів
- b. Провести первинний огляд (ABCDE), роздягнути пацієнта для проведення огляду
- c. Одягнути спеціальний захисний костюм або відповідні засоби індивідуального захисту
- d. -
- e. Визначити зону для проведення медичного сортування медичними працівниками

135. У пацієнта віком 57 років, який лікувався в стаціонарі з приводу інфаркту міокарда, виникла зупинка серця. Після проведення реанімаційних заходів у пацієнта з'явився пульс, артеріальний тиск - 60/20 мм рт. ст. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту для подальшої стабілізації стану?

- a. Продовжити болюсне введення адреналіну
- b. Серцеві глікозиди
- c. Інфузію глюкокортикостероїдів
- d. Інфузію допаміну
- e. Гемотрансфузію

136. Десятирічній дитині з важким загостренням бронхіальної астми призначили системний глюкокортикостероїд. Яку дозу преднізолону необхідно призначити пацієнту?

- a. 70 мг
- b. 35 мг
- c. 30 мг
- d. 140 мг
- e. 40 мг

137. У пацієнта діагностовано раптову зупинку кровообігу. Свідомість відсутня, дихання не визначається, пульс на сонній артерії не пальпується. На ЕКГ реєструються нерегулярні, неоднакової форми та амплітуди хвилі. Комплекс QRS, сегмент ST і зубець T не розпізнаються. Яке порушення серцевого ритму в цього пацієнта?

- a. Фібриляція передсердь без пульсу
- b. АВ-блокада без пульсу
- c. Фібриляція шлуночків
- d. Шлуночкова тахікардія без пульсу
- e. Безпульсова електрична активність

138. Під час якого патологічного стану знижується ефективність введеного епінефрину гідрохлорид для відновлення серцевої діяльності?

- a. Кислотно-лужний стан не має значення

b. Гіпоксії

c. Метаболічного ацидозу

d. Респіраторного алкалозу

e. Метаболічного алкалозу

139. Чоловік унаслідок ДТП отримав проникаюче поранення грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: неспокійний, наявний виражений акроціаноз, задишка, дихання поверхневе, прискорене, АТ - 100/60 мм рт. ст. Виявлено під час огляду обмеження рухливості ураженої половини грудної клітки. Як необхідно транспортувати пацієнта з цією патологією?

a. Лежачи на спині з піднятою верхньою частиною тулуба

b. Лежачи на животі з опущеними ногами

c. Лежачи на боці з піднятою верхньою частиною тулуба

d. Лежачи на спині з піднятими ногами

e. Транспортування протипоказане

140. Яка кількість балів за шкалою ком Глазго необхідна для постановки діагнозу: смерть мозку?

a. 6

b. 0

c. 1

d. 2

e. 3

141. У палаті інтенсивної терапії проводять реанімаційні заходи восьмирічній дитині з масою тіла 30 кг. На кардіомоніторі - ознаки фібриляції шлуночків серця. Якою має бути енергія першого розряду дефібрилятора?

a. 2 Дж /кг = 60 Дж

b. 200 Дж

c. 8 Дж /кг = 240 Дж

d. 4 Дж /кг = 120 Дж

e. 1 Дж /кг = 30 Дж

142. Чоловік віком 36 років отримав травму голови, відомо що втрачав свідомість на 5-10 хв. На момент огляду скарги на нудоту, блювання, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: розсіяна мікровогнищева неврологічна симптоматика, наявні забої м'яких тканин голови. Який метод обстеження необхідно виконати пацієнту для встановлення діагнозу?

a. Ангіографію судин головного мозку

b. Рентгенографію черепа

c. Ехоенцефалографію

d. Електроенцефалографію

e. Комп'ютерну томографію головного мозку

143. Яке твердження є правильним щодо потерпілих третьої сортувальної групи?

a. Мають найвищий пріоритет, наявні ресурси ЗОЗ повинні бути першочергово спрямовані на надання медичної допомоги цій групі

b. Надається необхідна медична допомога після пацієнтів/потерпілих II та IV категорії

c. Надається медична допомога в останню чергу

d. Надається медична допомога в необхідному об'ємі після надання допомоги потерпілим II категорії

e. Надається медична допомога в необхідному об'ємі після надання допомоги потерпілим I категорії

144. У дівчини віком 21 рік на відпочинку після укусу бджоли через 5 хв посилюється біль у ділянці укусу. Загальний стан різко погіршився: виникло відчуття нестачі повітря, жару, запаморочення, шум у вухах. Спостерігається: блідість шкіри, акроціаноз, холодний липкий піт по тілу, артеріальний тиск - 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у дівчини?

a. Непритомність

b. Анафілактичний шок

- c. Гіперглікемічна кома
- d. Гіпоглікемічна кома
- e. Гостре порушення мозкового кровообігу

145. Унаслідок ДТП водій отримав проникаючу травму грудної клітки. Візуалізується рана, через яку проходить повітря під час вдиху та видиху. Загальний стан потерпілого тяжкий, аускультативно - дихальні шуми на стороні поранення відсутні. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Клапанний, напружений пневмоторакс
- b. Спонтанний пневмоторакс
- c. Гемоторакс
- d. Відкритий пневмоторакс
- e. Закритий пневмоторакс

146. Диспетчер скерував бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги до місцевого нафтопереробного підприємства, звідки надійшло повідомлення про вибух паливного резервуару та численних потерпілих. Прибувши на місце виклику, працівники бригади виявили 18 потерпілих осіб із травмами різного ступеня тяжкості. Згідно з яким алгоритмом необхідно провести медичне сортування потерпілих?

- a. JumpSTART
- b. ABCDE
- c. CABCADE
- d. START
- e. SAMPLE

147. При проведенні медичного сортування на місці дорожньо-транспортної пригоди, працівник бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, виявив 2-х "чорних" потерпілих, 2-х "червоних" та 1 "жовтого" потерпілого. Кого потрібно госпіталізувати в першу чергу?

- a. "Зелених"
- b. "Чорних"
- c. "Жовтих"
- d. "Білих"
- e. "Червоних"

148. Чоловіку віком 47 років, що постраждав унаслідок ДТП викликали бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги. Об'єктивно спостерігається: ЧД - 35/хв, права сторона грудної клітки участі в акті дихання не бере, вени шиї - розширені, аускультативно дихальні шуми праворуч не вислуховуються. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- a. Перелом ребер справа
- b. Гемопневмоторакс
- c. Відкритий пневмоторакс
- d. Забій грудної клітки, ускладнений емфіземою органів середостіння
- e. Напружений пневмоторакс

149. У пацієнта зі штучним водієм ритму в серці виникла зупинка кровообігу та необхідність у дефібриляції. На якій безпечній відстані від корпусу кардіостимулятора потрібно розмістити електроди?

- a. Між електродами дефібрилятора та корпусом штучного водія ритму має бути відстань не менше ніж 5 см
- b. Один з електродів потрібно розмістити якнайближче до корпусу кардіостимулятора
- c. Один з електродів потрібно встановити безпосередньо над корпусом кардіостимулятора
- d. Між електродами дефібрилятора та корпусом штучного водія ритму має бути відстань не менше ніж 8 см
- e. Пацієнти із штучним водієм ритму не потребують електричної дефібриляції

150. Жінка віком 53 роки шпиталізована до реанімаційного відділення із симптомами гострого інфаркту міокарда, через 10 хв раптово виникла зупинка серцевої діяльності та дихання. негайно розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які подальші дії лікаря в цьому разі?

- a. Введення адреналіну 1 мг в/в
- b. Введення аміодарону 300 мг в/в
- c. Негайна дефібриляція
- d. Оцінка ЕКГ-ритму
- e. Визначення рівня глюкози крові