

1. Під час стоматоскопічного та антропометричного огляду чоловіка виявлено перевагу поздовжніх розмірів тіла над поперечними: довгі та тонкі кінцівки, довга та тонка шия, вузькі плечі, вузька та плоска грудна клітка, гострий епігастральний кут, крилоподібні лопатки, сутулість, тонка, суха і бліда шкіра, слабо розвинені м'язи та незначні жировідкладення. До якого типу тілобудови належить пацієнт (за Черноруцьким)?

- a. Астенічного
- b. Нормостенічного
- c. Атонічного
- d. Гіпостенічного
- e. Гіперстенічного

2. У пацієнта в анамнезі гостре порушення мозкового кровообігу. Об'єктивно виявлено: правобічний геміпарез. На досягнення якої цілі в довготривалому реабілітаційному періоді буде спрямовувати програму фізичний терапевт?

- a. Профілактика болю
- b. Профілактика виникнення контрактур
- c. Покращення самопочуття
- d. Удосконалення навичок самообслуговування
- e. Удосконалення дихальних рухів

3. У постінсультного пацієнта з геміпарезом за результатами мануально-м'язового тестування сила двоголового м'яза стегна становить 1 бал. Якому кваліфікатору МКФ для функцій організму відповідає зазначений показник сили м'язів?

- a. 3
- b. 1
- c. 0
- d. 2
- e. 4

4. Укажіть неврологічний рівень пошкодження спинного мозку, за якого прогностично пацієнт з ASIA A-B буде здатний до навчання ходьби за допомогою ортезів і милиць.

- a. L1-L2
- b. L2-L3
- c. L1-Th11
- d. S2-S4
- e. L4-S1

5. Які дії виконує фізичний терапевт при маніпуляційному втручанні "мануальна вібрація"?

- a. Вібрацію середньої частоти на грудну клітку під час видиху пацієнта
- b. Вібрацію низької частоти на грудну клітку під час вдиху пацієнта
- c. Вібрацію високої частоти на стінку грудної клітки під час видиху пацієнта
- d. Вібрацію низької частоти на стінку грудної клітки під час видиху пацієнта
- e. Вібрацію високої частоти на стінку грудної клітки під час вдиху пацієнта

6. Пацієнту віком 27 років, який хворіє на бронхіальну астму, сімейний лікар призначив 20 профілактичних сеансів переривчастої гіпоксичної терапії на стадії ремісії захворювання. Який очікуваний ефект дозованих інтервальних гіпоксичних тренувань сприятиме попередженню виникнення наступного загострення хвороби?

- a. Підвищення тонуусу гладеньких м'язів мікросудин
- b. Зниження тонуусу гладеньких м'язів бронхіол
- c. Зниження тонуусу гладеньких м'язів мікросудин
- d. Підвищення ефективності мукоциліарного кліренсу
- e. Підвищення тонуусу гладеньких м'язів бронхіол

7. Пацієнт скаржиться, що не може розігнути верхню кінцівку в ліктьовому, променево-зап'ястковому та п'ястково-фалангових суглобах, відвести великий палець, а також здійснити супінацію передпліччя та кисті. Який нерв, найімовірніше, пошкоджено?

- a. Присередній шкірний нерв передпліччя

- b. Ліктьовий
- c. Серединний
- d. Променевий**
- e. М'язово-шкірний

8. У пацієнта спостерігається розлад рухової функції верхньої кінцівки після геморагічного інсульту. Для оцінки якого показника використовують шкалу Ашфорта, шкалу оцінки інвалідизації та шкалу стійкості до пасивних рухів у цьому разі?

- a. Спастичності**
- b. Діапазону рухів
- c. Активності в повсякденному житті
- d. Точності та координованості рухів
- e. Сили м'язів

9. У чоловіка під час дослідження встановлено відсутність усіх видів чутливості на правій половині тіла. Який вид порушення чутливості спостерігається в пацієнта?

- a. Гіпестезія
- b. Парестезія
- c. Гіперестезія
- d. Каузалгія
- e. Анестезія**

10. Що дозволяє оцінити Бартел Індекс (BI) у пацієнтів, які перенесли інсульт?

- a. Тонус м'язів
- b. Рівень самообслуговування**
- c. Короткотривалу пам'ять
- d. Когнітивні функції
- e. Силу м'язів

11. Під час дослідження моделі ходи в пацієнта спостерігається втрата природного замаху руки та перетягування ураженої ноги півколом. Який це тип аномальної ходи?

- a. Атактичний
- b. Невропатичний
- c. Паркінсонічний
- d. Геміплегічний**
- e. Міопатичний

12. Укажіть метод фізичної терапії, який доцільно застосовувати при пневмонії з метою збільшення надходження антибіотиків до легеневої тканини.

- a. Інгаляції з морською сіллю
- b. Дихальні вправи**
- c. Спелеотерапія
- d. Точковий масаж
- e. Бальнеотерапія

13. Під час проведення аускультції над нижньою частиною легень не вислуховується дихання. Для якого захворювання це характерно?

- a. Муковісцидозу
- b. Ексудативного плевриту**
- c. Пневмонії
- d. Сухого плевриту
- e. Бронхоектатичної хвороби

14. До фізичного терапевта звернувся військовослужбовець після перелому правої великогомілкової кістки. Наразі права нижня кінцівка знерухомлена гіпсовою іммобілізацією до нижньої третини стегна. Які вправи можна призначити пацієнту?

- a. Ізотонічні вправи для м'язів гомілки
- b. Ізометричні вправи для м'язів гомілки**
- c. Пасивні вправи для гомілковостопного суглоба

- d. Пасивні вправи для колінного суглоба
- e. Активні динамічні вправи для колінного суглоба

15. Після родової травми в новонародженої дитини спостерігається: обмеження руху верхньої кінцівки, гіпорексія, м'язова атрофія. До якого виду рухових порушень належать ці зміни нервової системи?

- a. Порушення верхнього мотонейрона
- b. Пірамідальні порушення
- c. Порушення нижнього мотонейрона
- d. Міастенія
- e. Бульбарні розлади

16. Оберіть один зайвий пункт зі шкали повсякденної активності Бартел.

- a. Купання, одягання, користування туалетом, приймання їжі
- b. Приймання їжі, одягання, ходьба по сходах, біг по рівній поверхні
- c. Користування туалетом, ходьба по сходах, одягання та купання
- d. Приймання їжі, купання, вмивання, акт дефекації, сечопускання
- e. Приймання їжі, купання, вмивання, одягання

17. Під час обстеження виявлено, що пацієнт не може здійснити підшовне згинання стопи та пальців, але при цьому він може стояти на п'ятках, але не може стояти на пальцях. Який нерв, найімовірніше, пошкоджено?

- a. Задній шкірний нерв стегна
- b. Загальний маломілковий
- c. Великомілковий
- d. Бічний підшовний
- e. Сідничний

18. Фізичний терапевт проводить прийом пацієнтів, серед яких є особи з ознаками респіраторних захворювань. Він хоче мінімізувати ризик інфікування та дотримуватися правил індивідуального захисту. Який засіб індивідуального захисту він має обов'язково використовувати під час контакту з пацієнтом?

- a. Гумові чоботи та спеціальний ізоляційний костюм
- b. Респіратор або маску для захисту дихальних шляхів
- c. -
- d. Захисний екран або окуляри як єдиний засіб захисту
- e. Будь-який елемент захисту, який терапевт вважає достатнім

19. Який основний метод проведення інструктажу з правильного користування допоміжним засобом?

- a. Демонстрація
- b. Страхування
- c. Фасилітація
- d. Підбадьорювання
- e. Підтримка позитивного психоемоційного стану

20. Пацієнту віком 45 років встановлено діагноз: негоспітальна лівобічна нижньодольова пневмонія. Укажіть дренажне положення, яке буде сприяти відходженню мокротиння.

- a. На лівому боці з піднятим головним кінцем
- b. Зміна положення тіла не вплине на відходження мокротиння
- c. На правому боці з піднятим головним кінцем
- d. На правому боці з опущеним головним кінцем
- e. На лівому боці з опущеним головним кінцем

21. Пацієнтка віком 61 рік скаржиться фізичному терапевту на задишку під час ходьби, що змушує її зупинятися для відновлення дихання, після проходження дистанції до 100 м. Із анамнезу відомо, що 8 тижнів тому вона була виписана з кардіологічного стаціонару, де перебувала через інфаркт міокарда. Фізичний терапевт для оцінювання використав Шкалу вираженості задишки (modified Medical Research Council (mMRC), рекомендовану МОЗ України.

Яким є рівень задишки в цієї пацієнтки?

- a. 3
- b. 0
- c. 1
- d. 2
- e. 4

22. Пацієнт за призначенням фізичного терапевта виконує вправу "планка". Укажіть характерну особливість статичної роботи м'язів у цьому разі.

- a. Незначне напруження
- b. Значне напруження
- c. Відносно пізнє настання втоми
- d. Значне скорочення м'яза
- e. Наявне переміщення

23. Пацієнт із обмеженою рухливістю, який проходить реабілітацію після травми, перебуває на етапі відновлення ходьби. Під час одного з сеансів він починає відчувати невпевненість у рухах і може впасти. Як потрібно організувати процес, щоб уникнути падінь?

- a. Дозволити пацієнту рухатися без обмежень, щоб стимулювати його самостійність і впевненість
- b. Проводити заняття лише в присутності медичного персоналу, щоб мати додаткову підтримку за необхідності
- c. -
- d. Використовувати спеціальний пояс для страхування пацієнта під час ходьби, щоб знизити ризик падінь
- e. Страхувати пацієнта лише в кінці заняття, коли він наближається до завершення вправ

24. Як називається вільний у просторі рух, що виконується дистальним сегментом кінцівки?

- a. Вправа із закритим кінематичним ланцюгом
- b. Вправа з відкритим кінематичним ланцюгом
- c. Функціональна вправа
- d. Зворотна вправа
- e. Поступальна вправа

25. У дворічного хлопчика діагностовано периферичний параліч Дюшена-Ерба праворуч, зумовлений травматичним ураженням верхнього стовбура плечового сплетення. Під час об'єктивного обстеження пацієнта виявлено: значне зниження згинально-ліктьового та п'ястково-променевого рефлексів праворуч, розлади поверхневої чутливості на зовнішній поверхні плеча і передпліччя, болючість у надключичній ямці праворуч при натисканні. Які ще порушення спостерігатимуться в пацієнта?

- a. Приведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
- b. Відведення плеча та згинання в ліктьовому суглобі
- c. Приведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- d. Відведення плеча та розгинання в ліктьовому суглобі
- e. -

26. Пацієнт скаржиться на експіраторну задишку. Об'єктивно виявлено: чутно дистанційні хрипи, положення ортопное, лице набрякле, ціанотичне, допоміжна мускулатура грудної клітки бере участь в акті дихання. Грудна клітка збільшена, у стані максимального вдиху, екскурсія її різко зменшена. Під час пальпації грудна клітка ригідна, голосове тремтіння ослаблене по всіх полях. При порівняльній перкусії відчувається гучний коробковий перкуторний звук у всіх полях, при топографічній - екскурсія нижнього краю легень різко обмежена. Аускультативно: ослаблене везикулярне дихання з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи різної тональності (високі, низькі). Укажіть наявний синдром ураження системи дихання.

- a. Синдром пневмотораксу
- b. Синдром гідротораксу
- c. Синдром емфіземи

d. Синдром бронхоспазму

e. Синдром порожнини в легені

27. Для проведення реабілітації пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда необхідно оцінити толерантність до фізичного навантаження. Який діагностичний метод потрібно застосувати в цьому разі?

a. Плавання

b. Пульсоксиметрію

c. Пікфлоуметрію

d. Електрокардіографію

e. Велоергометрію

28. Укажіть найбільш ефективне положення для зменшення болю та полегшення екскурсії грудної клітки для пацієнта з плевритом на ліжковому режимі.

a. На хворому боці

b. На здоровому боці

c. На животі

d. Напівсидячи

e. На спині

29. Військовослужбовець віком 42 роки переніс вогнепальне поранення нижньої кінцівки, що спричинило обмеження в пересуванні. Після виписки з лікарні він мав розпочати курс фізичної терапії, але зіткнувся з труднощами. Реабілітаційний центр розташований за 10 км від його місця проживання, а чоловік не має власного транспорту. Громадський транспорт у його районі відсутній, а таксі коштує дорого. Водночас він мотивований до реабілітації та має високий рівень фізичної витривалості. Який із нижченаведених аспектів є "фактором середовища" (e) за МКФ, що впливає на реабілітацію пацієнта?

a. Обмеження рухів у суглобі

b. Відсутність доступного громадського транспорту

c. Його фізична витривалість

d. Рівень мотивації до реабілітації

e. Больовий синдром у нозі

30. Фізичний терапевт працює у клініці з високим навантаженням. Через нестачу персоналу він змушений часто залишатися після зміни, пропускати перерви та відчуває емоційне виснаження. Останнім часом у нього знизилася концентрація, з'явилися проблеми зі сном і дратівливість. Який підхід найбільш ефективно сприятиме його психологічній безпеці?

a. Оптимізація робочого графіка з поступовим упровадженням чітких меж між роботою та відпочинком, включаючи раціональне планування перерв

b. Формування стійкості до стресу шляхом прийняття високого темпу роботи як неминучого професійного виклику без надмірного фокусування на власному самопочутті

c. Використання стратегій емоційного дистанціювання у взаємодії з пацієнтами та колегами для зниження психологічного навантаження

d. Посилена концентрація на виконанні професійних обов'язків із максимальним залученням у робочий процес, що сприятиме підтримці дисципліни та ефективності

e. -

31. Яке положення потрібно надати суглобу під час оцінки пасивних додаткових рухів?

a. Анатомічне

b. Щільно укладене

c. Нещільно укладене

d. Індивідуальне

e. Вимушене

32. Під час огляду фізичний терапевт оцінює амплітуду рухів у груднинно-ключичному суглобі пацієнта. Навколо якої вісі можливе піднімання та опускання ключиці?

a. Вертикальної

b. Горизонтальної

с. Фронтальної

d. Сагітальної

е. Поперечної

33. Під час оцінювання рівня спастичності двоголового м'яза плеча за шкалою Ашфорта фізичний терапевт відчуває опір м'яза протягом усього руху, але пасивний рух виконано в повній амплітуді. Якою кількістю балів за шкалою Ашфорта можна оцінити спастичність м'яза в цьому разі?

a. 4

b. 1

c. 2

d. 3

е. 0

34. У постінсультного пацієнта з помірним лівобічним геміпарезом у післягострий період реабілітації спостерігається порушення селективного рухового контролю, згинальна синергія в руці, розгинальна - у нозі, спастичність м'язів 2-3 бали за шкалою Ашфорта. Який із тестів є оптимальним для оцінювання сили м'язів нижніх кінцівок пацієнта з урахуванням зазначених проявів?

a. Моторний контроль вертикалізації

b. Мануальний м'язовий тест

c. Тест 4-ох квадратного кроку

d. Тест 6-и хвилинної ходьби

е. Time Up and Go Test

35. Укажіть метод функціональної діагностики, що досліджує електричні потенціали, які виникають в міокарді з їх подальшим графічним зображенням.

a. Полікардіографія

b. Фонокардіографія

c. Електрокардіографія

d. Ехокардіографія

е. Ультразвукове дослідження серця

36. Який із нижченаведених варіантів відповідей характеризує фізичні вправи у відкритому кінематичному ланцюгу?

a. Більш вільний та швидкий рух, але менша стабільність

b. Збільшення компресійних сил стосовно сил зсуву

c. Залучення в роботу м'язів - агоністів, синергістів та антагоністів

d. Відтворення функціональних схем рухів

е. Багатосуглобові вправи із залученням декількох м'язових груп

37. Оберіть мобілізаційний прийом, який використовується при згинальній контрактурі в променево-зап'ястковому суглобі, з урахуванням правила опуклості-вгнутості.

a. -

b. Ковзання вниз

c. Ковзання латерально

d. Ковзання медіально

е. Ковзання вгору

38. Пацієнт скаржиться на змішану задишку. Об'єктивно виявлено: тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та згладженість міжреберних проміжків на цьому боці. У нижньому відділі цього боку грудної клітки під час пальпації не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється притуплений звук, а при топографічній - обмеження рухомості нижнього краю легені. Під час аускультії над зоною притуплення перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє, а вище цієї зони - ослаблене. Який наявний синдром ураження системи дихання?

a. Синдром гідротораксу

b. Синдром порожнини в легені

- c. Синдром емфіземи
- d. Синдром пневмотораксу
- e. Синдром бронхообструкції

39. Пацієнту віком 37 років встановлено діагноз: повне ушкодження спинного мозку на рівні T5. Під час занять у ліжку раптово почервонів та поскаржився на різкий головний біль і серцебиття, розпливчатість перед очима, сильну пітливість. Під час обстеження артеріальний тиск становив 185/100 мм рт. ст. Які дії повинен здійснити фізичний терапевт як домедичну допомогу в цьому разі?

- a. Виконати з пацієнтом дихальну гімнастику та повідомити лікаря
- b. Залишити пацієнта в положенні лежачи без подушки та повідомити лікаря
- c. Вдягнути на ноги еластичні панчохи та стискальний корсет на живіт
- d. Швидко забезпечити доступ свіжого повітря та повідомити лікаря
- e. Надати пацієнту положення сидячи та повідомити лікаря

40. У чоловіка віком 68 років - геморагічний інсульт, бал за шкалою ком Глазго - 8. Який із заходів фізичної терапії застосовують у перші 4 дні в реанімаційному відділенні?

- a. Дренажні положення та динамічні вправи
- b. Позиціонування та активні вправи
- c. Активні дихальні вправи
- d. Позиціонування та пасивні вправи
- e. Активні динамічні вправи

41. Постінсультному пацієнту діагностовано: лівобічний геміпарез, виражений у руці, помірний у нозі. Після обстеження ерготерапевтом верхньої кінцівки пацієнту призначено такі втручання: компресійний одяг, електростимуляцію, тривале виконання пасивних рухів у підвищеному положенні, підняття кінцівки під час відпочинку. Про наявність якого ускладнення паретичної кінцівки свідчать призначені втручання?

- a. Спастичності
- b. Болю
- c. Контрактури
- d. набряку
- e. сублюксації

42. Фізичний терапевт вимірює амплітуду рухів у надп'яtkово-гомiлковому суглобі пацієнта. Навколо якої вісі відбувається згинання та розгинання стопи із загальним обсягом до 60-70°?

- a. Фронтальної
- b. Поперечної
- c. Поздовжньої
- d. Сагітальної
- e. Горизонтальної

43. Пацієнт з тяжкою травмою головного мозку в післягострому періоді реабілітації самостійно не переміщується, є ризик аспірації. Який з варіантів позиціонування після приймання їжі доцільно обрати в цьому разі?

- a. Напівлежачи на спині з піднятим узголів'ям ліжка принаймні на 30-45°
- b. Напівлежачи на животі
- c. Латеральне або бокове положення лежачи
- d. Лежачи на спині
- e. -

44. Пацієнт віком 69 років за 6 місяців після ендопротезування правого колінного суглоба перебуває на довготривалій реабілітації. Який тест доцільно застосувати фізичному терапевту для оцінки швидкості ходьби?

- a. Тест "Встань та йди"
- b. Тест Філіпса
- c. Тест Ласега
- d. 10-метровий тест ходьби

е. 6-хвилинний тест ходьби

45. Фізичний терапевт проводить обстеження колінного суглоба пацієнта з підозрою на пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки. Пацієнт лежить на спині, коліно зігнуте під кутом приблизно 30° . Фізичний терапевт однією рукою стабілізує стегно, а іншою намагається змістити великогомілкову кістку вперед. Який тест використовується в цьому разі для оцінки надмірного зміщення великогомілкової кістки?

- a. Тест Патріка
- b. Тест МакМюррея
- c. Тест передньої висувної шухлядки
- d. Тест Х'юстона
- e. Тест Лахмана

46. Чоловік віком 46 роки з індексом маси тіла - $30,2 \text{ кг/м}^2$ скаржиться на зниження фізичної та розумової працездатності. Професійна діяльність пов'язана з роботою за комп'ютером. Інші скарги відсутні. Вправи якої спрямованості та інтенсивності доцільно рекомендувати пацієнту?

- a. Аеробні, помірної інтенсивності
- b. Анаеробні, субмаксимальної інтенсивності
- c. Аеробні, субмаксимальної інтенсивності
- d. Анаеробні, помірної інтенсивності
- e. Анаеробні, великої інтенсивності

47. Пацієнт віком 45 років скаржиться фізичному терапевту на біль у спині та обмеження рухів у грудному відділі хребта. В анамнезі: травма спини 5 років тому. Для оцінки рухливості хребта фізичний терапевт вирішив провести тест Отта. Під час виконання тесту фізичний терапевт відзначив нормальну рухливість хребта. На скільки сантиметрів збільшується відстань під час виконання тесту Отта при нормальній рухливості хребта?

- a. 1-2
- b. 3,5-5
- c. 7-10
- d. 0,5-3
- e. 8-9,5

48. У пацієнта віком 48 років - лівобічний гонартроз 2 ступеня, пошкодження медіального меніска лівого колінного суглоба. Виразений больовий синдром. Який метод обстеження дозволить визначити обсяг активних рухів у пошкодженному суглобі?

- a. Рентгенографія
- b. Комп'ютерна томографія
- c. Гоніометрія
- d. Мануально-м'язове тестування
- e. Пальпація

49. Після поранення в ділянці пахвової ямки пацієнт відчуває труднощі з розгинанням і приведенням плеча до тулуба, а також обертанням його досередини. Який м'яз ушкоджено в пацієнта?

- a. Великий круглий
- b. Дельтоподібний
- c. Двоголовий м'яз плеча
- d. Триголовий м'яз плеча
- e. Надостъовий

50. Укажіть особливості позиціонування пацієнтів, які перенесли ендопротезування кульшового суглоба, у перші дні.

- a. Таких рекомендацій немає
- b. У зручному положенні, немає значення, на якому боці
- c. У положенні на неоперовану сторону тіла, між колінами розміщений валик
- d. У положенні на оперованому боці, щоб суглоб набув правильної позиції
- e. У положенні лежачи на спині, оперована нога в положенні відведення

51. Укажіть допоміжний засіб, який у разі неправильного використання може викликати компресійну нейропатію у зв'язку з паховою, передплечовою або зап'ястною компресією серединного нерва.

- a. Тростини
- b. Крісло колісне
- c. Реабілітаційні бруси
- d. Ходунки
- e. Милиці

52. Чоловік віком 62 роки переніс ішемічний інсульт у басейні середньої мозкової артерії правої півкулі 3 місяці тому. Об'єктивно спостерігається: виражена спастичність у лівій верхній кінцівці, особливо у згиначах кисті та лікті (за шкалою Ашфорт - 3 бали). Пацієнт має труднощі в розгинанні руки, утриманні предметів та виконанні функціональних рухів. Яка техніка фізичної терапії є найбільш ефективною для зменшення спастичності в цьому разі?

- a. Тренування сили тільки в ураженій кінцівці без участі здорової
- b. Позиціонування в середньофізіологічному положенні
- c. Використання методики повільного розтягування спазмованих м'язів
- d. Застосування холодних компресів на спастичні м'язи
- e. Виконання швидких і різких рухів у суглобах

53. Пацієнт скаржиться на біль та оніміння в ділянці передпліччя та кисті правої руки, які посилюються вночі та під час роботи за комп'ютером. Фізичний терапевт провів два тести: запропонував пацієнту зігнути кисть максимально вниз та утримувати в такому положенні руку протягом 30-60 с; виконав постукування в ділянці зап'ястя та середини передпліччя. Про компресію якого нерва свідчитимуть позитивні результати цих тестів?

- a. Серединного
- b. Променевого
- c. Дистальної гілки плечового нерва
- d. Ліктьового
- e. Міжкісткового нерва передпліччя

54. Пацієнт з бронхіальною астмою перебуває на стаціонарному етапі лікування. Після завершення бронхоспазму асистент фізичного терапевта рекомендує використовувати терапевтичні дихальні вправи. Укажіть ці вправи.

- a. Дихання з форсованим видихом
- b. Швидке глибоке дихання
- c. Дихальні вправи з промовою звуків на подовженому видиху
- d. Повільне дихання без вольового керування
- e. Дихання з форсованим вдихом

55. Який клінічний інструмент використовується для оцінювання тяжкості та рівня пошкодження спинного мозку?

- a. Шкала ASIA
- b. Шкала VFM
- c. Шкала FIM
- d. Шкала COVS
- e. Шкала SCIM

56. Укажіть правильну позицію рук фізичного терапевта при страхуванні пацієнта під час ходьби.

- a. Одна рука розміщена на куприку, інша - попереду грудей
- b. Одна рука розміщена на стегнах, інша тримає за плече
- c. Одна рука тримає за плече
- d. Одна рука страхує за пояс, інша тримає за плече
- e. Обидві руки страхують за пояс

57. Постінсультний пацієнт у післягострий період реабілітації скаржиться на зниження чутливості, виражену слабкість м'язів у руці та помірний біль у плечі. Якої доказової стратегії

втручання необхідно дотримуватися з метою попередження сублюксації та болю в плечі пацієнта?

- a. Правильне позиціювання кінцівки, підтримувальні пов'язки, щадне ставлення до руки
- b. Тейпування плеча, пасивні вправи, розтирання плеча здоровою рукою
- c. -
- d. Обмеження усіх рухів в плечовому суглобі, підтримування руки за два суглоби, носіння бандажа
- e. Сидіння в кріслі з підлокотниками, ортез на променево-зап'ястковий суглоб, масаж руки

58. Виконуючи з пацієнтом вправи для розтягування м'язів кульшового суглоба, фізичний терапевт звернув увагу на патологічні зміни, які є протипоказанням до виконання таких вправ. Укажіть це протипоказання.

- a. Обмежений діапазон рухів
- b. Укорочення сухожилків
- c. Патологічно стягувальні рубці
- d. Гіпермобільність суглоба
- e. Порушення постави

59. До фізичного терапевта звернулася пацієнтка віком 61 рік за повторною консультацією. Вона 2 тижні виконувала призначену програму кардіореабілітації за післягострим періодом після інфаркту міокарда. Пацієнтка зазначила, що стала почувати себе краще, може проходити більшу дистанцію та виконувати значний обсяг побутових навантажень без задишки. Яку динаміку функціонального показника роботи серця, найімовірніше, буде встановлено під час обстеження у цьому разі?

- a. Зменшення максимального споживання кисню
- b. Збільшення фракції викиду лівого шлуночка
- c. Збільшення частоти серцевих скорочень у спокої
- d. Збільшення кінцево-діастолічного об'єму лівого шлуночка
- e. Збільшення активності синусового вузла правого передсердя

60. Пацієнтка віком 35 років перебуває в терапевтичному відділенні з приводу пневмонії. Загальний стан задовільний, єдине, що турбує жінку, це погане відходження мокротиння під час кашлю, що створює для неї дискомфорт. Який елемент масажу необхідно застосувати, щоб полегшити відходження мокротиння?

- a. Розминання
- b. Розтирання
- c. Вижимання
- d. Погладжування
- e. Вібрацію

61. Укажіть найефективніший спосіб профілактики пролежнів у пацієнтів з хребетно-спинномозковою травмою.

- a. Часта зміна положення тіла
- b. Протипролежневі матраци та подушки
- c. Мазі з трофічностимулювальними властивостями
- d. Гігієна тіла
- e. Повноцінне харчування

62. Як має рухатися фахівець, страхуючи пацієнта під час спуску зі сходів?

- a. Стояти позаду пацієнта та переходити після того як пацієнт зробив крок
- b. Переходити одночасно з пацієнтом
- c. Стояти нижче пацієнта та переходити на сходинку нижче, після того як пацієнт зробив крок
- d. Стояти двома ногами на одній і тій самій сходинці при кожному кроці пацієнта
- e. Стояти на рівні з пацієнтом та рухатись одночасно з ним

63. Під час опитування ерготерапевтом пацієнтка надала таку інформацію: "Я працюю бібліотекаркою та навчаюся на курсах медсестринства...". До якого домену МКФ належить отримана інформація про пацієнтку?

а. Активність

б. Участь

с. Особистісні фактори

д. Функції

е. Фактори середовища

64. У пацієнтки віком 56 років, яка хворіє на бронхіальну астму, об'єктивно спостерігається: обличчя ціанотичне, шийні вени набухлі, кашляє, під час дихання чути свистячі хрипи, жінка налякана. Яке положення необхідно надати пацієнтці для полегшення стану?

а. Лежачи з піднятими ногами

б. Лежачи з піднятим головним кінцем

с. Стоячи

д. Лежачи на животі

е. Ортопное

65. Які заходи фізичної терапії доцільно використати з метою відновлення стереогнозу?

а. Визначення із заплученими очима цифри, що накреслена на шкірі

б. Визначення здатності сприймати відокремлено два подразники одночасно

с. Відчуття пасивних рухів у пальцях верхніх і нижніх кінцівок

д. Визначення напрямку руху шкірної складки

е. Впізнання предмета шляхом його обмацування із заплученими очима

66. Під час вибору допоміжних засобів пересування орієнтуються на величину кута в ліктьовому суглобі. Який кут згинання в ліктьовому суглобі рекомендований при виборі тростини (ходунків, милиць, паралельних брусів)?

а. 25-30°

б. 15-20°

с. 20-25°

д. 5-10°

е. 10-15°

67. Асистенту фізичного терапевта необхідно оцінити рівень задишки під час фізичного навантаження в пацієнта віком 50 років з хронічним обструктивним захворюванням легень, який амбулаторно проходить реабілітацію. Який тест або шкалу треба застосувати для суб'єктивної оцінки задишки під час фізичних навантажень?

а. Шкалу Борга

б. Шкалу NYHA

с. Шкалу Берга

д. Тест 2-хвилинної ходьби

е. Тест 6-хвилинної ходьби

68. Як називається захисний рефлекс розтягування, що запобігає перерозтягуванню м'язів?

а. Аутогенне гальмування

б. Міотатичний рефлекс

с. Сухожильний рефлекс

д. Тонічний рефлекс

е. Сегментарний рефлекс

69. Під час обстеження пацієнта з наслідками ЧМТ за тестом "Встань та йди" було отримано результат - 15 с. Яка здатність до переміщення у цього пацієнта?

а. Переважно незалежна здатність до переміщення

б. Переважно обмежена здатність до переміщення

с. Обмежена здатність до переміщення

д. Порушена здатність до переміщення

е. Вільна здатність до переміщення

70. Під час оцінки результатів проби Мартіне-Кушелевського виявилося, що в пацієнта збудливість пульсу більше 80%, час відновлення пульсу 5 хв. Визначте тип реакції, якщо артеріальний тиск до навантаження - 120/80 мм рт. ст., а після навантаження - систолічний

значно підвищився, діастолічний значно знизився (180/50 мм рт. ст.).

a. Дистонічний

- b. Східчастий
- c. Гіпертонічний
- d. Нормотонічний
- e. Астенічний

71. Пацієнт із травмою спинного мозку на рівні Th6 після стабілізації стану проходить реабілітацію. Він має параплегію, збережену силу м'язів верхніх кінцівок і труднощі з підтриманням рівноваги в сидячому положенні. Тренування якої навички першочергово необхідне пацієнту для самостійного пересаджування в крісло колісне?

a. Переміщення в різних напрямках в положенні сидячи з опорою на руки

- b. Утримання балансу сидячи без опори на руки протягом 1 хв
- c. Утримання положення стоячи у вертикалізаторі протягом 5 хв
- d. Нахилу тулуба вперед без опори на руки
- e. Переносу ваги тіла на нижні кінцівки в положенні сидячи

72. Яку здатність людини ерготерапевту дозволяє оцінити універсальний опитувальник "активності у повсякденному житті" (Activities of Daily Living-ADL)?

a. Інструментальну активність повсякденного життя

b. До самостійного існування

- c. Задоволеність від виконання певної діяльності
- d. Діяльність в аспекті її важливості для пацієнта
- e. Заняттєву активність

73. Укажіть причину виникнення дефекту ходьби "підйом на носок" у пацієнта із протезом на трансфеморальному рівні.

a. Контрактура відвідних м'язів стегна

b. Занадто довгий протез

- c. Слабкість м'язів задньої поверхні стегна
- d. Приймальна гільза в зігнутому положенні
- e. Жорсткий протез стопи

74. Пацієнтка віком 65 років із діагнозом: остеопороз - має високий ризик падінь та переломів. Які з нижченаведених терапевтичних вправ є найбільш ефективним для профілактики падінь та зменшення ризику переломів?

- a. Вправи на силу та для розтягнення
- b. Вправи для розслаблення та аеробні вправи
- c. Вправи для рівноваги та для розслаблення
- d. Вправи для рівноваги та сили**
- e. Вправи для розтягнення та аеробні вправи

75. Правильне положення пацієнта під час мануально-м'язового тестування дозволяє запобігти включенню в рух інших м'язів при оцінюванні сили відповідного м'яза. Яке вихідне положення пацієнта передбачено для оцінювання сили чотириголового м'яза на 4 бали?

a. Сидячи на кушетці зі звислими ногами

- b. Лежачи на боці, зверху розігнута нога, яка тестується
- c. Лежачи на спині, ноги розігнуті
- d. Лежачи на животі з зігнутою ногою, яка тестується
- e. Сидячи на кушетці з витягнутими ногами

76. Пацієнту віком 66 років, який хворіє на ішемічну хворобу серця, з метою розроблення ефективної комплексної програми фізичної терапії призначено проведення функціональної проби для оцінки швидкості його адаптаційних можливостей на фізичне навантаження з визначенням часу відновлювальних процесів. Якою пробою визначається здатність серцево-судинної системи відновлюватися після занять фізичними вправами?

a. Вальсальви

b. Мартіне-Кушелевського

- c. Генчі
- d. Руф'є
- e. Штанге

77. Пацієнтка віком 67 років, проходить повторний курс реабілітації після ішемічного інсульту в басейні правої середньої мозкової артерії. Скаржиться на обмеженість рухів у лівих кінцівках, слабкість та порушення рухів у кінцівках, головний біль, коливання АТ, хиткість під час ходьби. Який тест доцільно застосувати для виміру функціональної рухливості та ризику падінь у пацієнтки, що не вимагає спеціального обладнання та багато часу?

- a. "10-метровий тест ходьби" (10MWT)
- b. Шкала рівноваги Берга (BBS)
- c. "Встань та йди" (TUG)
- d. Динамічний індекс ходьби (DGI)
- e. "2-хвилинний тест ходьби" (2MWT)

78. Пацієнт після інсульту має порушення ходьби, часто спотикається через слабкість ураженої ноги, відзначається обмежена активна дорсальна флексія стопи (проявляється "падінням стопи" під час кроку). Який підхід у фізичній терапії буде найбільш ефективним у цьому разі?

- a. Виконання вправ лише в положенні лежачи для збільшення сили м'язів
- b. Повна відмова від ходьби, щоб уникнути падінь
- c. Надання пацієнту милиць без навчання техніки ходьби
- d. Використання ортеза для стопи та тренування правильного патерна ходьби
- e. Вправи виключно на верхні кінцівки, оскільки відновлення ходьби можливе пізніше

79. Передчасно народжена дитина щоденно отримує до 10-12 стресових процедур догляду, зокрема забір крові. Яку шкалу застосовують для вимірювання процедурного болю недоношених і доношених немовлят?

- a. N-PASS
- b. Шкалу ВАШ
- c. NIPS
- d. -
- e. NBAS

80. Чому на початку реабілітації травм плечового суглоба надається перевага вправам у закритому кінематичному ланцюзі?

- a. Залучення в роботу м'язів-антагоністів та синергістів
- b. Відтворення певних схем рухів
- c. Менша швидкість руху, але більша стабільність
- d. Ізольована робота певних м'язових груп
- e. Менша стимуляція пропріоцептивної чутливості

81. Для встановлення толерантності до фізичних навантажень та складання програми реабілітації для пацієнта після перенесеного інфаркту міокарда фізичний терапевт запланував проведення тредмілєргометрії. Який тип навантаження при тредмілєргометрії найчастіше застосовують у цьому разі?

- a. Зі східчастим зменшенням навантаження
- b. З постійно зростаючим навантаженням
- c. Зі східчастим збільшенням навантаження без періодів відпочинку
- d. Зі східчастим збільшенням навантаження з періодами відпочинку
- e. З рівномірним навантаженням

82. У пацієнта віком 34 роки під час заняття терапевтичними вправами спостерігається: прискорене дихання, невисока пітливість та незначне почервоніння шкіри. Чоловік не має ніяких скарг та безпомилково виконує вказівки. Укажіть рівень втоми в пацієнта.

- a. Незначний
- b. Різкий
- c. Виражений
- d. Втома відсутня

е. Значний

83. Завданням комплексних реабілітаційних програм фізичної терапії пацієнтів хворих на ішемічну хворобу серця є покращення метаболічного забезпечення міокардіальних функцій через зниження потреби міокарда в кисні й адекватну його доставку. Завдяки чому реалізується сприятливий вплив індивідуально спланованих систематичних фізичних навантажень на гемодинаміку?

- a. Зростанню артеріального тиску і звуженню коронарних артерій
- b. Зростанню частоти серцевих скорочень і розширенню коронарних артерій
- c. Зниженню артеріального тиску і звуженню коронарних артерій
- d. Зростанню артеріального тиску й розширенню коронарних артерій
- e. Зменшенню частоти серцевих скорочень і розширенню коронарних артерій

84. Які функції нижньої кінцівки будуть порушені при розриві двоголового м'яза стегна, що виник у результаті падіння з висоти?

- a. Розгинання стегна та гомілки
- b. Розгинання стегна та згинання гомілки
- c. Супінація стопи
- d. Згинання стегна та гомілки
- e. Згинання та пронація гомілки

85. Пацієнту віком 65 років діагностовано COVID-19. SpO₂ - 70%. Яке позиціонування може посприяти значному підвищенню показників сатурації?

- a. На животі
- b. На правому боці
- c. На лівому боці
- d. На спині
- e. Напівсидячи

86. Пацієнт віком 64 роки після ендопротезування кульшового суглоба тренує навички ходьби сходами. Де повинен перебувати фізичний терапевт під час страхування пацієнта?

- a. Позаду від пацієнта, притримуючи пояс для страхування двома руками
- b. Дещо позаду і збоку від пацієнта, притримуючи пояс для страхування однією рукою, а іншою - надпліччя пацієнта
- c. Дещо позаду і збоку від пацієнта, притримуючи пояс для страхування двома руками
- d. Позаду і збоку від пацієнта, притримуючи пояс для страхування однією рукою, а іншою - руку пацієнта
- e. -

87. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудниною, який іррадіює в ліву руку, лопатку, нижню щелепу, триває більше години та не знімається нітрогліцериним. Встановлено діагноз: інфаркт міокарда. Якою буде основна мета першого (стаціонарного) етапу реабілітації для цього пацієнта?

- a. Підготовка пацієнта до повернення до професійної діяльності, зниження факторів ризику
- b. Забезпечення психологічної підтримки пацієнта, повернення до професійної діяльності
- c. Поступове підвищення рівня функціональної здатності, зниження факторів ризику серцево-судинних захворювань
- d. Протидія негативним впливам тривалого ліжкового режиму та підготовка пацієнта до повернення до нормальної повсякденної діяльності
- e. Покращення функціонального стану серцево-судинної системи, формування адекватного колатерального кровообігу в міокарді

88. Який спірографічний показник вважається найкращим для оцінки ступеня обструкції дихальних шляхів?

- a. Хвилинний об'єм дихання (ХОД)
- b. Максимальна вентиляція легень (МВЛ)
- c. Об'єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1)
- d. Функціональна залишкова ємність легень (ФЗЄ)

е. Форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ)

89. Постінсультний пацієнт віком 62 роки: післягострий період реабілітації, вертикалізований у положення сидячи, труднощі з утриманням балансу. Яке тренування для покращення самостійного сидіння є оптимальним для такого пацієнта?

- a. Вправи з підйомом таза, лежачи в ліжку
- b. Тренування опорної функції рук, сидячи
- c. -
- d. Вправи з імітації ходьби, сидячи

е. Тренування з дотягуванням випрямленою рукою, сидячи

90. Що є протипоказанням до постурального дренажу?

- a. Наявність бронхоектазів
- b. Емфізема легень
- c. Артеріальна гіпертензія

d. Легенева кровотеча

е. Субфебрильна температура

91. Жінка віком 42 роки після підняття важкого предмета відчула різкий біль у попереково-крижовому відділі хребта з іррадіацією в сідницю та по передній поверхні стегна і внутрішній поверхні гомілки праворуч. Об'єктивно спостерігається: напружені м'язи поперекової ділянки, сколіоз, випрямлення поперекового лордозу, обмеження рухів у поперековому відділі хребта та болючість під час глибокої пальпації паравертебральних точок L4-S1 праворуч. Симптом Ласега позитивний з правого боку. Ахіловий рефлекс праворуч не викликається. Гіпестезія по зовнішньому краю правої стопи. Який найімовірніший діагноз?

a. Радикулопатія L5

b. Радикулопатія S1

- c. Люмбаго
- d. Люмбоішіалгія
- e. Люмбалгія

92. У пацієнта перелом середньої третини плечової кістки. Йому накладено гіпсову пов'язку й рекомендовано курс ЛФК. На які періоди поділяється курс ЛФК цього пацієнта, залежно від етапів і термінів його лікування?

- a. Догоспітальний, госпітальний, загальний
- b. Щадний, функціональний, тренувальний
- c. Ліжковий, напівліжковий, вільний
- d. Імобілізація, постімобілізація, відновний**
- e. Стаціонарний, амбулаторно-поліклінічний

93. Пацієнт віком 56 років проходить ранній етап реабілітації після тотального ендопротезування кульшового суглоба. Яку модель ходьби необхідно застосовувати в цьому разі?

- a. З ходунками
- b. Триточкову з милицями**
- c. Двоточкову з милицями
- d. Чотириточкову з милицями
- e. З шестипроменевими палками

94. Фізичний терапевт проводить мануальне м'язове тестування привідних м'язів стегна. Який принцип є основним правилом тестування та оцінювання м'язової сили?

- a. Напруження та розслаблення
- b. Розслаблення та напруження
- c. Напруження та подолання**
- d. Розслаблення та подолання
- e. -

95. Пацієнтці віком 16 років після перенесеної гострої правосторонньої пневмонії для запобігання розвитку спайок призначено лікувальний масаж. Укажіть правильну послідовність

прийомів проведення лікувального масажу при захворюваннях органів дихання.

- a. Розтирання, погладжування, розтирання, вібрація
- b. Погладжування, розтирання, розминання, вібрація**
- c. Погладжування, вібрація, розминання, розтирання
- d. Погладжування, розминання, розтирання, вібрація
- e. Вібрація, розминання, погладжування, розтирання

96. Упродовж якого часу рекомендовано позиціонувати пацієнта з ішемічним інсультом в одному положенні для профілактики контрактур?

- a. 9-10 год
- b. 1-2 год**
- c. 5-6 год
- d. 3-4 год
- e. 7-8 год

97. У пацієнтки віком 67 років гостре порушення мозкового кровообігу, виражений геміпарез. В анамнезі: цукровий діабет, нестабільна гемодинаміка, високий ризик утворення пролежнів. Який проміжок часу є оптимальним для зміни положення тіла пацієнтки для профілактики пролежнів?

- a. 1 раз на добу
- b. Кожні 6 годин
- c. Кожні 2 години**
- d. 2 рази на добу
- e. Кожні 4 години

98. Укажіть, у якому випадку проводиться протинабрякова терапія та терапія, спрямована на покращення трофіки тканин, особливо м'язів, збереження амплітуди рухів у проксимальному суглобі, зняття больового синдрому, наявності трофічних розладів, тренування на опірність тканин, профілактика контрактур.

- a. Закритої травми периферійних нервів
- b. Несформованої кукси**
- c. Фантомної кінцівки
- d. Фантомного болю
- e. Сформованої кукси

99. Новонародженій дитині виконується погладжування щоки праворуч. Оберіть рефлекторну відповідь, яка буде вказувати на зрілий пошуковий рефлекс.

- a. Поворот голови ліворуч та закривання рота
- b. -
- c. Поворот голови ліворуч та відкривання рота
- d. Поворот голови праворуч та відкривання рота**
- e. Поворот голови праворуч та закривання рота

100. Яка мета використання допоміжних засобів у роботі з пацієнтами?

- a. Зменшення проявів слабкості м'язів
- b. Тренування сили нижніх кінцівок
- c. Забезпечити пацієнту більшу мобільність під час відновлення його здатності пересуватися**
- d. Навчити його нових навичок, які можуть знадобитися в житті
- e. Запобігання пасивно-активній роботі з пацієнтом

101. У разі ураження якого рівня спинного мозку пацієнту надається повна допомога під час прийому їжі?

- a. C5-C6
- b. C6-C7
- c. C7-C8
- d. C1-C4**
- e. T1-T2

102. Який метод обстеження пацієнтів із патологією органів дихання використовують під час

перевірки голосового тремтіння, визначення тургору, вологості шкіри, тону м'язів, товщини підшкірного жирового шару та периферичних лімфатичних вузлів?

- a. Пальпацію
- b. Перкусію
- c. Мануально-м'язове тестування
- d. Ларингоскопію
- e. Аускультацию

103. Пацієнтка віком 32 роки має в анамнезі: рецидивно-ремітуючий розсіяний склероз. Під час обстеження виявлено: дискоординація рухів, порушення балансу та хитання при ходьбі. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- a. Астереогнозія
- b. Анозогнозія
- c. Апраксія
- d. Афазія
- e. Атаксія

104. Рентгенологічно в пацієнта діагностовано перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути насамперед травмований уламками кістки в цьому разі?

- a. Двоголового м'яза плеча
- b. Великого круглого м'яза
- c. Найширшого м'яза спини
- d. Дельтовидного м'яза
- e. Великого грудного м'яза

105. Пацієнт віком 37 років із клінічним діагнозом: нестабільний нефіксований перелом хребта на рівні Th12-L1, забій спинного мозку, нижня параплегія. Яка амплітуда згинання прямої ноги при виконанні пасивних вправ у нижніх кінцівках такого пацієнта?

- a. Не більше 70°
- b. Не більше 80°
- c. Не більше 90°
- d. Не більше 60°
- e. Не більше 50°

106. Яку шкалу використовують в ерготерапії для стандартизованої оцінки рівня розвитку великих моторних функцій у дітей із церебральним паралічем?

- a. FIM
- b. CFCS
- c. GMFCS
- d. MACS
- e. FMS

107. Передчасно народжене немовля досягло координації в моделі "смоктання-ковтання-дихання". Соску якої форми буде рекомендовано для збереження смоктального рефлексу?

- a. Симетричної плоскої
- b. Циліндричної
- c. Асиметричної плоскої
- d. Округлої
- e. -

108. Яку стратегію потрібно вибрати для реалізації завдання із вдосконалення навичок пересідання на рівновисокі поверхні особою з наслідками хребетно-спинномозкової травми на рівні C7 (ASIA C)?

- a. Пересідання з частковою допомогою фізичного терапевта
- b. Пересідання з повною допомогою фізичного терапевта
- c. Пересідання з відпрацюванням належного рівня рівноваги тіла

d. Пересідання з вербальною допомогою фізичного терапевта

e. Пересідання за допомогою ковзкої поверхні

109. Які клінічні ознаки свідчатимуть про погіршення стану пацієнта, що хворіє на бронхіальну астму?

a. Інспіраторна задишка, клеочуче дихання

b. Експіраторна задишка з подовженим видихом, крепітація

c. Інспіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи

d. Експіраторна задишка з подовженим видихом, вологі хрипи

e. Експіраторна задишка з подовженим видихом, сухі свистячі хрипи

110. Після оперативного лікування колінного суглоба в пацієнта сформувалася післяімобілізаційна м'язова контрактура. Для збільшення амплітуди руху пацієнт самостійно розгинає колінний суглоб, утримуючи його у крайній можливій точці амплітуди за допомогою напруження чотириголового м'яза. Як називається цей тип розтягнення?

a. Балістичний

b. Постізометричний

c. Активний

d. Пасивний

e. Динамічний

111. Що з нижченаведеного є протипоказанням для фізичної терапії при гастриті в підгострій стадії?

a. Підвищення секреторної функції

b. Зміна апетиту

c. Диспептичні явища

d. Зниження секреторної функції

e. Виражений больовий синдром

112. Пацієнт скаржиться на затерплість та оніміння безіменного пальця та мізинця правої кисті. Під час огляду виявлено: порушення згинання та шкірної чутливості цих пальців, долонного згинання кисті, зведення і розведення пальців кисті, а також приведення великого пальця кисті. Міжкісткові, а також м'язи підвищення мізинця частково атрофовані (починає формуватися "пазуриста лапа"). Який нерв уражений в пацієнта?

a. Присередній шкірний нерв передпліччя

b. Серединний

c. Ліктьовий

d. М'язово-шкірний

e. Промієвий

113. Під час обстеження пацієнта виявлено спастичність двоголового м'яза верхньої кінцівки з оцінкою 1+ за модифікованою шкалою Ашфорта. Що буде демонструвати двоголовий м'яз з такою оцінкою під час пасивного розгинання передпліччя?

a. Значне підвищення м'язового тону, пасивні рухи утруднені

b. -

c. Незначне підвищення м'язового тону, що проявляється хапанням, з мінімальним опором протягом подальшої (менше половини) амплітуди руху

d. Незначне підвищення м'язового тону, що проявляється хапанням, з подальшим розслабленням або мінімальним опором в кінці амплітуди руху

e. Помірне підвищення м'язового тону, що проявляється хапанням, з незначним опором протягом подальшої (більше половини) амплітуди руху

114. Які завдання фізичної терапії будуть пріоритетними в перші три дні хребетно-спинномозкової травми?

a. Сприяння процесам нейропластичності

b. Профілактика ускладнень

c. Навчання навичок самообслуговування

d. Навчання навичок переміщення

е. Відновлення втрачених функцій

115. Які вправи доцільно рекомендувати пацієнтам, що хворіють на гіпертонічну хворобу в різних стадіях, з метою зниження артеріального тиску?

- а. Ритмопластичні
- б. Дихальні із затримкою дихання на вдиху
- с. Ізометричні
- д. Ізотонічні
- е. Дихальні із затримкою дихання на видиху

116. У чоловіка раптово виникли сильний біль у лівій половині грудної клітки, кашель, рясне кровохаркання, температура тіла підвищилася до 38,2 °С. Під час обстеження встановлено, що ліва половина грудної клітки дещо відстає в акті дихання. Під час аускультатії прослуховується крепітація і шум тертя плеври. Установіть попередній діагноз.

- а. Пневмонія
- б. Гострий бронхіт
- с. Бронхіальна астма
- д. Хронічний бронхіт
- е. Емфізема

117. Передчасно народжене немовля (скоригований вік 36 тижнів) має підвищений рівень розвитку апное. Укажіть позиціонує положення для здійснення орального годування через соску.

- а. -
- б. Вертикальне положення (сидячи)
- с. Альтернативне положення на спині
- д. Альтернативне положення "живіт до живота"
- е. Горизонтальне положення на спині

118. Пацієнт віком 73 роки хворіє на хворобу Паркінсона, акінетико-регідну форму. Після тестування визначена IV стадія хвороби за модифікованою шкалою Хена та Яра. Якому рівню рухової активності відповідає ця стадія хвороби в пацієнта?

- а. Легке обмеження рухової активності, пацієнт не потребує сторонньої допомоги
- б. Істотне обмеження рухової активності, але залишається можливим самостійне пересування
- с. Помірне обмеження рухової активності, пацієнт потребує істотної сторонньої допомоги в повсякденному житті
- д. Помірне обмеження рухової активності, легка залежність пацієнта від сторонньої допомоги в повсякденному житті
- е. Істотне обмеження рухової активності, пацієнт не може самостійно пересуватися

119. У пацієнта віком 67 років під час огляду виявлено: відсутність пропріоцептивної та тактильної чутливості шкіри верхньої кінцівки та верхньої половини тулуба. Про ураження якого провідного шляху це свідчить?

- а. Спинномозково-покрівельного
- б. Клиноподібного пучка Бурдаха
- с. Спинномозково-оливного
- д. Переднього спинномозково-мозочкового Говерса
- е. Тонкого пучка Голля

120. Під час огляду пацієнта з бронхіальною астмою фізичний терапевт встановив, що передньо-задній розмір грудної клітки збільшений переважно у верхній частині, ребра мають горизонтальне положення, міжреберні проміжки розширені, над- та підключичні ямки згладжені. Для якої форми грудної клітки характерні виявлені ознаки?

- а. Циліндричної
- б. Конічної
- с. Обструктивної
- д. Астматичної
- е. Емфізематозної

121. Пацієнт віком 72 роки потрапив до лікувального закладу внаслідок гіпертонічного кризу. Після проведеного лікування його стан частково поліпшився. Укажіть одне з основних завдань терапевтичних вправ при гіпертонічній хворобі.

- a. Попередження екстракардіальних чинників кровообігу
- b. Стимулювання психоемоційного стану пацієнта і зниження рухового режиму
- c. Пригнічення обміну речовин у міокарді та колатерального кровообігу
- d. -
- e. Покращення діяльності ЦНС, усунення порушень процесів регуляції артеріального тиску

122. Постінсультному пацієнту віком 60 років діагностовано: спастичний геміпарез, спастичність м'язів-згиначів верхньої кінцівки становить 3-4 бали за шкалою Ашфорта, больовий синдром. Яке втручання ерготерапії є оптимальним для пацієнта з урахуванням ступеня спастичності?

- a. Ортезування
- b. Тривале статичне розтягнення м'язів
- c. Теплові процедури
- d. Вібраційний масаж
- e. Ботулінотерапія

123. Під час огляду грудної клітини пацієнта асистент фізичного терапевта встановив, що ребра розташовані майже горизонтально, міжреберні проміжки широкі, передньо-задній та поперечний розміри практично однакові, нижня апертура грудної клітки широка, епігастральний кут тупий. Обидві половини грудної клітки симетрично беруть участь у диханні. Для якої форми грудної клітки характерні виявлені ознаки?

- a. Циліндричної
- b. Діжкоподібної
- c. Астенічної
- d. Конічної
- e. Плоскої

124. Яку концептуальну модель практики використовує у своїй професійній діяльності ерготерапевт, коли аналізує заняттєву активність та важливі для особи заняття з метою їх покращення, враховуючи вплив середовища та наратив самої особи?

- a. Модель процесу ерготерапевтичного втручання (OTIPM)
- b. Модель заняттєвої активності людини (MOHO)
- c. Модель KAWA "Річка"
- d. Модель "Особа-середовище-заняття-виконання" (PEOP)
- e. Канадська модель виконання заняття та залучення (CMOP-E)

125. Пацієнт віком 62 роки перебуває на підгострому періоді реабілітації після перенесеного інсульту в басейні середньої мозкової артерії. Яка шкала є оптимальною для визначення можливості здійснення самостійної діяльності пацієнта та формування цілей ФТ?

- a. Ренкіна
- b. Хокінса
- c. Функціональної незалежності (FIM)
- d. Візуальна аналогова шкала (VAS)
- e. Освестрі

126. Під час проведення проби з фізичним навантаженням реакція серцево-судинної системи характеризувалася підвищенням систолічного артеріального тиску більше ніж на 70 мм рт. ст., а показник діастолічного становив більше 95 мм рт. ст. Який із нижченаведених типів реакцій спостерігається в пацієнта?

- a. Астенічний
- b. Дистонічний
- c. Нормотонічний
- d. Гіпертонічний
- e. Гіпотонічний

127. Жінка віком 35 років має синдром зап'ясткового каналу. Скаржиться на те, що не може друкувати більше 10 хв, перш ніж біль стане непереборним. Які заходи фізичної терапії та ерготерапії застосовуватимуться з метою зменшення больових відчуттів у перші 5 днів?

a. Ортезування почергово з вправами з полегшених вихідних положень

b. Покращення нейром'язового контролю

c. Розтягування м'язів передпліччя почергово з ортезуванням

d. Покращення мобільності променево-зап'ясткового суглоба та ергономіка робочого місця

e. Ортезування та зміцнення м'язів передпліччя

128. Постізометричну релаксацію використовують для ліквідації міогенних контрактур. Після закінчення ізометричного напруження м'язів пацієнта фізичний терапевт легко й повільно виконує пасивне розтягування м'язів. Упродовж скількох секунд він це робить?

a. 21-25

b. До 5

c. 10-15

d. 16-20

e. 6-10

129. Чоловік віком 45 років скаржиться на задишку, що посилюється під час незначного фізичного навантаження та малопродуктивний кашель. В анамнезі: ХОЗЛ. Укажіть найбільш інформативний метод для визначення дихальної недостатності в пацієнта.

a. Комп'ютерна томографія легень

b. Бронхографія

c. Бронхоскопія

d. Спірографія

e. Рентгенографія органів грудної клітки

130. Пацієнт через місяць після черепно-мозкової травми демонструє ознаки 4 рівня когнітивного функціонування Ранчо. Яке втручання буде оптимальним для цього пацієнта?

a. -

b. Заняття тривалістю 20 хв з виконанням подвійних завдань

c. Заняття тривалістю до 20 хв у спокійному оточенні з виконанням простих команд

d. Заняття з гучним звуковим супроводженням тривалістю 30 хв

e. Заняття тривалістю 40 хв з виконанням простих команд

131. Чоловіку віком 60 років два дні тому виконано ендопротезування правого кульшового суглоба. Укажіть обмеження, яких повинен дотримуватися пацієнт упродовж 3-х місяців.

a. Сідати під кутом більше ніж на 90° між тулубом та нижніми кінцівками

b. Лягати на здоровий бік із подушкою між ногами

c. Піднімати пряму кінцівку на 30° при розігнутому коліні

d. Відводити пряму нижню кінцівку більше ніж на 30°

e. Підніматися сходами

132. Із якою метою проводиться профілактика респіраторних ускладнень в осіб із ураженням шийного відділу хребта в гострому періоді хребетно-спинномозкової травми?

a. Збільшення екскурсії діафрагми

b. Видалення мокротиння з трахіобронхіального дерева

c. Збільшення екскурсії грудної клітки

d. Забезпечення вентиляції легень

e. Попередження ателектазу

133. Пацієнтка віком 27 років перебуває 5 день у неврологічному відділенні після операції зі стабілізації хребта на рівні хребців T11-L1. З анамнезу відомо, що місяць тому, після дорожньо-транспортної пригоди, жінка була шпиталізована до лікарні з діагнозом перелом хребта на рівні T12 з повним пошкодженням спинного мозку. Фізичний терапевт планує на занятті навчити пацієнтку техніці самостійної стимуляції кашлю. Яке вихідне положення протипоказане для пацієнтки під час проведення цієї процедури?

a. Лежачи на животі

b. Лежачи на спині

- c. Лежачи на лівому боці
- d. Сидячи
- e. Лежачи на правому боці

134. Фізичному терапевту необхідно визначити структуру походження за характером болю в пацієнта. Який біль має такі характеристики: глибокий, свердлячий, локалізований?

- a. М'язовий
- b. Нервовий

c. Кістковий

- d. Фасціальний
- e. Судинний

135. Які дії має виконувати фізичний терапевт для підвищення ефективності дренажної позиції в разі накопичення мокротиння і гною в бронхах у пацієнта?

a. Під час видиху натискати на відповідну ділянку грудної клітки, виконуючи вібраційний масаж

- b. Під час вдиху натискати на відповідну ділянку грудної клітки, виконуючи вібраційний масаж
- c. Під час затримки дихання виконувати вібраційний масаж
- d. Під час затримки дихання натискати на відповідну ділянку грудної клітки
- e. Під час затримки дихання виконувати легке постукування на відповідній ділянці грудної клітки

136. У передчасно народженої дитини оцінюється здатність до орального годування. Укажіть фазу ковтання, під час якої будуть активно задіяні нижня щелепа, язик, м'яке та тверде піднебіння з частковим залученням губ.

a. Початкова езофагеальна

b. Ротова

- c. Фарингеальна
- d. -
- e. Езофагеальна

137. Чоловік віком 25 років потрапив до лікувального закладу внаслідок гіпотонічного кризи. Після надання допомоги і проведення лікування його стан поліпшився. Які терапевтичні вправи найбільш доцільно призначити для цього пацієнта?

a. Активні фізичні вправи для малих м'язових груп

b. Швидкокісно-силові вправи та вправи з невеликим обтяженням

- c. Пасивні фізичні вправи для великих м'язових груп
- d. Дихальні вправи із затримкою дихання на видиху
- e. Вправи з швидкою зміною положення тіла у просторі

138. Військовослужбовець віком 30 років отримав вогнепальне поранення нижньої кінцівки, що призвело до порушення ходьби та необхідності використання допоміжних засобів. Під час реабілітації фізичний терапевт проводить оцінку стану пацієнта. Він урахує не тільки обсяг рухів у суглобах та м'язову силу, а й емоційний стан пацієнта, рівень соціальної підтримки, архітектурну доступність житла та доступність транспорту для відвідування реабілітаційного центру. Який принцип використовує терапевт у цій ситуації відповідно до МКФ?

a. Біопсихосоціальний підхід

- b. Медичну модель
- c. Соціальну модель
- d. Діагностичний підхід
- e. Лише психологічну модель

139. Які індивідуальні соціальні чинники потрібно враховувати під час опитування пацієнта?

- a. Професія, матеріальне становище, сімейний стан, наявність домашніх тварин
- b. -
- c. Соціальний статус, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип помешкання
- d. Професія, сімейний стан, хобі, хороші побутові умови

е. Професія, хобі, сімейний стан, наявність домашніх тварин, тип і поверх помешкання

140. Які заходи рекомендовано комбінувати з метою виховання координаційних навичок і відновлення тактильної, м'язової та суглобової чутливості в решті кінцівки під час стояння та ходіння з протезом?

а. Масаж, вправи на розвиток рівноваги, догляд за шкірою кукси

б. Масаж, вправи на опір і витривалість, загартовування

с. Вправи на тренажерах, вправи зі складною координацією, гігієнічні процедури

д. Вправи на координацію та спротив, апаратна фізіотерапія, загартовування

е. Силкові вправи, вправи на тренування дрібної моторики, бальнеопроцедури

141. Після проведення фізичної терапії пацієнту з дорсопатією шийного відділу хребта дано рекомендації і продемонстровано виконання вправ із самоопором для м'язів шиї. Як активуються м'язи при виконанні таких вправ?

а. Напруження м'язів-синергістів та розслаблення м'язів-антагоністів

б. -

с. Одночасне напруження м'язів-синергістів та м'язів-антагоністів

д. Напруження м'язів-синергістів без включення м'язів-антагоністів

е. Розслаблення м'язів-синергістів та напруження м'язів-антагоністів

142. З якого положення треба починати вертикалізацію пацієнта, який тривалий час перебував у ліжку після гострого порушення мозкового кровообігу?

а. Дорсально лежачи

б. Положення лежачи на животі

с. Латерального або бокового положення лежачи

д. Положення Фаулера

е. Положення стоячи

143. Чим зумовлений мінімальний час кардіотренування незалежно від рівня здоров'я?

а. Функціональним станом дихальної та серцево-судинної систем

б. Поступовим утворенням достатньої кількості енергії для роботи на витривалість

с. Дотриманням загальних умов застосування аеробних терапевтичних вправ у фізичній терапії

д. Зростанням інтенсивності обміну речовин під час кардіотренування

е. Адаптацією дихальної та серцево-судинної систем до фізичного навантаження

144. Пацієнтка віком 66 років перебуває на консультації у фізичного терапевта після нещодавно перенесеного гострого інфаркту міокарда. Під час обстеження виявлено: ЧСС - 88/хв, АТ - 148/89 мм рт. ст., тест "встань та йди" - 22 с. Які вправи протипоказані для цієї пацієнтки?

а. На координацію рухів

б. Зі статичним напруженням

с. На витривалість на велотренажері

д. На розтягнення м'яких тканин

е. Дихальні вправи із подовженням видиху

145. Після перенесеної травми пацієнт не може зігнути праве плече в плечовому суглобі та привести його до тулуба. Який м'яз було травмовано?

а. Великий круглий

б. Плечовий

с. Малий круглий

д. Дзьобо-плечовий

е. Підлопатковий

146. Чоловіку віком 38 років, у результаті воєнної травми виконано трансфеморальну ампутацію лівої кінцівки. Функціонування верхніх кінцівок значних обмежень не має, проживає у приватному секторі, де середовище не безбар'єрне. Який допоміжний засіб реабілітації доцільно обрати на період передпротезної реабілітації?

а. Рама для ходьби

б. Милиці пахвові

- c. Ролатор
- d. Палиця
- e. Крісло колісне

147. Що є протипоказанням для проведення тесту на толерантність до фізичного навантаження?

- a. Серцева недостатність I ступеня
- b. Коронарна недостатність із частими нападами стенокардії**
- c. Поодинокі екстрасистоли
- d. Артеріальна гіпертензія
- e. Синусова тахікардія

148. Жінка віком 49 років, викладач, скаржиться на біль у попереку та скутість у поперековому відділі хребта під час здійснення побутової діяльності. Яке доступне функціональне дослідження доцільно застосувати, щоб дослідити амплітуду руху хребта в цьому разі?

- a. Тест з 6-хвилинною ходьбою
- b. Тест Отта
- c. Тест Форестье
- d. Проба підборіддя-груднина
- e. Тест Шобера**

149. Як правильно зробити вимір сили кисті методом динамометрії?

- a. В опущеній вниз руці, одноразово
- b. У відведеній убік прямій руці, тричі**
- c. У відведеній убік зігнутій у лікті руці, тричі
- d. У піднятій руці, різко
- e. У відведеній убік прямій руці, одноразово

150. Пацієнт скаржиться на змішану задишку. Об'єктивно виявлено: тахіпное, відставання однієї половини грудної клітки в акті дихання та згладженість міжреберних проміжків на цьому боці. Під час пальпації цього боку грудної клітки не визначається голосове тремтіння, при порівняльній перкусії виявляється тимпанічний звук. Аускультативно - над зоною тимпанічного перкуторного звуку везикулярне дихання відсутнє. Укажіть наявний синдром ураження системи дихання.

- a. Синдром пневмотораксу**
- b. Синдром емфіземи
- c. Синдром бронхообструкції
- d. Синдром гідротораксу
- e. Синдром порожнини в легені