

1. До відділення політравми бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги шпиталізовано водія авто після ДТП із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, закритою травмою живота, відкритим переломом кісток лівої гомілки, нестабільною гемодинамікою, ШКГ - 8 балів, запахом алкоголю з ротової порожнини. Пацієнт транспортований в операційну, розпочато заходи ресусцитації. Рентгенографію яких локалізацій потрібно виконати першочергово?

a. Таз, ліва гомілка

b. Грудна клітка, таз

c. Голова, ліва гомілка

d. Ліва гомілка, грудна клітка

e. Голова, таз

2. Що потрібно виконати як обов'язковий етап ПХО при вогнепальному пораненні з метою зменшення проявів компартмент-синдрому?

a. Фасціотомію

b. Накласти апарат зовнішньої фіксації

c. Не зашивати рану

d. Провести накладення VAC-системи

e. Провести некректомію

3. Чоловік віком 40 років у дорожньо-транспортній пригоді отримав перелом стегнової кістки в нижній третині зі значним зміщенням фрагментів. Розвиток якого ускладнення варто передбачити під час лікування пацієнта?

a. Здавлення судинно-нервового пучка

b. Контрактура колінного суглоба

c. Посттравматичний неврит сідничного нерва

d. Гемартроз колінного суглоба

e. Зрощення перелому у неправильному положенні

4. Який метод лікування потрібно вибрати при переломі ліктьового відростка з розходженням уламків?

a. Лікування скелетним витягінням

b. Фіксація гіпсовою пов'язкою в положенні розгинання в ліктьовому суглобі під кутом 140°

c. Імобілізація гіпсовою пов'язкою в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом $90-100^{\circ}$

d. Оперативне лікування (остеосинтез за Вебером)

e. Імобілізація гіпсовою пов'язкою в положенні згинання в ліктьовому суглобі під кутом 60°

5. У яких випадках група інвалідності встановлюється "безстроково"?

a. Для осіб з неоартрозом плечової або стегнової кісток, який викликає сильний біль, обмежує рухливість і вимагає повторного хірургічного втручання

b. Для осіб з неправильно зрощеним переломом стегнової кістки, що призводить до значного обмеження рухливості кінцівки

c. Для осіб з відкритими переломами обох стегнових кісток, що потребують тривалої реабілітації, мають збільшений ризик розвитку ускладнень та вимагають постійної допомоги або спеціалізованих засобів для пересування

d. Для осіб з анатомічними дефектами, необоротними порушеннями функцій, включно з ампутацією кінцівок, та осіб, що досягли пенсійного віку

e. Для осіб з хронічними захворюваннями, які не піддаються лікуванню та прогресують, ведучи до стійкої втрати працездатності

6. Військовослужбовець віком 45 років отримав мінно-вибухову травму, пошкодження органів черевної порожнини. Як повинно бути проведено "повне відключення" прямої кишки при вогнепальних пораненнях її позаочеревинного відділу?

a. Колостома

b. Дводульна сигмостома або операція Гартмана

c. Сигмостома

d. -

е. Діагностична лапароскопія

7. Що таке спондилоартроз?

- а. Дегенеративний процес міжхребцевого диску
- б. Дегенерація фіброзного кільця міжхребцевого диску з його розривом і утворенням протрузії
- с. Дегенеративний процес фіброзного кільця міжхребцевого диску
- д. Дегенеративний процес міжхребцевих суглобів хребта**
- е. Процес осифікації міжхребцевих зв'язок

8. Внаслідок ДТП пацієнт отримав удар по нижній третині лівого стегна, після чого не міг встати. Клінічно визначаються достовірні ознаки перелому: патологічна рухомість у незвичайному місці та крепітація кісткових уламків. На рентгенограмі лівого стегна у двох проєкціях виявлено уламковий перелом дистального метаепіфізу стегнової кістки зі зміщенням уламків. Ознак порушення кровопостачання та іннервації гомілки і стопи не виявлено. Який вид остеосинтезу показаний цьому пацієнтові відповідно до рекомендацій Асоціації остеосинтезу?

- а. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез
- б. Остеосинтез стрижневим апаратом зовнішньої фіксації
- с. Малоінвазивний остеосинтез пластиною з кутовою стабільністю**
- д. Остеосинтез титановими цвяхами
- е. Остеосинтез апаратом Ілізарова

9. Пацієнт віком 50 років шпиталізований до реанімаційного відділення після ДТП з діагнозом: закритий переломи діяфізів обох стегнових кісток, розрив селезінки, травматичний шок III ст. Які оперативні втручання повинні проводитись згідно з тактикою "Damage control"?

- а. Спленектомія. Скелетне витягіння
- б. Спленектомія. Гіпсові пов'язки
- с. Спленектомія. Інтрамедулярний остеосинтез
- д. Стабілізація загального стану пацієнта
- е. Спленектомія. Остеосинтез АЗФ**

10. У військово-медичний клінічний центр шпиталізований військовослужбовець віком 40 років із вогнепальним уламковим переломом середньої третини лівої стегнової кістки. Вогнепальне поранення отримав 2 міс тому. Під час огляду загальний стан пацієнта задовільний. Загальноклінічні аналізи в межах норми. На лівій кінцівці спостерігається апарат зовнішньої фіксації. На рентгенограмі стегна - багатоуламковий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням відламків. Рана на передній поверхні стегна 4х6 см, загоїлась вторинним натягом. Яка подальша тактика лікування?

- а. Демонтаж АЗФ, гіпсова лонгета
- б. Демонтаж АЗФ, скелетне витягіння
- с. Подальше лікування АЗФ
- д. Демонтаж АЗФ, заглиблений остеосинтез**
- е. Перемонтаж АЗФ

11. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на біль у лівому плечовому суглобі протягом 5-ти місяців. Під час надмірних навантажень у спортзалі, який вона регулярно відвідує, пацієнтку почав турбувати плечовий суглоб. Близько 1,5 місяця тому їй зробили субакроміальну лікувально-діагностичну блокаду, після чого вона протягом трьох тижнів проходила курси фізіотерапії, проте полегшення симптомів було мінімальним. Рентгенографія плечового суглоба не виявила жодних відхилень. МРТ плечового суглоба показує частковий внутрішньосуглобовий розрив ротаторної манжети лівого плечового суглоба. Пацієнтці проводять артроскопію лівого плечового суглоба, під час якої виявлено частковий розрив на 60% ширини сухожилка надостового м'яза. Яким має бути наступний етап лікування?

- а. Відновлення ротаторної манжети плечового суглоба**
- б. Артроскопічна декомпресія плечового суглоба
- с. Подальше консервативне лікування
- д. Дебридмент ротаторної манжети в поєднанні з артроскопічною декомпресією плечового суглоба
- е. Ендопротезування плечового суглоба

12. Внаслідок падіння на лівий бік з висоти власного зросту жінка віком 78 років не змогла самостійно піднятися. Під час шпиталізації виявлено: зовнішня ротація лівого стегна, вкорочення лівої кінцівки на 4 см, позитивний симптом прилиплої п'яти ліворуч. На рентгенограмі виявлено: субкапітальний перелом шийки стегнової кістки лівої кінцівки зі зміщенням уламків. Який вид лікування показаний у цьому разі відповідно до рекомендацій Асоціації остеосинтезу?

- a. Остеосинтез канюльованими гвинтами
- b. Тотальне ендопротезування кульшового суглоба**
- c. Остеосинтез PFNA
- d. Деротаційний чобіток
- e. Скелетне витягання

13. У новонародженого хлопчика, який годину тому народився природним шляхом в нормальний термін, виявлена деформація правої стопи. Під час обстеження виявлено: підшовне згинання надп'яtkово-гомількового суглоба, інверсія підтаранного суглоба, медіальний підвивих підтаранного та п'яtkово-кубовидного суглобів. Таке положення стопи не піддається пасивній корекції. Який найімовірніший діагноз?

- a. Вроджена плоскостопість
- b. Плосковальгусна деформація стопи
- c. Тарзальна коаліція
- d. Вроджена клишоногість**
- e. Metatarsus adductus

14. Що є найбільш ранньою рентгенологічною ознакою при деформуючому артрозі?

- a. Крайові кісткові розростання
- b. Зниження висоти щілини суглоба**
- c. Деформація хряща
- d. Кистоподібні просвітлення
- e. Деформація суглобових поверхонь

15. Пацієнт віком 41 рік отримав травму 3 тижні тому. Діагноз: політравма, закрита ЧМТ, струс головного мозку, закритий багатоуламковий перелом проксимального метаепіфізу лівої великогомілкової кістки АО 41-C2. Наразі пацієнту змонтовано апарат зовнішньої фіксації (АЗФ). Яка оптимальна тактика хірургічного лікування перелому великогомілкової кістки?

- a. Остеосинтез LC-DCP-пластиною медіальної колони великогомілкової кістки і звичайною пластиною латеральної колони**
- b. Остеосинтез LCP-пластиною медіальної колони великогомілкової кістки і звичайною пластиною латеральної колони
- c. Продовжувати лікування в АЗФ
- d. Остеосинтез DHS-системою з кістковою пластиною
- e. Остеосинтез LCP-пластиною медіальної колони великогомілкової кістки з кістковою пластиною

16. Який із видів пошкоджень меніска колінного суглоба найкраще піддається відновленню?

- a. Клаптевий розрив, що поширюється на центральну зону медіального меніска
- b. Горизонтальний розрив латерального меніска в білій зоні у чоловіка віком 55 років
- c. Застаріле дегенеративне пошкодження медіального меніска у чоловіка віком 65 років
- d. Вертикальний розрив медіального меніска у вигляді "ручки лійки", який розташований у білій зоні у жінки віком 24 роки
- e. Вертикальний розрив у червоній зоні медіального меніска у чоловіка віком 35 років**

17. Військовослужбовець віком 45 років наступив на невідомий вибуховий предмет, після чого був шпиталізований на II рівень медичної евакуації. Під час огляду спостерігається неповний відрив лівої нижньої кінцівки на рівні 1/3 гомілки, стопа бліда, пульсація на артеріях стопи відсутня. Під час ревізії рани виявлено ознаки травматичної ішемії великогомілкової артерії. Якого обсягу медичної допомоги потребує пацієнт на цьому рівні медичної евакуації?

- a. ПХО, МОС перелому великогомілкової кістки АЗФ на стрижневій основі
- b. ПХО, первинна ампутація в межах життєспроможних тканин**

- с. ПХО, первинна ампутація на рівні відриву
- д. ПХО, іммобілізація перелому великогомілкової кістки задньою гіпсовою шиною
- е. Туалет рани ведеться відкритим методом

18. До відділення політравми шпиталізований пацієнт після ДТП з діагнозом: політравма. Закрита травма живота. Розрив селезінки. Закритий перелом правої стегнової кістки (АО 3.3.C.3). Пацієнту виконано: лапаротомія, спленектомія, стабілізація перелому стегнової кістки апаратом зовнішньої фіксації. Планується металоостеосинтез (МОС) стегнової кістки пластиною та гвинтами. З анамнезу відомо, що пацієнт без супутньої патології, проте без призначення лікаря приймає клопідогрель в дозі 75 мг 1 р/д. Виберіть правильний варіант лікувальної тактики.

- а. Відміна клопідогрелю, призначення низькомолекулярного гепарину, МОС стегнової кістки не раніше ніж через 7 діб**
- б. Продовження прийому клопідогрелю, призначення низькомолекулярного гепарину, МОС стегнової кістки після стабілізації стану пацієнта
- с. Продовження прийому клопідогрелю, МОС стегнової кістки після стабілізації стану пацієнта
- д. Відміна клопідогрелю, призначення низькомолекулярного гепарину, МОС стегнової кістки не раніше ніж через 21 добу
- е. Відміна клопідогрелю, МОС стегнової кістки не раніше ніж через 7 діб

19. Яким кольором під час медичного сортування позначаються пацієнти, що потребують невідкладних оперативних втручань?

- а. Жовтим
- б. Зеленим
- с. Червоним**
- д. Сірим
- е. Чорним

20. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на біль у ділянці лівого кульшового суглоба, який посилюється під час рухів. Хворіє декілька років, попередні травми заперечує. Під час обстеження спостерігається: обмеження активних рухів у суглобі, пасивні рухи різко болючі, гіпотрофія м'язів стегна. Визначається привідна контрактура цього суглоба. На рентгенограмі виявлено звуження суглобової щілини, наявність крайових остеофітів, деформація голівки стегна, склероз субхондральних ділянок. Встановіть діагноз.

- а. Остеоартроз лівого кульшового суглоба**
- б. Ревматоїдний артрит
- с. Пухлина верхньої третини стегна
- д. Туберкульоз кульшового суглоба
- е. Поперековий радикуліт

21. Військовослужбовець під час бойового завдання отримав вогнепальне наскрізне уламкове поранення правого передпліччя. Лікування отримував на етапах медичної евакуації. Відповідно до чинної воєнної хірургічної доктрини, що роблять із первинним глухим швом після первинної хірургічної обробки у такого пацієнта?

- а. Не накладають**
- б. Накладають у перші 24 год з моменту поранення
- с. Накладають у перші 48 год з моменту поранення
- д. Накладають тільки на вхідний отвір
- е. Накладають тільки на вихідний отвір

22. З чим пов'язана безпосередня причина загрози життю пацієнта при травматичному шоці?

- а. З артеріальною кровотечею
- б. З численними переломами довгих трубчатих кісток
- с. З численними переломами плоских кісток
- д. З розладом мікроциркуляції в результаті метаболічного ацидозу**
- е. З венозною кровотечею

23. Укажіть правильну послідовність рентгенологічної ознаки асептичного некрозу голівки

стегнової кістки.

а. Нерівномірне звуження суглобової щілини, крайові кісткові розростання

б. Осередка висвітлення кісткової тканини, осередка остеопорозу, остеосклерозу

с. Поширені кісткові розростання, ознаки остеолізу

д. Розширення суглобової щілини, порушення контурів голівки стегнової кістки

е. -

24. Військовослужбовець віком 25 років отримав мінно-вибухове поранення правої стегнової кістки. Шпиталізований до стабілізаційного пункту в стані середньої тяжкості. Під час огляду виявлено: рвана рана на зовнішній поверхні стегна розміром 10x14 см, рана помірно кровоточить. У рані спостерігаються кісткові відламки. Яку медичну допомогу потрібно надати потерпілому?

а. Фасціотомія, апарат зовнішньої фіксації

б. ПХО рани, циркулярна гіпсова пов'язка

с. ПХО рани, апарат зовнішньої фіксації

д. Промивання рани, апарат зовнішньої фіксації

е. ПХО рани, шина Крамера

25. Військовослужбовець отримав вогнепальний перелом кісток гомілки. Якою буде тактика менеджменту рани з метою транспортної іммобілізації?

а. Виконати іммобілізацію шиною Дітеріхса

б. Зафіксувати гомілку фанерною шиною

с. Рану закрити асептичною пов'язкою та накласти шину Крамера від рівня дистальної третини стегна з фіксацією стопи

д. Накласти подвійний еластичний бинт

е. Зафіксувати гомілку і стопу драбинчастою шиною

26. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на постійний біль у шийному відділі хребта та відчуття оніміння в лівому плечі, які посилюються під час фізичних навантажень. Під час обстеження відзначаються обмеження рухів та напруження м'язів шийного відділу хребта, слабкість лівої руки. На МРТ виявлено звуження міжхребцевої щілини хребців С3-С4, наявність випинання диска С3-С4 до 2 мм, зміщення тіла хребця С4 становить 3 мм допереду. Встановіть діагноз.

а. Деформуючий спондиліоз шийного відділу хребта

б. Кила диска хребців С3-С4 з нестабільністю хребця на цьому рівні

с. Кила диска хребців С3-С4

д. Виражена нестабільність на рівні хребців С3-С4

е. Міозит

27. Військовослужбовець віком 40 років отримав різану рану задньої ділянки лівого колінного суглоба. Виникла інтенсивна фонтануюча кровотеча яскраво-червоного кольору. Пальцевим притисненням стегнової артерії в паху кровотечу тимчасово зупинено, накладена пов'язка, яка миттєво просякла кров'ю, вирішено накласти на стегно турнікет та транспортувати до хірургічного відділення. На який максимальний термін допустиме накладання джгута?

а. До зупинки кровотечі

б. 2 год

с. 1 год

д. 30 хв

е. 8 год

28. Пацієнт віком 25 років шпиталізований до травматологічного відділення після ДТП з діагнозом: закритий незрощений перелом діяфізу лівої плечової кістки в н/З, ЧМТ, забій головного мозку. Травма відбулась 3 міс тому. Під час об'єктивного обстеження відзначається патологічна рухомість в н/З лівого плеча. На рентгенограмі ознаки незрощеного перелому. Яку лікувальну тактику потрібно застосувати для цього пацієнта?

а. Апарат зовнішньої фіксації

б. Накістковий остеосинтез

с. Кісткова пластина, гіпсова пов'язка

д. Кісткова пластина, накістковий остеосинтез

е. Кісткова пластина, інтрамедулярний остеосинтез

29. Чоловік віком 40 років, скаржиться на біль у попереку. Під час огляду виявлено: поперековий лордоз збільшений, слабкість і парестезія нижніх кінцівок. На рентгенограмах відзначається зсув хребця L4 уперед на 75% тіла (спондилолістез). Який метод лікування є доцільним у цьому випадку?

а. Хірургічний

б. Паравертебральне введення стероїдних протизапальних засобів

с. Протизапальне лікування нестероїдними препаратами

д. Фізіотерапевтичний

е. Фіксація поперекового відділу хребта корсетом

30. Під час огляду пораненого на сортувальному майданчику медичної роти, евакуйованого машиною з поля бою, встановлено: кульове поранення отримав 6-7 год тому, праве плече деформоване, значно вкорочене. Пов'язка в його середній третині помірно просякла кров'ю. Після зняття пов'язки на задній латеральній поверхні плеча - вхідний отвір, а на передній медіальній поверхні - вихідний отвір ранового каналу. Права кисть зависла, активне розгинання кисті і основних фаланг відсутнє. Під час надання першої медичної допомоги стрільцем-санітаром іммобілізація не була виконана. Які неврологічні структури уражені?

а. Пошкодження нижнього стовбура плечового сплетіння

б. Пошкодження ліктьового нерва

с. Пошкодження верхнього стовбура плечового сплетіння

д. Пошкодження променевого нерва

е. Пошкодження серединного нерва

31. Чоловік віком 25 років самостійно звернувся до лікаря зі скаргами на біль у правому над'яtkово-гомiлковому суглобі після травми, отриманої 10 днів тому. Під час обстеження шкіра не змінена, незначний набряк. Наявний біль під час пальпації зовнішньої та внутрішньої кісточки правої гомілки. Розладів чутливості не виявлено. Пульсація на магістральних артеріях збережена. Після рентгенологічного обстеження виявлено перелом малогомілкової кістки на рівні дистального міжгомілкового синдесмозу та підвигих стопи назовні. Яке лікування є найдоцільнішим?

а. Фіксація довгою гіпсовою лонгетою

б. Закрите вправлення та зовнішня гіпсова фіксація

с. Фіксація короткою гіпсовою лонгетою

д. Відкрита репозиція та внутрішня фіксація

е. Апарат зовнішньої фіксації

32. У пацієнтки, хворої на гонартроз, після внутрішньосуглобового введення флостерону через тиждень посилився біль у суглобі, він збільшився в об'ємі, з'явилася згинальна контрактура. Яку патологію можна запідозрити і яку лікувальну тактику обрати в цьому разі?

а. Неспецифічний артрит, зробити пункцію суглобу, посіяти його вміст на наявність мікроорганізмів, промити суглоб антисептичним розчином, призначити антибіотики після виявлення мікробного росту

б. Загострення артрозу, призначити протизапальну терапію

с. Загострення артрозу, призначити протизапальну фізіотерапію

д. Загострення артрозу, зробити пункцію суглоба, призначити лікування антибіотиком широкого спектру дії

е. Загострення артрозу, провести іммобілізацію суглоба

33. Якою аббревіатурою позначається протокол ультразвукового обстеження біля ліжка пацієнта, призначений для виявлення перитонеальної рідини, перикардіальної рідини, пневмотораксу та гемотораксу у пацієнта після травми?

а. BLUE

б. FALLS

с. FAST

д. RUSH

е. SESAME

34. Що є джерелом болю під час артрозу суглоба?

- a. Механічне подразнення хрящової поверхні суглоба
- b. Механічне подразнення больових рецепторів, що розташовані в капсулі суглоба та синовіальній оболонці**
- c. Руйнований хрящ суглоба з утворенням дефектів
- d. Збільшення тиску синовіальної рідини
- e. Збільшення сили тертя між суглобовими поверхнями внаслідок недостатньої кількості синовіальної рідини

35. Яка найчастіша причина смерті поранених на полі бою, яку можна попередити?

- a. Інфекційні ускладнення, гангрена
- b. Проникні поранення грудної та черевної порожнини
- c. Напружений пневмоторакс
- d. Порушення прохідності дихальних шляхів, поранення органів грудної та черевної порожнини
- e. Масивна кровотеча з кінцівки**

36. У пацієнта віком 38 років після дорожньо-транспортної пригоди діагностовано закритий перелом обох стегнових кісток, забій головного мозку, тупа травма живота, шок III ст. Визначте актуальну тактику лікування.

- a. Протишокова терапія, накістковий остеосинтез обох стегнових кісток
- b. Протишокова терапія, інтрамедулярний остеосинтез обох стегнових кісток
- c. Протишокова терапія, скелетне витягіння за обидві стегнові кістки
- d. Накістковий остеосинтез обох стегнових кісток в ургентному порядку
- e. Протишокова терапія, стабілізаційний апарат зовнішньої фіксації**

37. За даними клініко-інструментальних обстежень пацієнту з кататравмою, встановлено попередній діагноз: поєднана травма. Закрита черепно-мозкова травма: струс головного мозку (клінічно). Закрита травма грудної клітки: переломи IV, V, VI, VII ребер справа; великий правобічний пневмоторакс (за даними рентгенографії). Закрита травма живота (FAST позитивний). Відкритий перелом II ст. н/З правої стегнової кістки. Закритий перелом в/З лівої великогомілкової кістки. Якій з травмованих анатомічних ділянок потрібно надати пріоритет при виконанні оперативних втручань та маніпуляцій?

- a. Голова
- b. Живіт
- c. Ліва гомілка
- d. Грудна клітка**
- e. Праве стегно

38. Чоловік віком 35 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на біль та набряк правого коліна протягом останніх трьох днів. Пацієнт може пересуватися, але під час ходи біль у коліні посилюється. Під час огляду виявлено: температура тіла - 39,3°C, праве коліно гіперемоване, тепле на дотик та болюче, напружений синовіт. Під час пальпації позитивний симптом балотування надколінка. Яке з нижченаведених діагностичних досліджень колінного суглоба є найдоцільнішим?

- a. Артроскопія
- b. Артроцентез**
- c. Рентгенограма
- d. МРТ
- e. КТ

39. У травматологічне відділення переведено пацієнта з переломами передпліччя та стегнової кістки на 4 добу після ДТП. Загальний стан пацієнта задовільний. Показники життєво важливих функцій організму наближаються до нормальних. Який період травматичної хвороби у цього пацієнта?

- a. Термінальний стан
- b. IV період
- c. I період - гострий
- d. II період (нестійкої адаптації)**

е. III період

40. Військовослужбовець отримав вогнепальне кульове поранення правої половини грудної клітки та лівої нижньої кінцівки. Побратимами був наданий базовий рівень медичної допомоги, евакуйований до медичного пункту батальйону. Яка допомога буде надана постраждалому на цьому етапі евакуації?

- a. Перша медична
- b. Спеціалізована медична
- c. Кваліфікована медична
- d. Перша лікарська**
- e. Реабілітаційна

41. У яких площинах вимірює рухи методика визначення рухів в суглобах за системою SFTR?

- a. Пряма, фронтальна, трансверзальна, ротаційна
- b. Пряма, поперечна, горизонтальна, осьова
- c. Сагітальна, фронтальна, трансверзальна, ротаційна**
- d. Сагітальна, фронтальна, горизонтальна, осьова
- e. Пряма, фронтальна, горизонтальна, ротаційна

42. У пацієнтки віком 53 роки діагностовано ревматоїдний артрит з ураженням колінних та ліктьових суглобів, суглобів кистей і стоп - II стадія (продуктивно-деструктивний панартрит), ексудативно-проліферативна фаза. Яка ортопедична корекція рекомендована для лікування цієї пацієнтки?

- a. Тотальна синовіокапсулектомія, редресация, видалення панусу**
- b. Видалення остеофітів, менісків, хряща
- c. Артроліз, хейлектомія
- d. Артропластика, ендопротезування
- e. Атродез

43. Пацієнт віком 58 років виписується зі стаціонару, де йому 6 днів тому виконали операцію ендопротезування кульшового суглоба з приводу диспластичного остеоартриту IV ступеня. Які рекомендації з реабілітації є недоречними?

- a. Повне навантаження через 1-1,5 міс після цементного ендопротезування
- b. Терапевтичні вправи під наглядом фізичного терапевта
- c. Рання ходьба без милиць**
- d. Повне навантаження через 2-2,5 міс після безцементного ендопротезування
- e. Щоденні вправи пасивних рухів у суглобах кінцівок

44. У новонародженого була діагностована дисплазія кульшових суглобів, призначене лікування, яке проводилося матір'ю під наглядом лікарів поліклініки. В тримісячному віці на рентгенограмі виявлено, що кут скошеності даху вертлюгової западини становить 40° праворуч і 35° ліворуч, ядра окостеніння голівок стегнових кісток відсутні, розриву ліній Шентона та Кальве немає. Який попередній діагноз у дитини?

- a. Вроджений вивих правого стегна
- b. Двобічний вивих кульшових суглобів
- c. Дисплазія правого кульшового суглоба
- d. Остеохондропатія голівок стегнових кісток
- e. Двобічна дисплазія кульшових суглобів**

45. Коли здійснюють остеосинтез в умовах політравми при поєднанні пошкодження кісток опорно-рухової системи з травмою внутрішніх органів?

- a. Після операцій на внутрішніх органах і стабілізації життєвих функцій організму**
- b. Після стабілізації пораненого
- c. Одночасно з проведенням протишокових заходів
- d. Одночасно з оперативним втручанням з приводу пошкодження внутрішнього органу
- e. Одночасно з проведенням протишокових заходів та оперативним втручанням з приводу пошкодження внутрішнього органу

46. Пацієнт віком 30 років шпиталізований до приймального відділення без свідомості, з

діагнозом: кататравма. Які ключові методи діагностики потрібно застосувати для пацієнта?

- a. МРТ головного мозку
- b. Рентгенографія органів грудної порожнини
- c. Рентгенографія кісток таза
- d. КТ-скринінг**
- e. Урографія

47. Який спосіб фіксації доцільно застосовувати в разі перелому гомілки з незначним зміщенням уламків, який супроводжується компартмент-синдромом?

- a. Гіпсовою шиною
- b. Накістковою мостовидною пластиною
- c. Накістковою пластиною
- d. Апаратом зовнішньої фіксації**
- e. Інтрамедулярним блоковим стрижнем

48. Дівчину віком 19 років шпиталізували після травми правого коліна під час катання на роликах. Пацієнтка розповідає, що відчула раптовий сильний біль у коліні під час падіння. Самостійно підвестися не змогла. Під час огляду виявлено набряк та деформацію правого коліна, обмеження під час спроби згинання-розгинання. Рентгенологічно спостерігається уламковий перелом надколінка. Окрім введення анальгетиків, яке лікування рекомендовано пацієнтці?

- a. Відкрите вправлення надколінка
- b. Закрите вправлення надколінка
- c. Остеосинтез спицями і серкляжем**
- d. Артроскопія
- e. Медіалізація горбистості великогомілкової кістки

49. Під час детального огляду пораненого встановлено локалізацію кровотечі з внутрішньої поверхні середньої третини плеча. Якою повинні бути подальші дії для зупинки кровотечі?

- a. Оцінити, чи є кровотеча "масивною", і залежно від результату використати необхідний метод**
- b. Використати оклюзійну пов'язку з одночасним застосуванням антибіотиків
- c. Накласти тиснучу пов'язку в ділянці середньої третини плеча
- d. Максимально швидко накласти турнікет за принципом "максимально високо-максимально туго"
- e. Застосувати тампонаду

50. Пацієнтка віком 20 років шпиталізована з місця ДТП, права нижня кінцівка іммобілізована шинами Крамера. Свідомість сплутана, шкірні покриви бліді з ціанотичним відтінком. Пульс - 120/хв, АТ - 70/50 мм рт. ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерігається гіпорексія, гіпотонія м'язів. Який патологічний стан розвинувся у цієї пацієнтки?

- a. Травматичний шок III ст.
- b. Травматичний шок II ст.**
- c. Кома помірна
- d. Травматичний шок I ст.
- e. Кома термінальна

51. Пацієнта віком 26 років шпиталізовано із закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, закритою травмою живота, відкритим переломом кісток лівої гомілки, нестабільною гемодинамікою, ШКГ - 8 балів, запахом алкоголю з ротової порожнини. Пацієнт транспортований в операційну, розпочато заходи ресусцитації. Рентгенографію яких локалізацій потрібно виконати першочергово?

- a. Голови, лівої гомілки
- b. Таза, лівої гомілки
- c. Грудної клітки, таза**
- d. Голови, таза
- e. Лівої гомілки, грудної клітки

52. Укажіть обсяг медичної допомоги в "червоній зоні" у разі мінно-вибухової травми та

ампутації стопи і надп'яtkово-гомiлкового суглоба.

а. Детальний огляд ураженого сегмента та пораненого і надання максимального обсягу медичної допомоги

б. Накладення асептичної пов'язки, знеболення, антибіотикопрофілактика, іммобілізація кінцівки транспортною шиною

с. Накладення турнікету в порядку само- або взаємодопомоги

д. Накладення асептичної пов'язки, знеболення та іммобілізація кінцівки

е. Накладення асептичної пов'язки, внутрішньовенне введення сольових розчинів, попередження розвитку шоку та іммобілізація кінцівки

53. Пацієнт скаржиться на біль у колінному суглобі, що посилюється під час спуску сходами, періодичні блокади в колінному суглобі. Симптоми Байкова та Чакліна позитивні. Який найімовірніший діагноз?

а. Пошкодження колатеральних зв'язок

б. Пошкодження менісків колінного суглоба

с. Перелом наколінка

д. Пошкодження схрещених зв'язок

е. Остеоартроз колінних суглобів

54. До військово-польового шпиталю шпиталізовано військовослужбовця з діагнозом: вогнепальне сліпе поранення м'яких тканин с/3 правого стегна, закритий перелом с/3 обох кісток правої гомілки зі зміщенням фрагментів, травматичний шок І ст. На попередньому етапі евакуації пацієнтові виконана іммобілізація переломів задньою гіпсовою шиною, хірургічна обробка рани правого стегна, інфузійна терапія розчинами кристалоїдів. На 2 добу больовий синдром у правій гомілці значно посилюється, пацієнт відзначає оніміння пальців правої стопи. Під час пальпації виявлено: напруженість м'яких тканин правої гомілки, послаблення пульсації на А) *dorsalis pedis* та А) *tibialis posterior*. Яке ускладнення розвинулося у пораненого?

а. Компресійно-ішемічна нейропатія великогомілкового нерва

б. Хронічний компартмент-синдром

с. Альгодистрофія Зудека

д. Гострий компартмент-синдром

е. Мезентеріальний тромбоз

55. Лікар, оглядаючи пацієнтку віком 35 років з підозрою на перелом лівого передпліччя, виявив локальну болючість у середній третині передпліччя, набряк та крепітацію уламків. Передпліччя деформоване. Активні рухи в променево-зап'ястковому та ліктьовому суглобах обмежені через біль. Який із симптомів найхарактерніший для перелому?

а. Гематома

б. Локальна болючість

с. Крепітація уламків

д. Набряк і деформація

е. Відсутність рухів у суглобі

56. Сержант віком 45 років внаслідок руйнування будинку отримав множинні травми: синдром тривалого стиснення обох нижніх кінцівок, множинні переломи кісток обох гомілок, переломи обох стегнових кісток. Постраждалого витягнуто з-під уламків будинку через 6 год, на місці катастрофи накладено турнікети на обидві нижні кінцівки на рівні верхньої третини стегна. Під час огляду спостерігається: шкірні покриви бліді, АТ - 100/30 мм рт. ст., пульсація на а. *dorsalis pedis* після зняття джгутів не визначається, тактильна і больова чутливість у дистальних відділах нижніх кінцівок відсутня, активні та пасивні рухи в колінних та надп'яtkово-гомiлкових суглобах неможливі. Яка тактика лікування?

а. Термінова ампутація обох нижніх кінцівок вище джгута

б. Гіпербарична оксигенація

с. Інфузійна терапія з метою стабілізації артеріального тиску

д. Стабілізація переломів нижніх кінцівок, протишоківі заходи

е. Детоксикаційна інфузійна терапія, форсований діурез

57. Пацієнт віком 45 років шпиталізований до лікарні. Під час обстеження йому встановлено

діагноз: черепно-мозкова травма, забій головного мозку, відкритий перелом лівої гомілки зі зміщенням уламків. Який вид травми у пацієнта?

a. Монофокальна

b. Поєднана

c. Комбінована

d. Множинна

e. Поліфокальна

58. Використання хірургічної концепції "Damage control surgery" показано пораненим із важкими та вкрай важкими травмами. Що є основним лейтмотивом цієї хірургічної тактики лікування?

a. Основні хірургічні операції виконуються одноетапно

b. Розподіл хірургічного лікування на етапи для збереження життя пораненого шляхом скорочення обсягу, терміну виконання і травматичності першої операції з остаточним відновленням органів та структур після стабілізації систем життєзабезпечення

c. Хірургічні втручання виконуються одноетапно в III періоді травматичної хвороби

d. Усунення життєзагрозливих станів із максимальною діагностикою всіх органів та систем і їх одномоментне лікування в III періоді травматичної хвороби

e. Розподіл хірургічних втручань за пріоритетом із одноетапним хірургічним лікуванням в I періоді травматичної хвороби

59. Для визначення осі нижньої кінцівки у положенні пацієнта лежачи лікар розташував вимірювальну стрічку по передній поверхні кінцівки. Які анатомічні орієнтири свідчитимуть про фізіологічність осі кінцівки?

a. Великий вертлюг, наколінник та зовнішня кісточка

b. Передньо-верхня ость здухвинної кістки, середина надколінка та перший міжпальцевий проміжок стопи

c. -

d. Великий вертлюг, щілина колінного суглоба та зовнішня кісточка

e. Гребінь здухвинної кістки, зовнішній край надколінка, внутрішня кісточка

60. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на виражений біль у суглобах кистей, ранкову скутість рухів протягом 2-3 год. Хворіє 6 років. Об'єктивно спостерігається: симетричне враження суглобів кистей, їх деформація, підвихи, гіпотрофія міжкісткових м'язів. В аналізі крові: еритроцити - $3,6 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $10,8 \cdot 10^9/л$, ШОЕ - 52 мм/год, С-реактивний білок - 47 Од/мл, ревматоїдний фактор - 114 Од/мл. Який найімовірніший діагноз?

a. Псоріатичний артрит

b. Ревматоїдний артрит

c. Хвороба Лайма

d. Подагричний артрит

e. Системний червоний вовчак

61. Який захід не включає тактика хірурга під час відкритих переломів обох стегнових кісток та стані травматичного шоку II ступеня?

a. Первинну хірургічну обробку ран

b. Боротьбу з шоком і зупинку кровотечі

c. Накладення апаратів зовнішньої фіксації

d. Ранній стабільний інтрамедулярний остеосинтез одразу обох стегон

e. Профілактику гнійних ускладнень

62. Яких невідкладних заходів потрібно вжити для пацієнта віком 27 років, який отримав закритий перелом груднини, множинний односторонній перелом ребер від 2 до 6 праворуч, та у якого спостерігається напружений пневмоторакс?

a. Дренування плевральної порожнини і стабілізація переломів груднини та ребер

b. Введення анальгетиків

c. Штучна вентиляція легень

d. Пункція плевральної порожнини

e. Загруднинна новокаїнова блокада

63. Чоловік віком 56 років отримав травму під час ДТП. Після надання першої медичної допомоги шпиталізований до лікарні. Загальний стан пацієнта середньої важкості. ЧСС - 100/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Під час об'єктивного обстеження діагностовано відкриті переломи с/3 правої та лівої стегнових кісток, закритий перелом діафізу правої гомілки. Яку лікувальну тактику потрібно застосувати для цього пацієнта?

a. Накладання гіпсових пов'язок

b. Остеосинтез переломів апаратом зовнішньої фіксації

c. Скелетне витягіння

d. Інтрамедулярний остеосинтез

e. Накістковий остеосинтез

64. Укажіть характерну рентгенологічну картину для туберкульозного спондиліту.

a. Наявність зміщення суміжних хребців за шириною

b. Деструкція центральної частини хребця

c. Деструкція суглобових відростків

d. Крайова деструкція замикаючих пластинок суміжних хребців і міжхребцевого диску

e. Клиноподібна деформація тіла хребця

65. Дівчина віком 19 років впала на ковзанці на випрямлену руку. Звернулася по медичну допомогу до лікарні невідкладної допомоги. Обстежена клініко-інструментально, встановлено діагноз: закритий перелом дистального епіметафізу правої променевої кістки без зміщення фрагментів. Черговим лікарем-травматологом зроблено підрахунок балів ISS - 10 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

a. Тяжкому

b. Незначному

c. Вкрай тяжкому

d. Легкому

e. Середньому

66. За 30 хв після звільнення з-під завалу військовослужбовець почав виявляти скарги на біль у лівій гомілці та стопі, порушення чутливості та опороспроможності лівої нижньої кінцівки. Шпиталізований до медичної роти. Об'єктивно спостерігається: ліва гомілка напружена, розлита підшкірна гематома, під час пальпації виявлено болючість м'яких тканин, патологічна рухомість і кісткова крепітація не визначаються. Пульсація артерій у ділянці лівої стопи послаблена, гіпостезія в ділянці пальців лівої стопи. Підфасціальний тиск дорівнює діастолічному. Якою повинна бути подальша тактика лікування?

a. Призначення діуретиків і динамічний нагляд

b. Динамічний нагляд

c. Аспірація гематоми лівої гомілки

d. Імобілізація кінцівки задньою гіпсовою шиною

e. Невідкладна фасціотомія

67. Військовослужбовець був шпиталізований на II рівень медичної евакуації із вогнепальним кульовим сліпим пораненням м'яких тканин правої гомілки. Під час огляду виявлено: на задній поверхні в ділянці с/3 гомілки спостерігається вогнепальна рана розміром 4x3 см, краї рани осаджені, під час дотику інструментом не чутливі, рановий канал лінійний, заповнений кров'яними згустками та уривками м'яких тканин. Наявність якої зони вогнепальної рани хірург враховує під час висічення нежиттєспроможних тканин у такого пацієнта?

a. Демаркації

b. Ранового каналу

c. Первинного ранового некрозу

d. Відриву

e. Вторинного ранового некрозу

68. Укажіть правильну послідовність періодів перебігу травматичної хвороби.

a. -

b. Реанімаційний період, період адаптації, період розвитку ускладнень, період стабілізації життєво важливих функцій

с. Період шоку, період нестійкої адаптації, період розвитку ускладнень, період повної стабілізації життєво важливих функцій

д. Догоспітальний період, реанімаційний період, період інтенсивної терапії, період спеціалізованого лікування

е. Гострий період, період нестійкої адаптації, період максимальної можливості розвитку ускладнень, період повної стабілізації життєво важливих функцій

69. Укажіть основні патогенні фактори артрозу.

а. Аліментарна недостатність хондроїтінсульфітів у харчовому раціоні

б. Надмірна вага тіла

с. Порушення гормонального балансу організму

д. Порушення обміну речовин з надмірним накопиченням сечової кислоти в крові

е. Нерівномірний характер розподілу напруження суглобових поверхонь з їхньою концентрацією на окремих ділянках

70. Пацієнт віком 26 років отримав травму під час гри у футбол (улюблене хобі) 2 місяці тому і до цього часу лікувався консервативно з відносно позитивним ефектом (рухи в колінному суглобі відновилися повністю, блоки не турбують, біль перестав турбувати, набряку немає, м'язи нижньої кінцівки відновилися до рівня контрлатеральної кінцівки, однак декілька разів на тиждень турбує нестійкість коліна в побуті). На МРТ не візуалізується передня схрещена зв'язка та наявний паракапсулярний розрив латерального меніска за типом "ручки лійки". Оберіть оптимальний метод лікування в цьому разі.

а. Продовження консервативного лікування з акцентом на зміцнення м'язів стегна на кінцівці, що ушкоджена

б. Пожиттєве зниження фізичної активності та заміна хобі на менш активне з постійним користуванням ортезом для додаткової стабільності коліна

с. Двоетапне оперативне втручання: шов латерального меніска з наступним виконанням аутопластики передньої схрещеної зв'язки з артроскопічною асистенцією

д. Аутопластика передньої схрещеної зв'язки та шов латерального меніска з допомогою артротомії

е. Аутопластика передньої схрещеної зв'язки з артроскопічною асистенцією та шов латерального меніска

71. Пацієнтка віком 38 років протягом року відзначає слабкість, пітливість, субфебрильну температуру тіла, біль і обмеження рухів у лівому колінному суглобі. Об'єктивно спостерігається: положення лівої кінцівки вимушене, колінний суглоб збільшений в об'ємі, болючий під час пальпації, рухи обмежені. Проба Манту з 2 ТО - папула 25 мм. Який попередній діагноз?

а. Туберкульозний гоніт

б. Остеоартрит

с. Посттравматичний артрит

д. Пухлина колінного суглоба

е. Ревматоїдний артрит

72. Шпиталізовано потерпілого віком 35 років із мінно-вибуховою травмою правої нижньої кінцівки в ділянці гомілки. На стегні ураженої кінцівки в середній третині був турнікет. Із запису на бирці турнікету встановлено, що він накладений на кінцівку близько 6,5 год тому. Пацієнт у свідомості. Під час огляду виявлено: виражений деревоподібний набряк кінцівки, оніміння кінцівки нижче колінного суглоба, тактильно відзначається гіпотермія дистальних відділів гомілки та стопи, пульс на кінцівці дистальніше місця накладення турнікета не визначається. Локально визначається вогнепальна рана гомілки із рваними некротичними краями, які не кровоточать, дном рани є кісткові фрагменти. Якою повинна бути подальша хірургічна тактика лікування?

а. Зняття турнікета, хірургічна обробка ран, фіксація фрагментів кісток гомілки апаратом зовнішньої фіксації

б. Ампутація нижньої кінцівки на рівні проксимального відділу гомілки після зняття турнікета

с. Первинна хірургічна обробка ран без зняття турнікета

d. Ампутація нижньої кінцівки без зняття турнікета вище його рівня

e. Зняття турнікета, первинна хірургічна обробка ран, фасціотомія гомілки

73. Пацієнт віком 23 роки, професійний футболіст, скаржиться на різкий біль і набряк у правому колінному суглобі. Із анамнезу відомо, що травму отримав 2 дні тому під час гри внаслідок різкого гальмування і падіння. За результатами рентгенографії: патологічних змін не виявлено. На МРТ: неповний розрив передньої схрещеної зв'язки і пошкодження переднього рогу медіального меніска. Яка тактика лікування буде найбільш доцільна?

a. Хірургічне лікування не показане

b. Артроскопічна пластика передньої схрещеної зв'язки та парціальна резекція медіального меніска

c. Артроскопічна пластика передньої схрещеної зв'язки та ушивання медіального меніска

d. Парціальна резекція медіального меніска без пластики передньої схрещеної зв'язки

e. Артроскопічна пластика передньої схрещеної зв'язки без реконструкції меніска

74. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на біль у ділянці лівого стегна, який посилюється вночі. Точно локалізувати місце болю він не може. За рекомендацією сімейного лікаря приймає 1 грам ацетилсаліцилової кислоти на ніч, що полегшує больові відчуття. На КТ лівого кульшового суглобу в ділянці дуги Адамса визначається просвітлення овальної форми, розмірами до 1 см, оточене смужкою склерозу. Кісткова тканина навколо гнізда пухлини не змінена. Який діагноз у цього пацієнта?

a. Фіброзна дисплазія

b. Остеогенна саркома

c. Кісткова кіста

d. Остеомієліт Гарре

e. Остеоїд-остеома

75. Військовослужбовець отримав удар трубою в ділянку передпліччя. Скаржиться на значний постійний біль, який не стихає після знеболення наркотичними анальгетиками. Спостерігається суттєвий набряк тканин, активні рухи пальців кисті не можливі, пасивні рухи супроводжуються нестерпним болем. Пульс на променевої артерії зберігається. Який попередній діагноз?

a. Тромбоз плечової артерії

b. Компартмент-синдром

c. Ушкодження плечової артерії

d. Вивих кісток передпліччя

e. Тракційне ураження плечового сплетення

76. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на біль у лівому стегні, який з'явився близько тижня тому. З анамнезу відомо: хворіє на хронічний остеомієліт лівого стегна протягом 10-ти років після уламкового поранення. Об'єктивно спостерігається: на зовнішній поверхні стегна є кілька кратероподібних втягнутих і лінійних рубців як наслідок нориць і перенесених оперативних втручань. Також спостерігається ділянка гіперемії шкіри, набряклість та болючість цієї ділянки, у центрі пальпованого інфільтрату наявне розм'якшення. Температура тіла - 37,8^oC. На рентгенограмі в дистальному метафізі стегнової кістки визначається порожнина з вільно лежачим секвестром 1,5x2 см. Якою повинна бути подальша тактика лікування?

a. Ультразвукова кавітація секвестральної порожнини

b. Антибіотикотерапія, перев'язки щодня

c. Вакерапія, антибіотикотерапія

d. Фістулосеквестректомія

e. Апарат Ілізарова, антибіотикотерапія

77. Під час огляду новонародженого виявлено деформацію правої стопи, яка перебуває у положенні еквінуса, супінації, аддукції, варуса. Вивести стопу в правильне положення не вдається. Встановіть найімовірніший діагноз.

a. Артрогрипоз

b. Амніотичні перетяжки

c. Спастична клишоногість

d. Плоско-вальгусна деформація стопи

е. Правобічна вроджена клишоногість

78. Військовослужбовець отримав вогнепальний перелом середньої третини кісток гомілки. Що потрібно іммобілізувати з метою транспортної іммобілізації?

- a. Іммобілізація не потрібна, лише накладення турнікету або тиснучої пов'язки з закриттям рани стерильною пов'язкою
- b. Використати шину Крамера
- c. Іммобілізація гомілково-ступневого суглоба та ушкодженого сегмента
- d. Іммобілізація ураженого сегмента та двох суміжних суглобів**
- e. Іммобілізуємо лише поранений сегмент

79. Що застосовують для черезкісткового позаосередкового компресійно-дистракційного остеосинтезу?

- a. Гвинти
- b. Спиці 2 мм
- c. Спиці 3 мм**
- d. Стрижні
- e. Балки

80. Укажіть рентгенометричну величину нормального кута нахилу "даху" кульшової западини у дитини віком до 3-х міс.

- a. До 30°**
- b. До 50°
- c. До 10°
- d. До 40°
- e. До 45°

81. В яких структурах залягає первинний осередок специфічного запалення при туберкульозі кісток?

- a. Діафіз довгих трубчастих кісток
- b. -
- c. Кістковий мозок трубчастих кісток
- d. Метафіз та епіфіз довгих трубчастих кісток**
- e. Кортикальний шар проксимального відділу довгих трубчастих кісток

82. Що являє собою поняття травматична хвороба?

- a. Комплекс патологічних реакцій організму у відповідь на пошкодження та подальший розвиток травматичного процесу при політравмі**
- b. -
- c. Тяжкий стан постраждалого, який супроводжується порушенням життєво важливих функцій у вигляді травматичного шоку
- d. Одночасна травма органів опори та руху та магістральних судин і нервів
- e. Травматичне пошкодження в межах одного анатомо-функціонального утворення або в декількох місцях цього утворення

83. Сержант віком 35 років отримав травму внаслідок дії вибухової хвилі, впавши на бік. Шпиталізований до медичної роти 2 год тому. У свідомості, скаржиться на біль у нижніх відділах живота, самотійно ходити не може, ноги підняти сам не може. Пульс - 104/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Живіт під час пальпації м'який, болючий в нижніх відділах, пальпується збільшений у розмірах сечовий міхур. Під час пальпації спостерігається різка болючість та крепітація в ділянці сідничних кісток та кісток лона. Симптом "прилиплої п'яти" позитивний. Самостійно мочитися не може, на калитці спостерігається виражений набряк. Встановіть попередній діагноз.

- a. Розрив сечового міхура з пошкодженням уретри
- b. Перелом поперекового відділу хребта
- c. Розрив сечового міхура, перитоніт, перелом кісток тазу
- d. Перелом тазу, розрив уретри**
- e. Перелом кісток тазу, розрив сечового міхура

84. Пацієнтка віком 83 роки з варусним субкапітальним переломом шийки стегнової кістки отримала травму 2 доби тому під час щоденної прогулянки у дворі власного будинку. З анамнезу відомо, що пацієнтка 10 років хворіє на остеоартрит обох кульшових суглобів та 3 роки тому перенесла інфаркт міокарда, неодноразово проходить курси стаціонарного консервативного лікування. Виберіть метод лікування пацієнтки.

- a. Однополюсне ендопротезування ушкодженого кульшового суглоба у найближчий термін
- b. Тотальне ендопротезування ушкодженого кульшового суглоба у найближчий термін**
- c. Стабільно-функціональний металоостеосинтез інтрамедулярним стрижнем PFNA у найближчий термін
- d. Деротаційний чобіток протягом 30 діб з наступною вертикалізацією пацієнта та реабілітацією
- e. Скелетне витягання за надвиростки стегнової кістки протягом 30 діб з наступною вертикалізацією пацієнта та реабілітацією

85. До приймального відділення шпиталізовано потерпілого з місця дорожньо-транспортної пригоди без свідомості. АТ - 60/0 мм рт. ст., пульс - 120/хв. Після обстеження визначено закритий перелом середньої третини правої стегнової кістки, внутрішньочеревну кровотечу. На КТ мозку виявлено геморагічний забій лобної доли. В який термін необхідно виконати остеосинтез стегна апаратом зовнішньої фіксації?

- a. Після зупинки внутрішньочеревної кровотечі
- b. Відразу після надходження у лікарню
- c. Після зупинки зовнішньої кровотечі
- d. Безпосередньо після закінчення діагностичного процесу
- e. Після стабілізації гемодинаміки**

86. Як називається хірургічне втручання, метою якого є видалення сторонніх тіл, нежиттєздатних тканин, створення сприятливих умов для загоєння рани та попередження ранової інфекції?

- a. Вторинна хірургічна обробка рани
- b. Хірургічна обробка рани
- c. Обробка вогнепальної рани
- d. Первинна хірургічна обробка рани**
- e. Відстрочена хірургічна обробка рани

87. Військовий отримав кульове поранення в дистальну третину плеча. З поверхні рани спостерігається витікання артеріальної крові. Що потрібно зробити для зупинки кровотечі?

- a. Накласти турнікет на рівні верхньої третини плеча. Рану закрити асептичною пов'язкою**
- b. Рану закрити тугою асептичною пов'язкою і максимально зігнути кінцівку у ліктьовому суглобі
- c. На рану накласти туго асептичну пов'язку
- d. Накласти джгут на рівні ліктьового суглоба. Рану закрити тугою асептичною пов'язкою
- e. Накласти джгут на рівні верхньої третини плеча і тримати його протягом 6 год

88. До лікаря-травматолога звернулись батьки чотиримісячного хлопчика. Під час огляду виявлено помірний нахил голови ліворуч та поворот обличчя до протилежного боку. Визначається обмеження рухів у шийному відділі хребта. Лівий груднино-ключично-соскоподібний м'яз щільний і скорочений. У черевці м'язу пальпуються окремі щільні вузли. Встановіть попередній діагноз.

- a. Наслідки перелому ключиці під час пологів
- b. М'язова кривошия**
- c. В'ялий параліч
- d. Спастичний параліч
- e. Дисплазія шийного відділу хребта

89. У пацієнта віком 24 роки під час артроскопії колінного суглоба виявлене транسخондральне ушкодження меніска. Яка подальша лікувальна тактика?

- a. Видалити задній ріг до місця розриву
- b. Видалити передній ріг до місця розриву**

с. Лаваж колінного суглоба

д. Видалити весь меніск

е. Виконати зшивання меніска

90. В якому разі показане інтраартикулярне введення глюкокортикостероїдів під час лікування пацієнтів з остеоартритом?

а. При остеоартрозі 3-4 стадії як перший крок у лікуванні

б. Для усунення вираженого больового синдрому в суглобі

с. У разі, коли пацієнт з остеоартрозом має індекс маси тіла 32-34

д. Як перший крок при лікуванні запалення та болю в комбінації з нестероїдними протизапальними препаратами

е. В якості другої лінії терапії за неефективності нестероїдних протизапальних препаратів

91. Що таке вторинний снаряд, що завдає ураження при мінно-вибуховому пошкодженні?

а. Снаряд, який виник з навколишнього середовища внаслідок дії вибухової хвилі

б. Снаряд, який виник внаслідок дії вибухової хвилі з вибухового пристрою

с. -

д. Снаряд, який виник при дії вибухового пристрою

е. Снаряд, який виник внаслідок дії вибухового пристрою

92. Укажіть достовірну клінічну ознаку вродженого вивиху стегна у дитини віком до 3-х міс.

а. Обмеження внутрішньої ротації

б. Асиметрія кількості сідничних складок

с. Вкорочення нижньої кінцівки

д. Симптом Маркса-Ортолані

е. Обмеження відведення стегна

93. У пацієнтки, шпиталізованої до лікарні після падіння з висоти 4 м, виявлено рани в ділянці с/З обох гомілок розмірам 5х6 см, які рясно кровоточать. Осі гомілок викривлені. У ділянці ран визначається патологічна рухомість, кісткова крепітація. Пульс - 120/хв, ритмічний, слабкого наповнення, АТ - 80/60 мм рт. ст. Встановіть попередній діагноз.

а. Відкриті переломи в/З кісток обох гомілок. Травматичний шок III ст.

б. Відкриті переломи с/З кісток обох гомілок. Травматичний шок I ст.

с. Відкриті переломи с/З кісток обох гомілок. Травматичний шок II ст.

д. Відкриті переломи в/З кісток обох гомілок. Травматичний шок II ст.

е. Відкриті переломи с/З кісток обох гомілок. Травматичний шок III ст.

94. Чоловік віком 66 років був збитий електропотягом. Шпиталізований до відділення політравми із діагнозом: поєднана черепно-мозкова, торакальна, абдомінальна, скелетна травма, відкрита черепно-мозкова травма, інтракраніальна гематома, відкритий двобічний гемопневмомедіастинум, травматичний розрив печінки, селезінки. Травматичні ампутації обох нижніх кінцівок на рівні с/З стегон. Травматичний шок II-III ст. Бригадою політравми проведено підрахунок балів ISS - 66 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

а. Середньому

б. Важкому

с. Легкому

д. Вкрай легкому

е. Вкрай важкому (травма несумісна з життям)

95. Виберіть покази до хірургічного лікування асептичного некрозу голівки стегнової кістки.

а. Порушення функції статика та ходьби II ст.

б. -

с. Інтенсивний біль, що з'являється при навантаженні

д. Обмеження амплітуди рухів у кульшовому суглобі

е. Біль у суглобі, пересування за допомогою милиць, згинально-розгинальна контрактура в суглобі

96. Пацієнта, що отримав травми внаслідок ДТП (водій мотоцикла), доправлено до приймального відділення політравми з ознаками нестабільної гемодинаміки. Після

клінічно-інструментально обстеження та проведених заходів інтенсивної терапії в умовах операційної встановлено діагноз: поєднана травма. Закрита травма грудної клітки. Перелом VI, VII, VIII ребер справа. Відкритий II ст. (Gustilo-Anderson) уламковий перелом н/З правої стегнової кістки. Розрив лонного зчленування. Закритий трансфорамінальний перелом крижової кістки справа. Закритий вивих лівого стегна. Забійно-рвана рана лівої гомілки. Геморагічний шок III ст. Виберіть пріоритетну лікувальну процедуру в цьому клінічному випадку.

- a. Дренування правої плевральної порожнини за Бюлау
- b. Стабілізація перелому правої стегнової кістки
- c. Усунення вивиху лівого стегна
- d. ПХО ран правого стегна та лівої гомілки
- e. Стабілізація тазового кільця**

97. Пацієнт віком 53 роки звернувся до лікаря зі скаргами на біль у ділянці хребта, який турбує його протягом останніх 3 міс, наявність пухлиноподібного утворення нижче пупартової зв'язки на лівому стегні, яке з'явилося близько тижня тому. Об'єктивно спостерігається: пацієнт ходить за допомогою милиць, під час пальпації визначається болючість та набряклість у ділянці остистих відростків хребців L1 та L2. На рентгенограмі в ділянці тіл першого та другого поперекових хребців спостерігаються осередки деструкції овальної форми, які носять контактний "цілувальний" характер. Під час пункції пухлиноподібного утворення стегна евакуйовано 800 мл "холодного гною". Встановіть діагноз.

- a. Туберкульозний спондиліт**
- b. Ілеофеморальний тромбоз
- c. Остеогенна саркома стегнової кістки
- d. Гематогенний остеомієліт стегна
- e. Флегмона стегна

98. На I етапі медичної евакуації шпиталізовано важкопораненого військовослужбовця віком 36 років (водій БМП). Із анамнезу встановлено, що під час штурмових дій потерпілий наїхав на протитанкову міну 3 год тому. Загальний стан тяжкий. Об'єктивно виявлено: шкірні покриви та слизові оболонки бліді, холодні на дотик, свідомість потьмарена, АТ - 80/50 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв, ЧД - 20/хв. Індекс Альговера - 1,5. Локально спостерігається: відкриті множинні переломи плеснової та заплеснової кісток, н/З обох кісток гомілок з обох сторін. Обидві стопи холодні на дотик. Пульсація на артеріях стоп не визначається. Відповідно до шкали MESS якою є імовірність подальшої ампутації у цього пораненого?

- a. 40%
- b. 100%**
- c. 70%
- d. 30%
- e. 50%

99. У пацієнтки віком 54 роки виявлено закритий перелом кісток гомілки зі зміщенням уламків: перелом внутрішньої кістки на рівні суглобової щілини, перелом зовнішньої кістки на рівні синдесмозу, розрив синдесмозу та підвивих стопи назовні. Який вид лікування найдоцільніше застосувати у цьому разі?

- a. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез
- b. Закрита репозиція, гіпсова іммобілізація
- c. Скелетне витягання
- d. Відкрита репозиція, накістковий остеосинтез**
- e. Черезкістковий остеосинтез за Ілізаровим

100. Потерпілий отримав травму в результаті ДТП. Скаржиться на біль в ділянці тазу, найменші рухи ногами посилюють біль. Стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді. АТ - 100/60 мм рт. ст., ЧСС - 110/хв, задовільного наповнення. Деформація тазового кільця. Симптом прилиплої п'яти позитивний. З чим пов'язаний розвиток шоку у цього постраждалого?

- a. З порушенням кровообігу в нижніх кінцівках
- b. З ушкодженням кістковими відламками "кінського хвоста"
- c. З ушкодженням органів черевної порожнини

d. З масивною крововтратою із ушкодженої кісткової тканини й аферентною больовою і не больовою імпульсацією

e. З порушенням цілісності тазового кільця

101. Яка основа причина збільшення частки ускладнень при політравмі?

a. Зміщення відламків зламаних кісток

b. Знижений імунітет

c. Інтоксикація

d. Масивна крововтрата

e. Авітаміноз

102. Виберіть правильну послідовність стадій патогенезу асептичного некрозу голівки стегнової кістки.

a. Остеонекроз, порушення кровообігу, склероз, фіброз, контрактура суглоба

b. -

c. Остеонекроз, порушення кровообігу, фіброз, склероз, контрактура суглоба

d. Порушення кровообігу, остеонекроз, контрактура суглоба, склероз, фіброз

e. Порушення кровообігу, остеонекроз, фіброз, склероз, контрактура суглоба

103. Пацієнт віком 66 років скаржиться на біль та обмеження рухів у правому кульшовому суглобі. Під час огляду виявлено: незначна атрофія м'язів правого стегна та обмеження всіх рухів у суглобі (привідні контрактури). Пацієнту рекомендоване ендопротезування правого кульшового суглоба. Що з наведеного не є показанням до ендопротезування кульшового суглоба?

a. Незрощені переломи і хибні суглоби після перелому голівки стегнової кістки

b. Асептичний некроз голівки стегнової кістки

c. Остеоартроз кульшових суглобів (коксартроз) III-IV стадії

d. Остеоартрит кульшових суглобів I-II стадії

e. Хвороба Бехтерева з переважним ураженням кульшових суглобів

104. Пацієнт віком 40 років шпиталізований до відділення політравми після падіння з висоти 6 м. Після клініко-інструментального обстеження встановлено діагноз: поєднана торакальна, абдомінальна, скелетна травма; правобічний гемопневмоторакс, розрив селезінки, закриті переломи лонних кісток зі зміщенням фрагментів, розрив клубово-крижових зчленувань з обох сторін. З урахуванням діагнозу, яка черговість оперативних втручань показана пацієнту?

a. Лапаротомія, дренування плевральної порожнини за Бюлау, стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі

b. Дренування плевральної порожнини за Бюлау, лапаротомія, функціональний метод лікування пошкодження тазу

c. Стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі, лапаротомія, дренування плевральної порожнини за Бюлау

d. Дренування плевральної порожнини за Бюлау, лапаротомія, стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі

e. Стабілізація тазу АЗФ на стрижневій основі, дренування плевральної порожнини за Бюлау, лапаротомія

105. Вкажіть метод зупинки масивної кровотечі у вузловій ділянці.

a. Туга тиснуча пов'язка

b. Турнікет

c. Індивідуальний перев'язувальний пакет

d. Джгут

e. Тампонада

106. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на виражений біль у суглобах кистей, ранкову скутість рухів протягом 3 год. Хворіє 5 років. Об'єктивно спостерігається симетричне ураження суглобів кистей, їх деформація, підвихи, атрофія міжкісткових м'язів. В аналізі крові виявлено: еритроцити - $3,8 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $10,2 \cdot 10^9/л$, ШОЕ - 48 мм/год, С-реактивний білок - 42 Од/мл, ревматоїдний фактор - 114 Од/мл. Який попередній діагноз?

- a. Лайм-бореліоз
- b. Подагричний артрит
- c. Ревматоїдний артрит**
- d. Системний червоний вовчак
- e. Псоріатичний артрит

107. Згідно з концепцією TCCC (Tactical Combat Casualty Care), бойовий медик, який проводить медичне сортування поранених та потерпілих, повинен позначити (промаркувати) тих, хто потребує невідкладних оперативних втручань. Яким кольором потрібно маркувати таких потерпілих?

- a. Жовтим
- b. Червоним**
- c. Зеленим
- d. Сірим
- e. Чорним

108. Укажіть рентгенологічні ознаки, які можуть вказувати на злоякісну пухлину кістки.

- a. Остеофіти, звуження суглобового просвіту, субхондральний остеосклероз, деформація суглобових поверхонь кістки
- b. Нерівні та нечіткі контури осередка, розвиток деструкції кістки, локалізація у метафізі**
- c. Прогресуюча прозорість центру тіл хребців, зменшення щільності кісткової тканини, збільшення порожнин у кістці, патологічний перелом
- d. Симетричне ураження парних дрібних суглобів, навколосуглобовий остеопороз, звуження суглобових проміжків, контрактури, анкілоз
- e. Контури рівні, без ознак руйнування навколишніх тканин, рівномірна структура та щільність, відсутність остеолізу, облямівка остеосклерозу, відсутність інвазії в сусідні тканини

109. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 47 років з діагнозом: політравма, відкрита черепно-мозкова травма, розрив печінки, закритий перелом обох стегнових кісток. Яку тактику лікування потрібно застосувати для цього пацієнта?

- a. "Damage control"**
- b. Стабілізація загального стану пацієнта
- c. Оперативне лікування переломів
- d. Одночасне лікування всіх пошкоджень
- e. Лікування внутрішніх органів

110. Пацієнтка віком 23 років скаржиться на біль у лівому колінному суглобі, збільшення суглобу в об'ємі, обмеження рухів, кульгання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 7 місяців. На рентгенограмах колінного суглоба в прямій проекції у зовнішньому виростку великогомілкової кістки виявлено округлу тінь зниженої щільності. Як проявляється така зміна кісткової тканини на рентгенограмі?

- a. Дефект
- b. Деструкція**
- c. Періостит
- d. Остеопороз
- e. Гіперостоз

111. Жінка віком 44 роки потрапила у ДТП (пасажирка). Шпиталізована до відділення політравми з діагнозом: ЗЧМТ, забій головного мозку легкого ступеня, закриті переломи II-IV ребер зліва. Закритий неускладнений компресійний перелом тіла хребця Th12 I ст. Бригадою політравми проведено підрахунок балів ISS - 12 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

- a. Середньому
- b. Легкому**
- c. Незначному
- d. Вкрай важкому
- e. Важкому

112. Внаслідок вибуху цистерни з бензолом на хімічному заводі є загиблі та поранені у великій кількості (понад 50 осіб) з опіками, механічними травмами та отруєннями. Вкажіть основні елементи, які передбачає лікувально-евакуаційне забезпечення в цій ситуації.

- a. Надання медичної допомоги, евакуація, ізоляція
- b. Сортивання, евакуація, лікування
- c. Ізоляція, рятування, відновлення
- d. Сортивання, надання первинної медичної допомоги, евакуація**
- e. Сортивання, відновлення, рятування

113. Жінка віком 38 років знаходиться в автівці після аварійного зіткнення, підозра на травму шийного відділу хребта. Чим треба фіксувати шию та голову під час вилучення постраждалої з автівки?

- a. М'яким ортопедичним коміром
- b. Імпровізованою шиною з фанери
- c. Шиною Крамера
- d. Жорстким ортопедичним коміром**
- e. Циркулярним бандажем

114. Молодий чоловік віком 19 років постраждав внаслідок ДТП. Після шпиталізації у пацієнта виявлено: закритий уламковий перелом діяфізу лівої стегнової кістки, струс головного мозку, закрита тупа травма живота, множинні садна тулуба, обличчя та нижніх кінцівок. Якою буде першочергова лікувальна тактика для цього пацієнта щодо пошкодження стегна?

- a. Блокований інтрамедулярний остеосинтез стегнової кістки
- b. Відкрита репозиція фрагментів стегнової кістки, остеосинтез пластиною
- c. Імобілізація нижньої кінцівки гіпсовою шиною
- d. Скелетний витяг за допомогою спиці, проведеної крізь горбистість великогомілкової кістки
- e. Стабілізація фрагментів стегнової кістки за допомогою апарату зовнішньої фіксації**

115. Потерпілий віком 68 років був збитий легковим автомобілем 40 хв тому. Була короточасна втрата свідомості, скарги на біль в грудній клітці, утруднене дихання, неможливість стати на ноги. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, адинамічний, горизонтальний ністагм. ЧДР - 32/хв. Під час пальпації грудної клітки крепітація VI-VIII ребер праворуч по середньоключичній лінії АТ - 100/60 мм рт. ст. ЧСС - 120/хв, деформація обох гомілок в середній третині. Який вид політравми у пацієнта?

- a. Множинна травма**
- b. Поліфокальна травма опорно-рухового апарата
- c. Дорожньо-транспортна травма
- d. Побутова травма
- e. Комбінована травма

116. На етап спеціалізованої допомоги шпиталізовано військовослужбовця з уламковим сліпим проникним пораненням правого колінного суглоба. Під час огляду спостерігається: рана на медіальній поверхні колінного суглоба, у проєкції медіального виростка стегнової кістки, розміром 5х3 см, дно рани заповнюють кісткові фрагменти. Наявні Ro-ознаки уламкового перелому правого надколінка зі зміщенням фрагментів, дефект кісткової тканини надколінка, стороннє металеве тіло порожнини правого колінного суглоба. Яка лікувальна тактика найдоцільніша у цьому разі?

- a. ПХО, напружений металоостеосинтез перелому надколінка, рана не зашивається, перев'язки з розчинами антисептиків
- b. ПХО, напружений металоостеосинтез перелому надколінка, рана зашивається, встановлюється система проточно-промивного дренивання колінного суглоба, перев'язки рани з розчинами антисептиків
- c. Туалет рани ведеться відкритим методом
- d. ПХО, накладається шов на капсулу суглоба, інші м'які тканини не ушиваються, встановлюється система проточно-промивного дренивання колінного суглоба, імобілізація перелому задньою гіпсовою шиною, перев'язки рани з розчинами антисептиків**
- e. ПХО, рана зашивається, перев'язки рани з розчинами антисептиків

117. У потерпілого під час землетрусу уламками зруйнованого будинку було здавлено обидві нижні кінцівки, які вдалося звільнити лише через 4 год. Розвиток якого патологічного процесу загрожує пацієнту?

- a. Септичного шоку
- b. Гострої ниркової недостатності**
- c. Метаболічного алкалозу
- d. Фібринолізу
- e. Гіперкоагуляції з поширеним тромбозом

118. Що таке первинний снаряд, що завдає ураження при мінно-вибуховому пошкодженні?

- a. Снаряд, який виник в наслідок дії вибухового пристрою
- b. Снаряд, який виник під впливом дії вибухової хвилі
- c. Снаряд від дії вибухового пристрою
- d. -
- e. Снаряд, який виник з елементів конструкції вибухового пристрою**

119. Які вимоги до репозиції уламків під час лікування діафізарних переломів (простих та багатоуламкових)?

- a. Відновлення осі, довжини, ротаційних відносин в ушкодженному сегменті**
- b. Усунення зміщення по ширині з можливістю залишкових кутових деформацій до $3-5^\circ$ у будь-якій площині
- c. Усунення зміщення по ширині з можливістю незначних залишкових кутових деформацій, які відповідають фізіологічним викривленням
- d. Повне відновлення довжини та осі ушкодженого сегмента
- e. Анатомічна репозиція всіх уламків перелому

120. Що є абсолютними показаннями для остеосинтезу апаратом зовнішньої фіксації?

- a. Закриті переломи зі зміщенням відламків на повний поперечник і більше
- b. Перелом з пошкодженням магістральної судини
- c. Перелом зі зміщенням на тлі остеопору
- d. Відкриті переломи, і відкриті та закриті уламкові переломи**
- e. Подвійні переломи

121. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на біль у правій гомілці, періодичне підвищення температури тіла до $38-39^\circ\text{C}$. З анамнезу відомо, що 12 міс тому переніс відкритий перелом, проводилося лікування скелетним витягінням і гіпсовою пов'язкою. Наразі пересувається за допомогою милиць, самостійно пересуватися не може через біль. На передній поверхні правої гомілки є нориця з незначними гнійними виділеннями. Об'єктивно спостерігається: гомілка набрякла, навколо нориці наявна помірна гіперемія тканин. На рентгенограмі гомілки наявні хибний суглоб, кінцевий остеоліз уламків великогомілкової кістки, потовщення і вйчастість періосту. Встановить діагноз.

- a. Перелом кісток гомілки
- b. Туберкульоз кісток гомілки
- c. Флегмона гомілки
- d. Посттравматичний остеомієліт**
- e. Гематогенний остеомієліт

122. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 32 роки. Діагноз: політравма, за шкалою ISS - 25 балів, відкритий II ст. перелом кісток середньої третини правої стегнової кістки. Коли потрібно проводити стабілізацію та остеосинтез перелому?

- a. Інтрамедулярний остеосинтез в I добу
- b. АЗФ, як остаточний метод лікування
- c. Скелетне витягіння, заміна методу фіксації через 3 тижні
- d. Стабілізація АЗФ в I добу, заміна методу фіксації після 10 доби**
- e. Остеосинтез пластиною в I добу

123. Намагаючись париувати удар палицею по голові, пацієнт підставив зігнуту в лікті ліву руку. Удар прийшовся на верхню третину передпліччя. Під час огляду в приймальному

відділенні встановлено, що на рівні верхньої третини лівої ліктьової кістки є підшкірна гематома, патологічна рухливість, кісткова крепітація. Осьове навантаження передпліччя викликає біль у проекції удару. Активне і пасивне згинання в ліктьовому суглобі відсутнє, спостерігається позитивний симптом пружного опору. Встановіть попередній діагноз.

- a. Перелом Колліса лівого передпліччя
- b. Перелом обох кісток лівого передпліччя
- c. Переломовивих Монтеджі лівого передпліччя**
- d. Вивих кісток лівого передпліччя
- e. Перелом променевої кістки в типовому місці

124. Які клінічні прояви має вроджений вивих стегна у дітей до одного року?

- a. Асиметрія складок стегна, укорочення кінцівки, відведення стегна на 80° , розміщення коліна нижче від іншого
- b. Асиметрія сідничних складок, укорочення ураженої кінцівки, відведення стегна менше 70° , колінний суглоб на стороні ураження нижче протилежного**
- c. Асиметрія складок стегна, укорочення кінцівки, відведення стегна на 70° , розміщення коліна вище від іншого
- d. -
- e. Асиметрія складок стегна, укорочення кінцівки, відведення стегна менше 70° , розміщення коліна вище іншого

125. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на біль у колінних, променевоzap'ясткових суглобах, дрібних суглобах кистей. Хворіє 2 роки. Об'єктивно спостерігається: потовщення та болючість міжфалангових суглобів, під час згинання - хрускіт і болючість у колінних суглобах. У загальному аналізі крові: лейкоцити - $9,2 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 52 мм/год. На рентгенограмі кистей спостерігається звуження суглобової щілини, узури, остеопороз. Який найімовірніший діагноз?

- a. Ревматичний поліартрит
- b. Реактивний артрит
- c. Подагрична артропатія
- d. Ревматоїдний артрит**
- e. Деформуючий остеоартроз

126. У дитини віком 14 років на основі клінічного, рентгенологічного, КТ обстежень встановлено діагноз: хвороба Блаунта лівої гомілки, варусна деформація лівого колінного суглоба. Якою буде подальша лікувальна тактика?

- a. Аутопластика медіальної зони проксимального паросткового хряща, фіксація великогомілкової кістки пластиною
- b. Консервативне лікування, обмеження навантаження, ЛФК, масаж, фізіотерапія
- c. Корируюча остеотомія лівої великогомілкової кістки з фіксацією пластиною**
- d. Обмеження навантаження, кальцій, полівітаміни, раціональна дієта, носіння наколінника
- e. Артродез лівого колінного суглоба з вирівнюванням осі кінцівки

127. Хлопчик віком 8 років протягом 4 міс скаржиться на біль різної інтенсивності у ділянці правого кульшового суглобу, кульгавість. Під час огляду активні рухи в суглобі обмежені, пасивні - болючі. На рентгенограмі у голівці стегнової кістки видно ділянку розміром 1-1,5 см з підвищеною щільністю і сплюсненням епіфіза. Суглобова щілина розширена, а суглобова впадина не змінена. Встановіть попередній діагноз.

- a. Хвороба Бехтерева
- b. Ревматоїдний артрит
- c. Деформуючий артроз
- d. Асептичний некроз голівки стегнової кістки**
- e. Туберкульозний артрит

128. На що спрямоване виконання первинної хірургічної обробки вогнепальної рани під час надання допомоги потерпілому з вогнепальним пораненням кінцівки?

- a. Забезпечення умов для відновлення життєздатності тканин у стані некротичних змін, відновлення кровообігу, промивання
- b. Закриття ранового дефекту шляхом ушивання рани, зупинку кровотечі

- c. Тільки видалення кулі або інших пошкоджуючих агентів та зупинку кровотечі
- d. Відновлення кровопостачання тканин, забезпечення адекватної тканинної перфузії, лаваж, закриття дефекту

e. Превентивне видалення нежиттєздатних тканин як субстрату ранової інфекції, профілактику компартмент-синдрому, зупинку кровотечі

129. До приймального відділення шпиталізовано пацієнта з політравмою, діагностовано: кома III, перелом стегна, клініка травматичного шоку. Якому періоду травматичної хвороби відповідає стан постраждалого?

- a. Період максимальної можливості розвитку ускладнень
- b. Період повної стабілізації життєво важливих функцій

c. Гострий період

- d. -
- e. Період нестійкої адаптації

130. У пацієнта віком 40 років з діагнозом: ревматоїдний артрит - виникли типові запально-деструктивні зміни в уражених суглобах. У яких суглобах виявляються перші рентгенологічні зміни?

a. Проксимальних міжфалангових

- b. Плечових
- c. Ліктьових
- d. Колінних
- e. Надп'яtkово-гомількових

131. Яку кількість шин Крамера застосовують для транспортної іммобілізації при вогнепальному переломі стегнової кістки?

- a. 2
- b. 4
- c. 1
- d. 5

e. 3

132. Укажіть післяопераційні реабілітаційні заходи, що абсолютно заборонені до використання у пацієнтки віком 69 років після планової процедури тотального ендопротезування колінного суглоба, що відбулася 1 місяць тому, з приводу остеоартриту III ст. на етапі амбулаторної реабілітації в умовах поліклініки.

a. Фізіопроцедури, що ґрунтуються на дії електромагнітного поля та локального тепла в зоні хірургічного втручання

- b. Розробка активних та пасивних рухів у прооперованому суглобі
- c. Опора на кінцівку, що була прооперована, без використання засобів додаткової опори
- d. Міостимуляція та масаж м'язів оперованої нижньої кінцівки
- e. Водні процедури та плавання

133. Під час надання першої медичної допомоги пораненому віком 40 років, який отримав мінно-вибухову травму, військовим парамедиком виявлено: травматична ампутація правої гомілки на рівні с/3, інтенсивна пульсуюча кровотеча, кров яскраво-червоного кольору. Який обсяг першої медичної допомоги потрібно надати пораненому?

a. Накладання джгута на рівні середньої третини стегна, асептична пов'язка, знеболювання

- b. Максимальне згинання кінцівки в колінному суглобі, стискаюча пов'язка, знеболювання
- c. Стискаюча асептична пов'язка, знеболювання
- d. Пальцеве притиснення магістральної артерії, стискаюча пов'язка, знеболювання
- e. Стискаюча асептична пов'язка, накладання джгута на рівні верхньої третини гомілки, знеболювання

134. Укажіть характерні ознаки для посттравматичного хронічного остеомієліту.

- a. Гіперемія сегмента або його ділянки, періостальна реакція на рентгенограмі, підвищення температури
- b. Рентгенологічні ознаки деструкції кістки, біль, що виникає при навантаженні

- с. Стан після зануреного остеосинтезу відламків з наявністю нориць з гнійним виділенням
d. Наявність секвестру, інфікованого осередка в кістці, нориці з гнійним виділенням
е. Наявність відкритого перелому, який супроводжувався гнійно-некротичним ускладненням

135. До лікаря-ортопеда звернувся пацієнт віком 14 років зі скаргами на викривлення хребта. На рентгенограмі в прямій проєкції виявлено сколіотичне викривлення в грудопоперековому відділі з кутом деформації за Cobb 36°. Над крилами клубових кісток спостерігаються півмісяцеві тіні зон окостеніння до половини окружності - симптом Ріссера. Про що свідчить цей симптом?

- а. Зупинку прогресування сколіозу
b. Відсутність повного окостеніння клубових кісток
с. Регресування сколіозу
d. Остеомієліт клубових кісток

e. Подальше прогресування сколіозу

136. У дівчини віком 15 років під час обстеження виявлено викривлення грудного відділу хребта у фронтальній площині, яке чітко виявляється у пацієнтки стоячи, однак під час нахилу тулуба вперед це викривлення зникає. На рентгенограмі стоячи кут викривлення грудного відділу хребта за Коббом становить 25°, лежачи кут викривлення відсутній. Встановіть діагноз.

- а. Остеохондропатія тіла хребця (хвороба Кальве)
b. Юнацький кіфоз грудного відділу хребта I ступеня
с. Кіфосколіоз грудного відділу хребта

d. Сколіотична постава

e. Сколіоз грудного відділу хребта I ступеня

137. Поблизу військовослужбовця віком 40 років стався вибух, унаслідок якого його ліву нижню кінцівку притиснуло машиною. Звільнення кінцівки відбулося через 2 год, потерпілого евакуювали до стабілізаційного пункту. Під час огляду кінцівки спостерігається: шкіра блідо-ціанотичного кольору, набрякла, холодна на дотик. Об'єктивно спостерігається: тони серця приглушені, АТ - 80/60 мм рт. ст., пульс слабкого наповнення - 120/хв. Під час лабораторного дослідження сечі виявлено: міоглобін, протеїнурія, циліндрурія, колір сечі бурий. Встановіть діагноз.

а. Синдром тривалого стиснення, період реконвалесценції

b. Синдром тривалого стиснення, гострий період

- с. Синдром тривалого стиснення, період пізніх проявів
d. Гострий гломерулонефрит
е. Гостра печінкова недостатність

138. Які є види хірургічних втручань з приводу доброякісних пухлин кісток?

а. Кріотерапія з використанням рідкого азоту для заморожування пухлини

b. Внутрішньокісткова резекція, крайова резекція кістки, клиноподібна резекція пласкої кістки, пластика дефекту кістки

с. Рентгенхірургічні втручання, термоабляція, пункційна вертебропластика, кріодеструкція пухлини

d. Резекція відділу (сегменту) кістки з пухлиною, ендопротезування суглоба, ектомія та екстирпація, ампутація, екзартикуляція кінцівки

е. Внутрішній остеосинтез, зовнішній остеосинтез, репозиційний остеосинтез, ендопротезування суглоба

139. У пацієнтки діагностовано відкритий перелом середньої третини діафізу кісток гомілки зі зміщенням уламків. Рана 7 см з масивним забоєм м'яких тканин. Укажіть, який метод лікування рекомендовано у цьому разі.

- а. Закрита репозиція, гіпсова іммобілізація
b. Відкрита репозиція, накістний остеосинтез
с. Відкрита репозиція, інтрамедулярний остеосинтез

d. Черезкістковий позаосередковий компресійно-дистракційний остеосинтез

е. Скелетне витягіння

140. Що є рентгенологічними симптомами вродженого вивиху стегна у дітей, згідно зі схемою Хільгенрейнера?

- a. Ацетабулярний індекс - 27° , відстань - 10 мм, висота - 10 мм
- b. Ацетабулярний індекс - 27° , відстань - 15 мм, висота - 12 мм
- c. Ацетабулярний індекс - 30° , відстань - 10 мм, висота - 12 мм
- d. Ацетабулярний індекс - 30° , відстань - 15 мм, висота - 7 мм**
- e. -

141. Яка структура первинно залучається у дегенеративно-дистрофічний процес під час остеоартриту?

- a. М'язово-сухожильний комплекс
- b. Капсульно-зв'язковий апарат
- c. Синовіальна оболонка суглоба
- d. Субхондральна кістка
- e. Суглобовий хрящ**

142. Чоловік віком 57 років був збитий електропотягом. Шпиталізований до відділення політравми із діагнозом: поєднана черепно-мозкова, торакальна, абдомінальна, скелетна травма, відкрита черепно-мозкова травма, інтракраніальна гематома, відкритий двобічний гемопневмоторакс, травматичний розрив печінки, селезінки. Закриті багатоуламкові переломи n/3 обох стегнових кісток зі зміщенням фрагментів. Бригадою політравми проведено підрахунок балів ISS - 46 балів. Якому ступеню травми відповідає цей результат?

- a. Легкому
- b. Вкрай тяжкому**
- c. Важкому
- d. Середньому
- e. Вкрай легкому

143. Що є основним методом лікування вродженої дисплазії кульшових суглобів у дітей віком 1-6 міс?

- a. Поступове відведення стегон етапними гіпсовими пов'язками
- b. Масаж та пасивне відведення стегон
- c. Масаж в комплексі з остеотропною терапією
- d. Поступове відведення стегон на системі клейового витягування
- e. Широке сповивання з фіксацією стегон у відведенні та згинанні**

144. На чому базується міжнародна класифікація остеоартриту за Kellgren-Lawrence, що включає 5 стадій ураження при остеоартриті?

- a. Ультрасонографії
- b. Рентгенологічному обстеженні**
- c. Магнітно-резонансній томографії
- d. Сцинтиграфії
- e. Комп'ютерній томографії

145. Пацієнту після встановлення діагнозу: ревматоїдний артрит - призначено біологічну терапію із застосуванням інгібітора туморнекротичного фактора-альфа. Які провідні фактори в патогенезі ревматоїдного артрити визначають доцільність та ефективність біологічної терапії?

- a. Ензимопатії
- b. Нейроендокринні порушення
- c. Генетична схильність
- d. Аутоімунні порушення**
- e. Утворення супероксидантних аніонів

146. Пацієнт віком 32 роки шпиталізований зі скаргами на нестерпний біль у правій кульшовій ділянці, різке обмеження опорно-кінематичної функції правої нижньої кінцівки. З анамнезу відомо, що травму отримав під час ДТП. Об'єктивно спостерігається: положення пацієнта вимушене, кінцівка у стані приведення, згинання в колінному суглобі з внутрішньою ротацією. Під час пальпації виявлено: дефігурація в ділянці кульшового суглоба, позитивний симптом

пружинної фіксації. Рухи в кінцівці різко підсилюють больовий синдром. Встановіть попередній діагноз.

- a. Травматичний вивих голівки правої стегнової кістки
- b. Асептичний некроз голівки правої стегнової кістки
- c. Травматичний вивих кісток правої гомілки
- d. Субкапітальний перелом голівки правої стегнової кістки
- e. Закритий перелом дна вертлюгової западини справа

147. Жінка віком 89 років прокинулася посеред ночі, щоб піти до ванної кімнати, втратила рівновагу і впала на праве стегно. Вона не змогла встати з підлоги через сильний біль у правому кульшовому суглобі. Доставлена до лікарні. Під час клінічного огляду права нижня кінцівка вкорочена та стопа ротована назовні. Виконано рентгенографію правого кульшового суглоба. Яке лікування є найбільш доцільним?

- a. Тотальне гібридне ендопротезування кульшового суглоба
- b. Однополюсне ендопротезування кульшового суглоба
- c. Інтрамедулярний остеосинтез стегна
- d. Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглоба
- e. Фіксація фрагментів канюльованими гвинтами

148. Чоловік віком 45 років у стані алкогольного сп'яніння впав з висоти 3-х метрів на випрямлені руки. Під час огляду спостерігається: блідий, визначаються рани на тильній поверхні у в/3 обох передпліч, дно рани заповнюють кісткові фрагменти. АТ - 90/60 мм рт. ст., пульс - 120/хв, ЧД - 22/хв. Рентгенологічно виявлено: багатоуламкові переломи обох кісток передпліч у в/3 зі зміщенням фрагментів. Лівобічний гемоторакс. Ургентно спрямований в операційну. Який метод фіксації кісткових фрагментів найдоцільніше застосувати в цій ситуації?

- a. ПХО. Лікування методом постійного скелетного витягання
- b. Блокуючий інтрамедулярний остеосинтез
- c. Накістковий остеосинтез LCP-пластинами
- d. ПХО. Триангулярна фіксація АЗФ на стрижневій основі
- e. Остеосинтез спицями Кіршнера

149. До лікарні шпиталізовано пацієнта віком 30 років зі сполученою травмою. Після клінічного обстеження виявлено: розрив сечового міхура, забій головного мозку, нестабільний перелом кісток таза із порушенням переднього та заднього півкілець. Зазначте найдоцільніший на цьому етапі метод лікувальної іммобілізації кісток тазу.

- a. Гіпсова іммобілізація
- b. Накладання апарата зовнішньої фіксації
- c. Гамак
- d. Скелетне витягання
- e. Внутрішній металоостеосинтез

150. Що належить до дистракційного елементу конструкції транспортної шини Дітерікса?

- a. Коротка дошка-шина
- b. Довга дошка-шина
- c. Дерев'яна підошва
- d. Закрутка
- e. Дерев'яна підошва з закрутою