

1. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на хронічну діарею (3-4 рази на день, випорожнення світлі, п
а. Целиакія
- b. Лактазна недостатність
c. Хронічний ентероколіт
d. Синдром мальабсорбції
e. Муковісцидоз
2. Батьки трирічної дівчинки скаржаться на хронічну діарею (3-4 рази на день, випорожнення світлі, п
а. Хронічний ентероколіт
b. Лактазна недостатність
c. Синдром мальабсорбції
d. Муковісцидоз
e. Целиакія
3. Вагітна жінка з п'ятирічним сином вчора випадково контактували з хворою на кір особою. Дитина та
а. Провести екстрене щеплення матері та дитини вакциною КПК
b. Провести екстрене щеплення матері та дитини вакциною проти кору
c. Спостерігати за контактними пацієнтами
d. Провести екстрене щеплення лише матері вакциною КПК
e. Провести екстрене щеплення лише дитини вакциною КПК
4. Вагітна жінка з п'ятирічним сином вчора випадково контактували з хворою на кір особою. Дитина та
а. Провести екстрене щеплення матері та дитини вакциною проти кору
b. Провести екстрене щеплення матері та дитини вакциною КПК
c. Спостерігати за контактними пацієнтами
d. Провести екстрене щеплення лише дитини вакциною КПК
e. Провести екстрене щеплення лише матері вакциною КПК
5. Для санітарної обробки та дегазації відкритих ділянок шкіри після потрапляння на них фосфороргані
а. Швидке всмоктування ФОС
b. Термін прив'язаний до евакуаційної логістики
c. Нестійкість діючої речовини дегазатора у зовнішньому середовищі
d. Нестійкість ФОС у зовнішньому середовищі
e. Термін прив'язаний до кількості потерпілих
6. Для санітарної обробки та дегазації відкритих ділянок шкіри після потрапляння на них фосфороргані
а. Нестійкість діючої речовини дегазатора у зовнішньому середовищі
b. Термін прив'язаний до кількості потерпілих
c. Термін прив'язаний до евакуаційної логістики
d. Нестійкість ФОС у зовнішньому середовищі
e. Швидке всмоктування ФОС
7. До сімейного лікаря звернувся пацієнт віком 34 роки через 14 днів після початку ерадикаційної тер
а. Динамічне спостереження
b. Призначити ІПП у стандартній дозі 2 рази/добу протягом 4 тижнів
c. Провести контроль ерадикації негайно
d. Провести контроль ерадикації через 4 тижні
e. Скерувати на ЕГДС для підтвердження загоєння виразки
8. До сімейного лікаря звернувся пацієнт віком 34 роки через 14 днів після початку ерадикаційної тер
а. Скерувати на ЕГДС для підтвердження загоєння виразки
b. Динамічне спостереження
c. Провести контроль ерадикації через 4 тижні
d. Призначити ІПП у стандартній дозі 2 рази/добу протягом 4 тижнів
e. Провести контроль ерадикації негайно
9. Дівчина віком 24 роки, з поліменореєю в анамнезі, скаржиться на загальну слабкість, ламкість нігт
а. Гіпохромна, нормоцитарна
b. Гіперхромна, макроцитарна
c. Нормохромна, нормоцитарна
d. Нормохромна, мікроцитарна
e. Гіпохромна, мікроцитарна
10. Дівчина віком 24 роки, з поліменореєю в анамнезі, скаржиться на загальну слабкість, ламкість ніг

- a. Нормохромна, мікроцитарна
- b. Гіперхромна, макроцитарна
- c. Нормохромна, нормоцитарна
- d. Гіпохромна, нормоцитарна
- e. Гіпохромна, мікроцитарна

11. Жінка віком 24 роки з терміном вагітності 34 тижні перебувала в контактi з пацієнтом, хворим на

- a. Введення анетуйованої протикорової вакцини
- b. Введення 10%-го Ig людського нормального
- c. Введення інактивованої протикорової вакцини
- d. Визначення титру IgM
- e. Визначення титру IgA

12. Жінка віком 24 роки з терміном вагітності 34 тижні перебувала в контактi з пацієнтом, хворим на

- a. Введення анетуйованої протикорової вакцини
- b. Визначення титру IgA
- c. Визначення титру IgM

d. Введення 10%-го Ig людського нормального

- e. Введення інактивованої протикорової вакцини

13. Жінка віком 35 років з раніше встановленим діагнозом: синдром подразненого кишківника (СПК) - з

a. Виразковий коліт

- b. Лямбліоз
- c. Хвороба Крона
- d. Загострення СПК
- e. Геморой

14. Жінка віком 35 років з раніше встановленим діагнозом: синдром подразненого кишківника (СПК) - з

- a. Лямбліоз
- b. Геморой
- c. Хвороба Крона
- d. Загострення СПК

e. Виразковий коліт

15. Жінка віком 36 років звернулася до сімейного лікаря для профілактичного огляду. На момент огляду

- a. Визначити рівень вітаміну B₉ в крові
- b. Визначити рівень трансферину крові
- c. Провести консультування з приводу необхідності включення тваринних продуктів у раціон
- d. Визначити рівень вітаміну B₁₂ в крові

e. Визначити рівень феритину крові

16. Жінка віком 36 років звернулася до сімейного лікаря для профілактичного огляду. На момент огляду

- a. Визначити рівень трансферину крові
- b. Визначити рівень вітаміну B₉ в крові
- c. Визначити рівень вітаміну B₁₂ в крові

d. Визначити рівень феритину крові

- e. Провести консультування з приводу необхідності включення тваринних продуктів у раціон

17. Жінка віком 36 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на задишку та швидку втомлюваність

- a. 10 хв
- b. 5 хв
- c. 30 хв
- d. 45 хв

e. 20 хв

18. Жінка віком 36 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на задишку та швидку втомлюваність

- a. 45 хв
- b. 30 хв
- c. 5 хв
- d. 10 хв

e. 20 хв

19. Жінка віком 58 років скаржиться на частий головний біль, запаморочення протягом останніх двох м

- a. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на хронічну

- b. Локальним протоколом амбулаторії ЗПСМ
 - c. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на гостру ішемію
 - d. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на гострий коронарний синдром
 - e. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на гіпертонічну хворобу
20. Жінка віком 58 років скаржиться на частий головний біль, запаморочення протягом останніх двох місяців.
- a. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на хронічну гіпертонічну хворобу
 - b. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на гостру ішемію
 - c. Локальним протоколом амбулаторії ЗПСМ
 - d. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на гіпертонічну хворобу
 - e. Уніфікованим клінічним протоколом МОЗ України з надання допомоги пацієнтам, хворим на гострий коронарний синдром
21. За результатами обстеження десятирічної дівчинки виявлено: ЛПНЩ - 225 мг/дл (норма <100), ЛПВЛ - 150 мг/дл (норма <100).
- a. Функціональні проби нирок. Електрокардіографію. Гормони щитовидної залози
 - b. Функціональні проби печінки, нирок. Гормони щитовидної залози
 - c. Ультразвукове обстеження печінки та нирок. Гормони щитовидної залози
 - d. Гормони щитовидної залози та гіпофізу. Ехокардіографію
 - e. Функціональні проби печінки. Електрокардіограму
22. За результатами обстеження десятирічної дівчинки виявлено: ЛПНЩ - 225 мг/дл (норма <100), ЛПВЛ - 150 мг/дл (норма <100).
- a. Функціональні проби нирок. Електрокардіографію. Гормони щитовидної залози
 - b. Функціональні проби печінки, нирок. Гормони щитовидної залози
 - c. Ультразвукове обстеження печінки та нирок. Гормони щитовидної залози
 - d. Функціональні проби печінки. Електрокардіограму
 - e. Гормони щитовидної залози та гіпофізу. Ехокардіографію
23. Мати скаржиться, що у її дворічної дитини було блювання шлунковим вмістом і підвищення температури тіла.
- a. Ампіцилін
 - b. Діазепам
 - c. Гентаміцин
 - d. Гідазепам
 - e. Епінефрин
24. Мати скаржиться, що у її дворічної дитини було блювання шлунковим вмістом і підвищення температури тіла.
- a. Гідазепам
 - b. Ампіцилін
 - c. Гентаміцин
 - d. Діазепам
 - e. Епінефрин
25. Мати терміново привела трирічну дитину до амбулаторії з ознаками задишки, почервоніння шкіри та підвищення температури тіла.
- a. Ввести в/м епінефрин 0,3 мг
 - b. Перевести пацієнта у позицію на боці
 - c. Провести інфузійну терапію
 - d. Ввести в/м дексаметазон 0,04 мг/кг
 - e. Терміново ввести антигістамінний препарат
26. Мати терміново привела трирічну дитину до амбулаторії з ознаками задишки, почервоніння шкіри та підвищення температури тіла.
- a. Провести інфузійну терапію
 - b. Терміново ввести антигістамінний препарат
 - c. Перевести пацієнта у позицію на боці
 - d. Ввести в/м епінефрин 0,3 мг
 - e. Ввести в/м дексаметазон 0,04 мг/кг
27. На етапі "Допомога під вогнем" пораненому було накладено кровоспинний джгут - кровотеча зупинилась.
- a. Синдромом дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
 - b. Порушенням функції згортання крові та розвитком ацидозу
 - c. Розвитком компартмент-синдрому
 - d. Швидким інфікуванням ранової поверхні
 - e. Розвитком артеріовенозної мальформації
28. На етапі "Допомога під вогнем" пораненому було накладено кровоспинний джгут - кровотеча зупинилась.
- a. Швидким інфікуванням ранової поверхні
 - b. Синдромом дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

с. Розвитком компартмент-синдрому

д. Порушенням функції згортання крові та розвитком ацидозу

е. Розвитком артеріовенозної мальформації

29. На консультацію до сімейного лікаря звернувся чоловік віком 42 роки щодо скринінгу на рак передміуріальної залози.

а. Відкласти тест на ПСА до досягнення пацієнтом 50-річного віку

б. Провести тест на ПСА через 3 роки

с. Виконати тест на ПСА негайно та повторювати його кожні 2 роки

д. Не рекомендувати тест на ПСА, оскільки у пацієнта немає мутацій BRCA2

е. Виконати тест на ПСА негайно та повторювати його щороку

30. На консультацію до сімейного лікаря звернувся чоловік віком 42 роки щодо скринінгу на рак передміуріальної залози.

а. Відкласти тест на ПСА до досягнення пацієнтом 50-річного віку

б. Виконати тест на ПСА негайно та повторювати його щороку

с. Виконати тест на ПСА негайно та повторювати його кожні 2 роки

д. Провести тест на ПСА через 3 роки

е. Не рекомендувати тест на ПСА, оскільки у пацієнта немає мутацій BRCA2

31. На місці вибуху відповідно до прийнятого порядку медичної евакуації розпочато перший етап. Усіх

а. Забезпечення комунікації з рідними та опікунами

б. Швидша евакуація з місця надзвичайної ситуації

с. Надання спеціалізованої лікарської допомоги

д. Визначення однорідних за потребами медичної допомоги груп

е. Надання першої кваліфікованої лікарської допомоги

32. На місці вибуху відповідно до прийнятого порядку медичної евакуації розпочато перший етап. Усіх

а. Швидша евакуація з місця надзвичайної ситуації

б. Забезпечення комунікації з рідними та опікунами

с. Надання першої кваліфікованої лікарської допомоги

д. Визначення однорідних за потребами медичної допомоги груп

е. Надання спеціалізованої лікарської допомоги

33. На прийом до сімейного лікаря звернулася мати восьмирічної дитини. Щеплення проводилися за календарем.

а. ІПВ, гепатит В, КПК

б. АДП-М, КПК, БЦЖ

с. Hib-інфекція, ІПВ, АКДП

д. КПК, АДП-М, ОПВ

е. АКДП, ОПВ, БЦЖ

34. На прийом до сімейного лікаря звернулася мати восьмирічної дитини. Щеплення проводилися за календарем.

а. АДП-М, КПК, БЦЖ

б. АКДП, ОПВ, БЦЖ

с. КПК, АДП-М, ОПВ

д. ІПВ, гепатит В, КПК

е. Hib-інфекція, ІПВ, АКДП

35. На підставі чого проводиться медичне сортування потерпілих?

а. Встановлення прогнозу для життя

б. Розпоряджень керівника (старшого лікаря)

с. Встановлення попереднього діагнозу

д. Розпоряджень рятувальників ДСНС

е. Встановлення клінічного діагнозу

36. На підставі чого проводиться медичне сортування потерпілих?

а. Встановлення прогнозу для життя

б. Розпоряджень рятувальників ДСНС

с. Встановлення попереднього діагнозу

д. Встановлення клінічного діагнозу

е. Розпоряджень керівника (старшого лікаря)

37. Онкологічному пацієнту з раком пілоричного відділу шлунка (високодиференційована аденокарцинома).

а. Тизанидин, таклофен, дулоксетин

б. Парацетамол, метамізол натрію, ібупрофен

с. Преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон

- d. Трамадол, морфін, оксикодон, налоксон
- e. Прегабалін, гебапентин, толперизон

38. Онкологічному пацієнту з раком пілоричного відділу шлунка (високодиференційована аденокарцинома)

- a. Тизанидин, таклофен, дулоксетин
- b. Преднізолон, дексаметазон, гідрокортизон
- c. Трамадол, морфін, оксикодон, налоксон
- d. Прегабалін, гебапентин, толперизон
- e. Парацетамол, метамізол натрію, ібупрофен

39. П'ятирічна дитина скаржиться на підвищення температури тіла та біль у правому вусі впродовж двох тижнів

a. Болісна припухлість за вухом

- b. Біль у вусі
- c. Гнійні виділення з вуха впродовж 7 днів
- d. -
- e. Гнійні виділення з вуха впродовж 14 днів

40. П'ятирічна дитина скаржиться на підвищення температури тіла та біль у правому вусі впродовж двох тижнів

a. -

b. Болісна припухлість за вухом

- c. Гнійні виділення з вуха впродовж 14 днів
- d. Гнійні виділення з вуха впродовж 7 днів
- e. Біль у вусі

41. Пацієнт віком 15 років скаржиться на напад вираженого сухого кашлю та задишки. Об'єктивно спостерігаються нормальні результати фізичного обстеження та лабораторних досліджень

- a. Кортикостероїди в середніх дозах внутрішньовенно
- b. Застосувати техніку дихання за Бутейко
- c. Інгаляційні beta₂-агоністи тривалої дії

d. Інгаляційні beta₂-агоністи короткої дії

e. Пероральні кортикостероїди у високих дозах

42. Пацієнт віком 15 років скаржиться на напад вираженого сухого кашлю та задишки. Об'єктивно спостерігаються нормальні результати фізичного обстеження та лабораторних досліджень

a. Пероральні кортикостероїди у високих дозах

b. Інгаляційні beta₂-агоністи короткої дії

- c. Кортикостероїди в середніх дозах внутрішньовенно
- d. Інгаляційні beta₂-агоністи тривалої дії
- e. Застосувати техніку дихання за Бутейко

43. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на біль у животі, втрату маси тіла, часті рідкі випорожнення з кров'ю

a. Метамізол натрію

b. Месалазин

- c. Пантопразол
- d. Ніфуроксазид
- e. Амоксицилін

44. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на біль у животі, втрату маси тіла, часті рідкі випорожнення з кров'ю

a. Метамізол натрію

- b. Ніфуроксазид
- c. Амоксицилін
- d. Пантопразол

e. Месалазин

45. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, біль у м'язах, суглобах, лихоманку

- a. Вітряна віспа
- b. ГРВІ
- c. Кіп
- d. Скарлатина

e. Краснуха

46. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на загальну слабкість, головний біль, біль у м'язах, суглобах, лихоманку

- a. Скарлатина
- b. Кіп

c. Краснуха

d. ГРВІ

е. Вітряна віспа

47. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у горлі, кровоточивість ясен, підвищення температури т

а. Інфекційний мононуклеоз

б. Апластична анемія

с. Гострий лейкоз

д. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

е. СНІД

48. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у ділянці попереку з лівого боку та нудоту. Із анамнез

а. КТ живота

б. Оглядову урографію

с. Рентген грудної та поперекової ділянки

д. Загальний аналіз сечі

е. УЗД сечостатевої системи

49. Пацієнт віком 25 років скаржиться на біль у ділянці попереку з лівого боку та нудоту. Із анамнез

а. Рентген грудної та поперекової ділянки

б. Загальний аналіз сечі

с. УЗД сечостатевої системи

д. Оглядову урографію

е. КТ живота

50. Пацієнт віком 26 років скаржиться на біль у лівій поперековій ділянці, біль під час сечовиділенн

а. Гостра ниркова недостатність

б. Пієлонефрит

с. Ниркова коліка

д. Амілоїдоз

е. Гломелуронефрит

51. Пацієнт віком 26 років скаржиться на біль у лівій поперековій ділянці, біль під час сечовиділенн

а. Пієлонефрит

б. Гломелуронефрит

с. Ниркова коліка

д. Гостра ниркова недостатність

е. Амілоїдоз

52. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль та набряк у лівому колінному суглобі та біль у правому

а. Ревматичний артрит

б. Подагричний артрит

с. Ревматоїдний артрит

д. Остеоартроз

е. Реактивний артрит

53. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль та набряк у лівому колінному суглобі та біль у правому

а. Ревматоїдний артрит

б. Остеоартроз

с. Ревматичний артрит

д. Подагричний артрит

е. Реактивний артрит

54. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на інтенсивний біль у лівій поперековій ділянці, озноб, що супр

а. Пієлонефрит

б. Ниркова коліка

с. Сечокам'яна хвороба

д. Гостра ниркова недостатність

е. Гломелуронефрит

55. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на інтенсивний біль у лівій поперековій ділянці, озноб, що супр

а. Сечокам'яна хвороба

б. Пієлонефрит

с. Ниркова коліка

д. Гостра ниркова недостатність

е. Гломелуронефрит

56. Пацієнт віком 34 роки звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на збільшення маси тіла на 10 кг
а. Ожиріння III ступеня

б. Ожиріння I ступеня

с. Ожиріння II ступеня

д. Надмірна маса тіла

е. Метаболічний синдром

57. Пацієнт віком 34 роки звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на збільшення маси тіла на 10 кг

а. Ожиріння III ступеня

б. Надмірна маса тіла

с. Ожиріння II ступеня

д. Ожиріння I ступеня

е. Метаболічний синдром

58. Пацієнт віком 34 роки пройшов 14-денний курс антихелікобактерної терапії з приводу хронічного не

а. Через 2 тижні, контрольну ЕФГДС зі швидким уреазним тестом (CLO-тест) на *H.pylori*

б. Через 4 тижні, тест на виявлення антигену *H.pylori* в калі

с. Через 2 тижні, рН-метрію тіла шлунка

д. Через тиждень, дихальний уреазний тест на *H.pylori*

е. Через 4 тижні, тест на виявлення антитіл до *H.pylori* в крові

59. Пацієнт віком 34 роки пройшов 14-денний курс антихелікобактерної терапії з приводу хронічного не

а. Через 4 тижні, тест на виявлення антитіл до *H.pylori* в крові

б. Через тиждень, дихальний уреазний тест на *H.pylori*

с. Через 2 тижні, контрольну ЕФГДС зі швидким уреазним тестом (CLO-тест) на *H.pylori*

д. Через 2 тижні, рН-метрію тіла шлунка

е. Через 4 тижні, тест на виявлення антигену *H.pylori* в калі

60. Пацієнт віком 35 років звернувся до сімейного лікаря з приводу тривоги, яка виникла у пацієнта п

а. 50 років

б. 60 років

с. 75 років

д. 35 років

е. 40 років

61. Пацієнт віком 35 років звернувся до сімейного лікаря з приводу тривоги, яка виникла у пацієнта п

а. 75 років

б. 50 років

с. 60 років

д. 35 років

е. 40 років

62. Пацієнт віком 35 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на появу новоутворення рожевого

а. Направити пацієнта на вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (впродовж 10 днів)

б. Дерматоскопія

с. Обстеження на вірусний гепатит В та ВІЛ-інфекцію

д. Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях

е. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів

63. Пацієнт віком 35 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на появу новоутворення рожевого

а. Рентгенографія органів грудної клітки у 2-х проекціях

б. Направити пацієнта на вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (впродовж 10 днів)

с. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів

д. Обстеження на вірусний гепатит В та ВІЛ-інфекцію

е. Дерматоскопія

64. Пацієнт віком 35 років скаржиться на появу висипу на шкірі, набряк та біль у гомілковостопних су

а. Комп'ютерну томографію суглобів

б. Рентгенографію гомілковостопних суглобів

с. Термографію суглобів

д. Денситометрію

е. Ультразвукове обстеження гомілковостопних суглобів

65. Пацієнт віком 35 років скаржиться на появу висипу на шкірі, набряк та біль у гомілковостопних су

a. Термографію суглобів

b. Ультразвукове обстеження гомілковостопних суглобів

c. Комп'ютерну томографію суглобів

d. Денситометрію

e. Рентгенографію гомілковостопних суглобів

66. Пацієнт віком 36 років скаржиться на біль і парестезію в нижній половині правої гомілки, тильній

a. Серединний

b. Сідничний

c. Великогомільковий

d. Стегновий

e. Малогомільковий

67. Пацієнт віком 36 років скаржиться на біль і парестезію в нижній половині правої гомілки, тильній

a. Сідничний

b. Малогомільковий

c. Серединний

d. Стегновий

e. Великогомільковий

68. Пацієнт віком 38 років скаржиться на постійний біль за грудниною середньої інтенсивності, що пол

a. Гострий міокардит

b. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

c. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST

d. Сухий плеврит

e. Гострий перикардит

69. Пацієнт віком 38 років скаржиться на постійний біль за грудниною середньої інтенсивності, що пол

a. Тромбоемболія гілок легеневої артерії

b. Гострий міокардит

c. Гострий перикардит

d. Сухий плеврит

e. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST

70. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу папул у ділянці тулуба та розгинальних поверхонь рук.

a. Скерувати до лікаря-дерматовенеролога

b. Скерувати до лікаря-ревматолога

c. Відмінити всі препарати, які приймає пацієнт та спостерігати

d. Призначити корекцію харчування та способу життя

e. Призначити лікування місцевими глюкокортикоїдами

71. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу папул у ділянці тулуба та розгинальних поверхонь рук.

a. Призначити корекцію харчування та способу життя

b. Призначити лікування місцевими глюкокортикоїдами

c. Відмінити всі препарати, які приймає пацієнт та спостерігати

d. Скерувати до лікаря-дерматовенеролога

e. Скерувати до лікаря-ревматолога

72. Пацієнт віком 38 років скаржиться на щотижневі напади задишки, які турбують протягом року, вини

a. Бронхіальна астма

b. Бронхоектатична хвороба

c. Хронічне обструктивне захворювання легень

d. Хронічний бронхіт

e. Саркоїдоз

73. Пацієнт віком 38 років скаржиться на щотижневі напади задишки, які турбують протягом року, вини

a. Саркоїдоз

b. Бронхоектатична хвороба

c. Бронхіальна астма

d. Хронічний бронхіт

e. Хронічне обструктивне захворювання легень

74. Пацієнт віком 39 років скаржиться на надлишкову масу тіла. Об'єктивно спостерігається: зріст - 1

a. 30-35%

- b. 30-40%
- c. 25-30%
- d. 40-45%

e. 5-10%

75. Пацієнт віком 39 років скаржиться на надлишкову масу тіла. Об'єктивно спостерігається: зріст - 1

- a. 30-40%
- b. 40-45%
- c. 25-30%
- d. 30-35%

e. 5-10%

76. Пацієнт віком 40 років звернувся до сімейного лікаря з приводу уточнення ймовірного ризику розви

- a. Колоноскопія в 50 років із подальшим щорічним скринінг-тестом (імуногістохімічний аналіз)
- b. Обстеження даного пацієнта до 50 років є недоцільними
- c. Колоноскопія в 50 років із подальшим щорічним скринінг-тестом ("Pap"-тест)

d. Колоноскопія в 40 років із подальшим скринінгом кожні 5 років

e. КТ в 40 років із подальшим щорічним контролем

77. Пацієнт віком 40 років звернувся до сімейного лікаря з приводу уточнення ймовірного ризику розви

- a. Обстеження даного пацієнта до 50 років є недоцільними
- b. Колоноскопія в 50 років із подальшим щорічним скринінг-тестом (імуногістохімічний аналіз)
- c. КТ в 40 років із подальшим щорічним контролем
- d. Колоноскопія в 50 років із подальшим щорічним скринінг-тестом ("Pap"-тест)

e. Колоноскопія в 40 років із подальшим скринінгом кожні 5 років

78. Пацієнт віком 40 років скаржиться на короткочасні епізоди серцебиття, головокружіння, раптове по

- a. Аортальна недостатність
- b. Проплапс мітрального клапана
- c. Ізольована мітральна недостатність

d. Мітральна вада з перевагою стенозу

e. Аортальний стеноз

79. Пацієнт віком 40 років скаржиться на короткочасні епізоди серцебиття, головокружіння, раптове по

a. Проплапс мітрального клапана

b. Мітральна вада з перевагою стенозу

- c. Ізольована мітральна недостатність
- d. Аортальна недостатність
- e. Аортальний стеноз

80. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на біль у попереку, потемніння сечі, загальну слабкість, запам

a. Гемолітична анемія

- b. Токсичний вплив на кістковий мозок
- c. Ниркова недостатність
- d. Гепатотоксична реакція
- e. Загострення холециститу

81. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на біль у попереку, потемніння сечі, загальну слабкість, запам

- a. Токсичний вплив на кістковий мозок
- b. Гепатотоксична реакція
- c. Ниркова недостатність
- d. Загострення холециститу

e. Гемолітична анемія

82. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на виражений больовий синдром, що виснажує його. В анамнез

a. Прегабалін

- b. Холінестеразний препарат
- c. Трициклічний антидепресант
- d. Ноотропний препарат
- e. НПЗЗ іншої молекули

83. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на виражений больовий синдром, що виснажує його. В анамнез

- a. НПЗЗ іншої молекули
- b. Холінестеразний препарат

с. Прегабалін

d. Ноотропний препарат

е. Трициклічний антидепресант

84. Пацієнт віком 43 роки звернувся до сімейного лікаря через те, що виявив рівень глюкози на рівні

a. Корекція способу життя без додаткової фармакотерапії. Повторний огляд через 6 місяців

b. Метформін або препарат сулфанілсечовини протягом 3 місяців. Повторний огляд, якщо показник HbA

с. Корекція способу життя та 2 антидіабетичні препарати. Повторний огляд через 3 місяці

d. Корекція способу життя та 1 антидіабетичний препарат. Повторний огляд через 6 місяців

е. Корекція способу життя та 1 антидіабетичний препарат. Повторний огляд у разі погіршення стану

85. Пацієнт віком 43 роки звернувся до сімейного лікаря через те, що виявив рівень глюкози на рівні

a. Корекція способу життя та 1 антидіабетичний препарат. Повторний огляд через 6 місяців

b. Корекція способу життя та 2 антидіабетичні препарати. Повторний огляд через 3 місяці

с. Корекція способу життя без додаткової фармакотерапії. Повторний огляд через 6 місяців

d. Метформін або препарат сулфанілсечовини протягом 3 місяців. Повторний огляд, якщо показник HbA

е. Корекція способу життя та 1 антидіабетичний препарат. Повторний огляд у разі погіршення стану

86. Пацієнт віком 43 роки має артеріальну гіпертензію без ураження органів-мішеней і без супутньої п

a. SCORE

b. ABC

с. GRACE

d. CCS

е. GINA

87. Пацієнт віком 43 роки має артеріальну гіпертензію без ураження органів-мішеней і без супутньої п

a. SCORE

b. GRACE

с. GINA

d. ABC

е. CCS

88. Пацієнт віком 44 роки з діагнозом: артеріальна гіпертензія - приймає комбінацію препаратів: блок

a. Хірургічне лікування

b. Зменшити дозу діуретика

с. Відмінити діуретик

d. Відмінити блокатор рецепторів ангіотензину II

е. Збільшити дозу блокатора кальцієвих каналів

89. Пацієнт віком 44 роки з діагнозом: артеріальна гіпертензія - приймає комбінацію препаратів: блок

a. Відмінити діуретик

b. Хірургічне лікування

с. Відмінити блокатор рецепторів ангіотензину II

d. Збільшити дозу блокатора кальцієвих каналів

е. Зменшити дозу діуретика

90. Пацієнт віком 45 років рік тому переніс ішемічний інсульт, а пів року тому - інфаркт міокарда. У

a. Загальний холестерин

b. Ліпопротеїди низької щільності

с. Коефіцієнт атерогенності

d. Ліпопротеїди дуже низької щільності

е. Ліпопротеїди високої щільності

91. Пацієнт віком 45 років рік тому переніс ішемічний інсульт, а пів року тому - інфаркт міокарда. У

a. Ліпопротеїди високої щільності

b. Ліпопротеїди низької щільності

с. Ліпопротеїди дуже низької щільності

d. Загальний холестерин

е. Коефіцієнт атерогенності

92. Пацієнт віком 47 років протягом 10-ти років лікувався з приводу остеохондрозу хребта з корінцеви

a. Антитіл до двоспіральної ДНК

b. HLA-B27 антигену

с. Антинуклеарних антитіл

d. Антитіл до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

е. Ревматоїдного фактора

93. Пацієнт віком 47 років протягом 10-ти років лікувався з приводу остеохондрозу хребта з корінцеви

a. Ревматоїдного фактора

b. Антитіл до двоспиральної ДНК

c. HLA-B27 антигену

d. Антинуклеарних антитіл

е. Антитіл до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)

94. Пацієнт віком 48 років скаржиться на біль за грудниною стискаючого характеру, що триває 6 год та

a. В/в введення ацетилсаліцилової кислоти (або per os)

b. В/в введення метопрололу

c. В/в введення діазепаму

d. В/в введення аденозину

е. В/в введення морфіну

95. Пацієнт віком 48 років скаржиться на біль за грудниною стискаючого характеру, що триває 6 год та

a. В/в введення метопрололу

b. В/в введення морфіну

c. В/в введення діазепаму

d. В/в введення ацетилсаліцилової кислоти (або per os)

е. В/в введення аденозину

96. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головокружіння, загальну слабкість, задишку під час фізично

a. Фібриляція передсердь

b. Суправентрикулярна екстрасистолія

c. Синусова тахікардія

d. Фібриляція шлуночків

е. Тріпотіння передсердь

97. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головокружіння, загальну слабкість, задишку під час фізично

a. Фібриляція шлуночків

b. Синусова тахікардія

c. Суправентрикулярна екстрасистолія

d. Тріпотіння передсердь

е. Фібриляція передсердь

98. Пацієнт віком 48 років скаржиться на задишку, набряки на кінцівках, порушення сну. В анамнезі: і

a. Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка

b. Серцева недостатність із помірно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

c. Серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

d. Серцева недостатність із недостатньою фракцією викиду лівого шлуночка

е. Серцева недостатність із нормальною фракцією викиду лівого шлуночка

99. Пацієнт віком 48 років скаржиться на задишку, набряки на кінцівках, порушення сну. В анамнезі: і

a. Серцева недостатність із помірно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

b. Серцева недостатність із недостатньою фракцією викиду лівого шлуночка

c. Серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка

d. Серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка

е. Серцева недостатність із нормальною фракцією викиду лівого шлуночка

100. Пацієнт віком 49 років скаржиться на появу сухого тривалого кашлю. Із анамнезу відомо, що хворі

a. Лізиноприл

b. Верапаміл

c. Валсартан

d. Бісопролол

е. Метопролол

101. Пацієнт віком 49 років скаржиться на появу сухого тривалого кашлю. Із анамнезу відомо, що хворі

a. Метопролол

b. Бісопролол

c. Валсартан

d. Верапаміл

е. Лізиноприл

102. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на печію до 2-х разів на день, переважно після вживання їжі, о

а. Рентгеноскопію стравоходу та шлунка

б. Тест на *H.pylori*

с. ЕФГДС

д. рН - моніторинг

е. Тест з ІПП

103. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на печію до 2-х разів на день, переважно після вживання їжі, о

а. Тест на *H.pylori*

б. ЕФГДС

с. Рентгеноскопію стравоходу та шлунка

д. Тест з ІПП

е. рН - моніторинг

104. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на стискаючий біль за грудниною, що іррадіює у ліве плече, вин

а. beta-адреноблокатори

б. Пролонговані нітрати

с. Діуретики

д. Інгібітори АПФ

е. НПЗП

105. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на стискаючий біль за грудниною, що іррадіює у ліве плече, вин

а. Інгібітори АПФ

б. beta-адреноблокатори

с. НПЗП

д. Діуретики

е. Пролонговані нітрати

106. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на інтенсивний стискаючий біль за грудниною без виразної ірра

а. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента S-T

б. Тромбоемболія легеневої артерії

с. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента S-T

д. Розшаровуюча аневризма аорти

е. Гострий панкреатит

107. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на інтенсивний стискаючий біль за грудниною без виразної ірра

а. Гострий коронарний синдром без елевації сегмента S-T

б. Тромбоемболія легеневої артерії

с. Гострий панкреатит

д. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента S-T

е. Розшаровуюча аневризма аорти

108. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на біль, набряклість, почервоніння в ділянці лівої гомілки, за

а. Піогенна гранульома

б. Флегмона гомілки

с. Тромбоз глибоких вен гомілки

д. Хвороба Ріттера

е. Бешиха

109. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на біль, набряклість, почервоніння в ділянці лівої гомілки, за

а. Хвороба Ріттера

б. Бешиха

с. Флегмона гомілки

д. Піогенна гранульома

е. Тромбоз глибоких вен гомілки

110. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на головний біль, шум у вухах, неприємні відчуття в ділянці се

а. Подвійна комбінація beta-блокатор + діуретик

б. Подвійна комбінація інгібітор АПФ + діуретик

с. Подвійна комбінація блокатор кальцієвих каналів + beta-блокатор

д. Монотерапія одним з антигіпертензивних препаратів першої лінії

е. Подвійна комбінація інгібітор АПФ + beta-блокатор

111. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на головний біль, шум у вухах, неприємні відчуття в ділянці серця.
а. Подвійна комбінація блокатор кальцієвих каналів + beta-блокатор

б. Подвійна комбінація інгібітор АПФ + діуретик

с. Подвійна комбінація інгібітор АПФ + beta-блокатор

д. Монотерапія одним з антигіпертензивних препаратів першої лінії

е. Подвійна комбінація beta-блокатор + діуретик

112. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на загальну слабкість, зменшення ваги тіла на 10 кг, діарею. І

а. Лоперамід

б. Омепразол

с. Панкреатин

д. Урсодезоксихолову кислоту

е. Мебеверин

113. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на загальну слабкість, зменшення ваги тіла на 10 кг, діарею. І

а. Омепразол

б. Урсодезоксихолову кислоту

с. Мебеверин

д. Лоперамід

е. Панкреатин

114. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на періодичне незначне здуття живота, дещо послаблений стілець.

а. Ендокринна недостатність підшлункової залози

б. Екзокринна недостатність підшлункової залози

с. Дисбіоз кишечника

д. Холестаз

е. Стеаторея

115. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на періодичне незначне здуття живота, дещо послаблений стілець.

а. Холестаз

б. Екзокринна недостатність підшлункової залози

с. Ендокринна недостатність підшлункової залози

д. Стеаторея

е. Дисбіоз кишечника

116. Пацієнт віком 53 років, який хворіє на ХОЗЛ, ДН II ступеня, після чергового нападу кашлю відчув

а. В/в введення сечогінних засобів

б. Проведення плевральної пункції

с. В/в введення серцевих глікозидів

д. Оксигенотерапії

е. В/в введення теофіліну

117. Пацієнт віком 53 років, який хворіє на ХОЗЛ, ДН II ступеня, після чергового нападу кашлю відчув

а. В/в введення сечогінних засобів

б. В/в введення теофіліну

с. Оксигенотерапії

д. В/в введення серцевих глікозидів

е. Проведення плевральної пункції

118. Пацієнт віком 54 роки звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на прискорене серцебиття, задишку.

а. DAPT

б. GRACE

с. PESI

д. CHA2DS2-VASc

е. HAS-BLED

119. Пацієнт віком 54 роки звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на прискорене серцебиття, задишку.

а. PESI

б. DAPT

с. CHA2DS2-VASc

д. HAS-BLED

е. GRACE

120. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на малопродуктивний кашель, виділення в'язкого жовто-зеленого

a. Амоксицилін

b. Меропенем

c. Ципрофлоксацин

d. Азитроміцин

e. Монтелукаст

121. Пацієнт віком 54 роки скаржиться на малопродуктивний кашель, виділення в'язкого жовто-зеленого

a. Меропенем

b. Монтелукаст

c. Ципрофлоксацин

d. Амоксицилін

e. Азитроміцин

122. Пацієнт віком 57 років скаржиться на інтенсивний стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліву

a. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів

b. Блокатори кальцієвих каналів

c. Триметазидин

d. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

e. Ацетилсаліцилова кислота

123. Пацієнт віком 57 років скаржиться на інтенсивний стискаючий біль за грудниною з іррадіацією в ліву

a. Триметазидин

b. Блокатори кальцієвих каналів

c. Ацетилсаліцилова кислота

d. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів

e. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

124. Пацієнт віком 58 років скаржиться на сильний біль, почервоніння та набряк у ділянці першого плечевого

a. Подагра

b. Ревматоїдний артрит

c. Дерматоміозит

d. Остеоартроз

e. Реактивний артрит

125. Пацієнт віком 58 років скаржиться на сильний біль, почервоніння та набряк у ділянці першого плечевого

a. Остеоартроз

b. Реактивний артрит

c. Подагра

d. Ревматоїдний артрит

e. Дерматоміозит

126. Пацієнт віком 59 років скаржиться на закреп та біль в ділянці промежини під час та після акту дефекації

a. Колоноскопію з біопсією

b. Додаткові обстеження не потрібні

c. Тест на приховану кров

d. Комп'ютерну томографію живота

e. Раковий ембріональний антиген

127. Пацієнт віком 59 років скаржиться на закреп та біль в ділянці промежини під час та після акту дефекації

a. Комп'ютерну томографію живота

b. Раковий ембріональний антиген

c. Тест на приховану кров

d. Колоноскопію з біопсією

e. Додаткові обстеження не потрібні

128. Пацієнт віком 60 років скаржиться на задишку під час звичайної ходьби, кашель з виділенням невеликої кількості мокротиння

a. Хронічне обструктивне захворювання легень

b. Саркоїдоз

c. Бронхіальна астма

d. Хронічний бронхіт

e. Бронхоектатична хвороба

129. Пацієнт віком 60 років скаржиться на задишку під час звичайної ходьби, кашель з виділенням невеликої кількості мокротиння

a. Бронхіальна астма

б. Бронхоектатична хвороба

с. Хронічне обструктивне захворювання легень

д. Саркоїдоз

е. Хронічний бронхіт

130. Пацієнт віком 60 років скаржиться на задишку, пекучий біль за грудниною, що іррадіює в нижню ш

а. ІХС: Стабільна стенокардія напруження ФК III

б. ІХС: Мікрovasкулярна стенокардія напруження ФК II

с. ІХС: Стабільна стенокардія напруження ФК IV

д. Перманентна синусова брадикардія

е. ІХС: Дифузний кардіосклероз ФК III

131. Пацієнт віком 60 років скаржиться на задишку, пекучий біль за грудниною, що іррадіює в нижню ш

а. Перманентна синусова брадикардія

б. ІХС: Дифузний кардіосклероз ФК III

с. ІХС: Стабільна стенокардія напруження ФК IV

д. ІХС: Стабільна стенокардія напруження ФК III

е. ІХС: Мікрovasкулярна стенокардія напруження ФК II

132. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на раптове погіршення стану та появу вираженої задишки. Із ан

а. набряк легень

б. Спонтанний пневмоторакс

с. Гострий інфаркт міокарда

д. Кардіогенний шок

е. ТЕЛА

133. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на раптове погіршення стану та появу вираженої задишки. Із ан

а. ТЕЛА

б. Спонтанний пневмоторакс

с. Кардіогенний шок

д. Гострий інфаркт міокарда

е. набряк легень

134. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на боковій поверхні носа у вигляді невеликої виразки,

а. Хронічна виразкова піодермія

б. Демодекоз

с. Герпес

д. Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)

е. Червоний вовчак

135. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на боковій поверхні носа у вигляді невеликої виразки,

а. Червоний вовчак

б. Хронічна виразкова піодермія

с. Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)

д. Герпес

е. Демодекоз

136. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на відчуття здавлювання та тяжкості за грудниною з іррадіацією

а. Гострий коронарний синдром

б. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда

с. Повторний інфаркт міокарда

д. Гострий пієлонефрит

е. Гостра постінфарктна стенокардія

137. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на відчуття здавлювання та тяжкості за грудниною з іррадіацією

а. Гострий трансмуральний інфаркт міокарда

б. Гостра постінфарктна стенокардія

с. Гострий пієлонефрит

д. Повторний інфаркт міокарда

е. Гострий коронарний синдром

138. Пацієнт віком 65 років скаржиться на біль у лівій руці, який виник раптово після фізичного нава

а. Біохімічний аналіз крові з визначенням маркерів запалення

б. Рентгенографію легень

с. ЕКГ

- d. Рентгенографію лівої руки
- e. Загальний аналіз крові

139. Пацієнт віком 65 років скаржиться на біль у лівій руці, який виник раптово після фізичного навантаження

- a. Рентгенографію легень
- b. Рентгенографію лівої руки
- c. Загальний аналіз крові

d. ЕКГ

- e. Біохімічний аналіз крові з визначенням маркерів запалення

140. Пацієнт віком 65 років скаржиться на стискаючий біль за грудниною під час фізичного навантаження

- a. ГКС із елевацією сегмента ST
- b. Розшаровуюча аневризма аорти
- c. Гострий перикардит
- d. Гіпертонічний криз

e. ГКС. Нестабільна стенокардія

141. Пацієнт віком 65 років скаржиться на стискаючий біль за грудниною під час фізичного навантаження

- a. Гострий перикардит
- b. Розшаровуюча аневризма аорти
- c. Гіпертонічний криз

d. ГКС. Нестабільна стенокардія

- e. ГКС із елевацією сегмента ST

142. Пацієнт віком 65 років, із післяінфарктним кардіосклерозом, після пневмонії на фоні коронавірусу

a. Концентрація натрійуретичних пептидів (BNP, ANP)

- b. Рівень С-реактивного протеїну
- c. Рівень тиреотропного гормону
- d. Тропоніновий тест
- e. Швидкість клубочкової фільтрації

143. Пацієнт віком 65 років, із післяінфарктним кардіосклерозом, після пневмонії на фоні коронавірусу

- a. Рівень С-реактивного протеїну
- b. Тропоніновий тест
- c. Рівень тиреотропного гормону

d. Концентрація натрійуретичних пептидів (BNP, ANP)

- e. Швидкість клубочкової фільтрації

144. Пацієнт віком 68 років скаржиться на задишку, тривалий кашель, періодичне кровохаркання, оприлюднені

- a. Оглядова рентгенографія ОГК в прямій проекції

b. Рентгенографія ОГК у 2-х проекціях

- c. Фібробронхоскопія
- d. Ультразвукове дослідження ОГК
- e. Цитологічне дослідження харкотиння

145. Пацієнт віком 68 років скаржиться на задишку, тривалий кашель, періодичне кровохаркання, оприлюднені

- a. Оглядова рентгенографія ОГК в прямій проекції
- b. Фібробронхоскопія
- c. Ультразвукове дослідження ОГК
- d. Цитологічне дослідження харкотиння

e. Рентгенографія ОГК у 2-х проекціях

146. Пацієнт віком 68 років скаржиться на різкий біль у животі. Із анамнезу відомо, що протягом 20-ти років

- a. Загострення хронічного панкреатиту
- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Загострення хронічного холециститу

d. Розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти

- e. Тромбоз судин ниркових артерій

147. Пацієнт віком 68 років скаржиться на різкий біль у животі. Із анамнезу відомо, що протягом 20-ти років

- a. Загострення хронічного холециститу
- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Тромбоз судин ниркових артерій

d. Загострення хронічного панкреатиту

e. Розшаровуюча аневризма черевного відділу аорти

148. Пацієнт віком 76 років скаржиться на виражену задишку, відчуття здавлювання у грудях. В анамнезі

a. Гостра аневризма серця

b. Набряк легень

c. Постінфарктна стенокардія

d. Гострий пієлонефрит

e. Синдром Дресслера

149. Пацієнт віком 76 років скаржиться на виражену задишку, відчуття здавлювання у грудях. В анамнезі

a. Синдром Дресслера

b. Гострий пієлонефрит

c. Набряк легень

d. Гостра аневризма серця

e. Постінфарктна стенокардія

150. Пацієнт віком 86 років скаржиться на періодичний біль у грудях, запаморочення, серцебиття. Аускульт

a. Пароксизмальна фібриляція передсердь

b. Атріовентрикулярна блокада

c. Пароксизмальна фібриляція шлуночків

d. Пароксизмальна синусова тахікардія

e. Пароксизмальна синусова брадикардія

151. Пацієнт віком 86 років скаржиться на періодичний біль у грудях, запаморочення, серцебиття. Аускульт

a. Пароксизмальна фібриляція шлуночків

b. Пароксизмальна синусова брадикардія

c. Пароксизмальна фібриляція передсердь

d. Атріовентрикулярна блокада

e. Пароксизмальна синусова тахікардія

152. Пацієнтка віком 24 роки в терміні вагітності 39 тижнів скаржиться на головний біль, порушення з

a. Еклампсія

b. Епілепсія

c. Гіпертонічний криз

d. Тяжка прееклампсія

e. Помірна прееклампсія

153. Пацієнтка віком 24 роки в терміні вагітності 39 тижнів скаржиться на головний біль, порушення з

a. Помірна прееклампсія

b. Еклампсія

c. Тяжка прееклампсія

d. Гіпертонічний криз

e. Епілепсія

154. Пацієнтка віком 25 років в терміні вагітності 28 тижнів скаржиться на втомлюваність, слабкість,

a. Залізодефіцитна анемія

b. Апластична анемія

c. Постгеморагічна анемія

d. В₁₂-дефіцитна анемія

e. Гемолітична анемія

155. Пацієнтка віком 25 років в терміні вагітності 28 тижнів скаржиться на втомлюваність, слабкість,

a. Постгеморагічна анемія

b. Апластична анемія

c. Залізодефіцитна анемія

d. Гемолітична анемія

e. В₁₂-дефіцитна анемія

156. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, заїди в кутиках рота,

a. Сульфат заліза

b. Еритроцитарну масу

c. Фолієву кислоту

d. Преднізолон

е. Ціанокобаламін

157. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, заїди в кутиках рота,

а. Ціанокобаламін

б. Преднізолон

с. Еритроцитарну масу

д. Фолієву кислоту

е. Сульфат заліза

158. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на набряклість і болючість дрібних суглобів кисті, ранішню

а. Гостра ревматична гарячка

б. Ревматоїдний артрит

с. Остеоартрит

д. Подагра

е. Системна склеродермія

159. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на набряклість і болючість дрібних суглобів кисті, ранішню

а. Подагра

б. Остеоартрит

с. Ревматоїдний артрит

д. Системна склеродермія

е. Гостра ревматична гарячка

160. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на біль і набряклість п'ястково-фалангового суглоба 2-го па

а. Остеоартрит

б. Ревматоїдний артрит

с. Псоріатичний артрит

д. Хвороба Лайма

е. Реактивний артрит

161. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на біль і набряклість п'ястково-фалангового суглоба 2-го па

а. Реактивний артрит

б. Хвороба Лайма

с. Ревматоїдний артрит

д. Остеоартрит

е. Псоріатичний артрит

162. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, випадіння волосся, ла

а. Залізодефіцитна анемія

б. Гострий лімфобластний лейкоз

с. Гемолітична анемія

д. Хронічний мієлоїдний лейкоз

е. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія

163. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, випадіння волосся, ла

а. Хронічний мієлоїдний лейкоз

б. Вітамін В₁₂-дефіцитна анемія

с. Залізодефіцитна анемія

д. Гострий лімфобластний лейкоз

е. Гемолітична анемія

164. Пацієнтка віком 28 років у терміні вагітності 24 тижні скаржиться на нудоту, блювання, біль у п

а. Гострий апендицит

б. Хвороба Крона

с. Загострення хронічного пієлонефриту

д. Гострий гестаційний пієлонефрит

е. Харчова токсикоінфекція

165. Пацієнтка віком 28 років у терміні вагітності 24 тижні скаржиться на нудоту, блювання, біль у п

а. Загострення хронічного пієлонефриту

б. Гострий апендицит

с. Хвороба Крона

д. Харчова токсикоінфекція

е. Гострий гестаційний пієлонефрит

166. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на періодичне прискорене серцебиття, запаморочення. Консу

a. Пароксизмальне тріпотіння передсердь

b. Перманентне тріпотіння шлуночків

c. Пароксизмальну синусову тахікардію

d. Пароксизмальну фібриляцію шлуночків

e. Перманентну синусову брадикардію

167. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на періодичне прискорене серцебиття, запаморочення. Консу

a. Пароксизмальну синусову тахікардію

b. Пароксизмальне тріпотіння передсердь

c. Перманентне тріпотіння шлуночків

d. Перманентну синусову брадикардію

e. Пароксизмальну фібриляцію шлуночків

168. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на рецидивуючі епізоди циститу (до 4-х разів на рік). В ана

a. Спорожнення сечового міхура після статевих актів

b. Постійне вживання пробіотиків

c. Прийом фосфоміцину триметамолу по 3 г кожні 10 днів

d. Щоденний прийом нітрофурантоїну по 50 мг 1 р/д

e. Постійне вживання соків журавлини

169. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на рецидивуючі епізоди циститу (до 4-х разів на рік). В ана

a. Прийом фосфоміцину триметамолу по 3 г кожні 10 днів

b. Спорожнення сечового міхура після статевих актів

c. Постійне вживання соків журавлини

d. Постійне вживання пробіотиків

e. Щоденний прийом нітрофурантоїну по 50 мг 1 р/д

170. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів, що з'яв

a. Дерматит

b. Еритразма

c. Сифіліс первинний. Індураційний набряк

d. Пахова епідермофітія

e. Генітальний герпес

171. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів, що з'яв

a. Пахова епідермофітія

b. Сифіліс первинний. Індураційний набряк

c. Генітальний герпес

d. Еритразма

e. Дерматит

172. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря з метою проходження планового профілактичного ог

a. Цитологічну діагностику (ПАП-тест)

b. Цитологічну діагностику мазка крові

c. Мікроскопічне дослідження мазка на мікрофлору

d. Урогенітальний мазок з ідентифікацією мікроорганізмів

e. Урогенітальний мазок на мікоплазму

173. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря з метою проходження планового профілактичного ог

a. Урогенітальний мазок з ідентифікацією мікроорганізмів

b. Цитологічну діагностику (ПАП-тест)

c. Урогенітальний мазок на мікоплазму

d. Мікроскопічне дослідження мазка на мікрофлору

e. Цитологічну діагностику мазка крові

174. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на часте болісне сечовипускання, відчуття неповного спорожн

a. Фосфоміцину триметамол

b. Амоксициліну клавуланат

c. Меропенем

d. Ніфуроксазид

e. Ципрофлоксацин

175. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на часте болісне сечовипускання, відчуття неповного спорожн

- a. Ципрофлоксацин
- b. Амоксициліну клавуланат
- c. Фосфоміцину трометамол
- d. Ніфуроксазид
- e. Меропенем

176. Пацієнтка віком 33 роки, з терміном вагітності 32 тижні, хворіє на гестаційний цукровий діабет.

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Лактацидемічна кома
- c. Сепсис
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Колапс

177. Пацієнтка віком 33 роки, з терміном вагітності 32 тижні, хворіє на гестаційний цукровий діабет.

- a. Лактацидемічна кома
- b. Колапс
- c. Гіпоглікемічна кома
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Сепсис

178. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на підвищення АТ до 220/140 мм рт. ст., епізоди м'язової сла

- a. Первинний гіперальдостеронізм
- b. Реноваскулярна артеріальна гіпертензія
- c. Гемодинамічна артеріальна гіпертензія
- d. Артеріальна гіпертензія на фоні первинного гіперпаратиреозу
- e. Феохромоцитома

179. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на підвищення АТ до 220/140 мм рт. ст., епізоди м'язової сла

- a. Феохромоцитома
- b. Первинний гіперальдостеронізм
- c. Гемодинамічна артеріальна гіпертензія
- d. Реноваскулярна артеріальна гіпертензія
- e. Артеріальна гіпертензія на фоні первинного гіперпаратиреозу

180. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,3^{\circ}\text{C}$, нудоту, блюванн

- a. Фторхінолони
- b. Макроліди
- c. Аміноглікозиди
- d. Карбапенеми
- e. Тетрацикліни

181. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,3^{\circ}\text{C}$, нудоту, блюванн

- a. Макроліди
- b. Тетрацикліни
- c. Фторхінолони
- d. Карбапенеми
- e. Аміноглікозиди

182. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на виражену загальну слабкість, запаморочення, які посилю

- a. Значення ширини розподілу еритроцитів
- b. Кількість ретикулоцитів
- c. Рівень феритину
- d. Рівень сатурації трансферину
- e. Кількість лейкоцитів

183. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на виражену загальну слабкість, запаморочення, які посилю

- a. Рівень феритину
- b. Рівень сатурації трансферину
- c. Кількість лейкоцитів
- d. Кількість ретикулоцитів
- e. Значення ширини розподілу еритроцитів

184. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на періодичне прискорене серцебиття, запаморочення. Консу

- a. Артеріальна дистонія

- b. Жіноча стать
- c. Артеріальна гіпертензія

d. Гіпертиреоз

e. Вік

185. Пацієнтка віком 36 років скаржиться на періодичне прискорене серцебиття, запаморочення. Консу

- a. Жіноча стать
- b. Артеріальна дистонія

c. Гіпертиреоз

d. Вік

e. Артеріальна гіпертензія

186. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на головний біль, виражену м'язову слабкість, відчуття паре

a. Доксазозин

b. Спіронолактон

c. Бісопролол

d. Моксонідин

e. Торасемід

187. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на головний біль, виражену м'язову слабкість, відчуття паре

a. Торасемід

b. Доксазозин

c. Спіронолактон

d. Бісопролол

e. Моксонідин

188. Пацієнтка віком 45 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на зморщування шкіри та втя

a. Дуктографія

b. МРТ грудних залоз

c. УЗД молочної залози

d. Рентгенографія ОГК

e. Мамографія

189. Пацієнтка віком 45 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на зморщування шкіри та втя

a. МРТ грудних залоз

b. Дуктографія

c. Рентгенографія ОГК

d. УЗД молочної залози

e. Мамографія

190. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, схуднення протягом останнього року н

a. Оглядову рентгенографія органів черевної порожнини

b. Фіброгастроуденоскопію

c. Фіброколоноскопію

d. Ректороманоскопію

e. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини

191. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, схуднення протягом останнього року н

a. Ректороманоскопію

b. Фіброколоноскопію

c. Фіброгастроуденоскопію

d. Оглядову рентгенографія органів черевної порожнини

e. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини

192. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на періодичне підвищення АТ до 140/90-150/95 мм рт. ст. Об'

a. Інгібітори АПФ або антагоністи рецепторів до ангіотензину II

b. Тіазидоподібні діуретики

c. Блокатори кальцієвих каналів

d. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів

e. beta-адреноблокатори

193. Пацієнтка віком 48 років скаржиться на періодичне підвищення АТ до 140/90-150/95 мм рт. ст. Об'

a. Тіазидоподібні діуретики

b. Інгібітори АПФ або антагоністи рецепторів до ангіотензину II

- c. Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів
- d. Блокатори кальцієвих каналів
- e. beta-адреноблокатори

194. Пацієнтка віком 50 років скаржиться на появу протягом останніх 3-х місяців нерегулярних скудних

- a. Екстирпація матки з придатками
- b. Гістероскопічна абляція/резекція ендометрію, біопсія ендометрію
- c. Призначення комбінованих оральних контрацептивів
- d. Введення внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом
- e. Метод дилатації шийки матки та вишкрібання стінок порожнини матки

195. Пацієнтка віком 50 років скаржиться на появу протягом останніх 3-х місяців нерегулярних скудних

- a. Метод дилатації шийки матки та вишкрібання стінок порожнини матки
- b. Гістероскопічна абляція/резекція ендометрію, біопсія ендометрію
- c. Введення внутрішньоматкової системи з левоноргестрелом
- d. Екстирпація матки з придатками
- e. Призначення комбінованих оральних контрацептивів

196. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у ділянці правого підребер'я. Встановлено попередній

- a. Діагностична лапароскопія
- b. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
- c. Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини
- d. Фіброгастроудоденоскопія
- e. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним введенням контрасту

197. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на біль у ділянці правого підребер'я. Встановлено попередній

- a. Фіброгастроудоденоскопія
- b. Діагностична лапароскопія
- c. Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини
- d. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним введенням контрасту
- e. Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини

198. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на виражену втому, скутість, м'язову слабкість, періодичні

- a. Гіпертиреоз
- b. Дифузний токсичний зоб
- c. Дерматоміозит
- d. Гіпотиреоз
- e. Системна склеродермія

199. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на виражену втому, скутість, м'язову слабкість, періодичні

- a. Системна склеродермія
- b. Дерматоміозит
- c. Гіпертиреоз
- d. Гіпотиреоз
- e. Дифузний токсичний зоб

200. Пацієнтка віком 58 років, яка прооперована 7 років тому з приводу колоректального раку, звернул

- a. Ацетилсаліцилова кислота, диклофенак
- b. Анальгетик периферичної дії, ад'ювантна терапія
- c. Метамізол натрію, ібупрофен
- d. Бупренорфін, ад'ювантна терапія
- e. Трамадол, ад'ювантна терапія

201. Пацієнтка віком 58 років, яка прооперована 7 років тому з приводу колоректального раку, звернул

- a. Бупренорфін, ад'ювантна терапія
- b. Трамадол, ад'ювантна терапія
- c. Анальгетик периферичної дії, ад'ювантна терапія
- d. Ацетилсаліцилова кислота, диклофенак
- e. Метамізол натрію, ібупрофен

202. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на підвищення АТ до 170/100 мм рт. ст., періодичний головни

- a. Модифікація стилю життя, алопуринол, індапамід
- b. Модифікація стилю життя, амлодипін, фуросемід
- c. Модифікація стилю життя, амлодипін, гіпотіазид

d. Модифікація стилю життя, лозартан, алопуринол

e. Модифікація стилю життя, періодично бендазол, папаверин

203. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на підвищення АТ до 170/100 мм рт. ст., періодичний головний біль

a. Модифікація стилю життя, амлодипін, фуросемід

b. Модифікація стилю життя, амлодипін, гіпотіазид

c. Модифікація стилю життя, алопуринол, індапамід

d. Модифікація стилю життя, періодично бендазол, папаверин

e. Модифікація стилю життя, лозартан, алопуринол

204. Пацієнтка віком 62 роки викликала лікаря додому у зв'язку з нападом задишки, що супроводжується

a. Кардіологічному або терапевтичному відділенні стаціонару

b. Денному стаціонарі амбулаторії ЗПСМ

c. Кардіохірургічному відділенні стаціонару

d. Гастроентерологічному відділенні стаціонару

e. Амбулаторно, не шпиталізуючи до стаціонару

205. Пацієнтка віком 62 роки викликала лікаря додому у зв'язку з нападом задишки, що супроводжується

a. Гастроентерологічному відділенні стаціонару

b. Кардіологічному або терапевтичному відділенні стаціонару

c. Денному стаціонарі амбулаторії ЗПСМ

d. Кардіохірургічному відділенні стаціонару

e. Амбулаторно, не шпиталізуючи до стаціонару

206. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на загальну слабкість, оніміння кінчика язика та правої щоки

a. HADS

b. FAST

c. Бартел

d. EDSS

e. Ренкін

207. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на загальну слабкість, оніміння кінчика язика та правої щоки

a. Ренкін

b. FAST

c. EDSS

d. HADS

e. Бартел

208. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на слабкість, нудоту, біль, що посилюється вночі та після вж

a. Дексаметазон

b. Ібупрофен

c. Трамадол

d. Диклофенак

e. Прегабалін

209. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на слабкість, нудоту, біль, що посилюється вночі та після вж

a. Диклофенак

b. Прегабалін

c. Дексаметазон

d. Трамадол

e. Ібупрофен

210. Пацієнтка віком 64 роки скаржиться на частий стискаючий біль за грудниною, що виникає під час х

a. Модифікація стилю життя, бісопролол, раміприл, розувастатин

b. Модифікація стилю життя, нітрати, індапамід, моксонідин

c. Модифікація стилю життя, амлодипін, гіпотіазид, аторвастатин

d. Модифікація стилю життя, бісопролол, індапамід, еналаприл

e. Модифікація стилю життя, анаприлін, розувастатин, нітрати

211. Пацієнтка віком 64 роки скаржиться на частий стискаючий біль за грудниною, що виникає під час х

a. Модифікація стилю життя, анаприлін, розувастатин, нітрати

b. Модифікація стилю життя, нітрати, індапамід, моксонідин

c. Модифікація стилю життя, амлодипін, гіпотіазид, аторвастатин

d. Модифікація стилю життя, бісопролол, індапамід, еналаприл

е. Модифікація стилю життя, бісопролол, раміприл, розувастатин

212. Пацієнту встановлено діагноз: подагра, призначена уратзнижувальна терапія (алопуринол). Якого

- a. <380 мкмоль/л
- b. <460 мкмоль/л
- c. <400 мкмоль/л

d. <360 мкмоль/л

e. <420 мкмоль/л

213. Пацієнту встановлено діагноз: подагра, призначена уратзнижувальна терапія (алопуринол). Якого

- a. <400 мкмоль/л
- b. <460 мкмоль/л
- c. <420 мкмоль/л

d. <380 мкмоль/л

e. <360 мкмоль/л

214. Пацієнту віком 25 років з пневмонією призначено введення цефтріаксону в/в. Через 10 хв після ін

a. набряк легень

b. напад астми

c. анафілактичний шок

d. ортостатичний колапс

e. пневмоторакс

215. Пацієнту віком 25 років з пневмонією призначено введення цефтріаксону в/в. Через 10 хв після ін

a. напад астми

b. анафілактичний шок

c. пневмоторакс

d. ортостатичний колапс

e. набряк легень

216. Пацієнту віком 48 років зі скаргами на стискаючий біль за грудниною, який наростає та іррадіює

a. ехокардіографія

b. проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка)

c. заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування

d. комп'ютерна томографія органів грудної клітки

e. вимірювання серцевих біомаркерів

217. Пацієнту віком 48 років зі скаргами на стискаючий біль за грудниною, який наростає та іррадіює

a. заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування

b. проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка)

c. вимірювання серцевих біомаркерів

d. ехокардіографія

e. комп'ютерна томографія органів грудної клітки

218. Пацієнту віком 50 років сімейний лікар призначив колоноскопію. На момент огляду скарги відсутні

a. скринінг раку товстої кишки

b. діагностика виразкового коліту

c. скринінг хвороби Крона

d. скринінг раку тонкої кишки

e. виявлення прихованої кровотечі

219. Пацієнту віком 50 років сімейний лікар призначив колоноскопію. На момент огляду скарги відсутні

a. скринінг хвороби Крона

b. скринінг раку тонкої кишки

c. скринінг раку товстої кишки

d. діагностика виразкового коліту

e. виявлення прихованої кровотечі

220. Пацієнту віком 54 роки встановлено діагноз: ІХС, стабільна стенокардія напруги, ФК II класу. Гі

a. прийом метопрололу

b. недостатня доза інгаляційного сальматеролу

c. прийом розувастатину

d. прийом раміприлу

e. прийом клопідогрелю

221. Пацієнту віком 54 роки встановлено діагноз: ІХС, стабільна стенокардія напруги, ФК II класу. Гі

- a. Прийом клопідогрелю
- b. Недостатня доза інгаляційного сальматеролу
- c. Прийом раміприлу
- d. Прийом розувастатину

e. Прийом метопрололу

222. Пораненому з масивною вузловою кровотечею виконано тампонування рани з використанням гемо

- a. Антибіотикотерапія (Моксифлоксацин 400 мг)
- b. Прямий тиск на рану протягом не менше ніж 3 хв
- c. Перевірка рівня свідомості за шкалою AVPU
- d. Переведення в стабільне положення на боці
- e. Знеболення (Мелоксикам 15 мг)

223. Пораненому з масивною вузловою кровотечею виконано тампонування рани з використанням гемо

- a. Знеболення (Мелоксикам 15 мг)
- b. Антибіотикотерапія (Моксифлоксацин 400 мг)
- c. Перевірка рівня свідомості за шкалою AVPU
- d. Переведення в стабільне положення на боці
- e. Прямий тиск на рану протягом не менше ніж 3 хв

224. Працівник ДСНС у процесі медичного сортування помітив особу, що лежить на землі. Під час подал

- a. Чорним кольором
- b. Зеленим кольором
- c. Жовтим кольором
- d. Червоним кольором
- e. -

225. Під час ліквідації наслідків землетрусу під завалом будинку виявлено потерпілого із закритою че

- a. Догоспітальний
- b. Медичне сортування
- c. Госпітальний
- d. Постгоспітальний
- e. Медичне рекогносцирування

226. Під час ліквідації наслідків землетрусу під завалом будинку виявлено потерпілого із закритою че

- a. Медичне рекогносцирування
- b. Медичне сортування
- c. Постгоспітальний
- d. Госпітальний
- e. Догоспітальний

227. Під час огляду десятимісячної дитини виявлено: петехіальний висип на нижніх кінцівках, ЧД - 40/

- a. Діазепам і фенobarбітал
- b. Ампіцилін і гентаміцин
- c. Цефтріаксон і преднізолон

- d. Парацетамол і метамізол натрію
- e. Ондансетрон і метоклопрамід

228. Під час огляду десятимісячної дитини виявлено: петехіальний висип на нижніх кінцівках, ЧД - 40/

- a. Парацетамол і метамізол натрію
- b. Ампіцилін і гентаміцин
- c. Діазепам і фенobarбітал
- d. Цефтріаксон і преднізолон

- e. Ондансетрон і метоклопрамід

229. Під час огляду пацієнта віком 42 роки сімейний лікар виявив клінічні ознаки інфаркту міокарда.

- a. GRACE
- b. GINA
- c. CCS
- d. ABC
- e. Killip

230. Під час огляду пацієнта віком 42 роки сімейний лікар виявив клінічні ознаки інфаркту міокарда.

- a. ABC
- b. CCS
- c. GINA

d. GRACE

e. Killip

231. Під час огляду потерпілого з травмою грудної клітки виявлено: девіацію трахеї на протилежний бік.

- a. Обструкція нижніх дихальних шляхів кров'ю
- b. Розрив діафрагми з дислокацією шлунка у плевральну порожнину

c. Напружений пневмоторакс

- d. Травматичний розрив аорти
- e. Тампонада серця

232. Під час огляду потерпілого з травмою грудної клітки виявлено: девіацію трахеї на протилежний бік.

- a. Тампонада серця
- b. Обструкція нижніх дихальних шляхів кров'ю

c. Напружений пневмоторакс

- d. Травматичний розрив аорти
- e. Розрив діафрагми з дислокацією шлунка у плевральну порожнину

233. Під час огляду семирічної дитини лікар виявив відсутність рубчика після щеплення проти туберкульозу.

- a. Введення додаткової дози вакцини через 2 тижні після проведення проби Манту
- b. Контрольний огляд лікарем-фтизіатром кожні 6 місяців
- c. Введення додаткової дози вакцини після негативного результату ПЦР
- d. Введення додаткової дози вакцини в 7 років

e. Введення додаткової дози вакцини не потрібно

234. Під час огляду семирічної дитини лікар виявив відсутність рубчика після щеплення проти туберкульозу.

- a. Контрольний огляд лікарем-фтизіатром кожні 6 місяців
- b. Введення додаткової дози вакцини в 7 років
- c. Введення додаткової дози вакцини після негативного результату ПЦР

d. Введення додаткової дози вакцини не потрібно

e. Введення додаткової дози вакцини через 2 тижні після проведення проби Манту

235. Під час проведення евакуаційно-транспортного сортування пацієнтів з місця надзвичайної ситуації.

a. Черговість евакуації

- b. Наявність евакуаційного паспорта
- c. Медична розвідка
- d. Забезпечення комунікації з рідними та опікунами
- e. Санітарно-епідеміологічна розвідка

236. Під час проведення евакуаційно-транспортного сортування пацієнтів з місця надзвичайної ситуації.

a. Наявність евакуаційного паспорта

b. Черговість евакуації

- c. Санітарно-епідеміологічна розвідка
- d. Медична розвідка
- e. Забезпечення комунікації з рідними та опікунами

237. Семирічний хлопчик скаржиться на загальну слабкість, виражений головний біль, біль у м'язах, запам'ятовує.

a. Інтоксикаційний

- b. Ацетонемічний
- c. Імунозапальний
- d. Диспептичний
- e. Дегідратаційний

238. Семирічний хлопчик скаржиться на загальну слабкість, виражений головний біль, біль у м'язах, запам'ятовує.

- a. Ацетонемічний
- b. Імунозапальний
- c. Диспептичний

d. Інтоксикаційний

e. Дегідратаційний

239. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C у вечірні години.

a. Дослідження сечі за Нечипоренком

b. Бактеріологічне дослідження сечі

- c. Проба за Зимницьким
- d. Проба Реберга
- e. Загальний аналіз крові

240. Тринадцятирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C у вечірні години.

- a. Проба за Зимницьким
- b. Загальний аналіз крові
- c. Дослідження сечі за Нечипоренком

d. Бактеріологічне дослідження сечі

- e. Проба Реберга

241. У дворічного хлопчика спостерігається: "гавкаючий" кашель, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$.

a. Дексаметазон

- b. Цефтріаксон
- c. Теофілін
- d. Сальбутамол
- e. Парацетамол

242. У дворічного хлопчика спостерігається: "гавкаючий" кашель, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$.

- a. Парацетамол
- b. Цефтріаксон

c. Дексаметазон

- d. Сальбутамол
- e. Теофілін

243. У дворічної дівчинки спостерігається: підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$ упродовж 3-х діб,

a. Пневмонія

- b. Гострий бронхіт
- c. Гострий бронхіоліт
- d. Гострий фарингіт
- e. Бронхіальна астма

244. У дворічної дівчинки спостерігається: підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$ упродовж 3-х діб,

a. Бронхіальна астма

b. Пневмонія

- c. Гострий бронхіоліт
- d. Гострий фарингіт
- e. Гострий бронхіт

245. У дворічної дівчинки спостерігається: підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$ упродовж 3-х діб,

- a. Ацикловір
- b. Сальбутамол

c. Ампіцилін

- d. Дексаметазон
- e. Доксидиклін

246. У дворічної дівчинки спостерігається: підвищення температури тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$ упродовж 3-х діб,

- a. Доксидиклін
- b. Ацикловір

c. Ампіцилін

- d. Сальбутамол
- e. Дексаметазон

247. У дев'ятимісячної дитини після введення прикорму з'явилася діарея, здуття живота, зниження апетиту.

a. Визначення IgE до коров'ячого молока

b. Визначення рівня IgA до тканинної трансглютамінази

- c. Дослідження кальпротектину в калі
- d. Копрограму
- e. Аналіз калу на вуглеводи

248. У дев'ятимісячної дитини після введення прикорму з'явилася діарея, здуття живота, зниження апетиту.

- a. Копрограму
- b. Аналіз калу на вуглеводи

с. Визначення IgE до коров'ячого молока

д. Дослідження кальпротектину в калі

е. Визначення рівня IgA до тканинної трансглютамінази

249. У новонародженої дівчинки під час огляду виявлено: відсутні дихальні розлади, вона активна, сеч

а. Вакцинація проти гепатиту В на першій добі життя

б. Ізоляція дитини від матері

с. Скринінг дитини на HBsAg

д. Вакцинація проти гепатиту В протипоказана

е. Повторний скринінг матері на HBsAg

250. У новонародженої дівчинки під час огляду виявлено: відсутні дихальні розлади, вона активна, сеч

а. Вакцинація проти гепатиту В на першій добі життя

б. Вакцинація проти гепатиту В протипоказана

с. Скринінг дитини на HBsAg

д. Ізоляція дитини від матері

е. Повторний скринінг матері на HBsAg

251. У пацієнта віком 17 років діагностовано загострення бронхіальної астми. Для лікування призначен

а. Термінова шпиталізація у відділення невідкладної допомоги стаціонару

б. Термінова консультація зі спеціалістом вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

с. Кортикостероїди в середніх дозах перорально

д. Термінове внутрішньовенне введення ксантинів короткої дії

е. Термінова інтубація із внутрішньовенним введенням ксантинів короткої дії

252. У пацієнта віком 17 років діагностовано загострення бронхіальної астми. Для лікування призначен

а. Кортикостероїди в середніх дозах перорально

б. Термінова інтубація із внутрішньовенним введенням ксантинів короткої дії

с. Термінове внутрішньовенне введення ксантинів короткої дії

д. Термінова шпиталізація у відділення невідкладної допомоги стаціонару

е. Термінова консультація зі спеціалістом вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

253. У пацієнта віком 35 років із необтяженим анамнезом протягом 4-х місяців поступово розвинулися с

а. Гіпертрофічна кардіоміопатія

б. Дифузний кардіосклероз

с. Дифузний міокардит

д. Ексудативний перикардит

е. Дилатаційна кардіоміопатія

254. У пацієнта віком 35 років із необтяженим анамнезом протягом 4-х місяців поступово розвинулися с

а. Ексудативний перикардит

б. Дифузний кардіосклероз

с. Гіпертрофічна кардіоміопатія

д. Дифузний міокардит

е. Дилатаційна кардіоміопатія

255. У пацієнта віком 64 роки після фізичного навантаження раптово вночі гостро виникла важка задиш

а. Нітрогліцерин в/в, фуросемід в/в

б. Нітрогліцерин в/в, метопролол в/в

с. Фуросемід в/в, кордіамін в/в

д. Магnezії сульфат в/в, дібазол в/в

е. Метопролол в/в, фуросемід в/в

256. У пацієнта віком 64 роки після фізичного навантаження раптово вночі гостро виникла важка задиш

а. Нітрогліцерин в/в, метопролол в/в

б. Метопролол в/в, фуросемід в/в

с. Нітрогліцерин в/в, фуросемід в/в

д. Фуросемід в/в, кордіамін в/в

е. Магnezії сульфат в/в, дібазол в/в

257. У пацієнта віком 70 років після надмірного фізичного навантаження раптово виник напад тахікард

а. Пароксизм фібриляції передсердь

б. Пароксизм трипотіння передсердь

с. Суправентрикулярна тахікардія

d. Фібриляція шлуночків

e. Пароксизм шлуночкової тахікардії

258. У пацієнта віком 70 років після надмірного фізичного навантаження раптово виник напад тахікардії

a. Фібриляція шлуночків

b. Суправентрикулярна тахікардія

c. Пароксизм трипотіння передсердь

d. Пароксизм шлуночкової тахікардії

e. Пароксизм фібриляції передсердь

259. У пацієнта діагностовано напад суправентрикулярної тахікардії з широкими комплексами QRS, AT -

a. Аміодарон

b. Верапаміл

c. Добутамін

d. Метопролол

e. Епінефрин

260. У пацієнта діагностовано напад суправентрикулярної тахікардії з широкими комплексами QRS, AT -

a. Верапаміл

b. Епінефрин

c. Добутамін

d. Аміодарон

e. Метопролол

261. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття зареєстровано часті передсердні екстрасистолії

a. Верапаміл

b. Дилтіазем

c. Добутамін

d. Лідокаїн

e. beta-адреноблокатор

262. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття зареєстровано часті передсердні екстрасистолії

a. Дилтіазем

b. Лідокаїн

c. Верапаміл

d. beta-адреноблокатор

e. Добутамін

263. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття та структурно здоровим серцем зареєстровано

a. -

b. Регулярне моніторування за Холтером

c. Планова абляційна терапія

d. Регулярний прийом антиаритмічних препаратів

e. Усунення факторів ризику

264. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття та структурно здоровим серцем зареєстровано

a. Регулярний прийом антиаритмічних препаратів

b. Планова абляційна терапія

c. Усунення факторів ризику

d. -

e. Регулярне моніторування за Холтером

265. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття та структурно здоровим серцем зареєстровано

a. Пояснення доброякісного характеру аритмії

b. Регулярний прийом антиаритмічних препаратів

c. -

d. Регулярне моніторування за Холтером

e. Планова абляційна терапія

266. У пацієнта зі скаргами на нерегулярне серцебиття та структурно здоровим серцем зареєстровано

a. Регулярний прийом антиаритмічних препаратів

b. -

c. Пояснення доброякісного характеру аритмії

d. Планова абляційна терапія

е. Регулярне моніторування за Холтером

267. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано супр

а. В/в введенні верапамілу

б. Проведенні СЛР

с. В/в введенні метопрололу

д. Проведенні синхронізованої кардіоверсії

е. В/в введенні аденозину

268. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано супр

а. Проведенні СЛР

б. Проведенні синхронізованої кардіоверсії

с. В/в введенні верапамілу

д. В/в введенні метопрололу

е. В/в введенні аденозину

269. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано супр

а. Проведенні вагусних проб

б. В/в введенні аденозину

с. Проведенні синхронізованої кардіоверсії

д. В/в введенні епінефрину

е. В/в введенні верапамілу

270. У пацієнта зі скаргами на прискорене серцебиття, яке виникло раптово, на ЕКГ зареєстровано супр

а. В/в введенні верапамілу

б. Проведенні вагусних проб

с. Проведенні синхронізованої кардіоверсії

д. В/в введенні аденозину

е. В/в введенні епінефрину

271. У пацієнтки віком 30 років в терміні вагітності 32 тижні з'явився різкий біль у животі та темні

а. Загроза передчасних пологів

б. Гострий панкреатит вагітної

с. Загроза розриву матки

д. Передчасне відшарування плаценти

е. Центральне передлежання плаценти

272. У пацієнтки віком 30 років в терміні вагітності 32 тижні з'явився різкий біль у животі та темні

а. Центральне передлежання плаценти

б. Гострий панкреатит вагітної

с. Загроза передчасних пологів

д. Передчасне відшарування плаценти

е. Загроза розриву матки

273. У пацієнтки віком 58 років, яка 12 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу та лікується метфо

а. Заліза

б. Тіаміну

с. Ціанокобаламіну

д. Піридоксину

е. Фолієвої кислоти

274. У пацієнтки віком 58 років, яка 12 років хворіє на цукровий діабет 2-го типу та лікується метфо

а. Тіаміну

б. Ціанокобаламіну

с. Піридоксину

д. Заліза

е. Фолієвої кислоти

275. У півторарічної дитини у момент введення АКДП-вакцини з'явилася задишка, виражений акроціаноз

а. Преднізолон

б. Дексаметазон

с. Адреналін (епінефрин)

д. Супрастин (хлоропірамін)

е. Фізіологічний розчин

276. У півторарічної дитини у момент введення АКДП-вакцини з'явилася задишка, виражений акроціаноз.

- a. Супрастин (хлоропірамін)
- b. Фізіологічний розчин
- c. Адреналін (епінефрин)
- d. Преднізолон
- e. Дексаметазон

277. У разі виникнення надзвичайної ситуації, що супроводжується забрудненням шкіри, слизових оболонок.

- a. На догоспітальному/ранньому госпітальному етапі
- b. На етапі надання спеціалізованої допомоги
- c. На етапі транспортування пацієнта
- d. На етапі надання долікарської допомоги
- e. На ранньому та пізньому госпітальному етапі

278. У разі виникнення надзвичайної ситуації, що супроводжується забрудненням шкіри, слизових оболонок.

- a. На етапі надання долікарської допомоги
- b. На етапі надання спеціалізованої допомоги
- c. На догоспітальному/ранньому госпітальному етапі
- d. На ранньому та пізньому госпітальному етапі
- e. На етапі транспортування пацієнта

279. У семимісячної дитини спостерігається: в'ялість, зниження апетиту, блідість шкірних покривів. І

- a. Парентеральне введення препаратів заліза
- b. Фолієва кислота, вітаміни групи В
- c. Харчування продуктами, збагаченими залізом
- d. Пероральне введення препаратів заліза
- e. Переливання еритроцитарної маси

280. У семимісячної дитини спостерігається: в'ялість, зниження апетиту, блідість шкірних покривів. І

- a. Переливання еритроцитарної маси
- b. Харчування продуктами, збагаченими залізом
- c. Пероральне введення препаратів заліза
- d. Парентеральне введення препаратів заліза
- e. Фолієва кислота, вітаміни групи В

281. У сечі жінки з терміном вагітності 12 тижнів виявлено кишкову паличку. Скарг у жінки немає. Заг

- a. Хронічний пієлонефрит
- b. Безсимптомна бактеріурія
- c. Гострий цистит
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Гестаційний пієлонефрит

282. У сечі жінки з терміном вагітності 12 тижнів виявлено кишкову паличку. Скарг у жінки немає. Заг

- a. Хронічний пієлонефрит
- b. Гострий цистит
- c. Безсимптомна бактеріурія
- d. Гестаційний пієлонефрит
- e. Гострий пієлонефрит

283. У трирічної дитини із проявами гострої респіраторно-вірусної інфекції на другу добу хвороби вно

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Пневмонія
- c. Несправжній круп
- d. -
- e. Типовий перебіг гострої респіраторно-вірусної інфекції

284. У трирічної дитини із проявами гострої респіраторно-вірусної інфекції на другу добу хвороби вно

- a. Пневмонія
- b. Напад бронхіальної астми
- c. Несправжній круп
- d. -
- e. Типовий перебіг гострої респіраторно-вірусної інфекції

285. У чотирирічної дитини спостерігаються рідкі випорожнення без патологічних домішок до 6-7 разів

- a. Розпочати антибактеріальну терапію перорально
- b. Розпочати антибактеріальну терапію ін'єкційно
- c. Розпочати оральну регідrataцію (ентеросорбенти)

d. Розпочати оральну регідrataцію (низькоосмолярні OPC)

- e. Визначити титр IgA

286. У чотирирічної дитини спостерігаються рідкі випорожнення без патологічних домішок до 6-7 разів

- a. Розпочати антибактеріальну терапію ін'єкційно
- b. Розпочати оральну регідrataцію (ентеросорбенти)
- c. Визначити титр IgA

d. Розпочати антибактеріальну терапію перорально

e. Розпочати оральну регідrataцію (низькоосмолярні OPC)

287. У чотирирічної дитини спостерігається: загальна слабкість, закладеність носа, нав'язливий кашель

a. Кір

- b. Епідемічний паротит
- c. Алергічна екзантема
- d. Скарлатина
- e. GPBI

288. У чотирирічної дитини спостерігається: загальна слабкість, закладеність носа, нав'язливий кашель

- a. Скарлатина
- b. GPBI
- c. Алергічна екзантема

d. Кір

- e. Епідемічний паротит

289. У шестирічного хлопчика спостерігаються рідкі випорожнення без патологічних домішок до 6 разів

- a. Призначити антибактеріальну терапію
- b. Збільшити об'єм рідини перорально**

- c. Призначити імунотерапію
- d. Збільшити об'єм рідини парентерально
- e. Призначити ентросорбенти

290. У шестирічного хлопчика спостерігаються рідкі випорожнення без патологічних домішок до 6 разів

- a. Призначити ентросорбенти
- b. Збільшити об'єм рідини парентерально
- c. Призначити імунотерапію

d. Збільшити об'єм рідини перорально

- e. Призначити антибактеріальну терапію

291. Укажіть, яка комбінація препаратів застосовується для підтримувальної терапії (MART) у пацієнті

a. Будесонід/тіотропіум

b. Будесонід/формотерол

- c. Флутиказон/формотерол
- d. Мометазон/формотерол
- e. Будесонід/сальбутамол

292. Укажіть, яка комбінація препаратів застосовується для підтримувальної терапії (MART) у пацієнті

- a. Флутиказон/формотерол
- b. Мометазон/формотерол

c. Будесонід/формотерол

- d. Будесонід/тіотропіум
- e. Будесонід/сальбутамол

293. Упродовж року пацієнтці тричі надавалася невідкладна допомога з приводу нападів суправентрикулярної брадикардії

- a. Імплантація кардіостимулятора
- b. Прийом таблетованого метопрололу
- c. Прийом таблетованого дилтіазему

d. Проведення абляційної терапії

- e. Прийом таблетованого верапамілу

294. Упродовж року пацієнтці тричі надавалася невідкладна допомога з приводу нападів суправентрикулярної брадикардії

- a. Прийом таблетованого метопрололу

b. Прийом таблетованого дилтіазему

c. Проведення абляційної терапії

d. Імплантація кардіостимулятора

e. Прийом таблетованого верапамілу

295. Чоловік віком 76 років звернувся до сімейного лікаря у супроводі доньки, через погіршення стану

a. Фракція викиду - 38%, COVID-19 у анамнезі, SpO₂ - 90%

b. Втрата 10% ваги за 2 місяці, хронічні болі, фракція викиду - 38%

c. АТ - 146/90 мм рт. ст., втрата 10% ваги за 2 місяці, хронічні болі

d. Фракція викиду - 38%, прогресуюча задишка, потреба у догляді

e. Хронічні болі, SpO₂ - 90%, звисання шкірних складок

296. Чоловік віком 76 років звернувся до сімейного лікаря у супроводі доньки, через погіршення стану

a. Фракція викиду - 38%, прогресуюча задишка, потреба у догляді

b. Втрата 10% ваги за 2 місяці, хронічні болі, фракція викиду - 38%

c. Фракція викиду - 38%, COVID-19 у анамнезі, SpO₂ - 90%

d. АТ - 146/90 мм рт. ст., втрата 10% ваги за 2 місяці, хронічні болі

e. Хронічні болі, SpO₂ - 90%, звисання шкірних складок

297. Яку тактику планової імунізації проти дифтерії, правця і кашлюка необхідно застосувати місячній

a. Проводити імунізацію інактивованою вакциною протипоказано

b. Проводити імунізацію згідно з календарем профілактичних щеплень

c. Проводити імунізацію після визначення кількості CD4+ клітин/мм³

d. Визначення титру IgA

e. Проводити імунізацію, якщо рівень CD4+ >200 клітин/мм³ (>15%)

298. Яку тактику планової імунізації проти дифтерії, правця і кашлюка необхідно застосувати місячній

a. Проводити імунізацію інактивованою вакциною протипоказано

b. Визначення титру IgA

c. Проводити імунізацію після визначення кількості CD4+ клітин/мм³

d. Проводити імунізацію, якщо рівень CD4+ >200 клітин/мм³ (>15%)

e. Проводити імунізацію згідно з календарем профілактичних щеплень