

1. Укажіть основні об'єкти епідеміологічного нагляду у разі епідемії сибірки.

a. Організації, що займаються санітарно-гігієнічним обслуговуванням населення

b. Ферми, тваринницькі господарства

c. Продовольчі склади, зерносховища

d. Джерела водопостачання

e. Лікувально-профілактичні заклади

2. Територія порту в районі катастрофи танкера з розливом токсичних відходів хімічного виробництва знаходиться під постійним моніторингом служби з ліквідації наслідків.

Постраждалих під час аварії шпиталізовано. Здорове населення порту в районі забруднення води на відстані 3 км відселено в інші райони, організована доставка води, продуктів харчування, теплих речей. Проводиться дегазація хімічних речовин на місці катастрофи, збір загиблих риби і тварин. Захворюваність населення в межах сезонних коливань. Який характер цієї надзвичайної ситуації?

a. Політичний

b. Соціально-політичний

c. Природний

d. Техногенний

e. Військовий

3. Для регіону характерний високий рівень захворюваності на ендемічний зоб. Які харчові продукти слід рекомендувати населенню для вживання з метою профілактики виникнення вказаного захворювання?

a. Рибу та морепродукти

b. Молоко та молочні продукти

c. М'ясо та м'ясні продукти

d. Овочі та фрукти

e. Зернові продукти

4. Укажіть найдієвіший спосіб профілактики на індивідуальному рівні, зважаючи на значення внеску у ризик розвитку НІЗ кожного виду детермінант.

a. Переїзд для проживання в більш безпечний регіон з екологічного погляду

b. Перереєструватися на обслуговування в приватний заклад охорони здоров'я

c. Укласти декларацію із сімейним лікарем у найкращій сімейній амбулаторії міста

d. Ведення здорового способу життя

e. Щорічно проходити повне медичне обстеження

5. Із метою оптимізації системи заходів профілактики туберкульозу та підвищення їхньої ефективності були проведені групові інтерв'ю (6-8 осіб) із сімейними лікарями різних амбулаторій ЗПСМ для визначення та обговорення їхньої думки щодо цього питання. Який метод якісного дослідження було застосовано?

a. Фокус-група

b. "Випадок-контроль"

c. Крос-секційне дослідження

d. Лонгітюдне дослідження

e. Когортне дослідження

6. У чоловіка, який хворіє на цукровий діабет, суттєво погіршився стан здоров'я, виникли ускладнення. Після лікування в стаціонарі його було направлено до місцевого санаторію. До якого комплексу заходів належить цей випадок?

a. Скринінгу захворюваності

b. Третинної профілактики

c. Моніторингу захворюваності

d. Первинної профілактики

e. Вторинної профілактики

7. Ґрунт є середовищем, що може бути причиною поширення серед населення інфекційних захворювань. Яке інфекційне захворювання вражає людину після контакту із зараженим

ґрунтом?

a. Гепатит А

b. Ботулізм

c. Туберкульоз

d. Сальмонельоз

e. Лептоспіроз

8. Досліжується структура первинної захворюваності в області. Який із методів потрібно використати для візуалізації даних у цьому разі?

a. ROC-криву

b. Лісову діаграму (forest plot)

c. Секторну діаграму

d. Радіальну діаграму

e. Криву Каплана-Мейєра

9. Визначте ресурси, які додатково можна використати для досягнення прийнятного рівня здоров'я населення світу відповідно до Алма-Атинської декларації ВООЗ.

a. Світові ресурси, що витрачаються на розвиток медицини країн

b. Світові ресурси, які витрачаються на озброєння та військові конфлікти

c. -

d. Ресурси країн, спрямовані на розвиток економіки

e. Світові ресурси, що витрачаються на розвиток туризму

10. Через значне поширення серед населення області ожиріння та надлишкової маси тіла було вирішено розробити інформаційні матеріали щодо раціонального харчування. Яке рекомендоване обмеження споживання у структурі енергетичної цінності харчового раціону повинно бути включено до вказаного матеріалу?

a. Клітковини до 40%

b. Жирів до 30%

c. Білків до 10%

d. -

e. Вуглеводів до 50%

11. На сьогодні у зв'язку із надзвичайною ситуацією, яка склалася через руйнування Каховської ГЕС, підтопленням значних територій, міграцією населення, існує загроза поширення інфекційних захворювань, спільних для людей і тварин. Укажіть одне з таких захворювань.

a. ВІЛ-інфекція

b. Гепатит В

c. Холера

d. Туберкульоз

e. Лептоспіроз

12. Який нормативно-правовий документ регламентує захист населення в умовах надзвичайної ситуації?

a. Основи законодавства України про охорону здоров'я

b. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

c. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

d. Кодекс цивільного захисту населення

e. Закон України "Про охорону навколишнього середовища"

13. Провести оцінку якого показника можна за допомогою Національного рахунку охорони здоров'я (НРОЗ)?

a. Витрат

b. -

c. Прибутків

d. Цін

e. Вартості

14. Через тривалі сильні дощі на території області сталося руйнування захисної дамби.

Унаслідок надзвичайної ситуації у двох районах цієї області було затоплено декілька населених пунктів, постраждало 67 осіб, 3 мешканці загинуло. Було затоплено 271 житловий будинок, де проживали близько 1000 мешканців. Визначте рівень надзвичайної ситуації природного характеру.

- a. Державний
- b. Регіональний**
- c. Об'єктовий
- d. Місцевий
- e. Світовий

15. До лікаря на прийом звернулася мати десятирічної дівчинки з метою оцінки здоров'я дитини. Лікар пояснив, що здоров'я людини залежить від впливу різних детермінант. Серед них важливу роль відіграють біологічні фактори. Що з нижченаведеного належить до біологічних факторів?

- a. Темпи росту, стан здоров'я матері, неповна сім'я
- b. Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я
- c. Рухова активність, спосіб життя
- d. Спадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік**
- e. Спадковість, фізичний розвиток, гіподінамія

16. Дослідник порівнював ефективність нового методу лікування гіпертензії з використанням плацебо в експериментальній групі, що складалась із 10 осіб, та контрольній групі теж із 10 осіб. Укажіть найбільш імовірну причину того, що отримані результати виявилися статистично недостовірними ($P>0,05$).

- a. Мала кількість спостережень**
- b. Незначна абсолютна різниця показників
- c. Невелика тривалість лікування
- d. Незначна відносна різниця показників
- e. Неоднорідні групи

17. Для дослідження розбіжностей у рівні здоров'я населення вирішено провести дослідження соціального градієнта. Що означає соціальний градієнт здоров'я?

- a. Пряма залежність рівня здоров'я від рівня прибутків**
- b. Зворотна залежність рівня здоров'я від рівня прибутків
- c. Не встановлено ні залежності здоров'я від рівня прибутків, ні її відсутності
- d. Відсутність залежності рівня здоров'я від рівня прибутків
- e. -

18. Який перший етап розробки програм сприяння здоров'ю?

- a. Розробка втручання
- b. -
- c. Розробка системи оцінки і моніторингу
- d. Визначення цілей
- e. Оцінка потреб**

19. В одному з районів міста для вивчення захворюваності населення на інфаркт міокарда в амбулаторно-поліклінічному відділенні організовано статистичне дослідження. Як об'єкт дослідження взято кожного мешканця району, що звертався до закладу охорони здоров'я. Який вид статистичного дослідження буде використовуватися?

- a. Основного масиву
- b. Суцільне спостереження**
- c. Комбіноване дослідження
- d. Монографічний опис
- e. Вибіркове спостереження

20. На виробництві цеховим лікарем було відмічено, що в групі робітників, які зловживають алкоголем та тютюнопалінням, значно знизилася продуктивність праці. До яких суспільних втрат відноситься зниження продуктивності праці на виробництві?

- a. Медико-біологічних
- b. Нормативно-правових
- c. Соціальних
- d. Економічних**
- e. Екзогенних

21. Фахівець із громадського здоров'я на прохання сімейного лікаря проводив інформаційно-роз'яснювальну роботу з метою залучення населення до скринінгового обстеження щодо наявності серцево-судинних захворювань. Під час бесіди фахівець допоміг визначити присутнім індекс маси тіла (IMT), показники якого були в межах $18,5-28,9 \text{ кг}/\text{м}^2$. Особам, з якими показниками IMT, було рекомендовано звернутися до сімейного лікаря для обстеження щодо наявності фактора ризику хвороб серцево-судинної системи?

- a. -
- b. $20,0-22,9 \text{ кг}/\text{м}^2$
- c. $25,0-28,9 \text{ кг}/\text{м}^2$**
- d. $23,0-24,9 \text{ кг}/\text{м}^2$
- e. $18,5-19,9 \text{ кг}/\text{м}^2$

22. За умов сучасного ритму життя люди часто скаржаться на порушення та недостатню тривалість сну. Укажіть оптимальну тривалість сну, що забезпечує здоров'я людини.

- a. 5-6 год
- b. 10-11 год
- c. 9-10 год
- d. 4-5 год
- e. 7-8 год**

23. Унаслідок економічної кризи чоловік віком 45 років втратив роботу, має лише випадковий підзаробіток, згодом розлучився та почав зловживати алкоголем, що негативно позначилося на його здоров'ї. Що характеризує його нинішнє становище?

- a. Уклад життя
- b. Стиль життя**
- c. Традиції, побут
- d. Рівень життя
- e. Якість життя

24. До лікаря звернувся пацієнт віком 48 років, який проживає в зоні, що постраждала від аварії на ЧАЕС, зі скаргами на нудоту, блювання, головний біль, гарячку та розлади шлунково-кишкового тракту. Яка група факторів ризику найбільше вплинула на стан здоров'я пацієнта?

- a. Генетичні фактори
- b. Стан довкілля**
- c. Спосіб життя
- d. Фізіологічні фактори
- e. Стан медичної допомоги

25. Що обов'язково передбачає готовність до надзвичайної ситуації в охороні здоров'я?

- a. Обмін інформацією
- b. Проведення досліджень
- c. Проведення консультування
- d. Складання або перегляд плану дій у надзвичайних ситуаціях**
- e. Моніторинг ситуації

26. У колективі закладу охорони здоров'я прийнято спільнотуватися на роботу, трапляються випадки неузгодженості дій співробітників, відсутня чіткість щодо контролю дій підлеглих з боку керівника. Укажіть стиль управління в цій ситуації.

- a. Демократичний
- b. -
- c. Комбінований

d. Авторитарний

e. Ліберальний

27. Громадське об'єднання бере участь у конкурсі проектів, метою якого є зменшення рівня тяжкості неінфекційних хвороб, запобігання передчасній смертності та підвищення тривалості життя населення. Що першочергово необхідно врахувати під час складання плану комунікації?

a. Чисельність населення

b. Кількість видатків

c. Поширеність хвороб

d. Цільову аудиторію

e. Демографічну ситуацію

28. За даними Державної служби статистики країни встановлено, що серед працівників охорони здоров'я 83% становлять жінки. Серед лікарів частка жінок становить 62% загальної чисельності, середнього медичного персоналу - 94%. За національним обліком, чисельність лікарів становить 57,6 тис. осіб, лікарок - 99,3 тис., медичних сестер - 294 тис., медичних братів - 19 тис. Найбільш точно охарактеризуйте стан медичної галузі країни з урахуванням гендерного аспекту.

a. -

b. Визначена лише галузева гендерна сегрегація

c. Визначається вертикальна сегрегація

d. Спостерігається гендерний дисбаланс та галузева гендерна сегрегація

e. Присутні ознаки гендерного дисбалансу

29. Для перевірки гіпотензивного ефекту препарату відібрано 100 людей з артеріальною гіпертензією, яким призначили прийом цього препарату. Для оцінки статистичної значущості результатів буде порівняно значення систолічного артеріального тиску (САТ) до початку лікування та через тиждень після початку. Який статистичний метод потрібно використати, якщо розподіл значень САТ відрізняється від нормального?

a. U-критерій Манна-Утні

b. Критерій Ст'юдента для незалежних вибірок

c. Критерій Ст'юдента для пов'язаних вибірок

d. T-критерій Вілкоксона

e. -

30. Досліджується, як використання нової тактики лікування вплине на виживаність пацієнтів, у порівнянні зі стандартною методикою. Який із методів потрібно використати для візуального порівняння виживаності пацієнтів в обох групах?

a. Криву Каплана-Мейєра

b. Лісову діаграму (forest plot)

c. Секторну діаграму

d. ROC-криву

e. Радіальну діаграму

31. Із якою метою використовується індекс DALY?

a. Для кількісної оцінки загальної тяжкості хвороб, травм та факторів ризику

b. Для визначення втрачених років життя через непрацездатність

c. Для з'ясування причин дитячої смертності

d. Для вимірювання впливу захворюваності на певну нозологію у регіоні

e. Для оцінки якості життя населення

32. Проведено дослідження впливу додаткових психотерапевтичних методик на лікування пацієнтів із тривожними розладами. У дослідження включено сорок осіб із тривожними розладами. Додатково до медикаментозної терапії з усіма пацієнтами проводили розвантажувальні психотерапевтичні сеанси двічі на тиждень впродовж трьох місяців. Який із варіантів відповіді описує цей дизайн дослідження?

a. Випадок-контроль

b. Серія випадків

- c. Когортне
- d. Рандомізоване клінічне
- e. Перехресне

33. Під час дослідження успішності непрацюючих здобувачів університету та тих, які поєднують навчання з роботою, було виявлено, що середній бал у непрацюючих становив $8,7 \pm 0,09$, у тих, які поєднують навчання з роботою - $6,8 \pm 0,05$. Обчисленням якого коефіцієнта (критерію) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?

- a. Коефіцієнт вірогідності (t-критерій Ст'юдента)

- b. Критерій Колмогорова-Смирнова
- c. Критерій знаків (z-критерій)
- d. Т-критерій Вілкоксона
- e. Критерій відповідності (критерій χ^2)

34. Представниками неурядової організації було вирішено провести адвокаційну кампанію з метою впливу на рівень поширеності неінфекційних захворювань серед мешканців громади. Із чого потрібно розпочинати цю інтервенцію відповідно до принципів адвокації?

- a. З аналізу впливу на керовані фактори ризику

- b. З аналізу місцевих потреб та вимог людей

- c. З аналізу цільової аудиторії
- d. З аналізу нормативної бази
- e. З аналізу некерованих факторів ризику

35. Вірогідність розвитку, прогресування та несприятливого результату захворювань підвищують потенційно небезпечні для здоров'я фактори. Укажіть, які фактори належать до екзогенних некерованих?

- a. Стан медичного обслуговування населення
- b. Вік, стать
- c. Забруднення води, ґрунту, повітря
- d. Артеріальна гіpertenzія, підвищений рівень глюкози в крові

- e. Сонячна радіація, геологічні особливості ґрунту

36. Укажіть систему, за якої гроши слідували за пацієнтом, що мав право вільного вибору лікаря; лікар отримував гонорар за кількість куріваних хворих, а також підвищений гонорар за окремі категорії пацієнтів, зокрема дітей чи людей похилого віку, а також мешканців бідних районів; лікування стаціонарних хворих проводилося за рахунок коштів, які виділялися лікарю, тож лікар був зацікавлений у профілактичних заходах, адже чим менше хворіли пацієнти, тим більше коштів у нього залишалося.

- a. Бісмарка

- b. Тетчер

- c. Семашка

- d. Беверіджа

- e. Джорджа

37. Центром громадського здоров'я України запропонована ідея створення національної програми "Здоровий спосіб життя". Який орган державної влади повинен розглядати концепцію такої державної цільової програми та приймати рішення щодо її затвердження?

- a. Конституційний Суд України
- b. Органи медичного самоврядування
- c. Верховна Рада України
- d. Міністерство охорони здоров'я України

- e. Кабінет Міністрів України

38. Укажіть, хто з перерахованих осіб є суб'єктом збереження лікарської таємниці?

- a. Пацієнт

- b. -

- c. Лікуючий лікар

- d. Близький родич пацієнта

е. Член сім'ї пацієнта

39. Фахівця з громадського здоров'я запросили провести інформаційно-роз'яснювальне заняття для школярів старших класів щодо безпечноного статевого життя. На яких контрацептивних засобах слід наголосити під час заняття з метою профілактики поширення серед молоді інфекцій, що передаються статевим шляхом?

- a. Презервативах
- b. Сперміцидах
- c. Посткоїтальних контрацептивах
- d. Гормональних таблетках
- e. Внутрішньоматкових спіралах

40. Чоловік віком 45 років звернувся до сімейного лікаря, який провів збір анамнезу та встановив, що на пацієнта впливають ендогенні керовані фактори ризику. Які з нижченаведених факторів належать до ендогенних керованих?

- a. Вік, стать
- b. Недоліки медицини, спадковість
- c. Клімат, природні умови
- d. Стан довкілля, спосіб життя
- e. Артеріальна гіpertenzія, дисліпідози

41. За результатами моніторингу отримано дані про стан навколошнього середовища і здоров'я населення за рік. Який метод статистичної обробки даних необхідно використовувати для оцінки ступеня впливу чинників навколошнього середовища на здоров'я населення?

- a. Кореляційний аналіз
- b. Метод стандартизації
- c. Розрахунок відносних і середніх величин
- d. Аналіз динамічного ряду
- e. Метод оцінювання достовірності відмінностей

42. Яка інфекційна хвороба не входить до "Переліку нозологічних форм інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення"?

- a. Віспа (натуральна)
- b. Kір
- c. COVID-19
- d. Малярія
- e. Холера

43. Спеціаліст громадського здоров'я розробляє заходи щодо зменшення впливу на здоров'я громади факторів ризику. Який вид харчування об'єднує таку групу факторів: недостатнє щоденне споживання фруктів та овочів, відсутність контролю за вмістом жирів та вуглеводів у харчових продуктах, надмірне вживання солі та цукру?

- a. Фітнес-харчування
- b. Незбалансоване харчування
- c. Раціональне харчування
- d. Повоноцінне харчування
- e. Спеціальне харчування

44. На станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги міста надійшов виклик про значну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП). У результаті ДТП зіткнулося 2 легкових автівки та перевернувся рейсовий автобус. На момент виклику є інформація про 15 потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості. Яка оптимальна кількість бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги повинна бути направлена до місця події?

- a. 12 бригад
- b. 15 бригад
- c. 5 бригад
- d. 6 бригад
- e. 9 бригад

45. У двох подібних за складом населення областях довгий час спостерігалися близькі за значеннями інтегральні показники здоров'я. Однак поява та збільшення відмінностей у поширеності хвороб на цих територіях останніми роками зумовили пошук причин цих явищ, зокрема й медико-демографічного характеру. Які дані є необхідними для оцінки природного руху населення?

- a. Смертність немовлят
- b. Спеціальний показник народжуваності, нетто-коєфіцієнт відтворення
- c. Смертність від окремих захворювань, середня очікувана тривалість життя
- d. Загальна смертність, брутто-коєфіцієнт відтворення

e. Народжуваність, смертність, природний приріст

46. Через виникнення спалаху гепатиту А в сусідньому населеному пункті фахівцю з громадського здоров'я доручено розробити план заходів щодо профілактики вказаного захворювання в громаді. Які специфічні профілактичні заходи повинні бути включені до плану?

- a. Санітарно-просвітницька робота серед населення щодо шляхів інфікування
- b. Обстеження населення на наявність вірусу гепатиту А
- c. Контроль за дотриманням норм на об'єктах громадського харчування

d. Активна імунопрофілактика з використанням інактивованих вакцин

- e. -

47. Під час обстеження жінки віком 55 років встановлено наявність таких факторів ризику: обтяжений спадковий анамнез, безпліддя, постменопаузальне ожиріння, уживання алкоголю, куріння. Які першочергові управлінські дії доцільно застосувати для такої пацієнтки?

- a. Направлення на швидкий тест на ВІЛ
- b. Направлення на стаціонарне лікування
- c. Опитування

d. Направлення на мамографію

- e. Направлення на санаторно-курортне лікування

48. Укажіть суспільно-небезпечні явища, які не регулюються міжнародними медико-санітарними правилами.

- a. Боротьба з хворобами
- b. Міжнародне поширення тероризму**
- c. Заходи у відповідь на поширення хвороб на рівні суспільної охорони здоров'я, що співмірні з ризиками для здоров'я населення та обмежені ними
- d. Міжнародне поширення хвороб
- e. Оберігання від поширення хвороб

49. У громаді реалізується програма попередження травматизму та його наслідків. Якій цільовій групі населення необхідно реалізовувати заходи третинної профілактики дорожньо-транспортного та побутового травматизму?

- a. Особам із наслідками травм**
- b. Пішоходам
- c. Працівникам підприємств
- d. Загальному населенню
- e. Водіям транспортних засобів

50. Лікар проводив корекцію поведінки пацієнта з ожирінням щодо дієти з метою зниження маси тіла та запобігання розвитку цукрового діабету. Який вид профілактики застосовується?

- a. Третинна
- b. Вторинна**
- c. Групова
- d. Первинна
- e. Індивідуальна

51. Пацієнт звернувся до свого сімейного лікаря (з яким у нього підписана декларація) зі скаргами на біль у поперековій ділянці. Після ретельного обстеження лікар вирішив направити пацієнта на консультацію до лікаря-нефролога. Яким медичним працівникам у цьому разі

доступні персоналізовані дані пацієнта в електронній системі охорони здоров'я (усі дані про пацієнта, які містяться у декларації, а також медична інформація та призначення)?

a. Тільки лікарю, з яким підписана декларація, та лікарю, до якого пацієнт приходить за напрямленням

b. Тільки пацієнт сам може вирішити, кому він надає доступ

c. Будь-якому медичному працівнику цього ЗОЗ

d. Тільки лікарю, з яким підписана декларація

e. Тільки лікарю, до якого пацієнт приходить за напрямленням

52. На металургійному комбінаті великого промислового міста працює 230 осіб, що проживають у сільській місцевості, які щоденно витрачають 2 години на дорогу до комбінату і назад.

Визначте, яку міграцію за тривалістю здійснюють робітники.

a. Сезонну

b. Щоденну

c. Маятникову

d. Постійну

e. Виробничу

53. Максимальна користь для здоров'я дітей раннього віку досягається за умов дотримання всіх рекомендацій щодо фізичної активності та тривалості сну протягом доби. Укажіть рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я тривалість сну у дітей віком 3-4 роки.

a. 12-15 год

b. 7-10 год

c. 10-13 год

d. 8-11 год

e. -

54. Оцінюються метрики продуктивності нового діагностичного тесту. Який із методів потрібно використати для візуалізації даних у цьому разі?

a. ROC-криву

b. Секторну діаграму

c. Криву Каплана-Мейєра

d. Лісову діаграму (forest plot)

e. Радіальну діаграму

55. В одній із областей України зареєстровано поширення заразної хвороби тварин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності цією хворобою на відповідній території. Як називається ця небезпечна ситуація?

a. Аварія

b. Епіфіtotія

c. Епідемія

d. Стихійне лихо

e. Епізоотія

56. Створення та забезпечення функціонування системи епіднагляду за демографічним станом населення передбачає дослідження показників народжуваності населення. Який обліковий документ є джерелом інформації для вивчення показників народжуваності?

a. Історія розвитку новонародженого

b. Свідоцтво про народження

c. Обмінна карта

d. Історія пологів

e. Медичне свідоцтво про народження

57. Діаграма Ішікави, відома як діаграма "риб'ячої кістки" (Fishbone Diagram), є одним із семи основних інструментів вимірювання, оцінювання, контролю та покращення якості виробничих процесів, у тому числі в медичній галузі. Які питання дозволяє вирішити побудова цієї діаграми в процесі вирішення проблем?

- a. Ілюструє види діяльності закладу
- b. Демонструє успіх виробничих процесів у закладі
- c. Дозволяє визначити тенденції змін поширення хвороб
- d. Допомагає встановити причинно-наслідкові (каузальні) зв'язки**
- e. Демонструє вектор виробничих процесів у закладі

58. Якість і безпека питної води за хімічним складом формується на основі вмісту окремих хімічних елементів. Який хімічний елемент із нижченаведених може викликати водну інтоксикацію серед споживачів?

- a. Марганець
- b. Свинець**
- c. Алюміній
- d. Залізо
- e. Кальцій

59. В одній із областей України зареєстровано поширення заразної хвороби рослин, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності на цю хворобу на відповідній території. Як називається ця небезпечна ситуація?

- a. Епіфіtotія**
- b. Стихійне лихо
- c. Аварія
- d. Епізоотія
- e. Епідемія

60. Пацієнта прийшла на консультацію до сімейного лікаря. Під час прийому лікар провів із нею освітню бесіду щодо принципів раціонального збалансованого харчування, вживання алкоголю, рекомендованої фізичної активності. Укажіть, який вид профілактики проведено в цьому разі?

- a. Третинну
- b. Первинну**
- c. Популяційну
- d. Вторинну
- e. -

61. Фармацевтична компанія проводить клінічне випробування нового лікарського засобу за участю людини. Усі особи, які виявили бажання взяти участь у дослідженні, були належно поінформовані про характер та значення клінічного випробування, вплив та ризики, після чого їм було запропоновано підписати документ, що підтверджував це усвідомлене добровільне рішення. Укажіть цей документ.

- a. Угода на дослідження
- b. Інформована згода**
- c. Клінічна угода
- d. Інформаційний лист
- e. Контракт на дослідження

62. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього відібрано дві групи: учасники першої - курці, учасники другої - ні. Протягом тривалого часу у учасників дослідження будуть фіксувати випадки виникнення досліджуваного захворювання. По закінченню терміну спостереження розраховують необхідні статистичні показники і роблять висновки про вплив фактора на результат. Дизайн якого дослідження описано?

- a. Екологічне
- b. Клінічний експеримент
- c. Когортне**
- d. Опис серії випадків
- e. Випадок-контроль

63. До лікаря сімейної практики звернувся пацієнт зі скаргами на порушення роботи шлунково-кишкового тракту. Збираючи анамнез, лікар встановив, що пацієнт не займається

фізичною активністю, із підліткового віку в його раціоні переважають вуглеводи в середньому 500 г на добу, білків пацієнт вживає 60 г, а жирів - лише 30 г на добу. Яка група негативних детермінантів визначається в цього пацієнта?

- a. Соціально-економічні
- b. Спадкові
- c. Поведінкові
- d. Харчові
- e. Біологічні

64. Недостатня фізична активність є одним із важливих факторів ризику, які є причиною смерті в глобальному вимірі. Всесвітньою організацією охорони здоров'я розроблено Глобальні рекомендації з фізичної активності для здоров'я. Укажіть рекомендовану тривалість фізичної активності помірної інтенсивності для дорослого населення у віковій групі 18-64 роки впродовж тижня?

- a. Не менше ніж 150 хв
- b. Не менше ніж 90 хв
- c. Не менше ніж 60 хв
- d. Не менше ніж 120 хв
- e. -

65. На території об'єднаної громади постійно проживає населення чисельністю 46500 осіб, із яких: 7500 - діти віком до 14 років, 26500 - особи віком від 15 до 49 років, а решта - 50 років і старше. Який тип вікової структури населення характерний для вказаної громади?

- a. Динамічний
- b. Стационарний
- c. Статичний
- d. Регресивний
- e. Прогресивний

66. Молода жінка проживає поблизу 100-кілометрової зони від діючої АЕС, викурює одну пачку цигарок на день, тому стурбована ризиком виникнення у неї раку. Що з нижченаведеної насамперед сприятиме зменшенню ризику виникнення раку?

- a. Проведення щорічного тесту на приховану кров
- b. Відмова від куріння
- c. Проведення щорічної мамографії
- d. Щорічне обстеження у гінеколога
- e. Переїзд до іншого населеного пункту

67. Якісне збалансоване харчування сприяє гарному самопочуттю, знижує ризик нездорового збільшення ваги та розвиток неінфекційних захворювань. Вкажіть рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я щоденну кількість споживання овочів і фруктів для дорослих?

- a. -
- b. Щонайменше 200 г
- c. Щонайменше 300 г
- d. Щонайменше 500 г
- e. Щонайменше 400 г

68. У регіоні спостерігається зростання летальності від інсульту. Ситуація вимагає оцінки ефективності роботи неврологічних стаціонарних відділень регіону. Визначте одиницю спостереження у цьому разі.

- a. Укомплектованість стаціонарів лікарями-неврологами
- b. Неврологічний стаціонар
- c. Своєчасність звернення до неврологічного стаціонару
- d. Забезпеченість населення ліжками неврологічного профілю
- e. Оснащення діагностичним обладнанням неврологічного стаціонару

69. Під час проведення мета-аналізу вивчається, наскільки показник, що розглядається, коливається в різних дослідженнях. Який із методів потрібно використати для візуалізації

коливань та усереднення даних у цьому разі?

- a. Секторну діаграму
- b. Лісову діаграму (forest plot)**
- c. Радіальну діаграму
- d. ROC-криву
- e. Криву Каплана-Мейєра

70. Проводиться пілотне дослідження ефективності нового препарату, у порівнянні зі стандартним. Дослідник виявив статистично значущу різницю між дією препаратів, яка була підтверджена в подальших дослідженнях. Як можна описати висновки, зроблені дослідником у цьому разі?

- a. Альтернативна гіпотеза прийнята неправильно
- b. Альтернативна гіпотеза прийнята правильно**
- c. Нульова гіпотеза прийнята правильно
- d. -
- e. Нульова гіпотеза прийнята неправильно

71. Генеральний директор комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня" провів зустріч із персоналом лікарні. На цій зустрічі були заслухані доповіді щодо результатів роботи лікарні та оцінки якості надання медичних послуг за попередній рік, а також була презентована програма роботи на наступний рік. Яка функція керівника представлена?

- a. Планування**
- b. Організація
- c. Керівництво
- d. Контроль
- e. Коригування

72. На території Сумської області виявлено стихійне захоронення решток овець. За результатами експертизи встановлено, що падіж пов'язаний із захворюванням тварин на сибірку. До якого виду, залежно від характеру походження, належить надзвичайна ситуація?

- a. -
- b. Соціального характеру
- c. Природного характеру**
- d. Воєнного характеру
- e. Техногенного характеру

73. У приватній офтальмологічній клініці відзначається зниження цін на медичні послуги та товари медичного призначення. Це привело до збільшення купівельної спроможності населення. Як називається кількісний показник, що відображає ступінь кількісних змін запропонованих товарів і послуг у відповідь на зміну їхніх цін?

- a. Коефіцієнт еластичності пропозиції**
- b. Сумація
- c. Капітація
- d. Еластичність попиту
- e. Еластичність пропозиції

74. В окремій місцевості розроблена регіональна програма громадського здоров'я щодо протидії неінфекційним захворюванням. Визначте структуру, яка має право погодити проект концепції регіональної програми.

- a. Центр громадського здоров'я МОЗ України
- b. ВООЗ
- c. Верховна Рада України
- d. Виконавчий комітет обласної або місцевої ради**
- e. МОЗ України

75. Протягом останніх 5-ти років серед населення громади спостерігається постійне зростання захворюваності на дифтерію. Які профілактичні заходи слід запланувати та організувати в громаді з метою стабілізації показників захворюваності?

a. Лікування хворих на дифтерію

b. Вакцинацію від дифтерії

c. Виявлення носіїв дифтерії

d. Медикаментозну профілактику дифтерії

e. Лікування контактних осіб

76. Унаслідок надзвичайної ситуації в одній із областей України постраждало понад 100 осіб та було порушене нормальні умови життєдіяльності більш ніж на 3 доби у понад 10 тис. осіб. Який рівень цієї надзвичайної ситуації?

a. Державний

b. Місцевий

c. Регіональний

d. Міждержавний

e. Об'єктовий

77. У громаді серед населення за останній рік виявлено велику кількість випадків ВІЛ-інфекції на четвертій стадії (стадії СНІДу), що значно перевищує кількість виявлених випадків на інших стадіях цієї хвороби. Про недостатню організацію якого процесу свідчить така ситуація?

a. Інформаційно-просвітницька робота щодо інфікування серед молоді

b. Залучення до добровільного консультування і тестування на наявність ВІЛ

c. Моніторинг стану пацієнтів із ВІЛ-інфекцією

d. Лікування осіб зі встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

e. Залучення до доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції

78. Під час вивчення впливу пасивного паління на захворюваність населення на рак легенів встановлено, що показник відношення шансів становив 1,0. Який висновок із нижчеприведених є правильним?

a. Підвищений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі здорових, ніж у групі хворих

b. Відсутність ефекту, тобто частота впливу чинника однакова в групі хворих і в групі здорових

c. Знижений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі здорових, ніж у групі хворих

d. Підвищений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі хворих, ніж у групі здорових

e. Знижений ризик, тобто частота впливу чинника вища в групі хворих, ніж у групі здорових

79. Заклад охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, закупив систему для визначення глікозильованого гемоглобіну, який дозволяє виявляти прихованій цукровий діабет (предіабет) та розробляти програму профілактики розвитку діабету для кожного пацієнта. Кому необхідно проводити такий скринінг?

a. Вагітним жінкам

b. Новонародженим дітям

c. Усім жінкам

d. Усім підліткам від 15 до 18 років

e. Усім чоловікам

80. У країні, що розвивається, відзначається зростання рівня життя населення в результаті реалізації ефективної міжрегіональної національної програми. Укажіть основний індикатор економічного розвитку країни, що є найповнішим показником сумарного обсягу виробництва товарів і послуг за певний період та характеризує стан економіки в країні.

a. Державні інвестиції

b. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

c. Валові приватні внутрішні інвестиції (ВПВІ)

d. Валовий національний продукт (ВНП)

e. Сальдо первинних доходів

81. Досліджуються зміни структури смертності за останні 5 років. Який із методів потрібно використати для візуалізації даних у цьому разі?

a. Криву Каплана-Мейєра

b. Лісову діаграму (forest plot)

c. ROC-криву

d. Дендрограму (tree diagram)

e. Внутрішньостовпчикову діаграму

82. Обласний департамент охорони здоров'я проводить аналіз рівня смертності немовлят в області та визначає, наскільки він залежить від керованих причин, пов'язаних із недоліками в організації медичної допомоги дітям. Який показник найбільш точно це відображає?

a. Показник перинатальної смертності в різні періоди

b. Показник смертності немовлят за календарний місяць

c. Питома вага неонатальної смертності в загальній смертності немовлят

d. Показник смертності дітей у віці до 1-го року

e. Питома вага постнатальної смертності в загальній смертності немовлят

83. Середній зріст вибірки студентів 1-го курсу становить 170 см зі стандартним відхиленням 8 см. Укажіть, які додаткові дані потрібно знати, щоб обчислити довірчий інтервал для середнього зросту студентів 1-го курсу.

a. Кількість студентів 1-го курсу зі зростом 170 см

b. Кількість студентів у досліджуваній вибірці

c. Кількість студентів усіх курсів

d. Кількість усіх студентів 1-го курсу

e. Наданих в умові даних достатньо, додаткових не потрібно

84. Сімейний лікар оцінює стан здоров'я своїх пацієнтів, які мають ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. За якою шкалою розраховується сумарний ризик розвитку фатального серцево-судинного захворювання?

a. EPIC

b. STATA

c. MABP

d. ASIST

e. SCORE

85. У мешканців Закарпатської області впродовж багатьох років спостерігається явище йододефіциту та поширення захворювань, пов'язаних із ним. Яку назву має це явище?

a. Спалах

b. Епідемія

c. Пандемія

d. Кластер

e. Ендемія

86. Оберіть правильну характеристику показника середнього споживання солі мешканцями України, який становить 12,6 г на добу згідно з результатами проведеного у 2019 році дослідження STEPS.

a. Більше ніж удвічі перевищує рекомендовану ВООЗ норму

b. Не перевищує гранично допустимих норм вмісту мікроелементів у щоденному раціоні

c. Більше ніж утрічі перевищує рекомендовану ВООЗ норму

d. Є порівняно низьким показником для забезпечення необхідної кількості мікроелементів у щоденному раціоні

e. Є нормальним (історично та культурно обумовленим) рівнем споживання солі для мешканців цього регіону

87. Обласний центр контролю та профілактики хвороб вирішив провести опитування серед населення щодо впливу територіальних факторів ризику на рівень здоров'я. Що може бути критерієм "винятку" з вибірки цього дослідження?

a. Невідвідування закладів охорони здоров'я протягом року

b. Проживання на території досліджуваного регіону менше 1-го року

c. Відсутність офіційного працевлаштування більше 1-го року

d. Відсутність вищої освіти

e. Відсутність декларації з сімейним лікарем

88. Досліджують сезонні коливання захворюваності на ГРВІ протягом року. Який із методів

потрібно використати для візуалізації даних у цьому разі?

- a. Криву Каплана-Мейєра
- b. Секторну діаграму
- c. Лісову діаграму (forest plot)
- d. ROC-криву
- e. Радіальну діаграму**

89. Вірогідність розвитку, прогресування та несприятливого результату захворювань підвищують потенційно небезпечні для здоров'я фактори. Укажіть, які фактори належать до ендогенних некерованих?

- a. Забруднення води, ґрунту, повітря

b. Вік, стать

- c. Артеріальна гіпертензія, підвищений цукор крові
- d. Сонячна радіація, геологічні особливості ґрунту
- e. Стан медичного обслуговування населення

90. У якому дослідженні проводиться тривале вивчення стану здоров'я однієї сукупності осіб за допомогою багаторазової реєстрації певних показників через встановлені проміжки часу з метою визначення динаміки їх зміни та взаємовпливу?

- a. Трендовому
- b. Повторному
- c. Оперативному
- d. Когортному

e. Лонгітюдному

91. У громаді було вирішено сформувати річний план вторинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань. Які заходи серед населення громади необхідно включити до такого плану?

- a. Проведення туберкулінодіагностики
- b. Організація скринінгу на виявлення артеріальної гіпертензії**
- c. Інформування щодо раціонального харчування
- d. Посилення інформаційно-освітньої роботи щодо здорового способу життя
- e. Організація реабілітаційних заходів після інфаркту міокарда

92. Під час вивчення проявів нерівності щодо здоров'я населення різних регіонів було виявлено відмінності у впливі окремих чинників на здоров'я. Які з нижче наведених чинників обумовлюють нерівність у здоров'ї?

- a. Економічні**
- b. Біологічні
- c. Кліматичні
- d. -
- e. Поведінкові

93. Після отриманого трагічного повідомлення у чоловіка виник сильний пекучий біль у ділянці серця з іrrадіацією у ліву руку та лопатку, виражена загальна слабкість, є відчуття нестачі повітря та тривоги. Який патологічний стан, імовірно, виник у цього чоловіка?

- a. Депресія
- b. Інфаркт міокарда**
- c. Мозковий інсульт
- d. Гіпертонічний криз
- e. Алкогольне отруєння

94. Нова Зеландія оголосила надзвичайну ситуацію, оскільки циклон "Габріель" спричинив масштабні повені, зсуви, величезні океанські хвилі та спровокував евакуацію населення. Унаслідок катаklіzmів 225 тисяч мешканців Нової Зеландії залишилися без світла, дороги зруйновані. До якого виду належить ця надзвичайна ситуація?

- a. Соціального характеру
- b. Природного характеру**

- c. Техногенного характеру
- d. Воєнного характеру
- e. Суспільного характеру

95. Комісія територіальної громади з благоустрою зафіксувала незадовільні умови проживання громадян певного селища. До якої групи детермінант належить цей фактор?

- a. Поведінкові
- b. Доступ до медичних послуг
- c. Соціально-економічні**
- d. Екологічні
- e. Генетичні

96. У закладі первинної медичної допомоги при виконанні професійних обов'язків сталася аварійна ситуація: сестра медична вкололася голкою після проведення венепункції пацієнту з потенційним позитивним ВІЛ-статусом. Після проведення заходів екстреної постконтактної профілактики сестрі медичній рекомендовано розпочати 28-денний курс антиретровірусної терапії (АРТ). Протягом якого періоду з моменту аварійної ситуації доцільно розпочати вказаний курс АРТ з метою попередження інфікування ВІЛ?

- a. 72 год**
- b. 80 год
- c. 96 год
- d. 120 год
- e. 92 год

97. На виконання Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" від 2009 року в місті підвищено ціни на тютюнові вироби, заборонено паління в громадських місцях, проведено роз'яснювальні роботи з населенням щодо шкоди паління, розміщено наочну інформацію на вулицях міста. Укажіть рівень стратегічного планування розробки проекту.

- a. Муніципальний**
- b. Національний
- c. Міжрегіональний
- d. Регіональний
- e. Міжнародний

98. Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з'ясувати, що між частотою артеріальної гіпертензії та наявністю в анамнезі черепно-мозкової травми існує кореляційний взаємозв'язок. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює $+0,85$. Оцініть силу і напрямок зв'язку.

- a. Зворотний, сильний
- b. Відсутній зв'язок
- c. Зворотний, середній
- d. Прямий, середній
- e. Прямий, сильний**

99. В одному з районів показник смертності немовлят за звітний період становив 13,8 випадків на 1000 новонароджених, у той час як в іншому районі цей показник - 12,4. Який статистичний метод потрібно застосувати для порівняння цих показників?

- a. Динамічного аналізу
- b. Нормування інтенсивних показників
- c. Стандартизації**
- d. Кореляційного аналізу
- e. Визначення достовірності різниці між показниками

100. Визначте основний міжнародний документ, який забезпечує право на найвищий досяжний рівень здоров'я.

- a. Конституція України
- b. Оттавська Хартія**

с. Алма-Атинська декларація ВООЗ

d. Статут ВООЗ

е. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

101. Жінка віком 29 років з терміном вагітності 35 тижнів знаходилася на диспансерному обліку у зв'язку з цукровим діабетом 1-го типу, з наявністю ускладнень у вигляді нефропатії. У пацієнтки розвинулася еклампсія тяжкого ступеня. Інтенсивна терапія, проведена в стаціонарі пологового будинку, належного ефекту не дала, і пацієнта померла. Який це вид смертності?

a. Материнська смертність

- b. Рання неонатальна смертність
- c. Перинатальна смертність
- d. Неонатальна смертність
- e. Загальна смертність

102. Фахівцю з громадського здоров'я доручили провести аналіз захворюваності на ВІЛ-інфекцію за 10-річний період. Який вид графічного зображення найбільш доцільно використати для якісної візуалізації статистичних даних?

- a. Секторну діаграму
- b. Радіальну діаграму

c. Лінійну діаграму

- d. Картодіаграму
- e. Діаграму розсіювання

103. Відповідно до наукових досліджень (A. I. Robbins, 1980) визначено чотири групи провідних детермінант, що впливають на здоров'я населення. Яке співвідношення за питомою вагою між групами провідних детермінант здоров'я встановлено автором дослідження?

- a. Спосіб життя - 30%; генетика - 20%; довкілля - 20%; медицина - 30%
- b. Спосіб життя - 35%; генетика - 25%; довкілля - 15%; медицина - 25%
- c. Спосіб життя - 45%; генетика - 25%; довкілля - 25%; медицина - 5%
- d. Спосіб життя - 50%; генетика - 20%; довкілля - 20%; медицина - 10%**
- e. Спосіб життя - 40%; генетика - 10%; довкілля - 30%; медицина - 20%

104. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надає Україні інструкції та методологічні рекомендації щодо впровадження сучасних технологій лікування, реформування національної системи охорони здоров'я, впровадження нових методів та форм профілактики захворювань. Яку функцію ВООЗ виконує в цьому разі?

- a. Посередницьку
- b. Мотиваційну
- c. Організаційну
- d. Наукового супроводу**
- e. Планування

105. Відділ із контролю за вакцинацією населення проводить розрахунок потреб у вакцинах для щеплення дітей до 1-го року згідно з Календарем щеплення на наступний рік. Який демографічний показник потрібно взяти для розрахунку?

- a. Кількість новонароджених**
- b. Кількість відмов з вакцинації за рік
- c. Чисельність населення
- d. Природний приріст населення
- e. Чисельність вакцинованих у минулому році

106. Укажіть основні групи населення, які підлягають обов'язковому обстеженню на ВІЛ.

- a. Донори крові**
- b. Працівники комерційного сексу
- c. Особи, які мають контакти з хворими на ВІЛ/СНІД
- d. Особи з наркотичною залежністю
- e. Особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією

107. Лікар під час стажування в Африці надавав допомогу пацієнтам із гарячкою Ебола. За 21

день після повернення зі стажування йому встановлено діагноз: геморагічна гарячка Ебола. Яких заходів має вжити головний лікар закладу охорони здоров'я у цьому разі?

a. Призначити контактному персоналу імуноглобулін

b. Ізолювати протягом 21-го дня увесь персонал відділення, який знаходився безпосередньо в контакті з хворим лікарем

c. Ізолювати протягом 10-ти днів увесь персонал відділення, який знаходився безпосередньо в контакті з хворим лікарем

d. Призначити імуномодулятори з профілактичною метою

e. Ізолювати протягом 3-х днів увесь персонал відділення, який знаходився безпосередньо в контакті з хворим лікарем

108. Онкологічна патологія займає провідне місце в структурі загальної захворюваності та смертності населення. Який фактор ризику розвитку онкологічного захворювання є найсуттєвішим?

a. Тютюнопаління

b. Стрес

c. Вірус герпесу

d. Надлишкова маса тіла

e. Старіння

109. Із метою оцінки демографічної ситуації в області фахівцю з громадського здоров'я доручили визначити рівні народжуваності, смертності та природного приросту за минулий рік. Які показники слід використати для визначення вказаних рівнів?

a. Інтенсивні

b. Екстенсивні

c. Співвідношення

d. Стандартизації

e. Наочності

110. Фахівцю із громадського здоров'я доручили сформувати цільову групу для проведення вакцинації від папіломавірусної інфекції. Яку категорію населення слід першочергово включити у вказану цільову групу?

a. Хлопці-підлітки

b. Особи з виявленим вірусом

c. Вагітні жінки

d. Діти до 1 року

e. Дівчата-підлітки

111. При землетрусі сталося руйнування великої кількості багатоповерхових будинків, в окремих місцях виникли пожежі, з'явилася величезна кількість потерпілих, у тому числі загиблих. Бригади служби ЕМД та МК надавали екстрену медичну допомогу в умовах дефіциту персоналу та ресурсів, розподіляючи потерпілих на певні групи залежно від стану, медичних показань та терміновості потреби в евакуації. Як називається процес розподілу потерпілих за такими принципами?

a. Медичне сортування

b. Екстрене сортування

c. Медичне групування

d. Розподіл хворих

e. Медична евакуація

112. Проводиться дослідження щодо оцінки впливу куріння на систолічний артеріальний тиск (САТ). Відібрано 2 гомогенні вибірки по 100 осіб у кожній, перша група - курці, друга - ні. Який статистичний тест необхідно використати для оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів, якщо розподіл значень САТ відрізняється від нормального?

a. Критерій Ст'юдента для пов'язаних вибірок

b. U-критерій Манна-Уітні

c. Критерій Ст'юдента для незалежних вибірок

d. T-критерій Вілкоксона

е. -

113. За певною групою населення (без ішемічної хвороби серця) було встановлено 5-річне спостереження з метою виявлення нових випадків ішемічної хвороби серця під впливом ендо- та екзогенних факторів. Який вид епідеміологічного дослідження був використаний у цьому разі?

- a. Експериментальний
- b. "Випадок-контроль"
- c. Проспективний
- d. Одномоментний
- e. Описовий

114. Інтегральним показником суспільного прогресу країн світу є Індекс людського розвитку, що поєднує в собі характеристики здоров'я населення, освіти та рівня життя. Який показник здоров'я входить до Індексу людського розвитку?

- a. Показник інвалідності населення
- b. Рівень загальної захворюваності населення
- c. Середня очікувана тривалість життя
- d. Рівень смертності населення
- e. Рівень захворюваності на основні соціально-значущі захворювання

115. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього відібрано дві групи людей: учасники першої групи мають в анамнезі рак легень, учасники другої - ні. Після цього з'ясовують, хто з учасників зазнав впливу фактора, а хто ні. Потім розраховують необхідні статистичні показники і роблять висновки про вплив фактора на результат. Дизайн якого дослідження описано?

- a. Когортне
- b. Екологічне
- c. Клінічний експеримент
- d. Опис серії випадків
- e. Випадок-контроль

116. Фонди соціального страхування отримували дві треті суми внесків безпосередньо від робітників й одну третю від працедавців. Із цих коштів оплачувалися лікування, пенсії, допомога по безробіттю. Згодом ці фонди перетворилися на лікарняні каси, а потім - у страхові компанії. Для якої системи притаманний такий механізм формування фондів соціального страхування?

- a. Біスマрка
- b. Семашка
- c. Тетчер
- d. Джорджа
- e. Беверіджа

117. Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка" подало заяву до Головної акредитаційної комісії щодо проведення акредитації. Який із нижченаведених документів обов'язково у двомісячний термін із дня подання заяви повинна розглянути комісія на предмет його відповідності переліку, вказаному Порядком?

- a. Результати самоаналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги
- b. Звіт про медичну допомогу в районі обслуговування лікувального закладу (ф.12)
- c. Загальну характеристику району обслуговування
- d. Акредитаційний сертифікат терміном на 3 роки
- e. Табель оснащення закладу

118. Під час соціологічного дослідження було проведено опитування певної категорії населення щодо обізнаності у поведінкових факторах ризику виникнення неінфекційних захворювань. Що з нижченаведеної належить до поведінкових факторів ризику?

- a. Психологічне середовище в колективі
- b. Рівень доходів

c. Забруднення навколишнього середовища

d. Споживання недостатньої кількості овочів та фруктів

e. Вік та стать

119. Лікар на прийомі, маючи дані про спосіб життя пацієнта віком 37 років, звернув увагу на те, що на організм пацієнта впливають різні групи факторів ризику. Який відсоток становить спосіб життя людини у структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення?

a. 10%

b. 40%

c. 20%

d. 30%

e. 50%

120. Вікова структура населення суттєво впливає на стан популяційного здоров'я та визначає потребу в послугах охорони здоров'я. Що характерно для вікової структури населення України?

a. Невелика питома вага осіб дитячого віку та осіб старшого віку

b. Велика питома вага осіб працездатного і молодого віку

c. Велика питома вага осіб дитячого віку та осіб старшого віку

d. Невелика питома вага осіб старшого віку і велика питома вага осіб молодого віку

e. Велика питома вага осіб старшого віку і невелика молодого віку

121. Для оцінки характеру і тенденцій епідемії ВІЛ/СНІД у клініці Інституту епідеміології та інфекційних хвороб було впроваджено поглиблений епідеміологічний нагляд серед різних груп населення із серологічним компонентом включно. Який тип системи епіднагляду застосовано в цьому разі?

a. Демографічний

b. За біологічними чинниками

c. За факторами ризику

d. За спалахами хвороб

e. Дозорний

122. Проводилося дослідження ефективності лікування артеріальної гіпертензії новим лікарським засобом у порівнянні з традиційною терапією. У дослідженні взяли участь 3000 осіб, яких розділили на дві ідентичні групи відповідно до віку, статі, стадії перебігу хвороби тощо. Одна група отримувала лікування новим препаратом, інша - традиційну терапію (контрольна група). Досліджувані не знали, яку терапію вони отримували. Який тип дослідження застосувався?

a. Подвійне сліpe контролюване рандомізоване дослідження

b. Дослідження "випадок-контроль"

c. Перехресне дослідження

d. Сліpe контролюване рандомізоване дослідження

e. Проспективне когортне дослідження

123. Керівник підрозділу запросив на нараду найбільш авторитетних у колективі співробітників із метою обговорення можливих варіантів графіку роботи в літній період. Укажіть стиль управління в цій ситуації.

a. Ліберальний

b. Авторитарний

c. Комбінований

d. -

e. Демократичний

124. Вивчається кореляція між рівнем глюкози крові та рівнем систолічного артеріального тиску. Який із методів потрібно використати для візуалізації даних у цьому разі?

a. Діаграму розсіювання

b. ROC-криву

c. Лісову діаграму (forest plot)

d. Дендрограму (tree diagram)

е. Криву Каплана-Мейєра

125. Із метою створення найбільш репрезентативної вибірки рекомендується відбирати учасників дослідження у випадковому порядку. Як називається процес випадкового відбору учасників та їх розподілу на експериментальну і контрольну групи?

a. Рандомізація

- b. Нормальний розподіл
- c. Сортування
- d. Селекція
- e. Розмежування

126. Держава за допомогою протиепідемічних заходів здійснює безпосередній вплив на епідемічний процес та зниження інфекційної захворюваності, що в подальшому призводить до ліквідації епідемічного перебігу деяких інфекційних хвороб. Одним із протиепідемічних заходів є проведення імунопрофілактики. Для якого захворювання не існує засобів імунопрофілактики?

a. Кору

b. Шигельозу

- c. Кашлюка
- d. Краснухи
- e. Епідемічного паротиту

127. Вкажіть, скільки часу повинні займатися фізичною активністю здорові дорослі люди різного віку згідно рекомендацій ВООЗ?

a. 30 і більше хвилин на день

- b. 3 години через день
- c. 15-20 хвилин на день
- d. 180 і більше хвилин на день
- e. 2 години щодня

128. До якого виду епідеміологічного нагляду належить проведення інтегрованого біоповедінкового дослідження серед людей, що вживають наркотики ін'єкційним шляхом?

a. Пасивного

b. Ретроспективного

c. Дозорного

d. Рутинного

e. Першого покоління

129. У 2022 році в регіоні було зареєстровано зниження рівня вакцинації дітей за календарем щеплень, у зв'язку з чим вирішено організувати програму підтримки імунопрофілактики в суспільстві. Що повинно стати першим кроком для налагодження ефективної підтримки імунопрофілактики серед населення регіону?

a. Проведення ситуаційного аналізу в області

- b. Залучення засобів масової інформації
- c. Підвищення кваліфікації працівників охорони здоров'я
- d. Проведення інформаційно-освітньої роботи серед батьків
- e. Налагодження доброзичливих відносин із населенням

130. Який метод фармакоекономічного аналізу використовується для оцінки і порівняння альтернатив при ідентичній (однаковій) клінічній, профілактичній ефективності медичних технологій, програм, фармацевтичних засобів, а також при різних формах або умовах застосування лікарського засобу, профілактичної медичної технології, які мають однаковий терапевтичний ефект?

a. "Мінімізація витрат"

- b. "Витрати-вигода"
- c. "Загальна вартість захворювання"
- d. "Витрати-корисність"
- e. "Витрати-ефективність"

131. Кількість іммігрантів в Україні (тобто іноземців, які проживають за посвідками на постійне

проживання) становить 250 тис. осіб, із них 75,2 тис. проживають за посвідками на тимчасове проживання. Це переважно іноземні студенти, які навчаються в Україні протягом 5-6 років.

Який це вид міграції за тривалістю?

a. Внутрішня

b. Тимчасова

c. Сезонна

d. Маятникова

e. Постійна

132. Через складні погодні умови на автотрасі відбулося зіткнення вантажівки та рейсового автобуса. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 6 осіб, травмовано 20 осіб. До якого виду, залежно від характеру походження, належить ця ситуація?

a. Надзвичайна ситуація природного характеру

b. Надзвичайна ситуація техногенного характеру

c. Надзвичайна ситуація воєнного характеру

d. Надзвичайна ситуація соціального характеру

e. Ця ситуація не належить до надзвичайних

133. В одному з районів спостерігається підвищений рівень захворюваності на меланому. Для його зменшення проаналізовано чинники, що впливають на розвиток меланоми, зокрема й зовнішні. Що із нижчепереліченого належить до фізичних канцерогенів?

a. Інфрачервоне випромінювання

b. Ультрафіолетове випромінювання

c. Ультразвукові хвилі

d. Електромагнітне поле

e. Електричний струм

134. Під час оцінки взаємозв'язку між віком та ожирінням існує прямий середньої сили кореляційний зв'язок. У яких межах має бути значення коефіцієнта кореляції?

a. Від (-0,30) до (-0,99)

b. Від (+0,70) до (+0,99)

c. Від (-0,70) до (+0,70)

d. Від (+0,30) до (+0,69)

e. Від (-0,70) до (-0,99)

135. Через значне поширення серед населення територіальної громади хронічних захворювань серцево-судинної системи керівництво вирішило підготувати комунікаційну стратегію з метою первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань. Який етап повинен бути першим при підготовці та проведенні вказаної стратегії?

a. Оцінка ситуації

b. Визначення цілей

c. Вибір цільових груп

d. Планування програми

e. Вибір каналів та механізмів реалізації

136. Які управлінські підходи необхідні для усунення нерівностей у здоров'ї?

a. Вплив на поведінкові детермінанти

b. Вплив на психологічні детермінанти

c. Вплив на екологічні детермінанти

d. Вплив на соціальні детермінанти

e. -

137. До сімейного лікаря звернулася жінка віком 35 років. Під час проведення антропометричних вимірювань було визначено: індекс маси тіла - 18,2 кг/м², окружність талії - 75 см. Дайте оцінку індексу маси тіла та ризику можливого розвитку серцево-судинної патології.

a. Нормальна маса тіла, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології низький

b. Недостатня вага, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології високий

- c. Зайва вага, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології низький
- d. Недостатня вага, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології підвищений
- e. Недостатня вага, ризик можливого розвитку серцево-судинної патології низький**

138. Яка з нижченаведених характеристик стосується сліпого дослідження?

- a. Отримані дані обробляються не за місцем його проведення, а незалежною стороною
- b. Пацієнт не знає, а лікар знає, яке лікування отримує пацієнт**
- c. Усі учасники (лікарі, пацієнти, організатори) знають, який препарат використовується для конкретного хворого
- d. Отримані дані обробляються за місцем проведення дослідження
- e. Ні пацієнт, ні лікар не знають, яке лікування отримує пацієнт

139. Суттєвий результат у переконанні людей відмовитися від шкідливих звичок, наприклад кинути палити, дає просвітницька робота. Елементом якого виду маркетингу є така діяльність?

- a. Синхромаркетингу
- b. Ремаркетингу
- c. Протидіючого**
- d. Демаркетингу
- e. Конверсійного

140. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього отримано дані на популяційному рівні про чисельність курців і кількість випадків раку легень у 50-ти містах. Потім обраховано коефіцієнт кореляції між явищами і зроблено відповідні висновки.

Дизайн якого дослідження описано?

- a. Екологічне**
- b. Опис серії випадків
- c. Когортне
- d. Клінічний експеримент
- e. Випадок-контроль

141. Укажіть міжнародний документ, у якому зазначено, що досягнення здоров'я неможливе без первинної медико-санітарної допомоги, яка має бути доступна всім.

- a. Оттавська хартія
- b. Гельсінська заява щодо здоров'я у всіх політиках
- c. Алма-Атинська декларація ВООЗ**
- d. Рамкова конвенція ВООЗ боротьби проти тютюну
- e. Міжнародні медико-санітарні правила

142. Чоловік віком 59 років довгий час курить до 8-9 сигарет на день та має надмірну масу тіла. Після значного фізичного навантаження у нього раптово виникли головний біль, запаморочення, короткочасна втрата свідомості. Він не може чітко вимовляти слова та піднімати праву руку, ворушити правою ногою. Яке захворювання можна запідозрити у цього чоловіка?

- a. Гіпертонічний криз
- b. Інфаркт міокарда
- c. Мозковий інсульт**
- d. Гострий тонзиліт
- e. Депресію

143. У промисловій зоні міста було проведено дослідження викидів у повітря заводів, які там розташовані. Паралельно цеховими лікарями цих підприємств досліджувалися рівні захворюваності працівників на обструктивний бронхіт та бронхіальну астму. Укажіть показник, за допомогою якого можливо встановити зв'язок між викидами та захворюваністю.

- a. Коефіцієнт варіації
- b. Критерій співвідношення
- c. Стандартизований показник
- d. Коефіцієнт кореляції**
- e. Критерій Ст'юдента

144. Створення та забезпечення функціонування системи епіднагляду за демографічним станом населення передбачає вивчення показників смертності за віком, статтю та причинами. Який обліковий документ є джерелом інформації для дослідження показників смертності?

a. Медична карта амбулаторного пацієнта

b. **Лікарське свідоцтво про смерть**

c. Свідоцтво про смерть

d. Виписка із журналу обліку померлих

e. Історія хвороби

145. Індекс людського розвитку - це інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості та довголіття, як основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території. Укажіть показник, який застосовується для підрахунку індексу розвитку людського потенціалу.

a. Стиль життя

b. Якість життя

c. **Очікувана тривалість життя населення країни**

d. Рівень реальних доходів населення

e. Умови життя

146. Посадова особа органу державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства у відповідній сфері має право ухвалювати рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу продукції, виконання робіт, надання послуг, що становлять загрозу для здоров'я та/або життя людини. Укажіть максимальний термін тимчасового припинення виробництва та/або обігу продукції, виконання робіт, надання послуг, що становлять загрозу для здоров'я та/або життя людини.

a. На термін не більше ніж 3 роки

b. На термін не більше ніж 30 календарних днів

c. На термін не більше ніж 10 робочих днів

d. **На термін не більше ніж 10 календарних днів**

e. На термін не більше ніж 1 рік

147. Лікар загальної практики-сімейної медицини проаналізував віковий склад серед населення, яке він обслуговує. Його здивував той факт, що найвищий відсоток (35%) становлять особи похилого віку. Що обов'язково повинен врахувати лікар для організації надання медичної допомоги особам похилого віку?

a. Збільшення захворювань із нетяжким типовим перебігом

b. Велику кількість неускладнених захворювань

c. Збільшення гострих інфекційних захворювань

d. Сезонний характер захворювань

e. **Велику кількість тривалих хронічних захворювань**

148. Як впливає розвинений ринок медичних послуг на збільшення тривалості життя, поліпшення здоров'я, збереження генофонду нації?

a. Безпосередньо

b. **Опосередковано**

c. Погано

d. Не впливає

e. Добре

149. Показання глюкози крові пацієнтки з діабетом за останні 2 тижні коливалися в межах 7-7,4 ммоль/л, за винятком двох вимірювань 19 і 21 ммоль/л під час останнього епізоду кетоацидозу. Ураховуючи цей набір даних, на який із представлених показників найбільш суттєво вплинути ці 2 додаткові екстремальні значення?

a. Середнє арифметичне

b. Медіану

c. Перший квартиль

d. Третій квартиль

e. Моду

150. Яка управлінська стратегія визначена основною в політиці Всесвітньої організації охорони здоров'я у сфері громадського здоров'я в ХХІ столітті?

- a. Удосконалення діяльності Міністерства охорони здоров'я
- b. Підвищення ролі місцевих адміністрацій
- c. Удосконалення управління системою охорони здоров'я
- d. Міжгалузева взаємодія**
- e. Розвиток державного управління