

1. Пацієнтка віком 55 років перебуває у стані без свідомості. В анамнезі: інсулінозалежний цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, рясне потовиділення, зіниці розширені, пульс - 98/хв, АТ - 140/90 мм рт. ст., судоми. Який патологічний стан розвинувся в пацієнтки?

- a. Кардіогенний шок
- b. Гіпоглікемічна кома**
- c. Анафілактичний шок
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Гіпертонічний криз

2. Постраждалий перебуває у стані без свідомості, але в нього збережений пульс і самостійне дихання. Яке положення необхідно надати постраждалому, щоб запобігти регургітації та западінню язика, в очікуванні приїзду бригади швидкої (екстреної) медичної допомоги?

- a. Стабільне бічне**
- b. Фаулера
- c. Тренделенбурга
- d. Сімса
- e. Ортопное

3. Головна сестра медична клінічної лікарні на нараді з підлеглими сестрами медичними, які пройшли курси підвищення кваліфікації, обговорювала стадії життєвого циклу організації. Укажіть стадії життєвого циклу організації.

- a. Період росту та розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення
- b. Утворення, народження, період росту, припинення існування або оновлення
- c. Заснування, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення
- d. Заснування, період росту та розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення**
- e. Період розвитку, етап стабілізації діяльності, припинення існування або оновлення

4. У пацієнтки віком 19 років спостерігаються зміни зовнішності: збільшення кистей рук, стоп, лицевої частини черепа, зріст - 195 см. Рівень якого гормону доцільно насамперед перевірити в крові пацієнтки?

- a. Тиреотропіну
- b. Інсуліну
- c. Тестостерону
- d. Прогестерону
- e. Соматотропіну**

5. У пацієнта віком 60 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на сильний оперізувальний біль в епігастрії, багаторазове блювання, що не приносить полегшення. Пацієнт блідий, шкіра волога, АТ - 85/50 мм рт. ст., ЧСС - 110/хв. В анамнезі - зловживання алкоголем. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?

- a. Гострого апендициту
- b. Інфаркту міокарда
- c. Кишкової непрохідності
- d. Ниркової коліки
- e. Гострого панкреатиту**

6. Генеральний директор медичного закладу під час обговорення конфліктної ситуації наголосив, що система управління охорони здоров'я в Україні має три рівні. Яка з нижченаведених посад належить до оперативного рівня управління?

- a. Головний лікар
- b. Постова сестра медична відділення
- c. Старша сестра медична відділення**
- d. Головна сестра медична
- e. Заступник головного лікаря

7. Під час огляду грудної клітки пацієнта терапевтичного відділення сестра медична виявила

такі зміни: збільшення її передньо-заднього розміру, розширення міжреберних проміжків, горизонтальне розташування ребер, вибухання над- та підключичних ямок, тупий епігастральний кут. Яка патологічна форма грудної клітки сформувалася в пацієнта?

- a. Човникоподібна
- b. Паралітична
- c. Емфізематозна**
- d. Воронкоподібна
- e. Рахітична

8. У постраждалого, який отримав вогнепальне поранення передпліччя, через 2 доби з'явилися інтенсивний нестерпний біль, щільний напружений набряк та порушення чутливості в кисті травмованої руки. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в постраждалого?

- a. М'язова контрактура
- b. ДВЗ-синдром
- c. Тромбофлебіт
- d. Синдром тривалого стиснення
- e. Компартмент-синдром**

9. Який підрозділ організовують в амбулаторно-поліклінічних закладах або поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних установ для надання медичної допомоги пацієнтам, які не потребують цілодобового лікарського та медсестринського догляду?

- a. Відділення реабілітації
- b. Денний стаціонар**
- c. Центр первинної медико-санітарної допомоги
- d. Домашній стаціонар
- e. Лікувально-діагностичний центр

10. Вакцинація проти яких захворювань розпочинається у віці 12 місяців (вводиться перша доза вакцини) згідно з Національним календарем профілактичних щеплень в Україні?

- a. Краснухи, кашлюка, туберкульозу
- b. Туберкульозу, кашлюка, вірусного гепатиту В
- c. Епідемічного паротиту, краснухи, кору**
- d. Дифтерії, туберкульозу, вірусного гепатиту В
- e. Кашлюка, дифтерії, правця

11. Пацієнта віком 68 років, який хворіє на цукровий діабет, шпиталізовано до лікарні в коматозному стані. Об'єктивно спостерігається: виражена сухість шкіри і слизових оболонок, зниження тонуусу очних яблук, відсутність дихання Куссмауля та запаху ацетону з рота, пульс - 120/хв, виражена гіперглікемія (глюкоза крові - 45 ммоль/л). Який вид коми розвинувся в пацієнта?

- a. -
- b. Гіперосмолярна**
- c. Лактацидотична
- d. Діабетична кетацидотична
- e. Гіпоглікемічна

12. Пацієнтка після перенесеного інсульту відчуває виражений страх втратити рівновагу та впасти, через що відмовляється виконувати балансувальні вправи. Сестра медична реабілітаційного відділення провела з нею бесіду щодо її побоювань та запропонувала спільно розробити стратегію їх подолання. Який принцип реабілітації реалізувала сестра медична під час сестринського втручання?

- a. Безперервність
- b. Своєчасність
- c. Цілеспрямованість
- d. Пацієнтоцентричність**
- e. Послідовність

13. Пацієнтці з декомпенсованою хронічною серцевою недостатністю призначено комплексне

лікування: інгібітор АПФ (еналаприл), діуретик (фуросемід), beta-адреноблокатор (бісопролол) і блокатор рецепторів до альдостерону (спіронолактон). Через два тижні стан пацієнтки значно покращився: зменшилися задишка та набряки ніг, але з'явився сухий виснажливий кашель. Клінічних проявів ГРВІ не виявлено. Який лікарський засіб, найімовірніше, спричинив появу кашлю в пацієнтки?

- a. Бісопролол
- b. Фуросемід
- c. Еналаприл**
- d. -
- e. Спіронолактон

14. У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$. Який лікарський засіб категорично протипоказано для використання з метою зниження високої температури тіла дітям віком до 15 років?

- a. Парацетамол
- b. Ацетилсаліцилова кислота**
- c. Ібупрофен
- d. Мефенамінова кислота
- e. -

15. Укажіть форму соціального медичного страхування в країнах із розвиненою системою охорони здоров'я, що є складовою частиною системи соціального страхування, проводиться в порядку, передбаченому законодавством країни і, відповідно, затверджена урядом.

- a. Добровільне
- b. Обов'язкове**
- c. Приватне
- d. Державне
- e. Змішане

16. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на рясні виділення зі статевих шляхів із неприємним "рибним" запахом. Результати гінекологічного дослідження: слизова оболонка піхви блідо-рожева, вагінальні виділення молочно-білого кольору, прилипають до стінок піхви, рН піхви - 5,0. Для якої патології характерні ці симптоми?

- a. Хламідіозу
- b. Генітального герпесу
- c. Трихомоніазу
- d. Кандидозного вульвовагініту
- e. Бактеріального вагінозу**

17. Унаслідок бойових дій постраждалий опинився під завалами зруйнованої будівлі. Об'єктивно спостерігається: права нижня кінцівка, яка стиснута уламками бетонних конструкцій, бліда, набрякла, пульс на підколінній артерії відсутній, чутливість порушена. Які дії треба виконати, якщо необхідно терміново евакуювати постраждалого, а з моменту стиснення кінцівки минуло більше ніж 10 хв?

- a. негайно після звільнення розмасажувати стиснуту кінцівку
- b. Накласти джгут на кінцівку вище місця стиснення перед її звільненням**
- c. Одразу після звільнення кінцівки підняти її вище рівня голови постраждалого
- d. Одразу після звільнення кінцівки розтерти її спиртовмісним розчином
- e. Накласти джгут на кінцівку вище місця стиснення після її звільнення

18. У центрі ПМСД проводиться обстеження дитини віком 4 тижні, щодо дисплазії кульшових суглобів. Укажіть симптом, при позитивному виявленні якого, дитину необхідно скерувати до лікаря-ортопеда-травматолога.

- a. Мюссі
- b. Мерфі
- c. Ортолані**
- d. Бабкіна
- e. Кера

19. Сімейний лікар встановив пацієнту попередній діагноз: гіпотиреоз - та скерував його на консультацію до ендокринологічного диспансеру. Який вид медичної допомоги він отримає в цьому медичному закладі?

- a. Вторинну
- b. Третинну**
- c. Первинну
- d. Екстрену
- e. Невідкладну

20. В операційному блоці, де чіткий розподіл повноважень є критично важливим для безпеки пацієнтів, існує ризик виникнення конфліктів через нечіткість функціональних обов'язків. Який структурний метод управління є найефективнішими для запобігання та врегулювання конфліктів серед медичного персоналу в цьому разі?

- a. Консенсус
- b. -
- c. Переговори
- d. Поступливість
- e. Роз'яснення**

21. Пацієнту встановлено попередній діагноз: шигельоз. Який специфічний лабораторний метод діагностики використовується для підтвердження діагнозу?

- a. Загальний аналіз крові
- b. Аналіз крові на глюкозу
- c. Загальний аналіз сечі
- d. Біохімічний аналіз крові
- e. Бактеріологічне дослідження випорожнень**

22. Пацієнту кардіологічного відділення проводиться аускультация серця. Який клапан серця найкраще вислуховується у точці, розташованій у II міжребер'ї праворуч від краю груднини?

- a. Легеневої артерії
- b. Тристулковий
- c. Мітральний
- d. -
- e. Аортальний**

23. У чоловіка під час фізичних навантажень часто виникають синкопальні стани та задишка. В анамнезі – хронічна ревматична хвороба серця. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, синхронна пульсація сонних артерій із похитуванням голови, АТ – 180/50 мм рт. ст. Для якої вади серця характерні ці симптоми?

- a. Стенозу мітрального клапана
- b. Недостатності аортального клапана**
- c. Недостатності мітрального клапана
- d. Недостатності тристулкового клапана
- e. Дефекту міжшлуночкової перегородки

24. Головна сестра медична лікувального закладу концентрує управлінські функції на собі, самостійно приймає рішення з усіх питань, а стосунки з підлеглими будує на офіційній основі, надаючи завдання у формальному жорсткому тоні. Який стиль управління відображає цей підхід у взаємодії з підлеглими?

- a. Ліберальний
- b. -
- c. Діловий
- d. Колегіальний
- e. Авторитарний**

25. У пацієнтки, яка хворіє на ревматоїдний артрит та впродовж року приймає глюкокортикоїди, з'явилися симптоми остеопорозу. Який інструментальний метод дослідження є інформативним для визначення щільності кісток?

- a. Томографія
- b. Ангіографія
- c. Артропневмографія
- d. Термографія
- e. Денситометрія**

26. Пацієнт, який довгий час працює бурильником у шахті, скаржиться на дискомфорт у кистях. Який із нижчезазначених методів дослідження дозволить оцінити їх больову чутливість?

- a. Алгезиметрія**
- b. Капіляроскопія
- c. Палестезіометрія
- d. Динамометрія
- e. Холодова проба

27. У пацієнта як реакція на стрес розвинувся патологічний стан, що проявляється значним зниженням рівня реагування на зовнішні подразники (навіть тим, що можуть загрожувати його життю), обмеженням спонтанних рухів та активності. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. Параліч
- b. Ступор**
- c. Кома
- d. Деменція
- e. Делірій

28. Жінка віком 25 років годину тому отримала опік лівої кисті окропом. Об'єктивно спостерігається: шкіра в місці опіку гіперемована, набрякла, є пухирі, наповнені прозорою рідиною. Який із нижченаведених заходів треба насамперед провести на догоспітальному етапі під час надання невідкладної допомоги пацієнтці?

- a. Накласти пов'язку з антисептиком на уражену ділянку
- b. Накласти мазеву пов'язку на уражену ділянку
- c. Охолодити місце опіку прохолодною проточною водою**
- d. Проколоти пухирі та накласти суху пов'язку на уражену ділянку
- e. Обробити місце опіку спиртовмісним розчином

29. Старша сестра медична амбулаторії складає графік роботи підлеглих працівників. Укажіть норми навантаження на сестру медичну загальної практики згідно з чинним законодавством України.

- a. 900 осіб у місті, 800 осіб у сільській місцевості
- b. 450 осіб у місті, 150 осіб у сільській місцевості
- c. 750 осіб у місті, 600 осіб у сільській місцевості**
- d. 1500 осіб у місті, 1200 осіб у сільській місцевості
- e. 800 осіб у місті, 400 осіб у сільській місцевості

30. Який тип організаційної структури дозволяє організувати управлінський процес за схемою: керівник вищого рівня - керівник нижчого рівня - виконавці, які виконують основну роботу в організації, а також характеризується наявністю методичної підтримки від обслуговуючих спеціалізованих підрозділів для виконання управлінських завдань?

- a. Дивізіонально-продуктова
- b. Лінійно-штабна
- c. Проєктна
- d. Лінійно-функціональна**
- e. Матрична

31. Пацієнт віком 45 років скаржиться на біль у грудній клітці зліва, що посилюється під час дихання, кашлю, нахилах тулуба у здоровий бік та на непродуктивний болісний кашель. Об'єктивно спостерігається: рухомість грудної клітки обмежена з ураженого боку, аускультативно вислуховується шум тертя плеври. Для якого захворювання характерні вказані

клінічні прояви?

- a. Бронхіальної астми
- b. Бронхоектатичної хвороби
- c. Сухого плевриту**
- d. Гострого стенозуючого ларингіту
- e. Гострого бронхіту

32. Який тип управління домінує в медичному закладі, якщо більшу частину повноважень щодо ухвалення управлінських рішень має керівник цього закладу?

- a. Децентралізований
- b. Змішаний
- c. Функціональний
- d. Лінійно-функціональний
- e. Централізований**

33. Під час оцінки рівня свідомості в постраждалого з'ясувалося, що він не реагує на зовнішні подразники - голос та біль (перебуває у стані без свідомості). Яку шкалу використано для оцінки рівня свідомості постраждалого в цьому разі?

- a. FAST
- b. ABCDE
- c. SAMPLE
- d. SCORE
- e. AVPU**

34. Чоловік отримав вогнепальне поранення обличчя. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, наявні травматичні пошкодження м'яких тканин ротової порожнини, зубів верхньої та нижньої щелепи. Самостійне дихання збережене, однак проявляються ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів. Який медичний пристрій доцільно насамперед застосувати для тимчасового забезпечення прохідності дихальних шляхів?

- a. Орофарингеальний повітровід
- b. Зонд Блекмора
- c. Пульсоксиметр
- d. Ендотрахеальна трубка
- e. Носоглотковий повітровід**

35. Пацієнту віком 69 років сестра медична за призначенням лікаря ввела внутрішньом'язово 1%-ий розчин морфіну гідрохлориду. Який показник потрібно обов'язково контролювати в пацієнта після введення цього препарату?

- a. Рівень глюкози в крові
- b. Частоту дихання**
- c. Частоту серцевих скорочень
- d. Температуру тіла
- e. Колір шкірних покривів

36. Пацієнтка віком 49 років після фізичного перенавантаження відчула раптове прискорене серцебиття, дискомфорт у грудній клітці, запаморочення, відчуття нестачі повітря. Об'єктивно спостерігається: пульс - 140/хв, ритмічний, маятникоподібний, АТ - 100/60 мм рт. ст.

Діагностовано напад пароксизмальної тахікардії. Яка специфічна методика, що рефлекторно підвищує тонус блукаючого нерва, використовується під час надання долікарської допомоги?

- a. Електрична дефібриляція
- b. Перикардіоцентез
- c. Черезстравохідна електростимуляція
- d. Катетерна абляція
- e. Проба Вальсальви**

37. Складність і різноманітність організацій зумовлюють необхідність їх класифікації. Укажіть види організації за формою результату діяльності організації.

- a. Приватні і державні

b. Формальні та неформальні

c. Комерційні та некомерційні

d. Одиначні та об'єднані на основі кооперації

e. Безстрокові та тимчасові

38. У дев'ятирічної дитини триває напад надшлуночкової тахікардії. Після проведення вагусних маневрів (проби Вальсальви) напад не припинився. Який лікарський засіб доцільно застосувати в цьому разі?

a. Анальгін (метамізол натрію)

b. Адреналін (епінефрин)

c. Аденозин

d. Атропін

e. Амідарон

39. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на біль у правому колінному суглобі, що виникає в момент початку руху та зменшується через деякий час після ходьби. Останнім часом з'явилося відчуття "блоку" у суглобі, коли нога "защемлюється" в певному положенні, що супроводжується різким болем та обмеженням рухів. Об'єктивно спостерігається: деформація та обмеження згинання колінного суглоба, хрускіт у ньому. Для якого захворювання найхарактерніші ці симптоми?

a. Деформуючого остеоартрозу

b. Ревматоїдного артрити

c. Подагри

d. Системного червоного вовчака

e. Бурситу

40. Як називається шкала, що використовується для об'єктивного оцінювання рівня свідомості пацієнта, та застосовується переважно в разі травматичних уражень головного мозку?

a. Нортон

b. Франкеля

c. Бартела

d. Апгар

e. Глазго

41. Укажіть пріоритетні дії медичного працівника перед початком надання невідкладної допомоги постраждалому в умовах надзвичайної ситуації.

a. Перевірити в постраждалого життєво важливі показники (пульс, АТ, дихання)

b. Перевести постраждалого в стабільне бічне положення

c. Оцінити місце події та впевнитися в безпеці - власній та постраждалого

d. негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

e. негайно перевезти постраждалого до найближчого медичного закладу

42. Старша сестра медична терапевтичного відділення організовує роботу підлеглого медичного персоналу, застосовуючи командну інформацію як елемент інформаційного забезпечення. Яка ключова характеристика інформації є визначальною для оперативного виконання сестрами медичними призначень лікаря та якісного догляду за пацієнтами?

a. Корисність

b. Періодичність

c. Доступність

d. -

e. Своєчасність

43. Укажіть обов'язковий документ, що медичний працівник має надати для проходження атестації, де зазначені відомості про трудову діяльність і надано оцінку його ділових і моральних якостей.

a. Довідка про доходи

b. Протокол засідання лікарської комісії

c. Особова медична картка

d. Автобіографія

e. Характеристика з місця роботи

44. Бойовий медик надає допомогу пораненим під час бойових дій. У якій зоні надання допомоги він може застосувати алгоритм MARCH згідно з концепцією TCCC?

a. Червоній або жовтій

b. Жовтій або зеленій

c. Тільки в зеленій

d. Червоній або зеленій

e. Тільки в червоній

45. У десятирічній дівчинки спостерігаються тривалий субфебрилітет, зменшення маси тіла. Під час об'єктивного обстеження виявлено: блідість шкіри та слизових оболонок, дрібнопетехіальний висип на шкірі тулуба і кінцівок, генералізоване збільшення лімфовузлів, гепатоспленомегалія. У периферичній крові: анемія, лейкоцитоз, тромбоцитопенія. У пунктаті кісткового мозку: тотальна бласттрансформація. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

a. Вітамін B₁₂-дефіцитної анемії

b. Гострого лейкозу

c. Гідраденіту

d. Анемії Фанконі

e. Інфекційного мононуклеозу

46. У закладі охорони здоров'я за наказом МОЗ створено відділ, до складу якого увійшли: лікар-епідеміолог, помічник лікаря-епідеміолога, координатор з адміністрування антимікробних препаратів, координатор з гігієни рук, координатор навчання і підготовки з профілактики інфекцій, статистик. Укажіть цей відділ.

a. Профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

b. Інфекційних захворювань

c. Інфекційного контролю

d. Особливо небезпечних інфекцій

e. Епідеміологічний

47. Пацієнт, який хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, скаржиться на слабкість, задишку під час незначних фізичних навантажень, спотворення смаку (бажання їсти крейду). Об'єктивно спостерігається: блідий, трофічні зміни шкіри. У крові: гемоглобін - 90 г/л, еритроцити - $3,3 \cdot 10^{12}/л$, КП - 0,75. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося в пацієнта?

a. Вітамін B₁₂-дефіцитна анемія

b. Гемолітична анемія

c. Залізодефіцитна анемія

d. Еритремія

e. Апластична анемія

48. У пацієнта без свідомості на кардіомониторі фіксується порушення серцевого ритму, що потребує негайної дефібриляції. Який із нижченаведених серцевих ритмів є показанням до проведення дефібриляції?

a. Атріовентрикулярна блокада

b. Фібриляція передсердь

c. Асистолія

d. Безпульсова електрична активність

e. Шлуночкова тахікардія без пульсу

49. Між сестрами медичними лікувального закладу, які працюють в одному відділенні, виник конфлікт через розбіжності в підходах до догляду за пацієнтами. Укажіть цей вид конфлікту.

a. Міжособовий

b. -

c. Між особою та групою

- d. Внутрішньоособовий
- e. Міжгруповий

50. Жінка віком 29 років скаржиться на свербіж і печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, дискомфорт у піхві, що посилюється під час статевого акту. Результати гінекологічного дослідження: слизова оболонка піхви гіперемована, набрякла, петехіальні крововиливи на слизовій оболонці вагінальної частини шийки матки ("полунична" шийка матки), вагінальні виділення пінисті, сіро-жовтого кольору, з неприємним запахом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Бактеріального вагінозу
- b. Хламідіозу
- c. Трихомоніазу**
- d. Кандидозного вульвовагініту
- e. Аеробного вагініту

51. У дворічної дитини, яка протягом п'яти днів хворіє на ГРВІ, раптово вночі з'явилися хриплий голос та грубий "гавкітливий" кашель, що супроводжувався шумним диханням з утрудненим вдихом. Об'єктивно спостерігається: тахіпное, ціаноз шкіри, втягнення над- і підключичних ямок та міжреберних проміжків під час вдиху. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт**
- b. Напад бронхіальної астми
- c. Гострий обструктивний бронхіт
- d. Паратонзиллярний абсцес
- e. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом

52. Пацієнтка віком 34 роки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, раптово втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: судомні посмикування м'язів, блідість та вологість шкіри, мідріаз, пульс - 98/хв, АТ - 110/70 мм рт. ст. Який із нижченаведених лікарських засобів необхідно застосувати негайно з метою надання невідкладної допомоги пацієнтці?

- a. 0,2%-ий розчин норадреналіну в/в
- b. 5%-ий розчин глюкози в/в
- c. 0,1%-ий розчин адреналіну (епінефрину) в/м
- d. 40%-ий розчин глюкози в/в**
- e. 10-14 ОД інсуліну короткої дії в/в

53. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано до лікарні із симптомами передозування морфіном. Після внутрішньовенного введення налоксону її стан значно покращився. Який механізм дії цього препарату?

- a. Стимуляція серотонінових рецепторів
- b. Блокада дофамінових рецепторів
- c. Блокада опіюїдних рецепторів**
- d. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів
- e. Блокада ГАМК-рецепторів

54. Основною формою медсестринської комунікації є спілкування сестри медичної та пацієнта, успішність якого залежить від певних критеріїв ефективної комунікації. Укажіть основні критерії міжособового спілкування.

- a. Виникнення комунікативних бар'єрів
- b. Відсутність спільного комунікативного простору
- c. Формування, отримання, оброблення інформації та розвиток стосунків**
- d. Пасивність учасників комунікації
- e. Неправильність думки співрозмовника та відповідна реакція на неї

55. У пацієнтки віком 30 років розвинувся напад пароксизмальної тахікардії. З яких заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги в цьому разі?

- a. Виконання електричної дефібриляції
- b. Забезпечення горизонтального положення тіла
- c. -

d. Проведення вагусних проб

e. Введення гіпотензивних засобів

56. У концепції надання допомоги постраждалим на догоспітальному етапі основою є проведення первинного огляду постраждалого. Укажіть головну мету цього огляду.

a. Швидке визначення станів, що загрожують життю постраждалого, та їх негайне усунення

b. Аналіз функцій центральної нервової системи

c. Забезпечення прохідності верхніх дихальних шляхів та стабілізація шийного відділу хребта

d. Забезпечення психоемоційного супроводу

e. Забезпечення достатньої оксигенації з метою підтримання аеробного метаболізму

57. Пацієнту гематологічного відділення встановлено попередній діагноз: хронічний лімфолейкоз. Укажіть найхарактернішу об'єктивну клінічну ознаку цього захворювання.

a. Лімфаденопатія

b. Жовтяниця

c. Гемартроз

d. Анасарка

e. Артралгія

58. Яку допомогу потрібно надати породіллі в III періоді пологів, якщо плацента не відокремилася після введення утеротоніків і триває кровотеча?

a. Підготувати роділлю до лапаротомії

b. Ушити розриви промежини

c. Спостерігати за кровотечею

d. Оглянути пологові шляхи на цілісність

e. Провести ручне відділення та виділення посліду

59. Під час консультації в центрі первинної медико-санітарної допомоги мати трирічної дитини цікавиться принципами здорового харчування. Який відсоток від добового раціону має становити сніданок у дітей для забезпечення здорового харчування згідно з рекомендаціями ВООЗ?

a. 25%

b. 35%

c. 15%

d. 50%

e. 40%

60. Пацієнт, який перебуває на етапі відновлення після інсульту, висловив бажання самостійно виконувати певні вправи вдома. Сестра медична, замість простої відмови, обговорила з ним можливі ризики та переваги, запропонувала адаптований комплекс вправ і домовилася про регулярний онлайн-моніторинг його стану. Яка модель взаємин між сестрою медичною у наведеній ситуації базується на діалозі, рівноправності та спільному прийнятті рішень?

a. Патерналістична

b. Контактна

c. Авторитарна

d. Інженерна

e. Колегіальна

61. Дівчина підліткового віку, перебуваючи в малопровітрюваному людному приміщенні, спочатку відчула загальну слабкість, нудоту, запаморочення, мерехтіння "мушок" перед очима та шум у вухах, після чого знепритомніла. Які дії є пріоритетними під час надання невідкладної допомоги пацієнтці в цьому разі?

a. Забезпечити доступ свіжого повітря, надати пацієнтці горизонтальне положення з трохи піднятими нижніми кінцівками

b. Увести адреналін (епінефрин) внутрішньовенно

c. Дати вжити легкозасвоювані вуглеводи (воду з цукром)

d. Розпочати виконання серцево-легеневої реанімації у співвідношенні 30 компресій на грудну клітку до 2 вдихів

е. -

62. Який із нижченаведених факторів є протипоказанням для лікування пацієнта в умовах домашнього стаціонару?

а. -

б. Інвалідність

с. Часті респіраторні захворювання

д. Тяжкий перебіг захворювання

е. Похилий вік

63. Пацієнтка віком 82 роки скаржиться на біль у мезогастральній ділянці, нудоту та триразове блювання. Укажіть правильну послідовність методів об'єктивного обстеження травної системи в цьому разі.

а. Огляд, перкусія, пальпація, аускультация

б. Огляд, аускультация, пальпація, перкусія

с. Огляд, аускультация, перкусія, пальпація

д. Огляд, перкусія, аускультация, пальпація

е. Огляд, пальпація, перкусія, аускультация

64. У новонародженої дитини (вік - 1 місяць) виявлено холодний абсцес у ділянці верхньої третини лівого плеча. Яке порушення під час проведення щеплення проти туберкульозу спричинило появу цього ускладнення?

а. Термін вакцинації

б. Спосіб введення вакцини

с. Дозування імунобіологічного препарату

д. Недотримання умов асептики

е. Вибір ділянки введення вакцини

65. Пацієнтка віком 62 роки скаржиться на біль уязику, відсутність апетиту, зміни смаку, оніміння, «повзання мурашок» та відчуття холоду в кінцівках, розлади дефекації й сечовипускання. В анамнезі - гастректомія. Об'єктивно спостерігається: хитка хода, м'язова слабкість, шкіра блідо-жовтяничного кольору, «лакований» яскраво-червоний язик, збільшення печінки та селезінки. У крові виявлено зниження кількості еритроцитів та гемоглобіну, підвищення кольорового показника, макроцитоз, наявність в еритроцитах тілець Жоллі та кілець Кебота. Для якого виду анемії характерні ці клініко-лабораторні показники?

а. Вітамін В12-дефіцитної

б. Постгеморагічної

с. Залізодефіцитної

д. Апластичної

е. Гіпопластичної

66. Сестрі медичній кардіологічного відділення необхідно виміряти пульс пацієнту. У який період доби та за яких обставин можна отримати найточніші показники цього параметра?

а. Вдень, після фізичного навантаження

б. В обідній час, після вживання їжі

с. Ввечері, перед сном, після вечері

д. Вранці, одразу після сніданку

е. Вранці, одразу після пробудження, натще

67. Яка група інвалідності встановлюється пацієнту зі стійкими, вираженими функціональними порушеннями, що значно обмежують життєдіяльність й унеможливають самообслуговування, вимагаючи постійного стороннього догляду?

а. Перша

б. Четверта

с. Третя

д. -

е. Друга

68. Існує багато ефективних методів управління конфліктними ситуаціями в трудовому

колективі. Які з нижченаведених методів управління передбачають чітке пояснення вимог до роботи для запобігання та усунення організаційних конфліктів?

- a. Міжособові
- b. Внутрішньоособові
- c. Персональні
- d. -

e. Структурні

69. У жінки, яка перебуває на 30-му тижні вагітності, спостерігаються такі зміни показників крові: гемоліз еритроцитів, підвищення активності амінотрансфераз, зниження концентрації фібриногену та тромбоцитопенія. Для якого патологічного стану характерні ці лабораторні ознаки?

- a. Еклампсії
- b. Поєднаної прееклампсії
- c. Тяжкої прееклампсії

d. HELLP-синдрому

- e. Помірної прееклампсії

70. Пацієнту, який хворіє на *H. pylori*-асоційований гастрит, у складі комплексної терапії призначено кларитроміцин. До якої фармакологічної групи належить цей препарат?

- a. Гастропротектори
- b. Пробиотики
- c. Спазмолітики

d. Антибіотики

- e. Антациди

71. Пацієнтці віком 46 років, яка скаржиться на сухість у роті та швидку стомлюваність, проведено глюкозо-толерантний тест та отримано такі результати: рівень глюкози в крові натще - 6,5 ммоль/л, через 2 год - 8,4 ммоль/л. Оцініть результати тесту.

- a. Цукровий діабет 2-го типу
- b. Цукровий діабет 1-го типу
- c. Фізіологічна норма
- d. Нецукровий діабет

e. Порушення толерантності до вуглеводів

72. У дитини, яка народилася з масою тіла 5200 г, об'єктивно спостерігається: щільні набряки на тильних поверхнях кистей та стоп, набряки обличчя, напіврозкритий рот, збільшені язик і губи, грубий, низького тембру голос під час плачу, уповільненість рухів і рефлексів, пізне відходження меконію. Укажіть основний лікарський засіб, що використовуватиметься для лікування цієї дитини.

a. Левотироксин (L-тироксин)

- b. Діазепам
- c. Преднізолон
- d. Гідрокортизон
- e. Калію йодид (йодомарин)

73. Пацієнт віком 45 років хворіє на бронхіальну астму. Який метод функціональної діагностики використовують для моніторингу пікової об'ємної швидкості форсованого видиху з метою оцінки ефективності лікування та попередження загострень бронхіальної астми?

a. Піклуфометрія

- b. -
- c. Спірометрія
- d. Пневмотахометрія
- e. Пульсоксиметрія

74. Кому з нижченаведених пацієнтів показане лікування в денному стаціонарі медичного центру?

- a. Пацієнту віком 67 років із гострим порушенням мозкового кровообігу

b. Пацієнту віком 49 років із загостренням хронічного холециститу

c. Пацієнтці віком 78 років із IV стадією раку шлунка

d. Пацієнту віком 56 років із термінальною стадією цирозу печінки

e. Пацієнтці віком 27 років, якій показаний остеосинтез

75. Пацієнту віком 20 років проводять серцево-легеневу реанімацію. Який із нижченаведених критеріїв свідчить про ефективність штучної вентиляції легень і закритого масажу серця на етапі базової підтримки життя?

a. Звуження зіниць

b. Поява акроціанозу

c. -

d. Збільшення ціанозу

e. Зниження тону повік

76. Який саме аспект управлінського процесу стосується створення й закріплення системи прав, обов'язків, повноважень і відповідальності працівників та підрозділів у рамках виконання конкретних операцій, робіт і етапів управлінських рішень?

a. Організаційний

b. Правовий

c. Соціальний

d. Економічний

e. Технологічний

77. Як у медичній організації називається комплекс заходів, спрямований на врахування потреб пацієнтів, адаптацію послуг до їхніх вимог, просування медичних послуг і популяризацію послуг медичного закладу?

a. Управління персоналом

b. Адміністративне управління

c. Логістика

d. Маркетинг

e. Фінансовий менеджмент

78. Укажіть посаду керівника недержавної форми власності, який відповідає за раціональну фінансово-господарську діяльність, використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів лікувально-профілактичного закладу.

a. Директор

b. Завідувач відділення

c. Головна сестра медична

d. Старша сестра медична

e. Ординатор

79. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, температура тіла впродовж кількох годин швидко знизилася з 39,5^oC до 37^oC. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, пацієнт млявий, апатичний, із зусиллям відповідає на запитання, шкірні покриви та слизові оболонки бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, пульс - 98/хв, слабкого наповнення, АТ - 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

a. Гостра судинна недостатність

b. Гіпоглікемічна кома

c. Гостра серцева недостатність

d. Гостра дихальна недостатність

e. Гіпертонічний криз

80. Пацієнт віком 65 років під час нападу стенокардії прийняв сублінгвально 1 таблетку нітрогліцерину. Укажіть найчастіший побічний ефект цього лікарського засобу.

a. Ністагм

b. Парестезії

c. Агранулоцитоз

d. Головний біль

е. Зниження слуху

81. Лікар встановив пацієнту діагноз: цукровий діабет 2-го типу - та виписав рецепт на антидіабетичний препарат (метформін). Пацієнт повідомив лікарю, що має фінансові труднощі. Яке пояснення потрібно надати пацієнтові щодо придбання цього препарату?

- а. Потрібно порекомендувати придбати препарат пізніше, коли з'являться кошти
- б. Препарат можна придбати за рецептом безкоштовно або з частковою доплатою в аптеках, що беруть участь у державній програмі "Доступні ліки"**
- с. Препарат можна придбати зі знижкою в аптеках, що проводять спеціальні акції
- д. Порекомендувати звернутися до соціальних служб, які можуть фінансово допомогти з придбанням препарату
- е. Препарат можна придбати нетерміново, після вирішення фінансових проблем

82. У пацієнтки віком 56 років на тлі дефіциту вітаміну В₁₂ в організмі розвинулися такі симптоми: зміна ходи, атрофія м'язів нижніх кінцівок, порушення чутливості в кінцівках. Для якого захворювання характерний вказаний симптомокомплекс?

- а. Метаболічної міопатії
- б. Атеросклерозу
- с. Фунікулярного мієлозу**
- д. Остеопорозу
- е. Поліартриту

83. Який лікарський засіб призначають усім здоровим новонародженим дітям у першу добу життя з метою профілактики геморагічної хвороби новонароджених?

- а. Транексамову кислоту
- б. Гепарин
- с. Вітамін К**
- д. Вітамін D
- е. Вітамін С

84. Як називаються помилкові або неадекватні дії медичного працівника, що були виконані з профілактичною, діагностичною або лікувальною метою, спричинили розвиток захворювання або патологічного стану в пацієнта і класифікуються як нещасний випадок з юридичному аспекті?

- а. Лікарська помилка
- б. Упущення
- с. Лікарська недбалість
- д. Медична помилка

е. Ятрогенія

85. Пацієнту віком 43 роки встановлено попередній діагноз: хронічний панкреатит. Які лабораторні маркери мають найбільшу діагностичну значущість для виявлення порушення функції підшлункової залози?

- а. Білірубін, трансамінази
- б. Трансамінази, С-реактивний білок
- с. Холестерин, білірубін
- д. Протромбіновий індекс, гематокрит
- е. alpha-амілаза, еластаза 1**

86. Під час роботи на промисловому об'єкті один із працівників зазнав ураження електричним струмом. Постраждалий лежить на землі без свідомості, у його руці помітний провід. Укажіть перший крок у наданні домедичної допомоги постраждалому в цьому разі.

- а. Увести внутрішньовенно 0,1%-ий розчин адреналіну (епінефрину)
- б. Безпечно припинити контакт постраждалого із джерелом електроструму**
- с. Провести оксигенотерапію
- д. Очікувати на прибуття бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги
- е. негайно розпочати проведення серцево-легеневої реанімації

87. У чоловіка внаслідок проникаючого поранення грудної клітки розвинувся напружений

пневмоторакс, який супроводжується блискавично наростаючою задишкою, ціанозом, тахікардією, гіпотензією. Укажіть оптимальне місце для проведення термінової пункційної декомпресії.

- a. 5-те міжребер'я по середньоключичній лінії
- b. 4-те міжребер'я по передній пахвинній лінії
- c. 5-те міжребер'я по передній пахвинній лінії**
- d. -
- e. 2-е міжребер'я по пригруднинній лінії

88. У п'ятирічної дитини протягом останніх трьох років спостерігаються періодичні напади чхання, свербіж у носі (дитина часто чухає ніс та морщить його, що спричинило появу поперечної складки вище кінчика носа). Також відзначаються закладеність носа, рясні прозорі виділення з носа, утруднене носове дихання та поява синців під очима. Для якого захворювання характерний цей симптомокомплекс?

- a. Гострого гаймориту
- b. Дифтерії носа
- c. Інфекційного мононуклеозу
- d. Гострого фарингіту
- e. Алергічного риніту**

89. У пацієнта віком 45 років після фізичного навантаження розвинулися такі симптоми: задишка, виснажливий нападopodobний малопродуктивний кашель, відчуття стиснення в грудях. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда з ціанотичним відтінком, видих утруднений і подовжений, пульс прискорений, наявні голосні дистанційні сухі хрипи. Для якого патологічного стану найбільш характерні ці симптоми?

- a. Тиреотоксичного кризу
- b. Набряку легень
- c. Нападу бронхіальної астми**
- d. Нападу надшлуночкової пароксизмальної тахікардії
- e. Гострого коронарного синдрому

90. Пацієнт віком 49 років, який упродовж двадцяти трьох років працює апаратником синтезу на фармацевтичній фабриці, скаржиться на загальну слабкість, швидку стомлюваність, запаморочення, головний біль, порушення сну та кровоточивість ясен. Об'єктивно спостерігається: петехіальний висип та поодинокі крововиливи на шкірі, лабільність пульсу, АТ -- 100/60 мм рт. ст., печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см. Результати аналізу крові: гемоглобін - 102 г/л, еритроцити $3,89 \cdot 10^{12}/л$, КП - 0,78, лейкоцити - $2,7 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $103 \cdot 10^9/л$. Яка найімовірніша причина появи цього клініко-лабораторного симптомокомплексу?

- a. -
- b. Хронічна інтоксикація марганцем
- c. Гостра інтоксикація окисом вуглецю
- d. Гостра інтоксикація бензолом
- e. Хронічна інтоксикація бензолом**

91. Старша сестра медична нефрологічного відділення проводить ознайомлення підлеглого медичного персоналу з основними службовими обов'язками, необхідними професійними навичками та організаційними аспектами їх діяльності. Який організаційно-правовий документ визначає розподіл обов'язків та повноважень медичних працівників у лікувальному закладі?

- a. Розпорядження
- b. Рішення
- c. Посадова інструкція**
- d. -
- e. Договір

92. Головна сестра медична розробила заходи, які заклад охорони здоров'я має виконати за рік, вказала терміни виконання та відповідальних виконавців. Яку функцію управління організацією вона виконала?

а. Оперативне планування

- b. Сервісне блокування
- c. Організаційний аналіз
- d. Функціональне блокування
- e. Стратегічний менеджмент

93. Укажіть три основних типи поведінки керівника залежно від стилю лідерства.

- a. Партократичний, монархічний, ліберальний
- b. Анархічний, автократичний, партоткратичний
- c. Демократичний, монархічний, партоткратичний

d. Автократичний, демократичний, ліберальний

- e. Демократичний, ліберальний, охлократичний

94. Пацієнт віком 45 років скаржиться на довготривалий кашель, зниження маси тіла, загальну слабкість та нічну пітливість, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Попередній діагноз: туберкульоз легень. Укажіть основний критерій для підтвердження цього діагнозу.

а. Виявлення збудника туберкульозу в мокротинні

- b. Позитивна проба Манту
- c. Лейкоцитоз у периферичній крові
- d. Позитивний квантифероновий тест
- e. Специфічні рентгенологічні зміни органів грудної клітки

95. Укажіть форму первинної медико-санітарної допомоги, надаючи яку, лікар загальної практики опікується членами прикріплених сімей протягом усього життя і несе повну відповідальність за стан їхнього здоров'я.

- a. Консультативна
- b. Педіатрична
- c. Екстрена (швидка)
- d. Спеціальна

e. Сімейна

96. Яка з нижченаведених причин є основною для виникнення ділових конфліктів у медичних установах?

- a. Дефіцит товарів першої необхідності
- b. Відсутність належних умов праці
- c. Низький рівень управлінської культури
- d. Дисбаланс у розподілі матеріальних ресурсів
- e. Нестабільність у суспільстві

97. Пацієнту віком 37 років призначено інгаляції іпратропію броміду (беродуалу). Який прилад використовується для проведення інгаляцій, що забезпечує наддрібнодисперсне розпилення лікарської речовини, сприяючи її глибокому проникненню в нижні дихальні шляхи?

а. Небулайзер

- b. Спірометр
- c. Пікфлуометр
- d. Пульсоксиметр
- e. -

98. Як називається національний документ, що засвідчує право на здійснення медичної діяльності з дотриманням спеціальних вимог?

а. Ліцензія

- b. Закон
- c. Припис
- d. Розпорядження
- e. Постанова

99. Який етап алгоритму MARCH передбачає оцінювання прохідності верхніх дихальних шляхів?

- a. R

b. М

c. А

d. Н

e. С

100. Укажіть медичний заклад, що надає медичну допомогу з багатьох лікарських спеціальностей у межах закладу та вдома.

a. Хоспіс

b. Санітарна станція

c. Перинатальний центр

d. Станція переливання крові

e. Поліклініка

101. У пацієнта, який хворіє на туберкульоз легень, після фізичного навантаження раптово з'явилося відчуття стиснення в грудях та виник нападopodobний кашель, під час якого з рота й носа почала виділятися піниста кров (яскраво-червоного кольору, повільно згортається). Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда, ЧД - 43/хв, АТ - 95/60 мм рт. ст., пульс - 115/хв, ниткоподібний. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося в пацієнта?

a. Носова кровотеча

b. Шлункова кровотеча

c. Відкритий пневмоторакс

d. Легенева кровотеча

e. Спонтанний пневмоторакс

102. У тримісячної дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, за результатами антропометричних досліджень виявлено недостатній приріст маси тіла за останній місяць. Під час опитування матері дитини з'ясувалося, що вона помічає зменшення об'єму грудного молока. Яку процедуру найдоцільніше насамперед провести для визначення подальшої тактики в цьому разі?

a. Вимірювання окружності голови та грудної клітки

b. Вимірювання довжини тіла дитини

c. Перевірка наявності й симетричності сухожильних рефлексів

d. Контрольне зважування дитини

e. Визначення пульсу та його властивостей

103. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку. Напередодні було блювання, що не принесло полегшення. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,8^оС, під час пальпації живіт помірно здутий, напружений та болючий у правому підребер'ї, помірне напруження м'язів черевної стінки у правому підребер'ї, симптом Ортнера позитивний. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

a. Гострого апендициту

b. Гострого панкреатиту

c. Гострого холециститу

d. Перфоративної виразки шлунка

e. Кишкової непрохідності

104. Який лікарський засіб необхідно насамперед застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту, у якого розвинувся напад бронхіальної астми?

a. Фуросемід

b. Азитроміцин

c. Дексаметазон

d. Дротаверин

e. Сальбутамол

105. Пацієнту віком 55 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія, I стадія, 2-й ступінь. У складі двокомпонентної антигіпертензивної терапії йому призначено амлодипін. До якої

фармакологічної групи належить цей лікарський засіб?

- a. Петльові діуретики
- b. Тіазидні діуретики
- c. Антагоністи кальцію**
- d. Адреноблокатори
- e. Адреноміметики

106. У доношеній новонародженій дівчинки на четвертий день життя з'явилися кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини та збільшення грудних залоз. Загальний стан дитини задовільний, апетит збережений, сон не порушений, рефлекс жаві, відповідають віку. Для якого стану характерні вказані симптоми?

- a. Сечокислого інфаркту нирок
- b. Вульвовагініту
- c. Статевого кризу**
- d. Вагініту
- e. Гнійного маститу

107. Чоловік віком 57 років скаржиться на стискальний пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліве плече, що виник під час фізичного навантаження та не минув після приймання нітрогліцерину. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, тони серця ослаблені, ритмічні, АТ - 90/50 мм рт. ст. Результати ЕКГ: сегмент S-T над ізолінією, коронарний зубець Q. Для якої патології це характерно?

- a. Ендокардиту
- b. Міокардиту
- c. Інфаркту міокарда**
- d. Перикардиту
- e. Ревматичної хвороби серця

108. Укажіть орієнтовний вік дитини, яка добре фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку, лежачи на животі, видає незначні звуки ("агукає"), усміхається, спить близько 18-20 год на добу.

- a. 2 місяці**
- b. 7 місяців
- c. 4 місяці
- d. 5 місяців
- e. 8 місяців

109. У пацієнтки, яка хворіє на дифузний токсичний зоб, після раптового стресу з'явилися такі симптоми: різке психомоторне збудження, виражена пітливість, тахікардія (пульс - 194/хв, аритмічний), головний біль, гіпертермія (температура тіла 41,3^oC), блювання. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить у положенні "жаби", шкіра гіперемована, обличчя маскоподібне з виразом жаху, слизові оболонки сухі, АТ - 210/100 мм рт. ст. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося в пацієнтки?

- a. Гіпотиреоїдна кома
- b. Тиреотоксичний криз**
- c. Гіпоглікемічна кома
- d. Анафілаксія
- e. Гіпертонічний криз

110. Пацієнт віком 35 років перебуває в реанімаційному відділенні у зв'язку з гострим отруєнням невідомою речовиною. Які лабораторні зміни в аналізі сечі можуть свідчити про розвиток гострої ниркової недостатності?

- a. Діурез та відносна густина сечі в межах норми
- b. Поліурія та гіперстенурія
- c. Олігурія та гіперстенурія
- d. Олігурія та гіпостенурія**
- e. -

111. Жінка віком 30 років, яку за нижню кінцівку вкусила змія, скаржиться на різкий біль і печіння в ділянці укусу, спостерігається швидконаростаючий набряк кінцівки. Який із нижченаведених заходів входить до алгоритму надання невідкладної допомоги в цьому разі?

- a. Припікання місця укусу гарячим предметом
- b. Надрізання шкіри в місці укусу
- c. Відсмоктування ротом отрути з місця укусу
- d. Накладання джгута на кінцівку вище місця укусу
- e. Проведення іммобілізації кінцівки**

112. У вагітної жінки віком 33 роки на 39-му тижні вагітності розпочалися генералізовані судоми, яким передував інтенсивний головний біль, порушення зору ("мушки" перед очима, двоїння в очах), біль у правому верхньому квадранті живота та в епігастрії, нудота, блювання. Також з'ясувалося, що протягом вагітності в жінки спостерігалися підвищення артеріального тиску, набряки та протеїнурія. Який патологічний стан розвинувся в пацієнтки?

- a. Еклампсія**
- b. -
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Тяжка прееклампсія
- e. Епілептичний статус

113. Пацієнту інфекційного стаціонару встановлено діагноз: дифтерія ротоглотки - та з лікувальною метою введено протидифтерійну сироватку. Укажіть її основний механізм дії.

- a. Стабілізація гемодинаміки
- b. Стимуляція імунної системи
- c. Знищення збудника інфекції
- d. Нейтралізація токсину**
- e. Забезпечення седативного ефекту

114. Сестрі медичній потрібно оцінити швидкість адаптації організму пацієнтки до фізичного навантаження, а також визначити час, необхідний для відновлення після нього. Яку з нижченаведених проб потрібно провести в цьому разі?

- a. Мартіне-Кушелевського**
- b. -
- c. Кліностатичну
- d. Штанге
- e. Генчі

115. У пацієнта фтизіатричного стаціонару на тлі нападоподібного кашлю виникли різка задишка та біль у грудній клітці праворуч, що іррадіює в праве плече. Об'єктивно спостерігається: ціаноз губ, ЧД - 34/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 110/хв, права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Під час перкусії грудної клітки визначається виражений тимпанічний звук праворуч. Аускультативно - ослаблення дихальних шумів праворуч. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнта?

- a. Набряк легень
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Гострий коронарний синдром
- d. Спонтанний пневмоторакс**
- e. Напад бронхіальної астми

116. Потерпілому внаслідок ДТП чоловіку віком 44 роки проведено ургентне оперативне втручання з приводу гемоперитонеуму. У разі пошкодження якого внутрішнього органа можна використовувати кров пацієнта із черевної порожнини для реінфузії, якщо забезпечені необхідні умови стерильності?

- a. Печінки
- b. Підшлункової залози
- c. Тонкого кишечника
- d. Шлунка
- e. Селезінки**

117. У пацієнта під час аускультатії серця вислуховується систолічний шум у ділянці верхівкового поштовху. Для недостатності якого клапана серця це характерно?

- a. Аортального
- b. Легеневої артерії
- c. Мітрального**
- d. Тристулкового
- e. -

118. У лейкоцитарній формулі здорової дитини спостерігається приблизно однакова кількість нейтрофілів та лімфоцитів (<<другий перехрест>> лейкоцитарної формули). У якому віці виявляється цей лабораторний феномен?

- a. 5-6 років**
- b. 2-3 роки
- c. 7-8 років
- d. 11-12 років
- e. 9-10 років

119. Керівник лікувального закладу проводить загальні збори з працівниками, а секретар задокументовує інформацію в письмовому вигляді. Як називається документ, у якому фіксується хід обговорення питань та прийняття рішень?

- a. Вказівка
- b. Протокол**
- c. -
- d. Наказ
- e. Розпорядження

120. У хірургічному відділенні перебуває пацієнт після пілороантрумектомії (операції на шлунку у зв'язку зі стенозом воротаря). В анамнезі: хронічний бронхіт і тромбофлебіт вен нижніх кінцівок. Який метод профілактики розвитку гіпостатичної пневмонії у пацієнта доцільно застосувати в ранньому післяопераційному періоді?

- a. Еластичне бинтування нижніх кінцівок
- b. Суворий ліжковий режим
- c. Часте провітрювання палати
- d. Антибіотикотерапію
- e. Дихальну гімнастику**

121. Укажіть частоту компресій на грудну клітку за 1 хв під час проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих.

- a. 70-80
- b. 130-140
- c. 100-120**
- d. 60-70
- e. 80-90

122. У трирічної дитини розвинувся гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Об'єктивно спостерігається: ціаноз носогубного трикутника, стридорозне дихання, пульс - 105/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст., сатурація - 92%. На якому етапі оцінки стану пацієнта за шкалою ABCDE можна виявити стридорозне дихання?

- a. C
- b. A
- c. B**
- d. D
- e. E

123. У центрі ПМСД медичний працівник проводить обстеження трирічної дитини. Яка формула використовується для визначення нормального артеріального тиску у дітей цього віку.

- a. $70 * n$
- b. $70 + 5n$

c. $80 * n$

d. $90 + 2n$

e. $10 + 2n$

124. Пацієнтка віком 58 років скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, сонливість, сухість та лущення шкіри, випадіння волосся, огрубіння голосу, збільшення маси тіла, мерзлякуватість. Об'єктивно спостерігається: пастозність обличчя, жовтуватий колір шкіри, збільшення язика, надмірний розвиток підшкірної жирової клітковини, пульс - 56/хв, ритмічний, АТ - 100/60 мм рт. ст. Рівень гормонів у крові: Т₄ і Т₃ знижений, ТТГ - підвищений. Для якого захворювання щитоподібної залози характерні вказані клініко-лабораторні показники?

a. Гострого тиреоїдиту

b. Тиреотоксикозу

c. Вузлового токсичного зоба

d. Хронічного тиреоїдиту

e. Гіпотиреозу

125. У дитини грудного віку (вік - 6 місяців), яка хворіє на ГРВІ, спостерігається гарячка (температура тіла підвищилася до $39,6^{\circ}\text{C}$). Який із нижченаведених лікарських засобів використовується для зниження температури тіла в дітей цього віку?

a. Ацетилсаліцилова кислота

b. Парацетамол

c. Дротаверин

d. Лоратадин

e. Фуросемід

126. Укажіть вид медичної допомоги, що надається пацієнтам з невиліковними захворюваннями на пізніх стадіях, мета якої - полегшити симптоми та покращити якість життя пацієнтів.

a. Первинна

b. Вторинна

c. Висококваліфікована

d. Паліативна

e. Реабілітаційна

127. Який інформативно-аналітичний документ на вимогу старшої сестри медичної терапевтичного відділення складено поштовою сестрою медичною у зв'язку з її запізненням на роботу?

a. Акт про неявку на роботу

b. Пояснювальна записка

c. Заява про звільнення

d. Службова записка про дисциплінарне порушення

e. Доповідна записка

128. Пацієнту, який хворіє на артеріальну гіпертензію, призначено проведення офтальмоскопії. Перед процедурою сестра медична закрала йому в очі мідріатичний засіб. Через 10 хв пацієнт поскаржився на біль у правій скроневій ділянці, нудоту, нечіткість зору. Об'єктивно спостерігається: АТ - 120/80 мм рт. ст., ЧСС - 68/хв, ЧД - 22/хв. Укажіть наймовірнішу причину появи цих скарг у пацієнта.

a. Напад закритокутової глаукоми

b. Крововилив у сітківку

c. Анафілактичний шок

d. Гіпертонічний криз

e. Гострий іридоцикліт

129. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на задишку, помірний кашель із виділенням невеликої кількості мокротиння, тяжкість у лівій половині грудної клітки, підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно спостерігається: ЧД - 28/хв, ліва половина грудної клітки відстає в акті

дихання, голосове тремтіння нижче кута лівої лопатки різко ослаблене, аускультативно в цій ділянці дихальні шуми відсутні. Для якого захворювання найхарактерніші ці симптоми?

a. Абсцесу легені

b. Ексудативного плевриту

c. Туберкульозу легень

d. Міжреберної невралгії

e. Бронхоектатичної хвороби

130. Сестра медична проводить бесіду з пацієнтом, який нещодавно завершив лікування з приводу гострого гломерулонефриту. Яка з нижченаведених рекомендацій є найбільш важливою для профілактики повторного епізоду гломерулонефриту?

a. Санація вогнищ хронічної інфекції

b. Обмеження вживання солі

c. Регулярний прийом сечогінних препаратів

d. Збільшення фізичної активності

e. Уникнення вживання солодощів

131. Для якої вродженої вади серця характерні чотири анатомічні ознаки: стеноз легеневої артерії, дефект міжшлуночкової перегородки, декстрапозиція аорти та гіпертрофія правого шлуночка?

a. Тетради Фалло

b. Коарктації аорти

c. Аномалії Ебштейна

d. Декстракардії

e. -

132. Медичну допомогу населенню надають медичні заклади, номенклатура яких затверджена Міністерством охорони здоров'я України. Які з нижченаведених закладів належать до лікувально-профілактичних?

a. Амбулаторії

b. -

c. Клінічні лабораторії

d. Аптечні установи

e. Бактеріологічні лабораторії

133. Укажіть технічний нормативний документ, який визначає вимоги до надання медичної допомоги пацієнту в разі конкретного захворювання, визначеного синдрому або в конкретній ситуації.

a. Комплексні стандарти

b. Рецепт

c. Технологічні стандарти

d. Формуляр

e. Клінічний протокол

134. Пацієнт віком 70 років скаржиться на стискальний біль за грудниною, що іррадіює в ліве плече, руку та лопатку. Біль виник після стресової ситуації. Який лікарський засіб доцільно насамперед застосувати із метою надання невідкладної допомоги пацієнту?

a. Нітрогліцерин

b. Дротаверин

c. Парацетамол

d. Гідазепам

e. Ібупрофен

135. Який внутрішній змінний фактор в організації визначає поділ праці та відповідальність за виконання конкретних завдань, що безпосередньо впливає на ефективність виробничого процесу?

a. Загальні цілі

b. Організаційна структура

- с. Матеріально-технічні ресурси
- д. Постановка завдань
- е. Трудові ресурси (персонал)

136. Під час оцінки нервово-психічного та фізичного розвитку дитини з'ясувалося, що вона знає назви багатьох предметів, показує частини тіла, вимовляє 8-10 слів, розуміючи їхнє значення (наприклад, припиняє дію, коли чує слово "не можна"), виконує прості доручення на прохання дорослих, присідає без опори, самостійно ходить. Укажіть орієнтовний вік дитини.

- а. 8 місяців
- б. 5 місяців
- с. 12 місяців**
- д. 9 місяців
- е. 3 місяці

137. У чоловіка віком 42 роки діагностовано вивих нижньої щелепи. Який вид пов'язки накладається після вправлення нижньої щелепи з метою іммобілізації (фіксації) щелепи в певному положенні?

- а. Хрестоподібна
- б. Пращоподібна**
- с. Вузлова
- д. Чеpecь
- е. Неаполітанська

138. Умови денного стаціонару поліклініки передбачають надання медичної допомоги пацієнтам, які не потребують контролю та спостереження протягом доби. Який стан або захворювання є показаннями для лікування пацієнтів у денному стаціонарі?

- а. -
- б. Ускладнений гіпертонічний криз
- с. Діабетична ангіопатія нижніх кінцівок**
- д. Гострий психоз
- е. Активна (відкрита) форма туберкульозу

139. У перинатальному центрі народилася дитина, яка має ознаки недоношеності. Яка шкала використовується для визначення гестаційного віку дитини методом оцінювання показників фізичної та нервово-м'язової зрілості новонародженого?

- а. Лаутона
- б. Баллард**
- с. Апгар
- д. Глазго
- е. Бішопа

140. Після успішного проведення реанімаційних заходів новонародженій дитині в пологовій залі необхідно забезпечити доступ до внутрішньовенного введення лікарських засобів для подальшої підтримки життєдіяльності організму. Які судини найкраще використовувати для катетеризації в цьому разі?

- а. Ліктьові вени
- б. Пахові вени
- с. Вени голови
- д. Підключичні вени
- е. Вени пуповини**

141. Як називається тип професійного спілкування, що передбачає обмін інформацією, пропозиціями, вимогами, поглядами та мотивацією з метою розв'язання конкретних проблем як усередині організації, так і поза її межами?

- а. Ділове**
- б. Формальне
- с. Товариське
- д. Емоційне

е. Розважальне

142. Який спеціальний державний орган, створений для реформування галузі охорони здоров'я в Україні, відповідає за замовлення медичних послуг у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності чи фізичної особи-підприємця та за їх оплату в рамках гарантованого обсягу медичної допомоги?

а. Кабінет Міністрів України

б. Національна служба здоров'я України

с. Обласна державна адміністрація

д. Міністерство охорони здоров'я України

е. Центр первинної медико-санітарної допомоги

143. Яка із загальних функцій менеджменту передбачає спонукування працівників організації до високопродуктивної діяльності для задоволення своїх потреб і досягнення цілей організації в цілому?

а. Контроль

б. Планування

с. Мотивація

д. Організація

е. Прогнозування

144. У чоловіка віком 55 років раптово виникли сильний головний біль, запаморочення, блювання, оніміння та слабкість правої половини тіла. Об'єктивно спостерігається: гіперемія та асиметрія обличчя, АТ - 170/120 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в чоловіка?

а. Мігренозний статус

б. Гіпертензивний криз

с. Гострий менінгіт

д. Гостре порушення мозкового кровообігу

е. Неврит лицевого нерва

145. Чоловік віком 42 роки отримав проникаючу травму грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки ціанотичні, прискорене поверхневе дихання, з рани на грудній клітці витікає піниста кров, а під час вдиху чуто шиплячий звук (звук всмоктування повітря через рану). Яку невідкладну допомогу необхідно насамперед надати пацієнту?

а. Провести електричну дефібриляцію

б. Прикласти холодний компрес на грудну клітку

с. Накласти на рану оклюзійну пов'язку

д. Накласти комірець Шанца

е. Надати постраждалому стабільне бічне положення

146. Пацієнт віком 57 років скаржиться на біль у ділянці шлунка, який виникає після їжі переважно в осінньо-весняний період. Попередній діагноз: виразкова хвороба шлунка. Яка діагностична процедура є найінформативнішою для підтвердження діагнозу?

а. Колоноскопія

б. УЗД органів черевної порожнини

с. Біохімічний аналіз крові

д. Дуоденальне зондування

е. Фіброезофагогастродуоденоскопія

147. Як називається комплекс заходів, спрямованих на знищення збудників патогенних мікроорганізмів на об'єктах навколишнього середовища?

а. Вакцинація

б. Дератизація

с. Дезінсекція

д. Асептика

е. Дезінфекція

148. У здорової доношеної дитини на третю добу життя сеча набула жовтувато-цегляного кольору (залишає червонуватий слід на пелюшках). Загальний стан дитини не порушений. Для

якого перехідного стану періоду новонародженості характерні ці клінічні прояви?

- a. Токсичної еритеми
- b. Транзиторної альбумінурії
- c. Статевого кризу
- d. Сечокислого інфаркту нирок**
- e. -

149. Пацієнтка віком 62 роки одразу після парентерального введення вітаміну групи В відчула раптову слабкість та запаморочення, з'явилися жар у всьому тілі, кашель, задишка, генералізований висип на шкірі. Об'єктивно спостерігається: АТ - 80/40 мм рт. ст., пульс слабкий, частий, тони серця глухі, дихання поверхневе, часте. В анамнезі: цукровий діабет, артеріальна гіпертензія. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнтки?

- a. Анафілаксія**
- b. Гіперглікемія
- c. Гіпоглікемія
- d. Пневмоторакс
- e. Гіпертонічний криз

150. Яка форма медичного страхування згідно із Законом України "Про страхування" реалізується шляхом фінансування за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб і передбачає встановлення загальних умов страхування страховиком самостійно?

- a. Некомерційне
- b. Обов'язкове
- c. Спеціальне
- d. Добровільне**
- e. Загальне