

1. До жіночої консультації звернулася і була поставлена на облік здорова вагітна жінка зі строком вагітності 26 тижнів. Назвіть рекомендовану кратність відвідування нею жіночої консультації:

a. 2 рази на місяць

- b. 1 раз на 3 місяці
- c. 1 раз на тиждень
- d. 1 раз на 2 місяці
- e. 1 раз на місяць

2. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

a. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

b. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

- c. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати
- d. Собівартість медичних послуг і загальні доходи
- e. Ціна та собівартість медичних послуг

3. Хворий К., 42 роки, страждає впродовж 8-ми років на гіпертонічну хворобу. Після емоційного стресу на роботі став дратівливим, відчуває сухість у роті. Об'єктивно: у свідомості, тремор рук, обличчя гіперемовано, шкіра зволожена, поліурія. АТ- 210/100 мм рт.ст., ЧСС110/хв. Рухових і сенсорних порушень немає. Глюкоза крові - 4,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

a. Гіперглікемічна кома

b. Гіпертонічний криз

- c. Ішемічний інсульт
- d. Гіпоглікемія
- e. Геморагічний інсульт

4. Серед населення міста зареєстровано 280 випадків смерті від новоутворень на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена смертність населення від новоутворень?

- a. Співвідношення
- b. Середнє арифметичне
- c. Екстенсивний
- d. Наочності

e. Інтенсивний

5. Наукове дослідження присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу на хвороби органів дихання. Одиницею спостереження в такому дослідженні буде кожен:

- a. Студент медичного коледжу з хворобою органів дихання
- b. Випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)
- c. Студент медичного коледжу
- d. Хворий студент медичного коледжу (на будь-яке захворювання)

e. Випадок захворювання органів дихання

6. Медична сестра обстежує пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Що є найбільш інформативним у діагностиці даного стану?

a. Пульсація сонних артерій, жовтяниця

b. Набряки на ногах та задишка

- c. Кашель та підвищена температура тіла
- d. Слабкість, поганий апетит
- e. Біль у серці ниючого характеру та біль у великих суглобах

7. Дитина 10-ти років скаржиться на слабкість, біль у горлі при ковтанні, підвищення t° тіла до 39°C . При огляді: шкіра звичайного кольору; в зіві: гіперемія, набряк мигдаликів, гнійні плівки. При реалізації плану медсестринських втручань необхідним є таке обстеження:

- a. Забір крові на біохімічне дослідження
- b. Забір слизу із носоглотки на віруси

с. Мазок із зіву та носа на BL

d. Рентгенологічне

е. Серологічне

8. Яким законодавчим актом визначаються організація та управління охороною здоров'я України?

a. Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"

b. "Основами законодавства України про охорону здоров'я", законом "Про місцеве самоврядування", законом "Про санепідблагополуччя"

с. "Основами законодавства України про охорону здоров'я", Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"

d. Законом "Про державну службу", Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"

е. -

9. Чоловік 59-ти років скаржиться на поганий апетит, відразу до м'ясних і молочних страв. За останні 3 місяці схуд на 18 кг. Про що може свідчити вказаний симптомокомплекс?

a. Рак шлунку

b. Синдром хронічної втоми

с. Виразкова хвороба шлунку

d. Астенічний синдром

е. Рак товстого кишківника

10. У пацієнта 49-ти років на 4-й день після резекції шлунку виник постійний інтенсивний біль в животі. Загальний стан важкий. Температура тіла- 37, 8°C, АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 104/хв. Язик сухий. Живіт здутий, ліва половина відстає під час дихання. Симптоми Воскресенського, Щоткіна-Блюмберга позитивні. Назвіть імовірне післяопераційне ускладнення:

a. Абсцес

b. Перитоніт

с. Кровотеча

d. Кишкова непрохідність

е. Панкреатит

11. Пацієнтка скаржиться на біль в правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку. Було блювання без полегшення. Температура тіла - 37, 6°C. Живіт помірно здутий, напружений та болючий в правому підребер'ї. Спостерігається помірне напруження м'язів черевної стінки в правому підребер'ї. Симптом Ортнера позитивний. Вкажіть попередній діагноз:

a. Гострий холецистит

b. Гострий панкреатит

с. Перфоративна виразка шлунку

d. Гостра кишкова непрохідність

е. Гострий апендицит

12. Медсестра проводить обстеження пацієнта з відмороженням правої ступні. Оберіть, який з симптомів є характерним лише для дореактивного періоду відмороження?

a. Втрата чутливості

b. Гіперемія шкіри

с. Підвищення температури

d. набряк тканин

е. Поява болю

13. Дитині 5,5 місяців. Перебуває на нераціональному штучному вигодовуванні (коров'ячим молоком). При введенні жовтка у дитини з'явилася плямистопапульозна висипка по всьому тілу, на щоках яскрава гіперемія, злущення шкіри, мокнучі ділянки, екскоріація. Про який стан слід думати в даній ситуації?

a. Нервово-артритичний діатез

b. Кропив'янка

с. Геморагічний діатез

d. Алергічний діатез

e. Лімфатико-гіпопластичний діатез

14. Антидоти - лікарські засоби, які використовуються як протиотрута при інтоксикації хімічними речовинами. Які антидоти використовують при отруєнні сірководнем?

a. Оксигенотерапія

b. Унітіол

c. Активоване вугілля

d. Тетацин кальцію

e. Метиленовий синій

15. При інтоксикації свинцем уражається система крові. Які зміни характерні для картини крові при інтоксикації свинцем?

a. Гіпохромія еритроцитів, підвищений вміст заліза

b. Поява в еритроцитах тілець Гейнца, збільшення базофілів

c. Лейкоцитоз

d. Гіпохромна анемія, тромбоцитопенія, поява в еритроцитах тілець Гейнца

e. Тромбоцитопенія, ретикулоцитоз

16. При проведенні патронажу медична сестра виявила у дитини 5-ти місяців наступні проблеми: кволість, t° - 38, 5 $^{\circ}$ C, часте блювання, випорожнення понад 15 разів на добу, знижений діурез, шкіра суха, тім'ячко запале. Для якого стану характерні дані симптоми?

a. Гіперглікемічна кома

b. Синдром токсикозу з ексікозом

c. Пілоростеноз

d. Функціональний розлад травлення

e. Ентеробіоз

17. Частину потреб районної лікарні у минулому році профінансовано за рахунок коштів програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. З якого джерела надійшли ці кошти?

a. Обов'язкове медичне страхування

b. Державний бюджет

c. Благодійні внески

d. Місцевий бюджет

e. Добровільне медичне страхування

18. У потерпілого К. 39-ти років термічний опік лівої кисті. Вкажіть препарат, який застосовують зовнішньо під час надання допомоги:

a. Пантенол

b. Первомур

c. Йодонат

d. Бактосин

e. Фулорцин

19. У пацієнта постійні скарги на нудоту, відчуття дискомфорту після прийому густої їжі, періодичне блювання, що приносить полегшення. Яке імовірне ускладнення виразкової хвороби шлунку розвинулося у пацієнта?

a. Перфорація

b. Малігнізація

c. Стеноз

d. Кровотеча

e. Пенетрація

20. До хірургічного відділення надійшов хворий віком 51 рік зі скаргами на біль у правій голі, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Флебіт

- b. Артеріїт
- c. Лімфангоїт
- d. Тромбофлебіт
- e. Флеботромбоз

21. Пацієнтка 50-ти років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку. Біль виникає після фізичного та психічного перенавантаження. Застосування якого препарату буде першочерговим?

- a. Папаверин
- b. Нітрогліцерин**
- c. Атенолол
- d. Ніфедипін
- e. Аспірин

22. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ- 170/100 мм рт.ст., Рс- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- a. Аналіз сечі за Нечипоренком**
- b. Аналіз сечі за Зимницьким
- c. Аналіз сечі на діастазу
- d. Загальний аналіз крові
- e. Аналіз сечі на глюкозу

23. Пацієнтка 26-ти років скаржиться на біль "летючого характеру" у колінних та ліктьових суглобах, який підсилюється при рухах, підвищення температури тіла до 37, 5°C ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При огляді суглобів відзначається їх припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- a. Гонорейний артрит
- b. Деформуючий остеоартроз
- c. Туберкульозний артрит
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Ревматичний артрит**

24. Хворий скаржиться на гострий "кинджальний" біль у животі, різку слабкість. Захворів раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

- a. Синдром подразненого кишківника
- b. Гострий панкреатит
- c. Шлункова кровотеча
- d. Гострий гастрит
- e. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки**

25. Пацієнт скаржиться на виникнення раптової ядухи з утрудненим видихом, наприкінці нападу кашель з виділенням незначної кількості склоподібного харкотиння. При аналізі харкотиння виявлені еозинофіли, кристали ШаркоЛейдена, спіралі Куршмана. Яке захворювання у пацієнта?

- a. Серцева астма
- b. Рак легень
- c. Туберкульоз легень
- d. Бронхіальна астма**
- e. Гострий бронхіт

26. Особливістю функцій медичних сестер спеціалізованих кабінетів поліклініки є:

- a. Проведення спеціальних лікувальних та діагностичних процедур**
- b. Виконання ін'єкцій

- с. Передача інформації про пацієнта родичам
- d. Підготовка кабінету лікаря до прийому хворого
- е. Санітарно-освітня робота

27. Дитина 4-х років захворіла гостро через 7 днів після ГРВІ. На шкірі нижніх кінцівок з'явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічнопапульозна висипка, скупчена навколо гомілковостопних суглобів. Визначте ймовірне захворювання:

- a. Хвороба Верльгофа
- b. Геморагічний васкуліт, шкірна форма**
- с. Гемофілія
- d. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- е. Тромбоцитопенічна пурпура

28. Результати попереднього (періодичного) медичного огляду працівників і висновки комісії про їх стан здоров'я заносяться до:

- a. Амбулаторної карти хворого
- b. Стаціонарної карти хворого
- с. Статистичного талону
- d. Картки працівника**
- е. Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання

29. Хворому К. лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Медична сестра пояснює пацієнтові, що слід зібрати таку порцію сечі:

- a. Кінцеву
- b. Початкову
- с. -
- d. Середню**
- е. Всю сечу

30. Хворий на токсичний дифузний зоб призначено консервативне лікування. Які препарати є обов'язковими для лікування даного захворювання?

- a. Метотрексат, метилурацил
- b. Гідрокортизон, преднізолон
- с. Тиреоїдин, тироксин
- d. Тиреокмб, тироксин
- е. Мерказоліл, метімазол**

31. Дитина 7-ми років захворіла раптово (напередодні вживала тістечка), підвищилася температура тіла до 38°C, турбують болі в животі, часті рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається болючість в лівій половині живота. Припущено дизентерію. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- a. Серологічні дослідження
- b. Бактеріологічне дослідження калу**
- с. Загальний аналіз крові
- d. Копрологічне дослідження
- е. Змив з носоглотки на віруси

32. Хворий К. 46-ти років скаржиться на задишку, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, біль у грудях. Умови праці пов'язані з вдиханням пилу заліза. Який вид металоконіоза розвинувся у хворого?

- a. Фіброз
- b. Сидероз**
- с. Алюміноз
- d. Бериліоз
- е. Баритоз

33. У дитини 4-х років на шкірі обличчя, волосистій частині голови виявлено плями, дрібні папули та везикули (пухирці). Везикули мають овальну форму, різні за розміром, розташовані

на незмінній шкірі. Вміст везикул прозорий. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

a. Вітряна віспа

- b. Кір
- c. Ексудативно-катаральний діатез
- d. Краснуха
- e. Скарлатина

34. Медична сестра 30-ти років працює у фізіотерапевтичному кабінеті, обслуговуючи електроапаратуру, яка є джерелом випромінювання всіх ділянок електромагнітного спектра. Засобами захисту медична сестра не користується. Скаржиться на біль та відчуття піску в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об'єктивно: спостерігається гіперемія та набряк кон'юнктиви очей. Яке професійне захворювання може розвинути внаслідок недостатнього контролю медичної сестри?

- a. Фотоалергія
- b. Катаракта
- c. Блефароспазм
- d. Прогресуюча міопія

e. Кератокон'юктивіт

35. Хвора 26-ти років занедужала через 2 години після вживання в їжу кремового торта. Виникли загальна слабкість, нудота, багаторазова блювота. Які заходи за призначенням лікаря треба провести щодо хворої в першу чергу?

- a. Введення преднізолону
- b. Промивання шлунку**
- c. Введення платифіліну
- d. Введення антибіотиків
- e. Введення реополіглюкіну

36. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

- a. Медичну карту амбулаторного хворого
- b. Талон амбулаторного пацієнта
- c. Медичну карту стаціонарного хворого
- d. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання**
- e. Контрольну карту диспансерного спостереження

37. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень належить до одного з додаткових джерел фінансування?

- a. Відрахування підприємств на медичне страхування
- b. Місцевий бюджет
- c. Державний бюджет
- d. Особисті кошти громадян

e. Благодійні внески

38. Перша фаза процесу управління це розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

- a. Фільтруючий
- b. Направляючий
- c. Попередній**
- d. Заключний
- e. Поточний

39. У стаціонарі на 300 ліжок перебувало на лікуванні протягом року 6500 хворих, виписано без змін у стані здоров'я - 135, померло - 65. Який показник ефективності треба застосувати для оцінки роботи стаціонару?

- a. Соціальної ефективності
- b. Мішаної ефективності

с. Всі види ефективності

d. Медичної ефективності

е. Економічної ефективності

40. У дитини 6-ти місяців через 2 тижні після вакцинації АКДС з'явилася геморагічна висипка у вигляді петехій та екхімозів на верхніх та нижніх кінцівках та обличчі. В крові: Hb- 115 г/л, лейкоц.- $6,5 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоц.- $15 \cdot 10^9/\text{л}$. Яке захворювання має місце у хворого?

a. Геморагічний васкуліт

b. Системний червоний вовчак

с. Апластична анемія

d. Тромбоцитопенічна пурпура

е. Гострий лейкоз

41. Дитині 8 місяців. Хворіє 5 днів. Спостерігаються кволість, підвищення температури тіла 37,8-38, 8°C, задишка 60/хв., в легенях з обох сторін у нижніх ділянках вислуховуються крепітація, послаблене дихання, пригнічення перкуторного тону. Яке обстеження є найвагомішим для встановлення діагнозу?

a. Імунограма

b. Клінічний аналіз крові

с. Рентгенографія органів грудної клітки

d. Кислотно-лужний стан крові

е. Спірометрія

42. У хворого кардіологічного відділення виникла зупинка дихання і зникла пульсація на сонній артерії. Який стан у хворого?

a. Клінічна смерть

b. Агонія

с. Соціальна смерть

d. Передагонія

е. Біологічна смерть

43. Який дієтичний стіл рекомендують хворому на хронічний ентероколіт?

a. Стіл №7

b. Стіл № 11

с. Стіл №1

d. Стіл № 5

е. Стіл № 4

44. До післяопераційної палати доставили пацієнта, якому проводили оперативне втручання під епідуральною анестезією. Які тимчасові зміни можуть спостерігатися у пацієнта?

a. Втрата чутливості

b. Затримка сечовиділення

с. Виникає біль

d. Патологічні рефлекси

е. Порушення дихання

45. Перед апендектомією пацієнту К. 45-ти років проводять премедикацію. З якою метою при цьому використовують розчин атропіну сульфату?

a. Зменшення секреції залоз

b. Запобігання блюванню

с. Звуження зіниць

d. Посилення дії анальгетиків

е. Прискорення серцевих скорочень

46. Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігають у разі кашлюку?

a. Нейтрофіліоз

b. Анемію

с. Лімфоцитоз

- d. Еозинофілію
- е. Тромбоцитопенію

47. Дитина народилася доношеною. Оцінка стану за шкалою Апгар 8-10 балів. Коли дитину прикласти до грудей?

а. Протягом перших 30 хвилин

- b. Через 6-8 годин
- с. Через добу
- d. Через 10-12 годин
- е. Через 2 години

48. Серед причин, які спричиняють розвиток повторних нападів професійної бронхіальної астми, є:

- a. Ультразвукове випромінювання
- b. Електромагнітне випромінювання

с. Екзогенні алергени

- d. Лазерне випромінювання
- е. Ендогенні алергени

49. У пацієнта діагностовано легкий ступінь гострої променевої хвороби. Під дією якої дози радіоактивного випромінювання він розвивається?

a. 600 - 800 рад

b. 100 - 200 рад

- с. 300 - 500 рад
- d. 200 - 300 рад
- е. 500 - 600 рад

50. Старша медична сестра бере участь у складанні та оформленні статуту новоствореної медичної організації (кабінет стоматологічної допомоги). Цей документ належить до такої групи:

а. Організаційні

- b. Розпорядчі
- с. Інформаційні та організаційні
- d. Фінансово-розрахункові
- е. Інформаційні

51. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

a. Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад

b. Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад

- с. Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- d. Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- е. Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад

52. Ви - медсестра пологового відділення. Згідно з яким наказом здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?

a. № 503

b. №620

с. № 234

d. №408

е. № 233

53. Ви - медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно з наказом №234)?

- a. 1 раз на рік
- b. 1 раз на 2 роки
- с. 1 раз на 6 місяців

d. 1 раз на 9 місяців

e. 1 раз на 3 місяці

54. У хворої 68-ми років інфаркт міокарду. Який з наведених лікарських засобів треба застосувати для зняття больового синдрому?

a. Клофелін

b. Анаприлін

c. Промедол

d. Еуфілін

e. Строфантин

55. Пацієнтці, яка лікувалася з приводу хронічного холециститу, лікар призначив дуоденальне зондування. В якій порції жовчі будуть виявлені патологічні компоненти жовчі, характерні для даного захворювання, та які саме компоненти?

a. Лейкоцити в порції А

b. Еритроцити в порції А

c. Еритроцити в порції В

d. Лейкоцити в порції В

e. Лейкоцити в порції С

56. Дитині 2 роки. Скарги на підвищення t° до 38°C , кашель, нежить, кон'юнктивіт, гіперемію зіва. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Кір

b. Пневмонія

c. Трахеобронхіт

d. Аденовірусна інфекція

e. Коклюш

57. Медична сестра здійснює патронаж дівчинки 1 року. Мати цікавиться, які щеплення необхідно зробити її дитині в даному віці?

a. Проти дифтерії, коклюшу, правця

b. Проти гепатиту В

c. Проти туберкульозу

d. Проти поліомієліту

e. Проти кору, краснухи, паротиту

58. Медична сестра здійснює догляд за дитиною з гіпотрофією. Що необхідно включити до плану незалежних медсестринських втручань при догляді за такою дитиною?

a. Введення еубіотиків

b. Введення антибіотиків

c. Проведення очисної клізми

d. Вимірювання артеріального тиску

e. Постійний контроль маси тіла

59. Пацієнт К. 43-х років скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника відсутня. З чим пов'язаний даний стан пацієнта?

a. Гострий панкреатит

b. Гострий холецистит

c. Перфорація виразки шлунку

d. Гострий апендицит

e. Гостра кишкова непрохідність

60. Медична сестра сімейного лікаря проводить за його дорученням збір інформації про захворюваність на дільниці. Які показники будуть її цікавити?

a. Витрати на медико-гігієнічне навчання населення

b. Дані перепису населення

c. Відсутність розбіжностей у захворюваності серед чоловіків і жінок

d. Показники тимчасової стійкої втрати працездатності, причин смерті

e. Співвідношення народжуваності та смертності

61. На яку суму здійснюється списання товарів відповідно до існуючої інструкції МОЗ України?

a. Не більше 2% від загального товарообігу

b. Не більше 1% від загального товарообігу

c. Не більше 0,1% від загального товарообігу

d. Не більше 5% від загального товарообігу

e. Не більше 10% від загального товарообігу

62. Наркотичні лікарські засоби, термін придатності яких минув, для списання і знищення необхідно передати з аптек:

a. На завод, де були виготовлені ліки

b. На аптечний склад

c. До спецкомісії УВС

d. До комісії ЛПЗ

e. До комісії ЗОЗ

63. Для заміщення втраченої крові хірург призначив переливання 1л свіжоцитратної крові. Медична сестра на кожні 500 мл перелитої донорської крові вводить внутрішньовенно 10 мл 10% розчину кальцію хлориду. Яке ускладнення це допоможе попередити?

a. Цитратний шок

b. Тромбоз судин

c. Алергічна реакція

d. Інфікування рани

e. Геморагічний шок

64. Жінка отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Її турбує сильний пекучий біль. При огляді: гіперемія передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світло-жовтою рідиною. Визначте площу і ступінь опіку:

a. 9%, II ступінь

b. 9%, III А ступінь

c. 4%, IV ступінь

d. 18%, III Б ступінь

e. 18%, II ступінь

65. За допомогою звернувся пацієнт Д. 58-ми років зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: виявлено напружене та болюче вип'ячування в паховій ділянці справа. Що можна припустити?

a. Незащемлену пахову килу

b. Защемлення пупкової кири

c. Защемлення пахової кири

d. Незащемлена стегнова кила

e. Невправима калиткова кила

66. За порадою звернувся чоловік 42-х років зі скаргами на біль в животі, загальну слабкість. Три години тому брав участь у бійці, отримав удар ногою в живіт. При огляді: живіт участі в акті дихання не бере, при пальпації м'який, справа спостерігається біль і напруження м'язів. Пульс в межах норми. Що необхідно зробити в першу чергу?

a. Заборонити пити

b. Холод на живіт

c. Ввести знеболювальні

d. Грілку на живіт

e. Ввести спазмолітики

67. Пацієнтові, який перебуває на лікуванні в онкологічному диспансері з приводу раку шлунка, призначено хіміотерапію. Яка побічна дія цитостатичних препаратів?

a. Анізокорія

b. Дисфагія

c. Блювання

d. Закрепи

e. Гіпотермія

68. В онкологічному диспансері на лікуванні з приводу пухлини легень перебуває пацієнт Н. 50-ти років. Яке з досліджень є найінформативнішим?

a. Імунологічне

b. Бактеріологічне

c. Гістологічне

d. Цитогенетичне

e. Біохімічне

69. У жінки О. 63-х років під час проведення профілактичного огляду грудних залоз виявлено: почервоніння та потовщення соска лівої молочної залози, наявні кірочки, струпи. Після їх зняття з'явилася волога та зерниста поверхня шкіри. Як називається таке захворювання?

a. Кіста

b. Рак Педжета

c. Аденокарцинома

d. Рак медулярний

e. Аденома

70. Вихідною базою для визначення витрат кошторису лікарні на наступний рік є затверджені кошторисні асигнування та їх виконання. За який період мають бути ці дані?

a. За минулий рік

b. За 3 минулих роки

c. За останні 5 років

d. За поточний рік

e. За 2 минулих роки

71. Яка система охорони здоров'я повинна бути в сучасній Україні, згідно з концепцією МОЗ України?

a. Мішана

b. Приватна медицина

c. Централізоване планування

d. Медичне страхування

e. Державне управління охороною здоров'я

72. При обстеженні пацієнта з ревматоїдним артритом виявлено проблему: біль у суглобах. З ураження яких суглобів починається дане захворювання?

a. Дрібні суглоби кистей рук і стоп

b. Кульшові суглоби

c. Великі суглоби нижніх кінцівок

d. Плечові суглоби

e. Великі суглоби верхніх кінцівок

73. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

a. Загальний аналіз сечі

b. Загальний аналіз крові

c. УЗД органів черевної порожнини

d. Кров на діастазу

e. Кров на визначення рівня холестерину

74. Рецензент статті науково-медичного журналу приступає до написання рецензії. Що насамперед йому необхідно зробити?

a. Написати анотацію

b. Переказати зміст статті

c. Написати резюме

d. Визначити актуальність статті

e. Прочитати та проаналізувати зміст журналу в цілому

75. Робота, в якій критично оцінюються основні положення та результати дослідження, звертається увага на актуальність теоретичних положень, оригінальність підручників, достовірність отриманих результатів, - це:

a. Рецензія

b. Анотація

c. Монографія

d. Навчальний посібник

e. Стаття

76. Пацієнтові Ф. 59-ти років проводиться резекція шлунку під загальним знеболюванням. Об'єктивно: обличчя бліде, зіниці розширені, тонус м'язів різко знижений. АТ- 90/60 мм рт.ст. Якій стадії наркозу відповідають такі ознаки?

a. IV

b. V

c. I

d. II

e. III

77. У дитини 6-ти місяців раптово виникла зупинка дихання, шкіра вкрита холодним липким потом, чути гучний вдих - "півнячий крик". З яких незалежних медсестринських втручань необхідно почати невідкладну допомогу?

a. Ввести 50% розчин анальгін

b. Ввести 1% розчин нікотинової кислоти

c. Проведення штучної вентиляції легень

d. Натискання на корінь язика

e. Ввести 0,5% седуксен

78. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

a. Пірогенна реакція

b. Септичний шок

c. Анафілактична реакція

d. Гемолітична реакція

e. Цитратний шок

79. Для інтубації трахеї пацієнта використали міорелаксант короткої дії - дитилін. Чим можна усунути залишкову дію цього препарату?

a. Прозерин

b. Мезатон

c. Атропін

d. Адреналін

e. Налоксон

80. У дитини 5-ти років після вживання в їжу полуниць розвинулася кропив'янка. Який з ентеросорбентів потрібно застосувати в даному випадку?

a. Фенкарол

b. Кларитин

c. Ентеросгель

d. Тавегіл

e. Цетрин

81. Дитина 4-х років стала дратівливою, погано спить, скаржиться на біль в животі, сильний

свербіж у ділянці перианальних складок. Яке захворювання можна припустити?

- a. Аскаридоз
- b. Ентерит
- c. Трихоцефаліоз
- d. Коліт

e. Ентеробіоз

82. При огляді хворої дитини 3-х років медична сестра виявила: "зірчастий" геморагічний висип на тілі, блювання, ригідність м'язів потилиці, підвищення температури до 38°C. Яке захворювання можна припустити?

- a. Туберкульозний менінгіт
- b. Мала хорія

c. Менінгококцемія

- d. Геморагічний васкуліт
- e. Екламсія

83. Медичній сестрі потрібно нагодувати недоношену новонароджену дитину. Відсутні смоктальний і ковтальний рефлекси. Вкажіть найдоцільніший метод годування дитини:

- a. З ложечки
- b. Парентеральний

c. Через зонд

- d. З пляшечки
- e. Прикладання до грудей

84. Захворювання є результатом довготривалого перенапруження м'язів плечового поясу. Зустрічається у робітників різних професій: ковалів, малярів, кочегарів, вантажників тощо. Об'єктивно: визначається невелика припухлість і помірна болючість при пальпації плечового суглобу. Яке це захворювання?

- a. Крепітуючий тендовагініт передпліччя
- b. Стенозуючий лігаментит

c. Періартрит плечового суглобу

- d. Асептичний остеонекроз
- e. Координаційний невроз

85. В центральній районній лікарні підраховали показники загальної та первинної захворюваності, а також питому вагу кожного класу захворювань. Які графіки можна застосувати для даних показників?

- a. Стопчикова, лінійні
- b. Радіальні, фігурні
- c. Картограма, радіальні

d. Секторні, лінійні

- e. Об'ємні, картограма

86. У пацієнта Н. проведено пробу за Зимницьким: 6:00-90 мл; 9:00-110 мл; 12:00-100 мл; 15:00-150 мл; 18:00-120 мл; 21:00-80 мл; 24:00-160 мл; 3:00-50 мл. Який це ряд?

- a. Ранговий, згрупований
- b. Динамічний, інтервальний**
- c. Динамічний, дискретний
- d. Варіаційний, інтервальний
- e. Динамічний, моментний

87. У місті К. від вроджених вад померло троє дітей до 28-ми днів. Який це показник?

- a. Загальна смертність
- b. Постнеонатальна смертність
- c. Спеціальна смертність

d. Неонатальна смертність

- e. Рання неонатальна смертність

88. У дитячій поліклініці було щеплено 2117 дітей до 14-ти років та прочитано 1117 лекцій в дитячих дошкільних та шкільних закладах. Які заходи були проведені?

- a. Лікувально-діагностичні
- b. Медичні
- c. Амбулаторні
- d. Вторинні профілактичні
- e. Первинні профілактичні**

89. Якому освітленню надається перевага при організації робочого місця маніпуляційної медсестри?

- a. Люмінесцентними лампами
- b. Не має значення
- c. Штучне
- d. Мішане
- e. Природне**

90. Який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, якщо зацікавленість у результатах є високою, як з боку керівництва лікарні, так і з боку працівників середньої медичної ланки:

- a. Тиск
- b. Примирення
- c. Переговори
- d. Співпраця**
- e. Уникнення

91. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72-х років. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його, і дізналася, що пацієнт перебільшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

- a. Дисимуляція
- b. Симуляція
- c. Агравация**
- d. Апеляція
- e. Атаксія

92. Під час профілактичного обстеження в жіночій консультації у пацієнтки Л. 65-ти років під час пальпації молочних залоз виявили ущільнення розміром 0,5 см в діаметрі у верхньому квадранті правої молочної залози. Яке з перерахованих нижче обстежень слід провести першочергово?

- a. Мамографія**
- b. Рентгенографія
- c. Сцинтиграфія
- d. Біопсія
- e. Загальноклінічні аналізи

93. У клініку звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на біль в животі, який виникає через 15-20 хв. після прийому їжі, відрижку кислим. Як характеризується цей біль?

- a. Голодний
- b. Пізній
- c. Ранній**
- d. Оперізуючий
- e. Періодичний

94. У пацієнта спостерігаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

- a. Дискінезія жовчовивідних шляхів
- b. Виразкова хвороба шлунку**
- c. Гастрит
- d. Жовчнокам'яна хвороба

е. Езофагіт

95. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

а. Визначення протеїнурії

б. Загальний аналіз сечі

с. Дослідження сечі за методом Нечипоренка

д. Проба за Зимницьким

е. Визначення креатиніну

96. До приймального відділення доставлено пацієнта з виразковою хворобою шлунку. Раптово у хворого розпочалося блювання кольору кавової гущі. Суб'єктивно пацієнт почуває себе задовільно, може рухатися самостійно. Як хворого необхідно транспортувати?

а. На каталці-ношах

б. Самостійною ходою

с. Ліфтом у супроводі медсестри

д. Пішки при підтримці медсестри

е. В кріслі-каталці

97. В хірургічному відділенні готується до планової операції пацієнт К. 55-ти років, в анамнезі якого порушення периферичного кровообігу нижніх кінцівок. Яке ускладнення може виникнути в післяопераційний період?

а. Розвиток пневмонії

б. Запалення країв рани

с. Реактивний психоз

д. Тромбоз вен

е. Динамічна кишкова непрохідність

98. Надається допомога постраждалому 35-ти років, в якого була стиснута нижня кінцівка більше 4-х годин. Яка першочергова дія під час надання допомоги?

а. Виконати інфузію реополіглюкіну

б. Ввести дихальні та серцеві аналептики

с. Накласти джгут вище стиснення

д. Звільнити стиснуту кінцівку

е. Виконати блокаду кінцівки

99. У соматичному відділенні лікується дитина 8-ми місяців з пневмонією. Яка інформація стосовно догляду за дитиною буде найбільш корисною для матері?

а. Вимірювати температуру тіла через 2 години

б. Стежити за кольором шкіри

с. Підраховувати через кожні 10 хвилин кількість дихань за 1 хвилину

д. Частіше брати на руки, змінювати положення в ліжку

е. Поїти через кожні 30 хвилин

100. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

а. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська

б. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька

с. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

д. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька

е. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча

101. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

а. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

б. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська

- с. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- д. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- е. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова

102. Старша медична сестра відділення готується до лекції на тему: "Інформаційне забезпечення управління". До яких документів належить Статут?

- а. Розпорядчі
- б. Інформаційні
- с. Організаційні**
- д. Фінансово-розрахункові
- е. Інші

103. Головна медична сестра лікарні готується до лекції з теми "Управління конфліктами та стресами". Вкажіть основні компоненти переговорів:

- а. Наявність інтриг
- б. Обмін інформацією**
- с. Наявність спільної мети
- д. Ведення бесіди
- е. Наявність протилежних поглядів та думок

104. Поділ тексту наукової роботи на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків та їх нумерації має назву:

- а. Рубрикація тексту**
- б. Вибірковий виклад матеріалів
- с. Впорядкування внутрішньотекстових посилань
- д. Групування матеріалу в бібліографічних описах
- е. Робота над остаточним варіантом рукопису

105. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія". $t^{\circ}38$, 5°C . Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

- а. Немає обмежень в часі
- б. Натщесерце
- с. Після одужання від пневмонії
- д. Одразу
- е. Після нормалізації температури тіла**

106. Через 10 днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулася до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, $t^{\circ}37$, 4°C , ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. До якого відділення слід госпіталізувати хвору?

- а. Урологічне
- б. Терапевтичне
- с. Нефрологічне**
- д. Кардіологічне
- е. Інфекційне

107. В ході складання річного звіту головна медична сестра повинна графічно відобразити динаміку загального рівня захворюваності серед населення за останні 5 років. Який вид діаграми вона використає?

- а. Радіальна
- б. Стовпчикова**
- с. Картограма
- д. Секторна
- е. Внутрішньостовпчикова

108. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску

та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- a. Мезатон
- b. Еуфілін
- c. Кордіамін**
- d. Фенобарбітал
- e. Адреналін

109. У пацієнта 19-ти років після укусу невідомої комахи раптово з'явилися інтенсивний свербіж шкіри, почервоніння, висипання, які виступають над поверхнею шкіри. Пізніше виникли різні за розміром пухирці, заповнені прозорою рідиною, температура тіла підвищилася до 38°C. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. набряк Квінке
- b. Анафілактичний шок
- c. Сироваткова хвороба
- d. Геморагічний діатез
- e. Кропив'янка**

110. Під час проведення плевроцентезу пацієнт 65-ти років став блідим, млявим, шкіра вкрилася холодним потом. Дихання прискорене, поверхневе, пульс швидкий, слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений. Який препарат необхідно терміново ввести парентерально, за стандартом надання невідкладної допомоги?

- a. Кофеїн**
- b. Корглікон
- c. Реополіглюкін
- d. Глюкозу
- e. Атропін сульфат

111. Хворий перебуває в хірургічному відділенні після апендектомії. Вкажіть фактор високого ризику, який затримує відновлення дихальної системи у даного пацієнта:

- a. Тривалі блювання
- b. Спинномозкова анестезія
- c. Застосування морфіну**
- d. Діабет
- e. Зупинка дихання під час операції

112. Медична сестра хірургічного відділення спостерігає у хворого 48-ми років післяопераційне тремтіння. Чим можна зняти даний стан у пацієнта?

- a. Протиаритмічні засоби
- b. Інгаляція кисню**
- c. Протисудомні засоби
- d. Зігрівання хворого
- e. Заспокійливі засоби

113. Пацієнта Ю. 21-го року готують до планового оперативного втручання, він попередньо погодився з планом лікування. Коли востаннє підтверджується згода цього пацієнта на операцію?

- a. Перед письмовою згодою
- b. Під час написання письмової згоди
- c. Напередодні операції
- d. У день операції зранку
- e. Безпосередньо перед премедикацією**

114. Як часто медична сестра повинна контролювати пульс, артеріальний тиск та загальний стан хворого в перший день після операції?

- a. Через кожні 2 години**
- b. Через кожні 30 хвилин
- c. Через кожні 6 годин
- d. Через кожні 4 години

е. Через кожну годину

115. Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?

а. Дані перепису населення

б. Показник загальної захворюваності

с. Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню

д. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності

е. Дані про профілактичний огляд

116. Головний лікар міської лікарні у методах свого керівництва виключає хаотичність, діє відповідно до заздалегідь спланованих схем. Така поведінка забезпечує досягнення поставленої мети. Вкажіть тип діяльності керівника:

а. Колегіальний

б. Діловий

с. Компромісний

д. Ліберальний

е. Авторитарний

117. Існує багато методик оцінки ефективності досліджень, але всі вони зводяться до того, що основною оцінкою реального вкладу за рік виступає:

а. Ступінь відповідності вирішення завдань поставленим вимогам

б. Глибина опрацювання тематики

с. Сума коштів, вкладених в наукову тематику

д. Тривалість розробки

е. Коефіцієнт економічної ефективності

118. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

а. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я

б. Регламенту

с. Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків

д. Нової теми досліджень

е. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

119. У хлопчика 4-х років погане самопочуття: виражена слабкість, знижена рухова активність, блідість шкірних покривів. На шкірі та слизових оболонках наявні петехії та екхімози, поодинокі крововиливи, безболісні, розташовані асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахікардія. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини:

а. Дефіцит IX фактора

б. Підвищена швидкість осідання еритроцитів

с. Зниження рівня гемоглобіну

д. Запалення дрібних судин

е. Зниження рівня тромбоцитів

120. В ході активного патронажу медична сестра проводить обстеження пацієнтки 32-х років з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

а. Вплив іонізуючого опромінення

б. Резекція тонкої кишки

с. Аутоімунні захворювання крові

д. Хронічний гепатит

е. Постійна крововтрата

121. Патронажна медична сестра дитячої поліклініки підраховує відсоток дітей, які перебували на грудному вигодовуванні до 4-х місяців життя. Вкажіть показник за яким Ви це визначите:

a. Показник укомплектованості

b. Екстенсивний

c. Показник наочності

d. Інтенсивний

e. Показник співвідношення

122. Пацієнт перебуває в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

a. Зменшення хвилювання

b. Усунення бронхоспазмів

c. Профілактика розвитку ателектазів

d. Усунення виділень з дихальних шляхів

e. Профілактика дихальної недостатності

123. До системи добровільного фінансування охорони здоров'я належить:

a. Приватне страхування

b. Соціальне медичне страхування

c. -

d. Обов'язкове медичне страхування

e. Загальне оподаткування

124. До групи зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення на медичні послуги, належать:

a. Витрати

b. Цілі ціноутворення

c. Рівень попиту

d. Державне регулювання

e. Змінні витрати

125. Завданням медичних працівників на першому етапі диспансеризації є групування так званого диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать хворі з хронічними захворюваннями в стадії субкомпенсації?

a. 3

b. 4

c. 5

d. 2

e. 1

126. Що можна обрати за одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності дітей на гострі респіраторні хвороби (ГРЗ) у поліклініці?

a. Випадок госпіталізації при ГРЗ

b. Випадок захворювання на хвороби органів дихання

c. Випадок захворювання ГРЗ у дитини

d. Випадок догляду за дитиною, хворою на ГРЗ

e. Дитина хвора на грип

127. Дитині 3 місяці. Об'єктивно: виражена блідість слизових оболонок, шкірних покривів, підвищена пітливість, особливо голови, неспокій, "облісіння" потилиці. Вигодовування штучне. Про яке захворювання свідчить даний стан дитини?

a. Анемія

b. Рахіт, період розпалу

c. Рахіт, початковий період

d. Рахіт, період реконвалесценції

e. Рахіт, період залишкових явищ

128. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад

враховував:

- a. Загальні та відносні витрати
- b. Співвідношення збуту й цін
- c. Вартість медичних послуг**
- d. Імовірні стратегії конкурентів
- e. Показники повторних купівель

129. Які моделі системи охорони здоров'я виділяються на основі класифікації за маркетинговими відносинами суб'єктів даної системи?

- a. Ринкова, неринкова, натуральна, модель змішаного типу**
- b. Утилітарна, комунотарна, ліберальна
- c. Класична ринкова, страхова утилітарна, національно-ліберальна
- d. Приватна, державна
- e. Класична, плюралістична, страхова, національна, соціалістична

130. Охарактеризуйте, який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, коли людину мало турбує, що вона отримає в результаті, як для себе, так і для іншої сторони:

- a. Примирення
- b. Тиск
- c. Уникнення**
- d. Співпраця
- e. Компроміс

131. Медсестра проводить клінічне обстеження пацієнта з синдромом тривалого стиснення. Який з симптомів буде характерним для II періоду даного захворювання?

- a. Локальні зміни в ушкоджених тканинах
- b. Нормалізація функції нирок
- c. Гостра ниркова недостатність**
- d. Бактеріальні ускладнення
- e. Ендогенна інтоксикація

132. При аналізі народжуваності найвищий показник в області спостерігався серед жінок 22-х років. Який це показник?

- a. Віковий**
- b. Показник народжуваності
- c. Тотальний
- d. Середній
- e. Загальний

133. В поліклініці проводили диспансерне спостереження людей за соціальними показниками. Які групи людей було охоплено в ході спостереження?

- a. Працівники навчальних та харчових закладів**
- b. Часто та тривало хворіючі
- c. Студенти навчальних закладів
- d. Особи, які мають донозологічні стани
- e. Хворі на окремі хронічні захворювання

134. З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

- a. Поточний
- b. Спеціальне вибіркове дослідження**
- c. Профілактичний
- d. Медичний огляд окремих груп
- e. Загальний

135. Дев'ятимісячна дитина під наглядом лікаря-педіатра проходить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

- a. 250 - 500 МО
- b. 500 - 1000МО
- c. 2000 - 5000МО**
- d. 1000 - 2000МО
- e. 5000 - 10000МО

136. До стаціонару доставлено дитину 2-х років, у якої 3 години тому під час гри з мозаїкою почався напад непродуктивного кашлю. Об'єктивно: дитина збуджена, температура тіла нормальна. Що може бути причиною такого стану?

- a. ГРВІ
- b. Пневмонія
- c. Бронхіальна астма
- d. Бронхіт

e. Стороннє тіло у дихальних шляхах

137. У пацієнта 42-х років туберкульоз легень. Вкажіть найбільш оптимальний препарат для терапії даного пацієнта:

- a. Цефтріаксон
- b. Еритроміцин
- c. Канаміцин
- d. Ампіокс

e. Рифампіцин

138. Якщо планування - це адміністративний інструмент, що забезпечує раціональну основу для прийняття управлінських рішень, то першим його етапом є:

- a. Визначення та аналіз проблеми**
- b. Вибір правильного рішення
- c. Визначення альтернативних варіантів
- d. Визначення технічних методів виконання
- e. Визначення цілей програми та головних дій щодо її реалізації

139. Основні джерела інформації, які характеризують захворюваність за даними медичних оглядів (цільових, попередніх, періодичних), - це:

- a. Статистична карта пацієнта, що вибув зі стаціонару
- b. Список осіб, що підлягають медичним оглядам**
- c. Талон амбулаторного пацієнта
- d. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
- e. Листок непрацездатності

140. У пацієнта з хронічним гломерулонефритом спостерігаються нудота, блювання, свербіння шкіри. Об'єктивно: стан важкий, психічна загальмованість, шкіра суха, запах аміаку з рота, АТ- 190/110 мм рт.ст., тони серця приглушені, аритмічні, ЧСС- 76/хв. Який стан виник у пацієнта?

- a. Уремія**
- b. Гіперглікемія
- c. Набряк легенів
- d. Ниркова колька
- e. Гіпоглікемія

141. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на болі в суглобах, субфебрильну температуру. При огляді: на спинці носа і щоках висип, що нагадує крила метелика. Погіршення стану пов'язує з перебуванням на сонці. Розвиток якого захворювання можна припустити?

- a. Ревматоїдний артрит
- b. Кропив'янка
- c. Ревматичний артрит
- d. Гострий лейкоз

e. Системний червоний вовчак

142. У дівчинки 4-х років t° - 37, 4 $^{\circ}$ C, утруднене носове дихання, слизовосерозні виділення з

носу, захриплість голосу, грубий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці зміни?

a. Гострий ларингіт

- b. Гострий трахеїт
- c. Обструктивний бронхіт
- d. Гострий бронхіт
- e. Гострий фарингіт

143. У хлопчика 9-ти місяців життя надмірний вологий кашель, задишка з утрудненим видихом, дистанційні хрипи, ЧДР- 52/хв., ЧСС- 110/хв., температура тіла - 36, 9°C. Нащо треба звернути увагу в першу чергу при плануванні сестринського обстеження?

a. Частота дихальних рухів

- b. Температура тіла
- c. Характер харкотиння
- d. Аускультация легень
- e. Частота серцевих скорочень

144. Медсестра здійснює догляд за дитиною 10-ти років з гострим гломерулонефритом. Які зміни у сечі є характерними?

a. Еритроцитурія, циліндрурія

- b. Підвищення цукру, циліндрурія
- c. Еритроцитурія, бактеріурія
- d. Лейкоцитурія, еритроцитурія
- e. Лейкоцитурія, бактеріурія

145. Жінка 30-ти років, яка перебуває в психіатричному диспансері з діагнозом маніакально-депресивний психоз у стані депресії, вже 3-й день поспіль відмовляється від приймання їжі. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?

- a. Продовжувати переконувати у необхідності поїсти
- b. Попросити допомоги у сусідів по палаті
- c. Ввести хворій снодійне

d. Вдатися до годування через зонд

- e. Дочекатися власної ініціативи пацієнтки поїсти

146. У хворої на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не лише пальпується, а й помітна при ковтанні. Вкажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

a. II ступінь

- b. I ступінь
- c. IV ступінь
- d. V ступінь
- e. III ступінь

147. У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації спостерігаються набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

- a. Ревматична гарячка, ревмокардит
- b. Деформуючий остеоартроз
- c. Ревматична гарячка, мала хорея

d. Ревматична гарячка, поліартрит

- e. Ревматоїдний артрит

148. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

- a. Пухирчатка новонароджених
- b. Фурункульоз
- c. Герпес-інфекція

d. Везикулопустульоз

е. Псевдофурункулез

149. Вкажіть вік, з якого недоношеним дітям починають проводити профілактику рахіту:

- а. 3-й місяць життя
- б. Одразу після народження
- с. 2-й місяць життя
- д. 5-й день життя

е. 10-20-й день життя

150. Чоловік працює акумуляторщиком протягом 12-ти років. Доставлений в хірургічне відділення зі скаргами на різкий переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень впродовж 2-х діб. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. При огляді: живіт втягнутий; при пальпації: розлитий біль, переважно навколо пупка. Симптоми подразнення очеревини негативні. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

а. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки

б. Свинцева колька

- с. Гострий панкреатит
- д. Гострий апендицит
- е. Гострий холецистит

151. Хворий 24-х років внаслідок автодорожньої аварії отримав черепно-мозкову травму і втратив свідомість. При обстеженні хворого на місці аварії шкіра бліда, з ціанотичним відтінком, пульс 140/хв., дихальні рухи грудної клітки відсутні, реакція зіниць на світло збережена. Визначити обсяг первинної допомоги:

а. Надання ворому напівсидячого положення

б. Усунення за падання зика, надання лежачого положення на правому боці, при необхідності - штучна вентиляція легень

- с. Штучна вентиляція легень потерпілому
- д. Термінова госпіталізація до стаціонару
- е. Масаж грудної клітки

152. Хлопчик 9-ти років скаржиться на часте сечовипускання, болі в животі, нудоту, одноразове блювання, підвищення температури тіла до 37,7°C. Хворіє 3 дні. При огляді шкірні покриви бліді, АТ- 105/60 мм рт.ст. Тони серця звучні, діяльність ритмічна, Рс- 100/хв., ЧД- 26/хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. У сечі: питома вага - 1012, білок 0,16 г/л, лейкоцити - 30-50 в п/з, еритроцити - 3-4 в п/з, бактерії - велика кількість. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Гломерулонефрит
- б. Сечокислий інфаркт нирок
- с. Цистит
- д. Сечокам'яна хвороба

е. Пієлонефрит

153. Населенням міста А має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста:

- а. Динамічний
- б. Змішаний
- с. Стабільний
- д. Регресивний

е. Прогресивний

154. При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: $((\text{число мертвонароджених} + \text{число дітей, які померли в постнатальний період}) * 1000) / (\text{число дітей, які народилися живими і мертвими})$. Як називається розрахований показник?

- а. Питома вага дітей, які померли в постнатальний період
- б. Мертвонароджуваність
- с. Малюкова смертність
- д. Акушерська смертність

е. Перинатальна смертність

155. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

а. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

б. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

с. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

д. Собівартість медичних послуг і загальні доходи

е. Ціна та собівартість медичних послуг

156. Жінка 36-ти років народила 1 годину тому. Крововтрата у пологах склала 1 літр. З'явилися шуми в голові, потемніння в очах, короточасна втрата свідомості. Діагностовано гостру судинну недостатність. Що з нижчеперерахованого є характерним для кола псу?

а. Глибоке, шумне дихання

б. Уповільнення пульсу

с. Дифузний ціаноз

д. Блідість шкіри

е. Високий систолічний тиск

157. Хворий скаржиться на стискаючі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку, які виникають при фізичному навантаженні, купіруються нітрогліцерином протягом 1 хвилини. Об'єктивно: набряків немає. РС - 72/хв., ритмічний. АТ - 135/90 мм рт.ст. Про яку патологію йдеться?

а. Міжреберна невралгія

б. Крупновогнищевий (Q) інфаркт міокарда

с. Стенокардія спокою

д. Стенокардія напруження

е. Дрібновогнищевий (не Q) інфаркт міокарда

158. Чисельність дитячого населення на педіатричних дільницях дитячої поліклініки становить: дільниця № 1 - 800 дітей; дільниця № 2 - 590 дітей; дільниця № 3 - 650 дітей; дільниця № 4 - 700 дітей; дільниця № 5 - 950 дітей. На якій із зазначених педіатричних дільниць кількість дитячого населення відповідає встановленому нормативу?

а. № 5

б. № 1

с. № 3

д. № 2

е. № 4

159. Робітник ливарного цеху заводу 46-ти років скаржиться на задишку, яка з'являється при незначному фізичному навантаженні, біль в грудній клітці, кашель з невеликою кількістю слизового харкотиння. Об'єктивно: шкіра бліда, ціаноз губ. Перкуторно - "мозаїчність" звуку. Аускультативно дихання жорстке, над ділянками емфіземи - послаблене. Тони серця приглушені. Яка рентгенологічна картина характерна для цієї стадії захворювання?

а. Підвищення прозорості і легень

б. "Снігова хуртовина"

с. Злиття вузликів тіней в конгломерати

д. Вузликові тіні діаметром до 1 мм

е. Бронхоектази

160. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидку втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабаних паличок", кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження цільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість?

а. Проба на реактивну гіперемію

б. Капіляроскопія

с. Палестезіометрія

- d. Холодова проба
- е. Алгезиметрія

161. Робітник 42-х років, що працює на коксохімічному комбінаті, порушив техніку безпеки, ввійшов до замкнутого приміщення для зберігання бензолу. Після виходу з приміщення відчув себе погано: з'явилося почуття оп'яніння, сонливість, головний біль, нудота, блювання, слабкість у м'язах, порушення ходи. В медпункті знепритомнів. При проведенні обстеження пацієнта медсестра повинна звернути увагу на шкіру, яка набуває кольору:

а. Сіро-синього

- b. Алебастрового
- с. Червоного
- d. Жовтяничного
- е. Землисто-блідого

162. Хворий 45-ти років, працівник по виготовленню електричного кабелю, потрапив у приймальне відділення зі скаргами на солодкий присмак у роті, блювання, пронос, раптове виникнення коліки, пітливість. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 38,9°C, виражена брадикардія, підвищене потовиділення, АТ- 180/90 мм рт.ст. В крові - гіпохромна анемія. Наявність якого основного діагностичного симптому повинна виявити медсестра при проведенні обстеження пацієнта:

- а. "Свинцевий поліневрит"
- b. "Снігова хуртовина"
- с. "Брудних ліктів"
- d. "Шкіра леопарда"

е. "Свинцевий колорит"

163. Пацієнт 60-ти років з діагнозом "ІХС: гострий коронарний синдром". Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудиною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів застосує для корекції гемодинаміки?

а. Дофамін

- b. Ефедрин
- с. Атропін
- d. Строфантин
- е. Коргликон

164. При обстеженні дитини 4-х років, виявлені наступні проблеми: біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Хворіє другий день. Захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно: гіперемія мигдаликів, гній в лакунках, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках, носогубний трикутник блідий. Яке захворювання можна запідозрити?

а. Скарлатина

- b. Краснуха
- с. Менінгококова інфекція
- d. Кіп
- е. Вітряна віспа

165. До дитячого відділення поступила дитина 20-ти днів. При проведенні медсестринської оцінки стану пацієнта виявлені проблеми: повторне блювання, частий рідкий стілець, підвищення температури тіла до 39,3°C. Стан дитини важкий, вона млява, шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком, еластичність шкіри знижена, слизові оболонки сухі, велике тім'ячко запале. З очей та правого слухового ходу відмічаються гнійні виділення, з пупкової ранки - серозно-геморагічні виділення. Про що можна подумати?

а. Кон'юнктивіт

b. Сепсис новонародженого

- c. Ентероколіт
- d. Омфаліт
- e. Отит

166. В інфекційному відділенні лікарні старша медична сестра має освітній рівень молодшого спеціаліста, а чергова медсестра - бакалавра. Чергова медсестра прямолінійно заявляє, що на посаді старшої медсестри повинна бути вона, бо має кращі знання вміння організувати роботу у відділенні. Назрів конфлікт. Який спосіб його розв'язання є у цьому випадку оптимальним?

- a. Уникнення
- b. Поступка
- c. Компроміс
- d. Пристосування
- e. Співпраця**

167. Медсестри кардіологічного відділення А. та М., сестра-господиня С. мають спільне захоплення- вишивання. Старша медична сестра відділення разом з головною медичною сестрою лікарні організували виставку робіт майстринь у холі відділення в день народження Т.Г. Шевченка. Це елемент культури організації. Про який рівень культури йдеться?

- a. Рівень поверхневої культури
- b. Смисловий рівень "цінність"
- c. Рівень світоприйнятних цінностей**
- d. Філософія організації
- e. Дух організації

168. За результатами акредитації районній лікарні присвоєно першу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?

- a. 74-70
- b. 69-50
- c. 92-100
- d. 75-80
- e. 81-91**

169. З метою покращення обслуговування пацієнтів, вчасного виявлення незадоволених потреб у хірургічному відділенні провели опитування хворих у вигляді анкетування. Що це означає в процесі маркетингового дослідження ринку медичних послуг?

- a. Кабінетні дослідження
- b. Постановка мети
- c. Висновки
- d. Збір первинної інформації**
- e. Аналіз отриманої інформації

170. До медичного коледжу надійшла гуманітарна допомога з американського госпіталю. Частина обладнання, придатного для практичного використання, коледж передав районній лікарні, певним чином оцінивши. Як називається цей вид ціни?

- a. Прейскурантна ціна
- b. Бюджетна оцінка**
- c. Договірна ціна
- d. Вільна ціна
- e. Тарифи з медичного страхування

171. В хірургічне відділення поступив хворий 51-го року із скаргами на біль у правій гомілці, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Флеботромбоз
- b. Тромбофлебіт
- c. Ліфмангоїт

d. Флебїт

e. Артерїїт

172. Пацієнт госпіталізований з приводу пневмонії. Лікар призначив антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, утруднення дихання, став блідим, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. набряк легень
- b. Серцева астма
- c. набряк Квінке
- d. Кропив'янка

e. Анафілактичний шок

173. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ 170/100 мм рт.ст., Рс - 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

a. Аналіз сечі за Нечипоренком

- b. Аналіз сечі за Зимницьким
- c. Аналіз сечі на діастазу
- d. Загальний аналіз крові
- e. Аналіз сечі на глюкозу

174. Пацієнтка 26-ти років скаржиться на біль у колінних та ліктьових суглобах "летючого характеру", який підсилюється при рухах, підвищення температури тіла до 37, 5°C ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При огляді суглобів відзначається їх припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- a. Гонорейний артрит
- b. Деформуючий остеоартроз
- c. Туберкульозний артрит
- d. Ревматоїдний артрит

e. Ревматичний артрит

175. Хворий скаржиться на напад ядухи з утрудненим видихом, незначну кількість харкотиння, відчуття стиснення в грудях, сухі свистячі хрипи, які чути на відстані. Захворів раптово після вдилення фарби у приміщенні. Об'єктивно: шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Грудна клітка у стані глибокого вдиху. В легенях при аускультції на тлі жорсткого дихання ухві свистячі хрипи, ЧД - 29/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Бронхоектатична хвороба
- b. Сухий плеврит
- c. Гострий трахеобронхіт

d. Бронхіальна астма

e. Пневмонія

176. Хлопчик 14-ти років страждає на цукровий діабет. Після ін'єкції інсуліну в нього різко погіршився стан. Шкіра бліда, пітливість, мідріаз, підвищення м'язового тонусу, підвищення ухажильних рефлексів, загальний тремор, судоми, зниження артеріального тиску, тахікардія, розлад психіки, рівень глюкози в крові 1,4 ммоль/л. Визначте захворювання:

- a. Печінкова кома
- b. Гіперглікемічна кома

c. Гіпоглікемічна кома

- d. Уремична кома
- e. Колапс

177. Вкажіть термін першого прикладання новонародженої здорової дитини до грудей матері в пологовому будинку:

- a. Через 1 добу після народження

b. В перші 30 хвилин післяна родження

- c. Через 3 години післяна родження
- d. Через 2 години післяна родження
- e. Через 6 годин післяна родження

178. Хвора 62-х років скаржиться на пітливість, серцебиття, тремор, почуття голоду. Хворіє на цукровий діабет впродовж 4-х років, приймає 20 ОД інсуліну. Яке додаткове обстеження треба провести першочергово?

- a. Аналіз сечі на діастазу
- b. Аналіз крові на амілазу
- c. Аналіз крові на білірубін
- d. Аналіз крові на глюкозу**
- e. Загальний аналіз крові

179. Перша фаза процесу управління розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

- a. Поточний
- b. Попередній**
- c. Фільтруючий
- d. Направляючий
- e. Заключний

180. Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігаються у разі кашлюку?

- a. Нейтрофіліоз
- b. Анемія
- c. Лімфоцитоз**
- d. Еозинофілія
- e. Тромбоцитопенія

181. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- a. Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад**
- b. Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- c. Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад
- d. Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- e. Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад

182. Медсестра оглядового кабінету поліклініки разом з лікарем-онкологом бере участь в огляді пацієнтки 49-ти років. При пальпації лівої молочної залози у верхньозовнішньому квадранті виявили щільне, горбисте утворення, спаяне зі шкірою. Про яке захворювання можна подумати?

- a. Кіста молочної залози
- b. Рак молочної залози**
- c. Ліпома
- d. Фіброаденома
- e. Аденома

183. Яка система охорони здоров'я повинна бути в сучасній Україні, згідно з концепцією МОЗ України?

- a. Медичне страхування
- b. Централізоване планування
- c. Державне управління охороною здоров'я
- d. Приватна медицина
- e. Змішана**

184. У відділення дійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням

жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- a. Загальний аналіз сечі
- b. Загальний аналіз крові
- c. УЗД органів черевної порожнини**
- d. Кров на діастазу
- e. Кров на визначення рівня холестерину

185. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- a. Септичний шок
- b. Гемолітична реакція
- c. Цитратний шок
- d. Анафілактична реакція**
- e. Пірогенна реакція

186. Для інтубації трахеї пацієнта використали міорелаксant короткої дії - дитилін. Чим можна усунути залишкову дію цього препарату?

- a. Налоксон
- b. Адреналін
- c. Атропін
- d. Прозерин**
- e. Мезатон

187. В центральній районній лікарні підраховували показники загальної та первинної захворюваності, а також питому вагу кожного класу захворювань. Які графіки можна застосувати для цих показників?

- a. Об'ємні, картограма
- b. Стопчикова, лінійна
- c. Секторна, лінійна**
- d. Радіальна, фігурна
- e. Картограма, радіальна

188. У пацієнта відмічаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після прийому їжі), зменшуються після вживання їжі. Для якого захворювання характерна дана картина?

- a. Езофагіт
- b. Дискінезія жовчовивідних шляхів
- c. Жовчнокам'яна хвороба
- d. Гастрит
- e. Виразкова хвороба шлунка**

189. Після введеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

- a. Визначення креатиніну
- b. Визначення протіємії
- c. Проба за Зимницьким
- d. Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- e. Загальний аналіз сечі**

190. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

- a. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- b. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- c. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька
- d. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька**

е. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча

191. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

- а. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- б. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- с. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська**
- д. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- е. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

192. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія". t° - $38,5^{\circ}\text{C}$. Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

- а. Натщесерце
- б. Після нормалізації температури тіла**
- с. Одразу
- д. Після дужання від пневмонії
- е. Немає обмежень в часі

193. Через 10-ти днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулась до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, $t^{\circ}37,4^{\circ}\text{C}$, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

- а. Інфекційне
- б. Нефрологічне**
- с. Урологічне
- д. Терапевтичне
- е. Кардіологічне

194. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- а. Адреналін
- б. Кордіамін**
- с. Мезатон
- д. Еуфілін
- е. Фенобарбітал

195. Медична сестра хірургічного відділення спостерігає у хворого 48-ми років післяопераційне тремтіння. Чим зняти даний стан у пацієнта?

- а. Протиаритмічні засоби
- б. Інгаляція кисню**
- с. Протисудомні засоби
- д. Зігріваннях ворого
- е. Заспокійливі засоби

196. Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?

- а. Дані перепису населення
- б. Показник загальної захворюваності**
- с. Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню
- д. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
- е. Дані про профілактичний огляд

197. При розробці тарифів цін нового приватного медичного закладу підприємці стараються забезпечити високий рівень медичної допомоги населенню і перспективність діяльності.

Керуючись загальними принципами економіки при розробці ціни послуги економіст закладу враховує:

- a. Ціни на медичні послуги передових країн
- b. Ціни споживчого ринку
- c. Незалежну вільну ціну
- d. Податок держави
- e. Собівартість, якість і прибуток послуги та податок держави**

198. Наукове дослідження проводиться з певною послідовністю, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- a. Нової теми досліджень
- b. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником
- c. Регламенту
- d. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- e. Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків**

199. У хлопчика 4-х років погане самопочуття: виражена слабкість, знижена рухова активність, блідість шкірних покривів. На шкірі та слизових оболонках наявні петехії та екхімози, поодинокі крововиливи, безболісні, розташовані асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахікардія. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини:

- a. Підвищена швидкість осідання ритроцитів
- b. Зниження рівня тромбоцитів**
- c. Запалення рібних судин
- d. Зниження рівня гемоглобіну
- e. Дефіцит ІХ фактора

200. При активному патронажі медична сестра проводить обстеження пацієнтки 32-х років з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

- a. Аутоімунні захворювання крові
- b. Вплив іонізуючого опромінення
- c. Резекція тонкої кишки
- d. Постійна крововтрата**
- e. Хронічний гепатит

201. Пацієнт перебуває в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

- a. Профілактика розвитку ателектазів**
- b. Зменшення впливу
- c. Профілактика дихальної недостатності
- d. Усунення вогнища з дихальних шляхів
- e. Усунення бронхоспазмів

202. У перші місяці життя малюк, народжений ВІЛ-інфікованою матір'ю, буде мати позитивний аналіз крові на ВІЛ. До якого терміну життя встановлюється статус ВІЛ-інфікованості?

- a. До 12 місяців
- b. До 3 місяців
- c. До 24 місяців
- d. До 18 місяців**
- e. До 6 місяців

203. На другу добу після паротомії, яка проводилася пацієнта 31-го року під ендотрахеальним наркозом, лікар призначив йому перевертатися з боку на бік, проводити дихальну гімнастику, лужні інгаляції. Для запобігання якого ускладнення це потрібно виконувати?

- a. Утруднення відлучення з дренажу

b. Бронхіт

- c. Тромбоз
- d. Парез кишечника
- e. Емболія

204. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- a. Загальні та відносні витрати
- b. Співвідношення збуту й цін

c. Вартість медичних послуг

- d. Імовірні стратегії конкурентів
- e. Показники повторних купівель

205. Які моделі системи охорони здоров'я виділяються на основі класифікації за маркетинговими відносинами суб'єктів даної системи?

- a. Класична ринкова, страхова утилітарна, національно-ліберальна

b. Ринкова, неринкова, натуральна, модель змішаного типу

- c. Утилітарна, комунітарна, ліберальна
- d. Класична, плюралістична, страхова, національна, соціалістична
- e. Приватна, державна

206. Медсестра проводить клінічне обстеження пацієнта з синдромом тривалого стиснення. Який з симптомів буде характерним для I періоду даного захворювання?

- a. Ендогенна інтоксикація

b. Гостра ниркова недостатність

- c. Локальні зміни в ушкоджених тканинах
- d. Нормалізація функції нирок
- e. Бактеріальні ускладнення

207. З метою раннього виявлення захворювання а туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

- a. Поточний

b. Спеціальне вибіркове дослідження

- c. Профілактичний
- d. Медичний огляд окремих груп
- e. Загальний

208. Дев'ятимісячній дитині лікар-педіатр проводить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

a. 2000 - 5000 МО

- b. 250 - 500 МО
- c. 5000 - 10000 МО
- d. 1000 - 2000 МО
- e. 500 - 1000 МО

209. Медсестра інфекційної лікарні приготувала все необхідне для взяття мазка у із ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для підтвердження когось захворювання проводиться процедура?

- a. Червона висипка

b. Кашлюк

- c. Скарлатина
- d. Дифтерія
- e. Кіп

210. Якщо планування - це адміністративний інструмент, що забезпечує раціональну основу для прийняття управлінських рішень, то першим його етапом є:

- a. Визначення цілей програми та головних дій щодо її реалізації

b. Визначення технічних методів виконання

c. Визначення альтернативних варіантів

d. Визначення та аналіз проблеми

e. Вибір правильного рішення

211. До Вас звернувся пацієнт з проблемами: біль у ділянці серця після фізичного навантаження з іррадіацією у ліву руку, тривалістю 3 хвилини, серцебиття. Який препарат доцільно використати?

a. Анальгін

b. Вольтарен

c. Нітрогліцерин

d. Корвалол

e. Кетанов

212. Пацієнт хворіє на пневмонію, лікується антибіотиками. На 4-ту добу лікування з'явилися шкірний свербіж, пухирцевий висип на шкірі, слабкість, головний біль, температура - 37,2°C, зниження апетиту. Яка проблема пацієнта буде пріоритетною?

a. Свербіж шкіри

b. Головний біль

c. Зниження апетиту

d. Субфебрильна температура тіла

e. Слабкість

213. У дівчинки 4-х років t° - 37,4°C, утруднене носове дихання, слизово-серозні виділення з носа, осиплість голосу, грубий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці зміни?

a. Гострий фарингіт

b. Гострий бронхіт

c. Обструктивний бронхіт

d. Гострий ларингіт

e. Гострий трахеїт

214. Медсестра здійснює догляд за дитиною 10-ти років з гострим гломерулонефритом. Які зміни у сечі є характерними?

a. Підвищення цукру, циліндрурія

b. Лейкоцитурія, бактеріурія

c. Еритроцитурія, циліндрурія

d. Лейкоцитурія, еритроцитурія

e. Еритроцитурія, бактеріурія

215. Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

a. Одномоментна

b. Цільова

c. Попередня

d. Облікова

e. Поточна

216. Ви досліджували захворюваність медичних сестер на гострі респіраторні вірусні інфекції. З висновками необхідно ознайомити медичний персонал відділення. Що необхідно написати?

a. Анотація

b. Тези

c. Резюме

d. Конспект

e. Виписки

217. За класифікацією предметів навколишнього середовища щодо ризику поширення

нутрішньолікарняної інфекції, предмети, що проникають в органи і порожнини тіла, мають:

- a. Нульовий ризик
- b. Високий ризик**
- c. Низький ризик
- d. Середній ризик
- e. Помірний ризик

218. У хворой на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не лише пальпується, а й помітна при ковтанні. Вкажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

- a. II ступінь**
- b. I ступінь
- c. IV ступінь
- d. V ступінь
- e. III ступінь

219. У дитини 5-ти років через 3 тижні після нгін з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації виявляється набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання і симптоми характерні?

- a. Ревматична гарячка, ревмокардит
- b. Деформуючий остеоартроз
- c. Ревматична гарячка, мала хорея
- d. Ревматична гарячка, поліартрит**
- e. Ревматоїдний артрит

220. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

- a. Пухирчатка новонароджених
- b. Фурункульоз
- c. Герпес-інфекція
- d. Везикулопустульоз**
- e. Псевдофурункульоз

221. Хвора 30-ти років, оператор машинного доїння, кілька місяців скаржиться на болі у м'язах, суглобах. При огляді виявлено ознаки ураження плечового, ліктьового і кульшового суглобів, фіброзит. Про яке професійне захворювання йдеться?

- a. Бруцельоз**
- b. Туляремія
- c. Лімфогранулематоз
- d. Сап
- e. Токсоплазмоз

222. В лікувальному закладі розроблено бізнес-план, який включає оцінку очікуваних витрат і доходів. В якому із розділів бізнес-плану приводиться прогноз майбутніх доходів та витрат при наданні медичних послуг:

- a. Організаційний план
- b. Фінансовий план**
- c. Маркетинг-план
- d. Характеристика галузі охорони здоров'я
- e. Виробничий план

223. Зовнішнє кодування здійснюється за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). При практичному використанні ТН ЗЕД кодування варів варто здійснювати тільки:

- a. Семизначним кодом
- b. Восьмизначним кодом
- c. П'ятизначним кодом
- d. Шестизначним кодом

е. Дев'ятизначним кодом

224. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся апат загальних судом. Необхідно ввести протисудомний препарат у дозі:

- a. 0,5% сибазон 0,5 мл
- b. 0,5% діазепам 2 мл
- c. 0,5% діазепам 0,2 мл
- d. 0,5% сибазон 0,8 мл**
- e. 0,5% седуксен 0,5 мл

225. У дитини 4-х місяців спостерігаються зригування, часте рідке випорожнення зі слизом. Живіт здутий, гази відходять погано. Температура тіла - 35,8°C, АТ знижений. Втрата маси 500 г. Про що свідчить важкий стан дитини?

- a. Сепсис, септикопемія
- b. Сепсис, септицемія

с. Кишковий токсикоз з ексикозом

- d. Адреногенітальний синдром, сільвтрачаюча форма
- e. Білково-енергетична недостатність

226. У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

- a. Фіброеластоз міокарда
- b. Дефект міжшлуночкової перегородки
- c. Дефект міжпередсердної перегородки
- d. Відкрити аортальну протоку

е. Тетраду Фалло

227. У дитини 8-ми місяців з гострою вірусною інфекцією стан погіршився: акроціаноз, задишка змішаного типу, роздування крил носа. В нижніх сегментах легенів симетричне притуплення перкуторного звуку. Діагноз буде підтверджувати аускультативна картина:

- a. Крепітації та послаблене дихання з однієї сторони
- b. Дрібнопухирчасті вологі хрипи з обох сторін, дихання послаблене**
- c. Крупнопухирчасті вологі хрипи, дихання жорстке
- d. Свистячі хрипи на вдосі
- e. Дихання в легенях жорстке, сухі хрипи

228. Перелік досліджень та заходів щодо виявлення хворих з артеріальною гіпертензією та принципи їх ведення визначені наказом МОЗ України:

- a. №186
- b. №207
- c. №236
- d. №247**
- e. №205

229. Пацієнт 56-ти років скаржиться на переймоподібний біль в животі, закрепи, рідкі випорожнення з кров'ю протягом року. Схуд на 15 кг. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт м'який, у лівому підребер'ї пальпується помірне болюче, щільне утворення. У крові: ер.- 3, 0·10¹²/л, Hb 98 г/л. Назвіть найбільш інформативний метод діагностики:

- a. Комп'ютерна томографія
- b. УЗД
- c. Колоноскопія (з біопсією)**
- d. Іригоскопія
- e. Магніто-резонансна терапія

230. У пацієнтки 28-ти років, яка хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки серед повного

благополуччя раптово виник сильний "кинджалоподібний" біль в пілородуоденальній ділянці. Прийом 2-х таблеток но-шпи біль не зняв. Об'єктивно: Рс- 90/хв., АТ- 125/70 мм рт.ст. Пальпація живота різко болюча в пілородуоденальній ділянці, симптоми подразнення очеревини позитивні. У крові: Нb- 124 г/л, лейкоцити - $16,8 \cdot 10^9$ /л, ШОЕ- 12 мм/год. Ці скарги вказують на:

а. Перфорацію виразки

- б. Гостру кишкову непрохідність
- с. Пенетрацію виразки 12-палої кишки
- д. Гострий панкреатит
- е. Гострий холецистит

231. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ 100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органа в черевній порожнині, який необхідно провести для діагностики захворювання:

а. Колоноскопія

б. Оглядова рентгенографія

- с. Іригоскопія
- д. УЗД
- е. Лапароцентез

232. Під час медсестринського обстеження пацієнта, який тривалий час страждає на цироз печінки, виникло блювання свіжою кров'ю. Стан пацієнта тяжкий, шкірні покриви бліді, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв., слабкого наповнення. Вкажіть імовірну причину кровотечі:

- а. Пухлина шлунка
- б. Виразка 12-палої кишки
- с. Виразкова хвороба шлунка
- д. Перфоративна виразка шлунка

е. Варикозно розширені вени стравоходу

233. В одному із фермерських господарств травмувалася молодша людина. Лікар запідозрив перелом стегна. Яку шину повинна підготувати і застосувати медична сестра сімейного лікаря?

а. Шина Дельбе

б. Шина Дітерікса

- с. Шина Фільберга
- д. Шина Беллера
- е. Шина Крамера

234. Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовтобілого кольору обмежені нашірвання. Перераховані симптоми вказують на:

- а. Фолікулярна ангіна
- б. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- с. Дифтерія зівя

д. Лакунарна ангіна

е. Катаральна ангіна

235. До лікаря звернулася пацієнтка 44х років, масажистка за фахом. Скаржиться на біль і відчуття поколювання в руках під час роботи і після її припинення. Особливо біль непокоїть вночі. Об'єктивно: пасивні рухи в кінцівках вільні, безболісні. При активних рухах виникає різкий біль в руках. Пальпаторно м'язи рук ущільнені, пальпуються болючі вузлики діаметром до 1 см. Це характерно для:

- а. Міалгії
- б. Дискінезії
- с. Бурситу

d. Міозиту

e. Артрозу

236. Соціальна медицина, як наука, володіє різноманітними методами дослідження. Як називається статистичне дослідження, яке охоплює облік усіх одиниць спостереження?

- a. Вибіркове дослідження
- b. Несуцільне дослідження
- c. Монографічне дослідження
- d. Дослідження основ ного масиву

e. Суцільне дослідження

237. Диспансерні контингенти населення підлягають періодичним профілактичним оглядам, програми яких передбачають такі дослідження: аналіз крові, аналіз сечі на глюкозу, аналіз сечі на білок, флюорографію. Назвіть віковий термін проведення даної програми?

- a. З 14 років 1 раз на 2 роки
- b. З 14 років 2 рази на 1 рік
- c. З 7 років 1 раз на 2 роки
- d. З 12 років 1 раз на 1 рік

e. З 12 років 1 раз на 2 роки

238. На прийомі мати 5-ти місячної дитини скаржиться на те, що малю неспокійно, погано спить, пітніє, з'явилося обличчя потилиці. При обстеженні: краї переднього тім'ячка розм'якшені, краніотабес. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Астено-невротичний синдром
- b. Кефалогематома

c. Рахіт

d. Алергічний діатез

e. Нервово-артритичний діатез

239. Вас викликали до дитини 10-ти років, мати якої скаржиться на появу ціанозу, задишку. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. На момент огляду дихання трудненьке, кашель, ціаноз шкіри. Якої допомоги потребує дитина?

- a. Прийом Леопольда
- b. Термінова інтубація трахеї
- c. Протишокові заходи

d. Прийом Геймліха

e. Відсмоктування слизу з рота та носа

240. При складанні звіту за рік за формою №24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту", було зареєстровано 102 проведених бесід з населенням. На основі якої облікової медичної документації заповнюється ця частина звіту?

- a. Журнал реєстрації амбулаторних хворих
- b. Журнал реєстрації листків непрацездатності
- c. Журнал обліку з гігієнічного виховання населення
- d. Журнал обліку інфекційних захворювань
- e. Журнал обліку процедур

241. Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечовипуск був 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечовипуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Статевий криз
- b. Гломерулонефрит
- c. Вульвовагініт

d. Сечокислий інфаркт нирок

e. Пієлонефрит

242. У дитини 4-х років із сім'ї хворих на туберкульоз декілька днів тому з'явилися головний

біль, блювання, підвищення температури тіла, погіршення апетиту. Об'єктивно: дитина млява, апатична, температура тіла - 38,6°C, ЧСС- 100/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст., мова тиха, невиразна, виражена ригідність м'язів потилиці, позитивні симптоми Керніга, Брудзінського. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

а. Туберкульозний менінгіт

- б. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- с. Епідемічний паротит
- д. Вірусний енцефаліт
- е. Менінгококовий менінгіт

243. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Перелом правого колінного суглоба
- б. Гострий артрит колінного суглоба
- с. Флегмона правої гомілки
- д. Вивих правого колінного суглоба

е. Гострий гематогенний остеомієліт

244. На шляху до роботи чоловіка збила автомашина. Об'єктивно: свідомість відсутня, зіниці на світло не реагують, шкіра бліда, дихання рідке і поверхневе. Пульс слабкий, частий, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Із рота, носа і вух кров'яні виділення. Який імовірний діагноз?

а. Перелом основи черепа

- б. Перелом склепіння черепа
- с. Перелом кісток черепа обличчя
- д. Крововилив у мозок
- е. Струс мозку

245. У приймальне відділення доставлено хворого 56-ти років. Стан пацієнта важкий, шкіра бліда, Рс- 132/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт м'який, болючий. Позитивні симптоми Валя, шум плеску. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини - наявність чаш Клойбера. Про яке захворювання свідчать вище вказані ознаки?

- а. Перитоніт
- б. Гострий панкреатит
- с. Гострий апендицит
- д. Асцит

е. Кишкова непрохідність

246. Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри на лівій гомілці. Хворіє 2 дні. Температура тіла - 39,5°C. Об'єктивно: в ділянці середньої третини лівої гомілки відмічаються набряк, почервоніння шкіри з чіткими фестончастими краями, місцями пухирі різних розмірів, заповнені серозно-геморагічним екссудатом. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- а. Фурункульоз
- б. Флегмона
- с. Лімфангоїт

д. Бешиха

е. Гострий тромбофлебіт

247. В хірургічне відділення госпіталізований хворий, який скаржиться на біль і випинання правій пахвинній ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій паховій ділянці невправиме напружене болісне випинання. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- а. Абсцес правої пахвинної ділянки
- б. Туберкульоз лімфатичних вузлів

с. Гострий лімфаденіт

d. Защемлена пахвинна грижа

е. Ліпома правої пахвинної ділянки

248. В приймальне відділення доставлений хворий, який після травми відмічає біль і неможливість рухів у правому плечовому суглобі. При огляді правий плечовий суглоб деформований, рухи в суглобі різко обмежені, пружні. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

a. Розрив м'язів плеча

b. Перелом ключиці

с. Перелом плечової кістки

d. Вивих плеча

е. Перелом передпліччя

249. Пацієнтка 48-ми років прооперована з приводу перфоративної виразки шлунка. З метою профілактики кровотечі на ділянку післяопераційної рани медична сестра поклала міхур з льодом. Вкажіть максимальний час, протягом якого можна тримати накладений міхур із льодом не знімаючи:

a. 3-4 години

b. 1-2 години

с. 2-3 години

d. 4-5 годин

е. 5-6 годин

250. Медична сестра стала свідком травми чоловіка, який пірнав у воду з висоти 2 м. Об'єктивно: при пальпації визначається болісність у ділянці 5-го шийного хребця, крепітація остистого відростка. Вкажіть вид іммобілізації, який необхідно застосувати при транспортуванні пацієнта в лікарню:

a. Шина Єланського

b. Шина Ентіна

с. Комірець Шанца

d. Шина Башмакова

е. Ватно-марлеве кільце

251. У пацієнта раптовий гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, іррадіює в стегно. Позитивний симптом Пастернацького. Для якої патології характерні дані ознаки?

a. Гострий панкреатит

b. Гострий апендицит

с. Гострий холецистит

d. Печінкова колька

е. Ниркова колька

252. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

a. Зняття ЕКГ

b. Оглядовий знімок грудної клітки

с. Оглядовий знімок черевної порожнини

d. Визначення мілази крові

е. Загальний аналіз крові

253. У пацієнта 63-х років, який протягом десяти років хворіє на хронічний лімфолейкоз, на фоні вираженого погіршення самопочуття в периферичній крові виявлено 15% лімфобластичних клітин. Як називається такий стан?

a. Зсув лейкоцитарної формули вліво

b. Лімфоцитоз

с. Лейкемічний провал

d. Бластна криза

е. Зсув лейкоцитарної формули вправо

254. У ревматологічному відділенні на лікуванні знаходиться хворий зі скаргами на субфебрилітет, загальну слабкість, болі в суглобах, стискаючі болі в серці. Лікар діагностував ревматичну лихоманку. Вкажіть збудника, що викликає дане захворювання:

- a. Стафілокок
- b. Бета-гемолітичний стрептокок групи C
- c. Бета-гемолітичний стрептокок групи A**
- d. Пневмокок
- e. Вірус Епштейн-Барра

255. Ви провізор аптеки. Як називається офіційний документ, що містить найменування та коди класифікаційних груп і/або об'єктів класифікації?

- a. Реєстр
- b. Кодифікатор
- c. Список
- d. Класифікатор**
- e. Каталог

256. Бромкамфору, йод, ментол, тимол, спиртові настойки, рідкі спиртові концентрати, густі екстракти зберігають у прохолодному місці, у герметично закупореній тарі з непроникних матеріалів (скла, металу, товстостінної пластмаси) при відносній вологості повітря 50-60%. До якої групи належать вказані лікарські засоби?

- a. Що потребують захисту від зниженої температури
- b. Пахучі і забарвлюючі
- c. Легколеткі (потребують захисту від випаровування)**
- d. Вибухонебезпечні
- e. Що потребують захисту від світла

257. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) $\times 1000$ /середньорічна чисельність населення - визначається:

- a. Інфекційна захворюваність
- b. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
- c. Первинна захворюваність
- d. Госпітальна захворюваність
- e. Поширеність захворювань**

258. Жінка скаржиться на біль голови, порушенням еменструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння в верхній половині тіла. Обличчя істотне червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ - 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

- a. Акромегалія
- b. Ревматична хвороба
- c. Гіпотиреоз
- d. Хвороба Іценко-Кушінга**
- e. Гіпертонічна хвороба

259. Жінка скаржиться на тупий біль у навколупупковій ділянці, здуття живота, кашкоподібні випорожнення до 4-5 разів на добу, невеличкі. Відразу після акту дефекації з'являється нудота, холодний піт, тремтіння кінцівок. Хворіє 5 років. Під час пальпації - болючість у навколупупковій ділянці. Для якого захворювання це характерно?

- a. Хронічний гастрит
- b. Хронічний холецистит
- c. Хронічний панкреатит
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Хронічний ентерит**

260. Який вид медичної допомоги є найбільш затратний в умовах ринкової економіки?

- a. Реабілітація

b. Стаціонарна

- c. Швидка медична допомога
- d. Амбулаторно-поліклінічна
- e. Санаторно-курортна

261. Кожний амбулаторно-поліклінічний заклад має свою структуру. В якому структурному підрозділі поліклініки медична сестра проводить антропометричні вимірювання?

- a. Терапевтичний кабінет
- b. Кабінет функціональної діагностики
- c. Денний стаціонар

d. Кабінет долікарського прийому

- e. Кабінет медоглядів

262. Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,9°C, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скуді зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірне?

- a. Ешеріхіоз
- b. Ротавірусна інфекція
- c. Сальмонельоз
- d. Іерсиніоз

e. Шигельоз

263. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- a. Рання неонатальна смертність
- b. Загальний показник смертності
- c. Перинатальна смертність
- d. Неонатальна смертність

e. Постнеонатальна смертність

264. За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про кількість проведених хворими ліжкоднів і кількість хворих, що вибули із стаціонару протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на підставі цих даних?

- a. Обіг ліжка
- b. Середньорічна зайнятість

c. Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі

- d. Загальна летальність
- e. Ефективність використання ліжкового фонду

265. Для аналізу у медичній статистиці використовуються графічні зображення. Які з перелічених діаграм використовуються для характеристики зміни явища за часом?

- a. Секторні
- b. Картодіаграма

c. Лінійні

- d. Внутрішньостовпкові
- e. Картограма

266. В основу поділу теорії розвитку менеджменту на етапи покладено періоди створення певних наукових шкіл управління. Хто ввів термін "наукове управління"?

a. Ф. Тейлор

- b. Г. Форд
- c. Е. Мейо
- d. Г. Гантт
- e. Я. Гілберт

267. При організації свого робочого місця слід врахувати економічні, інформаційні, ергономічні та гігієнічні вимоги. Якому освітленню надається перевага при організації робочого місця?

- a. Штучне
- b. Не має значення
- c. Люмінісцентне
- d. Природне**
- e. Змішане

268. Керівнику лікувально-профілактичного закладу під час виконання службових обов'язків доводиться мати справу з різними документами. За термінами зберігання ці документи поділяються на :

- a. Звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні
- b. Постійні, тимчасові, тривалі**
- c. Сталі, змінні
- d. Термінові, нетермінові
- e. Типові, трафаретні

269. Головний лікар ЦРЛ за важливих обставин не зміг бути присутнім на обласній конференції, але передав повноваження своєму заступнику, який взяв на себе відповідальність за виконання аної вказівки. Вкажіть законні підстави для виконання вказаної дії:

- a. Повноваження
- b. Делегування**
- c. Мотивація
- d. Керування
- e. Лідерство

270. Пацієнт скаржиться на появу сечі кольору "м'ясних ополосків", головний біль, набряки на обличчі. Три тижні тому хворів на ангіну. Об'єктивно: обличчя бліде, одутле, АТ- 145/90 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий пієлонефрит
- b. Гіпертонічна хвороба
- c. Гострий гломерулонефрит**
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Амілоїдоз нирок

271. Пацієнт поступив в пульмонологічне відділення зі скаргами на біль в правій половині грудної клітки, який посилюється під час кашлю і дихання, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, підвищення температури до 39,5°C, задишку. Вкажіть препарат, який застосовується з метою етіотропного лікування:

- a. Цефтріаксон**
- b. Аспірин
- c. Лібексин
- d. Сульфокамфокаїн
- e. Лазолван

272. В маніпуляційному кабінеті після підшкірного введення ціанокобаламіну пацієнтка відчула себе зле: з'явилися шум у вухах, відчуття духи, запаморочення. Які дії медичної сестри стосовно місця ін'єкції будуть доцільними?

- a. Застосувати міхур з льодом**
- b. Обробити спиртом
- c. Накласти грілку
- d. Накласти компрес
- e. Накласти стискаючу пов'язку

273. Пацієнта турбує ранкова скутість у дрібних суглобах кистей, постійний біль у них, який посилюється при будь-яких рухах, неможливість одягатися. Для якого захворювання це характерно?

- a. Склеродермія
- b. Ревматоїдний артрит**
- c. Деформуючий остеоартроз

- d. Ревматичний поліартрит
- e. Системний червоний вовчак

274. Під час клінічного обстеження пацієнта 33-х років виявлені скарги на біль, набряк і почервоніння шкіри. Об'єктивно: на внутрішній поверхні стегна визначається округлий інфільтрат, який дещо виступає над її поверхнею. В центрі інфільтрату є білуватий стрижень. Який діагноз можна поставити?

- a. Абсцес
- b. Гідраденіт
- c. Бешиха
- d. Фурункул**
- e. Флегмона

275. У працівника зерносховища після прибирання зерна, що гниє, виникли наступні симптоми: нездужання, гарячка, сухий кашель. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- a. Антракоз
- b. Силікатоз
- c. "Фермерська легеня"**
- d. Сидероз
- e. Азбестоз

276. Працівник, що брав участь у ліквідації пожежі в приміщенні, де зберігалось 2 кг металевої ртуті, доставлений у клініку із скаргами на емоційну нестриманість, серцебиття, пітливість, тремтіння тіла, плаксивість, біль в ділянці серця. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, у хворого стан депресії, стійкий червоний дермографізм, еретизм, нестійкий рівень АТ. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку?

- a. Тетацин кальцію
- b. Амілнітрит
- c. Дипіроксим
- d. Унітіол**
- e. Атропіну сульфат

277. Медичний працівник на дільниці проводить диспансеризацію пацієнтів. Скільки етапів включає в себе диспансеризація?

- a. 4 етапи
- b. 5 етапів
- c. 2 етапи
- d. 1 етап
- e. 3 етапи**

278. Пацієнту, який знаходиться на амбулаторному лікуванні, з приводу тимчасової непрацездатності видається документ. Як називається документ, що дає право на одержання виплат з державного соціального страхування?

- a. Студентська довідка
- b. Довідка про непрацездатність
- c. Консультаційне заключення
- d. Листок непрацездатності**
- e. Статистичний талон

279. Дівчинка, яка хворіє на епідемічний паротит, скаржиться на головний біль, шум та біль у вухах, при відкриванні рота, припухлість привушної залози. Який симптом виявиться у ротовій порожнині?

- a. Енантема на твердому піднебінні
- b. Плями Філатова-Коплика-Бельського
- c. Симптом Мурсона**
- d. "Географічний язик"
- e. "Малиновий язик"

280. Медсестра працює в перев'язувальному кабінеті хірургічного відділення. Лікар призначив пацієнту з гнійною раною застосувати протеолітичні ферменти під час наступної перев'язки. Назвіть мету їх застосування:

- a. Знеболювання
- b. Утворення лінійного рубця
- c. Зменшення температури тіла
- d. Лізис некротичних тканин**
- e. Поліпшення кровотоку тканин

281. Під час проведення проби на резус-сумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію?

- a. Несумісна по Rh-фактору**
- b. Сумісна по Rh-фактору
- c. Пробу треба переробити
- d. Резус-негативна
- e. Резус-позитивна

282. До медсестри звернулася усідка, яка тиждень тому наколола ногу на городі. До лікарня не зверталася, лікувалася вдома. Скарги на сіпаючий біль у рані, напруження м'язів. Обличчя має страждальний вираз. Що з хворою?

- a. Гнійна рана
- b. Неврит лицьового нерва
- c. Бешиха
- d. Правець**
- e. Остеомієліт

283. Ви працюєте медсестрою в онкологічному диспансері. Вкажіть, яке із захворювань прямої кишки належить до передракових станів і потребує обов'язкового диспансерного спостереження?

- a. Поліп прямої кишки**
- b. Запалення слизової прямої кишки
- c. Нориці прямої кишки
- d. Геморой
- e. Тріщини прямої кишки

284. Хірург планує провести пацієнту з пневмотораксом плевральну пункцію. Вкажіть місце оброблення операцийного поля для майбутньої пункції:

- a. II міжребер'я по середньо-ключичній лінії**
- b. VI міжребер'я по парагрудинній лінії
- c. IV міжребер'я по середньо-пахвовій лінії
- d. VII міжребер'я по лопатковій лінії
- e. VII міжребер'я по задньо-пахвовій лінії

285. Метою охорони здоров'я є зміцнення та збереження здоров'я кожної людини. Назвіть основне завдання екологічного навчання та виховання населення:

- a. Формування здорового способу життя**
- b. Розробку заходів по охороні навколишнього середовища
- c. Оптимізацію управління орою здоров'я
- d. Надання медичної допомоги на засадах ПМСД
- e. Збір статистичних даних про стан здоров'я населення

286. Існують різні форми та джерела фінансування охорони здоров'я. Назвіть основні джерела фінансування державних закладів охорони здоров'я:

- a. Бюджетні надходження, кошти від ОМС і ДМС, власні кошти громадян
- b. Кошти державного та місцевих бюджетів**
- c. Гуманітарна допомога
- d. Внутрішні ресурси, які надходять у результаті господарсько-фінансової діяльності закладів

охорони здоров'я
е. Акції, облигації, кредити

287. Медичне страхування виконує три основні функції. Який документ є гарантом соціального захисту громадян в галузі охорони здоров'я, та є носієм цих функцій?

- а. Посвідчення про сного донора
- б. Бізнес-план
- с. Паспорт
- д. Диплом про медичну освіту
- е. Медичний поліс**

288. Оплата медичних послуг - це процес фінансових розрахунків за надану допомогу. Як поділяється система оплати медичних послуг залежно від часу?

- а. Стратегічна та оперативна
- б. Проспективна та короткотривала
- с. Довготривала, середньотривала та короткотривала
- д. Ретроспективна та проспективна**
- е. Оперативна та проспективна

289. Ціна має багато функцій. Яка із функцій ціни мотивує підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості?

- а. Стимулююча**
- б. Розподільча
- с. Порівняльна
- д. Регулююча
- е. Обліково-вимірювальна

290. Пацієнт поскаржився на часті запаморочення та втрату свідомості при фізичних навантаженнях. В анамнезі - ревматична хвороба впродовж 23-х років. При об'єктивному обстеженні виявлено блідість шкірних покривів, пульсацію сонних артерій та похитування голови в такт пульсу. Для якої вади серця характерні дані симптоми?

- а. Недостатність трьохствулкового клапану
- б. Недостатність клапанів аорти**
- с. Стеноз мітрального отвору
- д. Тетрада Фалло
- е. Недостатність мітрального клапану

291. Пацієнтка тривалий час скаржиться на нудоту, блювання, гіркоту у роті, тяжкість в правому підребер'ї, особливо після вживання жирної їжі. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий у точці жовчного міхура. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

- а. Хронічний холецистит**
- б. Виразкова хвороба
- с. Хронічний панкреатит
- д. Хронічний гепатит
- е. Жовчнокам'яна хвороба

292. У пацієнта два тижні тому з'явилися кашель з виділенням харкотиння з неприємним запахом, підвищення температури тіла до 38°C. Об'єктивно: стан пацієнта тяжкий, ЧД- 24/хв. Рентгенологічно: в лівій легені виявлено порожнину до 3 см в діаметрі з горизонтальним рівнем рідини. Який найімовірніший діагноз?

- а. -
- б. Абсцес легені**
- с. Екссудативний плеврит
- д. Пневмонія
- е. Інфільтративний туберкульоз

293. Проводячи "п'ятихвилинку", старша медична сестра хірургічного відділення, прагне

підкорити весь колектив своїй волі, не сприймає заперечень і не прислухається до думки інших, вимагає пунктуального виконання своїх вказівок. Який тип поведінки характерний даному керівникові?

a. Авторитарний тип

b. Песимістичний тип

c. Соціалістичний тип

d. Ліберальний тип

e. Демократичний тип

294. Ви - головна медична сестра. Поясніть старшій медичній сестрі, як називається документ, який складається за вказівкою голови чи керівника колегіального органу або самостійно в межах його повноважень з оперативних питань, не потребує колегіального рішення:

a. Наказ

b. Рішення

c. Розпорядження

d. Протокол

e. Довідка

295. Існує інформація про наявність чен для автоматизованих ідентифікацій та обліку даних про товар, закодована у вигляді цифр і штрихів. Як вона називається?

a. Символічна

b. Словесна

c. Кодова

d. Штрихова

e. Образотворча

296. У здорової новонародженої дитини виявлені наступні показники периферичної крові: еритроцити - $6,0 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 150 г/л, лейкоцити - $15 \cdot 10^9/л$, нейтрофіли - 45%, лімфоцити - 43%. Для якого віку характерні такі показники периферичної крові?

a. Двадцятий день життя

b. Тридцятий день життя

c. Перший день життя

d. Десятий день життя

e. П'ятий день життя

297. Дитина 5-ти років хворіє близько двох тижнів, скаржиться на гнійно-кров'янисті виділення з носа, мацерації крил носа та верхньої губи. При риноскопії на носовій перетинці білісують острівці. Слизова ротоглотки не змінена. Клінічна картина дозволяє запідозрити:

a. Фарингіт

b. Дифтерію носа

c. Риновірусну інфекцію

d. Алергічний риніт

e. Аденовірусну інфекцію

298. Дитині 6 місяців, знаходиться на штучному вигодовуванні коров'ячим молоком. Під час огляду медична сестра-бакалавр виявила у дитини гіпотрофію I ступеня. Який перший прикорм найбільш бажаний для цієї дитини?

a. М'ясне пюре

b. Кисло-молочний сир

c. Овочеве пюре

d. Фруктове пюре

e. Молочні каші

299. Медична сестра-бакалавр прийшла на патронаж до дитини першого року життя. Об'єктивно: дитина добре утримує голівку у вертикальному положенні, доторкається до предметів, посміхається, спостерігається позитивна емоційна реакція на матір. Якому віку відповідає психомоторний розвиток дитини?

a. 2 місяці

b. 1 місяць

c. 3 місяці

d. 2 тижні

e. 3 тижні

300. Пацієнт 34-х років поступив у відділення з ознаками бронхіту. Упродовж 5-ти років працює в шахті, де добувають залізну руду. Який різновид пневмоконіозу в нього може виникнути?

a. Сидероз

b. Антракоз

c. Бериліоз

d. Бісиноз

e. Азбестоз

301. У хворого вібраційна хвороба від локального впливу вібрації I ст., периферичний ангіоспастичний синдром. Який з перелічених медикаментозних засобів доцільно використовувати для лікування?

a. Гормональні препарати (кортикостероїди)

b. Тромболітики

c. Судинорозширювальні

d. Антибіотики

e. Заспокійливі

302. Дитині 7 років. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, блювання, підвищення t° тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Живіт здутий, болючий при пальпації, в лівій здухвинній ділянці. Випорожнення до 10 раз на добу з домішками слизу та крові. Для якого захворювання це характерно?

a. Холера

b. Сальмонельоз

c. Дизентерія

d. Ешерихіоз

e. Харчова токсикоінфекція

303. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

a. Еритроцитурія

b. Лейкоцитурія

c. Поява "активних лейкоцитів"

d. Протеїнурія

e. Зрушення pH сечі в лужну сторону

304. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидку втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабанних паличок", кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість?

a. Капіляроскопія

b. Холодова проба

c. Алгезиметрія

d. Палестезіометрія

e. Проба на реактивну гіперемію

305. Дитині 12-ть місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сухого кашлю підвищення t° тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота ціаноз. Під час дихання спостерігається втягіння міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

a. ЕКГ

б. УЗД

с. Рентгенологічне

д. Біохімічне дослідження крові

е. Аналіз сечі по Зимницькому

306. Пацієнт 60-ти років з діагнозом "ІХС: гострий коронарний синдром". Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудниною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів слід застосувати для корекції гемодинаміки?

а. Корглікон

б. Строфантин

с. Атропін

д. Дофамін

е. Ефедрин

307. "Сонячний удар" - форма перегрівання, зумовлена впливом сонячних променів на незахищену голову за відсутності загального перегрівання організму. До симптомів "сонячного удару" належать:

а. Сухість шкірних покривів, болі в животі, загальна слабкість

б. Галюцинації, загальна слабкість, запаморочення

с. Носові кровотечі, блювання

д. Загальна слабкість, запаморочення, блювання, епілептоформні напади

е. Гіперемія шкіри, ослаблення пульсації, запаморочення

308. Пацієнт 45-ти років знаходиться на лікуванні в психіатричному відділенні. Хворий сидить на ліжку, відмовляється встати, загальмований, відповідає тихим сумним голосом. При розмові хворого з медичною сестрою стверджує, що "марно прожив життя", "нічого доброго не зробив", "немає більше для чого жити". Часто плаче, просить позбавити його життя. Який психічний розлад може виявити медична сестра у хворого?

а. Параноїдне маячіння

б. Маніакальний синдром

с. Депресивний синдром

д. Гебефренічне збудження

е. Кататонічне збудження

309. Медичну сестру аграрного господарства викликали до пацієнта - працівника складу отрутохімікатів, у якого вона виявила ознаки гострого отруєння ртутьорганічними пестицидами. Який препарат для знешкодження ртуті слід ввести насамперед?

а. Атропін сульфат

б. Унітіол

с. Преднізолон

д. Пірацетам

е. Аскорбінова кислота

310. Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. У відділення поступив пацієнт з діагнозом "Свинцева коліка". Який лікарський засіб потрібно ввести в першу чергу при наданні невідкладної допомоги з метою зв'язування свинцю?

а. Аскорбінова кислота

б. Анальгін

с. Ноотропіл

д. Тетацин кальцію

е. Ацетилсаліцилова кислота

311. У пацієнта непропорційне збільшення носа, губ, підборіддя, кистей рук, ступнів. Скаржиться на головний біль, запаморочення, біль у суглобах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення розмірів "турецького сидла", витончення його стінок. Вказані ознаки характерні для:

а. Стівурового енцефаліту

б. Акромегалії

с. Гігантизму

д. Хвороби Іценка-Кушінга

е. Пухлини наднирика

312. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ170/100 мм рт.ст., Рс- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

а. Аналіз сечі за Нечипоренком

б. Аналіз сечі за Зимницьким

с. Аналіз сечі на діастазу

д. Загальний аналіз крові

е. Аналіз сечі на глюкозу

313. Хвора 24-х років скаржиться на біль у суглобах нижніх кінцівок, який посилюється при незначних рухах, неприємні відчуття і біль у ділянці серця, задишку, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,8°C. Захворіла через 2 тижні після перенесеної ангіни. Об'єктивно: тони серця приглушені, м'який систолічний шум на верхівці серця. Правий колінний суглоб припухлий, шкіра над ним червона, гаряча на дотик. У крові: лейкоц.- 9, 9 · 10⁹/л, ШОЕ- 28 мм/год., Нb- 105 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Ревматична хвороба

б. Ревматоїдний артрит

с. Інфекційно-алергічний міокардит

д. Кардіосклероз

е. Стенокардія

314. Хвора скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, блювання. Хворіє понад 5-ть років. Під час огляду: хвора збуджена, шкіра волога, язик обкладений білим нальотом. Живіт здутий, болючий в правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Який діагноз у хворої?

а. Загострення хронічного холециститу

б. Гострий гастрит

с. Синдром подразненого кишечника

д. Загострення панкреатиту

е. Виразкова хвороба

315. Хворий скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий більше в епігастрії та лівому підребер'ї. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

а. Загальний аналіз сечі

б. Копрограма

с. Аналіз калу на приховану кров

д. Аналіз сечі та крові на діастазу

е. Аналіз крові на глюкозу

316. У дитини 7-ми років після споживання чіпсів з'явилися нудота, блювота, біль у животі. Ацетон сечі (++) . Про який стан можна думати ?

а. Виразкова хвороба шлунку

б. Ацетонемічний синдром

с. Гастрит

д. Хронічний розлад живлення

е. Дуоденіт

317. Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни

спостерігаються у разі кашлюку?

- a. Лімфоцитоз
- b. Нейтрофіліоз
- c. Тромбоцитопенія
- d. Еозинофілія
- e. Анемія

318. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- a. Загальний аналіз крові
- b. Кров на діастазу
- c. Кров на визначення рівня холестерину
- d. УЗД органів черевної порожнини
- e. Загальний аналіз сечі

319. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- a. Цитратний шок
- b. Анафілактична реакція
- c. Пірогенна реакція
- d. Септичний шок
- e. Гемолітична реакція

320. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72-х років. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його, і дізналась, що пацієнт перебільшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

- a. Дисимуляція
- b. Симуляція
- c. Агравация
- d. Апеляція
- e. Атаксія

321. Машиною швидкої допомоги в клініку доставлено пацієнта з попереднім діагнозом: виразкова хвороба шлунка, перфорація виразки. Який характер болю у пацієнта при цій патології?

- a. "Кинджальний"
- b. Пекучий
- c. Оперізуючий
- d. Колька
- e. Тиснучий

322. У пацієнта відмічаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

- a. Дискінезія жовчовивідних шляхів
- b. Виразкова хвороба шлунка
- c. Гастрит
- d. Жовчнокам'яна хвороба
- e. Езофагіт

323. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

- a. Загальний аналіз сечі
- b. Дослідження сечі за методом Нечипоренка

- с. Визначення протеїнурії
- д. Визначення креатиніну
- е. Проба за Зимницьким

324. Під час обстеження пацієнта бригадою швидкої допомоги виявлено: він сидить, не змінюючи пози (зі слів родичів багато годин), на запитання відповідає повільно, після паузи окремими словами; самотійно не їсть. Який ступінь пригнічення психічної активності?

а. Ступор

- б. Кома
- с. Сомнолентність
- д. Обнубіляція
- е. Сопор

325. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

а. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

б. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька

- с. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- д. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- е. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька

326. Ви - старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулася медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

а. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд

б. Посадовий оклад, тарифна ставка

с. Тарифна система та нормування праці

- д. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- е. Посадовий оклад, тарифна ставка

327. Ви - головна медична сестра. Готуєте доповідь "Групи інвалідності". Для II групи інвалідності характерно:

а. Наявність функціональних порушень, але ця особа не потребує сторонньої допомоги

- б. Постійна втрата працездатності, потребує стороннього догляду
- с. Захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та венеричні хвороби
- д. Наявність ознак ГРВІ чи грипу
- е. Наявність вроджених фізичних вад, потребує стороннього догляду

328. Через 10-ть днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулася до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, $t^{\circ}37,4^{\circ}\text{C}$, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

- а. Кардіологічне
- б. Інфекційне
- с. Терапевтичне
- д. Урологічне

е. Нефрологічне

329. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- а. Фенобарбітал
- б. Адреналін
- с. Еуфілін
- д. Мезатон

е. Кордіамін

330. У водолаза, що працює на глибині біля 10 м, більше ніж 20 хвилин виникли загальна слабкість, біль у вухах, суглобах і м'язах, сонливість, дихання поверхневе, часте, втрата

свідомості. Яка хвороба виникла у водолаза?

- a. Нейроциркуляторна дистонія
- b. Кесонна хвороба**
- c. IXС
- d. Висотна хвороба
- e. Гіпертензивний криз

331. Дитина 10-ти місяців неспокійна, перелякана. Шкіра бліда, ціанотичні кінцівки, дихання шумне, часте, з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападоподібний, голос втратив гучність. Яке захворювання у дитини?

- a. Гострий фарингіт
- b. Гострий стенозуючий ларингіт**
- c. Приступ бронхіальної астми
- d. Гостра пневмонія
- e. Гострий бронхіт

332. У перші місяці життя малюк, народжений ВІЛ-інфікованою матір'ю, буде мати позитивний аналіз крові на ВІЛ. До якого терміну життя встановлюється статус ВІЛ-інфікованості?

- a. До 24 місяців
- b. До 18 місяців**
- c. До 6 місяців
- d. До 12 місяців
- e. До 3 місяців

333. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- a. Вартість медичних послуг**
- b. Загальні та відносні витрати
- c. Показники повторних купівель
- d. Імовірні стратегії конкурентів
- e. Співвідношення збуту й цін

334. При постачанні товарів аптечного асортименту основним юридичним документом, який визначає права і обов'язки, як фармацевтичної фірми так і лікувальної установи, є:

- a. Специфікація
- b. Договір (контракт)**
- c. Акти на списання
- d. Сертифікат якості
- e. Протокол розбіжностей

335. Медична сестра по дорозі на роботу впала. Наприкінці робочого дня їй стало погано і за порадою лікарів вона прийняла відповідні ліки. Вночі стан її погіршився і була викликана швидка допомога. Другий день вона працювала. На третій день після падіння на дім був викликаний сімейний лікар. З якого дня вона отримає лікарняний?

- a. На 3-й день після падіння, в день виклику сімейного лікаря**
- b. З моменту виклику швидкої допомоги
- c. В перший день, коли звернулась до лікарів на роботі
- d. В перші три дні вона отримає довідку, а потім лікарняний листок
- e. В день падіння

336. Після автомобільної катастрофи хворий 1 місяць у стаціонарі та 2 місяці амбулаторно лікувався. Через 1,5 місяця стан його погіршився і в тяжкому стані він поступив в стаціонар, де лікувався 2 місяці. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

- a. Вихід на роботу
- b. Організація стаціонара на дому
- c. Продовжити лікування в амбулаторних умовах
- d. Переведення на інвалідність по трудовому каліцтву
- e. Переведення на загальну інвалідність**

337. Пацієнту 3 роки. Відвідує ДДЗ. Скарги на кашель, нежить, світлобоязнь, слинотечу, підвищення температури тіла до 38°C, кволість. Хворіє третю добу. Об'єктивно: на слизовій щік проти малих кутніх зубів дрібні плями розміром з макове зерно, оточені червоним вінчиком. Дитині був встановлений діагноз: "Кір". Визначте, в якому періоді хвороби перебуває дитина на підставі перерахованих проблем?

- a. Період висипу
- b. Інкубаційний період
- c. Катаральний період**
- d. Період пігментації
- e. Період видужування

338. Новонароджена дівчинка народилася від других пологів при терміні гестації 22 тижні, з масою тіла 1000 г, довжиною тіла - 40 см. Згідно листка лікарських призначень з метою профілактики рахіту планується введення наступного препарату:

- a. Відехол**
- b. Феррокаль
- c. Софрадекс
- d. Афлубін
- e. Супрастин

339. Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація та проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

- a. Одномоментна
- b. Цільова
- c. Попередня
- d. Облікова

e. Поточна

340. Ви досліджували захворюваність медичних сестер на гострі респіраторні вірусні інфекції. З висновками необхідно ознайомити медичний персонал відділення. Що необхідно написати?

- a. Виписки
- b. Резюме**
- c. Анотація
- d. Тези
- e. Конспект

341. У новонародженої доношеної дитини виражена інтоксикація, на шкірі з'явилися великі пухирі (2-3 см у діаметрі), які швидко збільшуються. Пухирі з каламутним вмістом, деякі лопаються, залишаючи ерозивну поверхню. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Псевдофурункульоз
- b. Везикулопустульоз
- c. Пухирчатка новонароджених**
- d. Фурункульоз
- e. Герпес-інфекція

342. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 міс., з генералізованими судомами та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

- a. Рахіт, гострий період. Судоми
- b. Спазмофілія, ларингоспазм
- c. Спазмофілія. Судоми**
- d. Гіпервітаміноз D. Судоми
- e. Рахіт залишкових явищ

343. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести протисудомний препарат у

дозі:

- a. 0,5% діазепам 2 мл
- b. 0,5% діазепам 0,2 мл
- c. 0,5% сибазон 0,5 мл
- d. 0,5% седуксен 0,5 мл
- e. 0,5% сибазон 0,8 мл**

344. Оральна регідратація проводиться дитині з кишковим токсикозом та вододефіцитним ексікозом. Рідину у вигляді 5% розчину глюкози, регідрону, ораліту дають дитині пити:

- a. По 50 мл через 2 години
- b. По 10 мл кожні 10-15 хвилин**
- c. По 10 мл через 30 хвилин
- d. По 20 мл кожну годину
- e. По 50 мл кожну годину

345. Дівчинка 6-ти років скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та біль у животі. На нижніх кінцівках над поверхнею м'язів-розгиначів симетрично з'явилися елементи геморагічного висипу. У дитини стан тяжкий, що передбачає введення антикоагулянтів прямої дії, а саме:

- a. Аскорутин
- b. Вольтарен
- c. Контрикал
- d. Дипіридамол
- e. Гепарин**

346. Новонародженій дитині, яка перебуває у відділенні патології новонароджених з діагнозом вродженої пневмонії, внутрішньовенно 2 рази на добу вводиться антибіотик пеніцилінового ряду, захищений клавулановою кислотою, а саме:

- a. Ампіокс
- b. Амікацин
- c. Амоксицилін
- d. Ампіцилін
- e. Амоксиклав**

347. Виконуючи медсестринське обстеження пацієнта, медична сестра повинна пам'ятати, що загальний огляд хворого починають з визначення:

- a. Конституції
- b. Кольору шкіри
- c. Свідомості
- d. Положення в ліжку
- e. Загального стану**

348. Пацієнта турбує біль, який супроводжується шумом тертя перикарда, виникає одночасно з підвищенням температури тіла, без іррадіації і зменшується при положенні тіла з нахилом вперед. Такий біль характерний для:

- a. Гострого сухого перикардиту**
- b. Кардіосклерозу
- c. Міозиту
- d. Спонтанного пневмотораксу
- e. Тромбоемболії легеневої артерії

349. У хворого порушення серцевого ритму, при якому протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

- a. Миготлива аритмія**
- b. Синусова тахікардія
- c. Атріовентрикулярна блокада
- d. Синусова аритмія

е. Пароксизмальна тахікардія

350. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- а. Лапароцентез
- б. Колоноскопія
- с. УЗД
- д. Іригоскопія

е. Оглядова рентгенографія

351. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається крепітація та патологічна рухливість. Рс- 112/хв., АТ80/45 мм рт.ст. Стан пацієнта відповідає:

- а. Шок I ступеня
- б. Шок III ступеня
- с. Передагонія

д. Шок II ступеня

е. Шок IV ступеня

352. Сімейна медсестра викликана до 4річного хлопчика, який при купанні протягом 4-х хвилин знаходився під водою. Відсутній пульс на сонній артерії та дихання, виражений ціаноз шкірних покривів. З чого слід почати дії?

а. Видалити воду з верхніх дихальних шляхів

- б. Провести масаж серця
- с. Заспокоїти матір
- д. Дати вдихнути нашатирний спирт
- е. Викликати швидку допомогу

353. В амбулаторію сімейного лікаря звернулася жінка зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання. При обстеженні позитивний симптом Воскресенського, Ровзінга, Щоткіна. Яку патологію слід запідозрити?

- а. Гострий панкреатит
- б. Жовчнокам'яна хвороба
- с. Хронічний панкреатит

д. Гострий апендицит

е. Гострий холецистит

354. Хворий 65-ти років, який страждає протягом 10-ти років на хронічний ларингіт, скаржиться на зміну голосу, охриплість, біль. За останні два місяці схуд на 10 кг. Це патологія характерна для такого стану пацієнта:

а. Рак шлунка

б. Рак гортані

- с. Рак щитоподібної залози
- д. Рак стравоходу
- е. Зоб ендемічний

355. У пацієнта 45-ти років побутова рана на лівій гомілці, отримана 2 дні тому. В ділянці рани виявляється набряк, почервоніння, підвищення температури тканини, посилення болю, порушення функції пошкодженої кінцівки. Рана знаходиться за класифікацією М.І. Кузіна і Б.М. Костюченко в фазі:

- а. Фаза дегідратації
- б. Фаза запалення, період нагноєння рани
- с. Фаза запалення, період очищення рани

d. Фаза регенерації і формування грануляцій

e. Фаза запалення, період судинних змін

356. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на біль, який виник після фізичного навантаження. Біль іррадіює у пахвинну ділянку. Хвора збуджена, не знаходить собі місця від болю, кричить. Біль супроводжується нудотою, блюванням, затримкою газів та випорожнень. При обстеженні пацієнтки відмічається болючість у ділянці лівої нирки, позитивний симптом Пастернацького. Перша невідкладна допомога в даному випадку складається з:

a. Заспокоїти хвору, холод на поперек

b. Призначення спазмолітиків, гарячої ванни

c. Призначення прийому рідини, гарячої ванни

d. Літотрипсія, грілка на поперек

e. Призначення антибіотиків та спазмолітиків

357. Ви - медична сестра дитячого пульмонологічного відділення. На лікуванні знаходиться дитина 10-ти років з бронхіальною астмою. Приступів ядухи не спостерігається. Здійснюючи медсестринський процес в період між приступами ядухи необхідно проводити терапію протизапальними та протиалергійними препаратами. Виберіть необхідний препарат:

a. Димедрол

b. Беротек

c. Серетид

d. Сальбутамол

e. Інтал

358. Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовтобілого кольору обмежені нашарування. Перераховані симптоми вказують на:

a. Фолікулярна ангіна

b. Гостра респіраторна вірусна інфекція

c. Дифтерія зівя

d. Лакунарна ангіна

e. Катаральна ангіна

359. Впродовж двох тижнів дитину 3-х років турбував сухий кашель, незначні виділення з носа. Стан дитини погіршився, кашель набув спазматичного характеру. Напади кашлю закінчуються блюванням. Запідозрено кашлюк. Критеріями легкої форми захворювання є:

a. Частота нападів кашлю - 1-2 на добу, репризів немає

b. Частота нападів кашлю - до 15 на добу, репризів до 5

c. Частота нападів кашлю - більше 25 на добу, репризів більше 10

d. Частота нападів кашлю - до 25 на добу, репризів до 10

e. Напади закінчуються блюванням, крововиливом в слизові, носові кровотечі

360. Диспансерні контингенти населення підлягають періодичним профілактичним оглядам, програми яких передбачають такі дослідження: аналіз крові, аналіз сечі на глюкозу, аналіз сечі на білок, флюорографію. Назвіть віковий термін проведення даної програми?

a. З 12 років 1 раз на 2 роки

b. З 12 років 1 раз на 1 рік

c. З 14 років 2 рази на 1 рік

d. З 14 років 1 раз на 2 роки

e. З 7 років 1 раз на 2 роки

361. Документ, який засвідчує право на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного періоду за умови виконання вказаних умов - це:

a. Ліцензія

b. Патент

c. Довідка

d. Дозвіл

e. Сертифікат

362. На який максимальний термін при безперервному захворюванні надається лікарняний лист хворому, що лікується в медичному закладі до визначення йому інвалідності?

a. 4 місяці

b. 2 місяці

c. 5 місяців

d. 3 місяці

e. 1 місяць

363. Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечовипускання було 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Вульвовагініт

b. Сечокислий інфаркт нирок

c. Пієлонефрит

d. Статевий криз

e. Гломерулонефрит

364. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Флегмона правої гомілки

b. Перелом правого колінного суглоба

c. Гострий артрит колінного суглоба

d. Гострий гематогенний остеомієліт

e. Вивих правого колінного суглоба

365. До хірургічного кабінету поліклініки звернувся пацієнт 39-ти років зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну, підвищення температури тіла до 39,5°C. На задній поверхні шиї в ділянці потилиці - інфільтрат червоного кольору, в центрі якого кілька гнійних стрижнів. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Карбункул

b. Флегмона

c. Лімфангіт

d. Абсцес

e. Фурункул

366. В хірургічному відділенні знаходиться хворий 36-ти років у важкому стані. Скарги на загальну слабкість, безсоння, надсадний кашель. Об'єктивно температура тіла - 39,7°C, тахіпное. На 9 добу у хворого на фоні частого кашлю виділилось близько 600 мл гнійного харкотиння. Стан пацієнта дещо покращився. Про яке захворювання йдеться?

a. Емпієма плеври

b. Туберкульоз легень

c. Пневмонія

d. Плеврит

e. Абсцес легень

367. Після закінчення медичного коледжу Ви влаштувались на роботу в хірургічне відділення на посаду операційної медсестри. Вкажіть антисептичний розчин для передопераційної обробки рук за методом Спасокукоцького-Кочергіна:

a. 85% розчин мурашиної кислоти

b. 3% розчин перекису водню

c. 0,5% розчин аміаку

d. 1% розчин хлоргексидину біглюконату

e. 5% розчин діюциду

368. На місце маніпуляційної медичної сестри опікового відділення прийнято нову співробітницю. Старша медична сестра зазначеного відділення ознайомила нову працівницю з коротким письмовим викладом її основних прав та обов'язків на робочому місці. Визначте вид даного документу:

- a. Розпорядження
- b. Пояснювальна записка
- c. Доповідна записка
- d. Посадова інструкція**
- e. Наказ

369. Причинами смертності населення є: 1) хвороби системи кровообігу, 2) травми та отруєння, 3) новоутворення, 4) СНІД, 5) хвороби органів дихання. Яка з перерахованих причин займає перше рангове місце в структурі причин смерті населення розвинених країн?

- a. 2
- b. 4
- c. 5
- d. 1**
- e. 3

370. За результатами акредитації обласній клінічній лікарні присвоєно вищу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?

- a. 75-80
- b. 81-91
- c. 92-100**
- d. 74-70
- e. 69-50

371. На сільській лікарській дільниці проводяться флюорографічні обстеження населення. До якого виду медичного огляду належать ці обстеження?

- a. Комплексний
- b. Миттєвий
- c. Попередній
- d. Періодичний
- e. Цільовий**

372. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільшінформативним для постановки діагнозу?

- a. Оглядовий знімок грудної клітки
- b. Оглядовий знімок черевної порожнини
- c. Зняття ЕКГ
- d. Загальний аналіз крові
- e. Визначення амілази крові**

373. Ви - медсестра кардіологічного відділення. Скільки разів на день слід проводити провітрювання палат?

- a. Не менше 3 разів
- b. Не менше 1-2 разів
- c. Не менше 1 разу
- d. Не менше 2 разів
- e. Не менше 4 разів**

374. Ви - медична сестра відділення реанімації. Як часто слід змінювати халати, шапочки і маски?

- a. 2 рази на тиждень
- b. 2 рази на місяць
- c. 2 рази на день
- d. Щотижня

е. Щоденно

375. Ви - старша медична сестра приймального відділення. Як часто обстежується медичний персонал відділення на носійство патогенного стафілокока?

- a. 2 рази в квартал
- b. 1 раз на рік
- c. 1 раз в тиждень
- d. 1 раз в місяць

е. 1 раз в квартал

376. Ви - старша медична сестра пологового будинку. Згідно якого Наказу здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?

- a. 620
- b. 408
- c. 167

d. 234

- e. 503

377. При обстеженні пацієнта на хронічний гепатит виявлено ендокринні порушення - гінекомастія, атрофія яєчок, випадіння волосся в пахвових ямках, на лобку. Для якого синдрому це характерно?

- a. Імунного запалення
- b. Біліарної дискінезії

c. Печінково-клітинної недостатності

- d. Демпінг-синдрому
- e. Астеновегетативного

378. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до РАЦСу для реєстрації народження дитини?

- a. Журнал запису пологів в стаціонарі
- b. Довідка пологового будинку про народження дитини

c. Медичне свідоцтво про народження дитини

- d. Свідоцтво про народження дитини
- e. Карта розвитку новонародженого

379. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна охарактеризувати дану ситуацію?

- a. Народжуваність
- b. Загальна смертність

c. Перинатальна смертність

- d. Смертність при народженні
- e. Шлюбна плідність

380. Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого статистичного документу розраховані ці дані?

- a. Листок руху хворих по стаціонару
- b. Щоденник роботи лікаря
- c. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

d. Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

- e. Історія хвороби

381. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

- a. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"

б. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

с. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

д. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"

е. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з позначкою "6+"

382. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

а. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

б. Контрольна карта диспансерного спостереження

с. Медична карта стаціонарного хворого

д. Талон амбулаторного пацієнта

е. Медична карта амбулаторного хворого

383. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) $\times 1000$ /середньорічна чисельність населення - визначається:

а. Госпітальна захворюваність

б. Первинна захворюваність

с. Поширеність захворювань

д. Інфекційна захворюваність

е. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

384. До якого рівня належить медична допомога, що передбачає консультацію лікаря загальної практики, діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів?

а. Третинний рівень надання медичної допомоги

б. Вторинний рівень надання медичної допомоги

с. Первинний рівень надання медичної допомоги

д. Четвертинний рівень надання медичної допомоги

е. -

385. Ви - медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини. До Вас звернулися за довідкою про тимчасову непрацездатність. В яких випадках і кому видається довідка встановленої форми?

а. В зв'язку з протезуванням в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства

б. В зв'язку з вагітністю та пологами

с. Учні всіх категорій, студентам вузів і технікумів

д. При направленні на санаторнокурортне лікування

е. В зв'язку з захворюванням працівника

386. У чоловіка виявлено задишку з утрудненим видихом. Шкіра обличчя, губи ціанотичного кольору. Вдих глибокий, видих тривалий. Грудна клітка діжкоподібна, перкуторно - коробковий звук над легеньми. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Яке захворювання можна запідозрити?

а. Пневмосклероз

б. Туберкульоз

с. Рак легенів

д. Емфізема легенів

е. Бронхіт

387. При обробці поля в шлунок тракториста потрапили фосфорорганічні сполуки. Які речовини необхідно використати медичній сестрі при наданні першої допомоги постраждалому під час промивання шлунку для інактивації отрути в шлунку?

а. Молоко

б. 2% розчин двовуглекислої соди, активоване вугілля

с. Розчин фурациліну

д. Переварена вода

е. Рослинна олія

388. Для покращення надання медичної допомоги дітям у загальноосвітніх школах передбачена посада медичної сестри. Яка кількість учнів школи припадає на одну посаду медсестри?

- а. 500 учнів
- б. 800 учнів
- с. 900 учнів
- д. 700 учнів**
- е. 600 учнів

389. Старша медична сестра провела інструктаж з медсестрами про терміни придатності лікарських засобів з обмеженим строком. Такі засоби можуть зберігатися:

- а. До 1 місяця
- б. До 3-х років**
- с. До 1 року
- д. Понад 3-х років
- е. До 3-х місяців

390. Хворий лікується в умовах домашнього стаціонару з приводу позагоспітальної пневмонії. На 7-му добу стан погіршився: з'явився біль у грудній клітці, який посилюється при сухому кашлі та русі. Яке найбільш ймовірне ускладнення?

- а. Гострий бронхіт
- б. Туберкульоз легенів
- с. Плеврит**
- д. Абсцес легенів
- е. Бронхоектатична хвороба

391. Рідкі лікарські засоби на своїй тарі мають етикетки. Як називається різновид етикеток, які мають особливу форму і наклеюються на шийку пляшки з різними рідинами?

- а. Контрольні стрічки
- б. Ярлики
- с. Бірки
- д. Вкладиші
- е. Кольєретки**

392. Ткаля із тривалим стажем роботи скаржиться на кашель, задишку, періодичні болі в грудній клітині. Назвіть професійне захворювання, яке виникає при тривалому вдиханні пилу бавовни:

- а. Сидероз
- б. Азбестоз
- с. Силікоз
- д. Бісиноз**
- е. Антракоз

393. До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), відноситься:

- а. Хронічний панкреатит
- б. Цироз печінки**
- с. Хронічний гастрит
- д. Гіпертонічна хвороба I стадії
- е. Нирковокам'яна хвороба

394. Медична сестра-бакалавр аналізує план лікування для хворого з забоєм головного мозку. За призначенням лікаря вона повинна приготувати 40% розчин глюкози, 25% розчин сульфату магнію, діуретичні засоби. З якою метою призначаються ці лікарські засоби?

- а. Дезінтоксикація організму

- b. Зупинка кровотечі
- c. Підвищення імунітету
- d. Поповнення ОЦК

e. Дегідратація мозку

395. У хлопчика 2-х років захворювання почалося з незначних катаральний явищ з боку верхніх дихальних шляхів, підвищення температури тіла до 37,8°C. На 10-й день хвороби кашель набув нападоподібного характеру, іноді супроводжується блюванням. Температура тіла - нормальна. У загальному аналізі крові відмічається лейкоцитоз, лімфоцитоз, нормальна швидкість осідання еритроцитів. Про яке захворювання слід подумати?

a. Кашлюк

- b. Бронхіальна астма
- c. ГРВІ
- d. Плеврит
- e. Пневмонія

396. Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,9°C, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірно?

- a. Ешеріхіоз
- b. Ротавірусна інфекція
- c. Сальмонельоз
- d. Іерсиніоз

e. Шигельоз

397. При проведенні профілактичного огляду дитини 11-ти місяців у сімейній амбулаторії медсестра звернула увагу на блідість шкіри та слизових оболонок. З анамнезу стало відомо, що дитина виключно на грудному вигодовуванні, прикормів не отримує. До якого лабораторного дослідження треба підготувати дитину для встановлення діагнозу?

- a. Печінкові проби
- b. Кров на ревмокомплекс
- c. Загальний аналіз сечі
- d. Копрограма

e. Загальний аналіз крові

398. Ви - дитяча медсестра перинатального центру. Якою вакциною Ви будете проводити щеплення недоношеній новонародженій дитині з масою 2100 г на 3-й день життя?

a. АаКДП

b. БЦЖ-М

- c. "Інжерікс"
- d. БЦЖ
- e. АКДП

399. На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну складає 300 мкмоль/л за рахунок непрямой фракції. Група крові дитини - В (III) Rh(+), у матері - кров групи 0(I) Rh(+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?

- a. Вроджений гепатит
- b. Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором

c. Гемолітична хвороба новонароджених за системою АВ0

- d. Атрезія жовчовивідних протоків
- e. Кон'югаційна жовтяниця

400. У дитячій поліклініці було проведено статистичне дослідження захворюваності дітей, які звернулися до дитячої поліклініки протягом року. Розподіл досліджуваної групи проводили за віком та статтю. Який вид таблиць доцільно використати для зведення отриманих даних?

- a. Групова
- b. Комбінована

- c. Проста
- d. Складна

e. Комбінаційна

401. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- a. Перинатальна смертність
- b. Рання неонатальна смертність
- c. Загальний показник смертності

d. Постнеонатальна смертність

e. Неонатальна смертність

402. Пацієнтка 50-ти років звернулась в лікувальний заклад зі скаргами на підвищення температури тіла, втрату апетиту, артралгію, біль в серці, еритематозну висипку на обличчі у вигляді "метелика". Які лабораторні показники є найбільш діагностично інформативні?

- a. ШОЕ
- b. С-реактивний білок
- c. Ревматоїдний фактор

d. LE-клітини

e. Гемоглобін

403. У пацієнта проктологічного відділення 34-х років виявлено скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з калом протягом одного тижня. Виберіть метод дослідження, інформативний для встановлення діагнозу:

- a. Рентгеноскопія
- b. Гастроскопія
- c. Фіброгастроезофагоскопія

d. Ректороманоскопія

e. Ультразвукове обстеження

404. Під час клінічного обстеження пацієнта 63-х років виявлено: стан важкий, шкіра бліда, Ps-125/хв., АТ- 80/55 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений. При пальпації живіт м'який, болючий в навколупупковій ділянці. Позитивний симптом Валя, шум плеску. Який попередній діагноз?

- a. Гострий панкреатит
- b. Гострий холецистит

c. Кишкова непрохідність

- d. Ниркова колька
- e. Гострий апендицит

405. В приймальне відділення поступив пацієнт 76-ти років зі скаргами на утруднене сечовиділення. Він відмітив, що сеча стала виділятися тонким струменем, іноді краплями. Почало турбувати часте сечовипускання вночі. Який попередній діагноз?

a. Аденома передміхурової залози

- b. Хронічний простатит
- c. Сечокам'яна хвороба
- d. Туберкульоз сечового міхура
- e. Гострий простатит

406. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темнокоричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Термічний опік IV ст.

b. Суха гангрена

- c. Хімічний опік II ст.
- d. Хімічний опік III ст.
- e. Волога гангрена

407. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 46-ти років, який поступив у торакальне відділення з ножовим пораненням грудної клітки, ускладненим ушкодженням легенів. Здійснена операція - пульмонектомія, призначено дренивання плевральної порожнини. Виберіть, який із дренажів плевральної порожнини є пасивним:

- a. Дренаж за допомогою гумового балончика
- b. Дренаж за методом Бюлау**
- c. Дренаж за допомогою електровідсмоктувача
- d. Дренаж за допомогою 3-х ампульної системи
- e. Дренаж за допомогою водоструминного пристрою

408. В травматологічне відділення лікарні доставлено пацієнта 20-ти років з проникаючим пораненням грудної клітки. Під час клінічного обстеження в VI міжребер'ї виявлено різану рану розміром 2,5x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час дихання чути свист повітря. Який попередній діагноз?

- a. Клапанний пневмоторакс
- b. Підшкірна емфізема
- c. Легенева кровотеча
- d. Відкритий пневмоторакс**
- e. Закритий пневмоторакс

409. В приймальне відділення звернувся хворий зі скаргами на головний біль, втрату апетиту, підвищення температури тіла до 39°C, біль в ділянці лівого стегна. Хворіє протягом 10 днів. Об'єктивно: в середній третині правого стегна - набряк м'яких тканин, гіперемія, місцеве підвищення температури. При рентгенологічному дослідженні виявлено відшарування окістя. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Панарицій
- b. Флегмона
- c. Остеомієліт**
- d. Бешиха
- e. Забій м'яких тканин

410. Медична сестра-статист проводить розрахунки для проведення статистичного дослідження в лікувальному закладі. Скільки етапів передбачає проведення статистичного дослідження?

- a. 5 етапів
- b. 2 етапи
- c. 1 етап
- d. 4 етапи**
- e. 3 етапи

411. Медичний працівник на дільниці проводить диспансеризацію пацієнтів. Скільки етапів включає в себе диспансеризація?

- a. 2 етапи
- b. 4 етапи
- c. 5 етапів
- d. 3 етапи**
- e. 1 етап

412. У дитини 5-ти місяців наявні тотальний ціаноз шкіри та слизових оболонок, поліцитемія (кількість еритроцитів - 5,7 Т/л), конфігурація серця при рентгенологічному дослідженні у вигляді "дерев'яного черевичка". Для якої вади серця найбільш характерні ці ознаки?

- a. Коарктація аорти
- b. Тетради Фалло**
- c. Дефект міжшлуночкової перегородки
- d. Дефект міжпередсердної перегородки
- e. Відкрита артеріальна протока

413. Дівчинка, яка хворіє на епідемічний паротит, скаржиться на головний біль, шум та біль у

вухах, при відкриванні рота, припухлість привушної залози. Який симптом виявиться у ротовій порожнині?

- a. "Географічний язик"
- b. "Малиновий язик"
- c. Плями Філатова-Коплика-Бельського
- d. Енантема на твердому піднебінні

e. Симптом Мурсона

414. У медичному закладі складений документ, у якому зроблено розпис грошових прибутків і витрат закладу на майбутній фінансовий рік. При цьому були вказані джерела дохідної частини й статті витрат грошових засобів із розрахунками. Який фінансовий документ складено у даному медичному закладі?

- a. План зростання виробництва
- b. Фінансовий запит
- c. Бюджет закладу
- d. Фінансовий звіт

e. Кошторис закладу

415. Охорона здоров'я фінансується з різних джерел. Яке основне джерело фінансування галузі охорони здоров'я при страховій формі фінансування?

a. За рахунок внесків робітників, підприємців і субсидій держави

- b. За рахунок оплати медичних послуг за власні кошти пацієнтів
- c. За рахунок гуманітарної допомоги
- d. За рахунок міжбюджетних трансферів
- e. За рахунок державного бюджету

416. До медсестри сімейного лікаря звернулась пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Ps- 94/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат потрібний для надання невідкладної допомоги?

- a. Анальгін
- b. Дицинон
- c. Кофеїн
- d. Строфантин

e. Дибазол

417. До приймального відділення госпіталізовано пацієнта із скаргами на загальну слабкість, запаморочення, шум у вухах, блювання "кавовою гущею", випорожнення дьогтеподібного характеру. В анамнезі - виразкова хвороба шлунка. Яке ускладнення запідозрить медсестра у пацієнта?

- a. Перфорація виразки
- b. Легенева кровотеча
- c. Стравохідна кровотеча

d. Шлункова кровотеча

e. Пенетрація виразки

418. У приймальне відділення доставлено пацієнта зі скаргами на набряк губ, обличчя, повік, носа, які виникли після укусу бджоли. Об'єктивно: набрякле обличчя, АТ- 110/70 мм рт.ст. Ps- 74/хв. Який стан виник у пацієнта?

a. Набряк Квінке

- b. Анафілактичний шок
- c. -
- d. Гіпотиреоз
- e. Кропив'янка

419. Медсестра працює в перев'язувальному кабінеті хірургічного відділення. Лікар призначив пацієнту з гнійною ранною застосувати протеолітичні ферменти під час наступної перев'язки. Назвіть мету їх застосування:

- a. Поліпшення кровообігу тканин
- b. Знеболювання
- c. Лізис некротичних тканин**
- d. Утворення лінійного рубця
- e. Зменшення температури тіла

420. Під час бійки постраждалий 33-х років отримав відкрите проникаюче поранення передньої черевної стінки з випадінням петель кишок на зовні. Що з пацієнтом?

- a. Перфорація
- b. Малігнізація
- c. Ексудація
- d. Евентрація**
- e. Пенетрація

421. Під час проведення проби на резуссумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію:

- a. Сумісна по Rh-фактору
- b. Резус-позитивна
- c. Несумісна по Rh-фактору**
- d. Резус-негативна
- e. Пробу треба переробити

422. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років, отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- a. 42%
- b. 56%
- c. 36%**
- d. 25%
- e. 18%

423. Існує декілька моделей медичного страхування. Як називається модель, яка базується на принципах універсальності доступу та безкоштовності медичної допомоги на основних етапах курсу лікування?

- a. Приватна модель
- b. Фінансова модель
- c. Модель Семашка
- d. Модель Бісмарка
- e. Модель Беверіджа**

424. Ви - старша медична сестра терапевтичного відділення. У вашому розпорядженні є гумові вироби. При якій вологості їх слід зберігати?

- a. Вологість не менше 65%**
- b. Вологість не менше 45%
- c. Вологість не менше 50%
- d. У прохолодному місці, вологість 25%
- e. Вологість не менше 30%

425. Медична сестра-бакалавр після закінчення медичного коледжу отримала направлення на роботу. Протягом якого терміну вона повинна приступити до роботи?

- a. 25 календарних днів
- b. У термін, визначений у направленні**
- c. 12 календарних днів
- d. 20 календарних днів
- e. 7 календарних днів

426. Медична сестра потребує відпустки за сімейними обставинами. Який термін відпустки без

збереження заробітної плати вона може вказати в заяві?

- a. 3 календарних дня
- b. 5 календарних днів
- c. 15 календарних днів**
- d. Два тижні
- e. 10 календарних днів

427. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?

- a. Інвалідність
- b. Травматизм
- c. Первинна захворюваність
- d. Летальність
- e. Народжуваність**

428. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцевосудинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- a. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням
- b. Кожен випадок хвороби серцевосудинної системи, виявлений на медичному огляді**
- c. Кожен випадок захворювання серцевосудинної системи за даними звертань за медичною допомогою
- d. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
- e. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи

429. Концепція розвитку системи охорони здоров'я в умовах ринкової економіки чітко орієнтує суспільство на сприйняття медицини не тільки як моральної, юридичної, а насамперед як соціально-економічної категорії. Розкрийте зміст економіки охорони здоров'я:

- a. Витрати держави на утримання ЛПЗ
- b. Наука, що вивчає економічні відносини в охороні здоров'я**
- c. Методи зниження собівартості лікування
- d. Бухгалтерський облік в ЛПЗ
- e. Витрати держави на охорону здоров'я

430. Ціна має багато функцій. Яка із функцій ціни мотивує підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості?

- a. Порівняльна
- b. Стимулююча**
- c. Розподільча
- d. Обліково-вимірювальна
- e. Регулююча

431. В приймальне відділення привезли хворого після автоаварії. Хворий без свідомості, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 97/хв., із носа і вух витікають кров та ліквор. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Субдуральна гематома
- b. Перелом основи черепа**
- c. Перелом лицевої частини черепа
- d. Перелом склепіння черепа
- e. Струс мозку

432. Хворий 27-ми років упав на витягнуту праву верхню кінцівку. Скаржиться на біль, неможливість активних і різке обмеження пасивних рухів у плечовому суглобі. Під час огляду: правий плечовий суглоб деформований, його контури згладжені. Кінцівка фіксована у вимушеному положенні (відведена вбік). Ушкоджене плече довше. На місці головки правого плеча - западина. Поставте діагноз:

- a. Розрив зв'язок плечового суглоба
- b. Перелом плечової кістки**

с. Вивих плеча

- d. Розрив двоголового м'яза
- e. Забій плеча

433. У приймальному відділенні інфекційної лікарні дитина віком 2-х років, якій не були проведені профілактичні щеплення. З анамнезу відомо, що захворювання почалося з підвищення температури до 39°C, головного болю, нудоти, блювання, болю у ногах та спині. На ранок не змогла стати на ніжки. Про яке захворювання можна думати?

- a. Кір
- b. Скарлатина
- c. Вірусний гепатит В
- d. Краснуха

е. Поліомієліт

434. У здорової новонародженої дитини виявлені наступні показники периферичної крові: еритроцити - $6,0 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 150 г/л, лейкоцити - $15 \cdot 10^9/л$, нейтрофіли - 45%, лімфоцити - 43%. Для якого віку характерні такі показники периферичної крові?

а. П'ятий день життя

- b. Десятий день життя
- c. Тридцятий день життя
- d. Двадцятий день життя
- e. Перший день життя

435. Дівчинка 7-ми років хворіє 3 дні, скаржиться на періодичний ниючий біль в поперековій ділянці, часте болюче сечовипускання. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 16 в полі зору. Яку патологію сечовивідної системи можна запідозрити в даному випадку?

а. Інфекція сечовивідних шляхів

- b. Хронічний гломерулонефрит
- c. Хронічна ниркова недостатність
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Гострий гломерулонефрит

436. Дитині 8-м років. Під час профілактичного огляду медична сестрабакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та S-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

а. Сколіоз грудного відділу хребта

- b. Лордоз грудного відділу хребта
- c. Залишкові явища перенесеного рахіту
- d. Хондродистрофію
- e. Кіфоз грудного відділу хребта

437. При огляді у приймальному відділенні непритомна дівчинка 11-ти років. Зіниці звужені. Наявні ознаки зневоднення, дихання типу Куссмауля, різкий запах ацетону з рота. Тахікардія - 98/хв., артеріальний тиск знижений. Глюкоза крові - 29 ммоль/л. Який стан найбільш імовірний у дитини?

- a. Гіпоксична кома
- b. Гіпоглікемічна кома

с. Гіперглікемічна кома

- d. Інфекційно-токсичний шок
- e. Гіповолемічний шок

438. Хворий 45-ти років на виробництві отримав пошкодження м'яких тканин лівого стегна. На передній поверхні стегна рана, краї якої зазубрені, нерівні, зі згустками крові. З рани продовжує витікати кров. Який оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі може застосувати медична сестра?

- a. Джгут вище місця поранення
- b. Джгут нижче місця поранення

- с. Пальцеве притиснення артерії
- d. Максимальне згинання кінцівки

е. Стискаюча пов'язка на рану

439. Хворий 19-ти років з дитинства страждає на підвищену кровоточивість. Після незначних травм виникають масивні підшкірні та внутрішньом'язові гематоми. Мати та сестра - здорові. Тромбоцити крові - $190 \cdot 10^9/\text{л}$. Про яке захворювання можна думати у цьому випадку?

- a. Тромбоцитопенія
- b. ДВЗ-синдром
- с. Геморагічний васкуліт

d. Гемофілія А

е. Тромбоцитопатія

440. Хворий 64-х років скаржиться на кашель з відходженням харкотиння, іноді кровохаркання. Палить 30-ть років. Схуд на 8 кг за останні 3 місяці. Рентгенологічно в середній частці правої легені порожнинне утворення, справа збільшені прикореневі лімфовузли. Яке дослідження є найбільшінформативним?

- a. Бронхографія
- b. Біохімічний аналіз крові
- с. Загальний аналіз крові
- d. Спірографія

е. Бронхоскопія з біопсією

441. У чоловіка 23-х років через три тижні після ангіни з'явилися набряки обличчя, гомілок, відчуття дискомфорту у попереку, підвищення АТ до 180/100 мм рт.ст. В сечі протеїнурія - 0,99 г/л, виружені еритроцити 60-80 в полі зору, циліндри. Це дозволяє запідозрити захворювання:

a. Рак нирки

b. Гострий гломерулонефрит

- с. Гострий пієлонефрит
- d. Гіпертонічна хвороба
- е. Сечокам'яна хвороба

442. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - $38,2^{\circ}\text{C}$, пульс - 150/хв., АТ - 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

a. -

b. Тиреотоксикоз

- с. Інфаркт міокарда
- d. Гіпертонічна хвороба
- е. Гіпотиреоз

443. Хто має право видати документ працюючій особі, що засвідчує тимчасову непрацездатність, на період лікування в стаціонарі?

a. Лікарська консультативна комісія

b. Лікуючий лікар разом із завідуючим відділенням

- с. Завідувач відділенням
- d. Лікуючий лікар
- е. Головний лікар або його заступник (начмед)

444. В аптеці необхідно придбати шовний матеріал, що не розсмоктується. Який із перелічених шовних матеріалів повинен відпустити фармацевт?

- a. Кетгут
- b. Окцелон
- с. Дексон

d. Лавсан

е. Вікріл

445. ?Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для

цього необхідні?

a. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

b. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

c. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

d. Собівартість медичних послуг і загальні доходи

e. Ціна та собівартість медичних послуг

446. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

a. Лейкоцитурія

b. Поява "активних лейкоцитів"

c. Еритроцитурія

d. Зрушення pH сечі в лужну сторону

e. Протеїнурія

447. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидку втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабаних паличок", кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість?

a. Холодова проба

b. Алгезиметрія

c. Капіляроскопія

d. Проба на реактивну гіперемію

e. Палестезіометрія

448. Дитині 12 місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сильного сухого кашлю, підвищення $t_{\text{о}}$ тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота - ціаноз. Під час дихання спостерігається втягнення міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

a. ЕКГ

b. УЗД

c. Рентгенологічне

d. Загальний аналіз калу

e. Аналіз сечі по Зимницькому

449. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ170/100 мм рт.ст., Рс- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

a. Аналіз сечі на глюкозу

b. Загальний аналіз крові

c. Загальний аналіз сечі

d. Аналіз сечі за Нечипоренком

e. Аналіз сечі на діастазу

450. Для встановлення остаточного діагнозу при кишкових інфекціях у дітей використовують дослідження:

a. Кал на яйця глистів

b. Бактеріологічне дослідження прямої кишки

c. Визначення вмісту білірубину в крові

d. Загальний аналіз крові

e. Визначення жовчних пігментів в сечі

451. Перша фаза процесу управління це розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

- a. Заключний
- b. Поточний
- c. Направляючий
- d. Фільтруючий
- e. Попередній**

452. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- a. Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- b. Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- c. Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад
- d. Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад**
- e. Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення

453. У спекотний сонячний день чоловік 40ка років, який перебував на пляжі, відчув себе погано. Виникли головний біль, запаморочення, блювання, шум у вухах. Об'єктивно: пульс - 120/хв., дихання поверхневе. Ви підозрюєте, що у пацієнта сонячний удар. Що необхідно зробити першочергово для покращення його стану?

- a. Зробити непрямий масаж серця
- b. Терміново транспортувати потерпілого до лікарні
- c. Здійснити ШВЛ
- d. Ввести антигістамінні засоби
- e. Холодне пиття, холодний компрес на голову**

454. У пацієнта, що хворіє на бронхіальну астму, напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу неефективні. Об'єктивно: вимушене положення тіла, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, дистанційні сухі хрипи. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- a. Преднізолон**
- b. Астмопент
- c. Анальгін
- d. Морфін
- e. Ефедрин

455. Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- a. Прозерин
- b. Адреналін
- c. Атропін
- d. Мезатон
- e. Налоксон**

456. Дитині молодшого шкільного віку дільнична медсестра проводить вторинну профілактику ревматичної лихоманки. Яким з перерахованих нижче препаратів здійснюється вона?

- a. Ортофеном
- b. Біциліном - 5**
- c. Цефтріаксоном
- d. Бісептолом
- e. Ампіциліном

457. Які завдання лікарсько-консультативної комісії [ЛКК]?

- a. Видача медикаментів
- b. Перевірка санітарно-епідемічного режиму
- c. Видача листків непрацездатності в перші 5 днів
- d. Переведення на іншу роботу

е. Вирішення складних питань експертизи непрацездатності

458. Яка є лікувально-профілактична допомога в залежності від ступеня складності?

- а. Змішана
- б. Профілактична, первинна, патронажна
- с. Первинна, вторинна, третинна**
- д. Профілактична, змішана, санітарногігієнічна
- е. Санітарно-епідеміологічна, змішана, патронажна

459. Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

- а. Шум тертя перикарду
- б. Плевроперикардіальний шум
- с. Дрібноміхурцеві хрипи
- д. Шум тертя плеври

е. Крепітація

460. Під час проведення об'єктивного обстеження пацієнта з діагнозом: гострий пієлонефрит, спостерігається біль в поперековій ділянці при постукуванні. Як називається такий симптом?

- а. Ортнера
- б. Френікус-симптом
- с. Керте

д. Пастернацького

е. Мерфі

461. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

а. Визначення протеїнурії

б. Загальний аналіз сечі

- с. Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- д. Дослідження сечі за Зимницьким
- е. Визначення креатиніну

462. Ви старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

- а. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд
- б. Посадовий оклад, тарифна ставка

с. Тарифна система та нормування праці

- д. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- е. —

463. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія", $t_{0} = 38,9^{\circ}\text{C}$. Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребер'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

а. Натщесерце

б. Після нормалізації температури тіла

- с. Одразу
- д. Після одужання від пневмонії
- е. Немає обмежень в часі

464. Медична допомога міському населенню надається за принципом:

а. Дільнично-територіальний

- б. Переважає обслуговування окремих соціально-значущих груп
- с. Цеховий
- д. Надання медичної допомоги вдома

е. Поетапний

465. У дитини 4-х років діагностовано туберкульозний менінгіт. Для такого захворювання характерні клінічні ознаки:

- a. Афонія
- b. Симптом Філатова
- c. Симптоми Керніга, Брудзінського**
- d. Біль у суглобах
- e. Симптом Філатова-КоплікаБельського

466. Дефіцит якого макроелементу може виникнути в організмі при неконтрольованому вживанні фуросеміду?

- a. Заліза
- b. Калію**
- c. Кобальту
- d. Натрію
- e. Магнію

467. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому за призначенням лікаря?

- a. Мезатон
- b. Еуфілін
- c. Кордіамін**
- d. Фенобарбітал
- e. Адреналін

468. Хворий, 2 доба після великої операції. Проводиться знеболення наркотичними анальгетиками згідно призначення лікаря. Яка ускладнення вони можуть викликати у хворого?

- a. Спричинюють брадикардію
- b. Спричинюють спазм периферійних судин
- c. Пригнічують дихання**
- d. Підвищують артеріальний тиск
- e. Порушують мозковий кровообіг

469. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які із нижче приведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?

- a. Аналіз крові на цукор
- b. Загальний аналіз крові
- c. Аналіз сечі на діастазу**
- d. Аналіз сечі на цукор
- e. Аналіз крові на білірубін

470. Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?

- a. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
- b. Дані про профілактичний огляд
- c. Дані перепису населення
- d. Показник загальної захворюваності**
- e. Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню

471. Дитина 5-ти років, хворіє 2-й день. Хвороба розпочалась гостро, $t_{0-39^{\circ}\text{C}}$, скаржиться на біль в горлі, зниження апетиту, порушення сну. Спостерігається лакуерна ангіна, язик з сіруватим нальотом. На гіперемійованому тлі шкіри - висипка яскраво-червона дрібно-крапкова крім носо-губного трикутника. Вкажіть захворювання, для якого найхарактерніші дані симптоми:

а. Скарлатина

- b. Кір
- c. Паротитна інфекція
- d. Вітряна віспа
- e. Краснуха

472. У пацієнта 55-ти років, через деякий час після введення йому вітаміну "В1" обличчя набрякло, повіки стали важкими, перешкоджають відкриванню очей, очні яблука "ін'єковані". Губи збільшились. Шкіра в місцях набряку бліда, із жовтуватим відтінком, не гаряча на дотик, не болюча, не свербить. Вкажіть, який стан розвинувся у пацієнта:

- a. Кропив'янка
- b. Бронхоспазм
- c. Анафілактичний шок
- d. Сироваткова хвороба

е. Набряк Квінке

473. Хворому з діагнозом: пієлонефрит призначена проба Зимницького. Яке пояснення треба надати хворому для правильного збору сечі?

- a. Збирати сечу вранці одноразово
- b. Збирати середню порцію сечі вранці
- c. Збирати сечу цілодобово в один посуд
- d. Збирати сечу вранці і ввечері

е. Збирати сечу цілодобово, кожні 3 години в окремий посуд

474. Показник малюкової смертності - це смертність дітей:

- a. До 6 дня життя
- b. До 3 років життя
- c. До 5 років життя
- d. До 1 року життя**
- e. До 1 місяця життя

475. Виберіть вид шоку, що ускладнює інфаркт міокарда:

- a. Септичний
- b. Гіповолемічний
- c. Кардіогенний**
- d. Неврогенний
- e. Анафілактичний

476. Пацієнт 55-ти років в хірургічному відділенні готується до флебектомії лівої нижньої кінцівки. При підготовці операційного поля медична сестра помітила фурункул в нижній третині стегна. Лікар відмінив оперативне втручання. Виникнення якої потенційної проблеми було попереджено?

- a. Підшкірна гематома
- b. Тромбофлебіт
- c. Нагноєння післяопераційної рани**
- d. Варикозне розширення вен
- e. Тромбоз

477. Дитина 4-х років відвідує дитячий садок. Захворіла на вітряну віспу. Який період ізоляції потребує дитина?

- a. 21 день
- b. 14 днів з моменту захворювання
- c. 22 дні
- d. До 5-ти днів, від появи останніх висипань**
- e. 3 дні з моменту появи висипань

478. На кожного пацієнта, що звертається в поліклініку або отримує допомогу вдома, медична сестра заповнює:

- a. Довідку про тимчасову непрацездатність Ф-095/0
- b. Санітарно-курортну карту Ф- 072/0
- c. Контрольну карту диспансерного спостереження Ф-030/0
- d. Карту профілактичних щеплень Ф063/0

e. Медичну карту амбулаторного хворого Ф-025/0

479. За змістом документи в охороні здоров'я поділяються на:

- a. Письмові, графічні, фотодокументи, акустичні
- b. Прості, складні
- c. Типові, зразкові

d. Організаційно-розпорядчі, фінансоворозрахункові, постачально-збутові, кадрові

e. Службові, офіційно-особисті

480. Ви, головна медсестра лікарні, відпустили у відділення 2 ампули кордарону 5% 3,0 №5 з коробки. Залишилось ще 3 ампули, тобто Ви порушили упаковку виробника. Ваші дії правильні, якщо:

a. Коробку, з якої взяли 2 ампули, не закрили, щоб було зрозуміло, що вона почата

b. На новоствореній упаковці Ви зазначили назву, серію, термін придатності, виробника ЛЗ та власний підпис старшої медсестри

c. Порушувати упаковку виробника не дозволено ні за яких умов

d. На новоствореній упаковці в довільній формі Ви зазначили назву та лікарську форму відпущеного засобу

e. На упаковці, що залишилась, Ви зробили напис "3 ампули"

481. Який препарат необхідно якомога швидше застосувати при гострому отруєнні миш'яковмісними сполуками?

- a. Тіосульфат натрію
- b. Розчин ізонітрозину
- c. Розчин атропіну

d. Унітіол

e. Тетацин кальцію

482. У дитини 7-ми років порушено загальний стан, температура тіла сягає 40°C, біль в глотці під час ковтання. Діагноз катаральної ангіни встановлено на підставі огляду. Яке дослідження необхідно провести, щоб визначити збудника хвороби?

a. Загальний аналіз сечі

b. Мазок із слизової оболонки глотки та носа

c. Біохімічне дослідження крові

d. Загальний аналіз крові

e. Серологічне дослідження - РЗК, в динаміці

483. Згідно з класифікацією документів, за строками зберігання вони поділяються на:

a. Постійні, тимчасові, тривалі

b. Сталі та змінні

c. Звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні

d. Типові та трафаретні

e. Термінові, нетермінові

484. Медична сестра бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Які з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

a. Симптом Ортнера

b. Симптом Мебіуса

c. Симптом Галанта

d. Симптом Труссо

e. Симптом Грефе

485. Дитина 9-ти років перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з приводу менінгіту. Складаючи план обстеження, яке обстеження потрібно зробити в першу чергу?

- a. Енцефалографію
- b. Комп'ютерну томографію
- c. Спинномозкову пункцію**
- d. Магнітно-ядерний резонанс
- e. Ангіографію

486. До Вас поступила дитина, при огляді якої Ви спостерігаєте: стан важкий, шкірні покриви бліді, висипи на шкірі у вигляді петехій та екхімозів. Під час огляду у дитини почалась носова кровотеча. Яке втручання першочергово Ви повинні зробити з метою надання невідкладної допомоги?

- a. Провести задню тампонаду носа
- b. Нахилити голову вперед**
- c. Закинути голову доверху
- d. Надати дитині горизонтального положення
- e. Провести гарячу ніжну ванну

487. Хлопчик 8-ми років лікується в нефрологічному відділенні. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на гомілках, АТ150/100 мм рт.ст. При проведенні медсестринського обстеження Ви виявили такі проблеми як: зменшення кількості сечі та переважання нічного діурезу над денним. Дайте визначення цим поняттям:

- a. Поліурія, бактеріурія
- b. Анурія, бактеріурія
- c. Лейкоцитурія, протеїнурія
- d. Олігурія, ніктурія**
- e. Циліндрурія, гематурія

488. Які принципи відносяться до основних принципів первинної лікувальнопрофілактичної допомоги?

- a. Надання медичної допомоги при нещасних випадках
- b. Солідарність і субсидіарність
- c. Кваліфікованість; оперативність; доступність**
- d. Керованість надання медичних послуг
- e. —

489. Пацієнт скаржиться на спрагу, поліурію, свербіж шкіри, нудоту, блювання, біль у животі. Хворий загальмований, дихання шумне, запах ацетону з рота, шкіра та слизові оболонки сухі, тони серця приглушені, ЧСС- 102/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Живіт болючий. Під час обстеження хворий втратив свідомість. Яке ускладнення виникло у хворого?

- a. Гіперглікемічна кома**
- b. Ліподистрофія
- c. Уремична кома
- d. Печінкова кома
- e. Гіпоглікемічна кома

490. У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації спостерігаються набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

- a. Ревматоїдний артрит
- b. Ревматична гарячка, ревмокардит
- c. Ревматична гарячка, поліартрит**
- d. Деформуючий остеоартроз
- e. Ревматична гарячка, мала хорея

491. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирці мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

- a. Фурункульоз
- b. Герпес-інфекція**

с. Пухирчатка новонароджених

d. Псевдофурункульоз

e. Везикулопустульоз

492. У дитини 8-ми років визначаються ознаки інтоксикації. Під час огляду: мигдалики збільшені, вкриті сіруватими нашаруваннями, які важко знімаються, після зняття виступають крапельки крові. Нашарування не розтираються між шпателями, не розчиняються у воді. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

a. Скарлатина

b. Мононуклеоз

с. Фолікулярна ангіна

d. Дифтерія горла

e. Лакунарна ангіна

493. У крові дітей, хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, виявляють специфічні антитіла до:

a. Bordetella pertussis

b. Salmonella

c. Helicobacter pylori

d. Entamoeba histolytica

e. Mycobacterium tuberculosis

494. При здійсненні медсестринського огляду у пацієнта виявлено гінгівіт, стоматит, а також ціанотична смуга вздовж країв ясен, постійний тремор рук, підвищена збудливість. Яка речовина при інтоксикації дає такі ознаки?

a. Марганець

b. Арсен

с. Свинець

d. Ртуть

e. Оксид вуглецю

495. Контроль - це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають, він складається з:

a. Попереднього, поточного й заключного

b. Попереднього й заключного

с. Тільки із заключного контролю

d. Тільки з поточного контролю

e. Поточного й заключного

496. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 місяці, з генералізованими судомами та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,6 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

a. Рахіт залишкових явищ

b. Спазмофілія. Судоми

с. Рахіт, гострий період. Судоми

d. Спазмофілія, ларингоспазм

e. Гіпервітаміноз D. Судоми

497. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Який лікарський препарат і яку дозу лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

a. 0,5% сибазон 0,8 мл

b. 0,5% седуксен 0,5 мл

с. 0,5% діазепам 0,2 мл

d. 0,5% діазепам 2 мл

e. 0,5% сибазон 0,5 мл

498. У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

- a. Дефект міжшлуночкової перегородки
- b. Фіброеластоз міокарда
- c. Коарктація аорти

d. Тетраду Фалло

- e. Відкриту аортальну протоку

499. У хворого порушення серцевого ритму, при якому на ЕКГ протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

- a. Синусова аритмія
- b. Атріовентрикулярна блокада
- c. Пароксизмальна тахікардія
- d. Синусова тахікардія

e. Миготлива аритмія

500. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виник гострий біль у животі, нудота, печія, гіркота у роті, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- a. Колоноскопія
- b. Лапароцентез
- c. Зняття ЕКГ

d. Оглядова рентгенографія

- e. Іригоскопія

501. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається крепітація та патологічна рухливість. Рс- 130/хв., слабого наповнення, АТ- 80/45 мм рт.ст. Дихання поверхневе, прискорене. Стан пацієнта відповідає:

- a. Шок III ступеня
- b. Передагонія
- c. Шок I ступеня
- d. Шок IV ступеня

e. Шок II ступеня

502. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на біль, який виник після фізичного навантаження. Біль іррадіює у пахвинну ділянку. Хвора збуджена, не знаходить собі місця від болю, кричить. Біль супроводжується нудотою, блюванням, затримкою газів та випорожнень. При обстеженні пацієнтки відмічається болючість у ділянці лівої нирки, позитивний симптом Пастернацького. Перша невідкладна допомога в даному випадку складається з:

- a. Літотрипсія, грілка на поперек
- b. Призначення антибіотиків та спазмолітиків
- c. Заспокоїти хвору, холод на поперек

d. Призначення спазмолітиків, гарячої ванни

- e. Призначення прийому рідини, гарячої ванни

503. Соціальна медицина, як наука, володіє різноманітними методами дослідження. Як називається статистичне дослідження, яке охоплює облік усіх одиниць спостереження?

- a. Несуцільне дослідження

b. Суцільне дослідження

- с. Дослідження основного масиву
- d. Монографічне дослідження
- е. Вибіркове дослідження

504. Вас викликали до дитини 10-ти років. На момент огляду у дитини безперервний кашель, ціаноз шкіри, задишка, дитина збуджена. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. Якої допомоги потребує дитина для звільнення дихальних шляхів від стороннього тіла?

a. Прийом Геймліха

- b. Відсмоктування слизу з рота та носа
- с. Прийом Селіка
- d. Термінова інтубація трахеї
- е. Прийом Леопольда

505. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Вивих правого колінного суглоба
- b. Флегмона правої гомілки

с. Гострий гематогенний остеомієліт

- d. Перелом правого колінного суглоба
- е. Гострий артрит колінного суглоба

506. У пацієнта 38-ми років після бійки виявлено крововилив і крепітацію в ділянці нижньої щелепи. Вкажіть вид пов'язки, яку необхідно застосувати для іммобілізації нижньої щелепи під час транспортування:

a. Поворотна

b. "Вуздечка"

- с. Хрестоподібна
- d. "Чепець"
- е. Колова

507. Населення міста А має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста:

a. Прогресивний

- b. Регресивний
- с. Змішаний
- d. Динамічний
- е. Стабільний

508. Реєстрація випадку смерті відбувається у відділі РАЦСу на основі спеціального медичного обліково-статистичного документа. Назвіть цей документ:

a. Лікарське свідоцтво про смерть

- b. Журнал обліку померлих
- с. Протокол розтину
- d. Довідка дільничного лікаря про випадок смерті
- е. Історія хвороби

509. Наукове дослідження, присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу хворобами органів дихання. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

a. Кожен випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

b. Кожен випадок захворювання органів дихання

- с. Кожен хворий студент медичного коледжу (будь-яким захворюванням)
- d. Кожен студент медичного коледжу
- е. Кожен студент медичного коледжу з хворобою органів дихання

510. Пацієнтка скаржиться на наростаючу задишку. При огляді пацієнтки визначають

асиметрію грудної клітки, відставання в акті дихання правої половини. Перкуторно - справа тупий перкуторний звук. Під час аускультатії дихання справа не вислуховується. Який синдром розвинувся у пацієнта?

- a. Синдром порожнини
- b. Накопичення рідини в плевральній порожнини**
- c. Деструкції легеневої тканини
- d. Ущільнення легеневої тканини
- e. Бронхіальної обструкції

511. У хворої раптово після фізичного навантаження виник біль в правій здухвинній ділянці, часте сечовипускання малими порціями через короткий проміжок часу. При огляді: симптом Пастернацького позитивний справа. Який попередній діагноз?

- a. Гострий панкреатит
- b. Гостра непрохідність кишечника
- c. Гострий аднексит
- d. Правобічна ниркова коліка**
- e. Гострий холецистит

512. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

- a. Оглядовий знімок грудної клітки
- b. Оглядовий знімок черевної порожнини
- c. Зняття ЕКГ
- d. Загальний аналіз крові
- e. Визначення амілази крові**

513. У хворої, оперованої з приводу апендициту рік тому, виникли біль у животі, блювання, затримка газів. При рентгенографії органів черевної порожнини множинні "чаші Клойбера". Встановіть попередній діагноз:

- a. Пухлина тонкої кишки
- b. Пухлина товстої кишки
- c. Спайкова хвороба**
- d. Защемлена грижа
- e. Дивертикуліт товстої кишки

514. За рекомендацією ВООЗ базова тривалість життя (показник який застосовується для розрахувань економічних показників) складає:

- a. 50 років
- b. 60 років
- c. 70 років
- d. 65 років**
- e. 55 років

515. Медична сестра має вагітність 28 тижнів. Працює у денну зміну. Коли їй необхідно оформити відпустку по вагітності та пологам?

- a. Через 4 тижня
- b. Через 6 тижнів
- c. Через 1 тиждень
- d. Через 3 тижня
- e. Через 2 тижні**

516. Амбулаторія сімейної медицини має реєстратуру, кабінети сімейного лікаря, оглядовий, фізіотерапії, експресдіагностики, палати денного перебування хворих. Який кабінет ще обов'язково повинен бути в структурі амбулаторії?

- a. Харчоблок
- b. Архів
- c. Маніпуляційна**

- d. Рентген-кабінет
- e. Аптека

517. У пацієнтки, яка потрапила у відділення з приводу негоспітальної пневмонії, протягом 1 години температура тіла знизилась з 39,9°C до норми, але стан погіршився: з'явилась різка слабкість, пульс ниткоподібний, кінцівки холодні, АТ- 80/40 мм рт.ст. Чим зумовлене погіршення стану пацієнтки?

- a. Анафілактичним шоком
- b. Непритомністю
- c. Колапсом
- d. Маренням
- e. Судомним синдромом

518. При підозрі на харчове отруєння грибами слід заповнити документ:

- a. Медичну карту стаціонарного хворого
- b. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре, професійне отруєння
- c. Контрольну карту диспансерного спостереження
- d. Медичну карту диспансерного спостереження
- e. Талон амбулаторного пацієнта

519. До Вас звернувся працівник аптеки з питанням. "Як правильно зберігати гумові грілки в умовах аптеки?"

- a. Злегка наповнені повітрям, у захищеному від світла і перепадів температури місця
- b. При відносній вологості 45%, у сухому приміщенні
- c. В темному прохолодному приміщенні
- d. В сухому прохолодному приміщенні
- e. При температурі 23°C та при вологості повітря не менше 50%

520. Ви старша медична сестра хірургічного відділення, проводите інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарнопротиепідемічних заходів у відділенні. Як часто Ви повинні стежити, за його виконанням?

- a. Щоденно
- b. Щомісячно
- c. Щорічно
- d. Щоквартально
- e. Щотижня

521. Ви медсестра кардіологічного відділення. Скільки разів на день слід проводити провітрювання палат?

- a. Не менше 1 разу
- b. Не менше 3 разів
- c. Не менше 1-2 разів
- d. Не менше 4 разів
- e. Не менше 2 разів

522. Ви медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно Наказу № 234)?

- a. 1 раз в 6 місяці
- b. 1 раз на рік
- c. 1 раз на 2 роки
- d. 1 раз в 3 місяці
- e. 1 раз в 9 місяці

523. Лікар призначив дитині, хворій на пневмонію, цефтриаксон в/м в дозі 700 мг. У флаконі 1 г препарату. Медична сестра ввела у флакон 5 мл розчинника. Скільки мл розведеного цефтриаксону повинна ввести дитині медична сестра?

- a. 4мл
- b. 2мл

с. 3,5 мл

d. 2,5 мл

e. 5мл

524. Під час профілактичного огляду пацієнтки встановлено діагноз злоякісного новоутворення правої молочної залози. Які ознаки найбільш характерні для даної патології?

a. Утягнутість соска справа

b. Відсутність апетиту

c. Гіркота в роті

d. Порушення менструального циклу

e. Дратівливість

525. На стаціонарному лікуванні у відділенні гнійної хірургії перебуває пацієнт у важкому стані. Яке ускладнення можливе у пацієнта з постійним гумовим катетером у сечовому міхурі?

a. Інфікування сечового міхура

b. Аденома передміхурової залози

c. Напад ниркової кольки

d. Сечокам'яна хвороба

e. Перфорація сечового міхура

526. Пацієнтка після черепно-мозкової травми скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. Відмічає короткочасну (протягом 2-3 хвилин) втрату свідомості. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?

a. Непритомністю

b. Струсом головного мозку

c. Стисненням головного мозку

d. Забоєм головного мозку

e. Колапсом

527. В травматологічний пункт звернувся пацієнт з укушеною раною правого передпліччя. Що Ви використаєте в першу чергу з метою неспецифічної профілактики сказу при укусах вуличним собакою?

a. Промити рану розчином господарського мила

b. Промити рану 0,02% розчином фурациліну

c. Промити рану 2% розчином натрію гідрокарбонату

d. Промити рану 70% розчином спирту

e. Промити рану 6% розчином перекису водню

528. Ви працюєте шкільною медичною сестрою. До Вас звернулася дівчинка 7-ми років зі скаргами на погане самопочуття, біль у горлі. Під час огляду виявлено підвищення температури тіла до 38,3°C, дрібноточковий висип на фоні гіперемійованої шкіри, блідий носогубний трикутник, фолікулярну ангіну. Які першочергові дії запланує медсестра?

a. Введення жарознижувачих препаратів

b. Введення імуноглобуліну

c. Обробка елементів висипу

d. Повідомлення в СЕС

e. Ізоляцію хворої дитини

529. Хвора звернулася зі скаргами на тривалий субфебрилітет, виражену загальну слабкість, в'ялість, наявність шкірного висипу на обличчі у вигляді "метелика". Для якого захворювання це характерно?

a. Набряк Квінке

b. Демодекоз

c. Хімічний опік

d. Вульгарні вугрі

e. Системний червоний вовчак

530. На третю добу в післяопераційному періоді у пацієнта 72-х років раптово виник біль за

грудиною, ціаноз верхньої половини тулуба, обличчя, шиї, тахікардія, задишка інспіраторного типу. Шийні вени набряклі. Про який стан можна подумати?

- a. Гіпертонічний криз
- b. Кардіогенний шок
- c. Інфаркт міокарда
- d. Набряк легень
- e. Тромбоемболія легеневої артерії**

531. За допомогою звернувся чоловік 58ми років зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. При огляді живота виявлено вип'ячування в паховій ділянці справа, болюче при пальпації, щільноеластичної консистенції. Що можна запідозрити?

- a. Защемлення стегнової кили
- b. Защемлення калиткової кили
- c. Защемлення пупкової кили
- d. Незащемлену пахвинну килу
- e. Защемлення пахвинної кили**

532. Материнська смертність - показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного належить до материнської смертності?

- a. Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами**
- b. Смертність під час пологів, якщо смерть жінки пов'язана з внутрішньоутробною інфекцією
- c. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю
- d. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана з пологами
- e. Смертність протягом вагітності, якщо смерть жінки не пов'язана з гінекологічною патологією

533. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

- a. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"
- b. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"
- c. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з позначкою "6+"
- d. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"**
- e. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"

534. Накази видаються на основі й для виконання законів, постанов і розпоряджень Уряду, наказів і директивних вказівок вищих органів. Хто видає наказ?

- a. Керівник організації**
- b. Голова колегіального органу
- c. —
- d. Вища посадова особа
- e. Колегіальний орган

535. Дитина 5-ти років захворіла гостро, підвищилася температури тіла до 37,5°C, з'явилася дрібноплямиста висипка спочатку на обличчі потім на внутрішній поверхні рук, на сідницях а потім і по всьому тілу. На момент огляду: потиличні та задньошийні лімфовузли збільшені, безболісні м'якої консистенції. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Скарлатина
- b. Кіп
- c. Краснуха**
- d. ГРВІ, алергічний висип
- e. Менінгококцемія

536. Дитині 5 діб, після кожного сечовиділення на пелюшках з'являються плями червоно-бурого кольору. Зібрана сеча мутна, при зберіганні у ній з'явився цеглястий осад. У загальному аналізі сечі: еритроцити - 7-10 в полі зору, урати - в значній кількості. У чому

причина даного стану у новонароджених?

- a. Нефролітіаз
- b. Інфекція сечових шляхів
- c. Фізіологічна норма
- d. Макрогематурія
- e. Сечокислий інфаркт нирок**

537. Ви працюєте в центрі медичної статистики. Облік всіх захворювань (гострих і хронічних), які зареєстровані у населення певної території за певний період, визначає:

- a. Загальна захворюваність**
- b. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
- c. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання
- d. Інфекційна захворюваність
- e. Госпітальна захворюваність

538. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) \times 1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

- a. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності
- b. Поширеність захворювань**
- c. Госпітальна захворюваність
- d. Первинна захворюваність
- e. Інфекційна захворюваність

539. Ви головна медична сестра. До якого рівня належить високоспеціалізована медична допомога, що забезпечується в обласних лікувально-профілактичних закладах?

- a. —
- b. Третинного рівня надання медичної допомоги**
- c. Первинного рівня надання медичної допомоги
- d. Вторинного рівня надання медичної допомоги
- e. Четвертинного рівня надання медичної допомоги

540. У чоловіка виявлено задишку з утрудненим видихом. Шкіра обличчя, губи ціанотичного кольору. Вдих глибокий, видих тривалий. Грудна клітка діжкоподібна, перкуторно - коробковий звук над легеньми. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Рак легенів
- b. Емфізема легенів**
- c. Бронхіт
- d. Пневмосклероз
- e. Туберкульоз

541. Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ - 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

- a. Ревматична хвороба
- b. Гіпотиреоз
- c. Акромегалія
- d. Гіпертонічна хвороба
- e. Хвороба Іценко-Кушінга**

542. У пацієнта з гострим гломерулонефритом сеча кольору м'ясних помиїв. Чим зумовлений такий колір?

- a. Лейкоцитурією
- b. Гематурією**
- c. Альбумінурією
- d. Протеїнурією

е. Циліндрурією

543. Медична сестра працює в медичному пункті по обслуговуванню робітників газонафтовидобувної компанії, де застосовується метанол. Який антидот вона повинна використовувати в випадку гострого отруєння метанолом?

а. Етанол (етиловий спирт)

b. Соду

c. Активоване вугілля

d. Унітіол

е. Амінокапронову кислоту

544. В ЛПЗ було успішно проведено акредитацію. Який документ видається в цьому випадку?

a. Посвідчення

b. Ліцензія

c. Диплом

d. Державний акт

е. Сертифікат

545. Охарактеризуйте стиль керівництва головної медсестри, яка часто влаштовує наради та вислуховує думки співробітників, винагороджує їх за гарну роботу та рідко вичитує або карає:

a. Ліберальний

b. Директорський

c. Демократичний

d. Авторитарний

е. Наставницький

546. Кожний амбулаторно-поліклінічний заклад має свою структуру. В якому структурному підрозділі поліклініки медична сестра проводить антропометричні вимірювання?

а. Кабінет долікарського прийому

b. Кабінет медоглядів

c. Денний стаціонар

d. Кабінет функціональної діагностики

е. Терапевтичний кабінет

547. Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

a. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

b. Кожного дня із застосуванням пилососу

c. По мірі забруднення приміщення

d. Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

е. Кожного дня вологим способом без застосування миючих засобів

548. Прийняття управлінських рішень проходить у декілька етапів. Назвіть перший етап прийняття управлінського рішення:

a. Постановки мети

b. Формування стратегії

c. Визначення альтернатив

d. Визначення проблеми

е. Формування системи

549. Після обробки приміщення дихлофосом у працівника виникли симптоми гострої інтоксикації фосфорорганічними сполуками. Який препарат застосовується в якості патогенетичної антидотної терапії?

a. Тіосульфат натрію

b. Тетацин кальцію

c. Сульфат магнію

d. Атропіну сульфат

е. Унітіол

550. Дівчинка 2-х років захворіла гостро, з підвищення температури тіла до 38,2°C, сухого кашлю, нежиті, кон'юнктивіту, блефароспазму. При огляді: на шкірі висип у вигляді червоних цяток, які злегка підняті над поверхнею шкіри. Висип спочатку з'явився за вухами, на обличчі, шиї на наступний день - на тулубі. На слизовій оболонці щік навпроти малих корінних зубів сірувато-білі висипання розміром з макове зерно, оточені червоною облямівкою, на піднебінні - плямисто-папульозна енантема. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. ГРВІ
- b. Аденовірусна інфекція
- c. Афтозний стоматит
- d. Кір**
- e. Ентеровірусна інфекція

551. Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,9°C, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірне?

- a. Іерсиніоз
- b. Сальмонельоз
- c. Шигельоз**
- d. Ешеріхіоз
- e. Ротавірусна інфекція

552. Під час амбулаторного прийому здорової доношеної дитини місячного віку, яка народилася взимку, знаходиться на грудному вигодовуванні, не виявлено ніякої патології. Профілактику якого захворювання необхідно рекомендувати в першу чергу?

- a. Анемія
- b. Спазмофілія
- c. Паратрофія
- d. Рахіт**
- e. Гіпотрофія

553. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

- a. Загальний показник смертності
- b. Постнеонатальна смертність**
- c. Неонатальна смертність
- d. Перинатальна смертність
- e. Рання неонатальна смертність

554. У пацієнта, який лікується з приводу інфаркта міокарда, раптово виникла задишка, дихання стало клопочучим, з рота та носа виділяється пінисте рожеве харкотиння. Яке ускладнення виникло?

- a. Тромбоз легеневої артерії
- b. Легенева кровотеча
- c. Носова кровотеча
- d. Набряк легенів**
- e. Астматичний статус

555. Пацієнтка 50-ти років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку і триває більше 45 хвилин. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Перикардит
- b. Остеохондроз
- c. Інфаркт міокарда**
- d. Міокардит
- e. Стенокардія

556. Пацієнт скаржиться на біль голови, зміну зовнішнього вигляду. В анамнезі: травма черепа. Об'єктивно: вилиці, нижня щелепа, лобові горби, ніс та губи збільшені. Він звернувся до медсестри з питанням: "Порушення функції якої ендокринної залози зумовлює дане захворювання?"

a. Гіпофіз

- b. Щитоподібна залоза
- c. Статеві залози
- d. Надниркові залози
- e. Підшлункова залоза

557. Пацієнт знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Скаржиться на погіршення свого стану - за 3 місяці втратив 10 кг ваги, відмічає відразу до м'ясної їжі. Який метод обстеження буде найбільш інформативним?

- a. Дуоденальне зондування
- b. Колоноскопія
- c. Загальний аналіз крові
- d. Шлункове зондування

e. Фіброгастроскопія

558. Пацієнт 42 роки, поступив до приймального відділення ЦРЛ зі скаргами на наростаючий набряк правої кінцівки, біль у ділянці рани, підвищення температури тіла до 39°C, серцебиття. З рани виділяються пухирці газу з невеликою кількістю сукровичної рідини. Пальпація тканин в ділянці ураження кінцівки супроводжувалась крепітацією. Поставте діагноз:

a. Правець

b. Газова гангрена

- c. Флегмона
- d. Бешиха
- e. Ангіна

559. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темнокоричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хімічний опік II ст.
- b. Хімічний опік III ст.

c. Суха гангрена

- d. Волога гангрена
- e. Термічний опік IV ст.

560. Пацієнтка 38-ми років, скаржиться на сильний біль у ділянці потилиці, загальну слабкість, нудоту, підвищення температури тіла до 38,5°C. В ділянці потилиці пальпується болючий інфільтрат розміром 1,5 см на 2 см, шкіра над ним багряно-синього кольору, через виниклі отвори виділяється густий зеленуватосірий гній та некротичні маси. Поставте діагноз:

a. Паранефрит

b. Карбункул

- c. Гідраденіт
- d. Бешиха
- e. Флегмона

561. Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на операції виготовлення "якісних" електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружних рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тону, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

- a. Тетраетилсвинець
- b. Карбофос

c. Марганець

- d. Бензол
- e. Дихлоретан

562. Пацієнта 39-ти років госпіталізовано до терапевтичного відділення з приводу негоспітальної пневмонії. Що використовують з метою проведення етіотропного лікування?

- a. Вітаміни
- b. Імуномодульну терапію
- c. Бронхолітики
- d. Антигістамінні
- e. Антибіотики**

563. До медсестри сімейного лікаря звернулася пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Рс- 94/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- a. Кофеїн
- b. Анальгін
- c. Дицинон
- d. Дибазол**
- e. Строфантин

564. Під час проведення проби на резуссумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію:

- a. Пробу треба переробити
- b. Несумісна за Rh-фактором**
- c. Сумісна за Rh-фактором
- d. Резус-позитивна
- e. Резус-негативна

565. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- a. 25%
- b. 18%
- c. 56%
- d. 42%
- e. 36%**

566. З яких першочергових заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги дитині з нападом пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії?

- a. 3 в/в введення р-ну ізоптина
- b. 3 в/в введення лідокаїну
- c. 3 в/в введення новокаїнамідю
- d. 3 вагусних проб**
- e. 3 в/в введення р-ну строфантину

567. На оперативній нараді старша медична сестра оголосила наказ завідуючого, стосовно графіка роботи. Визначте, до якого виду відноситься даний документ:

- a. Організаційний
- b. Інформаційний
- c. Розпорядчий**
- d. Фінансовий
- e. Рекомендований

568. Ви головна медична сестра. Проводите заняття. Який спосіб слід застосувати при стерилізації перев'язувальних засобів промислового виробництва?

- a. В автоклавах

b. Кип'ятіння

c. Радіаційне опромінення

d. Дезінфекція

e. В сухожаровій шафі

569. Після медичного огляду школярів медична сестра склала варіаційний ряд їх зросту. 149, 151, 151, 152, 153, 154, 154, 154, 156, 156, 156, 160, 162, 165. Який це варіаційний ряд?

a. Згрупований

b. Простий

c. Ранговий

d. Динамічний

e. Складний

570. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?

a. Народжуваність

b. Летальність

c. Травматизм

d. Інвалідність

e. Первинна захворюваність

571. Ви медична сестра статистичного відділу лікарні. При складанні статистичного звіту необхідно виділити одиницю обліку тимчасової непрацездатності. Виберіть її:

a. Журнал обліку випадків непрацездатності

b. Талон амбулаторного пацієнта

c. Довідка лікаря

d. Акт обстеження

e. Листок непрацездатності

572. Концепція розвитку системи охорони здоров'я в умовах ринкової економіки чітко орієнтує суспільство на сприйняття медицини не тільки як моральної, юридичної, а насамперед як соціально-економічної категорії. Розкрийте зміст економіки охорони здоров'я:

a. Методи зниження собівартості лікування

b. Бухгалтерський облік в ЛПЗ

c. Наука, що вивчає економічні відносини в охороні здоров'я

d. Витрати держави на охорону здоров'я

e. Витрати держави на утримання ЛПЗ

573. Ви старша медична сестра відділення обговорюєте принципи формування оплати праці медичних працівників. Поясніть молодим спеціалістам що таке посадовий оклад:

a. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу

b. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника

c. Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці

d. Премія за швидкість виконаної роботи

e. Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язані з режимом або умовами праці

574. У хворого відкритий перелом стегна ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги:

a. Знеболити, пов'язка, джгут, шина

b. Джгут, шина, знеболити, пов'язка

c. Джгут, знеболити, пов'язка, шина

d. Пов'язка, знеболити, джгут, шина

e. Шина, знеболити, джгут, пов'язка

575. Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу, виникло блювання. Під час пальпації різкий біль у правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга.

Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Гострий апендицит
- b. Гострий перитоніт
- c. Кишкова непрохідність
- d. Гострий холецистит
- e. Гострий панкреатит

576. Дівчинка 11-років впродовж 2-х років спостерігається з приводу хронічного гастриту. За останні 4 місяці з'явилися нічні болі в животі. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра для підтвердження діагнозу підготує пацієнта до наступного обстеження:

- a. Фіброезогастроудоденоскопія
- b. УЗД травноготракту
- c. Копрологічне дослідження
- d. Загальний аналіз сечі
- e. Аналіз кала на приховану кров

577. Дитині 8 років. Під час профілактичного огляду медична сестра-бакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та S-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

- a. Лордоз грудного відділу хребта
- b. Кіфоз грудного відділу хребта
- c. Сколіоз грудного відділу хребта
- d. Хондродистрофію
- e. Залишкові явища перенесеного рахіту

578. Пацієнт 34-х років поступив у відділення з ознаками бронхіту. Упродовж 5ти років працює в шахті, де добувають залізну руду. Який різновид пневмокніозу в нього може виникнути?

- a. Антракоз
- b. Азбестоз
- c. Сидероз
- d. Бісиноз
- e. Бериліоз

579. Пацієнт отримав хімічний опік правої гомілки концентрованою сірчаною кислотою. Яку речовину слід використати для нейтралізації сірчаної кислоти?

- a. 3% розчин пероксиду водню
- b. 2% розчин борної кислоти
- c. 2% розчин натрію гідрокарбонату
- d. 0,9% фізіологічний розчин
- e. 0,02% розчин фурациліну

580. Пацієнт скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника відсутня. Визначається позитивний симптом Валя. З чим пов'язані проблеми даного пацієнта?

- a. З перфоративною виразкою шлунка
- b. З гострим панкреатитом
- c. З гострим холециститом
- d. З гострою кишковою непрохідністю
- e. З гострим апендицитом

581. У пацієнта з травмою грудної клітки діагностовано закритий пневмоторакс. Яке положення слід надати пацієнту на період транспортування його до лікарні?

- a. З піднятими ногами
- b. Напівсидяче
- c. Горизонтальне на животі
- d. Горизонтальне на спині
- e. З опущеною головою

582. Жінка 35-ти років скаржиться на загальну слабкість, роздратованість, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові бліді. Рс- 96/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. У крові: знижений вміст гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника та сироваткового заліза. Дефіцит якого із факторів зумовив виникнення захворювання?

a. Заліза

- b. Вітаміну В12
- c. Фолієвої кислоти
- d. Кобальту
- e. Вітаміну В6

583. Хворий 19-ти років з дитинства страждає на підвищену кровоточивість. Після незначних травм виникають масивні підшкірні та внутрішньом'язові гематоми. Мати та сестра - здорові. Тромбоцити крові - $190 \cdot 10^9/\text{л}$. Про яке захворювання можна думати у цьому випадку?

- a. Тромбоцитопатія
- b. Тромбоцитопенія

c. Гемофілія А

- d. ДВЗ-синдром
- e. Геморагічний васкуліт

584. У хворого 25-ти років восени з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год. після вживання їжі, і вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш ймовірно?

- a. Хронічний холецистит
- b. Виразкова хвороба шлунка
- c. Хронічний панкреатит

d. Виразкова хвороба 12-палої кишки

- e. Діафрагмальна кила

585. Хвора 36-ти років скаржиться на серцебиття, пітливість, схуднення за останні 3 місяці на 5-6 кг. Апетит збережений. Об'єктивно: шкіра волога, тепла, пульс - 140/хв., ритмічний, АТ- 130/60 мм рт.ст. Щитоподібна залоза збільшена рівномірно. Яке лабораторне дослідження є найінформативнішим?

- a. Загальний аналіз сечі
- b. Глюкоза крові
- c. Загальний аналіз крові

d. Визначення рівня тиреоїдних гормонів

- e. Визначення рівня статевих гормонів

586. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, набряк повік, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - $38,2^{\circ}\text{C}$, задишка, тахікардія, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

a. Тиреотоксикоз

- b. Інфаркт міокарда
- c. Стенокардія
- d. Гіпотиреоз
- e. Гіпертонічна хвороба

587. В аптеці необхідно придбати шовний матеріал, що не розсмоктується. Який із перелічених шовних матеріалів повинен відпустити фармацевт?

a. Дексон

b. Лавсан

- c. Вікріл
- d. Кетгут
- e. Окцелон

588. Структура ринку - це розташування окремих його сегментів, їх співвідношення у

загальному обсязі ринку. Кожен із них виступає водночас субринком щодо всього ринку. Назвіть критерії сегментації ринку за рівнем насиченості:

- a. Офіційний, тіньовий
- b. Рівноважний, дефіцитний, надмірний**
- c. Вільний, монополістичний, олігополістичний
- d. Оптовий, роздрібний, аукціони
- e. Місцевий, регіональний, національний

589. За рік в місті народилося 1257 дітей, померло 1863 мешканців міста. Чому до-рівнює природний приріст?

- a. 1863
- b. 3120
- c. 1257
- d. 606
- e. 606**

590. Пацієнт 50-ти років потрапив у терапевтичне відділення з підозрою на інтоксикацію свинцем. При подальшому обстеженні діагноз підтверджений, виявлена інтоксикація середнього ступеня важкості. Вкажіть препарати, які найбільш доцільно використати для виведення свинцю з організму:

- a. Препарати заліза та міді
- b. Вітаміни групи B та кобальту
- c. Препарати заліза та 40% розчин глюкози
- d. Тетацин кальцію 10% та пентацин 5 %**
- e. Препарати заліза та вітаміни групи B

591. Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

- a. Гіпотиреоз
- b. Хвороба Іценко-Кушинга**
- c. Акромегалія
- d. Ревматична хвороба
- e. Гіпертонічна хвороба

592. До Вас звернувся працівник аптеки з питанням: "Як правильно зберігати гумові грілки в умовах аптеки?"

- a. У захищеному від світла і перепадів температури місця, відносній вологості 65%**
- b. В темному прохолодному приміщенні
- c. Е. В сухому прохолодному приміщенні
- d. При температурі 23°C та при вологості повітря не менше 50%
- e. При відносній вологості 45%, у сухому приміщенні

593. У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наро-стала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини ви-значається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

- a. Відкриту аортальну протоку
- b. Дефект міжпередсердної перегородки
- c. Тетраду Фалло**
- d. Дефект міжшлуночкової перегородки
- e. Фіброеластоз міокарда

594. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впрова-дження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

- a. Нової теми досліджень
- b. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником
- c. Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків**
- d. Регламенту
- e. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я

595. Для якої гострої хірургічної патології характерні: переймоподібний біль у животі, нудота, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів?

- a. Гострий панкреатит
- b. Перфоративна виразка шлунка
- c. Гостра кишкова непрохідність**
- d. Гострий холецистит
- e. Гострий апендицит

596. Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація та проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

- a. Облікова
- b. Поточна**
- c. Цільова
- d. Попередня
- e. Одномоментна

597. Дитині 7 років. Скарги на загальну слабкість, підвищення температури до 38,2°C. При огляді виявлено на шкірі дрібно- крапковий висип на гіперемійованому фоні, крім носо-губного трикутника, язик яскраво малинового кольору, прояви катаральної ангіни. Про яке захворювання можна думати в першу чергу?

- a. Червона висипка
- b. Кір
- c. Кропивниця
- d. Скарлатина**
- e. Алергічний дерматит

598. У пацієнтки 27-ми років після вживання їжі в їдальні через 2 години виникли слабкість, нудота, часте блювання, біль в животі. Об'єктивно: язик обкладено білим нальотом, температура - 38°C, з рота неприємний запах, живіт м'який болючий в епігастрії. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?

- a. Покласти міхур з льодом
- b. Промити шлунок**
- c. Покласти грілку
- d. Направити на Коло-дослідження шлунка
- e. Дати знеболюючі засоби

599. Ви головна медична сестра. Для досягнення цілей лікувальної установи Ви здійснюєте функції управління. Основні функції управління, це:

- a. Планування, організація
- b. Організація, мотивація
- c. Організація, контроль
- d. Планування, організація, мотивація, контроль**
- e. Планування, контроль

600. Ви старша медична сестра відділення обговорюєте принципи формування оплати праці медичних працівників. Поясніть молодим спеціалістам що таке посадовий оклад:

- a. Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці**
- b. Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язані з режимом або умовами праці
- c. Премія за швидкість виконаної роботи
- d. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника

е. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу

601. Медсестра урологічного відділення пояснює пацієнтові, що сечу для дослідження за методом Зимницького пацієнт повинен збирати:

- а. Добову кількість сечі
- б. Вечірню та ранішню порції сечі
- с. Ранішню порцію сечі
- д. Кожну порцію через 3 години**
- е. Середню порцію сечі

602. У хворого 25-ти років восени з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5- 2 год. після вживання їжі, і вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш ймовірно?

- а. Діафрагмальна кила
- б. Хронічний панкреатит
- с. Виразкова хвороба шлунка
- д. Хронічний холецистит
- е. Виразкова хвороба 12-палої кишки**

603. До медсестри сімейного лікаря звернулася пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Рз- 94/хв., АТ- 190/100 мм рт.ст. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невід-кладної допомоги?

- а. Кофеїн
- б. Дибазол**
- с. Строфантин
- д. Дицинон
- е. Анальгін

604. Серед впливу на формування смертності немовлят виділяють декілька факторів, серед яких є якість надання медичної допомоги. Яка допомога впливає на цей показник?

- а. Акушерсько-гінекологічна та педіатрична**
- б. Швидка
- с. Акушерсько-гінекологічна
- д. Педіатрична
- е. Невідкладна

605. В приймальне відділення поступила пацієнтка 42-х років, зі скаргами на різкий біль в животі та поперековій ділянці зліва, почашений сечопуск, невеликими порція-ми. Біль з'явився раптово, раніше відзначались подібні приступи. При огляді: шкіра блілого кольору, вкрита холодним потом. Живіт м'який при пальпації, здутий, позитивний симптом Пастернацького. В сечі виявлені свіжі еритроцити в значній кількості. Поставте попередній діагноз:

- а. Пієлонефрит
- б. Сечокам'яна хвороба**
- с. Гострий панкреатит
- д. Травма нирок
- е. Гломерулонефрит

606. Пацієнт 28-ми років перебуває у хірургічному відділенні з приводу вогнепального поранення правої гомілки. Об'єктивно: на 3-ю добу після поранення виник розпираючий біль у ділянці рани, швидко наростає набряк; з рани виділяються пухирці газу, невелика кількість сукровичної рідини, що має неприємний запах. Вкажіть симптом, який є характерною ознакою для даного захворювання:

- а. Симптом "переміжної кульгавості"
- б. Симптом "Ларрея"
- с. Симптом "Троянова-Тренделенбурга"
- д. Симптом "прилиплої п'яти"**

е. Симптом "лігатури"

607. У хворого відкритий перелом стегна ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги:

- а. Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- б. Джгут, шина, знеболити, пов'язка
- с. Джгут, знеболити, пов'язка, шина**
- д. Пов'язка, знеболити, джгут, шина
- е. Шина, знеболити, джгут, пов'язка

608. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ- 170/100 мм рт.ст., РЗ- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького - позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- а. Аналіз сечі за Нечипоренком**
- б. Аналіз сечі на глюкозу
- с. Аналіз сечі за Зимницьким
- д. Аналіз сечі на діастазу
- е. Загальний аналіз крові

609. Ви працюєте старшою медичною сестрою терапевтичного відділення міської лікарні №3. Назвіть основний документ, що юридично і фактично підтверджує ме-дикаментозне лікування хворих:

- а. Листок призначень лікарями наркотичних лікувальних засобів
- б. Зошит обліку виконань маніпуляцій
- с. Листок лікарських призначень**
- д. Журнал реєстрації хворих відділення
- е. Вимога накладна

610. Старша медична сестра терапевтичного відділення провела санітарно- просвітницьку роботу серед пацієнтів. Для цього вона зібрала хворих у холі, де розповідала про необхідність дотримання особистої гігієни, про зберігання продуктів від родичів, про режим у відділенні. Яку форму та метод санітарно-просвітньої роботи вона використала?

- а. Форму комбіновану, наочний метод
- б. Форму індивідуальну, наочний метод
- с. Форму масову, друкований метод
- д. Форму наочну, комбінований метод
- е. Форму групову, усний метод**

611. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати по-ранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років, отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- а. 18%
- б. 25%
- с. 56%
- д. 42%
- е. 36%**

612. Старша медсестра зробила зауваження медсестрі маніпуляційного кабінету з приводу неправильного зберігання інсуліну. Запаси інсуліну слід зберігати:

- а. В шафі для медикаментів на верхній полиці
- б. В холодильнику при температурі від -5°C до - 8°C
- с. В сейфі для зберігання медикаментів групи А
- д. В холодильнику при температурі від +0°C до +2°C
- е. В холодильнику при температурі від +2°C до +8°C %**

613. На обліку в жіночій консультації знаходяться жінки, яких поставлено на облік у різні

терміни вагітності - до 3-х місяців - 45%, до 5 місяців - 40%, а 15% - до 8 місяців вагітності. Який відсоток жінок поставлено на облік своєчасно?

- a. 85%
- b. 45%**
- c. 55%
- d. 40%
- e. 15%

614. Ви працюєте медичною сестрою в медико-санітарній частині заводу. Які заходи Вам необхідно здійснити для проведення профілактичних медичних оглядів працюючих?

- a. Виявити ранні ознаки впливу виробничих умов і шкідливих факторів на здоров'я
- b. Попередити виникнення нещасних випадків
- c. Скласти список працюючих, які підлягають медичному огляду та забезпечити їх явку**
- d. Розробити заходи для попередження нещасних випадків
- e. Розробити заходи по оздоровленню працюючих

615. При виявленні нестачі, зіпсованості, бою медичних товарів, приймальний акт необхідно скласти:

- a. В 3-х примірниках**
- b. В 4-х примірниках
- c. В 5-х примірниках
- d. В 2-х примірниках
- e. В 6-х примірниках

616. Першим етапом надання медичної допомоги сільському населенню є сільська лікарська дільниця. Які медичні установи забезпечують надання медичної допомоги на даному організаційному етапі?

- a. Диспансер, обласна лікарня, діагностичний центр
- b. Дитяча лікарня, центральна районна лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт
- c. Фельдшерсько-акушерський пункт, дільнична лікарня, лікарська амбулаторія**
- d. Центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміологічна станція, пологовий будинок
- e. Районна поліклініка, районний диспансер, пологовий будинок

617. До медпункту заводу доставлено потерпілого з венозною кровотечею з нижньої третини передпліччя. Виберіть оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі:

- a. Накладання судинного шва
- b. Пальцеве перетискання судин
- c. Прошивання судини в рані
- d. Накладання стискаючої пов'язки**
- e. Накладання артеріального джгута

618. Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла - 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечопуск був 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пієлонефрит
- b. Сечокислий інфаркт нирок**
- c. Статевий криз
- d. Гломерулонефрит
- e. Вульвовагініт

619. Хворий відчув раптовий кинджальний біль в епігастральній ділянці. Блювання не принесло полегшення. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Температура тіла - 36,7°C, АТ- 110/70 мм рт.ст. Рз- 63/хв, при пальпації різка болісність в епігастрії, живіт дошкоподібний. Позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий холецистит
- b. Проривна виразка шлунка**
- c. Гострий панкреатит

- d. Гострий апендицит
- e. Шлунково-кишкова кровотеча

620. У жінки 24-х років після загального переохолодження з'явилися скарги на інтенсивний біль у попереку, підвищення температури тіла до 38,5°C. При огляді симптом Пастернацького позитивний з обох боків. В загальному аналізі сечі: лейкоцитурія, бактеріурія. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий пієлонефрит
- b. Аднексит
- c. Гострий апендицит
- d. Позаматкова вагітність
- e. Гострий гломерулонефрит

621. Медсестра сімейного лікаря за призначенням надає невідкладну допомогу пацієнту із гіпертонічним кризом. Які препарати будуть найбільш ефективні у даному випадку?

- a. Ізоптин, резерпін
- b. Гепарин, фенігідин
- c. Седуксен, допегіт
- d. Клофелін, лазикс
- e. Раунатин, анальгін

622. Хворий звернувся зі скаргами на кашель з виділенням харкотиння вигляду ма-линового желе, задишку та біль в правій половині грудної клітки. Під час огляду у пацієнта виявлено: схуднення, бліда шкіра з сірим відтінком, набряк шиї та обличчя, збільшені надключичні лімфатичні вузли. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Рак легенів
- b. Бронхоектатичну хворобу
- c. Емфізему легенів
- d. Туберкульоз легенів
- e. Пневмонію

623. Старша медична сестра читає у відділенні лекцію на тему: "Саморозвиток та самовдосконалення" Що передбачає саморозвиток?

- a. Щоденні вправи за певною програмою
- b. Усунення особистих недоліків
- c. Досягнення запланованих показників
- d. Самоосвіту, самооцінку, самоконтроль
- e. Вказівка вищого начальства

624. У хворій виник сильний біль у правій здухвинній ділянці, нудота, одноразове блювання. Температура тіла - 37,5°C, РЗ- 100/хв. При пальпації виражений біль та напруження м'язів у правій здухвинній ділянці. Позитивний симптом Ровзінга, Сітковського, Воскресенського. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Кишкова непрохідність
- b. Гострий холецистит
- c. Проривна виразка шлунка
- d. Гострий панкреатит
- e. Гострий апендицит

625. У хірургічному відділенні лікується хворий, якому проведена резекція шлунка у зв'язку зі стенозом воротаря. В чому полягатиме профілактика застійної пневмонії у такого пацієнта?

- a. Проводити дихальну гімнастику
- b. Вводити сечогінні засоби
- c. Дотримуватись суворого ліжкового режиму
- d. Часто провітрювати палату
- e. Надати сидячого положення

626. Робітник-поліграфіст 49-ти років звернувся зі скаргами на субфебрильну температуру,

загальну слабкість, запаморочення та втрату апетиту Об'єктивно: сіро-зелений відтінок обличчя, сіро-бузкова облямівка на яснах. Зі сторони шлунково-кишкового тракту: постійні кольки в області епігастрію, періодичні закрепи. У крові - ознаки гіпохромної анемії. У сечі - підвищена кількість гематопорфірину. Яке захворювання у пацієнта?

- a. Хронічний гастрит
- b. Хронічний ентероколіт
- c. Отруєння свинцем**
- d. Вегето-судинна дистонія
- e. Гіпохромна анемія

627. Які основні функції виконує управління організаціями охорони здоров'я?

- a. Планування, облік, контроль
- b. Аналіз, планування, організацію, контроль
- c. Аналіз, прийняття рішення, організацію виховання, контроль
- d. Стратегічне планування, організацію, мотивацію, контроль**
- e. Збір інформації, розробку стратегії, аналіз, контроль

628. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я." Які основні функції виконує маркетинг?

- a. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- b. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- c. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- d. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська**
- e. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

629. Ви складаєте план проведення I ревакцинації проти дифтерії, кашлюку та правця згідно "Календаря профілактичних щеплень в Україні" Дітей якого віку Ви запросите до дитячої поліклініки у кабінет щеплень?

- a. 18 місяців**
- b. 3 роки
- c. 12 місяців
- d. 6 місяців
- e. 3 місяці

630. Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на операції виготовлення «якісних» електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружних рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тонусу, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

- a. Карбофос
- b. Дихлоретан
- c. Бензол
- d. Марганець**
- e. Тетраетилсвинцев

631. У дитини 12-ти років скарги на загальну слабкість, температура тіла - 37,5°C, болі в горлі. При огляді зіву мигдалики збільшені, набряклі, гіперемійовані, з нашаруваннями. Яке дослідження дозволить Вам провести диференційну діагностику між ангіною та дифтерією?

- a. Взяття харкотиння на бактеріологічне дослідження
- b. Взяття мазка з зіву та носу на ВВ**
- c. Взяття мазку з ротоглотки на паличку Борде-Жангу
- d. Взяття матеріалу на кишкову групу
- e. Взяття слизу з носової частини глотки на наявність вірусів

632. Дитина 7-ми років хворіє другу добу, Т - 39,5°C, скарги на головний біль, слабкість, повторне блювання, біль при ковтанні. Стан важкий. До середини шиї спостерігається набряк. Шкіра над зоною набряку не змінена, при натисканні ямка не залишається, набряк має характер желе. На мигдаликах, піднебінні нашарування сірого кольору, які знімаються важко,

залишаючи кровоточиву поверхню. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. набряк Квінке
- b. Некротична ангіна
- c. Дифтерія мигдаликів, токсична форма**
- d. Інфекційний мононуклеоз
- e. Лакунарна ангіна

633. У пацієнта, який хворіє на цукровий діабет, після пропущеного прийому їжі поступово з'явилися почуття голоду, загальна слабкість, психомоторне збудження, втрата свідомості. АТ- 130/80 мм рт.ст., тахікардія. Яке лабораторне дослідження необхідно провести в першу чергу?

- a. Печінкові проби
- b. Загальний аналіз сечі
- c. Визначення вмісту глюкози крові**
- d. Біохімічний аналіз крові
- e. Загальний аналіз крові

634. Медсестру викликали до пацієнтки, яка знепритомніла. У неї дихання Куссмауля, різкий запах ацетону з рота, шкіра суха, очні яблука м'які. Печінка при пальпації болюча і щільна. Пульс - 120/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Що трапилось з пацієнткою?

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Гіперосмолярна кома
- c. Кетоацидотична кома**
- d. Уремична кома
- e. Мозкова кома

635. До приймального відділення лікарні була доставлена жінка з ознаками гострої інтоксикації ртуттю. Назвіть речовини, які слід використати у даному випадку як антидоти:

- a. Норадреналін, поліглюкін, мезатон
- b. Камфора, кофеїн, кордіамін, корглікон
- c. Унітіол, сукцимер, натрію тіосульфат**
- d. Тетацин кальцію, пентацин
- e. Строфантин, корглікон

636. Ви медична сестра статистичного відділу лікарні. При складанні статистичного звіту необхідно виділити одиницю обліку тимчасової непрацездатності. Виберіть її:

- a. Журнал обліку випадків непрацездатності
- b. Довідка лікаря
- c. Талон амбулаторного пацієнта
- d. Акт обстеження
- e. Листок непрацездатності**

637. Від чого залежить якість надання медичної допомоги?

- a. Стандартизація медичної допомоги**
- b. Медичного обладнання
- c. Наявність типових укомплектованих медичних закладів
- d. Відповідальності медичних працівників
- e. Фінансування медичного закладу

638. В приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт без свідомості, шкіра бліда, суха, очні яблука м'які. Дихання зі значними рідкими дихальними рухами, яке супроводжується глибоким шумним вдихом. Цей тип дихання має назву:

- a. Інспіраторна задишка
- b. Куссмауля**
- c. Ядуха
- d. Біота
- e. Чейна-Стокса

639. Ви старша медична сестра хірургічного відділення, проводите інструктаж середнього та

молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарно-протиепідемічних заходів у відділенні. Як часто Ви повинні стежити, за його виконанням?

a. Щоденно

- b. Щорічно
- c. Щоквартально
- d. Щомісячно
- e. Щотижня

640. Медична сестра хірургічного відділення за власним бажанням переводиться до оперблоку. Назвіть вид інструктажу, який проведе з нею старша медична сестра оперблока:

a. Повторний

b. Первинний

- c. Цільовий
- d. Позаплановий
- e. Вступний

641. У хворого порушення серцевого ритму, при якому протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

a. Миготлива аритмія

- b. Синусова тахікардія
- c. Атріовентрикулярна блокада
- d. Синусова аритмія
- e. Пароксизмальна тахікардія

642. Ви головна медична сестра лікарні. Назвіть фінансовий документ медичного закладу, в якому відображено прибутки і витрати на майбутній фінансовий рік, вказані джерела дохідної частини і статті витрат:

- a. Пояснювальна записка
- b. Фінансовий запит
- c. План зростання виробництва

d. Кошторис закладу

e. Фінансовий звіт

643. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат лікар призначить ввести хворому?

- a. Мезатон
- b. Еуфілін
- c. Адреналін
- d. Фенобарбітал

e. Кордіамін

644. Медико-гігієнічне навчання населення має бути спрямоване на:

- a. Розробка заходів з охорони довкілля
- b. Надання медичної допомоги на засадах ПМСД
- c. Збір статистичних даних про стан здоров'я населення
- d. Оптимізація управління охорони здоров'я

e. Формування здорового способу життя

645. З позиції функціонального призначення управлінські рішення можуть бути:

- a. Внутрішніми
- b. Директивними
- c. Колективними
- d. Рекомендаційними

e. Організаційними

646. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура

тіла - 38.2° Г. пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Гіпотиреоз
- b. Гіпертонічна хвороба
- c. Стенокардія
- d. Інфаркт міокарда
- e. Тиреотоксикоз**

647. Сторож будівельного майданчика отримав виробничу травму внаслідок завалу: бетонний стовпець придавив праву нижню кінцівку. З анамнезу: стиснення кінцівки тривало понад 7 годин. Надаючи невідкладну допомогу, медична сестра провела знеболення. Вкажіть її першочергову дію, яку слід здійснити перед звільненням нижньої кінцівки пацієнта:

- a. Провести іммобілізацію
- b. Накласти асептичну пов'язку
- c. Накласти еластичний бинт
- d. Охолодити кінцівку
- e. Накласти джгут**

648. Яку долікарську допомогу слід надати дитині при носовій кровотечі?

- a. Внутрішньовенне введення розчину амінокапронової кислоти
- b. У лежачому положенні нахилити голову уперед, зробити передню тампонаду
- c. У сидячому положенні нахилити голову назад, зробити передню тампонаду
- d. У лежачому положенні закапати в ніс розчин перекису водню
- e. У сидячому положенні нахилити голову уперед, зробити передню тампонаду**

649. У хлопчика 10-ти місяців під час крику з'явилося шумне дихання, ціаноз шкіри, холодний піт, настала короткочасна зупинка дихання, тонічні судоми в руках і ногах. Через декілька хвилин хлопчик знов став активним. При огляді виявлені ознаки рахіту, температура тіла - 36,6°C. Який препарат необхідно призначити в першу чергу після нападу?

- a. Вітамін С
- b. Вітамін І
- c. Глюконат кальцію**
- d. Фінлепсин
- e. Оксидутират натрію

650. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

- a. Вартість медичних послуг**
- b. Показники повторних купівель
- c. Імовірні стратегії конкурентів
- d. Співвідношення збуту й цін
- e. Загальні та відносні витрати

651. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцево-судинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- a. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
- b. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням
- c. Кожен випадок захворювання серцево-судинної системи за даними звертань за медичною допомогою
- d. Кожен випадок хвороби серцево-судинної системи, виявлений на медичному огляді**
- e. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи

652. У підлітка 15-ти років, що хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, на фоні зникнення болю з'явилися холодний липкий піт, блювання, блювотні маси у вигляді "кавової гущі", слабкість, блідість шкіри, тахікардія, зниження артеріального тиску, запаморочення. Який стан найбільш імовірний?

- a. Шлунково-кишкова кровотеча**
- b. Гостра судинна недостатність

- c. Шок
- d. Перфорація виразки
- e. Пенетрація виразки

653. Аналіз фінансового положення медичних установ дозволяє відслідкувати тенденції її розвитку і дати оцінку комерційній діяльності. Зовнішній фінансовий аналіз діяльності установи базується на:

- a. Даних податкової інспекції
- b. Рівня рахунку грошових коштів в банках
- c. Величині інвестицій
- d. Офіційній фінансовій звітності установи**
- e. Показниках дебіторської заборгованості

654. Грошові суми, які відображають рівень повернення затрат медичних закладів за виконання територіальних програм обов'язкового медичного страхування називаються:

- a. Тарифи на медичні послуги**
- b. Вільні ціни
- c. Договірні ціни
- d. Ринкові ціни
- e. Державні ціни

655. У кардіологічне відділення поступив пацієнт з трансмуральним гострим інфарктом міокарда. Стан його різко погіршився, свідомість порушена, шкіра блідо-ціанотична, холодна. Пульс на променевих артеріях не знайдено. АТ- 80/50 мм рт.мт., тони серця глухі. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- a. Гостра ниркова недостатність
- b. Пневмонія
- c. Аритмія
- d. Кардіогенний шок**
- e. Набряк легенів

656. Дитина 12-ти років захворіла раптово, підвищилась температура тіла до 38,3°C, з'явилися болі у животі, часті випорожнення, тенезми, випорожнення рідкі, з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається біль у лівій клубовій ділянці. Сигмовидна кишка пальпується у вигляді щільного, болючого тяжу, бурчить. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Холера
- b. Аскаридоз
- c. Дизентерія**
- d. Сальмонельоз
- e. Вірусна інфекція

657. Як називається вид медичної допомоги, що надається хворим, які потребують постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах?

- a. Екстрена медична допомога
- b. Стаціонарна медична допомога**
- c. Реабілітаційна медична допомога
- d. Амбулаторно-поліклінічна медична допомога
- e. Санаторно-курортна медична допомога

658. Після закінчення медичного коледжу Ви влаштувались на роботу в хірургічне відділення на посаду операційної медсестри. Вкажіть антисептичний розчин для передопераційної обробки рук за методом Спасокукоцького-Кочергіна:

- a. 1% розчин хлоргексидину біглюконату
- b. 5% розчин діюциду
- c. 3% розчин перекису водню
- d. 85% розчин мурашиної кислоти

е. 0,5% розчин аміаку

659. Хвора потрапила в приймальне відділення із скаргами на слинотечу, нудоту блювання, біль у животі, слъозоточивість, порушення зору. Ці явища виникли після знищування мух і комарів за допомогою хлорофосу. Черговий лікар поставив діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидот необхідно застосувати?

- а. Тетацин кальцію
- б. Унітіол
- с. Кокарбоксілаза

д. Атропіну сульфат

е. Тіосульфат натрію

660. Пацієнт перебуває у реанімаційному відділенні. Загальний стан вкрай тяжкий, свідомість відсутня. Пульс частий, напружений. АТ- 160/110 мм рт.ст. Під час аускультатії серця - шум тертя перикарду. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. У повітрі запах аміаку. Рівень креатиніну в крові - 1060 мкмоль/л. Для якого стану це характерно?

а. Уремична кома

- б. Аддісоновий криз
- с. Гіпоглікемічна кома
- д. Гіперглікемічна кома
- е. Алкогольна кома

661. У відділення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надійшли пахучі лікарські засоби. Які особливості їх зберігання необхідно знати?

- а. В упаковці з полімерної плівки при кімнатній температурі
- б. В промисловій упаковці в захищеному від світла місці
- с. У прохолодному місці, в щільно закупореній тарі з матеріалів, непроникних для водяної пари

д. Зберігати ізольовано, у герметично за- критій тарі, роздільно за найменуваннями

е. В сухому приміщенні, у герметично закупореній тарі, залитій парафіном

662. До медсестри звернувся пацієнт, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,2-37,5°C, холодний нічний піт, слабкість, погіршення апетиту, постійне покашлювання. Яке лабораторне дослідження є основним у діагностиці туберку-льозу?

- а. Аналіз харкотиння на атипові клітини
- б. Загальний аналіз харкотиння
- с. -

д. Дослідження харкотиння на БК

е. Загальний аналіз крові

663. Головні лікарі лікарень ставляться до своїх підлеглих по-різному. Основними типами поведінки керівників за ознакою відносин із підлеглими є:

- а. Охлократичний, демократичний, ліберальний
- б. Автократичний, демократичний, ліберальний
- с. Демократичний, ліберальний, анархічний
- д. Демократичний, партократичний, монархічний
- е. Анархічний, автократичний, партократичний

664. Головна медична сестра пояснює пацієнту про те, що медичне страхування поділяється за формами. На які форми?

- а. Примусове та добровільне
- б. Обов'язкове та добровільне
- с. Безкоштовне та платне
- д. Індивідуальне та групове
- е. Сімейне та виробниче

665. У стаціонар доставлений потерпілий 57-ми років із переломом ребер. Яке положення слід надати потерпілому?

а. Лежаче

b. На животі

c. Напівсидяче

d. Сидяче

e. На боці

666. У хворого 29-ти років в ранньому післяопераційному періоді виникла аспірація шлунковим вмістом. Чим небезпечне дане ускладнення?

a. Евентрацією

b. Розвитком пневмонії

c. Розвитком циститу

d. Розвитком гастриту

e. Розвитком ангіни

667. Ви старша медсестра дитячого дошкільного закладу, де захворіла дитина 3-х років на кір. Скільки триватиме в даному випадку карантин?

a. 17 днів

b. 30 днів

c. 14 днів

d. 9 днів

e. 21 день

668. Оглядаючи дівчинку без свідомості, лікар виставив діагноз гіпоглікемічної коми. Які симптоми з перерахованих нижче характерні?

a. Тонус м'язів, очних яблук, артеріальний тиск знижені

b. Розвивається гостро, шкіра бліда, "холодний піт, тонус м'язів підвищений, тахікардія

c. Розвивається поступово; шкіра, слизові сухі, "діабетичний рум'янець"

d. Різка дегідратація, висока осмолярність крові, виражена неврологічна симптоматика

e. Дихання глибоке, гучне (Куссмауля); запах ацетону у повітрі

669. Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений, температура тіла - 38,5°C, біль у суглобах, підщелепні лімфатичні вузли збільшені. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовто-білого кольору обмежені, нашарування які легко віддаляються шпателем. Перераховані симптоми вказують на:

a. Лакунарна ангіна

b. Катаральна ангіна

c. Гостра респіраторна вірусна інфекція

d. Дифтерія зівя

e. Фолікулярна ангіна

670. З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

a. Загальний

b. Спеціальне вибіркове дослідження

c. Поточний

d. Профілактичний

e. Медичний огляд окремих груп

671. Робітник 42-х років, що працює на коксохімічному комбінаті, порушив техніку безпеки, ввійшов до замкнутого приміщення для зберігання бензолу. Після виходу з приміщення відчув себе погано: з'явилося почуття сп'яніння, сонливість, головний біль, нудота, блювання, слабкість у м'язах, порушення ходи. В медпункті зне-притомнів. При проведенні обстеження пацієнта медсестра повинна звернути увагу на шкіру, яка набуває кольору:

a. Жовтяничного

b. Сіро-синього

c. Землисто-білого

d. Червоного

е. Алебастрового

672. Хвору турбує відчуття розпирання, тупий ниючий біль у правому підребер'ї, відрижка, нудота, гіркий присмак у ротовій порожнині. При обстеженні живота виявлено позитивні симптоми Кера, Ортнера з правого боку. Для якого захворювання це характерно?

- a. Хронічного гастриту
- b. Хронічного коліту
- c. Хронічного холециститу**
- d. Хронічного панкреатиту
- e. Пептичної виразки

673. Хворий 32-х років, 12 років працював шліфувальником лопастей на турбінному заводі. Потрапив до профпатолога із скаргами на оніміння, поколювання, відчуття повзання комах, ниючий біль у дистальних відділах рук, підвищену мерзлякуватість пальців кистей в спокійному стані, після роботи і вночі. Ці ж прояви з'являються під час охолодження, у разі зміни атмосферного тиску, при виконанні тяжкої фізичної роботи. Після тривалих перерв у роботі неприємні відчуття в руках зникають. Яке професійне захворювання у шліфувальника найбільш вірогідне?

- a. Вібраційна хвороба**
- b. Поліневрит
- c. Хвороба Рейно
- d. Остеоартроз
- e. Хвороба Бехтерева

674. Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- a. Налоксон**
- b. Атропін
- c. Адреналін
- d. Прозерин
- e. Мезатон

675. Згідно результатів бактеріологічного обстеження поліклініки, старша медсестра поліклініки прийняла певні рішення щодо посилення протиепідемічного режиму. Якому рівню управління відповідають ці рішення?

- a. Тактичному
- b. Координаційному
- c. Оперативному**
- d. Перспективному
- e. Стратегічному

676. У пацієнта з мітральним стенозом раптово почався кашель з рожевим пінистим харкотинням. Об'єктивно: на обличчі рум'янець з синюшим відтінком губ та кінчика носа. В легенях дихання послаблене, в нижніх відділах вологі хрипи. Частота дихальних рухів - 28/хв. Тони серця глухі, миготлива аритмія, частота серцевих ско-рочень - 120/хв. Пульс - 92/хв., АТ-105/60 мм рт.ст. Який стан виник у пацієнта?

- a. набряк легень**
- b. Серцева астма
- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Бронхіальна астма
- e. Істерична астма

677. До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), відноситься:

- a. Цироз печінки**
- b. Нирковокам'яна хвороба

- c. Гіпертонічна хвороба I стадії
- d. Хронічний панкреатит
- e. Хронічний гастрит

678. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирці мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

a. Везикулопустульоз

- b. Фурункульоз
- c. Псевдофурункульоз
- d. Герпес-інфекція
- e. Пухирчатка новонароджених

679. По обов'язковості виконання медичні стандарти бувають:

- a. Міжнародні
- b. Регіональні
- c. Локальні

d. Законодавчі

- e. Національні

680. Ви головна медична сестра ЦРЛ. Проводите заняття на тему "Правець". З якого віку починають проводити планову імунізацію усьому населенню проти правця?

- a. З 5 місяців
- b. З 6 місяців
- c. З 2 місяців

d. З 3 місяців

- e. З 4 місяців

681. Постраждалий 24-х років, отримав електротравму на виробництві. З чого необхідно розпочати першу невідкладну допомогу?

- a. Непрямого масажу серця
- b. Надання кисисотерапії

c. Звільнити потерпілого від дії електричного струму

- d. Накладання асептичної пов'язки
- e. ШВЛ

682. При вивченні захворюваності на грип використовувались статистичні талони. Що це за метод вивчення захворюваності?

- a. Опитування
- b. Медичний огляд окремих груп населення
- c. Амбулаторне дослідження

d. Звернення за лікарською допомогою

- e. Спеціальне вибіркоче дослідження

683. Ви працюєте в центрі медичної статистики. Облік всіх захворювань (гострих і хронічних), які зареєстровані у населення певної території за певний період, визначає:

- a. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

b. Загальна захворюваність

- c. Госпітальна захворюваність
- d. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання
- e. Інфекційна захворюваність

684. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

a. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

- b. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з позначкою "6+"
- c. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон

з позначкою "-"

d. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"

e. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

685. Пацієнт 60-ти років з діагнозом ІХС: гострий коронарний синдром. Після по-рушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудниною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях ви-слуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів лікар застосує для корекції гемодинаміки?

a. Мезатон

b. Дофамін

c. Ефедрин

d. Строфантин

e. Атропін

686. Пацієнт 52-х років, поступив у приймальне відділення з такими проблемами: сильний біль у ділянці серця стискаючого характеру, який віддає в ліву руку, тривалістю більше 30 хв. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

a. Пневмонію

b. Стенокардію

c. Остеохондроз

d. Набряк легень

e. Інфаркт міокарда

687. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпо- педальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести вну-трішньовенно протисудомний препарат у дозі:

a. 0,5% діазепам 0,2 мл

b. 0,5% сибазон 0,5 мл

c. 0,5% седуксен 0,5 мл

d. 0,5% сибазон 0,8 мл

e. 0,5% діазепам 2,5 мл

688. В дитячій поліклініці №2 за звітний період було щеплено 2337 дітей, прочитано 1000 лекцій в навчальних закладах з питань зниження захворюваності, створення сприятливих умов для нормального розвитку та навчання дітей. Який характер носять проведені заходи?

a. Амбулаторно-поліклінічні

b. Лікувально-діагностичні

c. Медичні

d. Змішані

e. Первинно-профілактичні

689. Вкажіть, яким органом проводиться акредитація ЛПЗ:

a. Органами виконавчої влади на місцях

b. Спеціальними акредитаційними комісіями

c. Виконкомом ради народних депутатів

d. Облздороввідділом

e. Міністерством охорони здоров'я

690. Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

a. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

b. Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

c. По мірі забруднення приміщення

d. Кожного дня із застосуванням пилососу

e. Кожного дня вологим способом без застосування миючих засобів

691. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

- a. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати
- b. Ціна та собівартість медичних послуг
- c. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів**
- d. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису
- e. Собівартість медичних послуг і загальні доходи

692. Пацієнт 49-ти років доставлений в хірургічне відділення з різаною раною лівого стегна. Після зупинки кровотечі лікар призначив переливання крові. Вкажіть, що необхідно підготувати медсестрі для проведення проби на індивідуальну сумісність:

- a. Сироватку пацієнта і розчин поліглюкіну
- b. Сироватку пацієнта та еритроцити донора**
- c. Еритроцити пацієнта і розчин желатину
- d. Еритроцити пацієнта і сироватку донора
- e. Сироватку пацієнта і сироватку донора

693. У пацієнта через деякий час після введення цефтриаксону набрякло обличчя, повіки стали тяжкими, перешкоджають відкриванню очей, утруднене дихання. Іу- би збільшились. Шкіра в місцях набряку бліда, із жовтуватим відтінком. Який стан розвинувся у пацієнта?

- a. Кропив'янка
- b. Анафілактичний шок
- c. Сироваткова хвороба
- d. Набряк Квінке**
- e. Бронхоспазм

694. Медсестра інфекційної лікарні приготувала все необхідне для взяття мазку із ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для підтвердження якого захворювання проводиться дана процедура?

- a. Дифтерія
- b. Кашлюк**
- c. Кір
- d. Червона висипка
- e. Скарлатина

695. Дитині 2 роки. Скарги матері на те, що у дитини мають місце: $t^{\circ} - 38,7^{\circ}\text{C}$, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу, блідість, періодичний ціаноз. При аускультції ослаблене дихання, дрібноміхурцеві хрипи. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Назофарингіт
- b. Гострий бронхіт
- c. Бронхіальна астма
- d. Гострий ларингіт
- e. Гостра пневмонія**

696. Медична сестра бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Які з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

- a. Симптом Ортнера
- b. Симптом Труссо**
- c. Симптом Грефе
- d. Симптом Мебіуса
- e. Симптом Галанта

697. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ- 100/60 мм рт.ст., РЗ- 96/хв. Язик сухий, живіт дошко- подібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

- a. Колоноскопія
- b. УЗД
- c. Лапароцентез
- d. Іригоскопія

e. Оглядова рентгенографія

698. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темно-коричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Суха гангрена

- b. Волога гангрена
- c. Термічний опік IV ст.
- d. Хімічний опік II ст.
- e. Хімічний опік III ст.

699. Дільничний педіатр, оглядаючи 5-річну дитину, виставив діагноз кору, катаральний період. Вкажіть який з перерахованих симптомів нижче допоміг у виставленні діагнозу:

- a. Везикулярний висип на шкірі
- b. Біло-сірі плівки на мигдаликах
- c. Свербіж шкіри
- d. Збільшення задньошийних лімфатичних вузлів

e. Білі дрібні плями на слизовій щік

700. У дитини, хворої на холецистохолангіт, визначається болючість унаслідок по-стукування ребром долоні по правій реберній дузі. Такий симптом носить назву:

- a. Позитивного симптому Оппенгейма
- b. Позитивного симптому Кера

c. Позитивного симптому Ортнера

- d. Позитивного симптому Гротта
- e. Позитивного симптому Мерфі

701. На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну складає 300 мкмоль/л за рахунок непрямой фракції. Група крові дитини - B(III) Юі(+)\ У матері - кров групи 0(1) Ші(+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?

a. Гемолітична хвороба новонароджених за системою АБО

- b. Вроджений гепатит
- c. Кон'югаційна жовтяниця
- d. Атрезія жовчовивідних протоків
- e. Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором

702. Хворий 45-ти років, скаржиться на постійний біль у правій пахвинній ділянці наявність пухлиноподібного утворення, яке не вправляється у черевну порожнину. Утворення уперше виявив 3 роки тому, не турбувало і самостійно втягувалось в черевну порожнину. При пальпації: живіт болючий у нижніх відділах. Симптом кашльового поштовху негативний. Яке захворювання у цього хворого?

a. Защемлена грижа

- b. Хронічний апендицит
- c. Кишкова непрохідність
- d. Гострий апендицит
- e. Пухлина пахвинної ділянки

703. Дитина 4-х років відвідує дитячий садок. Захворіла на вітряну віспу. Який період ізоляції потребує дитина?

a. 22 дні

b. До 5-ти днів, від появи останніх висипань

- c. 3 дні з моменту появи висипань
- d. 14 днів з моменту захворювання

е. 21 день

704. При огляді хлопчика 14-ти років спостерігаються: блідість шкіри з ціанотичним відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка, з довгим свистячим видихом. Хрипи чути на відстані. Грудна клітка здута. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані симптоми:

а. Напад бронхіальної астми

b. Крупозна пневмонія

c. Хронічний бронхіт

d. Стафілококова пневмонія

е. Гострий бронхіт

705. Пацієнтка 34-х років, звернулась до лікаря зі скаргами на сильний біль у лівш поперековій ділянці, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Об'єктивно: у лівій поперековій ділянці пальпується болючий інфільтрат розміром 3,5х6,5 см. Шкіра над ним багряно-синього кольору, через виниклі отвори виділяється густий зеленувато-сірий гній та некротичні маси. Вкажіть діагноз:

a. Флегмона

b. Гідраденіт

c. Бешиха

d. Паранефрит

е. Карбункул

706. При огляді дитини 2-х років Ви виявили, що стан її тяжкий, температура тіла - 39,4° C "зірчасті" геморагічні висипання на' сідницях та стегнах. Про яке захворювання слід подумати?

a. Туберкульозний менінгіт

b. Тромбоцитопенія

c. Поліморфна еритема

d. Геморагічний васкуліт

е. Менінгококцемія

707. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

a. Кров на визначення рівня холестерину

b. Загальний аналіз сечі

c. Загальний аналіз крові

d. УЗД органів черевної порожнини

е. Кров на діастазу

708. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38,0°С. Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болючий при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Гострий артрит колінного суглоба

b. Перелом правого колінного суглоба

c. Вивих правого колінного суглоба

d. Флегмона правої гомілки

е. Гострий гематогенний остеомієліт

709. У дитини 4,5 років скарги на підвищення температури тіла до 38,0°С, млявість, зниження апетиту, появу висипань на тілі. Хворіє 3-й день. Об'єктивно: на шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках, крім долонь та стоп, висипання у вигляді папул, кірочок, везикул (однокамерних, з прозорим вмістом, з пупкоподібним вдавленням), які розміщуються на незмінній шкірі. Клінічна картина дозволяє запідозрити:

a. Краснуху

b. Натуральну віспу

с. Вітряну віспу

- d. Скарлатину
- e. Кір

710. Мати 4-річного хлопчика скаржиться на появу у дитини рожевої дрібно папульозної висипки по всьому тілу. Елементи висипки не зливаються. При об'єктивному обстеженні у хлопчика виявлені збільшені підщелепні, задньошийні і потиличні лімфовузли, які при пальпації щільні, рухомі, дещо болючі, шкіра над ними не змінена. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

- a. Кір

b. Краснуха

- c. Вітряна віспа
- d. Скарлатина
- e. Алергічний дерматит

711. Ви - медсестра-бакалавр гастроентерологічного відділення, спостерігаєте за пацієнтом з загостренням виразкової хвороби шлунка. До якого найінформативнішого методу дослідження Ви підготуєте пацієнта?

- a. УЗД органів черевної порожнини
- b. Шлункове зондування
- c. Рентгеноскопія шлунка

d. Фіброгастродуоденоскопія

- e. Дуоденальне зондування

712. Пацієнта 32-х років з черепно-мозковою травмою доставлено в приймальне відділення лікарні. Під час клінічного обстеження пацієнта Ви встановили: потерпілий непритомний, з зовнішнього слухового проходу та носових ходів повільно витікає рідина рожевого кольору, навколо орбітальні гематоми. Поставте діагноз:

- a. Стиснення мозку
- b. Перелом склепіння черепа

c. Перелом основи черепа

- d. Струс мозку
- e. Внутрішньочерепна гематома

713. При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований стати-стичний показник за наступною формулою: $(\text{число мертвонароджених} + \text{число дітей, які померли в постнатальний період}) \times 1000$: число дітей, які народилися живими і мертвими). Як називається розрахований показник?

- a. Питома вага дітей, які померли в постнатальний період
- b. Мертвонароджуваність

c. Перинатальна смертність

- d. Акушерська смертність
- e. Малюкова смертність

714. До медичної сестри школи звернулася 9-річна дитина, із скаргами на млявість, погіршення апетиту, бажання їсти крейду. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді, волосся тьмяне, посічене, нігті ламкі. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?

- a. Геморагічного васкуліту

b. Залізодефіцитної анемії

- c. Апластичної анемії
- d. Гемолітичної анемії
- e. Гострої лейкемії

715. Пацієнт поступив з кровотечею, яка тривала впродовж 2 днів з різаної рани на долоні. Шкіра бліда. На правій руці пов'язка просякла кров'ю. Колінний та над'яtkово-гомілковий суглоби збільшені, деформовані, рухи в них обмежені. Аналіз крові: тромбоцити - $320 \cdot 10^9/\text{л}$, тривалість кровотечі за Дуке - 3 хв., час згор-тання крові - 24 хв. Який діагноз у хворого?

- a. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

b. Постгеморагічна анемія

c. Гемофілія А

d. Гемолітична анемія

e. Геморагічний васкуліт

716. В травмпункт доставлений пацієнт 23-х років, який 40 хвилин тому впав на вулиці зі скутера. Об'єктивно: в середній третині лівого стегна набряк, крововилив, патологічна рухливість. Вкажіть абсолютну ознаку перелому:

a. Пружисті рухи

b. Вимушене положення кінцівки

c. Біль

d. Гіперемія

e. Крепітація

717. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми «Ринок медичних послуг». Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

a. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

b. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська

c. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча

d. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька

e. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька

718. На чолі організації стоїть керівник. При якому типі управління він здійснює всі функції управління?

a. Лінійний тип управління

b. Лінійно-штабний тип управління

c. Функціональний тип управління

d. Розгалужений тип управління

e. Матричний тип управління

719. Ви працюєте медсестрою в школі. Через 2 тижні після перенесеної скарлатини до Вас звернувся хлопчик 12-ти років, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5°C, набряки під очима, зменшену кількість сечі, яка набула червоного кольору. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

a. Інфекція сечових шляхів

b. Пухлина нирки

c. Сечокам'яна хвороба

d. Гломерулонефрит

e. Цистит

720. Постраждалий отримав множинні травми. Накладений дренаж за Бюлау. При якій патології він використовується?

a. Черепно-мозкова травма

b. Защемлена грижа

c. Клапанний пневмоторакс

d. Розрив печінки

e. Гострий апендицит

721. У юнака 19-ти років через 2 тижні після ангіни з'явилися летючі болі і припухлість великих суглобів, підвищення температури до 38°C, серцебиття, еритематозні висипання на шкірі. У крові: лейкоцитоз, ШОЕ- 30 мм/год. С-реактивний білок «+++». Клінічна картина дозволяє запідозрити:

a. Бактеріальний артрит

b. Реактивний артрит

c. Ревматоїдний артрит

d. Хворобу Рейтера

e. Ревматичну хворобу

722. У дівчинки 4-х років млявість, не збільшується маса тіла. Шкіра бліда, суха, лущиться, ламкість волосся, нігтів. Періодично тахікардія, задишка. Тони серця глухі, систолічний шум на верхівці серця. Збільшені печінка та селезінка. Відстає у фізичному розвитку. У загальному аналізі крові знижена кількість гемоглобіну та еритроцитів. Такий стан діагностують при:

a. Гемофілії

b. Анемії

c. Лейкозі

d. Ревматизмі

e. Гіпотрофії

723. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

a. Зрушення pH сечі в лужну сторону

b. Протеїнурія

c. Поява «активних лейкоцитів»

d. Лейкоцитурія

e. Еритроцитурія

724. Медична сестра-бакалавр проводить клінічне обстеження постраждалого 30-ти років після падіння з мотоцикла. Постраждалий скаржиться на біль в правій нозі. Об'єктивно: на передній поверхні гомілки рана з кістковими відламками, кровотеча незначна. Відмічається наявність рухів поза ділянкою суглоба, вимушене положення та деформація кінцівки в зоні ушкодження. Установіть попередній діагноз:

a. Відкритий вивих правої гомілки

b. Відкритий перелом правої гомілки

c. Закритий вивих правої гомілки

d. Рана м'яких тканин правої гомілки

e. Закритий перелом правої гомілки

725. Пацієнт під час введення розчину анальгіну раптово відчув жар, різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: стан тяжкий, шкіра бліда, ЧДР- 28/хв., ЧСС- 100/хв., АТ- 70/20 мм рт.ст. Який препарат слід ввести пацієнту в першу чергу?

a. Супрастин

b. Дофамін

c. Кордіамін

d. Димедрол

e. Адреналін

726. Дитині 8 років. Під час профілактичного огляду медична сестра-бакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та 8-подібне ви-кривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

a. Лордоз грудного відділу хребта

b. Хондродистрофію

c. Кіфоз грудного відділу хребта

d. Сколіоз грудного відділу хребта

e. Залишкові явища перенесеного рахіту

727. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) x 1000/середньорічна чисельність населення - визначається:

a. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

b. Первинна захворюваність

c. Госпітальна захворюваність

d. Інфекційна захворюваність

e. Поширеність захворювань

728. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, задишка, свербіння шкіри. При огляді виявлені

великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

- a. Септичний шок
- b. Пірогенна реакція
- c. Цитратний шок
- d. Анафілактична реакція**
- e. Гемолітична реакція

729. В стаціонарі хворий 36-ти років готується до операції з приводу гострого перитоніту. Який симптом характерний при цьому захворюванні?

- a. -
- b. Щоткіна-Блюмберга**
- c. Роздольського
- d. Ортнера-Грекова
- e. Мейо-Робсона

730. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається крепітація та патологічна рухливість. Рз- 120/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Стан пацієнта відповідає:

- a. Шок II ступеня**
- b. Шок IV ступеня
- c. Передагонія
- d. Шок III ступеня
- e. Шок I ступеня

731. Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в дано-му випадку?

- a. Плевроперикардіальний шум
- b. Крепітація**
- c. Шум тертя перикарду
- d. Шум тертя плеври
- e. Дрібноміхурцеві хрипи

732. Медсестра в праві розкрити конфіденційну інформацію про пацієнта тільки:

- a. З дозволу лікуючого лікаря
- b. Будь-коли, бо на медсестер правило лікарської таємниці не поширюється
- c. За згодою пацієнта та у випадках передбачених законом**
- d. На прохання родичів
- e. За своїми переконаннями

733. Ви старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

- a. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд
- b. Тарифна система та нормування праці**
- c. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- d. Посадовий оклад, тарифна ставка
- e. -

734. В населеному пункті при вивченні смертності серед населення було встановлено, що причиною смерті в 34% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22% - новоутворення. Визначте статистичний характер наведених показників:

- a. Інтенсивні
- b. Наочності та співвідношення
- c. Співвідношення
- d. Наочності
- e. Екстенсивні**

735. В хірургічне відділення поступила пацієнтка 63-х років зі скаргами на біль і посмикування м'язів в ділянці колотої рани лівої стопи, яку отримала 5 днів тому, коли випадково наступила на цвях. Вкажіть клінічну ознаку при подальшому обстеженні та прогресуванні захворювання:

- a. Симптом "окулярів"
- b. "Сардонічна посмішка"**
- c. Гнівний погляд
- d. Симптом Грефе
- e. Обличчя "Гіппократа"

736. Кесонна хвороба - захворювання, яке розвивається внаслідок роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску. Основним фактором патогенезу кесонної хвороби є:

- a. Емболія кровоносних судин**
- b. Обструкція бронхів
- c. Тромбоз кровоносних судин
- d. Зменшення легеневої вентиляції
- e. Ангіоспазм

737. Ви працюєте в кабінеті медичної статистики ЛПЗ. Що є одиницею спостереження при вивченні госпітальної захворюваності?

- a. Кожний випадок звертання хворого до лікаря з приводу будь-якого захворювання
- b. Кожний випадок гострого захворювання
- c. Кожний випадок госпіталізації хворого з приводу будь-якого захворювання**
- d. Кожний випадок захворювання хворого
- e. Кожний випадок госпіталізації хворого з приводу захворювання з хірургічним втручанням

738. Комунальні заклади охорони здоров'я є формальними організаціями. Назвіть головні риси формальної організації:

- a. Відсутність єдності в діях її членів
- b. Постійний твердий тиск на її членів з метою поліпшення якості роботи
- c. Наявність посадових інструкцій і приписів
- d. Свідома координація дій двох або більше осіб для досягнення певних результатів**
- e. Постійна згода всіх членів організації з будь-якими рішеннями керівника