

1. Пацієнту, у якого виявлено хронічну бактеріальну інфекцію, призначено дослідження функціональної активності нейтрофілів. Яке дослідження проводиться для визначення бактерицидної активності киснезалежних процесів фагоцитозу?

a. Тест поглинання нітросинього тетразолю

- b. Визначення фагоцитарного числа
- c. Реакція гальмування міграції лейкоцитів
- d. Реакція агломерації лейкоцитів
- e. Визначення індексу завершеності фагоцитозу

2. Пацієнтка віком 67 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на задишку під час незначного фізичного навантаження, появу набряків на нижніх кінцівках та швидку втомлюваність. Об'єктивно спостерігається: акроціаноз, розширення меж серця, в легенях вислуховуються вологі хрипи. Рівень мозкового натрійуретичного пептиду в крові - 200 пг/мл. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ)
- b. Нефротичного синдрому
- c. Ішемічної хвороби серця

d. Хронічної серцевої недостатності

e. Цирозу печінки

3. У пацієнта віком 37 років через 9 діб після введення препарату, що містить правцевий анатоксин, розвинулися такі симптоми: підвищилася температура тіла до $37,9^{\circ}\text{C}$, збільшилися лімфатичні вузли, з'явилися алергічний висип та свербіж шкіри, артралгія, міалгія. В аналізі крові: прискорення ШОЕ, помірний лейкоцитоз, еозінофілія, зниження вмісту комплементу. Укажіть вид імунокомплексної реакції III типу, що розвинулася у пацієнта.

a. Ревматоїдний артрит

b. Сироваткова хвороба

- c. Системний червоний вовчак
- d. Кропив'янка
- e. Вузликовий периартеріїт

4. Лікар - лаборант складає звіт про результати дослідження, проведеного шляхом полімеразно - ланцюгової реакції для виявлення ДНК вірусу гепатиту С у пацієнта. Які дані можуть бути відсутні у бланку звіту?

a. Унікальна ідентифікація пацієнта

b. Назва лабораторної інформаційної системи

- c. Визначення лабораторії, що видає звіт
- d. Чітка ідентифікація проведених досліджень
- e. Тип первинного зразка

5. У дитини спостерігається підвищення температури тіла до 39°C та кашель із виділенням великої кількості слизово - гнійного мокротиння. Результати мікроскопічного дослідження мокротиння: багато фібрину, поодинокі еритроцити, альвеолярні епітеліоцити з ознаками жирової дистрофії, лейкоцити - 12 у полі зору мікроскопа. Концентрація С - реактивного білка в плазмі крові - 115 мг/л. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Бронхоектатичної хвороби
- b. Бронхіальної астми
- c. Туберкульозу легень
- d. Пневмотораксу

e. Пневмонії

6. Фармацевтична компанія розробляє цитокіни за допомогою технології рекомбінантної ДНК, оптимізуючи їх для ефективного всмоктування через шкіру. Який із нижченаведених цитокінів здатен зменшити тяжкість шкірної запальної реакції у разі місцевого застосування?

- a. -
- b. IL - 2
- c. IL - 10

- d. IL - 8
- e. IL - 3

7. Який спеціальний метод фарбування використовується для виявлення атипівних клітин у мазку із шийки матки з метою ранньої діагностики передракових станів та раку шийки матки?

- a. За Грамом
- b. За Папаніколау**
- c. За Майн - Грюнвальдом
- d. За Цілем - Нільсеном
- e. За Романовським - Гімзою

8. У дівчини віком 19 років під час гінекологічного обстеження виявлено ознаки недорозвинення внутрішніх статевих органів. Попередній діагноз: первинна недостатність яєчників. Дослідження рівня якого гормону в крові пацієнтки необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- a. Пролактину
- b. Окситоцину
- c. Глюкагону
- d. Інсуліну
- e. Фолікулостимулюючого**

9. Пацієнт скаржиться на наростаючу слабкість, підвищення температури тіла, пітливість. Результати клінічного аналізу крові вказують на розвиток прогресуючої гіперхромної анемії, еритроцити - $2,9 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 130 г/л, лейкоцити - $5 \cdot 10^9/л$. Лейкограма з мієлобластами та одиничними еритробластами. У пунктаті кісткового мозку виявлено велику кількість еритробластів, мегалобластів, мієлобластів. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Лімфогранулематозу
- b. Хронічного моноцитарного лейкозу
- c. Гострого мієлоїдного лейкозу
- d. Справжньої поліцитемії
- e. Еритромієлозу**

10. Пацієнтка скаржиться на дратівливість, підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, відчуття жару. За результатами лабораторних досліджень у сироватці крові виявлено підвищення рівнів тироксину (Т3) і трийодтироніну (Т4), а також зниження рівня тиреотропного гормону (ТТГ). Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Еутиреозу
- b. Гіпотиреозу
- c. Гіпертиреозу**
- d. Гіпопаратиреозу
- e. Гіперпаратиреозу

11. У пацієнта з припущенням на новоутворення шлунково - кишкового тракту взято матеріал для цитологічного дослідження. У цитологічних мазках виявлено: пласти епітеліоцитів слизової оболонки з ознаками проліферації, трапляються двоядерні збільшені клітини, в ядрах яких наявні кілька ядерець. Цитоплазма епітелію різко базофільна та зерниста. В окремих клітинах спостерігається вакуолізація цитоплазми, каріолізис і каріорексис, а також наявність множинних патологічних мітозів. Яка з нижченаведених ознак свідчить про розвиток злоякісного процесу?

- a. Патологічні мітози**
- b. Проліферація клітин
- c. Вакуолізація ядер
- d. Каріолізис
- e. Каріорексис

12. Які зміни в біохімічному аналізі крові є типовими для хвороби Аддісона (первинного

гіпокортицизму)?

- a. Гіпонатріємія, гіпокаліємія
- b. Гіпонатріємія, гіперкаліємія**
- c. Гіпернатріємія, гіперкаліємія
- d. Гіпернатріємія, гіпокаліємія
- e. -

13. Під час лабораторного дослідження крові пацієнта, якого шпиталізовано у тяжкому стані, виявлено такі показники: лейкоцити - $72 \cdot 10^9/\text{л}$, лімфоцити - $16 \cdot 10^9/\text{л}$, поява пролімфоцитів та лімфобластів, в мазках крові виявлено напівзруйновані ядра лімфоцитів - тіні Гумпрехта. Для якого гемобластозу характерні ці результати дослідження?

- a. Справжньої поліцитемії
- b. Хронічного мієлоїдного лейкозу
- c. Ідіопатичного мієлофіброзу
- d. Хронічного лімфоїдного лейкозу**
- e. Гострого мієлоїдного лейкозу

14. Лейкоплакія шийки матки належить до передракових захворювань. Наявність яких клітин у цитологічних мазках характерна для цієї патології?

- a. Метаплазованих
- b. Зроговілих без'ядерних**
- c. Численних клітин із світлою цитоплазмою
- d. -
- e. Резервних

15. Чоловік віком 35 років скаржиться на загальну слабкість, швидку стомлюваність та тяжкість у лівому підребер'ї. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри та слизових оболонок, значне збільшення селезінки. За результатами загального аналізу крові виявлено гіпохромну анемію, гіперлейкоцитоз, тромбоцитоз. У лейкоформулі - зсув вліво нейтрофілів до промієлоцитів. Цитогенетичне дослідження кісткового мозку виявило наявність "філадельфійської хромосоми". Для якого гемобластозу характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Ідіопатичного мієлофіброзу
- b. Гострого лейкозу
- c. Хронічного мієлоїдного лейкозу**
- d. Хронічного лімфоїдного лейкозу
- e. Лейкемоїдної реакції

16. У пацієнтки віком 22 роки після пологів виявлено виворіт слизової оболонки каналу шийки матки, що обмежується нижнім її відділом, спостерігається рубцева деформація шийки матки. У цитологічних препаратах мазків із зони деформації шийки матки переважають клітини циліндричного епітелію та клітини плоского епітелію без ознак атипії, лейкоцити 2 - 6 у полі зору мікроскопа. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- a. Ектропіону**
- b. Ектопії
- c. Цервіциту
- d. Дисплазії
- e. Карциноми in situ

17. Для якого онкологічного захворювання характерне підвищення рівня пухлино - асоційованого антигена СА 15 - 3 у сироватці крові?

- a. Лімфогранулематозу
- b. Гемобластозу
- c. Раку підшлункової залози
- d. Раку грудної залози**
- e. Раку щитоподібної залози

18. У семирічної дитини спостерігається загальна слабкість, носові кровотечі та підвищення

температури тіла. Результати загального аналізу крові: лейкоцитоз, численні лімфобласти, "лейкемічний провал". Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Лімфогранулематозу
- b. Гострого лімфобластного лейкозу**
- c. Хронічного лімфоїдного лейкозу
- d. Хронічний мієлоїдного лейкозу
- e. Інфекційного мононуклеозу

19. Які з нижченаведених показників кислотно - основного стану (КОС) артеріальної крові відповідають нормі?

- a. pH = 7,5, pCO₂ = 45 мм рт. ст., BE = +10 мМ/л
- b. pH = 7,6, pCO₂ = 20 мм рт. ст., BE = +1 мМ/л
- c. pH = 7,4, pCO₂ = 40 мм рт. ст., BE = +1 мМ/л**
- d. pH = 7,15, pCO₂ = 40 мм рт. ст., BE = - 10 мМ/л
- e. pH = 7,3, pCO₂ = 60 мм рт. ст., BE = +4 мМ/л

20. Зразок крові пацієнта для дослідження системи гемостазу доставлено до лабораторії у пробірці з цитратом натрію. Зазначено, що рівень крові в пробірці на 20% нижчий від мітки об'єму. Температура в контейнері для транспортування зразка становить 20°С. Лаборант одразу відмовився від використання цього зразка. Яка найімовірніша причина відбракування біоматеріалу у цьому разі?

- a. -
- b. Порушення температурного режиму під час транспортування
- c. Порушення співвідношення цільна кров/антикоагулянт**
- d. Недостатній об'єм біоматеріалу для проведення дослідження
- e. Використання пробірки з неправильним антикоагулянтом

21. Відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 15189:2022 "Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності" лабораторія зобов'язана впроваджувати процедури внутрішнього контролю якості для моніторингу поточної валідності результатів досліджень. З якою частотою має виконуватися ця процедура згідно з вимогами стандарту?

- a. Із будь - якою частотою, встановленою в лабораторії, але не рідше 1 разу на тиждень
- b. Із частотою, що ґрунтується на стабільності та надійності методу обстеження та ризику заподіяння шкоди пацієнту через помилковий результат**
- c. Із частотою, яка визначається наявністю часу на виконання контрольних вимірювань
- d. Із частотою, яка визначається рівнем економічного та матеріально - технічного забезпечення лабораторії
- e. Із будь - якою частотою, встановленою в лабораторії, але не рідше 1 разу на день

22. Які клітини імунної системи разом із В - лімфоцитами беруть участь у розвитку специфічної імунної відповіді?

- a. Гепатоцити та еритроцити
- b. Фолікулярні дендритні клітини та Т - лімфоцити**
- c. Базофіли та Т - лімфоцити
- d. Фолікулярні дендритні клітини та базофіли
- e. Гепатоцити та базофіли

23. Визначення рівня якого біомаркера використовується для діагностики ревматоїдного артриту?

- a. Антитіл до двоспиральної ДНК
- b. Антитіл до тиреоглобуліну
- c. Антинуклеарних антитіл
- d. Антитіл до циклічного цитрулінового пептиду**
- e. Кальцитоніну

24. У пацієнтки віком 40 років спостерігається ожиріння з перерозподілом підшкірної жирової клітковини (із переважним відкладенням її на обличчі та тулубі), а також артеріальна

гіпертензія з високим систолічним і діастолічним тиском, наявність розтяжок (стрій) на шкірі. У крові: підвищення рівня кортизолу, гіперглікемія, лейкоцитоз із лімфопенією. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Гіпертиреозу
- b. Акромегалії
- c. Гіпотиреозу
- d. Синдрому Конна
- e. Хвороби Іценко - Кушинга

25. Під час мікроскопічного дослідження вагінального мазка, зафарбованого за методом Паппенгейма, на тлі численних лейкоцитів виявлено одноклітинні паразити округлої або грушоподібної форми, розміром 15 - 20 мкм. Мають ексцентрично розташоване видовжене ядро у вигляді сливової кісточки, світло - блакитну вакуолізовану цитоплазму та джгутики. Який паразит виявлено у мазку?

- a. Лейшманії
- b. Амеби
- c. Трихомонади
- d. Трипаносоми
- e. Лямблії

26. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз. Які зміни в загальному аналізі крові найхарактерніші для цього захворювання?

- a. Лейкемічний провал
- b. Лейкоцитоз
- c. Лейкопенія
- d. Зсув лейкоцитарної формули вліво
- e. -

27. У пацієнта віком 38 років після вживання коров'ячого молока виникають симптоми алергії. Відомо, що харчова алергія обумовлена реакцією гіперчутливості негайного типу. Який медіатор відіграє основну роль у виникненні клінічних проявів цього типу гіперчутливості?

- a. Серотонін
- b. Гістамінолібератор
- c. Брадикінін
- d. Гістамін
- e. Лейкотрієн

28. Синтез якого C21 - стероїдного гормону починається з гідроксилювання прогестерону по C17 - положенню?

- a. Прегненалону
- b. Кортикостерону
- c. Кортизолу
- d. Альдостерону
- e. Тестостерону

29. У пацієнта на шкірі обличчя візуалізується виразка, оточена еритематозною зоною. Під час дослідження цитологічного матеріалу, взятого із зони виразки, виявлено епітеліоподібні, веретеноподібні та невусоподібні клітини. Епітеліоподібні клітини різної форми та розміру, серед яких трапляються гігантські клітини, що містять різну кількість хроматину. Цитоплазма таких клітин містить невелику кількість зерен меланіну різної величини, ядра їх гіперхромні, великі, багато фігур мітозу. Визначте вид новоутворення шкіри.

- a. Невус
- b. Меланома
- c. Базальноклітинний рак шкіри
- d. -
- e. Плоскоклітинний рак шкіри

30. Пацієнтка після операції на аортальному клапані упродовж 2 - х місяців приймає пероральні

антикоагулянти непрямої дії. Який лабораторний показник коагулограми є основним для оцінки ефективності цієї терапії?

- a. Тромбіновий час
- b. D - димер
- c. Активований частковий тромбопластиновий час
- d. Міжнародне нормалізоване відношення**
- e. Фібриноген

31. У лабораторії плануються і обговорюються алгоритми заходів внутрішньолaboratorного контролю якості. Укажіть обов'язкові умови для проведення вимірювання контрольного матеріалу.

- a. Винятково після проведення досліджень проб пацієнтів
- b. У разі зміни чергових лаборантів
- c. Винятково перед початком роботи
- d. У той же спосіб, що і проби пацієнтів**
- e. У разі зміни умов навколишнього середовища (температура, вологість)

32. Пацієнту віком 24 роки із гарячкою нез'ясованого генезу призначено дослідження факторів гуморального неспецифічного імунного захисту. Який із наведених нижче факторів продукується макрофагами і клітинами слизових оболонок?

- a. Циркуючі імунні комплекси
- b. IgM
- c. IgG
- d. Лізоцим**
- e. -

33. Чоловік віком 50 років скаржиться на біль у кістках. Результати загального аналізу крові: еритроцити - $3,3 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 100 г/л, лейкоцити - $6,5 \cdot 10^9/л$, сегментоядерні нейтрофіли - 50%, лімфоцити - 32%, моноцити - 18%, ШОЕ - 62 мм/год. На рентгенограмі кісток черепа виявлено дрібні множинні дефекти. У пунктаті кісткового мозку кількість плазматичних клітин перевищує 50%. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Множинної мієломи**
- b. Апластичної анемії
- c. Системного червоного вовчака
- d. Хвороби Віллебранда
- e. Ревматоїдного артрити

34. Пацієнт віком 60 років скаржиться на часті кровотечі з ясен і підвищену схильність до утворення синців навіть у разі незначних травм. Останнім часом кровотечі стали тривалішими, ніж раніше. Під час обстеження у пацієнта не виявлено захворювань печінки або інших патологій, які могли б пояснити появу цих симптомів. Результати коагулограми: протромбіновий час - 12 с, активований частковий тромбопластиновий час - 28 с, фібриноген - 1,2 г/л, тромбіновий час - 18 с. Кількість тромбоцитів у крові - 220 тис./мкл. Який лабораторний показник свідчить про порушення в системі гемостазу у пацієнта?

- a. Активований частковий тромбопластиновий час
- b. Тромбіновий час
- c. Протромбіновий час
- d. Фібриноген**
- e. Тромбоцити

35. Чоловік віком 49 років, який хворіє на хронічне захворювання нирок, скаржиться на погіршення самопочуття, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, холодна та суха на дотик, гепатомегалія, набряки (спочатку виникали на повіках та обличчі, а згодом поширилися по всьому тілу, стали стійкими, вираженими). Результати загального аналізу сечі: відносна густина - 1,030, значна (масивна) протеїнурія - $>3,0$ г/добу, циліндрурія, наявність в осаді сечі кристалів холестерину та крапель нейтрального жиру. Для якої патології характерні ці клініко - лабораторні показники?

а. Гострого гломерулонефриту

б. Нейфротичного синдрому

с. Гострого пієлонефриту

д. Цирозу печінки

е. Сечокам'яної хвороби

36. Жінка віком 65 років скаржиться на появу частих носових кровотеч, підвищену кровоточивість ясен і швидку втомлюваність. Подібних скарг раніше не було. В анамнезі: хронічне захворювання печінки. Результати коагулограми: протромбіновий час - 15 с, активований частковий тромбoplastиновий час - 32 с, протромбіновий індекс - 65%, міжнародне нормалізоване відношення - 1,2, фібриноген - 3 г/л. Який лабораторний показник вказує на порушення в системі гемостазу у пацієнтки?

а. Протромбіновий індекс

б. Міжнародне нормалізоване відношення

с. Фібриноген

д. Активований частковий тромбoplastиновий час

е. Протромбіновий час

37. Результати клінічного аналізу крові пацієнта, у якого спостерігаються симптоми анемії, такі: гемоглобін - 100 г/л, КР - 0,7, еритроцити - $2,9 \cdot 10^{12}/л$, кількість ретикулоцитів у межах норми. У мазку крові визначається мікро - та анізоцитоз. Класифікуйте вид анемії.

а. Гіпохромна

б. Нормохромна

с. Мегалобластна

д. Гемолітична

е. Гіперхромна

38. Пацієнту, який скаржиться на частий біль у правому підбер'ї, відчуття гіркоти у роті та епізодичну нудоту, проведено дуоденальне зондування. Під час мікроскопічного дослідження жовчі в порції А виявлено велику кількість кристалів білірубінату кальцію, холестерину та жовчних кислот. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

а. Вірусного гепатиту

б. Жовчнокам'яної хвороби

с. Цирозу печінки

д. Сечокам'яної хвороби

е. Гострого панкреатиту

39. Які лабораторні зміни в клінічному аналізі крові є характерними для хронічного лімфоїдного лейкозу?

а. -

б. Лейкопенія з незначним лімфоцитозом

с. Нормальна кількість лейкоцитів із незначним лімфоцитозом

д. Лейкоцитоз із абсолютним лімфоцитозом та наявністю клітини лейколізу

е. Лейкоцитоз із нейтрофіліозом

40. Пацієнту встановлено діагноз: залізодефіцитна анемія. На момент проведення лабораторного дослідження з'ясувалося, що рівень феритину в крові - 70 нг/мл. Який із нижченаведених факторів міг стати причиною підвищення рівня цього показника?

а. Фізичне навантаження

б. Прийом вітамінів або антибіотиків

с. Специфічне дієтичне харчування

д. -

е. Наявність запального процесу (гострофазова реакція)

41. Поява яких клітин у периферичній крові характерна для гострого лейкозу?

а. Бластів

б. Плазматичних клітин

с. Атипових мононуклеарів

d. Мікросфероцитів

e. -

42. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на задишку, біль у грудній клітці, що посилюється під час вдиху, та набряк правої нижньої кінцівки. З анамнезу з'ясувалося, що пацієнт нещодавно переніс операцію на колінному суглобі, веде малорухливий спосіб життя. Попередній діагноз: тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА). Результати коагулограми: протромбіновий час - 12 с, активований частковий тромбопластиновий час - 30 с, міжнародне нормалізоване відношення - 1,1, антитромбін III - 85%, уміст D - димеру - 1500 нг/мл. Який лабораторний показник є підтвердженням розвитку тромбоемболічного процесу?

a. D - димер

b. Міжнародне нормалізоване відношення

c. Протромбіновий час

d. Антитромбін III

e. Активований частковий тромбопластиновий час

43. Пацієнтка скаржиться на відчуття стороннього тіла в горлі, появу хриплого голосу, утруднення ковтання, візуальне збільшення щитоподібної залози. У крові виявлено підвищення рівня антитіл до тиреоглобуліну та до тиреопероксидази, підвищення IgG. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

a. Гіпопаратиреозу

b. Аденоми парашитоподібної залози

c. Гіпертиреозу

d. Гіпотиреозу

e. Аутоімунного тиреоїдиту

44. Для якого захворювання є характерним підвищення рівня міді в сироватці крові?

a. Муковісцидозу

b. Хвороби Вільсона - Коновалова

c. Саркоїдозу

d. Первинного остеопорозу

e. Гемохроматозу

45. Чоловік віком 45 років скаржиться на нездужання, головний біль, набряки обличчя, підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$ та АТ до 160/100 мм рт. ст. Результати загального аналізу сечі: реакція (рН) - слабкокисла, відносна щільність - 1,032, білок - 3,2 г/л, еритроцити - 15 - 20 у полі зору мікроскопа, лейкоцити - до 8 у полі зору мікроскопа, гіалінові циліндри - 6 у полі зору мікроскопа, зернисті циліндри - 5 у полі зору мікроскопа. Для якого захворювання характерні ці клініко - лабораторні показники?

a. Гострого пієлонефриту

b. Амілоїдозу нирок

c. Гострого циститу

d. Гострого гломерулонефриту

e. Сечокам'яної хвороби

46. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу кров'янистих прозоро - бурих виділень із соска грудної залози. В анамнезі: дисфункція яєчників. Результати мікроскопічного дослідження цитологічного препарату виділень: комплекси впорядковано розташованих мономорфних кубічних клітин з ознаками гіперплазії, поодинокі клітини залозистого епітелію. Укажіть тип пухлини.

a. Фібroadенома

b. Інвазивна протокова карцинома

c. Неінвазивна внутрішньопротокова карцинома

d. Інвазивна дольова карцинома

e. Внутрішньопротокова папілома

47. Пацієнту віком 68 років призначено антибактеріальні лікарські засоби для лікування пневмонії. Наприкінці курсу лікування з'явилися скарги на біль у горлі та кашель. Об'єктивно

спостерігається: гіперемія зіву та білуваті нашарування на поверхні мигдаликів і стінок глотки. Під час мікроскопічного дослідження мазків, зафарбованих за методом Грама, визначаються лейкоцити, нитки міцелію та спори дріжджоподібних грибків. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Вірусного фарингіту
- b. Кандидомікозу глотки**
- c. Дифтерії глотки
- d. Хронічного гіпертрофічного фарингіту
- e. Бактеріального фарингіту

48. Пацієнту встановлено діагноз: поліноз. Лікар призначив дослідження імунограми для визначення імунного статусу пацієнта. Підвищення рівня імуноглобулінів якого класу характерно для цього захворювання?

- a. IgM
- b. IgA
- c. IgD
- d. IgG
- e. IgE**

49. Укажіть варіант раку, що найчастіше розвивається в сечовому міхурі.

- a. Плоскоклітинний
- b. Недиференційований
- c. Перехідноклітинний**
- d. Аденокарцинома
- e. Залозистий

50. У пацієнта спостерігається значне збільшення добового діурезу без наявності глюкозурії. Дефіцит якого гормону є причиною розвитку такого стану?

- a. Вазопресину**
- b. Альдостерону
- c. Адреналіну
- d. Інсуліну
- e. Окситоцину

51. Які морфологічні критерії є цитологічним маркером кишкової метаплазії епітелію шлунка?

- a. -
- b. Атипія клітин
- c. Наявність великої кількості клітин епітелію залоз
- d. Наявність клітин витягнутої форми з ексцентрично розташованими ядрами**
- e. Проліферація покровно - ямкового епітелію

52. Пацієнт віком 55 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на постійну втому, зниження апетиту, появу жовтяниці та свербіж шкіри. За результатами лабораторних досліджень виявлено зниження концентрації альбуміну та підвищення активності ізоензиму лактатдегідрогенази 5 (ЛДГ - 5) в крові. Для ураження якого органа характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Селезінки
- b. Серця
- c. Нирки
- d. Печінки**
- e. Легень

53. У десятирічного хлопчика протягом кількох місяців спостерігаються загальна слабкість, блідість шкіри, зниження апетиту, поява набряків на обличчі та нижніх кінцівках та підвищення артеріального тиску. Попередній діагноз: хронічна ниркова недостатність. Який із нижченаведених лабораторних показників є основним для оцінки функції нирок?

- a. Креатинін**
- b. Вітамін D

- c. Білірубін
- d. Кальцій
- e. Глюкоза

54. Пацієнтка віком 29 років скаржиться на посилення апетиту, різке збільшення маси тіла, порушення менструального циклу (менструації мізерні, не регулярні). Відомо, що два роки тому пацієнтці встановили діагноз: гіпотиреоз. Дослідження рівня якого гормону в крові доцільно провести для з'ясування причини порушень менструального циклу?

- a. Соматотропіну
- b. Пролактину**
- c. Окситоцину
- d. Інсуліну
- e. Адреналіну

55. У пацієнта перебіг виразкової хвороби дванадцятипалої кишки ускладнився розвитком шлунково - кишкової кровотечі. Який колір калових мас характерний для цього ускладнення?

- a. Коричневий із яскравими червоними краплями
- b. Сірувато - білий
- c. Чорний (дьюгтеподібний)**
- d. Світло - жовтий
- e. Зелений

56. У дворічної дитини, яка часто хворіє на вірусні та грибкові інфекції, діагностовано синдром Ді - Джорджі. Укажіть діагностичні критерії цього захворювання.

- a. Гіперплазія тимусу з повною відсутністю NK - клітин
- b. Гіперплазія тимусу з повною відсутністю В - лімфоцитів
- c. Гіперплазія тимусу з повною відсутністю Т - лімфоцитів
- d. Гіпоплазія або відносна відсутність тимусу з повною відсутністю макрофагів
- e. Гіпоплазія або повна відсутність тимусу з повною відсутністю Т - лімфоцитів**

57. Під час дослідження пунктату щитоподібної залози визначаються елементи хронічного запалення: макрофаги, гістіоцити, фіброцити, фібробласти, нейтрофільні та еозинофільні гранулоцити. Також визначаються фолікулярні клітини з ознаками дегенерації, тяжі безклітинної оксифільної субстанції, колоїд, обривки капілярів, багато гігантських багатоядерних клітин (клітин сторонніх тіл). Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- a. Ендемічного колоїдного зоба
- b. Медулярного раку щитоподібної залози
- c. -
- d. Папілярного раку щитоподібної залози
- e. Підгострого тиреоїдиту (тиреоїдиту де Кервена)**

58. Пацієнт віком 60 років звернувся до лікаря зі скаргами на порушення сечовипускання. Під час лабораторного дослідження виявлено помірне підвищення рівня загального простат - специфічного антигену (ПСА) у крові. Під час цитологічного аналізу відбитка біоптату передміхурової залози визначаються комплекси впорядковано розташованих мономорфних клітин залозистого епітелію з невеликими ядрами та ознаками проліферації. Який патологічний процес спостерігається в передміхуровій залозі?

- a. Аденокарцинома
- b. Перехідноклітинний рак
- c. Доброякісна гіперплазія**
- d. Плоскоклітинний рак
- e. Світлоклітинний рак

59. Під час проведення внутрішнього контролю якості результатів дослідження рівня глюкози в сироватці крові один із результатів відхиляється від середнього значення на +3 SD) Попередні результати контрольних вимірювань були прийнятними. Про що свідчить отриманий результат внутрішнього контролю якості?

- a. Тренд результатів
- b. Наявність систематичної похибки
- c. -
- d. Наявність випадкової похибки
- e. Зсув результатів

60. Пацієнт віком 45 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на загальну слабкість, нудоту та періодичний біль у ділянці правого підребер'я. За результатами лабораторних досліджень у крові виявлено підвищення активності АлАТ, АсАТ, ЛДГ - 5, фруктозо - 1 - фосфатальдолази та орнітинкарбамойлтрансферази. З анамнезу відомо, що пацієнт нещодавно перехворів на вірусний гепатит. Для якого гепатопатичного синдрому характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Цитолізу
- b. Печінково - клітинної недостатності
- c. Мезенхімального запалення
- d. Пухлинного росту
- e. Холестазу

61. Пренатальна діагностика має важливе значення для раннього виявлення хромосомних патологій. Які зміни в сироватці крові свідчать про високий ризик розвитку синдрому Дауна у плода?

- a. Зниження рівня РАРР і зниження ХГЛ
- b. Зниження рівня alpha - фетопротейну і підвищення ХГЛ
- c. Підвищення рівня alpha - фетопротейну і зниження ХГЛ
- d. Підвищення рівня РАРР і зниження ХГЛ
- e. Підвищення концентрації плацентарного лактогену і alpha - фетопротейну

62. Укажіть найпоширеніший лабораторний метод для визначення пухлинних маркерів.

- a. Полімеразна ланцюгова реакція
- b. Реакція аглютинація
- c. Електрофорез
- d. Радіоімунний аналіз

e. Імуноферментний аналіз

63. Під час цитологічного дослідження пунктату підшкірного пухлиноподібного утворення виявлено велику кількість лімфоцитів, поодинокі нейтрофіли, макрофаги - 3 - 4 у полі зору мікроскопа, плазматичні клітини - 1 - 3 у полі зору мікроскопа. Для якого виду запалення характерні ці зміни?

- a. Гнійного
- b. Фібринозного
- c. Хронічного специфічного
- d. Хронічного неспецифічного
- e. Гострого

64. У пацієнта віком 37 років, який хворіє на хронічний цистит, під час цитологічного дослідження відбитка зі слизової оболонки сечового міхура, поряд із клітинами перехідного епітелію виявлено комплекси клітин багаточарового плоского незроговілого епітелію. Який процес спостерігається у клітинах?

- a. Гіперплазія
- b. Неоплазія
- c. Гіперкератоз
- d. Дисплазія
- e. Метаплазія

65. Для яких захворювань найхарактернішим є підвищення рівня загального IgE у сироватці крові?

- a. Імунодефіцитних та алергічних захворювань
- b. Гельмінтозів, вірусних інфекцій

- c. Кишкових інфекцій, аутоімунних захворювань
- d. Гельмінтозів, імунодефіцитних захворювань
- e. Гельмінтозів, алергічних захворювань

66. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу щільного рухомого утворення в грудній залозі. В анамнезі: порушення менструального циклу. Результати цитологічного дослідження препарату з новоутворення: наявність комплексів впорядковано розташованих клітин залозистого епітелію з ознаками гіперплазії, поодинокі клітини кубічного епітелію, багато сполучнотканинних клітин. Укажіть тип пухлини.

- a. Інвазивна дольова карцинома
- b. Внутрішньопротокова папілома

c. Фібroadенома

- d. Неінвазивна внутрішньопротокова карцинома
- e. Інвазивна протокова карцинома

67. Для біохімічної діагностики інфаркту міокарда на ранній стадії (після появи торакального болю у пацієнта) необхідно визначити активність певних ензимів та їх ізоензимних форм у крові. Який із нижченаведених ензимів є найбільш інформативним для підтвердження або спростування цього діагнозу?

- a. ММ - ізофермент креатинкінази

b. МВ - ізофермент креатинкінази

c. Цитоплазматичний ізоензим АсАТ

d. Ізоензим ЛДГ - 1

e. Ізоензим ЛДГ - 5

68. Яку з нижченаведених дій потрібно виконати під час збирання та транспортування зразків крові для коагулологічних досліджень, щоб забезпечити стабільність зразків і точність відповідних результатів вимірювання?

- a. Заморозити зразки одразу після взяття та транспортувати в замороженому стані

b. -

c. Зберігати зразки при кімнатній температурі без обмежень за часом до проведення аналізу

d. Транспортувати зразки без дотримання температурного режиму, якщо доставка здійснюється протягом дня

e. Дотримуватися інструкцій медичної лабораторії щодо часових меж та оптимальних температур для зберігання зразків

69. У жінки віком 30 років діагностовано atopічну бронхіальну астму. Шкірні тести з побутовими алергенами дали позитивний результат. Який тип алергічної реакції за Кумбсом та Джеллом має місце в цьому разі?

a. V тип (стимулююча реакція)

b. IV тип (реакція гіперчутливості уповільненого типу)

c. I тип (анафілактична реакція)

d. II тип (цитотоксична реакція)

e. III тип (імунокомплексна реакція)

70. Під час мікроскопічного дослідження мокротиння пацієнта, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, виявлено заплілі еластичні волокна, рисоподібні тільця, кристали холестерину та гігантські клітини Пирогова - Лангханса. Для якого захворювання характерні ці результати аналізу мокротиння?

a. Туберкульозу легень

b. Пневмонії

c. Загострення хронічного бронхіту

d. Абсцесу легень

e. Бронхоектатичної хвороби

71. У чоловіка віком 25 років через рік після отриманої черепно - мозкової травми спостерігається диспропорційний ріст кісток, м'яких тканин та внутрішніх органів, що супроводжується порушенням їх функцій. Дослідження рівня якого гормону в крові доцільно

провести в цьому разі?

- a. Тиреотропного
- b. Пролактину
- c. Соматотропного**
- d. Інсуліну
- e. Окситоцину

72. У пацієнтки віком 27 років під час цитологічного дослідження зішкрібка з шийки матки визначаються поодинокі клітини плоского епітелію з просвітленою навколядерною ділянкою цитоплазми та темною периферійною зоною, що може бути пов'язано з розвитком LSIL (згідно з класифікацією Bethesda). Який вірус, найімовірніше, спричинив ці зміни?

- a. Вірус простого герпесу
- b. Аденовірус
- c. Вірус Епштейна - Барр
- d. Вірус папіломи людини**
- e. Цитомегаловірус

73. Під час цитологічного дослідження мокротиння пацієнта спостерігається: лейкоцити у великій кількості, детрит некротичного походження, кристали холестерину, пробки Дітріха. Для якого захворювання характерні ці результати аналізу мокротиння?

- a. Бронхоектатичної хвороби**
- b. Пневмонії
- c. Хронічного бронхіту
- d. Бронхіальної астми
- e. Гострого бронхіту

74. Що демонструє показник активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) у дослідженні системи гемостазу?

- a. Стан тромбоцитарної ланки гемостазу
- b. Стан антикоагулянтної системи
- c. Зовнішній шлях активації протромбінази
- d. Внутрішній шлях активації протромбінази**
- e. Стан фібринолітичної системи

75. Пацієнтці встановлено попередній діагноз: аутоімунний тиреоїдит. Дослідження рівня якого з нижченаведених лабораторних показників необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- a. Вазопресину
- b. Антитіл до пероксидази щитоподібної залози**
- c. Адренокортикотропного гормону
- d. Інсуліну
- e. Пролактину

76. Чоловіку віком 24 роки встановлено попередній діагноз: розсіяний склероз. Який імунологічний маркер може спростувати цей діагноз?

- a. Наявність антитіл до нейротрасмітерів
- b. Відсутність антитіл до основного білка мієліна**
- c. Лейкоцитоз та підвищення ШОЕ
- d. Відсутність антиядерних антитіл
- e. Наявність антитіл до основного білка мієліна

77. Пацієнт скаржиться на постійну надмірну спрагу, сухість у роті, часте та рясне сечовипускання. Результати аналізу сечі: низька відносна густина (1,001 - 1,005), поліурія (10 л/добу), глюкози й ацетону не виявлено. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Хронічної ниркової недостатності
- b. Гострої ниркової недостатності
- c. Цукрового діабету 1 - го типу
- d. Нецукрового діабету**

е. Психогенної полідипсії

78. Керівництво багатoproфільної приватної медичної лабораторії впроваджує заходи для організації внутрішнього контролю якості лабораторних досліджень. Укажіть його головну мету.

а. Аналіз закупівлі сучасного лабораторного обладнання

б. Виявлення та усунення помилок під час виконання досліджень

с. Підвищення заробітної плати персоналу

д. Змінення споживання реактивів

е. Впровадження нових методів та методик

79. Які клітини не входять до складу багатошарового плоского епітелію піхви?

а. Базальні

б. Проміжні

с. Поверхневі

д. Парабазальні

е. Шийкові мукоцити

80. Який із нижченаведених процесів є характерним для дисплазії шийки матки?

а. Заміщення одного типу тканини іншим

б. Порушення диференціації і дозрівання епітелію

с. Зроговіння епітелію

д. -

е. Метаплазія епітелію

81. Чоловік віком 30 років скаржиться на слабкість і запаморочення. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри та слизових оболонок, тахікардія. Результати загального аналізу крові: еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $1,7 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $80 \cdot 10^9/л$, лімфоцити - 15%, ШОЕ - 30 мм/год. У пунктаті кісткового мозку - зменшення кількості клітин усіх паростків кровотворення. Класифікуйте вид анемії.

а. Апластична

б. Гемолітична

с. Постгеморагічна

д. Залізодефіцитна

е. Мегалобластна

82. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на стискальний нестерпний біль за грудниною, що виник 2 - 3 год тому та іррадіює у ділянку шиї. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, шкірні покриви бліді, тони серця ослаблені. За результатами лабораторних досліджень виявлено підвищення активності МВ - ізофермента креатинкінази та ЛДГ - 1. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

а. Інфаркту міокарда

б. Жовчнокам'яної хвороби

с. Цукрового діабету

д. Гострого панкреатиту

е. Нападу стенокардії

83. Цитологічний препарат мазка зі стравоходу складається з груп клітин багатошарового плоского епітелію зі значним збільшенням ядер. Ядерна мембрана потовщена, хроматин гомогенний, нагадує "годинникове скло". Трапляються двоядерні клітини та внутрішньоядерні включення з чітким обідком. Визначте вид інфекційного ураження стравоходу.

а. Цитомегаловірусне

б. Герпетичне

с. Бактеріальне

д. Аспергільозне

е. Кандидозне

84. Чоловік віком 22 роки, який народився у тропічному регіоні, скаржиться на загальну слабкість та біль у суглобах. Результати клінічного аналізу крові: гемоглобінопатія,

переважання дрепаноцитів, КР - 0,85. Для якого виду анемії характерні ці клініко - лабораторні показники?

- a. Серпоподібноклітинної
- b. Фолієводефіцитної
- c. Вітамін В₁₂ - дефіцитної
- d. Мікросфероцитарної
- e. Залізодефіцитної

85. Жінка віком 65 років скаржиться на нудоту та відчуття гіркоти у роті натще, блювання, тяжкість у правому підребер'ї, слабкість, нездужання, пожовтіння шкіри та склер. Ці скарги турбують пацієнтку упродовж останніх 8 років та періодично з'являються після вживання жирної їжі. Під час дослідження дуоденального вмісту у порції В виявлено лейкоцити, епітелій, жовч каламутна. Для якого захворювання характерні ці клініко - лабораторні показники?

- a. Хронічного панкреатиту
- b. Гострого дуоденіту
- c. Вірусного гепатиту
- d. Хронічного холециститу
- e. Цирозу печінки

86. Результати дослідження плеврального пунктату пацієнта такі: відносна густина - 1,022, білок - 40 г/л, велика кількість лейкоцитів, наявність макрофагів і клітин мезотелію. Для якого захворювання характерні ці результати лабораторного дослідження?

- a. Мезотеліоми
- b. Бронхіальної астми
- c. Гнійного плевриту
- d. Туберкульозного плевриту
- e. Метастатичного ураження серозних оболонок

87. У пацієнта, який хворіє на вітамін В₁₂ - дефіцитну анемію, в клінічному аналізі крові спостерігається зменшення кількості еритроцитів та рівня гемоглобіну, макроанізоцитоз, трапляються мегалобласти та еритроцити з тільцями Жоллі і кільцями Кебота. Який рівень кольорового показника є характерним для цього виду анемії?

- a. 0,8
- b. 1,2
- c. 1,0
- d. 0,5
- e. -

88. Пацієнт віком 25 років скаржиться на значне підвищення АТ (до 200/110 мм рт. ст.), що супроводжується головним болем, тахікардією, тремтінням тіла, рясним потовиділенням. Попередній діагноз: феохромоцитома. Укажіть лабораторні критерії цього захворювання.

- a. Підвищення рівня катехоламінів у сечі
- b. Підвищення рівня кортизолу в крові
- c. Гіпокаліємія
- d. Підвищення рівня АКТГ у крові
- e. Гіпокальціурія

89. Наявність яких клітин у цитограмі може спричинити помилкову діагностику дрібноклітинного недиференційованого раку?

- a. Лімфоцитів
- b. Гістіоцитів
- c. Клітин циліндричного епітелію
- d. Епітеліоїдних клітин
- e. -

90. Відсутність яких клітин в імунограмі характерна для хвороби Брутона?

- a. Т - і В - лімфоцитів
- b. Т - лімфоцитів

c. Еозинофілів

d. Базофілів

e. В - лімфоцитів

91. Під час лабораторного дослідження в мокротинні пацієнта виявляються еозинофіли, кристали Шарко - Лейдена та спіралі Куршмана. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

a. Хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ)

b. Бронхоектатичної хвороби

c. Бронхіальної астми

d. Туберкульозу легень

e. Раку легень

92. Який тип епітелію в нормі вистилає слизову оболонку дрібних бронхів (бронхіол)?

a. Багатошаровий зроговілий

b. Багатошаровий незроговілий

c. Перехідний

d. Одношаровий циліндричний

e. Одношаровий кубічний

93. Цитологічний препарат біоптата новоутворення слизової оболонки стравоходу містить пласти клітин, переважно з поверхневих шарів багатошарового плоского епітелію. Клітини мають дрібні пікнотичні ядра, а тло препарату складають лусочки багатошарового плоского епітелію. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

a. Лейкоплакії стравоходу

b. Аденокарциноми стравоходу

c. Стравоходу Барретта

d. Плоскоклітинного раку стравоходу

e. Езофагіту

94. Чоловік віком 35 років звернувся до лікаря - уролога у зв'язку з безпліддям у шлюбі впродовж 4 - х років. Під час лабораторного дослідження в еякуляті виявлено зменшення кількості сперматозоїдів, усі інші показники спермограми - у межах норми. Інтерпретуйте результат лабораторного дослідження.

a. Азооспермія

b. Нормозооспермія

c. Астенозооспермія

d. Тератозооспермія

e. Олігозооспермія

95. Пацієнт відділення інтенсивної терапії перебуває у критичному стані і для корекції його лікування терміново потрібно провести аналіз на визначення рівня калію в сироватці крові. Під час екстреного відключення світла і перемикання живлення на генератор відбулося аварійне перезавантаження приладів (вимірювання показника можливе тільки через 20 хв). Як лабораторія має діяти в цій ситуації, враховуючи важливість впливу затримки видачі результату на стан пацієнта?

a. Зачекати завершення перезавантаження обладнання та видати результати пізніше

b. Повідомити адміністрацію лікарні про технічні проблеми лабораторії

c. -

d. Відправити пробу до іншої лабораторії без інформування лікаря про затримку

e. негайно сповістити лікаря відділення інтенсивної терапії про затримку результату та зорієнтувати щодо терміну затримки

96. Центральна лабораторія університетської клініки отримала нову серію (лот) контрольного матеріалу для оцінки біохімічних показників. Лікар - лаборант одразу провів вимірювання контрольного матеріалу спільно з пробами пацієнтів та видав результати лабораторних досліджень, порівнюючи отримані результати вимірювання контрольного матеріалу з паспортними значеннями. Проведення якого етапу внутрішньолaboratorного контролю якості

пропустив фахівець?

- a. Калібрування аналізатора
- b. Перевірка умов зберігання проб пацієнтів
- c. Перевірка умов зберігання контрольного матеріалу
- d. -

e. Установчої серії вимірювання

97. У пацієнта віком 36 років під час лабораторного дослідження сечі виявлені такі зміни: реакція сечі кисла, відносна густина - 1,015, білок - 0,99 г/л, нейтрофільна лейкоцитурія (лейкоцити - 50 - 60 у полі зору мікроскопа), мікрогематурія, наявні клітини ниркового епітелію, зернисті та гіалінові циліндри - поодинокі. Для якого захворювання характерні ці результати аналізу сечі?

- a. Гострого пієлонефриту
- b. Загострення хронічного гломерулонефриту
- c. Множинної мієломи
- d. Нефротичного синдрому
- e. Хронічної ниркової недостатності

98. Який електроаналітичний метод застосовується для вимірювання pH та визначення іонного складу біологічних рідин, зокрема крові та сечі?

- a. Полум'яна фотометрія
- b. Радіоізотопний аналіз
- c. Імуноферментний аналіз
- d. -

e. Потенціометрія

99. У дівчини віком 17 років після тривалого перебування на сонці з'явився біль у великих суглобах рук та ніг. Температура тіла - 38,8 °C. На обличчі візуалізується еритематозний висип у вигляді "метелика". Результати аналізу крові: гемоглобін - 92 г/л, ШОЕ - 66 мм/год, СРБ - [+++]. Попередній діагноз: системний червоний вовчак. Яке додаткове дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

a. Виявлення антинуклеарних антитіл, антитіл до нативної й двоспиральної ДНК

- b. Реакцію РІБТ і РІФ
- c. Визначення ревматоїдного фактора
- d. Біопсію шкіри та м'язів
- e. Визначення титру АСЛ - О

100. Яке з нижченаведених захворювань супроводжується формуванням Т - клітинного імунodefіциту?

- a. Кашлюк
- b. ВІЛ - інфекція
- c. Грип
- d. Скарлатина
- e. Кір

101. Пацієнт віком 60 років, який зловживає алкоголем, скаржиться на слабкість, втрату апетиту та збільшення об'єму живота. Результати лабораторних досліджень крові: зниження рівня альбуміну, підвищення активності АсАТ і АлАТ, підвищення рівня білірубіну та зниження протромбінового індексу. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Гострого холециститу
- b. Раку печінки
- c. Жирового гепатозу

d. Цирозу печінки

e. Гострого гепатиту

102. Який клас імуноглобулінів перешкоджає колонізації поверхні слизових оболонок бактеріями і бере участь у нейтралізації їх токсинів?

- a. IgM
- b. IgG
- c. IgA
- d. IgD
- e. IgE

103. Пацієнт звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на зменшення маси тіла, біль у животі та нудоту. Після проведення ряду обстежень встановлено попередній діагноз: рак шлунка. Укажіть специфічний біохімічний маркер цього новоутворення.

- a. beta - хоріонічний гонадотропін (ХГЧ)
- b. Простатоспецифічний антиген (ПСА)

c. CA 72 - 4

- d. alpha - фетопротейн
- e. CA 125

104. Укажіть тип жовтяниці, що супроводжується значним підвищенням рівня прямого (кон'югованого) білірубіну в крові та наявністю жовчних пігментів у сечі.

- a. -
- b. Гемолітична

c. Механічна (обтураційна)

- d. Фізіологічна (транзиторна)
- e. Надпечінкова

105. У цитологічному препараті мазка з піхви виявлено гігантські клітини з пилеподібними інтрацитоплазматичними та внутрішньоядерними включеннями за типом "совиноного ока". Визначте вид інфекційного ураження епітелію шийки матки.

a. Цитомегаловірусне

- b. Стафілококове
- c. Кандидозне
- d. Трихомонадне
- e. Гонококове

106. Під час гістологічного дослідження зішкрібу ендометрія матки виявлено сполучнотканинний виріст із численними кровоносними судинами та наявністю у ньому залоз різного розміру, переважно округлої чи овальної форми. У просвіті деяких залоз виявлено рідину (секрет). Залози розташовані нерівномірно, на різній відстані одна від одної. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- a. Аденокарциноми ендометрія
- b. Ендометриту
- c. Фіброміоми матки
- d. Лейоміоми матки

e. Залозисто - фіброзного поліпа ендометрія

107. Імуноглобуліни якого класу здатні проникати крізь плаценту від матері до плода та захищати дитину упродовж перших 4 - 6 місяців життя від збудників інфекцій, з якими раніше контактувала мати?

- a. IgD
- b. IgG
- c. IgE
- d. IgM
- e. IgA

108. У цитологічному препараті мазка з шийки матки виявлено клітини плоского епітелію з непропорційно збільшеними гіперхромними ядрами неправильної форми, нерівномірною конденсацією хроматину і потовщенням ядерної мембрани. Ядерця множинні, неправильної форми. Трапляються багатоядерні клітини. Який процес спостерігається у клітинах?

- a. Гіперплазія
- b. Некроз

- c. Апоптоз
- d. Метapлазія
- e. Дискаріоз

109. Визначення вмісту якого показника в крові є найбільш інформативним для диференційної діагностики анемій, абсолютного і відносного дефіциту заліза?

- a. Загальної залізоzв'язувальної здатності
- b. Феритину
- c. Коефіцієнта насичення трансферину залізом
- d. -
- e. Концентрації заліза

110. Пацієнт віком 45 років скаржиться на незначний біль у ділянці правого підребер'я, нудоту та загальну слабкість. Під час лабораторного дослідження виявлено підвищення рівня ензимів у крові, активності лужної фосфатази, gamma - глутамілтранспептидази, 5 - нуклеотидази та лейцинамінопептидази. Для якого гепатопатичного синдрому характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Мезенхімального запалення
- b. Портокавального шунтування
- c. Пухлинного росту

d. Холестазу

e. Цитолізу

111. У пацієнта, який курить та довгий час хворіє на хронічний бронхіт, виявлено пухлину легень. У відбитку видаленої пухлини під час мікроскопічного дослідження визначаються групи атипових поліморфних клітин зі збільшеними ядрами, фігури мітозів, оксифільні без'ядерні рогові лусочки, "рогові перлини". Укажіть тип пухлини.

- a. Недиференційований рак
- b. Плоскоклітинний зроговілий рак

- c. Саркома Капоші
- d. Ендофітна папілома
- e. Папілярна аденокарцинома

112. Медичний працівник пункту відбору біологічного матеріалу підготував зразки венозної крові пацієнта для транспортування до лабораторії з метою подальшого дослідження. Транспортування проводитиметься легковим автомобілем лабораторії. Укажіть місце розміщення наклейки або печатки з позначенням "Біологічна небезпека" відповідно до вимог ВООЗ щодо системи потрійного пакування інфекційних матеріалів категорії B.

- a. На зовнішньому контейнері
- b. На лобовому склі автомобіля
- c. На кожній пробірці із зразком крові
- d. -

e. На вторинному контейнері

113. У пацієнта віком 60 років, який курить упродовж багатьох років, протягом останніх кількох місяців спостерігається поява задишки (особливо під час фізичних навантажень) та постійний кашель із відходженням слизового мокротиння. Результати загального аналізу крові: лейкоцити - $7,8 \cdot 10^9/\text{л}$, еритроцити - $5,7 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 176 г/л. Результати спірометрії: об'єм форсованого видиху за першу секунду - 45% від прогнозованого значення, відношення об'єму форсованого видиху за першу секунду до форсованої життєвої ємності легень - 55%. Газовий аналіз крові: PaO_2 - 65 мм рт. ст., PaCO_2 - 50 мм рт. ст., IgE - 85 МО/мл. Для якого захворювання характерні вказані симптоми та результати додаткових методів обстеження?

- a. Ідіопатичного легеневого фіброзу
- b. Пневмонії
- c. Гострого бронхіту
- d. Хронічного обструктивного захворювання легень
- e. Бронхіальної астми

114. Запорукою ефективного ведення пацієнта є тісна співпраця лікарів - клініцистів із лабораторією. Які завдання знаходяться поза межами обов'язків лікаря - лаборанта?

- a. Визначення терапевтичних схем для корекції стану пацієнта
- b. Надання професійних суджень щодо інтерпретації результатів досліджень
- c. Консультування з питань невідповідності зразків критеріям прийнятності
- d. Сприяння ефективному використанню лабораторних досліджень
- e. Консультування щодо вибору переліку досліджень

115. Вкажіть дитячий вік, у якому відбувається другий нейтрофільно - лімфоцитарний перехрест у лейкограмі.

- a. 7 - 8 місяців
- b. 4 - 5 років
- c. 12 - 13 років
- d. 9 - 11 років
- e. 1 - 2 роки

116. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$ та кашель із виділенням слизово - гнійного мокротиння з неприємним запахом. В анамнезі: нещодавно перенесена пневмонія. Під час макроскопічного дослідження мокротиння спостерігається його поділ на 3 шари: верхній - слизово - гнійний, середній - серозний, нижній - гнійний. Під час мікроскопічного дослідження мокротиння виявлено велику кількість лейкоцитів, часточки легеневої тканини, кристали холестерину. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Туберкульозу легень
- b. Бронхоектатичної хвороби
- c. Абсцесу легень
- d. Хронічного бронхіту
- e. Пневмонії

117. До лабораторії передано пунктат кісткового мозку з груднини пацієнта. Які клітини є характерними тільки для кісткового мозку і можуть бути використані як показник правильності виконання стерильної пункції?

- a. Мегакаріоцити
- b. Еритробласти
- c. -
- d. Тромбоцити
- e. Пронормоцити

118. Під час морфологічного дослідження мазка зі стравоходу виявлено обмежене заміщення шарів плоского епітелію на спеціалізований кишковий. Цитограма мазка складається з груп клітин циліндричного епітелію келихоподібної форми. Спостерігаються пласти клітин у вигляді "шестигранних" структур із включеннями перснеподібних клітин залозистого епітелію. Ядра клітин великих розмірів, ядерця дрібні або не візуалізуються, збільшення ядерно - цитоплазматичного співвідношення. Для якого захворювання характерні ці результати дослідження?

- a. Езофагіту
- b. Лейкоплакії стравоходу
- c. Стравоходу Барретта
- d. Аденокарциноми стравоходу
- e. Плоскоклітинного раку стравоходу

119. Укажіть метод дослідження сечі, за допомогою якого можна виявити порушення концентраційної здатності нирок.

- a. За Амбурже
- b. За Зимницьким
- c. За Аддісом - Каковським
- d. За Богомолівим
- e. За Нечипоренком

120. Пацієнт віком 50 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на підвищення артеріального тиску, м'язову слабкість та часті порушення серцевого ритму. За результатами біохімічного аналізу крові виявлено гіпокаліємію та підвищення рівня альдостерону в плазмі. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Хвороби Аддісона
- b. Синдрому Кушинга
- c. Феохромоцитом
- d. Астроцитом
- e. Синдрому Конна

121. У пацієнта віком 48 років, який скаржиться на періодичний різкий біль у верхній частині живота, що посилюється натщесерце і полегшується після вживання їжі, з'явилися блювання з домішками крові та загальна слабкість. У крові: гемоглобін - 98 г/л, еритроцити - $3,3 \cdot 10^{12}/л$, гематокрит - 32%, АлАТ - 18 Од/л, АсАТ - 20 Од/л, загальний білірубін - 12 мкмоль/л. Результати лабораторного дослідження шлункового соку: пепсиноген I - 22 нг/мл (норма 30 - 160 нг/мл), пепсиноген II - 4 нг/мл (норма 3 - 15 нг/мл), гастрин - 150 пг/мл (норма 13 - 115 пг/мл). Тест на *Helicobacter pylori* та аналіз калу на приховану кров позитивні. Для якого захворювання характерні вказані симптоми та результати додаткових методів обстеження?

- a. Раку шлунка
- b. Гострого гастриту
- c. Гастроезофагальної рефлюксної хвороби
- d. Хронічного панкреатиту
- e. Виразкової хвороби шлунка

122. У пацієнта з опіками шкіри через 7 днів після трансплантації донорського матеріалу на місці локалізації трансплантата з'явилися набряки та геморагії. Це свідчить про розвиток реакції відторгнення трансплантата. Які клітини зумовлюють таку реакцію?

- a. Цитотоксичні лімфоцити
- b. Нейтрофільні гранулоцити
- c. В - лімфоцити
- d. Еозинофіли
- e. Макрофаги

123. Який тип імунodefіциту характеризується стійкими кількісними і/або функціональними змінами Т - клітинної ланки імунної системи?

- a. Лімфоцитарний
- b. Комбінований
- c. Фагоцитарний
- d. Комплементарний
- e. Гуморальний

124. Яка з нижченаведених ознак характерна для клітин злоякісної пухлини?

- a. Ніжнісітчатий хроматин
- b. Нерівномірний розподіл хроматину
- c. Збільшення кількості тілець статевого хроматину
- d. Ексудація
- e. Зникнення хроматину

125. Пацієнт віком 55 років скаржиться на часті носові кровотечі, тривалість яких останнім часом збільшилася, появу невеликих синців, що виникають без видимих причин. Захворювань печінки в анамнезі немає, антикоагулянтної терапії не приймає. Результати коагулограми: протромбіновий час - 12 с, міжнародне нормалізоване відношення - 1,0, активований частковий тромбoplastиновий час - 50 с. Кількість тромбоцитів у крові - 230 тис./мкл, фібриноген - 3,0 г/л. Який лабораторний показник вказує на порушення в системі гемостазу у пацієнта?

- a. Рівень тромбоцитів
- b. Фібриноген
- c. Активований частковий тромбoplastиновий час
- d. Протромбіновий час

е. Міжнародне нормалізоване відношення

126. У дитини в перші години після народження спостерігається жовтяниця, іктеричність слизових оболонок і склер, збільшення печінки та селезінки, темний колір сечі. У крові: рівень гемоглобіну різко знижений, ретикулоцитоз, значна кількість еритробластів, підвищення рівнів прямого і непрямого білірубину. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Вірусного гепатиту А
- b. Гострого холециститу
- c. Дискінезії жовчних шляхів
- d. Гемолітичної хвороби новонароджених**
- e. Вірусного гепатиту В

127. Процес опсонізації є важливим етапом у формуванні імунної відповіді на інфекцію в людському організмі. Яка з нижченаведених властивостей характерна для опсонінів?

- a. Зменшують синтез інтерлейкінів
- b. -
- c. Активують утворення Т - лімфоцитів
- d. Посилюють фагоцитоз**
- e. Пригнічують фагоцитоз

128. Укажіть клітини, що забезпечують контроль над якістю клітин всього організму та здійснюють протипухлинний захист.

- a. Т - клітини
- b. NK - клітини**
- c. В - клітини
- d. -
- e. Т - супресори

129. Пацієнту встановлено діагноз: туляремія, виразково - бубонна форма. Лікування проводиться стрептоміцином. Через тиждень основні клінічні прояви захворювання зникли, але з'явилися нові симптоми: підвищення температури тіла та рельєфний висип на шкірі, що свербить. Після відміни стрептоміцину симптоми зникли. Яку роль відіграв вказаний лікарський засіб у розвитку цієї реакції?

- a. Діяв як гаптен**
- b. Ініціював мітоз В - клітин
- c. Забезпечував ефект костимуляції сигналів
- d. Стимулював адаптивну імунну відповідь
- e. Сприяв надмірній активації імунітету

130. Для виявлення злоякісних пухлин на ранніх стадіях застосовують скринінг онкологічних маркерів. Визначте головний імунологічний маркер раку підшлункової залози.

- a. Цитокератин
- b. СА 125
- c. СА 19 - 9**
- d. Кальцитонін
- e. Простат - специфічний антиген

131. Електролітний баланс відіграє важливу роль у підтримці кислотно - основного стану (КОС) організму. Який із нижченаведених факторів може спричинити розвиток негазового (метаболічного) алкалозу?

- a. Надмірна втрата іонів калію**
- b. Накопичення органічних кислот
- c. Надмірна втрата іонів натрію
- d. Гіпервентиляція легень
- e. Гіперкапнія

132. Пацієнт віком 68 років скаржиться на задишку, появу набряків на нижніх кінцівках, підвищену втомлюваність. Який біомаркер потрібно дослідити для діагностики серцевої

недостатності?

- a. Лужну фосфатазу
- b. Натрійуретичний пропептид**
- c. gamma - глутамілтранспептидазу
- d. Прокальцитонін
- e. C - реактивний білок

133. Лікарю - лаборанту потрібно терміново провести лабораторне дослідження біологічної рідини пацієнта. Як називається проміжок часу між двома визначеними точками в межах переданалітичного, аналітичного і постаналітичного етапів дослідження?

- a. Тривалість циклу процесів
- b. Тривалість циклу дослідження**
- c. Тривалість клінічного дослідження
- d. Тривалість лабораторного тестування
- e. -

134. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на тривалі кровотечі після незначних травм, часті носові кровотечі та підвищену кровоточивість ясен. Подібних скарг раніше не було. Результати коагулограми: протромбіновий час - 12 с, активований частковий тромбопластиновий час - 30 с, фібриноген - 3,0 г/л. Час (тривалість) кровотечі за Дюке - 9 хв. Кількість тромбоцитів у крові - 210 тис./мкл. Який лабораторний показник свідчить про порушення функції первинного гемостазу у цієї пацієнтки?

- a. Протромбіновий час
- b. Час кровотечі**
- c. Тромбоцити
- d. Фібриноген
- e. Активований частковий тромбопластиновий час

135. У пацієнта віком 30 років спостерігаються дизуричні явища. Під час мікроскопічного дослідження мазка з уретри, зафарбованого за методом Грама, виявлено диплококи червоного кольору бобоподібної форми, розташовані в середині цитоплазми численних нейтрофільних лейкоцитів та поза клітинами у шаховому порядку. Інша бактеріальна флора у препараті відсутня. Який вид уретриту в пацієнта?

- a. Хламідійний
- b. Трихомонадний
- c. Кандидозний
- d. Гонококовий**
- e. Стафілококовий

136. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, швидку втомлюваність, блідість шкіри та часте серцебиття. Під час дослідження кісткового мозку виявлено наступні зміни: подразнення червоного паростка кровотворення, зменшення лейкоеритробластного співвідношення 1:1, збільшення кількості базофільних нормоцитів, зменшення кількості сидеробластів (<5%), характерні мікроформи нормоцитів, звуження зернистого паростка кровотворення. Для якого захворювання системи крові характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Хронічного лімфоїдного лейкозу
- b. Залізодефіцитної анемії**
- c. Мегалобластної анемії
- d. Гострого лейкозу
- e. Апластичної анемії

137. Які зміни лабораторних показників крові характерні для первинного гіпотиреозу?

- a. Зниження рівня T₃ та T₄, зниження ТТГ
- b. Підвищення ТТГ, рівні T₃ та T₄ у межах норми
- c. Підвищення ТТГ та рівнів T₃ і T₄
- d. Зниження рівня T₃ та T₄, підвищення ТТГ**
- e. Зниження ТТГ, рівні T₃ та T₄ у межах норми

138. Працівник медичної лабораторії проводить внутрішній контроль якості дослідження рівня глюкози в крові за допомогою контрольних карт Леві - Дженінгса, застосовуючи традиційний алгоритм Вестгарда. Яке з нижченаведених правил Вестгарда є попереджувальним та не вимагає негайного відхилення аналітичної серії?

- a. R:4S
- b. 2:2S
- c. 10X
- d. 1:2S**
- e. 1:3S

139. У пацієнта віком 40 років під час дослідження мазка крові виявлені гіперхромні еритроцити з залишками ядер у вигляді тілець Жоллі і кілець Кебота. Визначається пойкило - і анізоцитоз, трапляються нормоцити. Для якого виду анемії характерні ці результати дослідження?

- a. Вітамін В₁₂ - дефіцитної**
- b. Гемолітичної
- c. Залізодефіцитної
- d. Апластичної
- e. Постгеморагічної

140. У дев'ятирічної дівчинки спостерігаються симптоми, що характерні для порушення функції печінки: часті епізоди жовтяниці, підвищення температури тіла, свербіж шкіри. Дослідження активності якого фермента в крові має найбільше діагностичне значення для діагностики захворювань печінки та жовчовивідних шляхів?

- a. Креатинкінази
- b. Аланінамінотрансферази (АлАТ)
- c. gamma - глутамілтрансферази**
- d. Аспартатамінотрансферази (АсАТ)
- e. alpha - амілази

141. Укажіть біохімічний маркер первинного раку печінки.

- a. Кальцитонін
- b. С - реактивний білок
- c. Церулоплазмін
- d. alpha - фетопротейн**
- e. Серомукоїд

142. Пацієнтці віком 38 років, у якої розвинулася маткова кровотеча, проведено кюретаж порожнини матки. Під час цитологічного дослідження матеріалу ендометрія серед елементів крові виявляються залозистоподібні структури з атипових клітин з ознаками поліморфізму, гіперхромними ядрами з численними ядерцями, фігурами мітозу. Який патологічний процес спостерігається в ендометрії?

- a. Аденокарцинома**
- b. Ендометріоз
- c. Плоскоклітинна карцинома
- d. Аденоматозний поліп
- e. Залозиста гіперплазія

143. У пунктаті кісткового мозку пацієнта виявлено бластні клітини неправильної форми (>30%). Цитохімічні реакції на мієлопероксидазу та ліпіди із суданом чорним - позитивні, на неспецифічну естеразу - негативні. Імуноморфологічне дослідження виявило бластні клітини з імунофенотипом CD33+, CD13+, HLA - DR+, CD14 - . Який варіант лейкозу в пацієнта?

- a. Гострий лімфобластний
- b. Хронічний мієлоїдний
- c. Лімфогранулематоз
- d. Гострий мієлоїдний**
- e. Хронічний лімфоцитарний

144. Пацієнт віком 38 років скаржиться на часті носові кровотечі та підвищення температури тіла до 38,9°C. Симптоми з'явилися раптово. Об'єктивно спостерігається: велика кількість геморагій на шкірі тулуба, лімфовузли, печінка та селезінка не збільшені. Результати аналізу крові: еритроцити - $2,95 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 91 г/л, МСН - 31 пг, тромбоцити - $120 \cdot 10^9/\text{л}$, лейкоцити - $53 \cdot 10^9/\text{л}$, еозинофіли - 0%, паличкоядерні нейтрофіли - 1%, сегментоядерні нейтрофіли - 19%, лімфоцити - 31%, бласти - 49%. Реакція бластів на глікоген слабо - позитивна, дифузна. Реакція на пероксидазу слабо - позитивна. Для якого захворювання характерні вказані клініко - лабораторні показники?

- a. Сублейкемічного мієлозу
- b. Лейкемоїдної реакції за мієлоїдним типом
- c. Гострого лейкозу (мієлобластний варіант)**
- d. Гострого лейкозу (лімфобластний варіант)
- e. Хронічного мієлоїдного лейкозу

145. До лікаря звернулися батьки десятирічного хлопчика зі скаргами на виникнення кровотеч у дитини навіть у разі незначного травмування. Дитина хворіє з раннього віку, а в сімейному анамнезі подібна патологія була у дідуся по материнській лінії. Об'єктивно спостерігається: гематоми на шкірі, ліктьові та колінні суглоби деформовані, рухи в них обмежені. Результати дослідження системи гемостазу такі: АЧТЧ подовжений, рівень фактора VIII плазми крові - 5%. Інші лабораторні тести без відхилень. Для якої патології системи гемостазу характерні ці клініко - лабораторні показники?

- a. Хвороби Віллебранда
- b. Геморагічного васкуліту
- c. Гемофілії В
- d. -
- e. Гемофілії А**

146. Які клітини виділяють медіатори запалення у разі класичного варіанта анафілаксії?

- a. Тучні клітини**
- b. Т - лімфоцити
- c. Атипові клітини
- d. В - лімфоцити
- e. Нейтрофіли

147. Який показник рН крові вказує на розвиток декомпенсованого ацидозу?

- a. рН = 7,35 - 7,45
- b. рН = 7,25 - 7,34
- c. рН = 7,46 - 7,55
- d. рН > 7,55
- e. рН < 7,25**

148. У шестирічної дитини на задній поверхні шиї виявлено флюктууюче, м'яке за консистенцією утворення без ознак запалення. Під час гістологічного дослідження біоптату (взятого з ділянки новоутворення) з'ясувалося, що це лімфатичний вузол із помітно збільшеною кількістю клітин у кірковій зоні. Який маркер клітинної поверхні кіркової зони лімфатичного вузла асоціюється з В - лімфоцитами?

- a. CD4
- b. CD2
- c. CD19**
- d. CD16
- e. CD3

149. У ліпідограмі пацієнта віком 62 роки спостерігається підвищення рівня загального холестерину, ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності. Коефіцієнт атерогенності - > 5 ОД. Для якого захворювання характерні ці результати ліпідограми?

- a. Атеросклерозу**
- b. Міокардиту
- c. Артеріальної гіпертензії

- d. Стенокардії
- e. Хвороби Альцгеймера

150. У сироватці крові пацієнта виявлено високу активність ізоферменту ЛДГ - 1. Для ураження якого органа це найбільш характерно?

- a. Печінки
- b. Скелетних м'язів
- c. Підшлункової залози
- d. Нирок
- e. Серця