

1. Пацієнт 29 л. звернувся в клініку на наявність порожнини в 25 зубі. Поставлено діагноз – хронічний фіброзний пульпіт 25 зуба. Де повинна знаходитися границя кореневої пломби.

- a. Не доходячи 2.0 – 2.5 мм до рентгенологічної верхівки кореня
- b. За межами кореня
- c. На рівні анатомічної верхівки.
- d. Не доходячи 1.0 – 1.5 мм до рентгенологічної верхівки кореня**
- e. Не доходячи 3.0 – 3.5 мм до рентгенологічної верхівки. Верхівки

2. Хлопчик 11-ти років. Під час профілактичного огляду виявлено аномалію положення зубів – 23 зуб прорізався на місці латерального різця, а 22 зуб – на місці ікла. Встановіть діагноз

- a. Транспозиція латерального різця і ікла**
- b. Дистальне положення латерального різця
- c. Дистальне положення латерального різця і мезіальне положення ікла.
- d. Мезіальне положення ікла
- e. Тртоаномалія латерального різця і ікла

3. Пацієнт, 32 року, скаржиться на слабкість, головний біль та біль у горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38,7°C. Об'єктивно: на слизовій оболонці передніх піднебінних дужок, мигдаликів, задньої стінки глотки на тлі гіперемії - безліч дрібних ерозій. Вставлено діагноз герпангіна. Які препарати для обробки порожнини рота слід призначити в перші три дні захворювання?

- a. Протизапальні,гіпосенсибілізуючі засоби
- b. Кератопластичні, противірусні препарати
- c. Кератопластичні засоби, антисептичні розчини
- d. Противірусні препарати, антисептичні розчини**
- e. Протизапальні, антисептичні розчини

4. Дитина 14 років діагностовано остеобластокластому (кістозна форма). На рентгенограмі правої половини нижньої щелепи: вогнище резорбції кісткової тканини із зоною склерозу навколо. У вогнищі ураження виявляються множинні дрібні порожнини, горизонтальна резорбція коренів зубів, що знаходяться в зоні пухлини. Яке лікування показане хворому?

- a. Хіміотерапія
- b. Комбіноване
- c. Симптоматичне
- d. Хірургічне**
- e. Променева терапія

5. Після профілактичного огляду у дитини 6 років лікарем-ортодонтом зішліфовані нестерті рвучі горбки тимчасових іклів. Для профілактики розвитку якого прикусу було це здійснено?

- a. Прогнатичного
- b. Відкритого
- c. Глибокого
- d. Прогенічного**
- e. Опістогнатичного

6. Больному Д., 67 лет, с беззубыми челюстями, при изготовлении съёмных протезов применяли аппарат Ларина. При помощи этого аппарата:

- a. Формировали окклюзионную плоскость
- b. Формировали сферическую окклюзионную поверхность
- c. Определяли камперовскую горизонталь

d. Определяли франкфуртскую горизонталь

e. Формировали протетическую плоскость

7. Пациент 55 лет обратился с жалобами на отсутствие 26 зуба. Объективно: слизистая в области удаленного зуба бледно-розового цвета, зубы, ограничивающие дефект интактны, устойчивы. 36 зуб на 1/3 коронки выдвинут в сторону дефекта. Какой план лечения необходимо рекомендовать больному:

a. Направить на ортодонтическое лечение с последующим ортопедическим лечением

b. Провести аппаратурно-хирургическое лечение с последующим изготовлением ортопедического протеза

c. Изготовить мостовидный протез с вогнутой промежуточной частью

d. Депульпирование 36 зуба и одновременное изготовление мостовидного протеза на верхнюю челюсть и искусственной коронки на 36 зуб

e. Изготовление временного мостовидного протеза на период от 3 до 6 месяцев с последующим изготовлением постоянного мостовидного протеза

8. Чоловік 48 р. звернувся зі скаргами на постійні болі в ділянці 36 зуба. Раніше зуб неодноразово болів. При огляді порожнини рота коронка 36 зуба відсутня, перкусія коренів болісна. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів 36 зона розрідження з нечіткими контурами. Встановіть діагноз:

a. Хронічний гранульоматозний періодонтит

b. Хронічний фіброзний періодонтит

c. Хронічний пульпіт.

d. Хронічний гранулюючий періодонтит

e. Гострий періодонтит

9. До місцевих карієсogених факторів відносять:

a. Екстремальні впливи

b. Спадковість

c. Неповноцінна структура твердих тканин

d. Порушення властивостей і складу ротової рідини

e. Погана якість питної води

10. Хвора 22 років страждає ревмокардитом. спрямована до стоматолога для санації порожнини рота. Яка форма періодонтиту з перерахованих є найбільш грізним вогнищем одонтогенної інфекції?

a. Хронічний гранульоматозний періодонтит

b. Гострий серозний періодонтит

c. Гострий гнійний періодонтит.

d. Хронічний гранулюючий періодонтит

e. Хронічний фіброзний періодонтит

11. У клініку звернулася жінка з дитиною 12 років із приводу травми 11 зуба. Об'єктивно: відкол коронки на 1/3, перкусія безболісна, зондування слабоболюча. Коротка болюча реакція на температурні подразники. На знімку змін немає. Дії лікаря?

a. Відновити зуб і періодично спостерігати

b. Провести вітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки

c. Спостерігати за зубом.

d. Провести девітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки

e. Провести вітальну ампутацію з наступним відновленням зуба

12. Яке ускладнення під час ортодонтчного лікування незнімним апаратом виникає при використанні великої сили?

- a. Біль в області суглобів
- b. Некроз емалі.
- c. Гіперемія ясен
- d. Декубітальні виразки
- e. Рухливість та біль в зубах**

13. Жінка, 41 рік, звернулась до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: генералізований пародонтит II ступеню, загострений перебіг. З анамнезу відмічає цукровий діабет. З яким лікарем інтерністом необхідно вести цю пацієнтку?

- a. Пульмонологом
- b. Гематологом
- c. Ендокринологом**
- d. Нефрологом
- e. Алергологом

14. Больной С., 33 лет, находится на лечении у стоматолога по поводу хронического глубокого кариеса 22, III класс по Блеку. Восстановление коронки врач решил выполнить с применением фотоотверждаемого композиционного материала. Какая оптимальная температура рекомендована в стоматологическом кабинете для работы с фотоотверждаемыми композиционными материалами?

- a.
- b. 21-24°C**
- c. 24-26°C
- d. 18-21°C
- e. Не имеет значения

15. Після ендодонтчного лікування пацієнтка 35 р. звернулася з приводу зміни кольору коронки 22 зуба. Зуб придбав рожеве фарбування. Вкажіть причину

- a. Порушення технології обробки кореневого каналу
- b. Неправильний вибір реставраційного матеріалу
- c. Неправильний вибір кореневого наповнювача**
- d. Порушення технології реставрації зуба
- e. Внутрішні захворювання пацієнтки.

16. Жінка скаржиться на гострий біль у 48 зубі. Біль постійний, самовільний, інтенсивність наростає з кожною годиною, відмічається відчуття "вирослого зуба". При огляді в 48 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія різко болісна. Встановіть діагноз

- a. хронічний пульпіт
- b. невралгія трійчастого нерва.
- c. гострий пульпіт
- d. глибокий карієс
- e. гострий періодонтит**

17. Підліток звернувся зі скаргами на біль у 26 зубі. Встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт. Які симптоми характерні?

- a. короткочасні приступоподібні з довгими періодами ремісії
- b. постійні сильні болі

с. самовільні, нічні, ірадіюючі

- d. Поряд з гострими приступоподібними болями може бути довгочасний, ниючий біль
- e. Постійні слабкі болі.

18. На прийом прийшов пацієнт з пляшкою холодної води, яка заспокоює зубний біль. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. гострий періодонтит
- b. середній карієс
- c. гострий гнійний пульпіт**
- d. хронічний періодонтит
- e. глибокий карієс.

19. У клініку звернувся пацієнт 33 р зі скаргами на рухливість 22 зуба. В анамнезі травма зуба 2 роки тому. Об'єктивно: зуб раніше не лікований, рухливість 3 ст., перкусія слабо болюча. На знімку – резорбція кореня на 1/3. Найбільше доцільно:

- a. Провести фізіотерапевтичне лікування
- b. Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини
- c. Спостереження
- d. Видалити зуб**
- e. Провести ендодонтичне лікування і шинувати зуб

20. Для відкриття міської дитячої стоматологічної поліклініки потрібна певна кількість населення. Яка кількість населення необхідна для відкриття міської дитячої стоматологічної поліклініки

- a. 25 тис. населення**
- b. 18 тис. населення
- c. 15 тис. населення
- d. 16 тис. населення
- e. 20 тис. населення

21. У дитини Д., 4 років під час диспансерного огляду визначено індекс рівня інтенсивності карієсу, який дорівнює 0,3. Як можна оцінити цей показник?

- a. Дуже низький
- b. Низький**
- c. Високий
- d. Середній
- e. Дуже високий

22. Батьки дівчинки 3 років скаржаться на наявність порожнин в зубах на верхній щелепі. Об'єктивно: на жувальних поверхнях 54, 64 каріозні порожнини в межах плащевого дентину, краї емалі стоншені, легко відламуються, дентин каріозних порожнин світлий, вологий, знімається пластами. Зондування дна каріозної порожнини безболісне. Який пломбувальний матеріал бажано використати?

- a. Композитний матеріал
- b. Срібну амальгаму
- c. Склоіономерний цемент**
- d. Сілікатний цемент
- e. Цинкфосфатний цемент

23. Хлопчик 6 років скаржиться на біль в зубі від хімічних та термічних подразників, затримку їжі між зубами. Об'єктивно: в 55 каріозна порожнина на жувальній поверхні в межах біляпульпарного

дентину, дентин світло-коричневого кольору, м'який, знімається пластами. Зондування дна слабо болісне, реакція на термічні подразники позитивна, швидко минає після усунення подразника.

Виберіть пломбувальний матеріал

- a. Цинкфосфатний цемент
- b. Склоіономерний цемент**
- c. Композитний матеріал
- d. Срібну амальгаму
- e. Сілікатний цемент

24. Дитина 8 років скаржиться на болі в 26 зубі, які посилюються від термічних та хімічних подразників. Болі не проходять після зняття подразника протягом 4-5 хв. Безбольові проміжки короткотривалі, перкусія болюча, зондування болюче по всьому дну, зуб болить три дні. Який метод лікування Ви оберете, зважаючи на ступінь формування коренів?

- a. Девітальна екстерпація
- b. Девітальна ампутація
- c. Вітальна екстерпація
- d. Вітальна ампутація**
- e. Біологічний метод

25. Хворому І., 34 років внаслідок отриманої травми на виробництві у процесі виконання ним трудових обов'язків було пошкоджено 4 фронтальних зуба на верхній щелепі, які було за показаннями видалено. Чи забезпечується потерпілий правом безоплатного зубного протезування?

- a. Забезпечується зубним протезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів та металокерамічних і металлопластмасових протезів)
- b. Не забезпечується
- c. Забезпечується зубним протезуванням з відшкодуванням витрат із фонду соціального страхування (за винятком протезування з дорогоцінних металів)**
- d. Забезпечується зубним протезуванням (за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівняних до них по ціні тільки по досягненню пенсійного віку)
- e.

26. Хворий 45-ти років звернувся зі скаргами на постійний ниючий біль у зубі, що підсилюється при накушуванні. 3 дні тому зуб було запломбовано з приводу глибокого карієсу. Вертикальна перкусія болісна. Термопроба болісна ЄОД 120 мкА. На рентгенограмі - тканини періодонту не змінені. Що повинен зробити лікар у першу чергу:

- a. призначити антисептичні полоскання
- b. видалити пломбу
- c. Відкрити порожнину зуба і створити відток ексудату**
- d. призначити фізпроцедуру
- e. провести корекцію пломби

27. Який термін зберігання стерильності інструментарію в камері з бактерицидним опроміненням після стерилізації?

- a. Сім діб**
- b. П'ять діб
- c. Три доби
- d. Шість діб
- e. Чотири доби

28. Скільки посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів-хірургів установлюються сумарно на

10 000 дорослого населення міста, де мешкає понад 25тис. осіб, згідно штатних нормативів медичного персоналу за Наказом МОЗ України № 33 від 23.02.2000

a. 4 посади лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

b. 7 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

c. 8 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

d. 9 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів

e. 6 посад лікарів-стоматологів і лікарів стоматологів- хірургів