

1. Під час стоматологічного прийому лікар одягнув нову медичну маску. Як часто треба змінювати маску?

- a. Кожні 4 год
- b. Кожні 5 год
- c. Кожні 3 год
- d. Кожні 6 год
- e. Кожні 2 год**

2. Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного середнього карієсу зуба 11. Пломбування каріозної порожнини буде здійснюватися композитним матеріалом світлового твердіння. Яка лампа необхідна для роботи з композитними матеріалами світлового твердіння?

- a. Кварцева
- b. Люмінесцентна
- c. Солюксова
- d. Фотополімерна**
- e. Світлодіодна

3. У підлітка віком 17 років для пломбування карієсу зуба 16 лікар-стоматолог застосував амальгаму. Яким інструментом амальгамову масу вносять у підготовлену порожнину?

- a. Кюретою
- b. Штопфером
- c. Амальгамтрегером**
- d. Гладилкою
- e. Екскаватором

4. Лікар-стоматолог під час препарування каріозної порожнини II класу за Блекум вибрав техніку тунельного методу. Який пломбувальний матеріал раціонально застосовувати в разі вибору цієї методики?

- a. Склоіономерний цемент
- b. Макрофільний композит
- c. Текучий композит**
- d. Гібридний композит
- e. Мікрофільний композит

5. Яка помилка, що виникла під час препарування каріозної порожнини, може викликати виникнення вторинного карієсу?

- a. Перфорація стінки каріозної порожнини
- b. Обламування стінки каріозної порожнини
- c. Недостатнє препарування**
- d. Перфорація дна каріозної порожнини
- e. Ушкодження бором прилеглих зубів

6. Назвіть відбитковий матеріал, що належить до силіконової групи і застосовується під час виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза.

- a. Ортокор
- b. Репін
- c. Редонт
- d. Speedex**
- e. Уреен

7. Підліток віком 14 років звернувся до лікаря-стоматолога для планової санації. Під час стоматологічного огляду лікар виявив порушення крайового прилягання пломби в зубі 16. Яким інструментом проводять визначення крайового прилягання пломби?

- a. Штопфером
- b. Екскаватором
- c. Зондом**
- d. Гладилкою
- e. Шпателем

8. Як називається патологічний процес, що розвивається після прорізування зубів і характеризується демінералізацією та руйнуванням твердих тканин зуба із подальшим утворенням дефекту у вигляді порожнини.

a. Карієс

b. Пародонтит

c. Остеомієліт

d. Пульпіт

e. Періодонтит

9. Пацієнт скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи, кровотечу з носа. Об'єктивно спостерігається: рухомість верхньої щелепи, подовження середньої третини обличчя, кровотеча з носа, нудота, блювання, крововилив у кон'юнктиву. Яке травматичне ушкодження виникло?

a. Перелом верхньої щелепи

b. Перелом нижньої щелепи

c. Перелом зуба

d. Вивих верхньої щелепи

e. Вивих нижньої щелепи

10. У стоматологічній клініці провели стерилізацію використаних інструментів паровим методом без індивідуального пакування. Ці інструменти склали на стерильних столах та накрили стерильними простиррадлами. Скільки часу інструменти можуть зберігати свою стерильність у цьому разі?

a. 9 год

b. 12 год

c. 48 год

d. 6 год

e. 24 год

11. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект. Під час огляду виявлено, що зуб 11 змінений у кольорі (рожево-фіолетового відтінку). З анамнезу відомо: зуб був раніше ендодонтично лікований. Яка помилка під час ендодонтичного лікування може спричинити ці наслідки?

a. Неправильний вибір пломбувального матеріалу

b. Виведення пломбувального матеріалу за верхівку кореневого каналу

c. Травма периапікальних тканин

d. Недостатнє механічне оброблення кореневого каналу

e. Перфорація стінки кореневого каналу

12. Яку пробу треба виконати для контролю якості передстерилізаційного очищення стоматологічного інструментарію від залишків крові?

a. Тетрациклінову

b. Фенолфталеїнову

c. З Суданом III

d. Амідопіринову

e. -

13. Назвіть відбитковий матеріал, що належить до альгінатної групи і використовується для виготовлення часткового знімного пластинкового протеза.

a. Speedex

b. Ypeen

c. Репін

d. Протакрил

e. Ортокор

14. Під час профілактичного огляду пацієнту проводили оцінку гігієнічного стану порожнини рота за допомогою фарбування жувальними таблетками. Окрім зубних відкладень на вестибулярній поверхні зубів 42, 43 виявлено плями, що зафарбувалися барвником. Про який

патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

- a. Гіпоплазія емалі
- b. Гострий початковий карієс**
- c. Ерозія емалі
- d. Гострий поверхневий карієс
- e. Хронічний поверхневий карієс

15. Лікар-стоматолог планує провести обстеження первинного пацієнта. Для цього він просить асистента подати градуйований зонд. З якою метою лікар-стоматолог використовує цей інструмент?

- a. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах нижньої щелепи
- b. Провести дослідження міжзубних сосочків
- c. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах верхньої щелепи
- d. Дослідити глибину зубо-ясенного прикріплення**
- e. Провести замірювання довжини вуздечки язика

16. Яку температуру застосовують під час стерилізації паровим методом?

- a. 110-134 °C**
- b. 170-200 °C
- c. 155-170 °C
- d. 200-220 °C
- e. 135-155 °C

17. Пацієнту з гострим періодонтитом зуба 47 проведено інфільтраційну анестезію в ділянці набряклих тканин навколо зуба. Після введення анестетика пацієнт не відчув змін. Чому ефект знеболювання не настав?

- a. Неправильно вибраний вид анестезії**
- b. -
- c. Лікування не потребує знеболювання
- d. Недостатня кількість введеного препарату
- e. Алергічна реакція на анестетик

18. Під час лікування карієсу зуба 16 у підлітка віком 15 років для пломбування застосовано композитний матеріал, що має розмір частинок наповнювача 8-45 мкм. Який композитний матеріал застосовано для пломбування?

- a. Макрофільний**
- b. Мікрогібридний
- c. Мікрофільний
- d. Гібридний
- e. Нанонаповнений

19. На терапевтичному прийомі лікар-стоматолог використовує алмазні бори, що відрізняються за розміром робочої частини, властивостями алмазу, щільністю посадки алмазного зерна. Який середній розмір зерна в алмазного бора з червоним маркуванням?

- a. 180 мкм
- b. 50 мкм**
- c. 100 мкм
- d. 30 мкм
- e. 135 мкм

20. Пацієнт скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба 46, неприємний запах з рота. З анамнезу відомо, що п'ять днів тому проведено видалення зуба 46. Об'єктивно спостерігається: комірка видаленого зуба виповнена залишками згустка сірого кольору, слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

- a. Невропатія трійчастого нерва
- b. Гострий альвеоліт**
- c. Хронічний остеомієліт
- d. Гострий остеомієліт

е. Гострий періостит

21. Пацієнтці віком 35 років встановлено діагноз: ерозія твердих тканин зубів 11, 21, 34, 35, 44, 45. Який матеріал треба підготувати для пломбування в цьому разі?

а. Композитний матеріал світлової полімеризації

б. Склоіономерний цемент

с. Амальгаму

д. Силікатний цемент

е. Композитний матеріал хімічної полімеризації

22. Що насамперед треба зробити у випадку потрапляння хімічної речовини в око під час надання першої допомоги?

а. Промити уражене око чистою водою

б. Накласти антисептичну мазь

с. -

д. Накласти пов'язку на уражене око

е. Закапати в уражене око очні краплі

23. Лікар-стоматолог-хірург планує видалення зуба пацієнту через загострення хронічного періодонтиту. Лікар просить подати йому багнетоподібні щипці. Який зуб планується видаляти?

а. 16 зі зруйнованою коронковою частиною

б. 36 зі зруйнованою коронковою частиною

с. 26 зі збереженою коронковою частиною

д. 46 зі збереженою коронковою частиною

е. 33 зі збереженою коронковою частиною

24. Який час перебування (експозиції) стоматологічного інструментарію в дезінфекційному розчині 3%-го хлораміну?

а. 90 хв

б. 60 хв

с. 50 хв

д. 30 хв

е. 45 хв

25. Назвіть блок стоматологічної установки, до складу якого входять скейлер та наконечники.

а. -

б. Освітлювальний блок

с. Стоматологічне крісло

д. Блок інструментів

е. Блок управління

26. Яка кістка належить до кісток лицьового черепа?

а. Лобова

б. Клиноподібна

с. Тім'яна (парна)

д. Вилична (парна)

е. Решітчаста

27. Жінка віком 46 років звернулася до лікаря-стоматолога-хірурга для видалення зуба 16 зуба. Коронкова частина зуба збережена. Які щипці треба підготувати в цьому разі?

а. S-подібні ліві

б. S-подібні праві

с. Багнетоподібні кореневі

д. Багнетоподібні коронкові

е. Прямі

28. П'ятнадцятирічному хлопцю планується видалення зуба 14 за ортодонтичними показаннями. Коронка зуба збережена. Які щипці треба підготувати для видалення?

- a. Прямі
- b. Дзьобоподібні зі щічками, що сходяться

c. S-подібні

- d. Байонетні
- e. Дзьобоподібні зі щічками, що не сходяться

29. Пацієнтка скаржиться на самовільний наростаючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч, що посилюється під час накушування. З анамнезу відомо: тиждень тому було проведено лікування глибокого карієсу зуба 44. Об'єктивно спостерігається: вертикальна перкусія зуба 44 різкоболісна, ЕОД - 100 мкА, рентгенологічно виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня зуба 44. Яка тактика надання допомоги?

a. Провести корекцію пломби

b. Розкрити порожнину зуба та кореневий канал

- c. Видалити пломбу
- d. Видалити зуб
- e. Замінити пломбу

30. Для індивідуального догляду за порожниною рота лікар-стоматолог порекомендував семирічній дівчинці зубну пасту з мікроелементами та призначив курс ремінералізаційної терапії. Який із нижченаведених методів належить до екзогенної профілактики карієсу?

a. Накладання фторвмісних лаків на поверхню зубів

- b. Уживання продуктів, багатих на кальцій та фтор
- c. Додавання в їжу фторованої солі
- d. Уживання морепродуктів
- e. Уживання таблеток фториду натрію

31. Під час профілактичного огляду пацієнта на ортопантограмі в ділянці верхівки кореня зуба 12 виявлено осередок просвітлення кісткової тканини з нечіткими межами у вигляді язиків полум'я. Об'єктивно спостерігається: зуб змінений у кольорі, на яснах у ділянці проєкції верхівки кореня наявний рубець. Для якого захворювання характерна ця рентгенологічна картина?

a. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

b. Хронічний гранулюючий періодонтит

- c. Хронічний гангренозний пульпіт
- d. Хронічний фіброзний періодонтит
- e. Хронічний гранулематозний періодонтит

32. Яка кількість коренів та кореневих каналів найчастіше спостерігається в нижньому першому і другому премолярах?

a. Один корінь, два канали

b. Один корінь, один канал

- c. Два корені, два канали
- d. Два корені, один канал
- e. Три корені, три канали

33. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування першого премоляра верхньої щелепи. Який варіант рентгенологічного дослідження треба провести асистенту лікаря-стоматолога?

a. Прицільний рентген

- b. Панорамний рентген
- c. Контрастний рентген
- d. Тривимірний рентген
- e. Прикусний рентген

34. До комплексної програми профілактики основних стоматологічних захворювань входить обстеження стану тканин пародонту. Який діагностичний індекс треба застосувати, щоб оцінити потребу в лікуванні захворювань тканин пародонту в дітей віком 15 років?

a. OHI-S (Гріна-Вермільйона)

- b. Індекс Рамф'єрда
- c. РМА (Парма)
- d. PI (Рассела)

e. CPITN (BOO3)

35. Який комплекс заходів буде здійснювати асистент лікаря-стоматолога для знищення мікроорганізмів у рані та в патологічному осередку?

a. Передстерилізаційне очищення

b. Антисептику

c. Асептику

d. Дезінфекцію

e. Стерилізацію

36. На ортопантомограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено осередок просвітлення округлої форми розміром до 5 мм у ділянці верхівки кореня зуба 34, кореневий канал якого частково заповнений пломбувальним матеріалом. З анамнезу відомо: раніше зуб 34 був ендодонтично лікований. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки?

a. Хронічний фіброзний пульпіт

b. Гострий серозний періодонтит

c. Хронічний гранулюючий періодонтит

d. Хронічний гранулематозний періодонтит

e. Гострий дифузний пульпіт

37. Під час профілактичного огляду дітей віком 8-12 років лікар-стоматолог іноді виявляє білі плями на вестибулярних поверхнях фронтальної групи зубів верхньої щелепи, що прорізалися з цими дефектами. Під час вітального фарбування плями не зафарбовуються. Про який імовірний діагноз свідчать ці ознаки?

a. Гіпоплазія емалі

b. Ерозія емалі

c. Некроз емалі

d. Гострий поверхневий карієс

e. Гострий початковий карієс

38. На якому тижні вагітності починається мінералізація зачатків перших молочних зубів?

a. 17-му

b. 9-му

c. 30-му

d. 6-му

e. 23-му

39. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубах нижньої щелепи від термічних та хімічних подразників. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці зубів 35, 34, 44, 45 дефекти в межах дентину з гладкими, блискучими стінками, що сходяться під кутом. Який найімовірніший діагноз?

a. Клиноподібний дефект

b. Гострий середній карієс

c. Некроз твердих тканин

d. Ерозія емалі

e. Системна гіпоплазія емалі

40. На ортопантомограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня зуба 35. Скарг немає, перкусія і термопроба негативні, раніше зуб 35 був лікований з приводу глибокого карієсу. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки?

a. Гострий серозний періодонтит

b. Хронічний фіброзний пульпіт

c. Хронічний гранулюючий періодонтит

d. Гострий дифузний пульпіт

e. Хронічний фіброзний періодонтит

41. Яке з передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ належить до факультативних передраків із низькою потенціальною злоякісністю?

a. Папіломатоз піднебінний

b. Еритроплакія Кейра

c. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті

d. Бородавчастий передрак червоної облямівки губ

e. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ

42. Виберіть метод лікування хронічного середнього карієсу тимчасового моляра в шестирічної дитини.

a. Ремінералізація

b. Протезування

c. Видалення

d. Герметизація

e. Пломбування

43. Для хірургічної дезінфекції рук рекомендовано застосовувати засоби на основі спирту. Яка частка спирту має бути в дезінфікуючих розчинах?

a. 30%

b. 65%

c. 55%

d. 100%

e. 40%

44. Перед початком прийому пацієнта лікар-стоматолог провів оброблення рук із метою видалення та знищення транзиторної патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Яку назву має оброблення, що попереджає розповсюдженню інфекції через руки?

a. Миття рук

b. -

c. Стерилізація рук

d. Гігієнічна обробка рук

e. Хірургічна обробка рук

45. Під час лікування карієсу пацієнту було встановлено пломбу з амальгами без ізоляційної прокладки. Яке ускладнення може розвинути в цьому разі?

a. Верхівковий періодонтит

b. Вторинний карієс

c. Випадіння пломби

d. Запалення пульпи

e. Папіліт

46. Одним із найрозповсюдженіших та доступних засобів місцевої профілактики карієсу зубів у наш час треба вважати використання фторвмісних зубних паст. Яка найнижча межа норми фтору в питній воді?

a. 0,5 мг/л

b. 1 мг/л

c. 2 мг/л

d. 1,2 мг/л

e. 0,3 мг/л

47. Який інструментарій на ортопедичному прийомі використовує лікар-стоматолог для вигинання кламерів?

a. Зонд

b. Елеватор

c. Пінцет

d. Байонетні щипці

е. Крампонні щипці

48. До устаткування стоматологічного кабінету належить електричний мікромотор. Який діапазон регулювання швидкості обертання бора має електричний мікромотор?

- a. Від 50000 до 100000 об/хв
- b. -
- c. Від 100 до 1000 об/хв

d. Від 1000 до 40000 об/хв

- e. Від 100000 до 300000 об/хв

49. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці зуба верхньої щелепи праворуч. Після огляду встановлено попередній діагноз: гострий обмежений пульпіт зуба 14. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Які показники ЕОД характерні для гострого обмеженого пульпіту?

- a. 100 мкА
- b. 80-90 мкА
- c. 30-40 мкА
- d. 60-70 мкА

е. 15-30 мкА

50. Який термін зберігання простерилізованих медичних виробів у стерилізаційних коробках з фільтром?

- a. 16 діб
- b. 3 доби
- c. 28 діб

d. 20 діб

- e. 10 діб

51. До лікаря-стоматолога звернувся хлопець віком 18 років зі скаргами на випадіння зуба 11 після отриманої травми годину тому. Було вирішено зуб помістити у власну комірку альвеолярного відростка та провести шинування. Як називається ця операція?

- a. Гемісекція
- b. Трансплантація
- c. Ампутація
- d. Імплантація

е. Реплантація

52. У пацієнта діагностовано дефект коронкової частини зуба 34, що відповідає II класу каріозних порожнин за Блеком. Визначте топографічне розміщення каріозної порожнини на поверхні зуба в цьому разі.

- a. Контактна поверхня з ураженням різального краю

b. Контактна поверхня

- c. Пришийкова ділянка
- d. Жувальна поверхня
- e. Різальний край

53. Вагітна жінка віком 25 років скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, що з'явилися на п'ятому місяці вагітності. Для диференційної діагностики захворювання лікар вирішив провести кольоровий тест. Який барвник треба підготувати для проведення тесту?

a. 2%-ий розчин метиленового синього

- b. Йодинол
- c. 2%-ий розчин фтористого натрію
- d. 0,2%-ий розчин хлоргексидину
- e. Йодовмісний розчин Шіллера-Писарєва

54. Після стоматологічного прийому необхідно провести стерилізацію медичних виробів, у конструкції яких використовуються термолабільні матеріали. Який метод стерилізації доцільно застосувати?

a. Хімічний

b. Повітряний

c. Кип'ятіння

d. Паровий

e. -

55. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт, якому три тижні тому було видалено зуб, зі скаргами на наявність незакритого дефекту слизової оболонки в ділянці видаленого зуба. Об'єктивно спостерігається: порушення закриття лунки в місці видаленого зуба, розростання грануляцій, слизова оболонка в ділянці лунки синюшна. Про яке захворювання можуть свідчити ці ознаки?

a. Абсцес

b. Гострий остеомієліт

c. Хронічний альвеоліт

d. Хронічний остеомієліт

e. Хронічний періостит

56. Під час обстеження тринадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив прогнатичний прикус. До патології в якій площині належить цей прикус?

a. Орбітальний

b. Сагітальний

c. Трансверзальний

d. Мезіальний

e. Вертикальний

57. Яка помилка під час пломбування каріозних порожнини може призвести до виникнення папіліту, гінгівіту, пародонтиту?

a. Неправильний вибір пломбувального матеріалу

b. Завищення висоти оклюзії на пломбі

c. Відсутність контактного пункту

d. -

e. Неправильне накладання ізоляційної прокладки

58. Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини II класу за Блекум. У каріозну порожнину після нанесення адгезивної системи потрапила кров. Яка тактика в цьому разі?

a. Обробити каріозну порожнину спиртом, нанести адгезив

b. Провести повторне протравлювання дентину, нанести адгезив

c. Обробити каріозну порожнину 3%-м перекисом водню, нанести адгезив

d. Повторне кислотне протравлювання емалі та дентину та нанесення адгезиву

e. Промити та висушити каріозну порожнину, нанести адгезив

59. На прийомі в лікаря-стоматолога через емоційне напруження та страх перед маніпуляцією пацієнт відчув дискомфорт, відчуття нудоти, запаморочення, шум у вухах, неясність зору, нестачу повітря, появу холодного поту, оніміння язика, губ, кінчика носа. Який невідкладний стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

a. Колапс

b. Непритомність

c. Анафілактичний шок

d. Асфіксія

e. Алергічна реакція

60. Під час стоматологічного прийому пацієнт знепритомнів, почалися клонічні та тонічні судоми, спостерігається посилене пінисте слиновиділення, мимовільне сечовипускання та дефекація. Який стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

a. Гіперглікемічна кома

b. Епілептичний напад

c. Колапс

- d. Анафілактичний шок
- e. Гіпоглікемічна кома

61. Для яких маніпуляцій використовують спредер під час ендодонтичного лікування?

- a. Горизонтальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі
- b. Вертикальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі
- c. Внесення пломбувального матеріалу в кореневий канал
- d. Розпломбування кореневих каналів під час повторного ендодонтичного лікування
- e. Латеральної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

62. Укажіть назву частини порожнини рота, що обмежена губами і щоками зовні та зубами і яснами зсередини.

- a. Ретромоларна ділянка
- b. Присінок порожнини рота
- c. Слизова оболонка рота
- d. Власне порожнина рота
- e. Перехідна складка рота

63. Під час оброблення каріозної порожнини лікар-стоматолог видаляє всі патологічно змінені тканини зуба. Що спричиняє зміну кольору коронки зуба після неякісного препарування каріозної порожнини?

- a. Опік твердих тканин зуба
- b. Значне стоншення шару емалі
- c. Перегрів та запалення пульпи зуба
- d. Розм'якшений дентин насичується пігментами
- e. Запалення та пошкодження ясенного сосочка

64. Який з елементів будови скронево-нижньощелепного суглоба має еліпсоподібну форму, у 2-3 рази більший за суглобову головку, укритий хрящем, знаходиться на скроневої кістці?

- a. Суглобова ямка
- b. Суглобова капсула
- c. Суглобова головка
- d. Суглобовий горбок
- e. Внутрішньосуглобовий диск

65. Що належить до допоміжного обладнання стоматологічного кабінету?

- a. Рукомийник для миття рук
- b. Стоматологічна установка
- c. Стоматологічний рентген апарат
- d. Стоматологічний пересувний стілець
- e. Стоматологічне крісло

66. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба 37. Який метод дослідження треба виконати для контролю якості проведеного лікування?

- a. Глибоке зондування
- b. Термопробу
- c. Бактеріологічне дослідження
- d. Рентгенологічне дослідження
- e. ЕОД

67. Під час огляду порожнини рота дванадцятирічної дівчинки виявлено, що верхні фронтальні зуби повністю перекривають нижні. Бічні зуби в сагітальній і трансверзальній площинах змикаються в межах норми. Установлено діагноз: глибокий прикус. Порушенням яких функцій супроводжується ця аномалія?

- a. Жування, ковтання
- b. Відкушування їжі, вимова звуків
- c. Дихання, порушення дикції
- d. Дихання, ковтання
- e. Відкушування їжі, дихання

68. Пацієнт віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби та наявність великої каріозної порожнини в зубі 37. З анамнезу відомо, що раніше в зубі було проведено ендодонтичне лікування. Для відновлення анатомічної форми зуба лікар вирішив застосувати методику <<сендвіч-техніки>>. Які матеріали потрібно підготувати асистенту лікаря-стоматолога для пломбування каріозної порожнини?

- a. Композит та склоіономерний цемент
- b. Текучий композит та компомер
- c. Композит та силікофосфатний цемент
- d. Текучий композит та силікатний цемент
- e. Компомер та силікатний цемент

69. Для лікування карієсу I класу за Блекум у постійних зубах використовують амальгаму. Який складник амальгами підвищує пластичність матеріалу та забезпечує щільне крайове прилягання пломби?

- a. Срібло
- b. Цинк
- c. Ртуть
- d. Мідь
- e. Олово

70. Під час роботи виїзної стоматологічної станції проводилося лікування карієсу зубів у дітей молодших класів. Який пломбувальний матеріал використовується під час застосування ART-методику лікування карієсу в дітей?

- a. Силікатний цемент
- b. Склоіономерний цемент
- c. Текучий композит
- d. Композит хімічної полімеризації
- e. Компомер

71. Скільки зубів має повний сформований тимчасовий прикус?

- a. 32
- b. 18
- c. 20
- d. 12
- e. 24

72. Після проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичний інструментарій є підготовленим до етапу стерилізації. Хто має право проводити стерилізацію медичних інструментів?

- a. Санітарки
- b. Середній медичний персонал, який має відповідну підготовку
- c. Медичний персонал, який пройшов інструктаж із техніки безпеки
- d. Будь-які працівники відділення
- e. Працівники, які пройшли навчання

73. Одним із етапів проведення ендодонтичного лікування в постійних зубах є розширення кореневих каналів. Яким ендодонтичним інструментом проводиться розширення кореневих каналів?

- a. Спредером
- b. К-файлом
- c. Пульпоекстрактором
- d. Каналонаповнювачем
- e. Плагером

74. Який найімовірніший шлях передачі вірусних гепатитів В, С та ВІЛ-інфекції в лікувально-профілактичних закладах у разі порушення правил асептики та санітарно-протиепідемічного режиму?

- a. Водний

- b. Контактний
- c. Аліментарний
- d. Повітряно-краплинний

e. Парентеральний

75. Пацієнту віком 50 років на прийомі в лікаря-стоматолога потрапило стороннє тіло у верхні дихальні шляхи, що спричинило обтураційну асфіксію. Укажіть подальші дії лікаря, якщо дістати стороннє тіло неможливо.

- a. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо штучну вентиляцію легень
- b. Проводимо трахеотомію
- c. Проводимо інтубацію
- d. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо непрямий масаж серця

e. Проводимо поштовхи за Геймліхом

76. Чим треба закапати очі після їх промивання проточною водою у разі потрапляння стороннього тіла на слизову оболонку очей?

- a. 0,0002%-м розчином кетаміну
- b. 0,12%-м розчином хлоргексидину
- c. 0,1%-м розчином перманганату калію
- d. 1%-м розчином фурациліну

e. 30%-м розчином альбуциду

77. Стоматологічне дзеркало застосовують для огляду порожнини рота. Яке зображення дає поверхня дзеркала?

- a. Пряме, збільшене, уявне**
- b. Пряме, зменшене, дійсне
- c. Пряме, зменшене, уявне
- d. Обернене, збільшене, уявне
- e. Обернене, збільшене, дійсне

78. Під час стоматологічного обстеження підлітку віком 16 років встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт зуба 36 та проведено ендодонтичне лікування. Який ендодонтичний інструмент застосовують під час пломбування корневих каналів?

a. Каналонаповнювач

- b. К-ример
- c. U-файл
- d. К-файл
- e. Пульпоекстрактор

79. У пацієнта віком 45 років лікар-стоматолог діагностував гострий обмежений пульпіт зуба 44. Об'єктивно спостерігається: порожнина рота санована, гігієна в задовільному стані. З анамнезу відомо: пацієнт соматично здоровий. Що є протипоказанням до лікування пульпіту біологічним методом у цьому разі?

- a. Інтенсивність каріозного процесу
- b. Соматичні захворювання
- c. Стан гігієни порожнини рота
- d. Вік понад 18-20 років

e. Вік понад 30-35 років

80. Дівчина віком 16 років під час тренування на спортивній секції отримала травму. Скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи праворуч. Під час огляду порушення цілісності шкірних покривів не виявлено, спостерігається незначний набряк у ділянці тіла нижньої щелепи праворуч, відкривання рота не обмежене. Яку невідкладну допомогу треба надати в цьому разі?

- a. Обробити ділянку шкіри антисептиком
- b. Призначити протинабрякову терапію
- c. Холод на травмовану ділянку в перші 30 хв**
- d. Застосувати слабодезінфікуючу мазь

е. Компрес 2-5%-им розчином натрію гідрокарбонату

81. Після використання стоматологічного інструментарію була проведена його дезінфекція та передстерилізаційне очищення. Яка мета передстерилізаційного очищення?

- а. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- б. Знищення всіх видів мікроорганізмів
- с. Знищення вірусів
- д. Знищення патогенних видів мікроорганізмів

е. Видалення білкових, жирових та механічних забруднень

82. Укажіть, чи можна накладати стискальну пов'язку або джгут при пораненні в шию та кровотечі з сонної артерії.

а. Так, можна. Але з протилежного боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка

- б. Ні, не можна. Інакше буде механічна асфіксія, бо пов'язка накладається на усю шию
- с. Ні, не можна. Інакше буде гіпоксія мозку, що не сумісна з життям
- д. Так, можна. Але проводиться трахеотомія
- е. Так, можна. Але з боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка

83. Що із нижченаведеного належить до загальної профілактики карієсу?

- а. Герметизація фісур
- б. Покриття поверхні зубів фторлаком
- с. Полоскання ремінералізаційними розчинами

д. Вживання таблеток фториду натрію

е. Раціональна гігієна порожнини рота

84. Укажіть, яке ускладнення може виникнути під час проведення операції видалення зубів нижньої щелепи.

а. Перелом коронки або кореня зуба

- б. Неврит нижньоальвеолярного нерва
- с. Альвеоліт лунки зуба
- д. Відламування горба щелепи
- е. Проштовхування зуба в гайморову пазуху

85. Дівчина віком 15 років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх і верхніх фронтальних зубів набрякла, гіперемована, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки кровоточать від дотику, збільшені в розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 їхньої висоти. На зубах верхньої та нижньої щелепи встановлена незнімна ортодонтчна конструкція (брекет-система). Установіть попередній діагноз.

- а. Катаральний гінгівіт
- б. Фіброматоз ясен
- с. Виразковий гінгівіт
- д. Генералізований пародонтит

е. Гіпертрофічний гінгівіт

86. Пацієнту віком 25 років проводять пломбування зубів 44, 45 та 46. Для ізоляції відпрепарованих порожнин від ротової рідини використовують тонкий квадрат з латексу. За допомогою якого інструмента зроблено отвори для ізоляції зубів?

- а. Крампонні щипці
- б. Щипці для накладання кламерів

с. Щипці-пробійник

- д. Байонетні щипці
- е. Щипці-затискачі

87. Пацієнтка віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття оскоми на зубах верхньої щелепи протягом двох тижнів. Під час огляду в пришийковій ділянці зубів 11 та 21 виявлено білі плями з матовим відтінком та нечіткими контурами, що

інтенсивно сприймають барвники. Що треба підготувати для проведення лікування?

- a. Нітрат срібла для імпрегнації
- b. Муміфікуючу пасту
- c. Композитний матеріал
- d. Антисептичні розчини
- e. Ремінералізаційні розчини**

88. Який препарат треба підготувати в разі виникнення гіпоглікемічної коми в пацієнта?

- a. 20 ОД інсуліну
- b. 0,5%-ий розчин дибазолу
- c. 0,05%-ий строфантину
- d. 2,4%-ий розчин еуфіліну
- e. 40%-ий розчин глюкози**

89. Під час препарування каріозних порожнин використовуються алмазні бори різного ступеня зернистості. Який колір має маркувальне кільце алмазного бору, призначеного для кінцевого полірування композиційних реставрацій?

- a. Синій
- b. Чорний
- c. Білий**
- d. Червоний
- e. Зелений

90. Дев'ятирічна дівчинка отримала опік шкіри обличчя оцтовою кислотою. Який розчин можна застосувати для нейтралізації травмуючої речовини в цьому разі після тривалого промивання ураженої ділянки водою?

- a. 0,05%-ий хлоргексидину біглюконат
- b. 2-5%-ий натрію гідрокарбонат**
- c. 96%-ий етиловий спирт
- d. 10%-ий розчин аміаку
- e. 5%-ий спиртовий розчин таніну

91. На якому етапі пломбування каріозної порожнини композитним матеріалом світлової полімеризації треба проводити <<фінішне>> засвічування матеріалу?

- a. Після внесення кожної порції пломбувального матеріалу
- b. Після формування пломби
- c. Після шліфування пломби
- d. Після внесення останньої порції матеріалу
- e. Після остаточного оброблення пломби**

92. Лікар-стоматолог проводить лікування гострого глибокого карієсу зуба 27. Який метод дослідження можна застосувати для визначення рівня некретомії?

- a. Метод транслюмінації
- b. Фарбування карієс-маркером**
- c. Люмінесцентну діагностику
- d. ЕОД
- e. Термопробу

93. У пацієнтки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 35 зі світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини зуба дещо болюче. Який інструмент треба вибрати для некретомії?

- a. Екскаватор**
- b. Алмазний бор
- c. Штопфер
- d. Гладилку
- e. Зонд

94. Після стоматологічного прийому необхідно виконати повну обробку інструментів. Яка послідовність обробки використаного стоматологічного інструментарію?

- a. Передстерилізаційне очищення, стерилізація
- b. Передстерилізаційне очищення, стерилізація, дезінфекція
- c. Передстерилізаційне очищення, дезінфекція, стерилізація
- d. -
- e. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація**

95. Укажіть, яке ускладнення може виникнути в пацієнта після операції з видалення зуба.

- a. Потрапляння зуба в дихальні шляхи
- b. Ушкодження зуба-антагоніста
- c. Вивих нижньої щелепи
- d. Альвеоліт лунки зуба**
- e. Проштовхування зуба в м'які тканини

96. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект переднього зуба. Після огляду встановлено діагноз: гострий середній карієс зуба 23 із локалізацією каріозної порожнини в пришийковій ділянці. Для якого класу каріозних порожнин за Блемом характерна ця локалізація дефекту?

- a. V**
- b. II
- c. IV
- d. III
- e. I

97. У пацієнтки віком 26 років під час лікування гострого глибокого карієсу зуба 36 випадково була відкрита пульпова камера зуба. Який лікарський засіб треба підготувати в цьому разі?

- a. Пасту на основі миш'яку
- b. Пасту на основі параформальдегіду
- c. Ізоляційну прокладку
- d. Одонтотропну пасту**
- e. Склоіономерний цемент

98. Розуміння будови та функцій різних частин ясен допомагає лікарям-стоматологам в ефективному веденні лікування пацієнтів та догляду за здоров'ям порожнини рота. Укажіть, на які частини поділяють ясна.

- a. Внутрішні та зовнішні
- b. Прикріплені та вільні**
- c. -
- d. Тверді та м'які
- e. Епітеліальні та базальні

99. Одним із етапів препарування каріозної порожнини є некректомія розм'якшеного дентину. Який інструмент треба підготувати для проведення цього етапу препарування?

- a. Карборундова головка
- b. Алмазний бор
- c. Фінір
- d. Твердосплавний бор**
- e. Полір

100. Уявіть, що ви стали свідком надзвичайної ситуації та помітили постраждалого. Виберіть крок, згідно з алгоритмом MARCH, який є найпріоритетнішим до виконання?

- a. Особиста безпека
- b. Зупинка кровотечі**
- c. Відновлення дихання
- d. Накладання шини
- e. Запобігання гіпотермії

101. Пацієнту проводиться ендодонтичне лікування зуба 43. Для антисептичного оброблення та видалення ошурків з кореневого каналу використовується розчин гіпохлориту натрію. Яка концентрація цього антисептика використовується для іригації кореневого каналу?

- a. 0,03%
- b. 6%
- c. 12%
- d. 3%
- e. 9%

102. Під час виконання азопірамової проби протягом 1 хв на одному інструменті з усієї партії з'явилося фіолетово-бузкове забарвлення. Що потрібно зробити в цьому разі?

- a. Промити всю партію інструментів під проточною водою
- b. Ополоснути інструмент дистильованою водою та висушити
- c. Простерилізувати всі інструменти, за винятком того, на якому виявилася позитивна азопірамова проба
- d. Здійснити повторне передстерилізаційне очищення всієї партії інструментів
- e. Промити інструмент під проточною водою

103. Потерпілий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав черепно-мозкову травму та перелом щелепи. Як здійснити тимчасову зупинку сильної кровотечі в щелепно-лицьовій ділянці?

- a. Притиснути загальну сонну артерію
- b. Накласти джгут
- c. Накласти холодний компрес
- d. Накласти міхур з льодом
- e. Надати пацієнту положення з опущеною головою

104. Яка кислота і в якій концентрації використовується для протравлювання дентину та емалі в разі застосування адгезивної техніки пломбування каріозних порожнин?

- a. 3%-ий розчин ортофосфорної кислоти
- b. 15%-ий розчин полікарбонових кислот
- c. 5%-ий розчин полікарбонових кислот
- d. 37%-ий розчин ортофосфорної кислоти
- e. 10%-ий розчин ортофосфорної кислоти

105. У клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт для видалення зуба 13. Які щипці треба приготувати лікарю-стоматологу-хірургу для проведення цієї операції?

- a. Прямі
- b. Зігнуті по ребру із щічками, що не змикаються
- c. Зігнуті по ребру із щічками, що змикаються
- d. Багнетоподібні
- e. S-подібні

106. Після використання ендодонтичного інструментарію помічник лікаря-стоматолога провів його дезінфекцію та передстерилізаційне очищення. Яка мета дезінфекції?

- a. Знищення білкових, жирових забруднень
- b. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- c. Знищення патогенних та умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- d. Механічне знищення забруднень
- e. Знищення залишків лікарських препаратів

107. Під час ортопедичного прийому планується зняття відбитків щелеп. Укажіть, який інструментарій необхідний лікарю-стоматологу-ортопеду для отримання відбитка альгінатною масою.

- a. Шпатель для замішування та стоматологічне скельце
- b. Гумові рукавички та каталізатор для затвердіння
- c. Блокнот для замішування та стоматологічне скельце
- d. Каталізатор та інгібітор
- e. Гумова колба та шпатель для замішування

108. Вагітна жінка віком 26 років звернулася до лікаря-стоматолога для професійної гігієни порожнини рота. Які насадки треба підготувати для проведення завершального етапу

видалення зубних відкладень?

- a. Міжзубні йоржики
- b. Гумові ковпачки**
- c. Мануальні скейлери
- d. Міжзубні стимулятори
- e. Флосети

109. Ротова порожнина є початком травної системи і складається з присінка та власне порожнини рота. Укажіть межі власне порожнини рота.

- a. Зверху - тверде та м'яке піднебіння, знизу - язик та дно порожнини рота, спереду та з боків - ясна та зуби**
- b. Зверху - тверде піднебіння, знизу - м'язи дна порожнини рота, спереду - альвеолярний відросток, з боків - щоки
- c. Зверху - вуздечка верхньої губи, знизу - вуздечка нижньої губи, спереду - зуби, знизу - язик
- d. Зверху та знизу - альвеолярний відросток, вкритий слизовою оболонкою, спереду - присінок, з боків - слизова оболонка щік
- e. Зверху та знизу - присінок ротової порожнини, спереду - язик та зуби, з боків - ясна та зуби

110. Укажіть, за допомогою якої групи матеріалів лікарю-стоматологу найдоцільніше зняти відбиток для виготовлення металокерамічної коронки.

- a. Композитних матеріалів
- b. Альгінатних відбиткових матеріалів
- c. Силіконових відбиткових матеріалів**
- d. Гіпсу медичного
- e. Термопластичних мас

111. Які лампи використовують для знезараження повітря та поверхонь у стоматологічному кабінеті?

- a. Люмінесцентні
- b. Бактерицидні**
- c. Розжарювання
- d. Фотополімерні
- e. Світлодіодні

112. Які інструменти використовують для оброблення твердих тканин зуба під час препарування каріозних порожнин?

- a. Карборундові головки, плагери
- b. Кулясті бори, екскаватор**
- c. Кулясті бори, плагери
- d. Карборундові головки, фініри
- e. Кулясті бори, матриці

113. Які інструменти необхідно підготувати для проведення обстеження стоматологічного пацієнта?

- a. Екскаватор, гладилка, дзеркало стоматологічне
- b. Зонд зубний зігнутий, дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний**
- c. Зонд зубний зігнутий, шпатель, пінцет
- d. Дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний, екскаватор
- e. Штопфер, дзеркало стоматологічне, пінцет

114. Лікар-стоматолог проводить визначення індексу гігієни Федорова-Володкіної в дітей молодшого шкільного віку. Який розчин треба підготувати для проведення цієї процедури?

- a. Еритрозину
- b. Фуксину
- c. Йодисто-калієвий**
- d. Фурациліну
- e. Метиленового синього

115. Які антисептики належать до групи окисників?

- a. Карболова кислота, соляна кислота
- b. Хлорамін Б, хлоргексидину біглюконат
- c. Фурацилін, фуразолідон
- d. Мурашина кислота, борна кислота
- e. Перекис водню, калію перманганат

116. Для дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у стоматологічній клініці передбачено проведення генерального прибирання в комплексі заходів, спрямованих на попередження поширення інфекції. Укажіть, з якою кратністю проводиться цей вид прибирання.

- a. На початку робочої зміни
- b. Щодня
- c. 1 раз на тиждень
- d. У кінці робочої зміни
- e. 1 раз на місяць

117. У пацієнта діагностовано передпухлинний процес слизової оболонки порожнини рота. Лікар пояснив, що без належного лікування з часом він обов'язково призведе до розвитку раку. Який діагноз встановлено пацієнту?

- a. Кератоакантома
- b. Папіломатоз
- c. Обмежений гіперкератоз
- d. Лейкоплакія
- e. Шкірний ріг

118. Під час обстеження порожнини рота пацієнта було виявлено, що внаслідок звуження верхньої зубної дуги щічні горбки нижніх бічних жувальних зубів розташовані назовні від однойменних верхніх, фронтальні зуби змикаються правильно. Який прикус має пацієнт?

- a. Перехресний
- b. Прогнатичний
- c. Глибокий
- d. Прогенічний
- e. Відкритий

119. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення коренів зубів 37 та 36. Пацієнту планується проведення аплікаційної анестезії перед проведенням провідникової анестезії. Яка концентрація розчину лідокаїну використовується для аплікаційної анестезії?

- a. 15%
- b. 20%
- c. 25%
- d. 30%
- e. 10%

120. Після використання стоматологічного інструментарію асистенту лікаря-стоматолога необхідно провести його дезінфекцію, передстерилізаційне очищення та стерилізацію. Який режим стерилізації стоматологічних інструментів у сухожаровій шафі?

- a. При температурі 160°C - 120 хв
- b. При температурі 120°C - 90 хв
- c. При температурі 140°C - 45 хв
- d. При температурі 180°C - 60 хв
- e. При температурі 200°C - 30 хв

121. У чотирирічної дівчинки під час огляду лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 55 у межах плащового дентину з широким вхідним отвором. Дно та стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, під час зондування безболісні. Який матеріал найдоцільніше застосувати для пломбування?

- a. Полікарбоксилатний цемент
- b. Цинк-фосфатний цемент

- с. Амальгаму
- d. Склоіономерний цемент**
- е. Силікофосфатний цемент

122. Який інструмент використовують для механічного розширення корневих каналів?

- a. Спредер
- b. Коренева голка
- с. Дрильбор**
- d. Каналонаповнювач
- е. Плагер

123. Для постійного пломбування каріозної порожнини І класу за Блекум був використаний пломбувальний матеріал світлового затвердіння. Які компоненти входять до складу композитів світлового затвердіння?

- a. Тільки порошок
- b. Тільки паста**
- с. Паста-паста
- d. Порошок-рідина
- е. Паста-рідина

124. Дівчина віком 17 років скаржиться на печіння та сухість слизової оболонки порожнини рота. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на цукровий діабет протягом трьох років. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка щік суха, укрита білим нальотом, що легко знімається. Установлено діагноз: кандидозний стоматит. Яку мазь доцільно рекомендувати для лікування в цьому разі?

- a. Ланолінову
- b. Клотримазолову**
- с. Інтерферонову
- d. Еритроміцинову
- е. Преднізолонову

125. Пораненому надається допомога згідно з алгоритмом MARCH. Якою літерою позначено етап виявлення черепно-мозкових травм?

- a. C
- b. A
- с. M
- d. R
- е. H**

126. Яку назву має хейліт, спричинений підвищеною чутливістю червоної облямівки губ до інсоляції?

- a. Метеорологічний
- b. Ексфоліативний
- с. Атопічний
- d. Екзематозний
- е. Актинічний**

127. Що треба підготувати для лікаря-стоматолога з метою видалення надлишків композитного матеріалу та для попереднього полірування приясенних ділянок реставрацій у ділянці переходу пломбувального матеріалу на емаль на контактних поверхнях зубів?

- a. Полірувальні штрипси**
- b. Фінішні алмазні бори
- с. Полірувальні диски
- d. Полірувальні щітки
- е. Гумові головки

128. Укажіть відбитковий матеріал, що належить до групи на основі окису цинку й евгенолу та використовується для отримання відбитків індивідуальною ложкою при повній відсутності зубів на щелепі.

- a. Ортокор
- b. Speedex
- c. Ypeen
- d. Фторакс
- e. Репін

129. Для проведення розширення кореневих каналів зуба 27 лікарю-стоматологу треба подати К-ример. Яким графічним символом позначено цей вид ендодонтичних інструментів?

- a. Восьмикінцева зірочка
- b. Коло
- c. Трикутник
- d. Квадрат
- e. П'ятикінцева зірочка

130. Під час огляду семирічної дівчинки лікар-стоматолог виявив на присінкових поверхнях зубів 11, 21, 31, 41 і на горбиках зубів 16, 26, 36, 46 темні плями. З анамнезу відомо, що зуби прорізалися ураженими. Лікар встановив діагноз: флюороз. Надлишок якого хімічного елемента в питній воді буде причиною виникнення цього захворювання?

- a. Кальцію
- b. Йоду
- c. Заліза
- d. Фосфору
- e. Фтору

131. Назвіть поверхню зуба, на якій найчастіше для профілактики карієсу проводять герметизацію?

- a. Контактна
- b. Оральна
- c. -
- d. Вестибулярна
- e. Жувальна

132. Яке положення треба надати пацієнту в разі стану непритомності?

- a. Сімса
- b. На боці
- c. Фаулера
- d. Тренделенбурга
- e. На животі

133. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт віком 40 років зі скаргами на виникнення післяопераційної чутливості в ділянці зуба 21 після проведення значної реставрації. Який препарат треба приготувати асистенту для усунення чутливості твердих тканин зубів?

- a. Десенситайзер
- b. Компомер
- c. Пасту з тимолом
- d. Кондиціонер
- e. Ормокер

134. Лікар-стоматолог готується до останнього етапу пломбування зуба. Які інструменти йому знадобляться?

- a. Фініри, поліри, оклюзійний папір, матриці
- b. Фініри, гладилка, оклюзійний папір, штопфер
- c. Фініри, поліри, оклюзійний папір, штрипси
- d. Фреза, поліри, екскаватор, штрипси
- e. Штопфер, поліри, оклюзійний папір, штрипси

135. Під час препарування каріозної порожнини в межах емалі використовують турбінні наконечники. Яку швидкість обертання бора може забезпечити цей наконечник?

- a. 15000-20000 об/хв

- b. 20000-70000 об/хв
- c. 50000-100000 об/хв
- d. 300000-400000 об/хв**
- e. 100000-200000 об/хв

136. Асистент лікаря-стоматолога проводить рентгенологічне дослідження зубів 24, 25 та 26. Які з обстежуваних зубів мають найчастіше три корені?

- a. Верхні премолари
- b. Верхні ікла
- c. Верхні моляри**
- d. Нижні моляри
- e. Нижні премолари

137. Батьки шестимісячної дівчинки скаржаться на наявність сироподібного нальоту на слизовій оболонці щік та язика в дитини. Після огляду лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий кандидозний стоматит. Який збудник викликає це захворювання?

- a. Спірохета Венсана
- b. Дріжджоподібні гриби**
- c. Паличка Леффлера
- d. Вірус герпесу
- e. Веретеноподібна паличка

138. Чим обумовлена поява трем та діастем між молочними зубами в період підготовки заміни їх на постійні?

- a. Надмірним жувальним навантаженням
- b. Широкою коронковою частиною молочного зуба
- c. Подовженими комірковими відростками щелеп
- d. Короткими комірковими відростками щелеп
- e. Ростом щелеп, більшим розміром зачатків постійних зубів**

139. Як називається методика ендодонтичного лікування зубів під час якої кореневу частину пульпи насичують речовинами, що глибоко дифундують, муміфікують і перетворюють її на септичний тяж або склоподібну масу?

- a. Імпрегнація**
- b. Ампутація
- c. Ремінералізація
- d. Девіталізація
- e. Екстирпація

140. Назвіть, з яких частин складається перший постійний моляр на верхній щелепі праворуч.

- a. Коронка, корінь, альвеолярний відросток
- b. Коронка, шийка, ясна
- c. Корінь, пародонт, альвеолярний відросток
- d. Коронка, шийка, корінь**
- e. Ясна, корінь, пародонт

141. Укажіть, яку першу допомогу необхідно надати потерпілому при переломі нижньої щелепи в ментальному відділі без зміщення.

- a. Накласти стискальну пов'язку в ділянці поранення та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення
- b. Накласти стискальну пов'язку в ділянці поранення та скерувати потерпілого до щелепно-лицевого відділення
- c. Накласти пращоподібну пов'язку та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення
- d. Накласти головну та стискальну пов'язки та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення
- e. Накласти пращоподібну пов'язку та скерувати потерпілого до щелепно-лицевого відділення**

142. Як, за перебігом, називається карієс, що супроводжується множинним ураженням

практично всіх зубів, часто в одному зубі виникають 2-3 каріозні порожнини?

- a. Ускладненим
- b. Хронічним
- c. Квітучим**
- d. Гострим
- e. Рецидивним

143. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубі 46 під час вживання гарячого. Після огляду встановлено попередній діагноз: хронічний гангренозний пульпіт. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Який діапазон показників ЕОД характерний для хронічного гангренозного пульпіту?

- a. 15-30 мкА
- b. Більше 100 мкА
- c. -
- d. 50-90 мкА**
- e. 30-40мкА

144. Після стоматологічного обстеження підлітка віком 16 років лікар-стоматолог встановив діагноз: хронічний фіброзний пульпіт зуба 36. Пацієнту проведено ендодонтичне лікування. Яким інструментом проводять видалення судинно-нервового пучка?

- a. Плагером
- b. Пульпоекстрактором**
- c. Спредером
- d. Римером
- e. Каналонаповнювачем

145. Під час препарування каріозної порожнини лікар повинен працювати з перервами за відповідної кількості обертів бора та його охолодження. Яке ускладнення виникає у разі недотримання цієї рекомендації?

- a. Швидке затуплення борів
- b. Швидке зношування наконечника
- c. Запалення або загибель пульпи**
- d. Збільшення пилу у повітрі
- e. Ушкодження прилеглих зубів

146. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляду виявлено каріозну порожнину в зубі 45 в межах плащового дентину світлого кольору, що легко знімається за допомогою екскаватора. З анамнезу відомо, що пацієнт відзначає больові відчуття під час вживання солодкого в ділянці цього зуба. Про який патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

- a. Хронічний середній карієс
- b. Гострий поверхневий карієс
- c. Гострий середній карієс**
- d. Хронічний глибокий карієс
- e. Гострий глибокий карієс

147. Пацієнту показано видалення зубів 21, 22 через загострення хронічного періодонтиту. Коронкові частини зубів 21, 22 зруйновані на 1/2. Який інструмент треба вибрати для видалення?

- a. Кутовий елеватор
- b. Байонетні щипці
- c. S-подібні щипці
- d. Прямі щипці**
- e. Дзьобоподібні щипці

148. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка віком 17 років зі скаргами на наявність глибокої каріозної порожнини в зубі. Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий глибокий карієс зуба 26. Для проведення лікування асистент лікаря-стоматолога

підготувала пасту на основі кальцію гідроксиду. Яка дія препарату?

- a. Знеболювальна, седативна
- b. Седативна, адгезивна
- c. Протизапальна, одонтотропна**
- d. Антисептична, знеболювальна
- e. Адгезивна, протизапальна

149. Лікар-стоматолог під час профілактичного огляду запропонував пацієнту розжувати таблетку синього кольору, а потім сполоснути ротову порожнину. Для чого лікар проводить цю процедуру?

- a. Контролю гігієнічних навичок пацієнта**
- b. Контролю крайового прилягання пломб на зубах
- c. Виявлення запального процесу в яснах
- d. Виявлення запального процесу на слизовій оболонці ротової порожнини
- e. Виявлення каріозних порожнин

150. У пацієнта виявлено каріозну порожнину, розташовану на різальному краї різця, що утворилася через стирання емалі і оголення дентину. До якого класу за класифікацією Блека належить ця каріозна порожнина?

- a. VI**
- b. III
- c. I
- d. II
- e. IV