

1. Пацієнт хворіє на синдром Гійєна-Барре з повним паралічем м'язів тіла. Яку тактику в роботі з цим пацієнтом потрібно застосувати першочергово?

- a. Заняття для зміцнення м'язів
- b. Рівновага та вправи на загальне зміцнення
- c. Заняття для зміцнення м'язів кисті руки
- d. Тренування навичок ADL (активності повсякденного життя)
- e. Збільшення пасивного діапазону рухів, позиціонування та ортезування

2. Під час роботи з пацієнтом із контрактурою в колінному суглобі відзначається патологічне кінцеве відчуття "пружинний блок". Які відчуття виникають у пацієнта?

- a. Подібне до нормального, але виникає раніше
- b. Виникає ефект віддачі при найбільшій амплітуді
- c. М'яз рефлексорно зупиняє рух через сильний біль
- d. Відсутність механічної протидії, проте рух зупиняється через сильний біль
- e. Подібне до нормального відчуття розтягнення м'яких тканин, проте виникає значно раніше, відчуття віддачі відсутнє

3. Яка навичка не є передумовою навчання самостійного одягання?

- a. Сила плечового поясу та верхніх кінцівок мінімум 3 бали за MMT
- b. Достатня амплітуда рухів у суглобах верхніх та нижніх кінцівок
- c. Здатність утримувати рівновагу в положенні сидячи
- d. Наявність пальцевого або долонного хапання
- e. Здатність утримувати рівновагу в положенні стоячи

4. Яка шкала використовується для оцінки індексу активності повсякденного життя?

- a. Шкала Ашфорта
- b. Шкала Баллард
- c. Шкала Бартела
- d. Шкала Хачинського
- e. Європейська шкала інсульту

5. Якою має бути висота ручки чотириопорної палиці для особи після перенесення ГПМК?

- a. На висоті кінчиків пальців
- b. На висоті 1/3 передпліччя
- c. На висоті ліктя
- d. На висоті згину зап'ястка
- e. На висоті середини передпліччя

6. Десятирічна дитина скаржиться на біль у спині та швидко втомлюваність. Діагностовано сколіотичну поставу. Який вид лікувального масажу потрібно призначити та яку кількість процедур передбачити?

- a. Сегментарно-рефлекторний, 10-12
- b. Періостальний, 5-10
- c. Точковий, 10-15
- d. Сполучнотканинний, 20-25
- e. Класичний, 10-15

7. Чоловік віком 75 років ходить повільно, однак скаржиться, що швидко стомлюється. Який тест можна використати для обстеження пацієнта?

- a. Френчай
- b. Тінетті
- c. Перевірку за секундоміром
- d. "Встань та йди"
- e. Шестихвилинний тест ходьби

8. Дитина самостійно утримує положення сидячи в стільці, однак під час спроби виконати будь-яку активну дію спостерігається підвищення тону м'язів, приведення та внутрішня ротація ніг. Що може порекомендувати ерготерапевт у цьому разі?

- a. U-подібну ортопедичну подушку

- b. Циліндр
- c. Корсет із еластичними вставками
- d. Брючки для сидіння
- e. Наплічну хустку

9. Для діагностики якого захворювання використовують метод ультразвукової денситометрії?

- a. Остеохондрозу
- b. Спондильозу
- c. Коксартрозу
- d. Сколіозу

e. Остеопорозу

10. Вкажіть рівні незалежності в контексті ерготерапії.

- a. Незалежний, такий, що потребує допомоги, та залежний
- b. Незалежний, такий, що потребує допомоги чи нагадування, та залежний
- c. Незалежний, під наглядом, з мінімальною допомогою, з середньою допомогою, із максимальною допомогою, залежний
- d. Самостійний у виконанні занять та несамостійний у виконанні занять
- e. Незалежний та залежний

11. Яка з нижченаведених характеристик не належить до SMART-цілей, що визначаються для пацієнта?

- a. Вимірювана
- b. Реалістична
- c. Обмежена в часі
- d. Соціальна
- e. Специфічна

12. Визначте поняття "виконання заняття" в ерготерапії.

- a. Процес, коли завдяки вмінням і певним інструментам людина може створити певну річ
- b. Залучення до діяльності за допомогою навичок і вмінь
- c. Процес практичного застосування теоретичних знань
- d. Отримання результату від процесу виконання діяльності
- e. Акт реалізації вибраного заняття в результаті динамічної взаємодії між людиною, середовищем та заняттям

13. Який вид діяльності не належить до інструментальних активностей повсякденного життя?

- a. Здійснення покупок
- b. Приготування їжі
- c. Прибирання
- d. Споживання їжі
- e. Користування транспортом

14. Чоловіку віком 32 роки діагностовано гостре порушення мозкового кровообігу. Пацієнт перебуває в нестабільному стані у відділенні інтенсивної терапії. Коли потрібно розпочати реабілітаційні заходи з цим пацієнтом?

- a. Після виписки пацієнта в реабілітаційний центр або відділення
- b. Одразу після стабілізації стану пацієнта у відділенні інтенсивної терапії
- c. Після переведення пацієнта до палати стаціонару
- d. У відділенні інтенсивної терапії через 7 днів
- e. Одразу після інсульту в нестабільному стані

15. Жінка віком 82 роки перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні через перенесений інфаркт міокарда. Пацієнтка повідомляє, що відчуває задишку під час одягання. Яку рекомендацію має надати ерготерапевт?

- a. Спочатку одягати сорочку на праву верхню кінцівку
- b. Звертатися по допомогу до сестри медичної
- c. Використовувати одяг без ґудзиків і застібок
- d. Використовувати гачок для застібання ґудзиків сорочки

е. Одягаючись, сидіти на краю ліжка

16. Що з нижченаведеного повинен зробити ерготерапевт під час першого інтерв'ю з пацієнтом?

а. Запитати пацієнта про його інтереси

б. Проінформувати пацієнта про особливості ерготерапевтичних втручань, які пропонуються пацієнту

с. Попросити пацієнта продемонструвати активні рухи верхньої кінцівки

д. Проінформувати пацієнта про важливість оцінювання

е. Погодити з пацієнтом цілі ерготерапії

17. Чоловік віком 90 років має остеоартрит правого колінного суглоба. Відчуває труднощі з пересуванням та самообслуговуванням. Ерготерапевт вважає, що пацієнт потребує спеціального обладнання, яке сприятиме підвищенню його безпеки, однак чоловік від усього відмовляється. Які дії ерготерапевта є першочерговими?

а. Обговорити з дружиною пацієнта рекомендоване обладнання

б. Продовжувати переконувати пацієнта в необхідності обладнання

с. Надати рекомендоване обладнання у тимчасове безкоштовне користування

д. Знайти можливість для пацієнта придбати рекомендоване обладнання зі знижкою

е. Задokumentувати відмову пацієнта від обладнання

18. За допомогою якого методу можна визначити здатність пацієнта модифікувати ходьбу, пов'язану з рухом голови, когнітивними завданнями, зміною її швидкості чи перешкодами?

а. Динамічний індекс ходьби

б. Тест "Встань та йди"

с. Шестихвилинний тест

д. Індекс Мотрісіті

е. Десятиметровий тест ходьби

19. У пацієнтки діагностовано синдром Броуна-Секара. Яке порушення буде виявлено ерготерапевтом під час первинного оцінювання?

а. Параліч та біль

б. Параліч і часткова втрата відчуття болю, температури та дотику вище від рівня ураження

с. Параліч і повна втрата відчуття болю, температури та дотику нижче від рівня ураження

д. Руховий параліч і втрата пропріоцепції на контралатеральній стороні та втрата відчуття болю, температури і дотику на іпсилатеральній стороні нижче від рівня ураження

е. Руховий параліч і втрата пропріоцепції на іпсилатеральній стороні та втрата відчуття болю, температури і дотику на контралатеральній стороні нижче від рівня ураження

20. Які потенційні предиктори відновлення для верхньої кінцівки в осіб з ураженням головного мозку?

а. Активне розгинання великого пальця та згинання плеча в перші 48 год

б. Відсутність спастичності в перші 72 год

с. Активне згинання пальців у перші 72 год

д. Активне згинання кисті та згинання передпліччя в перші 72 год

е. Активне розгинання великого пальця та відведення плеча в перші 48 год

21. Яке положення кисті та пальців повинен забезпечувати статичний ортез на долонну сторону кисті та передпліччя, що накладається після опіків?

а. 30° екстензії кисті, 0° флексії метакарпофалангових суглобів II-V пальців, міжфалангові суглоби в положенні екстензії, великий палець відведений

б. 30° екстензії кисті, 90° флексії метакарпофалангових суглобів II-V пальців, міжфалангові суглоби в положенні екстензії, великий палець відведений

с. 0° екстензії кисті, 90° флексії метакарпофалангових суглобів II-V пальців, міжфалангові суглоби в положенні екстензії, великий палець відведений

д. 0° екстензії кисті, 90° флексії метакарпофалангових суглобів II-V пальців, міжфалангові суглоби в положенні екстензії, великий палець приведений

е. 5° екстензії кисті, 90° флексії метакарпофалангових суглобів II-V пальців, міжфалангові

суглоби в положенні екстензії, великий палець приведений

22. Що належить до адаптивних технологій для ADL?

- a. Комунікаційні дошки, спеціальне програмне забезпечення, картки для альтернативної комунікації
- b. Ортез відпочинку на кисть, резинка на великий палець
- c. Стілець для душу, ручка з піни для зубної щітки, тарілка з бортиком, підвищене сидіння для туалету
- d. Крісло колісне, милиці, тростини
- e. Ручка з піни для олівця/ручки, адаптивна дошка для нарізання, тримач для посуду

23. Пацієнту встановлено діагноз: слуховий неглект. Яку тактику потрібно застосувати ерготерапевту для підтвердження діагнозу?

- a. Попросити пацієнта виконати будь-яку дію
- b. По черзі з одного та з іншого боку плескати долонями за спиною в пацієнта
- c. Попросити пацієнта скопіювати малюнок годинника
- d. Гучно увімкнути музику
- e. Зав'язати очі пацієнту та перевірити його координацію

24. Укажіть основну мету ерготерапевта під час роботи з пацієнтом із хворобою Паркінсона.

- a. Навчити не комплексувати при треморі
- b. Навчити самостійно їсти
- c. Навчити самостійно ходити
- d. Навчити самостійно виконувати гігієнічні процедури
- e. Максимально довго зберегти здатність пацієнта до незалежності та самообслуговування

25. Чоловіку віком 27 років діагностовано тендопатію ротаторної манжети плеча. Усі фізіологічні рухи збережені. Силові показники за MMT становлять 4/5. Набряку немає. Результати тестування швидкості та швидкості "Box and blocks" у межах норми. За шкалою DASH функціональна можливість використовувати верхню кінцівку в межах норми, спостерігається лише мінімальний біль. Який вид занять використовуватиме ерготерапевт?

- a. Завдання-орієнтоване тренування
- b. Тренування на дрібну моторику
- c. Сила
- d. Гнучкість
- e. Витривалість

26. Ерготерапевт проводить скринінгове оцінювання пацієнта, якому нещодавно наклали гіпс на ліву верхню кінцівку. Яка з нижченаведених ситуацій має його найбільше насторожити?

- a. Зауваження про недотримання рекомендацій лікаря щодо тримання руки у піднятому положенні
- b. Скарга на свербіж лівої руки
- c. Роздратування щодо неможливості нормального миття
- d. Скарга на біль у лівому передпліччі
- e. Скарга на прояви артриту у зап'ястях під час спирання на милиці

27. Що означає оцінка 35 балів за шкалою самооцінки побутових можливостей повсякденного життя Мертон і Саттон?

- a. Повну побутову адаптацію
- b. Відсутність побутової адаптації
- c. Достатню побутову адаптацію
- d. Мінімальну побутову адаптацію
- e. Задовільну побутову адаптацію

28. Жінка звернулась до ерготерапевта через 6 місяців після інсульту. Який метод оцінювання найкраще застосувати для визначення бачення пацієнтки власної можливості функціонального використання кисті та руки?

- a. Опитувальник DASH - Disability of Arm Shoulder and Hand
- b. Тест функціонування Джебсона-Тейлора

- c. -
- d. Модифіковану шкалу Ашфорта
- e. Шкалу Фугл-Мейера

29. Чоловіку віком 72 роки діагностовано хворобу Альцгеймера. У другій половині дня він самостійно ходить у сад. Які стратегії допоможуть йому не заблукати?

- a. Фотографії
- b. Годинник
- c. Значущі предмети протягом всього маршруту
- d. Щоденник
- e. Календар

30. Немовля народилося у терміні гестації 32 тижні. Має вагу 2200 г, довжину тіла - 48 см. Визначте стан новонародженої дитини.

- a. З малою масою тіла при народженні
- b. -
- c. Із затримкою внутрішньоутробного розвитку
- d. Недоношена
- e. З ознаками гіпотрофії

31. Який тест можна використовувати для тестування координаційних здібностей літніх людей?

- a. Мотрісіті
- b. Ловетта
- c. Френчай
- d. Тінетті
- e. Флосінга

32. Щоб вибрати тест для обстеження пацієнта, необхідно спиратися на основні вимоги до використання тесту. Яка ключова вимога для використання тесту в неврології?

- a. Ергономічність
- b. Типовість
- c. Валідність
- d. Доцільність
- e. Ефективність

33. Трирічна дитина із церебральним паралічем має труднощі зі споживанням їжі. Для побудови плану терапії потрібно визначити рівень навичок. За допомогою якого інструмента оцінювання ерготерапевт має змогу чітко визначити рівень умінь споживання?

- a. Сенсорного профілю
- b. Оцінки рівня розвитку дітей
- c. Педіатричного опитувальника якості життя
- d. Системи класифікації спроможності вживання їжі та рідини
- e. Питальника визначення дитячої інвалідності

34. Чоловік віком 71 рік шпиталізований з приводу пневмонії та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Він пересувається самостійно. За всі інструментальні активності повсякденного життя відповідає його дружина. Пацієнт не демонструє порушень когнітивної функції. Він працював столяром і як хобі продовжує виготовляти меблі. Яку рекомендацію насамперед потрібно дати пацієнту щодо продовження столярної справи?

- a. Використовувати легші інструменти
- b. Вдягати маску
- c. Продовжувати цю діяльність не можна з таким діагнозом
- d. Працювати вранці
- e. Сидіти на високому табуреті

35. Яка компенсаторна стратегія не підходить пацієнту з геміплегією?

- a. Формування звички спрямовувати увагу на уражену кінцівку
- b. Покращення спритності дрібної моторики неуразованої кінцівки, якщо домінуюча кінцівка є

ураженою

- с. Забезпечення допоміжними пристроями, які замінюють функцію стабілізації або утримання ураженої кінцівки
- d. Навчання прийомам виконання однією рукою тих завдань, що зазвичай виконуються двома руками
- е. Навчання рухатися за підказками

36. Чотирирічна дитина з атаксією самостійно не п'є з чашки та розливає воду, інколи навіть не доносячи її до рота. Який посуд для пиття необхідно порекомендувати?

- a. Склянка без ручок, у яку вставлена довга соломинка, що має товсті стінки та вузький простір
- b. Чашку з товстими ручками та кришкою, в яку вставлена коротка соломинка, що має товсті стінки та вузький простір**
- с. Склянка без ручок з вирізом для губ
- d. Звичайна чашка з довгою соломинкою
- е. пляшка із соскою

37. Який параметр оцінює мануально-м'язове тестування?

- a. Силу м'язів**
- b. Чутливість м'язів
- с. Пропріоцепцію
- d. Діапазон рухів у суглобах
- е. Витривалість м'язів

38. Яке положення гомілковостопного суглоба повинна забезпечувати статична шина, що накладається після опіків?

- a. 20° дорсальної флексії
- b. 20° інверсії
- с. 30° плантарної флексії
- d. Нейтральне положення 90°**
- е. 20° еверсії

39. Хлопець віком 18 років отримав травму голови. У нього спостерігається сильне порушення координації, але він хоче самостійно їсти. Однак коли він їсть самостійно, дуже брудниться, і батько наполягає на тому, щоб його годували. Яка ваша подальша тактика?

- a. Порадьте батьку знайти особу, яка би могла годувати хлопця
- b. Послухаєте батька, бо він - єдиний доглядальник за сином
- с. Дослухаєтеся до пацієнта та його потреб**
- d. Поясніть хлопцю, що він не зможе самостійно це робити, і батько не проти йому допомагати
- е. Проведете навчання з використанням пластикових предметів

40. Ерготерапевт працює у центрі для осіб із порушеннями психічного здоров'я. Один із пацієнтів скаржиться, що після зміни ліків він відчуває труднощі з читанням інструкцій на роботі. Яку тактику потрібно застосувати ерготерапевту першочергово?

- a. Переконати пацієнта в тому, що порушення зору не пов'язане з прийманням ліків
- b. Звернутися до лікаря-офтальмолога для перевірки зору
- с. Заохочувати пацієнта проконсультуватися з лікарем-психіатром щодо виявлених проблем із зором**
- d. Запропонувати пацієнту купити окуляри для читання в місцевій аптеці
- е. Навчити пацієнта, як обговорити його проблему з роботодавцем

41. За допомогою якої шкали оцінюють морфологічну та функціональну незрілість організму, його органів і систем у недоношених дітей?

- a. МоСА
- b. Бартел
- с. Баллард**
- d. Апгар
- е. FIM

42. Ерготерапевт працює з пацієнтом із травмою сегмента спинного мозку рівня C<sub>8</sub>. Яких

цілей може досягти пацієнт?

- a. Бути незалежним в усіх ADL (активностях повсякденного життя) із використанням допоміжних засобів
- b. Бути незалежним в усіх ADL (активностях повсякденного життя) без допоміжних засобів**
- c. Виконувати більшість ADL (активностей повсякденного життя) із використанням тенодезного хапання
- d. Виконувати більшість ADL (активностей повсякденного життя)
- e. Виконувати більшість ADL (активностей повсякденного життя) із використанням допоміжних засобів

43. У будинку для літніх людей жінці віком 83 роки діагностовано хворобу Альцгеймера. Пацієнтка дезорієнтована в часі та просторі, що погіршує її координацію та рівновагу під час ходьби. Вона не знає, де перебуває та чому, відмовляється користуватися кріслом колісним. Яку з нижченаведених рекомендацій надасть ерготерапевт першочергово?

- a. Рекомендувати пацієнтці штовхати крісло колісне перед собою для безпеки
- b. Рекомендувати пацієнтці не виходити зі своєї кімнати
- c. Рекомендувати членам родини постійно бути поруч із пацієнткою
- d. Рекомендувати членам сім'ї принести родинні фотографії в кімнату пацієнтки**
- e. Скерувати пацієнтку до психіатра або психотерапевта

44. Який етап рухового навчання потребує словесних і тактильних сигналів для правильного виконання вправи?

- a. Формувальний
- b. Асоціативний
- c. Когнітивний**
- d. Автономний
- e. Маніпулятивний

45. До ерготерапевта звернулася сім'я п'ятирічного хлопчика з такими поведінковими розладами: вибірковість у їжі й тактильна надчутливість. Який метод ерготерапевтичного оцінювання найдоцільніший для розуміння причини заняттєвих проблем?

- a. Анкетування
- b. Тестування великих моторних функцій
- c. Сенсорний профіль**
- d. Опитувальник якості життя
- e. Заняттєвий аналіз

46. Проведено первинне оцінювання пацієнтки, яка перенесла інсульт середньої мозкової артерії 2 тижні тому. Жінка демонструє порушення динамічної рівноваги сидячи під час виконання особистих ADL (активностей повсякденного життя), динамічної рівноваги під час функціональних переміщень та лівосторонній неглект. Яке втручання найкраще задовольняє усі потреби пацієнтки?

- a. Виконання завдань, сидячи за столом із папером та ручкою, для розширення лівого поля зору
- b. Тренування зорового сканування полицки над умивальником для пошуку засобів гігієни під час умивання та чищення зубів**
- c. Залучення клієнтки до вправ для покращення рівноваги у терапевтичній залі
- d. Виконання будь-яких значних для пацієнта завдань
- e. Залучення клієнтки до споживання їжі, сидячи за столом, із вербальними підказками для уваги до лівого боку

47. Який ступінь залежності відображає шкала FIM, якщо пацієнт у домені "самообслуговування" має оцінку меншу ніж 1?

- a. Потребує супервізії
- b. Мінімальна залежність
- c. Незалежний
- d. Повна залежність**
- e. Максимальна залежність



48. Що здійснює ерготерапевт, розбиваючи заняття на складові частини та визначаючи послідовність їх виконання пацієнтом, з урахуванням стабільних і ситуативних складників, які можуть на нього впливати?

a. Заняттєвий аналіз

b. Градування

c. Заняттєву ідентичність

d. Скринінг

e. Заняттєву адаптацію

49. Пацієнт скаржиться на труднощі в користуванні мобільним телефоном, зазначає, що не бачить ліву нижню частину екрана. Яке функціональне порушення спостерігається в пацієнта?

a. Квадроплегія

b. Атаксія

c. Квадрантопія

d. Неглект

e. Геміанопсія

50. Що таке терапевтичні стосунки з точки зору ерготерапії?

a. Процес, коли ерготерапевт та пацієнт працюють над покращенням функціональних можливостей

b. Взаємодія між ерготерапевтом та пацієнтом, у якій ерготерапевт відповідальний за залучення до процесу ерготерапії, сприяння реабілітаційному процесу

c. Процес, коли ерготерапевт пояснює пацієнту, що він повинен взяти на себе відповідальність за своє відновлення

d. Взаємодія між ерготерапевтом та пацієнтом, у якій ерготерапевт знає, у якій ситуації треба порадити пацієнту звернутися до психолога чи іншого спеціаліста

e. Процес, коли ерготерапевт визначає цілі, яких може досягнути пацієнт в процесі втручання, та будує відповідний план терапії

51. Чоловік віком 71 рік був шпиталізований з приводу гострої пневмонії та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). Пересувається самостійно. Проживає з дружиною у фізично доступному одноповерховому будинку. За всі інструментальні активності повсякденного життя відповідає його дружина. Пацієнт не демонструє порушень когнітивної функції. Яку діяльність було б найважливіше виконувати пацієнтові?

a. Купання у ванній

b. Оплата рахунків

c. Туалет

d. Керування автомобілем

e. Гоління

52. Жінці віком 42 роки діагностовано адгезивний капсуліт плеча. Пацієнтка скаржиться на сильний біль, обмеження активної та пасивної амплітуди рухів, набряк. Працює пекарем та хоче повернутися до роботи. Яке оцінювання потрібно провести пацієнтці?

a. Шкала DASH, специфічні тести для плеча, візуально-аналогова шкала, сантиметрова стрічка для перевірки наявності набряку, тест "Box and blocks", гоніометрія, COMP

b. Тест "Box and blocks", MMT, специфічні тести для плеча, гоніометрія

c. Тест "Box and blocks", шкала DASH, специфічні тести для плеча, гоніометрія

d. MMT, гоніометрія, наявність набряку, COMP

e. Тест "Box and blocks", шкала DASH, специфічні тести для плеча, візуально-аналогова шкала

53. Дайте рекомендації щодо пози для сну пацієнту після ендопротезування кульшового суглоба через 1 тиждень після операції.

a. На спині з подушкою під колінними суглобами

b. Лежачи на спині з подушкою для відведення між ногами

c. На неоперованому боці з подушкою для відведення між ногами

d. На неоперованому боці без допоміжних пристроїв

e. На оперованому боці з подушкою для відведення між ногами



54. Який рух потрібно зробити, для перевірки спастичності м'язів задньої групи стегна (hamstring muscles group)?

- a. Швидке розгинання стегна
- b. Повільне розгинання стегна

**c. Швидке згинання гомілки**

- d. Повільне розгинання гомілки
- e. Швидке розгинання гомілки

55. У дитини з атаксією порушені стабільність, координація та селективність рухів. Що може рекомендувати ерготерапевт для чіткішого сприйняття дитиною сенсорної інформації від свого тіла (положення тіла в просторі)?

- a. Вертикалізатор
- b. Брючки для сидіння
- c. Корсет із еластичними вставками

**d. Жилет зі свинцевими вставками**

- e. Ходунки

56. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: травма спинного мозку на рівні Th9-Th10, ASIA C, нижня параплегія. Об'єктивно спостерігається: самостійне присаджування на край ліжка, з незначною допомогою переміщення на приліжкове крісло та приліжковий туалет, самостійне пересування на кріслі колісному, самостійне вдягання одягу на верхню частину тіла, з помірною допомогою - на нижню частину тіла. Із анамнезу відомо, що працював водієм-експедитором, через травму втратив роботу. Одружений, дітей не має. Добре вмотивований. На якій довгостроковій цілі в контексті домена участь (за МКФ) фокусуватиметься кінцевий результат ерготерапії для пацієнта?

- a. Навчання самостійному переміщенню на крісло
- b. Навчання вдягання речей на нижню частину тіла
- c. Навчання користуванню туалетом

**d. Повернення до роботи або її модифікація**

- e. Відновлення сили м'язів нижніх кінцівок

57. Який допоміжний засіб не потребують пацієнти з бічним аміотрофічним склерозом у паліативному періоді?

- a. Крісло колісне на електричному приводі
- b. Засіб альтернативної та допоміжної комунікації
- c. Окуляри

**d. Слуховий апарат**

- e. Апарат штучної вентиляції легень

58. Яке адаптивне обладнання рекомендоване пацієнту з ампутацією нижньої кінцівки нижче коліна з метою профілактики контрактур у колінному суглобі?

- a. Постійне носіння статичного ортеза на колінному суглобі в положенні флексії 10°
- b. Постійне носіння статичного ортеза на колінному суглобі в положенні флексії 30°

**c. Використання опорної дошки для уникнення флексії в колінному суглобі**

- d. Постійне носіння статичного ортеза на колінному суглобі в положенні флексії 90°
- e. Постійне носіння статичного ортеза на колінному суглобі в положенні флексії 45°

59. Під час обстеження чоловіка після перенесеного ГПМК виявилось, що в нього слабкість у верхній та нижній кінцівках з правого боку. Який тип ослаблення м'язів наявний у цього пацієнта?

- a. Параплегія

**b. Геміпарез**

- c. Геміплегія

- d. Парапарез

- e. Тетрапарез

60. Які втручання найдоречніше проводити ерготерапевту дитині, у якій присутня гравітаційна невпевненість, з метою підвищення толерантності до рухової активності та зменшення страху?

- a. Мінімізувати вестибулярні стимуляції
- b. Активність, яка вимагає використання симетричних рухових патернів (наприклад, гра в м'яч обома руками)
- c. Активність, яка вимагає стабільного поля зору під час руху (наприклад, кидання в ціль під час руху)
- d. Лінійні, вертикальні рухи (наприклад, батут), гойдання на низько підвішених гойдалках з двома точками кріплення
- e. Активність, яка вимагає чергування рухових патернів (наприклад, перетягування канату)

61. Якою є залежність пацієнта в активності повсякденного життя за індексом Бартела, якщо цей індекс становить 50 балів?

- a. Повна
- b. Відсутня
- c. Легка
- d. Виражена
- e. Помірна

62. Яка мета аналізу виконання заняттєвої активності?

- a. Зрозуміти, якому заняттю пацієнт надає перевагу
- b. Зрозуміти якомога більше про те, які заняття пацієнт може, хоче або повинен виконувати; виявити перешкоди на рівні особи, середовища та заняття; визначити, що потрібно для залучення у виконання активності
- c. Зрозуміти, чи вдасться пацієнту виконати заняття
- d. Дізнатися, як пацієнт виконує заняття
- e. Продемонструвати родичам пацієнта, що він може бути незалежним у виконанні занять

63. Недоношена дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Через м'язову слабкість відсутні антигравітаційні довільні рухи верхніми кінцівками. Позиціонування в якому положенні сприятиме функціональним рухам "з рук у рот"?

- a. Напівлежачи на спині
- b. Лежачи на боці
- c. Лежачи на животі
- d. -
- e. Лежачи на спині

64. Тримісячна дитина має вроджену правобічну кривошию. Оберіть положення для позиціонування, які сприятимуть корекції асиметричної пози та постави.

- a. Положення лежачи на животі та на спині
- b. Положення лежачи на спині та сидячи під прямим кутом
- c. -
- d. Положення лежачи на животі та на правому боці
- e. Положення лежачи на животі та на лівому боці

65. Мати дитини, у якої знижений м'язовий тонус, звернулася до ерготерапевта з проханням зробити для дитини корсет з еластичними вставками для стимуляції сприйняття власного тіла. Які розміри ерготерапевт повинен врахувати?

- a. На спині - до верху лопаток, спереду - 3-4 см вище сосків, з боків - від пахової западини і до стегна
- b. На спині - до верху лопаток, спереду - 3-4 см вище сосків, з боків - 2 см вниз від пахової западини і вниз до великого вертлюга
- c. На спині - від низу лопаток, спереду - 3-4 см вище сосків, з боків - 2 см вниз від пахової западини і до великого вертлюга, на нижньому краї спереду повинна бути виїмка (приміряти сидячи)
- d. На спині - до середини лопаток, спереду - 5-6 см нижче сосків, з боків - 2 см вниз від пахової западини і до великого вертлюга
- e. На спині - до середини лопаток, спереду - 3-4 см вище сосків, з боків - 2 см вниз від пахової западини і до великого вертлюга, на нижньому краї спереду повинна бути виїмка (приміряти сидячи)

66. Жінка віком 66 років перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції на шлунку. Вона має масу тіла 147 кг та вимагає певного методу переміщення, щоб вставати з ліжка. Ерготерапевт не знайомий із цим видом трансферу. Асистент ерготерапевта працює у відділенні два роки і має досвід роботи з клієнтами, які мають ожиріння. Що повинен зробити ерготерапевт у цьому разі?

- a. Доручити трансфер пацієнтки сестрі медичній, яка працює у відділенні
- b. Уповноважити асистента самостійно виконувати трансфер
- c. Відмовитися від трансферу пацієнтки через ризик травми
- d. Попросити асистента ерготерапевта продемонструвати трансфер
- e. Виконувати трансфер із використанням техніки, що добре знайома ерготерапевту

67. Під час тестування чоловіка віком 80 років виявлено: пацієнту складно сконцентруватися та зрозуміти поточну ситуацію, наявні проблеми з пам'яттю та іншими когнітивними здібностями. Для якого патологічного стану характерна така клінічна картина?

- a. Гострого порушення мозкового кровообігу
- b. Деадаптації
- c. Деменції
- d. Депривації
- e. Хвороби Паркінсона

68. Які адаптивні засоби потенційно можуть бути рекомендовані для пацієнта з хворобою Альцгеймера?

- a. Обтяжувачі на столові прибори та засоби для хобі (ручки, олівці тощо)
- b. Засоби для мобільності - милиці та ходунки
- c. Адаптовані столові прибори - виделки та ложки з товстими ручками, адаптована дошка для нарізання
- d. Засоби для користування у ванній кімнаті та для одягання з подовженими ручками
- e. Органайзери для медикаментів, прилади для нагадування (звукові та світлові), календар подій та графік дня

69. Що означає термін "ейджизм" у контексті ерготерапії?

- a. Категорія людей похилого віку
- b. Форма упередженого ставлення, що ґрунтується на загальних припущеннях, стереотипах про старих людей
- c. Підхід, спрямований на пропаганду здорового способу життя серед людей похилого віку
- d. Категорія людей похилого та старечого віку
- e. Що людині мінімум 65 років

70. За яких станів дітям рекомендоване застосування перлинних ванн та яка кількість процедур передбачена?

- a. Функціональні розлади нервової системи, 10 процедур
- b. Хвороби травної системи, 12 процедур
- c. Захворювання сечовидільної системи, 9 процедур
- d. Травми опорно-рухового апарату, 8 процедур
- e. Захворювання шкіри, 11 процедур

71. Жінка віком 90 років скаржиться на зниження пам'яті, що заважає їй у повсякденному житті. Лікар призначив ліки, але пацієнтка забуває їх приймати. Яку рекомендацію може надати ерготерапевт?

- a. Тримати ліки поруч із їжею, щоб не забувати їх приймати разом або після їжі
- b. Використовувати нагадування, не залежні від соціального середовища - будильники, таймери на побутовій техніці, стікери
- c. Просити родичів взяти під контроль процес приймання ліків
- d. Звернутися до представників соціальних служб, які будуть приходити та давати їй ліки вчасно
- e. Домовитися із сусідкою, щоб вона приходила до жінки та давала їй ліки

72. Що може запропонувати ерготерапевт пацієнту з порушенням розрізнення правої та лівої

сторони в контексті виконання ADL та IADL?

- a. Використання контрастних кольорів у домашньому середовищі
- b. Використання письмових підказок і покрокових інструкцій
- c. Використання допоміжних засобів для одягання - засоби для взування з подовженою ручкою, допоміжний засіб для вдягання шкарпеток та одягу на нижню частину тіла
- d. Маркування різними кольорами предметів різного призначення
- e. Маркування сторін одягу та взуття, використання яскравого браслета чи годинника на руці**

73. Чоловік після перенесеної черепно-мозкової травми під час первинного огляду ерготерапевта був наляканий, не розумів, що терапевт намагається допомогти. Реагував різко на навколишні стимули, але поведився стримано, боячись нашкодити собі. Зосереджувався на фізіологічних потребах (зокрема візит до туалету), одягнув кофтину з допомогою та за вказівками дружини. На якому рівні когнітивного функціонування шкали Ранчо перебував чоловік?

- a. 7
- b. 4**
- c. 9
- d. 1
- e. 6

74. Пацієнт після перенесеного ГПМК повідомляє ерготерапевту, що не впізнає своїх рідних та знайомих. Яке порушення спостерігається в пацієнта?

- a. Агнозія
- b. Апраксія
- c. Неглект
- d. Ністагм
- e. Прозопагнозія**

75. Жінка віком 46 років скаржиться на появу хиткості вправо під час ходьби, не може втримати ложку в правій руці (вміст ложки розливається). У пацієнтки змінився почерк - літери стали великими, розмашистими. Під час обстеження виявлено горизонтальний ністагм при погляді вправо. Під час пальце-носової проби спостерігаються кінетичний тремор із амплітудою <5 см у правій руці, знижений м'язовий тонус, гіперметрія правої верхньої та нижньої кінцівок. Під час проби Ромберга виявлено нестійкість із відхиленням вправо та назад. Який синдром порушення координації виявлено у цієї пацієнтки?

- a. Правосторонню коркову атаксію
- b. Правосторонню мозочкову атаксію**
- c. Правосторонню сенситивну атаксію
- d. Правосторонню лобну атаксію
- e. Правосторонню вестибулярну атаксію

76. Пацієнт після ГПМК під час обстеження із застосуванням функціональної шкали рівноваги Берга набрав 39 балів. Про що свідчить така кількість балів?

- a. Здатність переміщуватися, високий ризик падіння
- b. Незалежність від зовнішньої підтримки, малий ризик падіння
- c. Здатність ходити без допоміжних засобів
- d. Здатність ходити з допомогою, середній ризик падіння**
- e. Повністю залежить від крісла колісного, високий ризик падіння

77. Жінка після ендопротезування кульшового суглоба (тиждень після операції) звернулася до ерготерапевта. Її запит стосується правильного положення під час сну. Що може рекомендувати ерготерапевт?

- a. На оперованому боці з подушкою для відведення між ногами для уникнення внутрішньої ротації та аддукції
- b. Тільки на неоперованому боці без допоміжних засобів
- c. Обмежень у положенні під час сну немає
- d. Положення під час сну - лежачи на спині, не використовуючи допоміжні засоби, або на оперованому боці з подушкою для відведення з метою уникнення аддукції

е. На спині, використовуючи подушку між ногами, зі згоди терапевта - на неоперованому боці з подушкою для відведення для уникнення внутрішньої ротації та аддукції

78. Який вектор для адаптації процесу навчання, зокрема письма, для дітей із м'язовою дистрофією Дюшена є найкращим?

- a. Зміна нахилу столу
- b. Зміна положення впродовж заняття
- c. Перерви під час заняття
- d. Заміна ручки на легшу

е. Застосування програми голосової активації

79. Ерготерапевт під час роботи з пацієнтом із прозопагнозією вчить його асоціювати людину з її характерними рисами (голосом, мімікою, способом ходьби, зростом) та вчить родичів важливості використання голосу, міміки та інших специфічних ознак. Який підхід використовує терапевт?

- a. Відновлення
- b. -
- c. Навчальний
- d. Компенсаторний

е. Адаптаційний

80. Жінка віком 63 роки хворіє на морбідне ожиріння і два дні тому перенесла операцію шлункового шунтування. Перебуває у відділенні інтенсивної терапії через перфорацію кишечника. Під час зміни положення тіла пацієнтка впала з ліжка на підлогу. Після цього вона почала відмовлятися від мобілізації. У пацієнтки підвищений ризик захворіти на аспіраційну пневмонію. Що повинен зробити ерготерапевт прешочергово, щоб попередити акт аспірації?

a. Підняти узголів'я та підніжжя ліжка

- b. Оцінити ковтання
- c. Забезпечити пацієнтку протертою їжею
- d. Забезпечити пацієнтку адаптованим посудом
- e. Заохочувати пацієнтку часто кашляти

81. Шестирічна дитина має геміпарез з лівого боку. Когнітивний стан збережений. Не залучає ліву верхню кінцівку в побуті та під час гри. Яка терапія є провідною під час занять з ерготерапевтом для вирішення проблеми?

- a. Сенсорна інтеграція
- b. Бобат-терапія
- c. Войта-терапія

d. Індукована обмеженням рухова терапія

е. Дзеркальна терапія

82. Укажіть специфічну шкалу, яку використовують для оцінки якості життя після інсульту.

a. Ноттінгемський профіль здоров'я

b. Шкалу впливу інсульту

- c. Шкалу профілю впливу хвороби
- d. Шкалу інсульту Національного інституту здоров'я
- e. Європейську шкалу інсульту

83. У пацієнтки віком 63 роки з паркінсонізмом під час наближення ручки до аркуша з'являється сильне треміння рук. Які рекомендації може надати ерготерапевт у цьому разі?

a. Класти аркуш на м'яку поверхню

b. Належне освітлення, обтяжувачі на ручки та олівці

- c. Вибір тонких ручок для письма
- d. Використовувати контрастні кольори ручки та аркуша
- e. Користування електронними приладами для написання листів або стороння допомога

84. У пацієнта після перенесеного ГПМК під час оцінки дрібної моторики спостерігається використання компенсаторних рухів ліктем при спробах посунути запропоновані предмети. Який тип хапання спостерігається у пацієнта?

- a. Третинний неповний
- b. Неповний
- c. Третинний
- d. Первинний
- e. Вторинний

85. Чоловік отримав спінальну травму, перебуває у відділенні нейрореабілітації та вчиться вдягатися. Йому ніяк не вдається зробити це самостійно. Він швидко втомлюється та втрачає мотивацію повертатися до заняття. Який підхід може виявитися правильним, щоб він зміг виконати це заняття самостійно?

- a. Складання алгоритму дій та слідування йому

**b. Градування**

- c. Допомога сторонньої особи
- d. Підказки
- e. Він не зможе сам виконувати це заняття, тому треба призначити особу, яка весь час буде піклуватися про нього

86. Скільки існує рівнів залежності за шкалою FIM: критерії функціональної незалежності старих людей?

- a. 5
- b. 4
- c. 2
- d. 3

**e. 7**

87. Яка загальна тривалість реабілітаційних сесій протягом робочого дня ерготерапевта, що працює на повну ставку, під час надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних та/або амбулаторних умовах згідно з чинним законодавством України?

- a. Не менше 2 год
- b. Не менше 7 год
- c. 8 год

**d. Не більше 6 год**

- e. Не більше 5 год

88. Пацієнт віком 20 років з діагнозом: травма спинного мозку, неврологічний рівень C<sub>6</sub>, ASIA A) Після травми минув один місяць. Під час заняття в ліжку в положенні лежачи виникли такі симптоми: головний біль, раптове збільшення артеріального тиску на 30 мм рт. ст., потовиділення вище рівня ураження. Яку допомогу потрібно швидко надати пацієнту?

- a. Покласти та підняти ноги вище рівня тулуба
- b. Посадити та підняти ноги під кутом більше ніж 90°
- c. Покласти з прямими ногами
- d. Перевернути на правий бік і зігнути ноги в колінах

**e. Посадити та опустити ноги**

89. Який вид контролю застосовують для оцінки ефективності проведеного комплексного лікування та його корекції?

- a. Поєднаний
- b. Одночасний

**c. Етапний**

- d. Комплексний
- e. Тимчасовий

90. Чоловік навчається підніматися сходами після перенесеного ГПМК. Яку ногу пацієнту потрібно першою ставити на сходинку?

- a. Паретичну

**b. Непаретичну**

- c. Ту саму, що і під час спуску
- d. Протилежну тій, що ставиться першою під час спуску

е. Немає різниці

91. Ерготерапевт оглядає пацієнта віком 65 років з черепно-мозковою травмою для оцінки його активності та здатності до самообслуговування. Ерготерапевт просить приготувати просту гарячу їжу. Пацієнт відповідає, що зазвичай не готує їжу вдома. Яка тактика ерготерапевта в цьому разі?

**а. Запитати у пацієнта, чим він хоче займатися**

б. Попросити пацієнта докласти зусиль для виконання цього заняття

с. Призначити особу, яка піклуватиметься про пацієнта

д. Інформувати пацієнта про характер його травми та можливі наслідки

е. Інформувати пацієнта про важливість виконання цього заняття для якісної оцінки функціональних можливостей

92. Якому діапазону відповідає задовільна адаптація за шкалою самооцінки побутових можливостей повсякденного життя Мертон і Саттон?

а. Від 46 до 55 балів

б. Від 50 до 65 балів

с. Від 10 до 25 балів

д. Від 20 до 40 балів

**е. Від 30 до 45 балів**

93. Під час роботи з пацієнтом із контрактурою в ліктьовому суглобі відзначається патологічне кінцеве відчуття "спазму м'яза". Які симптоми спостерігаються у пацієнта?

**а. М'яз рефлекторно зупиняє рух через сильний біль**

б. Відсутність механічної протидії, але рух зупиняється через сильний біль

с. Подібне до нормального, але виникає раніше

д. Виникає ефект віддачі при найбільшій амплітуді

е. Подібне до нормального відчуття розтягнення м'яких тканин, але виникає значно раніше, відчуття віддачі відсутнє

94. Недоношена дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Зовнішня шкідлива стимуляція (яскраве світло, гучні сторонні звуки) викликає у дитини стрес. Які з нижченаведених ознак є моторними ознаками стресу у дитини?

а. Збільшення частоти дихання та типу дихання

**б. Гримаса, гіперекстензія кінцівок і тулуба**

с. Підвищення показників серцево-судинної системи

д. Дратівливість або сонливість

е. -

95. Яка послідовність спускання сходами з двома милицями після операційного втручання на нижній кінцівці?

а. Милиці, неоперована кінцівка, прооперована кінцівка

б. Неоперована кінцівка, милиці, прооперована кінцівка

с. Неоперована кінцівка, прооперована кінцівка, милиці

**д. Милиці, прооперована кінцівка, неоперована кінцівка**

е. Прооперована кінцівка, неоперована кінцівка, милиці

96. Дайте визначення терміна "апоптоз" в контексті теорій старіння.

а. Процес заміщення здорових клітин на погані

б. Процес згасання енергії в організмі

с. Процес поступового знищення здорових клітин організму

**д. Процес запрограмованої загибелі клітин**

е. Процес погіршення функцій та систем організму

97. Працюючи з чоловіком віком 40 років, який має порушення процесуальних навичок, ерготерапевт застосовує модель заняттєвої активності людини. Його метою є покращення виконавчих моделей для успішної заняттєвої участі пацієнта. З анамнезу відомо, що чоловік переніс ЧМТ (черепно-мозкову травму). Яке завдання під час реабілітаційної сесії якнайкраще відповідає поставленим цілям ерготерапевта?



- a. Приготування простої страви
- b. Заповнення чеклисту інтересів
- c. Написання списку для здійснення покупок
- d. Організація списку щоденних завдань**
- e. Виконання будь-якої активності повсякденного життя

98. Чоловік віком 84 роки хворіє на хронічну серцеву недостатність унаслідок ішемічної хвороби серця. Він відчуває труднощі з пересуванням, деякими аспектами самообслуговування та демонструє зниження витривалості. Враховуючи стан серцево-судинної системи пацієнта, виконання якого завдання було б для нього найскладнішим?

- a. Знімання взуття
- b. Миття голови під душем**
- c. Одягання светра-пуловера
- d. Гоління електробритвою
- e. Підстригання нігтів

99. Пацієнт має підвищений тонус у правій верхній кінцівці дистальніше ліктя внаслідок інсульту. Ерготерапевт позиціонує пацієнта в положенні лежачи на правому боці. Яка основна перевага цього положення тіла?

- a. Сприяння безпечному переміщенню в ліжку
- b. Сприяння виконанню активностей повсякденного життя
- c. Сприяння активному використанню протилежної частини тіла
- d. Сприяння комфортному положенню тіла пацієнта
- e. Сприяння зменшенню спастичності**

100. Який показник входить до компоненту "функції" за міжнародною класифікацією функціонування (МКФ)?

- a. Робота
- b. Гнучкість**
- c. Прогулянка з онуками
- d. Догляд за квітами
- e. Спускання східцями

101. Пацієнту після перенесеного ГПМК потрібно обстежити ризик падіння. Який тест буде оптимальним для використання, якщо в доступі є коридор довжиною 5 метрів?

- a. Тест 20-ти присідань
- b. Динамічний індекс ходьби
- c. Тест Френчай
- d. Шестихвилинний тест ходьби
- e. Тест "Встань та йди"**

102. Чоловік віком 65 років впав на кисть та отримав перелом зап'ястка в типовому місці. Накладено гіпс на чотири тижні. Після зняття гіпсу спостерігаються м'язові контрактури, набряк і біль. Запит пацієнта - відновити здатність писати та друкувати на комп'ютері. Яку короткострокову ціль поставить ерготерапевт?

- a. Через 2 тижні пацієнт, використовуючи адаптивне обладнання та ручку, за 5 хв самостійно напише номер телефону та своє ім'я**
- b. -
- c. Через 2 тижні збільшиться пасивна амплітуда рухів у променево-зап'ястковому суглобі та суглобах кисті
- d. Через 2 тижні пацієнт навчиться тримати в руці ручку, столові прибори тощо
- e. Через 2 тижні пацієнт повністю повернеться до виконання робочих завдань

103. Ерготерапевт під час роботи з пацієнтом з агнозією вибрав підхід відновлення. Які завдання потрібно використовувати на заняттях?

- a. Здатність зосереджуватися на зорових стимулах
- b. Розподіл малюнків за категоріями
- c. Розпізнавання та використання предметів у побуті**

- d. Використання комп'ютерних програм для дефіцитів поля зору
- e. Здатність розкласти предмети за категоріями

104. Ерготерапевт просить пацієнта, який переніс операцію на ротаторній манжеті, дотягнутися до шафи та взяти пластикові окуляри. Яку рамку практики застосовує ерготерапевт у своїй роботі?

- a. Реабілітаційну
- b. Біомеханічну**
- c. Компенсаційну
- d. Моторного контролю
- e. -

105. Який вид середовища оцінює ерготерапевт, коли просить пацієнта розповісти про цінності, звичаї та стандарти поведінки, що він демонструє у громаді, до якої він належить?

- a. Культурне**
- b. Фізичне
- c. Соціальне
- d. Інституційне
- e. Навколишнє

106. У жінки віком 51 рік діагностовано ураження променевого нерва в ліктьовому згині. Скаржиться на зниження м'язової сили в руці та втрату шкірної чутливості. Працює лаборантом із забору крові у відділенні трансфузіології. Багато маніпулює пробірками та пише. Обоюмо свою роботу. Який основний запит буде у пацієнтки?

- a. Покращення спритності та координації
- b. Повернення на роботу**
- c. Повернення до господарських обов'язків
- d. Збільшення витривалості
- e. Збільшення сили

107. Як називаються заходи, які ерготерапевт проводить з пацієнтом після оцінювання?

- a. Комплекс терапевтичних заходів
- b. Втручання**
- c. План дій
- d. План заходів
- e. Вправи

108. Яка з нижченаведених відповідей найбільш вдало демонструє навички активного слухання на фразу клієнта "Я дуже злюсь через те, що лікарня так далеко, і я не можу туди легко доїхати"?

- a. Скільки часу у вас займає дорога до лікарі?
- b. Чи є поруч люди, які могли би вам допомогти дістатися лікарні?
- c. Я відчуваю, ви дуже стурбовані, що не можете доїхати до лікарні
- d. Ви відчуваєте злість, тому що вам важко дістатися лікарні, оскільки вона далеко. Це правда?**
- e. -

109. У п'ятирічної дитини з обтяженим алергологічним анамнезом спостерігається: підвищення температури тіла до 37,8°C, сухий кашель і задишка з утрудненим видихом. Над легеньми вислуховується жорстке дихання з обох боків. Які ліки та в якому дозуванні необхідно застосувати для інгаляційної терапії цієї дитини?

- a. Розчин натрію гідрокарбонату, 100 мл
- b. Настій квіток ромашки, 50 мл
- c. Олію евкаліптову, 10 крапель
- d. Розчин новоіманіну, 5 мл
- e. Сальбутамол, 100 мкг**

110. Що з нижченаведеного належить до контекстуальних компонентів гри, які сприяють грайливості і допомагають ерготерапевту налагодити гармонійну терапію з дитиною?

- a. Свобода вибору, дорослі, які не є нав'язливими чи директивними, безпечна та комфортна

атмосфера, повний контроль ситуації дитиною

b. Свобода вибору, дорослі, які не є нав'язливими чи директивними, безпечна та комфортна атмосфера, гаджети

c. Свобода вибору, безпечна та комфортна атмосфера, знайомі однолітки, знайоме середовище, знайома гра

d. Свобода вибору, дорослі, які не є нав'язливими чи директивними, безпечна та комфортна атмосфера, планування, що дозволяє уникнути періоду втоми

e. Безпечна та комфортна атмосфера, знайомі однолітки, знайоме середовище, присутність батьків

111. Чоловікові віком 28 років з переломом плечової кістки встановлено пластину для остеосинтезу. З ерготерапевтом почав працювати через місяць після операції. Його запит: водити авто, грати на гітарі, друкувати на ноутбукі. Яке оцінювання потрібно застосувати, щоб зрозуміти пріоритетну ціль для пацієнта?

a. Канадська оцінка виконання заняттєвої активності та участі

b. Оцінка спроможності верхньої кінцівки DASH

c. Оцінювання інструментальної повсякденної активності

d. Шкала функціональної незалежності (FIM)

e. Шкала Бартела

112. Відповідно до запита пацієнта встановлено ціль ерготерапії: "Через 2 тижні пацієнт самостійно годуватиме та купатиме свою кішку". На яку складову частину заняттєвої активності спрямовано ціль?

a. Активність повсякденного життя

b. Дозвілля

c. Відпочинок

d. Інструментальну активність повсякденного життя

e. Продуктивну діяльність

113. Визначте термін "ремінісценція" в ерготерапії.

a. Модифікація важливих для пацієнта активностей повсякденного життя

b. Адаптація середовища, де пацієнт перебуває більшість часу

c. Акт згадування минулого досвіду, що проводиться з метою викликання спогадів

d. Навчання пацієнта компенсаторним рухам, які допомагатимуть у виконанні ADL

e. Техніка роботи з пацієнтами, які мають зоровий неглект

114. Визначте термін "духовність" у контексті ерготерапії.

a. Глибоке переживання значення життя шляхом участі в заняттях, що передбачають реалізацію особистих ідеологій, прагнення знайти відповіді на важливі питання про сенс життя

b. Сім'я, релігія, інтереси та захоплення особи

c. Віра в Бога

d. Ціннісні орієнтири особи

e. Перелік найважливіших переконань

115. Пацієнт після перенесеного ГПМК не здатен до функціонального використання правої верхньої кінцівки. Яке втручання є першочерговим у гострому періоді реабілітації?

a. Перенесення ваги на уражену кінцівку з дотягуванням протилежною верхньою кінцівкою під час функціональних завдань

b. Використання ураженої кінцівки для підтримки вертикальної постави під час виконання ADL (активностей повсякденного життя)

c. Навчання технікам захисту ураженого плеча

d. Використання ортеза для ефективнішого виконання ADL (активностей повсякденного життя)

e. Використання ураженої верхньої кінцівки для прасування сорочки

116. Що належить до компонента "участь" за міжнародною класифікацією функціонування (МКФ)?

a. Гнучкість

b. Хода

с. Прогулянка з онуками

d. Витривалість

е. Сила

117. Які загальні напрями роботи з пацієнтом із спинномозковою травмою на рівні C6 ASIA A?

a. Навчання вертикальним переміщенням (підлога-візок)

b. Сприяння формуванню тенодезного захвату, уникаючи надмірного розгинання кисті та пальців, підбір адаптивних засобів

с. Втручання, направлені на відновлення ковтання

d. Розвиток тонких маніпуляцій, що потребують розвиненої дрібної моторики, іммобілізація вирівняних пальців

е. Підбір милиць для навчання користуватися ними

118. Яка оцінка призначена для забезпечення базового вимірювання перцептивних, моторних і когнітивних втручань для дітей?

a. Сенсорний профіль

b. Тест Бірі-Буктениці

с. Шкала розвитку моторики Пібоді II (PDMS-2)

d. Тест Брунінкса-Осерецького

е. Когнітивне тестування для дітей (DOTCA-Ch)

119. Який симптом характерний для контрактури суглоба?

a. Гойдальні рухи

b. Біль у спокої

с. Обмеження рухів

d. Розхитаність

е. Перерозгинання

120. Що враховує ерготерапевт під час планування втручання, коли аналізує особистісно та духовно важливі для пацієнта дії/серії дій, що виконуються пацієнтом у певній послідовності, у зручний для нього час, спосіб і манеру?

a. Уміння та навички соціальної взаємодії

b. Звички

с. Рутини

d. Ритуали

е. Ролі

121. Що належить до адаптивних технологій для мобільності?

a. Кошик для ходунків, таця для ходунків, тримач для посуду

b. Стілець для душу, підвищене сидіння для туалету, приліжковий комод з поручнем

с. Крісло колісне, милиці, тростини

d. Ортез на гомілковостопний суглоб, ортез на колінний суглоб

е. Комунікаційні дошки, спеціальне програмне забезпечення, картки для альтернативної комунікації

122. Пацієнт віком 48 років отримав легку черепно-мозкову травму внаслідок дії вибухової хвилі. Заплановані ерготерапевтичні втручання для пацієнта передбачають вправи зі стабілізації погляду з одночасними рухами головою. Яка терапевтична мета застосування цих вправ?

a. Відновлення та покращення рухливості шийного відділу хребта

b. Усунення та зменшення інтенсивності головного болю

с. Підтримка та покращення зорово-моторної координації

d. Профілактика та усунення порушень периферичного зору

е. Компенсація та адаптація вестибулярної функції

123. Які з нижченаведених визначень не належать до підрозділів МКФ?

a. Активність і участь

b. Фактори навколишнього середовища

с. Реадаптація і участь

**d. Інвалідність і реадаптація**

**e. Структура і функція**

124. Який ортез рекомендовано у разі невропатії серединного нерва?

- a. Статичний ортез на IV та V пальці для уникнення перерозгинання в метакарпофалангових суглобах
- b. Статичний ортез на променево-зап'ястковий суглоб
- c. Статичний ліктьовий ортез для уникнення флексії
- d. Ортез на липучках для фаланг двох пальців

**e. Ортез стабілізації великого пальця для виведення його в положення хапання**

125. Який основний м'яз відповідає за рух розгинання в колінному суглобі?

- a. Клубово-поперековий м'яз
- b. Півсухожилковий м'яз
- c. Двоголовий м'яз стегна
- d. Передній великомілковий м'яз

**e. Чотириголовий м'яз стегна**

126. Пацієнтка хворіє на розсіяний склероз впродовж 7 років. Вона скаржиться, що їй складно організувати свою повсякденну активність і вона дедалі більше залежить від допомоги чоловіка в усіх справах повсякденного життя. Який метод необхідно застосувати для оцінювання виконавчих навичок пацієнтки?

- a. Канадська оцінка виконання занять COPM (Canadian Occupational Performance Measure)
- b. Монреальське когнітивне оцінювання MoCA (Montreal Cognitive Assessment)
- c. Оцінка функціональної самостійності FIM (Functional Independence Measure)
- d. MiniCog Test

**e. Оцінювання рухових та процесуальних навичок AMPS (Assessment of Motor and Process Skills)**

127. Яка терапія найефективніша для поліпшення функції верхніх кінцівок у перші чотири тижні після інсульту за наявності позитивного прогнозу відновлення?

- a. Дзеркальна терапія та десенситизація
- b. Модифікована, індукована обмеженням рухова терапія та терапія, орієнтована на завдання**
- c. Бобат-терапія та індукована обмеженням рухова терапія
- d. Десенситизація та індукована обмеженням рухова терапія
- e. Бобат-терапія та терапія, орієнтована на завдання

128. Ерготерапевт під час спілкування з пацієнтом після гострого порушення мозкового кровообігу вбачає потребу у проведенні обмеження активності повсякденного життя пацієнта. Який інструмент оцінювання, ймовірно, вибере ерготерапевт?

- a. Шкалу Ашфорта
- b. Індекс Бартела**
- c. Індекс Мотрісіті
- d. Шкалу Френчай
- e. Тест Альберта

129. Які відкриті питання можуть застосовуватися ерготерапевтом під час інтерв'ю?

- a. Питання для пошуку варіантів правильної відповіді, питання, які передбачають єдину правильну відповідь
- b. Питання на пошук причин проблем пацієнта, питання, які вже мають відповідь, питання, які не передбачають різних тлумачень
- c. Уточнювальні питання, питання зондування, питання для вирішення**
- d. Питання, з якими погоджується пацієнт, питання, які не містять протиріч, питання, у змісті якого вже міститься відповідь
- e. Питання для покращення розуміння, питання з відповіддю, питання "так" і "ні"

130. Пацієнт віком 47 років отримав травму під час професійної діяльності. Спостерігається уламковий перелом плечової та променевої кістки. На першу консультацію до ерготерапевта прийшов у гіпсі від дистальних відділів кисті до середини плечової кістки. Яке оцінювання та втручання виконає ерготерапевт у цьому разі?

a. ММТ, гоніометрія, наявність набряку; білатеральні вправи, ізометричні вправи, навчання пацієнта виконувати вправи самостійно

b. ММТ, "Box and blocks"; навчання пацієнта виконувати вправи самостійно

c. ММТ, гоніометрія; пасивні вправи

d. -

e. ММТ, гоніометрія, "Box and blocks"; пасивні ізометричні вправи

131. Дитина віком 14 років перебуває на диспансерному обліку у зв'язку з виразковою хворобою шлунка. Щороку проходить санаторно-курортне лікування в спеціалізованих стаціонарних закладах з використанням бальнеотерапії, ЛФК, фізіотерапевтичної апаратури. Які мінеральні води потрібно призначити для перорального застосування?

a. Хлоридно-натрієві в холодному вигляді

b. Гідрокарбонатні в теплому вигляді

c. Сульфатно-магнієві в холодному вигляді

d. Хлоридно-натрієві в теплому вигляді

e. Гідрокарбонатні в холодному вигляді

132. Когнітивна реабілітація пацієнтів після черепно-мозкової травми в післягострий період реабілітації передбачає реалізацію алгоритмів відновлення та алгоритмів компенсації когнітивних функцій. Яка із нижченаведених стратегій є ефективною для відновлення виконавчих функцій з позиції доказової практики?

a. Повільне надання інформації шляхом її розчленування

b. Використання середовища віртуальної реальності

c. Застосування техніки тестування

d. Навчання завданням із розподіленою увагою

e. Глибоке кодування інформації шляхом асоціацій

133. Що не належить до виконавчих моделей у контексті ерготерапії?

a. Звички

b. Ролі

c. Ритуали

d. Активності повсякденного життя

e. Рутини

134. Де має знаходитися терапевт для страхування пацієнта з правостороннім геміпарезом під час піднімання сходами?

a. Праворуч від пацієнта, стоячи на сходинку нижче від пацієнта

b. Ліворуч від пацієнта, стоячи на сходинку нижче від пацієнта

c. Праворуч від пацієнта, стоячи на сходинку вище від пацієнта

d. Ліворуч від пацієнта, стоячи на сходинку вище від пацієнта

e. Праворуч від пацієнта, стоячи перед пацієнтом

135. Визначте поняття "стандартизований тест" у практиці роботи ерготерапевта.

a. -

b. Тест, який виявився оптимальним для оцінювання у випадку, подібному до того, що розглядається зараз

c. Тест, який пройшов процес наукового випробування, щоб визначити його валідність та надійність

d. Тест, яким часто користуються у певних ситуаціях

e. Тест, який має детальну інструкцію для використання

136. У чоловіка віком 88 років встановлено діагноз: застійна серцева недостатність і двосторонній остеоартрит коліних суглобів. Він використовує тростину під час прогулянок по вулиці та відчуває труднощі з пересуванням і зниження витривалості. Який мобільний пристрій найкраще підходить для вирішення проблеми пересування пацієнта по вулиці?

a. Крісло колісне з електричним приводом

b. Ще одна тростина

c. Колісні ходунки із сидінням

- d. Крісло колісне з ручним керуванням
- e. Крокувальні ходунки

137. Які параметри необхідно виміряти для коректного вибору крісла колісного?

- a. Довжина ніг і довжина тулуба
- b. Маса та довжина тіла
- c. Ширина, глибина та висота сидіння, довжина ніг, висота передпліч і висота спинки
- d. Ширина, глибина та висота сидіння, маса тіла
- e. Маса тіла, довжина передпліччя, довжина гомілки, довжина тулуба

138. Пацієнт віком 64 роки з третьою стадією хвороби Паркінсона скаржиться на зміну швидкості ходьби (стала повільнішою). Під час зміни напрямку та піднімання сходами періодично відзначається втрата постурального контролю протягом 3-5 секунд у вигляді стартових затримок і короткочасних зупинок, щоб не впасти. Який тест потрібно використати для оцінки функціональної мобільності цього пацієнта?

- a. "П'яти присідань" з обліком часу
- b. "Швидких поворотів" з обліком часу
- c. "Ходьба на 10 метрів" з обліком часу
- d. "Оцінка часу підйому і ходьби" з обліком часу
- e. "Ходьба на 6 метрів" з обліком часу

139. Укажіть вихідну позицію при страхуванні пацієнта після перенесеного ГПМК з лівостороннім геміпарезом під час спускання сходами.

- a. Позаду та трохи ліворуч від пацієнта
- b. Позаду пацієнта
- c. Позаду та трохи праворуч від пацієнта
- d. Попереду та трохи праворуч від пацієнта
- e. Попереду та трохи ліворуч від пацієнта

140. У чоловіка віком 57 років спостерігаються наслідки ішемічного інсульту з лівостороннім геміпарезом. Під час обстеження виявлено: збіднене мовлення, складно добирає слова, не всі предмети може назвати, однак правильно пояснює їхнє призначення. Читає по складах і розуміє значення лише простих слів, але не всього тексту. Здатність рахувати грубо порушена. На прохання дати праву руку - дезорієнтований. Яке порушення функції мовлення спостерігається у пацієнта?

- a. Моторна афазія
- b. Семантична афазія
- c. Сенсорна афазія
- d. Тотальна афазія
- e. Амнестична афазія

141. На які характеристики ерготерапевт має орієнтуватися, вибираючи взуття для шестирічної дитини з розладами аутистичного спектра?

- a. Самостійний вибір дитини, легкість взування та знімання взуття, однотипні матеріали на всіх типах взуття
- b. Легкість взування та знімання взуття, наявність довгої застібки, наявність шнурівки, ортопедичне взуття
- c. Самостійний вибір дитини, легкість взування та знімання взуття, наявність довгої застібки, наявність шнурівки
- d. Реакція дитини під час носіння, легкість взування та знімання взуття, наявність довгої застібки
- e. Розрахунок на більший розмір, наявність довгої застібки, наявність шнурівки

142. Пацієнтці віком 46 років встановлено діагноз: інфаркт головного мозку з лівобічним геміпарезом. Пацієнтка звертається до ерготерапевта із запитом на покращення можливості виконувати щоденні домашні завдання із залучення лівої руки. Зазначає, що може виконувати завдання, які передбачають відведення руки до рівня плечей, але руки швидко втомлюються. Також хоче покращити активні рухи кисті, адже зараз пацієнтка може брати в руку великі



циліндричні предмети, але деколи відчуває неможливість відпустити предмет. Яке доказове втручання для покращення функції лівої руки та активності повсякденного життя є оптимальним для цієї пацієнтки?

- a. Контекст-орієнтовна терапія
- b. Інтенсивне бімануальне тренування
- c. Індукована обмеженням рухова терапія
- d. Дзеркальна терапія**
- e. Когнітивно-поведінкова терапія

143. Чоловік віком 42 роки перебуває в лікарні після ампутації лівої нижньої кінцівки вище коліна. Пацієнт живе один у квартирі на першому поверсі, до якої можна потрапити бетонним безрейковим пандусом, побудованим зі співвідношенням висоти до довжини 1:6. Результати первинної ерготерапевтичної оцінки вказують на зниження чутливості в правій стопі, наявність великої ділянки почервоніння на куприку, самостійний динамічний баланс у сидінні, функціональну силу верхніх кінцівок і погану статичну рівновагу стоячи. Який мобільний пристрій найкраще підходить для пацієнта?

- a. Крісло колісне з ручним керуванням
- b. Крісло колісне з електричним приводом**
- c. Крокувальні ходунки
- d. Баріатричні ходунки із сидінням
- e. Милиці з підлокітниками

144. Яке порушення не характерне для пацієнтів з діагнозом: синдром Гієна-Барре?

- a. Відчуття болю у нижніх та верхніх кінцівках
- b. Невиразне мовлення**
- c. Низькі показники оцінювання монофіламентами Семмеса-Вайнштейна
- d. Зниження концентрації уваги
- e. Неможливість виконання тесту з дев'ятьма кілочками (9-HPT)

145. Пацієнт після перенесеного інсульту проходить первинне оцінювання з ерготерапевтом. Показник за шкалою Бартела становить 70 балів. Який рівень побутової активності у цього пацієнта?

- a. Зможе одягати нижню частину тіла з мінімальною допомогою**
- b. Зможе виконувати активність повсякденного життя з середньою допомогою
- c. Зможе вживати їжу із середньою допомогою
- d. Зможе перевертатися у ліжку з мінімальною допомогою
- e. Зможе переміщуватися з крісла колісного на туалет з середньою допомогою

146. Які причини можуть спонукати ерготерапевта вибрати для дитини з інвалідністю допоміжні пристрої або технології та навчити дитину використовувати їх?

- a. Порушення, що обмежують здатність дитини брати участь у своїх життєвих ролях**
- b. Вимога дитини або її батьків
- c. Рекомендація лікаря
- d. Вимоги посадової інструкції ерготерапевта
- e. Обмеження функцій опорно-рухового апарату

147. Майже дворічна дитина з геміпарезом мотивована до самостійного вживання "пальчикової їжі". Під час заняття реабілітації ерготерапевт пропонує родзинки, які дитина піднімає неураженою кінцівкою. Який тип хапання демонструє дитина?

- a. Сферичне
- b. Пучкою
- c. Пінцетне
- d. Нігтьове
- e. Латеральне**

148. На розумінні чого зосереджується навичка активного слухання пацієнта ерготерапевтом під час спілкування?

- a. Вміння перевести розмову в потрібний ерготерапевту напрям

b. Проблем постави, міміки та жестів клієнта

c. Змісту повідомлення, влучності відображення емоцій і почуттів ерготерапевтом

d. Тривалості спілкування та дотриманні плану розмови ерготерапевтом

e. Можливості для ерготерапевта поставити відкриті питання

149. Пацієнт віком 22 роки, який знаходиться в лікарні під спостереженням у зв'язку із ризиком суїциду, здається веселим, оскільки виписується. Що з нижченаведеного, ймовірно, відбувається?

a. Пацієнт задоволений, що йому не треба буде знову спілкуватися з медичними працівниками

b. Пацієнт передбачає, що зміна обстановки може бути для нього корисною

c. Його суїцидальний план прогресував

d. Пацієнт радіє, що зможе припинити прийом ліків за межами лікарні

e. Пацієнт схвильований та радий бути знову в колі сім'ї

150. Який тест використовують для оцінки здатності орієнтувати своє тіло в просторі та сприймати положення предметів відносно себе й інших предметів?

a. Тест візуального сприйняття (без рухів)

b. Тест "Встань та йди"

c. Тест ARAT

d. Десятиметровий тест ходьби

e. Шестихвилинний тест