

1. Під час стоматологічного прийому лікар одягнув нову медичну маску. Як часто треба змінювати маску?

- a. Кожні 3 год
- b. Кожні 6 год
- c. Кожні 2 год**
- d. Кожні 5 год
- e. Кожні 4 год

2. Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного середнього карієсу зуба 11. Пломбування каріозної порожнини буде здійснюватися композитним матеріалом світлового твердіння. Яка лампа необхідна для роботи з композитними матеріалами світлового твердіння?

- a. Фотополімерна**
- b. Люмінесцентна
- c. Кварцева
- d. Солюксова
- e. Світлодіодна

3. У підлітка віком 17 років для пломбування карієсу зуба 16 лікар-стоматолог застосував амальгаму. Яким інструментом амальгамову масу вносять у підготовлену порожнину?

- a. Гладилкою
- b. Амальгамтрегером**
- c. Кюретою
- d. Екскаватором
- e. Штопфером

4. Лікар-стоматолог під час препарування каріозної порожнини II класу за Блекум вибрав техніку тунельного методу. Який пломбувальний матеріал раціонально застосовувати в разі вибору цієї методики?

- a. Макрофільний композит
- b. Склоіономерний цемент
- c. Гібридний композит
- d. Мікрофільний композит
- e. Текучий композит**

5. Яка помилка, що виникла під час препарування каріозної порожнини, може викликати виникнення вторинного карієсу?

- a. Обламування стінки каріозної порожнини
- b. Ушкодження бором прилеглих зубів
- c. Перфорація стінки каріозної порожнини
- d. Перфорація дна каріозної порожнини
- e. Недостатнє препарування**

6. Назвіть відбитковий матеріал, що належить до силіконової групи і застосовується під час виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза.

- a. Редонт
- b. Репін
- c. Ортокор
- d. Speedex**
- e. Уреен

7. Підліток віком 14 років звернувся до лікаря-стоматолога для планової санації. Під час стоматологічного огляду лікар виявив порушення крайового прилягання пломби в зубі 16. Яким інструментом проводять визначення крайового прилягання пломби?

- a. Шпателем
- b. Зондом**
- c. Гладилкою
- d. Екскаватором
- e. Штопфером

8. Як називається патологічний процес, що розвивається після прорізування зубів і характеризується демінералізацією та руйнуванням твердих тканин зуба із подальшим утворенням дефекту у вигляді порожнини.

- a. Пародонтит
- b. Періодонтит
- c. Пульпіт
- d. Карієс**
- e. Остеомієліт

9. Пацієнт скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи, кровотечу з носа. Об'єктивно спостерігається: рухомість верхньої щелепи, подовження середньої третини обличчя, кровотеча з носа, нудота, блювання, крововилив у кон'юнктиву. Яке травматичне ушкодження виникло?

- a. Вивих нижньої щелепи
- b. Вивих верхньої щелепи
- c. Перелом верхньої щелепи**
- d. Перелом зуба
- e. Перелом нижньої щелепи

10. У стоматологічній клініці провели стерилізацію використаних інструментів паровим методом без індивідуального пакування. Ці інструменти склали на стерильних столах та накрили стерильними простирадлами. Скільки часу інструменти можуть зберігати свою стерильність у цьому разі?

- a. 9 год
- b. 12 год
- c. 6 год**
- d. 48 год
- e. 24 год

11. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект. Під час огляду виявлено, що зуб 11 змінений у кольорі (рожево-фіолетового відтінку). З анамнезу відомо: зуб був раніше ендодонтично лікований. Яка помилка під час ендодонтичного лікування може спричинити ці наслідки?

- a. Травма периапікальних тканин
- b. Перфорація стінки кореневого каналу
- c. Недостатнє механічне оброблення кореневого каналу
- d. Виведення пломбувального матеріалу за верхівку кореневого каналу
- e. Неправильний вибір пломбувального матеріалу**

12. Яку пробу треба виконати для контролю якості передстерилізаційного очищення стоматологічного інструментарію від залишків крові?

- a. Амідопіринову**
- b. Тетрациклінову
- c. Фенолфталеїнову
- d. -
- e. З Суданом III

13. Назвіть відбитковий матеріал, що належить до альгінатної групи і використовується для виготовлення часткового знімного пластинкового протеза.

- a. Ортокор
- b. Speedex
- c. Протакрил
- d. Репін
- e. Ypeen**

14. Під час профілактичного огляду пацієнту проводили оцінку гігієнічного стану порожнини рота за допомогою фарбування жувальними таблетками. Окрім зубних відкладень на вестибулярній поверхні зубів 42, 43 виявлено плями, що зафарбувалися барвником. Про який

патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

a. Гострий початковий карієс

- b. Ерозія емалі
- c. Гіоплазія емалі
- d. Хронічний поверхневий карієс
- e. Гострий поверхневий карієс

15. Лікар-стоматолог планує провести обстеження первинного пацієнта. Для цього він просить асистента подати градуйований зонд. З якою метою лікар-стоматолог використовує цей інструмент?

a. Дослідити глибину зубо-ясенного прикріплення

- b. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах нижньої щелепи
- c. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах верхньої щелепи
- d. Провести дослідження міжзубних сосочків
- e. Провести замірювання довжини вуздечки язика

16. Яку температуру застосовують під час стерилізації паровим методом?

a. 200-220[°]C

b. 110-134[°]C

- c. 135-155[°]C
- d. 170-200[°]C
- e. 155-170[°]C

17. Пацієнту з гострим періодонтитом зуба 47 проведено інфільтраційну анестезію в ділянці набряклих тканин навколо зуба. Після введення анестетика пацієнт не відчув змін. Чому ефект знеболювання не настав?

a. Недостатня кількість введеного препарату

b. Неправильно вибраний вид анестезії

- c. Лікування не потребує знеболювання
- d. Алергічна реакція на анестетик
- e. -

18. Під час лікування карієсу зуба 16 у підлітка віком 15 років для пломбування застосовано композитний матеріал, що має розмір частинок наповнювача 8-45 мкм. Який композитний матеріал застосовано для пломбування?

a. Мікрогібридний

b. Макрофільний

- c. Мікрофільний
- d. Нанонаповнений
- e. Гібридний

19. На терапевтичному прийомі лікар-стоматолог використовує алмазні бори, що відрізняються за розміром робочої частини, властивостями алмазу, щільністю посадки алмазного зерна. Який середній розмір зерна в алмазного бора з червоним маркуванням?

a. 180 мкм

b. 50 мкм

- c. 135 мкм
- d. 30 мкм
- e. 100 мкм

20. Пацієнт скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба 46, неприємний запах з рота. З анамнезу відомо, що п'ять днів тому проведено видалення зуба 46. Об'єктивно спостерігається: комірка видаленого зуба виповнена залишками згустка сірого кольору, слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

- a. Невропатія трійчастого нерва
- b. Хронічний остеомієліт

c. Гострий альвеоліт

d. Гострий періостит

е. Гострий остеомієліт

21. Пацієнтці віком 35 років встановлено діагноз: ерозія твердих тканин зубів 11, 21, 34, 35, 44, 45. Який матеріал треба підготувати для пломбування в цьому разі?

а. Склоіономерний цемент

б. Амальгаму

с. Силікатний цемент

д. Композитний матеріал світлової полімеризації

е. Композитний матеріал хімічної полімеризації

22. Що насамперед треба зробити у випадку потрапляння хімічної речовини в око під час надання першої допомоги?

а. -

б. Накласти антисептичну мазь

с. Закапати в уражене око очні краплі

д. Промити уражене око чистою водою

е. Накласти пов'язку на уражене око

23. Лікар-стоматолог-хірург планує видалення зуба пацієнту через загострення хронічного періодонтиту. Лікар просить подати йому багнетоподібні щипці. Який зуб планується видаляти?

а. 16 зі зруйнованою коронковою частиною

б. 33 зі збереженою коронковою частиною

с. 46 зі збереженою коронковою частиною

д. 36 зі зруйнованою коронковою частиною

е. 26 зі збереженою коронковою частиною

24. Який час перебування (експозиції) стоматологічного інструментарію в дезінфекційному розчині 3%-го хлораміну?

а. 60 хв

б. 30 хв

с. 90 хв

д. 50 хв

е. 45 хв

25. Назвіть блок стоматологічної установки, до складу якого входять скейлер та наконечники.

а. Блок інструментів

б. Стоматологічне крісло

с. -

д. Блок управління

е. Освітлювальний блок

26. Яка кістка належить до кісток лицьового черепа?

а. Тім'яна (парна)

б. Клиноподібна

с. Вилична (парна)

д. Лобова

е. Решітчаста

27. Жінка віком 46 років звернулася до лікаря-стоматолога-хірурга для видалення зуба 16 зуба. Коронкова частина зуба збережена. Які щипці треба підготувати в цьому разі?

а. S-подібні ліві

б. S-подібні праві

с. Багнетоподібні кореневі

д. Прямі

е. Багнетоподібні коронкові

28. П'ятнадцятирічному хлопцю планується видалення зуба 14 за ортодонтичними показаннями. Коронка зуба збережена. Які щипці треба підготувати для видалення?

- a. Прямі
- b. Дзьобоподібні зі щічками, що сходяться
- c. S-подібні**
- d. Байонетні
- e. Дзьобоподібні зі щічками, що не сходяться

29. Пацієнтка скаржиться на самовільний наростаючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч, що посилюється під час накушування. З анамнезу відомо: тиждень тому було проведено лікування глибокого карієсу зуба 44. Об'єктивно спостерігається: вертикальна перкусія зуба 44 різкоболісна, ЕОД - 100 мкА, рентгенологічно виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня зуба 44. Яка тактика надання допомоги?

- a. Видалити пломбу
- b. Видалити зуб
- c. Розкрити порожнину зуба та кореневий канал**
- d. Замінити пломбу
- e. Провести корекцію пломби

30. Для індивідуального догляду за порожниною рота лікар-стоматолог порекомендував семирічній дівчинці зубну пасту з мікроелементами та призначив курс ремінералізаційної терапії. Який із нижченаведених методів належить до екзогенної профілактики карієсу?

- a. Уживання таблеток фториду натрію
- b. Накладання фторвмісних лаків на поверхню зубів**
- c. Уживання продуктів, багатих на кальцій та фтор
- d. Додавання в їжу фторованої солі
- e. Уживання морепродуктів

31. Під час профілактичного огляду пацієнта на ортопантограмі в ділянці верхівки кореня зуба 12 виявлено осередок просвітлення кісткової тканини з нечіткими межами у вигляді язиків полум'я. Об'єктивно спостерігається: зуб змінений у кольорі, на яснах у ділянці проєкції верхівки кореня наявний рубець. Для якого захворювання характерна ця рентгенологічна картина?

- a. Хронічний фіброзний періодонтит
- b. Хронічний гіпертрофічний пульпіт
- c. Хронічний гранулюючий періодонтит**
- d. Хронічний гангренозний пульпіт
- e. Хронічний гранулематозний періодонтит

32. Яка кількість коренів та кореневих каналів найчастіше спостерігається в нижньому першому і другому премолярах?

- a. Один корінь, два канали
- b. Два корені, один канал
- c. Один корінь, один канал**
- d. Три корені, три канали
- e. Два корені, два канали

33. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування першого премоляра верхньої щелепи. Який варіант рентгенологічного дослідження треба провести асистенту лікаря-стоматолога?

- a. Прицільний рентген**
- b. Контрастний рентген
- c. Прикусний рентген
- d. Панорамний рентген
- e. Тривимірний рентген

34. До комплексної програми профілактики основних стоматологічних захворювань входить обстеження стану тканин пародонту. Який діагностичний індекс треба застосувати, щоб оцінити потребу в лікуванні захворювань тканин пародонту в дітей віком 15 років?

- a. OHI-S (Гріна-Вермільйона)

- b. РМА (Парма)
- c. Індекс Рамф'єрда
- d. CPITN (BOO3)
- e. PI (Рассела)

35. Який комплекс заходів буде здійснювати асистент лікаря-стоматолога для знищення мікроорганізмів у рані та в патологічному осередку?

- a. Дезінфекцію
- b. Антисептику
- c. Стерилізацію
- d. Асептику
- e. Передстерилізаційне очищення

36. На ортопантограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено осередок просвітлення округлої форми розміром до 5 мм у ділянці верхівки кореня зуба 34, кореневий канал якого частково заповнений пломбувальним матеріалом. З анамнезу відомо: раніше зуб 34 був ендодонтично лікований. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки?

- a. Гострий дифузний пульпіт
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит
- c. Хронічний фіброзний пульпіт
- d. Гострий серозний періодонтит
- e. Хронічний гранулематозний періодонтит

37. Під час профілактичного огляду дітей віком 8-12 років лікар-стоматолог іноді виявляє білі плями на вестибулярних поверхнях фронтальної групи зубів верхньої щелепи, що прорізалися з цими дефектами. Під час вітального фарбування плями не зафарбовуються. Про який імовірний діагноз свідчать ці ознаки?

- a. Гіпоплазія емалі
- b. Гострий поверхневий карієс
- c. Некроз емалі
- d. Ерозія емалі
- e. Гострий початковий карієс

38. На якому тижні вагітності починається мінералізація зачатків перших молочних зубів?

- a. 9-му
- b. 17-му
- c. 23-му
- d. 6-му
- e. 30-му

39. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубах нижньої щелепи від термічних та хімічних подразників. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці зубів 35, 34, 44, 45 дефекти в межах дентину з гладкими, блискучими стінками, що сходяться під кутом. Який найімовірніший діагноз?

- a. Клиноподібний дефект
- b. Некроз твердих тканин
- c. Гострий середній карієс
- d. Системна гіпоплазія емалі
- e. Ерозія емалі

40. На ортопантограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня зуба 35. Скарг немає, перкусія і термопроба негативні, раніше зуб 35 був лікований з приводу глибокого карієсу. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки?

- a. Гострий серозний періодонтит
- b. Хронічний фіброзний пульпіт
- c. Хронічний фіброзний періодонтит

- d. Гострий дифузний пульпіт
- e. Хронічний гранулюючий періодонтит

41. Яке з передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ належить до факультативних передраків із низькою потенціальною злоякісністю?

- a. Папіломатоз піднебінний
- b. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
- c. Бородавчастий передрак червоної облямівки губ
- d. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ
- e. Еритроплакія Кейра

42. Виберіть метод лікування хронічного середнього карієсу тимчасового моляра в шестирічній дитини.

- a. Протезування
- b. Герметизація
- c. Пломбування
- d. Видалення
- e. Ремінералізація

43. Для хірургічної дезінфекції рук рекомендовано застосовувати засоби на основі спирту. Яка частка спирту має бути в дезінфікуючих розчинах?

- a. 40%
- b. 100%
- c. 65%
- d. 55%
- e. 30%

44. Перед початком прийому пацієнта лікар-стоматолог провів оброблення рук із метою видалення та знищення транзиторної патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Яку назву має оброблення, що попереджає розповсюдженню інфекції через руки?

- a. Хірургічна обробка рук
- b. Стерилізація рук
- c. -
- d. Гігієнічна обробка рук
- e. Миття рук

45. Під час лікування карієсу пацієнту було встановлено пломбу з амальгами без ізоляційної прокладки. Яке ускладнення може розвинути в цьому разі?

- a. Верхівковий періодонтит
- b. Папіліт
- c. Випадіння пломби
- d. Запалення пульпи
- e. Вторинний карієс

46. Одним із найрозповсюдженіших та доступних засобів місцевої профілактики карієсу зубів у наш час треба вважати використання фторвмісних зубних паст. Яка найнижча межа норми фтору в питній воді?

- a. 0,5 мг/л
- b. 0,3 мг/л
- c. 2 мг/л
- d. 1 мг/л
- e. 1,2 мг/л

47. Який інструментарій на ортопедичному прийомі використовує лікар-стоматолог для вигинання кламерів?

- a. Байонетні щипці
- b. Зонд
- c. Елеватор
- d. Пінцет

е. Крампонні щипці

48. До устаткування стоматологічного кабінету належить електричний мікромотор. Який діапазон регулювання швидкості обертання бора має електричний мікромотор?

- a. Від 100 до 1000 об/хв
- b. Від 1000 до 40000 об/хв**
- c. Від 100000 до 300000 об/хв
- d. Від 50000 до 100000 об/хв
- e. -

49. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці зуба верхньої щелепи праворуч. Після огляду встановлено попередній діагноз: гострий обмежений пульпіт зуба 14. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Які показники ЕОД характерні для гострого обмеженого пульпіту?

- a. 60-70 мкА
- b. 80-90 мкА
- c. 15-30 мкА**
- d. 100 мкА
- e. 30-40 мкА

50. Який термін зберігання простерилізованих медичних виробів у стерилізаційних коробках з фільтром?

- a. 3 доби
- b. 16 діб
- c. 20 діб**
- d. 10 діб
- e. 28 діб

51. До лікаря-стоматолога звернувся хлопець віком 18 років зі скаргами на випадіння зуба 11 після отриманої травми годину тому. Було вирішено зуб помістити у власну комірку альвеолярного відростка та провести шинування. Як називається ця операція?

- a. Ампутація
- b. Реплантація**
- c. Імплантація
- d. Гемісекція
- e. Трансплантація

52. У пацієнта діагностовано дефект коронкової частини зуба 34, що відповідає II класу каріозних порожнин за Блеком. Визначте топографічне розміщення каріозної порожнини на поверхні зуба в цьому разі.

- a. Контактна поверхня**
- b. Контактна поверхня з ураженням різального краю
- c. Жувальна поверхня
- d. Пришийкова ділянка
- e. Різальний край

53. Вагітна жінка віком 25 років скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, що з'явилися на п'ятому місяці вагітності. Для диференційної діагностики захворювання лікар вирішив провести кольоровий тест. Який барвник треба підготувати для проведення тесту?

- a. 2%-ий розчин фтористого натрію
- b. 0,2%-ий розчин хлоргексидину
- c. Йодинол
- d. 2%-ий розчин метиленового синього**
- e. Йодовмісний розчин Шіллера-Писарєва

54. Після стоматологічного прийому необхідно провести стерилізацію медичних виробів, у конструкції яких використовуються термолабільні матеріали. Який метод стерилізації доцільно застосувати?

- a. Паровий
- b. -
- c. Хімічний
- d. Кип'ятіння
- e. Повітряний

55. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт, якому три тижні тому було видалено зуб, зі скаргами на наявність незакритого дефекту слизової оболонки в ділянці видаленого зуба. Об'єктивно спостерігається: порушення закриття лунки в місці видаленого зуба, розростання грануляцій, слизова оболонка в ділянці лунки синюшна. Про яке захворювання можуть свідчити ці ознаки?

- a. Хронічний альвеоліт
- b. Гострий остеомієліт
- c. Хронічний періостит
- d. Абсцес
- e. Хронічний остеомієліт

56. Під час обстеження тринадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив прогнатичний прикус. До патології в якій площині належить цей прикус?

- a. Орбітальний
- b. Мезіальний
- c. Сагітальний
- d. Вертикальний
- e. Трансверзальний

57. Яка помилка під час пломбування каріозних порожнини може призвести до виникнення папіліту, гінгівіту, пародонтиту?

- a. Завищення висоти оклюзії на пломбі
- b. Відсутність контактного пункту
- c. Неправильний вибір пломбувального матеріалу
- d. Неправильне накладання ізоляційної прокладки
- e. -

58. Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини II класу за Блекум. У каріозну порожнину після нанесення адгезивної системи потрапила кров. Яка тактика в цьому разі?

- a. Промити та висушити каріозну порожнину, нанести адгезив
- b. Провести повторне протравлювання дентину, нанести адгезив
- c. Обробити каріозну порожнину спиртом, нанести адгезив
- d. Повторне кислотне протравлювання емалі та дентину та нанесення адгезиву
- e. Обробити каріозну порожнину 3%-м перекисом водню, нанести адгезив

59. На прийомі в лікаря-стоматолога через емоційне напруження та страх перед маніпуляцією пацієнт відчув дискомфорт, відчуття нудоти, запаморочення, шум у вухах, неясність зору, нестачу повітря, появу холодного поту, оніміння язика, губ, кінчика носа. Який невідкладний стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

- a. Асфіксія
- b. Колапс
- c. Анафілактичний шок
- d. Непритомність
- e. Алергічна реакція

60. Під час стоматологічного прийому пацієнт знепритомнів, почалися клонічні та тонічні судоми, спостерігається посилене пінисте слиновиділення, мимовільне сечовипускання та дефекація. Який стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

- a. Колапс
- b. Анафілактичний шок
- c. Гіпоглікемічна кома

d. Гіперглікемічна кома

e. Епілептичний напад

61. Для яких маніпуляцій використовують спредер під час ендодонтичного лікування?

a. Розпломбування кореневих каналів під час повторного ендодонтичного лікування

b. Латеральної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

c. Внесення пломбувального матеріалу в кореневий канал

d. Горизонтальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

e. Вертикальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

62. Укажіть назву частини порожнини рота, що обмежена губами і щоками зовні та зубами і яснами зсередини.

a. Ретромолярна ділянка

b. Перехідна складка рота

c. Власне порожнина рота

d. Слизова оболонка рота

e. Присінок порожнини рота

63. Під час оброблення каріозної порожнини лікар-стоматолог видаляє всі патологічно змінені тканини зуба. Що спричиняє зміну кольору коронки зуба після неякісного препарування каріозної порожнини?

a. Розм'якшений дентин насичується пігментами

b. Запалення та пошкодження ясенного сосочка

c. Значне стоншення шару емалі

d. Опік твердих тканин зуба

e. Перегрів та запалення пульпи зуба

64. Який з елементів будови скронево-нижньощелепного суглоба має еліпсоподібну форму, у 2-3 рази більший за суглобову головку, укритий хрящем, знаходиться на скроневої кістці?

a. Суглобовий горбок

b. Внутрішньосуглобовий диск

c. Суглобова капсула

d. Суглобова ямка

e. Суглобова головка

65. Що належить до допоміжного обладнання стоматологічного кабінету?

a. Стоматологічний пересувний стілець

b. Стоматологічна установка

c. Стоматологічний рентген апарат

d. Стоматологічне крісло

e. Рукомийник для миття рук

66. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба 37. Який метод дослідження треба виконати для контролю якості проведеного лікування?

a. Рентгенологічне дослідження

b. Глибоке зондування

c. ЕОД

d. Бактеріологічне дослідження

e. Термопробу

67. Під час огляду порожнини рота дванадцятирічної дівчинки виявлено, що верхні фронтальні зуби повністю перекривають нижні. Бічні зуби в сагітальній і трансверзальній площинах змикаються в межах норми. Установлено діагноз: глибокий прикус. Порушенням яких функцій супроводжується ця аномалія?

a. Дихання, ковтання

b. Жування, ковтання

c. Дихання, порушення дикції

d. Відкушування їжі, вимова звуків

e. Відкушування їжі, дихання

68. Пацієнт віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби та наявність великої каріозної порожнини в зубі 37. З анамнезу відомо, що раніше в зубі було проведено ендодонтичне лікування. Для відновлення анатомічної форми зуба лікар вирішив застосувати методику <<сендвіч-техніки>>. Які матеріали потрібно підготувати асистенту лікаря-стоматолога для пломбування каріозної порожнини?

- a. Компомер та силікатний цемент
- b. Композит та силікофосфатний цемент
- c. Текучий композит та силікатний цемент
- d. Текучий композит та компомер

e. Композит та склоіономерний цемент

69. Для лікування карієсу I класу за Блекум у постійних зубах використовують амальгаму. Який складник амальгами підвищує пластичність матеріалу та забезпечує щільне крайове прилягання пломби?

- a. Срібло
- b. Ртуть
- c. Олово
- d. Цинк

e. Мідь

70. Під час роботи виїзної стоматологічної станції проводилося лікування карієсу зубів у дітей молодших класів. Який пломбувальний матеріал використовується під час застосування ART-методики лікування карієсу в дітей?

- a. Композит хімічної полімеризації
- b. Силікатний цемент
- c. Компомер

d. Склоіономерний цемент

e. Текучий композит

71. Скільки зубів має повний сформований тимчасовий прикус?

- a. 32
- b. 24
- c. 12

d. 20

e. 18

72. Після проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичний інструментарій є підготовленим до етапу стерилізації. Хто має право проводити стерилізацію медичних інструментів?

- a. Працівники, які пройшли навчання
- b. Медичний персонал, який пройшов інструктаж із техніки безпеки
- c. Будь-які працівники відділення
- d. Санітарки

e. Середній медичний персонал, який має відповідну підготовку

73. Одним із етапів проведення ендодонтичного лікування в постійних зубах є розширення кореневих каналів. Яким ендодонтичним інструментом проводиться розширення кореневих каналів?

- a. Каналонаповнювачем
- b. Плагером
- c. Пульпоекстрактором
- d. Спредером

e. К-файлом

74. Який найімовірніший шлях передачі вірусних гепатитів В, С та ВІЛ-інфекції в лікувально-профілактичних закладах у разі порушення правил асептики та санітарно-протиепідемічного режиму?

a. Контактний

- b. Аліментарний
- c. Повітряно-краплинний
- d. Парентеральний**
- e. Водний

75. Пацієнту віком 50 років на прийомі в лікаря-стоматолога потрапило стороннє тіло у верхні дихальні шляхи, що спричинило обтураційну асфіксію. Укажіть подальші дії лікаря, якщо дістати стороннє тіло неможливо.

- a. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо непрямий масаж серця
- b. Проводимо поштовхи за Геймліхом**
- c. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо штучну вентиляцію легень
- d. Проводимо інтубацію
- e. Проводимо трахеотомію

76. Чим треба закапати очі після їх промивання проточною водою у разі потрапляння стороннього тіла на слизову оболонку очей?

- a. 30%-м розчином альбуциду**
- b. 1%-м розчином фурациліну
- c. 0,0002%-м розчином кетаміну
- d. 0,12%-м розчином хлоргексидину
- e. 0,1%-м розчином перманганату калію

77. Стоматологічне дзеркало застосовують для огляду порожнини рота. Яке зображення дає поверхня дзеркала?

- a. Пряме, зменшене, дійсне
- b. Пряме, збільшене, уявне**
- c. Пряме, зменшене, уявне
- d. Обернене, збільшене, уявне
- e. Обернене, збільшене, дійсне

78. Під час стоматологічного обстеження підлітку віком 16 років встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт зуба 36 та проведено ендодонтичне лікування. Який ендодонтичний інструмент застосовують під час пломбування кореневих каналів?

- a. Каналонаповнювач**
- b. Пульпоекстрактор
- c. U-файл
- d. К-ример
- e. К-файл

79. У пацієнта віком 45 років лікар-стоматолог діагностував гострий обмежений пульпіт зуба 44. Об'єктивно спостерігається: порожнина рота санована, гігієна в задовільному стані. З анамнезу відомо: пацієнт соматично здоровий. Що є протипоказанням до лікування пульпіту біологічним методом у цьому разі?

- a. Вік понад 30-35 років**
- b. Соматичні захворювання
- c. Інтенсивність каріозного процесу
- d. Стан гігієни порожнини рота
- e. Вік понад 18-20 років

80. Дівчина віком 16 років під час тренування на спортивній секції отримала травму. Скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи праворуч. Під час огляду порушення цілісності шкірних покривів не виявлено, спостерігається незначний набряк у ділянці тіла нижньої щелепи праворуч, відкривання рота не обмежене. Яку невідкладну допомогу треба надати в цьому разі?

- a. Компрес 2-5%-им розчином натрію гідрокарбонату
- b. Застосувати слабодезінфікуючу мазь
- c. Призначити протинабрякову терапію
- d. Обробити ділянку шкіри антисептиком

е. Холод на травмовану ділянку в перші 30 хв

81. Після використання стоматологічного інструментарію була проведена його дезінфекція та передстерилізаційне очищення. Яка мета передстерилізаційного очищення?

- a. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- b. Знищення всіх видів мікроорганізмів
- c. Знищення вірусів

d. Видалення білкових, жирових та механічних забруднень

- e. Знищення патогенних видів мікроорганізмів

82. Укажіть, чи можна накладати стискальну пов'язку або джгут при пораненні в шию та кровотечі з сонної артерії.

a. Так, можна. Але з протилежного боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка

b. Ні, не можна. Інакше буде механічна асфіксія, бо пов'язка накладається на усю шию

c. Так, можна. Але проводиться трахеотомія

d. Так, можна. Але з боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка

e. Ні, не можна. Інакше буде гіпоксія мозку, що не сумісна з життям

83. Що із нижченаведеного належить до загальної профілактики карієсу?

a. Герметизація фісур

b. Вживання таблеток фториду натрію

c. Раціональна гігієна порожнини рота

d. Полоскання ремінералізаційними розчинами

e. Покриття поверхні зубів фторлаком

84. Укажіть, яке ускладнення може виникнути під час проведення операції видалення зубів нижньої щелепи.

a. Перелом коронки або кореня зуба

b. Альвеоліт лунки зуба

c. Відламування горба щелепи

d. Проштовхування зуба в гайморову пазуху

e. Неврит нижньоальвеолярного нерва

85. Дівчина віком 15 років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх і верхніх фронтальних зубів набрякла, гіперемована, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки кровоточать від дотику, збільшені в розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 їхньої висоти. На зубах верхньої та нижньої щелеп встановлена незнімна ортодонтчна конструкція (брекет-система). Установіть попередній діагноз.

a. Фіброматоз ясен

b. Гіпертрофічний гінгівіт

c. Генералізований пародонтит

d. Виразковий гінгівіт

e. Катаральний гінгівіт

86. Пацієнту віком 25 років проводять пломбування зубів 44, 45 та 46. Для ізоляції відпрепарованих порожнин від ротової рідини використовують тонкий квадрат з латексу. За допомогою якого інструмента зроблено отвори для ізоляції зубів?

a. Байонетні щипці

b. Щипці-затискачі

c. Щипці для накладання кламерів

d. Крампонні щипці

e. Щипці-пробійник

87. Пацієнтка віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття оскоми на зубах верхньої щелепи протягом двох тижнів. Під час огляду в пришийковій ділянці зубів 11 та 21 виявлено білі плями з матовим відтінком та нечіткими контурами, що

інтенсивно сприймають барвники. Що треба підготувати для проведення лікування?

a. Ремінералізаційні розчини

b. Муміфікуючу пасту

c. Нітрат срібла для імпрегнації

d. Антисептичні розчини

e. Композитний матеріал

88. Який препарат треба підготувати в разі виникнення гіпоглікемічної коми в пацієнта?

a. 0,5%-ий розчин дибазолу

b. 40%-ий розчин глюкози

c. 20 ОД інсуліну

d. 2,4%-ий розчин еуфіліну

e. 0,05%-ий строфантину

89. Під час препарування каріозних порожнин використовуються алмазні бори різного ступеня зернистості. Який колір має маркувальне кільце алмазного бору, призначеного для кінцевого полірування композиційних реставрацій?

a. Червоний

b. Синій

c. Чорний

d. Зелений

e. Білий

90. Дев'ятирічна дівчинка отримала опік шкіри обличчя оцтовою кислотою. Який розчин можна застосувати для нейтралізації травмуючої речовини в цьому разі після тривалого промивання ураженої ділянки водою?

a. 0,05%-ий хлоргексидину біглюконат

b. 96%-ий етиловий спирт

c. 10%-ий розчин аміаку

d. 5%-ий спиртовий розчин таніну

e. 2-5%-ий натрію гідрокарбонат

91. На якому етапі пломбування каріозної порожнини композитним матеріалом світлової полімеризації треба проводити <<фінішне>> засвічування матеріалу?

a. Після внесення останньої порції матеріалу

b. Після остаточного оброблення пломби

c. Після шліфування пломби

d. Після внесення кожної порції пломбувального матеріалу

e. Після формування пломби

92. Лікар-стоматолог проводить лікування гострого глибокого карієсу зуба 27. Який метод дослідження можна застосувати для визначення рівня некретомії?

a. Люмінесцентну діагностику

b. Термопробу

c. ЕОД

d. Фарбування карієс-маркером

e. Метод транслюмінації

93. У пацієнтки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 35 зі світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини зуба дещо болюче. Який інструмент треба вибрати для некретомії?

a. Гладилку

b. Штопфер

c. Екскаватор

d. Зонд

e. Алмазний бор

94. Після стоматологічного прийому необхідно виконати повну обробку інструментів. Яка послідовність обробки використаного стоматологічного інструментарію?

a. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація

b. Передстерилізаційне очищення, дезінфекція, стерилізація

c. -

d. Передстерилізаційне очищення, стерилізація

e. Передстерилізаційне очищення, стерилізація, дезінфекція

95. Укажіть, яке ускладнення може виникнути в пацієнта після операції з видалення зуба.

a. Проштовхування зуба в м'які тканини

b. Ушкодження зуба-антагоніста

c. Потрапляння зуба в дихальні шляхи

d. Вивих нижньої щелепи

e. Альвеоліт лунки зуба

96. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект переднього зуба. Після огляду встановлено діагноз: гострий середній карієс зуба 23 із локалізацією каріозної порожнини в пришийковій ділянці. Для якого класу каріозних порожнин за Блемом характерна ця локалізація дефекту?

a. I

b. IV

c. III

d. V

e. II

97. У пацієнтки віком 26 років під час лікування гострого глибокого карієсу зуба 36 випадково була відкрита пульпова камера зуба. Який лікарський засіб треба підготувати в цьому разі?

a. Склоіономерний цемент

b. Пасту на основі миш'яку

c. Ізоляційну прокладку

d. Пасту на основі параформальдегіду

e. Одонтотропну пасту

98. Розуміння будови та функцій різних частин ясен допомагає лікарям-стоматологам в ефективному веденні лікування пацієнтів та догляду за здоров'ям порожнини рота. Укажіть, на які частини поділяють ясна.

a. Тверді та м'які

b. Прикріплені та вільні

c. Внутрішні та зовнішні

d. -

e. Епітеліальні та базальні

99. Одним із етапів препарування каріозної порожнини є некректомія розм'якшеного дентину. Який інструмент треба підготувати для проведення цього етапу препарування?

a. Полір

b. Алмазний бор

c. Фінір

d. Твердосплавний бор

e. Карборундова головка

100. Уявіть, що ви стали свідком надзвичайної ситуації та помітили постраждалого. Виберіть крок, згідно з алгоритмом MARCH, який є найпріоритетнішим до виконання?

a. Зупинка кровотечі

b. Відновлення дихання

c. Накладання шини

d. Особиста безпека

e. Запобігання гіпотермії

101. Пацієнту проводиться ендодонтичне лікування зуба 43. Для антисептичного оброблення та видалення ошурків з кореневого каналу використовується розчин гіпохлориту натрію. Яка концентрація цього антисептика використовується для іригації кореневого каналу?

- a. 0,03%
- b. 6%
- c. 12%
- d. 9%
- e. 3%

102. Під час виконання азопірамової проби протягом 1 хв на одному інструменті з усієї партії з'явилося фіолетово-бузкове забарвлення. Що потрібно зробити в цьому разі?

- a. Промити всю партію інструментів під проточною водою
- b. Здійснити повторне передстерилізаційне очищення всієї партії інструментів
- c. Простерилізувати всі інструменти, за винятком того, на якому виявилася позитивна азопірамова проба
- d. Промити інструмент під проточною водою
- e. Ополоснути інструмент дистильованою водою та висушити

103. Потерпілий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав черепно-мозкову травму та перелом щелепи. Як здійснити тимчасову зупинку сильної кровотечі в щелепно-лицьовій ділянці?

- a. Накласти джгут
- b. Надати пацієнту положення з опущеною головою
- c. Накласти міхур з льодом
- d. Накласти холодний компрес
- e. Притиснути загальну сонну артерію

104. Яка кислота і в якій концентрації використовується для протравлювання дентину та емалі в разі застосування адгезивної техніки пломбування каріозних порожнин?

- a. 3%-ий розчин ортофосфорної кислоти
- b. 5%-ий розчин полікарбонових кислот
- c. 37%-ий розчин ортофосфорної кислоти
- d. 10%-ий розчин ортофосфорної кислоти
- e. 15%-ий розчин полікарбонових кислот

105. У клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт для видалення зуба 13. Які щипці треба приготувати лікарю-стоматологу-хірургу для проведення цієї операції?

- a. S-подібні
- b. Прямі
- c. Зігнуті по ребру із щічками, що змикаються
- d. Багнетоподібні
- e. Зігнуті по ребру із щічками, що не змикаються

106. Після використання ендодонтичного інструментарію помічник лікаря-стоматолога провів його дезінфекцію та передстерилізаційне очищення. Яка мета дезінфекції?

- a. Знищення білкових, жирових забруднень
- b. Знищення патогенних та умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- c. Механічне знищення забруднень
- d. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- e. Знищення залишків лікарських препаратів

107. Під час ортопедичного прийому планується зняття відбитків щелеп. Укажіть, який інструментарій необхідний лікарю-стоматологу-ортопеду для отримання відбитка альгінатною масою.

- a. Блокнот для замішування та стоматологічне скельце
- b. Каталізатор та інгібітор
- c. Гумові рукавички та каталізатор для затвердіння
- d. Гумова колба та шпатель для замішування
- e. Шпатель для замішування та стоматологічне скельце

108. Вагітна жінка віком 26 років звернулася до лікаря-стоматолога для професійної гігієни порожнини рота. Які насадки треба підготувати для проведення завершального етапу

видалення зубних відкладень?

- a. Флосети
- b. Міжзубні йоржики
- c. Мануальні скейлери
- d. Міжзубні стимулятори
- e. Гумові ковпачки**

109. Ротова порожнина є початком травної системи і складається з присінка та власне порожнини рота. Укажіть межі власне порожнини рота.

- a. Зверху - вуздечка верхньої губи, знизу - вуздечка нижньої губи, спереду - зуби, знизу - язик
- b. Зверху та знизу - присінок ротової порожнини, спереду - язик та зуби, з боків - ясна та зуби
- c. Зверху - тверде піднебіння, знизу - м'язи дна порожнини рота, спереду - альвеолярний відросток, з боків - щоки
- d. Зверху та знизу - альвеолярний відросток, вкритий слизовою оболонкою, спереду - присінок, з боків - слизова оболонка щік
- e. Зверху - тверде та м'яке піднебіння, знизу - язик та дно порожнини рота, спереду та з боків - ясна та зуби**

110. Укажіть, за допомогою якої групи матеріалів лікарю-стоматологу найдоцільніше зняти відбиток для виготовлення металокерамічної коронки.

- a. Термопластичних мас
- b. Альгінатних відбиткових матеріалів
- c. Гіпсу медичного
- d. Композитних матеріалів
- e. Силіконових відбиткових матеріалів**

111. Які лампи використовують для знезараження повітря та поверхонь у стоматологічному кабінеті?

- a. Фотополімерні
- b. Люмінесцентні
- c. Розжарювання
- d. Бактерицидні**
- e. Світлодіодні

112. Які інструменти використовують для оброблення твердих тканин зуба під час препарування каріозних порожнин?

- a. Кулясті бори, плагери
- b. Кулясті бори, екскаватор**
- c. Карборундові головки, плагери
- d. Карборундові головки, фініри
- e. Кулясті бори, матриці

113. Які інструменти необхідно підготувати для проведення обстеження стоматологічного пацієнта?

- a. Екскаватор, гладилка, дзеркало стоматологічне
- b. Штопфер, дзеркало стоматологічне, пінцет
- c. Дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний, екскаватор
- d. Зонд зубний зігнутий, шпатель, пінцет
- e. Зонд зубний зігнутий, дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний**

114. Лікар-стоматолог проводить визначення індексу гігієни Федорова-Володкіної в дітей молодшого шкільного віку. Який розчин треба підготувати для проведення цієї процедури?

- a. Метиленового синього
- b. Еритрозину
- c. Фурациліну
- d. Фуксину
- e. Йодисто-калієвий**

115. Які антисептики належать до групи окисників?

- a. Перекис водню, калію перманганат
- b. Карболова кислота, соляна кислота
- c. Хлорамін Б, хлоргексидину біглюконат
- d. Мурашина кислота, борна кислота
- e. Фурацилін, фуразолідон

116. Для дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у стоматологічній клініці передбачено проведення генерального прибирання в комплексі заходів, спрямованих на попередження поширення інфекції. Укажіть, з якою кратністю проводиться цей вид прибирання.

- a. На початку робочої зміни
- b. 1 раз на місяць
- c. У кінці робочої зміни
- d. 1 раз на тиждень
- e. Щодня

117. У пацієнта діагностовано передпухлинний процес слизової оболонки порожнини рота. Лікар пояснив, що без належного лікування з часом він обов'язково призведе до розвитку раку. Який діагноз встановлено пацієнту?

- a. Шкірний ріг
- b. Кератоакантома
- c. Обмежений гіперкератоз
- d. Папіломатоз
- e. Лейкоплакія

118. Під час обстеження порожнини рота пацієнта було виявлено, що внаслідок звуження верхньої зубної дуги щічні горбки нижніх бічних жувальних зубів розташовані назовні від однойменних верхніх, фронтальні зуби змикаються правильно. Який прикус має пацієнт?

- a. Прогнатичний
- b. Перехресний
- c. Прогенічний
- d. Глибокий
- e. Відкритий

119. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення коренів зубів 37 та 36. Пацієнту планується проведення аплікаційної анестезії перед проведенням провідникової анестезії. Яка концентрація розчину лідокаїну використовується для аплікаційної анестезії?

- a. 10%
- b. 20%
- c. 15%
- d. 25%
- e. 30%

120. Після використання стоматологічного інструментарію асистенту лікаря-стоматолога необхідно провести його дезінфекцію, передстерилізаційне очищення та стерилізацію. Який режим стерилізації стоматологічних інструментів у сухожаровій шафі?

- a. При температурі 180°C - 60 хв
- b. При температурі 140°C - 45 хв
- c. При температурі 200°C - 30 хв
- d. При температурі 120°C - 90 хв
- e. При температурі 160°C - 120 хв

121. У чотирирічної дівчинки під час огляду лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 55 у межах плащового дентину з широким вхідним отвором. Дно та стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, під час зондування безболісні. Який матеріал найдоцільніше застосувати для пломбування?

- a. Цинк-фосфатний цемент
- b. Полікарбоксилатний цемент

- c. Амальгаму
- d. Силікофосфатний цемент
- e. Склоіономерний цемент

122. Який інструмент використовують для механічного розширення корневих каналів?

- a. Дрильбор
- b. Спредер
- c. Плагер
- d. Коренева голка
- e. Каналонаповнювач

123. Для постійного пломбування каріозної порожнини I класу за Блемом був використаний пломбувальний матеріал світлового затвердіння. Які компоненти входять до складу композитів світлового затвердіння?

- a. Тільки паста
- b. Тільки порошок
- c. Порошок-рідина
- d. Паста-рідина
- e. Паста-паста

124. Дівчина віком 17 років скаржиться на печіння та сухість слизової оболонки порожнини рота. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на цукровий діабет протягом трьох років. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка щік суха, укрита білим нальотом, що легко знімається. Установлено діагноз: кандидозний стоматит. Яку мазь доцільно рекомендувати для лікування в цьому разі?

- a. Інтерферонову
- b. Еритроміцинову
- c. Преднізолонову
- d. Клотримазолову
- e. Ланолінову

125. Пораненому надається допомога згідно з алгоритмом MARCH. Якою літерою позначено етап виявлення черепно-мозкових травм?

- a. M
- b. C
- c. R
- d. H
- e. A

126. Яку назву має хейліт, спричинений підвищеною чутливістю червоної облямівки губ до інсоляції?

- a. Ексфоліативний
- b. Екзематозний
- c. Атопічний
- d. Метеорологічний
- e. Актинічний

127. Що треба підготувати для лікаря-стоматолога з метою видалення надлишків композитного матеріалу та для попереднього полірування приясенних ділянок реставрацій у ділянці переходу пломбувального матеріалу на емаль на контактних поверхнях зубів?

- a. Полірувальні щітки
- b. Полірувальні штрипси
- c. Полірувальні диски
- d. Гумові головки
- e. Фінішні алмазні бори

128. Укажіть відбитковий матеріал, що належить до групи на основі окису цинку й евгенолу та використовується для отримання відбитків індивідуальною ложкою при повній відсутності зубів на щелепі.

a. Speedex

b. Репін

c. Фторакс

d. Yreen

e. Ортокор

129. Для проведення розширення кореневих каналів зуба 27 лікарю-стоматологу треба подати К-ример. Яким графічним символом позначено цей вид ендодонтичних інструментів?

a. Трикутник

b. Коло

c. Восьмикінцева зірочка

d. Квадрат

e. П'ятикінцева зірочка

130. Під час огляду семирічної дівчинки лікар-стоматолог виявив на присінкових поверхнях зубів 11, 21, 31, 41 і на горбиках зубів 16, 26, 36, 46 темні плями. З анамнезу відомо, що зуби прорізалися ураженими. Лікар встановив діагноз: флюороз. Надлишок якого хімічного елемента в питній воді буде причиною виникнення цього захворювання?

a. Йоду

b. Кальцію

c. Заліза

d. Фтору

e. Фосфору

131. Назвіть поверхню зуба, на якій найчастіше для профілактики карієсу проводять герметизацію?

a. -

b. Контактна

c. Жувальна

d. Вестибулярна

e. Оральна

132. Яке положення треба надати пацієнту в разі стану непритомності?

a. Сімса

b. Тренделенбурга

c. Фаулера

d. На животі

e. На боці

133. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт віком 40 років зі скаргами на виникнення післяопераційної чутливості в ділянці зуба 21 після проведення значної реставрації. Який препарат треба приготувати асистенту для усунення чутливості твердих тканин зубів?

a. Ормокер

b. Кондиціонер

c. Компомер

d. Пасту з тимолом

e. Десенситайзер

134. Лікар-стоматолог готується до останнього етапу пломбування зуба. Які інструменти йому знадобляться?

a. Фреза, поліри, екскаватор, штрипси

b. Фініри, поліри, оклюзійний папір, штрипси

c. Фініри, поліри, оклюзійний папір, матриці

d. Штопфер, поліри, оклюзійний папір, штрипси

e. Фініри, гладилка, оклюзійний папір, штопфер

135. Під час препарування каріозної порожнини в межах емалі використовують турбінні наконечники. Яку швидкість обертання бора може забезпечити цей наконечник?

a. 100000-200000 об/хв

b. 300000-400000 об/хв

c. 15000-20000 об/хв

d. 50000-100000 об/хв

e. 20000-70000 об/хв

136. Асистент лікаря-стоматолога проводить рентгенологічне дослідження зубів 24, 25 та 26. Які з обстежуваних зубів мають найчастіше три корені?

a. Верхні ікла

b. Верхні моляри

c. Верхні премолари

d. Нижні моляри

e. Нижні премолари

137. Батьки шестимісячної дівчинки скаржаться на наявність сироподібного нальоту на слизовій оболонці щік та язика в дитини. Після огляду лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий кандидозний стоматит. Який збудник викликає це захворювання?

a. Спірохета Венсана

b. Дріжджоподібні гриби

c. Вірус герпесу

d. Паличка Леффлера

e. Веретеноподібна паличка

138. Чим обумовлена поява трем та діастем між молочними зубами в період підготовки заміни їх на постійні?

a. Надмірним жувальним навантаженням

b. Подовженими комірковими відростками щелеп

c. Широкою коронковою частиною молочного зуба

d. Короткими комірковими відростками щелеп

e. Ростом щелеп, більшим розміром зачатків постійних зубів

139. Як називається методика ендодонтичного лікування зубів під час якої кореневу частину пульпи насичують речовинами, що глибоко дифундують, муміфікують і перетворюють її на септичний тяж або склоподібну масу?

a. Девіталізація

b. Ампутація

c. Імпрегнація

d. Екстирпація

e. Ремінералізація

140. Назвіть, з яких частин складається перший постійний моляр на верхній щелепі праворуч.

a. Ясна, корінь, пародонт

b. Коронка, шийка, ясна

c. Коронка, корінь, альвеолярний відросток

d. Коронка, шийка, корінь

e. Корінь, пародонт, альвеолярний відросток

141. Укажіть, яку першу допомогу необхідно надати потерпілому при переломі нижньої щелепи в ментальному відділі без зміщення.

a. Накласти пращоподібну пов'язку та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення

b. Накласти стискальну пов'язку в ділянці поранення та скерувати потерпілого до щелепно-лицевого відділення

c. Накласти стискальну пов'язку в ділянці поранення та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення

d. Накласти пращоподібну пов'язку та скерувати потерпілого до щелепно-лицевого відділення

e. Накласти головну та стискальну пов'язки та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення

142. Як, за перебігом, називається карієс, що супроводжується множинним ураженням

практично всіх зубів, часто в одному зубі виникають 2-3 каріозні порожнини?

- a. Хронічним
- b. Квітучим**
- c. Гострим
- d. Ускладненим
- e. Рецидивним

143. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубі 46 під час вживання гарячого. Після огляду встановлено попередній діагноз: хронічний гангренозний пульпіт. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Який діапазон показників ЕОД характерний для хронічного гангренозного пульпіту?

- a. -
- b. 50-90 мкА**
- c. 30-40мкА
- d. Більше 100 мкА
- e. 15-30 мкА

144. Після стоматологічного обстеження підлітка віком 16 років лікар-стоматолог встановив діагноз: хронічний фіброзний пульпіт зуба 36. Пацієнту проведено ендодонтичне лікування. Яким інструментом проводять видалення судинно-нервового пучка?

- a. Каналонаповнювачем
- b. Спредером
- c. Римером
- d. Плагером
- e. Пульпоекстрактором**

145. Під час препарування каріозної порожнини лікар повинен працювати з перервами за відповідної кількості обертів бора та його охолодження. Яке ускладнення виникає у разі недотримання цієї рекомендації?

- a. Ушкодження прилеглих зубів
- b. Швидке зношування наконечника
- c. Збільшення пилу у повітрі
- d. Запалення або загибель пульпи**
- e. Швидке затуплення борів

146. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляду виявлено каріозну порожнину в зубі 45 в межах плащового дентину світлого кольору, що легко знімається за допомогою екскаватора. З анамнезу відомо, що пацієнт відзначає больові відчуття під час вживання солодкого в ділянці цього зуба. Про який патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

- a. Хронічний середній карієс
- b. Гострий поверхневий карієс
- c. Гострий середній карієс**
- d. Хронічний глибокий карієс
- e. Гострий глибокий карієс

147. Пацієнту показано видалення зубів 21, 22 через загострення хронічного періодонтиту. Коронкові частини зубів 21, 22 зруйновані на 1/2. Який інструмент треба вибрати для видалення?

- a. Кутовий елеватор
- b. S-подібні щипці
- c. Дзьобоподібні щипці
- d. Байонетні щипці
- e. Прямі щипці**

148. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка віком 17 років зі скаргами на наявність глибокої каріозної порожнини в зубі. Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий глибокий карієс зуба 26. Для проведення лікування асистент лікаря-стоматолога

підготувала пасту на основі кальцію гідроксиду. Яка дія препарату?

- a. Антисептична, знеболювальна
- b. Адгезивна, протизапальна
- c. Протизапальна, одонтотропна**
- d. Знеболювальна, седативна
- e. Седативна, адгезивна

149. Лікар-стоматолог під час профілактичного огляду запропонував пацієнту розжувати таблетку синього кольору, а потім сполоснути ротову порожнину. Для чого лікар проводить цю процедуру?

- a. Контролю гігієнічних навичок пацієнта**
- b. Виявлення каріозних порожнин
- c. Виявлення запального процесу в яснах
- d. Контролю крайового прилягання пломб на зубах
- e. Виявлення запального процесу на слизовій оболонці ротової порожнини

150. У пацієнта виявлено каріозну порожнину, розташовану на різальному краї різця, що утворилася через стирання емалі і оголення дентину. До якого класу за класифікацією Блека належить ця каріозна порожнина?

- a. I
- b. III
- c. IV
- d. VI**
- e. II