

1. Хворому Д., 67 років, з беззубими щелепами, при виготовленні знімних протезів застосовували апарат Ларіна. За допомогою цього апарату:

- a. Визначали франкфуртську горизонталь
- b. Визначали камперовську горизонталь
- c. Формували протетичну площину
- d. Формували оклюзійну площину
- e. Формували сферичну оклюзійну поверхню

2. Пациент 55 лет обратился с жалобами на отсутствие 26 зуба. Объективно: слизистая в области удаленного зуба бледно-розового цвета, зубы, ограничивающие дефект интактны, устойчивы. 36 зуб на $\frac{1}{3}$ коронки выдвинут в сторону дефекта. Какой план лечения необходимо рекомендовать больному:

- a. Изготовление временного мостовидного протеза на период от 3 до 6 месяцев с последующим изготовлением постоянного мостовидного протеза
- b. Направить на ортодонтическое лечение с последующим ортопедическим лечением
- c. Депульпирование 36 зуба и одновременное изготовление мостовидного протеза на верхнюю челюсть и искусственной коронки на 36 зуб
- d. Провести аппаратно-хирургическое лечение с последующим изготовлением ортопедического протеза
- e. Изготовить мостовидный протез с вогнутой промежуточной частью

3. Чоловік 48 р. звернувся зі скаргами на постійні болі в ділянці 36 зуба. Раніше зубнеодноразово болів. При огляді порожнини рота коронка 36 зуба відсутня, перкусія коренів болісна. На рентгенограмі в ділянці верхівок коренів 36 зона розрідження з нечіткими контурами. Встановіть діагноз:

- a. Хронічний пульпіт
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит
- c. Гострий періодонтит
- d. Хронічний гранульоматозний періодонтит
- e. Хронічний фіброзний періодонтит

4. Больной И. 27 лет обратился к хирургу стоматологу для удаления зуба на верхней челюсти, с целью подготовки к протезированию. В анамнезе у больного полиаллергия на различные лекарственные препараты. После введения лидокаина у больного развился анафилактический шок. Выберите препарат, который первым вводится при оказании первой помощи:

- a. Эуфиллин 2,4% - 10,0 мл
- b. -
- c. Димедрол 1% - 2,0 мл
- d. Кордиамин 25% - 1,0 мл
- e. Адреналин 0,1% - 0,5 мл

5. До місцевих карієсogених факторів відносять:

- a. Порушення властивостей і складу ротової рідини
- b. Погана якість питної води
- c. Неповноцінна структура твердих тканин
- d. Спадковість
- e. Екстремальні впливи

6. Хвора 22 років страждає ревмокардитом. спрямована до стоматолога для санації порожнини рота. Яка форма періодонтиту з перерахованих є найбільш грізним вогнищем одонтогенної

інфекції?

- a. Гострий гнійний періодонтит
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит**
- c. Хронічний фіброзний періодонтит
- d. Хронічний гранульоматозний періодонтит
- e. Гострий серозний періодонтит

7. У клініку звернулася жінка з дитиною 12 років із приводу травми 11 зуба. Об'єктивно: відкол коронки на $\frac{1}{3}$, перкусія безболісна, зондування слабоболуча. Коротка болуча реакція на температурні подразники. На знімку змін немає. Дії лікаря?

- a. Спостерігати за зубом
- b. Відновити зуб і періодично спостерігати**
- c. Провести вітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки
- d. Провести вітальну ампутацію з наступним відновленням зуба
- e. Провести девітальну екстерпацію з наступним відновленням коронки

8. Дівчинці 4 роки. В анамнезі часті респіраторні захворювання. Об'єктивно: Обличчя симетричне. Тимчасовий прикус. Зубна формула: на верхній щелепі – 55 54 53 52 51 61 62 63 64 65, на нижній щелепі – 85 84 83 82 81 71 72 73 74 75. Дихає ротом. Консультація якого лікаря-спеціаліста більш необхідна у даному випадку?

- a. ЛОР-лікаря**
- b. Лікаря-гастроентеролога
- c. Лікаря-хірурга
- d. Лікаря-невропатолога
- e. Лікаря-терапевта

9. Яке ускладнення під час ортодонтичного лікування незнімним апаратом виникає при використанні великої сили?

- a. Рухливість та біль в зубах**
- b. Декубітальні виразки
- c. Некроз емалі
- d. Біль в області суглобів
- e. Гіперемія ясен

10. Больной 65-ти лет жалуется на длительно существующие слабые боли, неприятные ощущения на слизистой оболочке правой щечной области. Табакокурение с 15 лет. Полость рта не санирована. Во время осмотра у больного выявлена верукозно-эрозивная форма лейкоплакии щеки размером 1,5x0,5 см. Какая тактика врача-стоматолога в этом случае?

- a. Направить больного в онкодиспансер для дальнейшего лечения и диспансеризации**
- b. Хирургическое удаление очага, диспансеризация
- c. Криодеструкция
- d. Наблюдение и лечение в случае появления признаков малигнизации
- e. Консервативная терапия

11. Жінка, 41 рік, звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на кровоточивість ясен. Після проведеного обстеження встановлений діагноз: генералізований пародонтит II ступеню, загострений перебіг. З анамнезу відмічає цукровий діабет. З яким лікарем і інтерністом необхідно вести цю пацієнтку?

- a. Нефрологом
- b. Алергологом**

- c. Гематологом
- d. Пульмонологом

e. Ендокринологом

12. Больной С., 33 лет, находится на лечении у стоматолога по поводу хронического глубокого кариеса 22, III класс по Блеку. Восстановление коронки врач решил выполнить с применением фотоотверждаемого композиционного материала. Какая оптимальная температура рекомендована в стоматологическом кабинете для работы с фотоотверждаемыми композиционными материалами?

- a. 18-21°C
- b. Не имеет значения
- c.

d. 21-24°C

e. 24-26°C

13. Після ендодонтичного лікування пацієнтка 35 р. звернулася з приводу зміни кольору коронки 22 зуба. Зуб придбав рожеве фарбування. Вкажіть причину

- a. Внутрішні захворювання пацієнтки
- b. Неправильний вибір кореневого наповнювача**
- c. Порушення технології обробки кореневого каналу
- d. Неправильний вибір реставраційного матеріалу
- e. Порушення технології реставрації зуба

14. Жінка скаржиться на гострий біль у 48 зубі. Біль постійний, самовільний, інтенсивність наростає з кожною годиною, відмічається відчуття "вирослого зуба". При огляді в 48 зубі глибока каріозна порожнина, перкусія різко болісна. Встановіть діагноз

a. гострий періодонтит

- b. глибокий карієс
- c. невралгія трійчастого нерва
- d. хронічний пульпіт
- e. гострий пульпіт

15. Підліток звернувся зі скаргами на біль у 26 зубі. Встановлений діагноз: гострий дифузний пульпіт. Які симптоми характерні ?

- a. Постійні слабкі болі
- b. самовільні, нічні, ірадіючі**
- c. короткочасні приступоподібні з довгими періодами ремісії
- d. постійні сильні болі
- e. Поряд з гострими приступоподібними болями може бути довгочасний, ниючий біль

16. На прийом прийшов пацієнт з пляшкою холодної води, яка заспокоює зубний біль. Який найбільш вірогідний діагноз?

- a. середній карієс
- b. хронічний періодонтит
- c. глибокий карієс
- d. гострий гнійний пульпіт**
- e. гострий періодонтит

17. У клініку звернувся пацієнт 33 р зі скаргами на рухливість 22 зуба. В анамнезі травма зуба 2 роки тому. Об'єктивно: зуб раніше не лікований, рухливість 3 ст., перкусія слабоболуча. На знімку –

резорбція кореня на $\frac{1}{3}$. Найбільше доцільно:

a. Спостереження

b. Видалити зуб

c. Провести ендодонтичне лікування і шинувати зуб

d. Провести фізіотерапевтичне лікування

e. Провести резекцію кореня зуба з підсадженням кісткової тканини

18. Пацієнт 29 л. звернувся в клініку на наявність порожнини в 25 зубі. Поставлено діагноз – хронічний фіброзний пульпіт 25 зуба. Де повинна знаходитися границя кореневої пломби

a. За межами кореня

b. На рівні анатомічної верхівки

c. Не доходячи 2.0 – 2.5 мм до рентгенологічної верхівки кореня

d. Не доходячи 3.0 – 3.5 мм до рентгенологічної верхівки. Верхівки

e. Не доходячи 1.0 – 1.5 мм до рентгенологічної верхівки кореня