

1. У вагітної жінки віком 28 років раптово розпочався судомний напад. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, АТ - 170/110 мм рт. ст., сатурація — 90%. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: висота стояння дна матки визначається на рівні, що відповідає 37-му тижню вагітності. Яке положення тіла треба надати пацієнтці після стабілізації стану під час транспортування до лікувального закладу?

A. На лівому боці

- B. На спині
- C. На животі
- D. Сидячи
- E. На правому боці

2. У дитячому дошкільному закладі зареєстровано спалах кору. Укажіть характер елементів висипу у разі типового перебігу періоду висипань кору.

A. Пламисто-папульозний

- B. Геморагічно-зірчастий
- C. Везикулярний
- D. Петехіальний
- E. Уртикарний

3. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання у руках, судом в м'язах кистей. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом 10-ти років працює забійником у шахті. Об'єктивно спостерігається: кисті ціанотичні, холодні на дотик, зниження больової чутливості за типом «рукавичок». Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Вібраційної хвороби

- B. Пневмоконіозу
- C. Системної склеродермії
- D. Ревматоїдного артрити
- E. Цукрового діабету

4. Укажіть засіб, яким потрібно промити неушкоджену шкіру, у разі потрапляння на неї крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин.

A. Водою з милом

- B. Дезінфікуючим розчином
- C. Етиловим спиртом
- D. Антисептиком
- E. Фізіологічним розчином

5. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей візуалізуються численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Висівкоподібного лишаю

- B. Токсикодермії
- C. Екземи
- D. Мікроспорії
- E. Дерматиту

6. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховується у діагностиці (визначенні ступеня звуження) анатомічно вузького таза?

A. Справжня кон'югата

- B. Міжостьова відстань
- C. Міжребенева відстань
- D. Міжвертлюгова відстань
- E. Зовнішня кон'югата

7. У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна амплітуди дихання з паузами між хвилями 40-50 с. Укажіть патологічний тип дихання.

A. Чейна-Стокса

- B. Гаспінг
- C. Тахіпное
- D. Біота
- E. Куссмауля

8. Пацієнту віком 65 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія. Підвищення рівня якого біохімічного показника в крові може свідчити про ураження одного з органів-мішеней у разі цього захворювання?

A. Креатиніну

- B. Загального білірубіну
- C. Глюкози
- D. Лужної фосфатази
- E. Загальних ліпідів

9. Укажіть основний метод пренатальної інвазивної діагностики для виявлення генетичної патології у плода, ДНК-діагностики, каріотипування на ранніх термінах гестації шляхом біопсії плаценти.

A. Кордоцентез

- B. Ультразвукове дослідження
- C. Дослідження ворсин хоріона
- D. Амніоцентез

10. Який ендоскопічний метод дослідження сечового міхура використовується для діагностики захворювань, виконання біопсії, забору біологічного матеріалу та проведення лікувальних маніпуляцій?

A. Цистоскопія

- B. Холецистографія
- C. Колоноскопія
- D. Ультразвукове дослідження
- E. Цистографія

11. Для лікування подагричного артриту в стадії загострення препаратами першої лінії є швидкодіючі НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) у високих дозах. Укажіть особливість приймання лікарських засобів цієї групи, що дозволяє запобігти розвитку побічних ефектів на шлунково-кишковий тракт.

A. Після вживання їжі

- B. За 2 год до вживання їжі
- C. Незалежно від вживання їжі
- D. Натщесерце
- E. Запивати невеликою кількістю води

12. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пацієнта в стаціонарі закладу охорони здоров'я та фіксації відомостей про медикаментозне лікування, методів обстеження, фізіотерапевтичних процедур тощо?

A. Листок лікарських призначень

B. Консультативний висновок спеціаліста

C. Журнал обліку процедур

D. Реєстраційна генетична карта

E. Температурний листок

13. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спостерігалися тривала жовтяниця, пізні відпадання пупкового канатика та повільне загоєння пупкової ранки, зниження фізіологічних рефлексів, гіпотрофія м'язів, щільні набряки на тильних поверхнях кистей та стоп, непропорційно велика голова, збільшення губ і язика. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

A. Вродженого гіпотиреозу

B. Вродженої вади серця

C. Акромегалії

D. Дифузного токсичного зоба

E. Рахіту

14. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Яке співвідношення денного діурезу до нічного в нормі?

A. 3 до 1

B. 1 до 3

C. 1 до 1

D. 1 до 4

15. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період фізіологічних пологів. Під час прорізування голівки після потуги зареєстровано, що частота серцевих скорочень плода становить 80/хв. Укажіть подальшу тактику ведення пологів у цьому разі.

A. Провести епізіотомію під місцевою анестезією

B. Увести епінефрин 0,01 мг/кг

C. Продовжити очікувальну тактику

D. Накласти акушерські щипці

E. Негайно провести кесарів розтин

16. У чоловіка віком 35 років після контакту із хлорофосом під час польових робіт з'явилися такі симптоми: слюзотеча, посилене слиновиділення, нудота та блювання, біль у животі, діарея, зниження гостроти зору. Об'єктивно спостерігається: пацієнт перебуває у стані психомоторного збудження, мовлення ускладнене, зіниці звужені, пульс - 48/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні вказані симптоми? Отруєння якою речовиною, найімовірніше, спричинило появу вказаних симптомів?

A. Фосфорорганічними сполуками

B. Ртуттю

C. Нітратами

D. Хлорорганічними сполуками

E. Метанолом

17. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, «гавкаючий

кашель», утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра обличчя ціанотична, повіки та губи набряклі, щільні на дотик, свербіж не має, пульс - 84/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

A. Набряк Квінке

- B. Анафілактичний шок
- C. Аспірація стороннього тіла
- D. Кропив'янка
- E. Дифтерійний круп

18. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл/хв. До якої лікувальної процедури необхідно підготувати пацієнта в цьому разі?

A. Гемодіалізу

- B. Фонофорезу
- C. Шунтування
- D. Лапароцентезу
- E. Літотрипсії

19. У чоловіка віком 40 років унаслідок падіння з висоти стався перелом кісток передпліччя. Укажіть одне з ранніх ускладнень, що може виникнути у разі закритих переломів довгих трубчастих кісток.

A. Жирова емболія

- B. Анкілоз
- C. Некроз кістки
- D. Укорочення кінцівки
- E. Контрактури

20. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести для видалення патологічного вмісту (зайвої рідини) з черевної порожнини?

A. Абдомінальну

- B. Люмбальну
- C. Плевральну
- D. Стернальну

21. Під час дослідження пульсу пацієнтки сестра медична з'ясувала, що після притискання променевої артерії до променевої кістки пульсація не припинилася. Проаналізуйте цей параметр пульсу.

A. Напружений (твердий)

- B. М'який
- C. Ниткоподібний
- D. Слабкого наповнення
- E. Нормального наповнення

22. Жінці віком 48 років після комплексного обстеження встановлено діагноз: ендемічний зоб. Укажіть найпоширеніший фактор розвитку цього захворювання.

A. Недостатнє споживання йоду з їжею та водою

- B. Недостатнє надходження заліза до організму
- C. Надлишкове споживання харчових продуктів, що містять йод
- D. Дефіцит кальцію в продуктах харчування

Е. Надлишкове споживання кухонної солі

23. Пацієнтка віком 18 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на часте і болісне сечовипускання, біль у надлобковій ділянці, підвищення температури тіла до 37,4°C. Симптоми з'явилися після переохолодження. У сечі: лейкоцитурія, еритроцити - 20-30 в полі зору мікроскопа. Для якого захворювання найхарактерніші вказані клініко-лабораторні показники?

А. Гострого циститу

В. Полікістозу нирок

С. Гострого пієлонефриту

Д. Сечокам'яної хвороби

Е. Гострого аднекситу

24. У пацієнта виразкова хвороба шлунка ускладнилася шлунково-кишковою кровотечею. Який вигляд матимуть калові маси в цьому разі?

А. Чорного кольору, дьогтеподібні

В. Мутнувато-білого кольору, водянисті

С. Зеленого кольору, водянисті

Д. Знебарвлені, пастоподібні

Е. Гострого циститу

25. Який спосіб введення гепарину протипоказаний для використання у зв'язку з високим ризиком утворення гематом?

А. Внутрішньом'язовий

В. Підшкірний

С. Внутрішньовенний

Д. Внутрішньошкірний

26. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,2°C, набряк і почервоніння правої щоки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається інфільтрат, болючий під час пальпації, шкіра над ним напружена, гіперемована, у центрі інфільтрату візуалізується стрижень у вигляді сіро-зелених мас. Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

А. Флегмона

В. Абсцес

С. Карбункул

Д. Гідраденіт

Е. Фурункул

27. Сестра медична проводить запис електрокардіограми пацієнту кардіологічного відділення. Якому грудному відведенню відповідає електрод, встановлений у п'ятому міжребер'ї по лівій середньоключичній лінії?

А. V4

В. V1

С. V5

Д. V3

Е. V2

28. Пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції. Лікар призначив введення постійного катетера Фолея для моніторингу та забезпечення дренивання сечі. Для

його правильної фіксації необхідно заповнити балон катетера ізотонічним розчином натрію хлориду. Яку кількість ізотонічного розчину натрію хлориду потрібно ввести в балон катетера Фолея?

A. 10 мл

B. 8 мл

C. 1 мл

D. 2 мл

E. 6 мл

29. Маніпуляційна сестра медична контролює термін стерильності матеріалу в бікс, який не був розкритий. Протягом якого часу зберігається його стерильність?

A. 8-ми год

B. 1-го дня

C. 3-х діб

D. 1-го тижня

E. 6-ти днів

30. Пацієнту віком 30 років встановлено діагноз: псоріаз. Який специфічний клінічний прояв вказуватиме на стадію (фазу) захворювання?

A. Симптом Кебнера

B. Симптом Нікольського

C. Плями Бельського-Філатова-Копліка

D. Кільцеподібна еритема

E. Висип у вигляді «метелика»

31. У жінки на 35-му тижні вагітності з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс - 100\хв, АТ - 100\60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття плода ритмічне, 160\хв. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

B. Аборт у ході

C. Загроза розриву матки

D. Неповне передлежання плаценти

E. Розрив матки, що відбувся

32. На машинобудівному заводі проводиться позапланова перевірка у зв'язку з зафіксованим збільшенням захворюваності на пневмокніоз серед працівників. Під час обстеження виявлено підвищену концентрацію кварцового пилу в повітрі робочої зони. Який із нижченаведених заходів є найефективнішим для зменшення ризику захворюваності співробітників на пневмокніоз?

A. Зменшення запиленості в повітрі робочої зони

B. Скорочення тривалості робочої зміни

C. Надання додаткових днів відпустки

D. Проведення позапланового інструктажу для працівників

E. Оптимізація температурних умов робочої зони

33. Який метод дослідження дає можливість провести трансервікальний огляд нижнього полюса плодового міхура, визначати характер навколоплідних вод, особливостей плодових

оболонок і стану плода?

A. Амніоскопія

B. Цервікоскопія

C. Лапароскопія

D. Гістероскопія

E. Кольпоскопія

34. Для якого захворювання характерні такі результати аналізу сечі пацієнта: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (концентрація білка менше 1 г/л)?

A. Гострого пієлонефриту

B. Гострої ниркової недостатності

C. Хронічного гломерулонефриту

D. Сечокам'яної хвороби

E. Гострого гломерулонефриту

35. У жінки віком 42 роки, яка впродовж 10-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію, після емоційного перенавантаження виникли головний біль, почуття тривоги, сухість у роті. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, тремор рук, гіперемія обличчя, підвищена вологість шкіри, рухових розладів не виявлено, АТ - 220/120 мм рт. ст., пульс — 110/хв. Глюкоза крові - 4,7 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

A. Гіпертензивний криз

B. Ішемічний інсульт

C. Гіперглікемічна кома

D. Гіпоглікемічна кома

E. Геморагічний інсульт

36. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на біль у правому підребер'ї, що іррадіює в епігастральну ділянку та під праву лопатку, підвищення температури тіла. Під час опитування з'ясувалося, що жінка хворіє впродовж 3-х років, останнє загострення спровоковане вживанням жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: біль у ділянці проєкції жовчного міхура під час пальпації, позитивний френікус-симптом. За результатами дуоденального зондування в порції B виявлено значну кількість лейкоцитів та епітеліальних клітин. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви та результати додаткового методу дослідження?

A. Жовчнокам'яної хвороби

B. Геморагічного коліту

C. Виразкової хвороби шлунка

D. Гострого пієлонефриту

E. Вірусного гепатиту

37. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для цього захворювання?

A. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік

B. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв

C. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр

D. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння

Е. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, «повним ротом»

38. Пацієнтка, яка хворіє на хронічний холецистит, пройшла курс лікування у стаціонарі у зв'язку із загостренням захворювання. Після цього їй рекомендовано дотримуватися спеціальної дієти. Які продукти необхідно виключити з раціону харчування пацієнтки для уникнення повторних загострень хвороби?

А. Жирні сорти м'яса, сало

В. Овочі та фрукти

С. Каші та борошняні вироби

Д. Кисломолочні продукти з низьким вмістом жиру

39. Породіллі після народження плода введено 10 Од окситоцину, процес народження посліду проведено шляхом контрольованої тракції за пуповину з контртракцією на матку. Укажіть ще один стандартний компонент повноцінного активного ведення третього періоду фізіологічних пологів.

А. Масаж матки через передню черевну стінку

В. Інструментальна ревізія порожнини матки

С. Пункція заднього склепіння піхви

Д. Балонна тампонада матки

40. У пацієнта з діагнозом: цироз печінки виникла кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Який із нижченаведених медичних приладів використовується для досягнення гемостазу у разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та кардіального відділу шлунка?

А. Зонд Блекмора

В. Гудзиковий зонд

С. Діатермокоагулятор

Д. Шлунковий зонд

Е. Катетер Фолея

41. Пацієнтка віком 56 років після вживання гострої їжі відчула різкий біль у правому підребер'ї, що супроводжувався нудотою, блюванням і здуттям живота. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс - 100\хв, АТ - 110\70 мм рт. ст., язик сухий, вкритий білим нальотом, живіт помірно здутий, болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера і Кера. Яка група препаратів використовується для полегшення стану пацієнтки?

А. Спазмолітики

В. Антибіотики

С. Снодійні

Д. Антиагреганти

Е. Гепатопротектори

42. Пацієнт віком 60 років скаржиться на пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву лопатку, що виник годину тому. Двічі приймав нітрогліцерин, проте біль не минув. Об'єктивно спостерігається: пацієнт перебуває у стані психомоторного збудження, наляканий, шкіра бліда, пульс — 88\хв, ритмічний, АТ - 130\70 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

А. Інфаркту міокарда

В. Колапсу

С. Гіпертензивного кризи

- D. Нападу стенокардії
- E. Кардіогенного шоку

43. Укажіть термін вагітності, на якому згідно із законодавством в Україні може проводитися штучне переривання небажаної вагітності за бажанням жінки.

- A. До 12 тижнів
- B. До 16 тижнів
- C. До 18 тижнів
- D. До 20 тижнів

44. Пацієнт скаржиться на часткову втрату чутливості в правій нижній кінцівці після внутрішньом'язового введення лікарського засобу у правий сідничний м'яз. Яка анатомічна структура, найімовірніше, зазнала ушкодження внаслідок порушення техніки виконання ін'єкції?

- A. Сідничний нерв
- B. Стегновий нерв
- C. Стегова артерія
- D. Клубова кістка
- E. Зовнішня клубова артерія

45. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти діб спостерігаються часті рідкі випорожнення (до 15 разів на добу) світло-жовтого кольору зі шматочками неперетравленої їжі. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, апатію, спрагу, значну втрату маси тіла. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

- A. Зневоднення (дегідратація)
- B. Дефіцит вітаміну D
- C. Гіпергідратація (затримка води)
- D. Дефіцит заліза
- E. Гіпокальціємія

46. Під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції сестра медична ввела голку шприца в м'яз на всю довжину, внаслідок чого вона зламалася так, що навіть не видно її кінчика. Оберіть найоптимальніший метод видалення голки з м'яза в цьому разі.

- A. Провести хірургічне втручання для видалення голки
- B. Видалити голку за допомогою хірургічного пінцета
- C. Прикласти мазь Вишневського до місця уколу
- D. Спробувати витягнути голку пальцями
- E. Спробувати витягнути голку, скориставшись магнітом

47. Якої тактики необхідно дотримуватися для запобігання некрозу тканин під час внутрішньовенного введення гіпертонічного розчину?

- A. Не допускати потрапляння розчину в паравенозний простір
- B. Ретельно мити руки перед процедурою
- C. Змінювати місце введення лікарського засобу
- D. Перевірити кут і глибину введення голки
- E. Перед застосуванням розчин потрібно підігріти

48. Пацієнту віком 42 роки встановлено попередній діагноз: гостра ниркова недостатність. Рівень яких біохімічних показників потрібно визначити в крові для дослідження функції нирок?

A. Креатиніну, сечовини

- В. Загального білка та його фракцій
- С. α -амілази, трипсину
- Д. Білірубіну, трансаміназ
- Е. С-реактивного білка, сіалових кислот

49. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні на 5-ту добу захворювання зі скаргами на сильний біль у м'язах, підвищення температури тіла до 39°C, головний біль, пожовтіння шкіри. Об'єктивно спостерігається: язик сухий, обкладений білим нальотом, пульс -120\хв, АТ - 80\50 мм рт. ст., тони серця приглушені, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3,5 см. Результати загального аналізу крові: лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Спостерігається зменшення добового об'єму сечі. З анамнезу з'ясувалося, що 2 тижні тому купався в озері. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

A. Лептоспірозу

- В. Гепатиту
- С. Малярії
- Д. Бешихи
- Е. ВІЛ-інфекції

50. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на біль у поперековій ділянці, часте сечовипускання, озноб, підвищення температури до 38,5°C. Під час об'єктивного обстеження виявлено позитивний симптом Пастернацького. З боку інших органів патології не виявлено. Які зміни в загальному аналізі сечі, найімовірніше, спостерігатимуться в цьому разі?

A. Лейкоцитурія (піурія)

- В. Гематурія (сеча кольору «м'ясних помиїв»)
- С. Міоглобінурія
- Д. Парапротеїнурія
- Е. Глюкозурія

51. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати якої групи порушують процеси росту, розвитку та механізми поділу всіх клітин організму, включаючи злоякісні?

A. Цитостатики

- В. Кардіопротектори
- С. Гепатопротектори
- Д. Противірусні
- Е. Антибіотики

52. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу в лівій пахвовій ділянці щільного болючого утворення багряно-червоного кольору, озноб, головний біль, підвищення температури тіла. Під час пальпації утворення спостерігається симптом флюктуації. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

A. Гідраденіту

- В. Карбункулу
- С. Фурункулу
- Д. Сикозу
- Е. Остеомієліту

53. У пацієнта віком 35 років спостерігаються симптоми туберкульозу: тривалий кашель,

субфебрильна температура тіла, зниження маси тіла, нічна пітливість. Укажіть інноваційний молекулярногенетичний тест, що забезпечує швидкий автоматизований результат у виявленні генів збудника туберкульозу.

A. GeneXpert

B. Sanger sequencing

C. FISH

D. ELISA

E. Western blot

54. Під час внутрішньовенного введення розчину антибіотика у пацієнта раптово виникли такі симптоми: відчуття жару та стиснення в грудях, задишка. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, рясна пітливість, АТ- 80/60 мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Який лікарський засіб потрібно застосувати насамперед для надання невідкладної допомоги пацієнту?

A. Елінефрин

B. Цетиризин

C. Лоратадин

D. Хлоропірамін

E. Парацетамол

55. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності - 39 тижнів, вагітність I, пологи II. Як часто потрібно вислуховувати серцебиття для оцінки стану плода?

A. Кожні 15 хв

B. Кожні 30 хв

C. З інтервалом 20 хв

D. Раз на 1 год

E. З інтервалом 10 хв

56. У пацієнтки на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився стан: з'явилися задишка, кашель із виділенням рожевого пінистого мокротиння, клекітливе дихання. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда, пульс - 86/хв, слабкого наповнення, АТ - 100/60 мм рт. ст. Укажіть першочерговий захід невідкладної допомоги в цьому разі.

A. Киснева терапія

B. Антибіотикотерапія

C. Інгаляційне введення гормональних препаратів

D. Фізіотерапевтичні процедури

E. Інгаляція сальбутамолу

57. Пацієнт перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні після транспортної пригоди, яка сталася 2 дні тому. У ділянці стегна, в місці забою, утворилася гематома. Укажіть оптимальну лікувальну тактику, що сприятиме розсмоктуванню гематоми.

A. Накладання зігрівального компресу

B. Прикладання міхура з льодом

C. Накладання охолоджувального компресу

D. Застосування гірчичників

E. Імобілізація кінцівки

58. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів

свідчить про розвиток у пацієнта синдрому холестазу?

A. Свербіж шкіри

- B. Тризм жувальних м'язів
- C. Екзофтальм
- D. Шум у вухах
- E. Біль у кістках

59. У жінки віком 28 років після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явилися висипання, що супроводжуються свербіжем, схожі на опіки кропивою. Об'єктивно спостерігається: на шкірі візуалізуються пухирі червоного кольору різних розмірів, температура тіла - 37,05°C, пульс - 78\хв, АТ- 120\80 мм рт. ст. Яка група лікарських засобів використовується для лікування цього патологічного стану?

A. Антигістамінні

- B. Антибіотики
- C. Антациди
- D. Антидепресанти
- E. Антиагреганти

60. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження температури тіла із 39,5°C до 37°C, раптово виникли загальна слабкість, запаморочення, відчуття холоду, серцебиття. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, апатичний, із зусиллям відповідає на запитання. Шкірні покриви та слизові оболонки бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, пульс 98\хв, слабкого наповнення, АТ 80\50 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

A. Колапс

- B. Астматичний статус
- C. Анафілактичний шок
- D. набряк легень
- E. Кардіогенний шок

61. Пацієнтці, яка хворіє на хронічну недостатність кровообігу, для зменшення набряків призначено сечогінні лікарські засоби. Який із нижченаведених методів є найбільш інформативним для оцінки ефективності дії призначених сечогінних препаратів?

A. Визначення водного балансу

- B. Вимірювання артеріального тиску
- C. Підрахунок кількості сечовипускань за добу
- D. Вимірювання нічного діурезу

62. Пацієнтці віком 35 років діагностовано недостатність мітрального клапана. Яке захворювання в анамнезі є однією з основних причин розвитку набутих вад серця?

A. Гостра ревматична гарячка

- B. Грип
- C. Туберкульоз
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Поліомієліт

63. Чоловік віком 35 років після падіння з висоти скаржиться на виражений біль у ділянці правого плеча. Під час об'єктивного обстеження медичний працівник виявив абсолютні об'єктивні ознаки (симптоми) перелому кістки. Укажіть одну з них.

A. Кісткова крепітація

- B. Блідість шкіри
- C. Локальний біль
- D. Гіперемія шкіри
- E. набряк шкіри

64. Пацієнта віком 65 років шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом: неспецифічний виразковий коліт. Яка діагностична процедура найдоцільніша для підтвердження діагнозу?

A. Колоноскопія

- B. Цистоскопія
- C. Фіброгастроскопія
- D. Холецистографія
- E. Лапароскопія

65. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів?

A. Біологічна

- B. Магнітна
- C. Електролітична
- D. Термічна

66. У п'ятирічної дитини упродовж 2-х діб спостерігаються підвищення температури тіла до 38°C, рідкі випорожнення зеленуватого кольору з прожилками крові, часті болючі позиви на випорожнення (тенезми). Живіт під час пальпації болючий, переважно в лівій здухвинній ділянці за ходом сигмоподібної кишки. Для якого інфекційного захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Шигельозу

- B. Ротавірусної інфекції
- C. Лептоспірозу
- D. Сальмонельозу
- E. Холери

67. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри промежини довжиною 1 см, м'язи промежини неушкоджені. Укажіть ступінь розриву промежини.

A. II

- B. IV
- C. I
- D. III

68. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово розвинулася шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігатимуться у разі виникнення цього невідкладного стану?

A. Тахікардія, зниження АТ

- B. Аритмія, АТ не змінюється
- C. Брадикардія, зниження АТ
- D. Тахікардія, підвищення АТ
- E. Брадикардія, підвищення АТ

69. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

A. Гідротубація

- B. Кольпоскопія
- C. Лапароскопія
- D. Пертубація
- E. Гістероскопія

70. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниження фізичної активності. Об'єктивно спостерігається: симетричні згинальні контрактури дрібних суглобів. На рентгенограмі кисті й зап'ястка – ерозії та виражений остеопороз безпосередньо прилеглих до суглоба кісток, анкілоз. Для якого захворювання це характерно?

A. Ревматоїдного артриту

- B. Системного червоного вовчака
- C. Деформуючого остеоартрозу
- D. Системного васкуліту
- E. Ревматичного поліартриту

71. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, утруднення дихання, відчуття страху смерті, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, вкрита холодним потом, дихання часте, поверхневе, пульс - 120/хв, слабкого наповнення, АТ - 70/30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

A. Анафілактичний шок

- B. Напад бронхіальної астми
- C. набряк Квінке
- D. Гіповолемічний шок
- E. Кардіогенний шок

72. Після забору крові з вени для лабораторного дослідження сестра медична сортує використані одноразові вироби медичного призначення за категоріями медичних відходів. До якої категорії медичних відходів належать засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)?

A. B

- B. D
- C. C
- D. E
- E. A

73. Укажіть особливість приймання ферментних препаратів.

A. Під час вживання їжі

- B. Натщесерце
- C. За 2 год до вживання їжі
- D. Через 1 год після вживання їжі
- E. Через 2 год після вживання їжі

74. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рідини в животі. Для якого виду диспепсії характерні ці клінічні прояви?

A. Кишкової (ентерогенної)

- B. Печінкової (гепатобіліарної)

С. Шлункової
D. Панкреатогенної

75. До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу висипань на кистях рук. Після обстеження їй встановлено діагноз: справжня екзема в стадії мокнуття. Яка лікарська форма (форма випуску) препаратів рекомендована для місцевого лікування цього захворювання?

A. Розчин

B. Гель
C. Паста
D. Крем
E. Мазь

76. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом, інколи «повним ротом», задишку, періодичне підвищення температури тіла та зниження працездатності. Мокротиння розшароване, гнійно-слизового характеру. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

A. Бронхоектатичної хвороби

B. Негоспітальної пневмонії
C. Гострого бронхіту
D. Ексудативного плевриту
E. Сухого плевриту

77. Пацієнту в першу добу після травми показане прикладання міхура з льодом до місця ушкодження. Оберіть правильний режим його застосування, щоб уникнути місцевого переохолодження.

A. Кожні 20 хв робити перерву на 10-15 хв

B. Кожні 60 хв робити перерву на 20-30 хв
C. Кожні 5 хв робити перерву на 20-30 хв
D. Кожні 40 хв робити перерву на 10-15 хв

78. Пацієнт віком 56 років скаржиться на появу висипань на відкритих ділянках тіла (долонях, обличчі). Ці прояви турбують його протягом останніх 3-х років. Під час опитування з'ясувалося, що пацієнт працює на хімічному заводі, також він зазначає, що в неробочі дні шкірні симптоми зменшуються. Пацієнту встановлено діагноз: контактний дерматит та рекомендовано оптимізувати умови праці. Який основний шкідливий виробничий фактор потрібно усунути для покращення стану пацієнта?

A. Контакт із фарбами та лаками

B. Вплив холоду та низьких температур
C. Контакт із паперовими матеріалами
D. Роботу на автоматизованій виробничій лінії
E. Вплив ароматизаторів у повітрі робочої зони

79. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, задишку під час фізичних навантажень, відчуття «повзання мурашок» по шкірі та утруднення під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри з лимонним відтінком, іктеричність склер, яскраво-червоний глянцеви́й язик з атрофією сосочків. У крові: гемоглобін - 70 г/л, колірний показник - 1,4, макроцитоз еритроцитів. В анамнезі: атрофічний гастрит. Для якого виду анемії характерні ці клінічні прояви та показники гемограми?

A. Вітамін B12-дефіцитної

B. Постгеморагічної

C. Апластичної

D. Залізодефіцитної

E. Гіпопластичної

80. Пацієнт, у якого триває I стадія гарячки, скаржиться на головний біль, м'язове тремтіння, мерзлякуватість, біль у м'язах, загальне нездужання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, холодна на дотик, набула вигляду «гусячої». Який найпростіший метод фізіотерапії доцільно застосовувати в I стадії гарячки для полегшення стану пацієнта?

A. Застосування медичної грілки

B. Накладання охолоджувального компресу

C. Прикладання міхура з льодом

D. Прикладання мішечків із сухим льодом на ділянку великих судин шиї

E. Застосування гірчичників

81. Укажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

A. Ліва нога

B. Ліва рука

C. Права рука

D. Права нога

82. Під час вимірювання артеріального тиску пацієнтці сестра медична звернула увагу на те, що різниця між систолічним та діастолічним тиском становить 30 мм рт. ст. Як називається цей показник?

A. Пульсовий тиск

B. Систолічний об'єм крові

C. Капілярний пульс

D. Хвилинний об'єм крові

E. Центральний тиск

83. Пацієнта шпиталізовано до лікарні з припущенням на ниркову колику та проведено загальний аналіз сечі. Наявність яких патологічних компонентів у сечі характерна для нападу ниркової колики?

A. Незмінених еритроцитів, кристалів солей

B. Білка, циліндрів

C. Кетонових тіл, глюкози

D. Лейкоцитів, бактерій

E. Білірубіну, уробіліну

84. Пацієнту віком 50 років, у якого триває затяжне і тяжке загострення бронхіальної астми, призначено інгаляційне введення лікарських засобів. Який із нижченаведених пристроїв використовується для забезпечення ефективного введення ліків, спрямовуючи їх безпосередньо у верхні та нижні дихальні шляхи?

A. Небулайзер

B. Пневмотахометр

C. Пікфлоуметр

D. Пульсоксиметр

Е. Спірометр

85. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичною метою призначено спинномозкову пункцію. Який медичний інструмент треба підготувати сестрі медичній для проведення цієї процедури?

А. Голку Біра

- В. Голку Дюфо
- С. Голку Касирського
- Д. Біопсійну голку
- Е. Троакар

86. Який із нижченаведених факторів має найбільший вплив на стан дихальних шляхів і може значно зменшити ризик загострень хронічного бронхіту у пацієнта та покращити його загальне самопочуття?

А. Відмова від тютюнопаління

- В. Нормалізація маси тіла
- С. Зволоження повітря в приміщенні
- Д. Використання засобів для чищення повітря
- Е. Підвищення фізичної активності

87. Пацієнтка, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність, скаржиться на наростаючу задишку під час звичайних фізичних навантажень, часте серцебиття, підвищену втомлюваність та знижену працездатність. Добовий діурез становить 400 мл. На якій частині тіла насамперед виникатимуть набряки у пацієнтки?

А. Нижніх кінцівок

- В. Обличчі
- С. Кистях рук
- Д. Животі
- Е. Поперековій ділянці

88. Сестра медична, виконуючи призначення лікаря, вводить лікарський засіб пацієнту внутрішньом'язово. Укажіть рекомендовану швидкість введення ін'єкційного розчину в м'яз для оптимального розподілу препарату в тканинах та мінімізації ризику ускладнень.

А. 1 мл за 10 с

- В. 0,5 мл за 5 с
- С. 1 мл за 1 с
- Д. 1 мл за 5 с
- Е. 0,5 мл за 10 с

89. Як називається метод інвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

А. Спірографія

- В. Шкірні алергологічні тести
- С. Бронхоскопія
- Д. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- Е. УЗД легенів

90. Операційна сестра медична комплектує стерилізаційний бікс та укладає все необхідне

(операційну білизну, халати, перев'язувальний матеріал та ін.) для роботи перев'язувального кабінету або малої операційної протягом одного робочого дня. Як називається такий вид укладки?

- A. Універсальна
- B. Видова
- C. Цілеспрямована
- D. Спеціалізована

91. П'ятирічна дитина каталась на самокаті і впала. На місці забою виникла гематома, без пошкодження шкірних покривів. Які дії зменшать зону крововиливу?

- A. Застосування міхура з льодом
- B. Застосування гірчичників
- C. Накладання зігрівального компресу
- D. Прикладання медичної грілки

92. У пацієнтки напад бронхіальної астми минув після застосування інгаляційного глюкокортикоїдного препарату та завершився виділенням в'язкого мокротиння. Укажіть характер мокротиння в цьому разі.

- A. Склоподібне
- B. Гнійне
- C. У вигляді «малинового желе»
- D. Із прожилками крові
- E. «Іржаве»

93. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий інтенсивний біль у поперековій ділянці, що іррадіює в промежину і статеві органи, супроводжується нудотою та частими позивами до сечовипускання. Біль з'явився після тривалої тряскої їзди. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка перебуває у стані психомоторного збудження, шкіра бліда, надмірно волога, пульс частий і слабкий. У загальному аналізі сечі: свіжі еритроцити та кристали солей. Для якого патологічного стану характерні вказані клінічні прояви?

- A. Ниркової коліки
- B. Гострого аднекситу
- C. Перитоніту
- D. Жовчної (печінкової) коліки
- E. Гострого апендициту

94. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість та біль у правій половині тулуба. Під час огляду на шкірі грудної клітки виявлено множинні пухирці із серозним вмістом, розташовані групами вздовж VII ребра в міжреберному проміжку. Для якого з нижченаведених захворювань характерні вказані симптоми?

- A. Оперізувального герпесу
- B. Токсикодермії
- C. Справжньої екземи
- D. Простого герпесу
- E. Імпетиго

95. Чоловік віком 49 років скаржиться на біль у грудній клітці та утруднене дихання. Після первинного обстеження встановлено попередній діагноз: ексудативний плеврит. Яка діагностична процедура найдоцільніша для підтвердження діагнозу та подальшого

планування лікування?

A. Торакоцентез

B. Стернальна пункція

C. Бронхоскопія

D. Спірометрія

E. Абдомінальна пункція

96. У пацієнта терапевтичного відділення під час об'єктивного обстеження виявлено випинання надключичних ямок. Перкуторно над легенями визначається коробковий звук. Аускультативно вислуховується жорстке дихання та сухі свистячі хрипи на видиху. Для якого захворювання характерні ці результати об'єктивного обстеження?

A. Бронхіальної астми

B. Ексудативного плевриту

C. Раку легень

D. Пневмонії

E. Гострого бронхіту

97. У пацієнта, який хворіє на рак легень, розвинулася легенева кровотеча. Медична сестра надає йому долікарську допомогу. Яке положення тіла потрібно забезпечити пацієнту, надаючи долікарську допомогу?

A. Високе Фаулера

B. Лежачи на животі

C. Гренделенбурга

D. Низьке Фаулера

E. Сімса

98. Для якого захворювання нирок характерний такий симптомокомплекс: підвищення артеріального тиску, олігурія, набряки?

A. Гострого гломерулонефриту

B. Сечокам'яної хвороби

C. Хронічного пієлонефриту

D. Гострої ниркової недостатності

E. Хронічної ниркової недостатності

99. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на задишку, колючий біль та відчуття скутості в грудній клітці, кашель із виділенням гнійного мокротиння, загальну слабкість. З анамнезу відомо, що пацієнт довгий час працює у гірничорудній промисловості з видобутку корисних копалин, що залягають у породі, яка містить кварц. Об'єктивно спостерігається: температура тіла 37,2°C, ЧД – 26\хв, пульс 90\хв, АТ 130\80 мм рт. ст. Перкуторно у легенях визначаються ділянки коробкового та притупленого звуку. Аускультативно вислуховується ослаблене везикулярне дихання та дрібнопухирчасті вологі хрипи. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

A. Силікозу

B. Пневмонії

C. Антракозу

D. Сухого плевриту

E. Гострого бронхіту

100. До гастроентеролога звернулася пацієнтка віком 65 років, яка довгий час хворіє на

виразкову хворобу шлунка. Пацієнтка скаржиться на відчуття розпирання і тяжкості в ділянці шлунка, відрижку, що виникає після вживання м'ясної їжі, загальну слабкість і швидку втомлюваність, значне зниження маси тіла (за два місяці - на 10 кг). У периферичній крові виявлено ознаки анемії. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

A. Раку шлунка

B. Гострого гастроентероколіту

C. Хронічного холециститу

D. Раку нирки

E. Гострого панкреатиту

101. Для зменшення інтенсивності спастичного болю, що супроводжує перебіг хронічного холециститу, пацієнту рекомендовано використання медичної грілки. Якою має бути температура води для заповнення грілки в цьому разі?

A. 60°C

B. 80°C

C. 40°C

D. 90°C

E. 50°C

102. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної обробки рук перед виконанням внутрішньовенної ін'єкції?

A. 3 мл

B. 6 мл

C. 5 мл

D. 1 мл

E. 9 мл

103. Укажіть дозволений максимальний відсоток заповнення ємності (коробки безпечного зберігання) для медичних відходів категорії B.

A. 75%

B. 55%

C. 50%

D. 45%

E. 60%

104. Жінка віком 19 років, яка перебуває на 37-му тижні вагітності, цікавиться методом епідуральної аналгезії для полегшення болю під час фізіологічних пологів. Проінформуйте жінку щодо можливих наслідків, які можуть виникнути у разі застосування цього методу знеболювання.

A. Подовження другого періоду пологів

B. Негативний вплив на серцебиття плода

C. Гіперстимуляція яєчників

D. Збільшення ризику розвитку прееклампсії

E. Збільшення ризику розвитку еклампсії

105. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього патологічного стану?

A. Червоний

- В. Прозорий
- С. Безбарвний
- Д. Жовтувато-зеленуватий
- Е. Каламутний

106. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: «маскоподібне обличчя», кисетоподібні складки навколо рота, синдром Рейно?

А. Системної склеродермії

- В. Ревматоїдного артриту
- С. Гострої ревматичної гарячки
- Д. Червоного системного вовчака
- Е. Вузликового періартеріїту

107. Укажіть групу лікарських засобів, що використовується у лікуванні пацієнтів, які хворіють на атеросклероз, з метою зниження рівня холестерину в крові та нормалізації ліпідного профілю.

А. Статини

- В. β -адреноблокатори
- С. Антикоагулянти
- Д. Інгібітори АПФ
- Е. Антиагреганти

108. В якому терміні вагітності доцільно шпиталізувати жінку до акушерського закладу охорони здоров'я для попередження переношування вагітності, за умови неускладненого її перебігу?

А. 42 тижні

- В. 37 тижнів
- С. 35 тижнів
- Д. 39 тижнів
- Е. 41 тиждень

109. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність сухого кашлю і прогресуючої задишки?

А. Астматичного

- В. Гастралгічного
- С. Аритмічного
- Д. Церебрального
- Е. Ангінозного

110. Пацієнту, згідно з призначенням лікаря-отоларинголога, вводять лікарський засіб у зовнішній слуховий прохід шляхом закрапування крапель. Яким чином можна забезпечити пролонгацію дії препарату?

А. Ввести в слуховий прохід турунду, змочену лікарським засобом

- В. Утримувати голову пацієнта нахиленою вбік протягом 30 хв
- С. Прикласти зігрівальний компрес до вушної ділянки
- Д. Провести гігієнічну санацію зовнішнього слухового проходу
- Е. Забезпечити горизонтальне положення пацієнту упродовж 2-х год

111. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та

ранньої діагностики стенокардії?

A. Велоергометрія

B. Спірографія

C. Нейроміографія

D. Енцефалографія

E. Аудіометрія

112. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується у II періоді гарячки для полегшення стану пацієнта?

A. Міхур із льодом

B. Медичні банки

C. Гірчичники

D. Медична грілка

E. Зігрівальний компрес

113. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Укажіть метод, спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

A. Механотерапія

B. Міостимуляція

C. Вакуумний масаж

D. Пневмопресинг

E. Вісцеральна терапія

114. Пацієнту після гастректомії в післяопераційному періоді призначено парентеральне харчування. Який спосіб введення білкових розчинів потрібно обрати в цьому разі?

A. Внутрішньовенний

B. Ректальний

C. Пероральний

D. Внутрішньом'язовий

E. Інгаляційний

115. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігастрії з'являється натщесерце, вночі або через 3-4 год після останнього вживання їжі та зникає навіть після незначного вживання будь-яких продуктів харчування?

A. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

B. Хронічного холециститу

C. Хронічного панкреатиту

D. Виразкової хвороби шлунка

E. Хронічного атрофічного гастриту

116. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс 110\хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

A. Психотравма

B. Порушення дієти

C. Шкідливі звички

D. Переохолодження

E. Куріння

117. Для механічного видалення (вимивання) сірчаної пробки з вуха пацієнта необхідно підготувати оснащення, що включає: шприц Жане, лоток, стерильні марлеві серветки та 0,02% р-н фурациліну. Який із нижченаведених станів є протипоказанням до проведення процедури механічного вимивання сірчаної пробки?

A. Перфорація барабанної перетинки

B. Опік вушної раковини

C. Зовнішній отит

D. Відмороження вушної раковини

E. Звуження слухових проходів

118. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилюється біль у серці, виникла різка слабкість. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, акроціаноз, холодний липкий піт, АТ -70/30 мм рт. ст., пульс - 110/хв, слабкого наповнення. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

A. Кардіогенний шок

B. Нестабільна стенокардія

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Набряк легень

E. Серцева астма

119. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель з виділенням гнійного з неприємним запахом мокротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A. Абсцесу легень

B. Вогнищевої пневмонії

C. Гострого бронхіту

D. Пневмосклерозу

E. Раку легень

120. Чоловіка вкусив пес, який, імовірно, був хворий на сказ. Який із нижченаведених симптомів може спостерігатися у пацієнта вже в продромальному періоді захворювання?

A. Гіперестезії

B. Гіперсалівація

C. Аерофобія

D. Фотофобія

E. Паралічі

121. Яку процедуру потрібно провести медичному працівнику після контакту з потенційно інфікованим матеріалом та зняття медичних рукавичок?

A. Миття рук із милом

B. Хірургічну обробку рук

C. Висушування рук

D. Гігієнічну обробку рук

122. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно заповнити для обліку цього захворювання?

A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

B. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів

C. Медичну карту стаціонарного хворого

D. Контрольну карту диспансерного нагляду

123. Упродовж скількох діб допускається заповнення контейнерів для небезпечно гострих медичних відходів категорії B?

A. 3-х

B. 14-ти

C. 6-ти

D. 10-ти

E. 5-ти

124. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика групи цефалоспоринів III покоління. У флаконі міститься 1000 мг діючої речовини. Скільки мілілітрів розчину антибіотика потрібно ввести дитині, якщо застосувати стандартне розведення?

A. 3,5 мл

B. 35 мл

C. 1,5 мл

D. 10 мл

E. 5 мл

125. Вагітна жінка віком 25 років перебуває на обліку в жіночій консультації. Вагітність перша, протікає без ускладнень. На 38-му тижні вагітності, вона помітила, що зі статевих шляхів відійшов згусток в'язкого тягучого слизу, і негайно звернулася до жіночої консультації. Укажіть подальшу тактику ведення цієї пацієнтки.

A. Порекомендувати продовжити планові візити до жіночої консультації до настання пологів

B. Виписати направлення для шпиталізації до хірургічного відділення

C. Завених перекування в денному стаціонарі

D. Спостерігати за станом вагітної жінки в оглядовому кабінеті впродовж години

126. У пацієнтки віком 52 роки після фізичного навантаження виник напад стенокардії. Який основний клінічний прояв цього захворювання?

A. Стискальний біль за грудниною

B. Експіраторна задишка

C. Набряки на нижніх кінцівках

D. Кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння

E. Інспіраторна задишка

127. Пацієнту віком 38 років встановлено діагноз: гостра кропив'янка. Який симптом найхарактерніший для цього захворювання?

A. Свербіж шкіри

B. Мерзлякуватість

C. Сльозотеча

D. Ціаноз шкіри

E. Іктеричність шкіри

128. Укажіть період пологів, який починається з моменту повного розкриття шийки матки і

закінчується народженням плоду через природні пологові шляхи.

A. Другий

B. Третій

C. Четвертий

D. Перший

129. Пацієнту віком 37 років встановлено попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба. Який рентгенологічний метод дослідження застосовується для оцінки стану жовчного міхура та виявлення патологічних змін у ньому з використанням контрастної речовини?

A. Холецистографія

B. Цистографія

C. Гастрографія

D. Урографія

130. Який метод лікування доцільно запропонувати пацієнтці з неускладненою формою жовчнокам'яної хвороби, у якої під час обстеження виявлено одиничні невеликі холестеринові камені в жовчному міхурі, придатні для руйнування без ризику обструкції?

A. Ударно-хвильову літотрипсію

B. Електрофорез жовчного міхура з магнію сульфатом

C. Гепатопротекторну терапію

D. Холецистектомію

E. Жовчогінну терапію

131. Пацієнт відчув раптовий біль та стиснення у грудях. Сестра медична, надаючи невідкладну допомогу, звільнила його від тиснучого одягу, порекомендувала прийняти під язик таблетку нітрогліцерину, викликала лікаря. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

A. Напад стенокардії

B. Напад бронхіальної астми

C. Колапс

D. Кардіогенний шок

E. Гіпертензивний криз

132. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягнути поршень шприца назад після проколу шкіри перед введенням препарату?

A. Медикаментозної емболії

B. Некрозу

C. Повітряної емболії

D. Гематоми

E. Інфільтрату

133. Які лікарські засоби найчастіше викликають медикаментозну алергію?

A. Антибіотики

B. Ентеросорбенти

C. Сечогінні

D. Гіпотензивні

E. Проносні

134. Жінка віком 20 років скаржиться на сильний переймоподібний біль унизу живота та

попереку, кров'яністі виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після падіння. Із анамнезу відомо, що остання менструація була 4 місяці тому. Порушення менструального циклу та гінекологічні захворювання в минулому заперечує, статеве життя регулярне, без контрацепції. Об'єктивно спостерігається: дно матки визначається посередині між лобковим симфізом та пупком, матка в гіпертонусі. Виділення зі статевих шляхів кров'яністі, значні, зі згустками. Який паталогічний стан, найімовірніше, розвинувся в жінки?

A. Аборт у ходу

B. Альгодисменорея

C. Передчасні пологи

D. Загроза переривання вагітності

E. Апоплексія яєчника

135. У пацієнта раптово підвищилася температура тіла, з'явилася болючість шкіри. З анамнезу відомо, що він приймає антибіотики. Під час об'єктивного обстеження на шкірі тулуба виявлено множинні бульозні елементи та яскраво-червоні ерозії. Також спостерігається позитивний симптом Нікольського. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

A. Токсичного епідермального некролізу

B. Алергійного контактного дерматиту

C. Фіксованої медикаментозної еритеми

D. Герпетиформного дерматиту Дюрінга

E. Простого контактного дерматиту

136. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути у пацієнта під час внутрішньовенного введення 1%-го розчину нікотинової кислоти.

A. Відчуття жару в тілі

B. Сонливість

C. Порушення зору

D. Закреп

E. Брадикардія

137. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток цієї патології?

A. Запах аміаку з рота

B. Гіперемія шкірних покривів

C. Підвищення апетиту

D. Підвищення температури тіла

E. Збільшення лімфатичних вузлів

138. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа). Які зміни в загальному аналізі крові є найхарактернішими для цього захворювання?

A. Тромбоцитопенія

B. Ретикулоцитопенія

C. Еозинофілія

D. Лейкопенія

E. Еритроцитоз

139. У жінки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну з'явилися загальна слабкість, головний біль, відчуття голоду, тривожність, пітливість, тремтіння рук.

Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, пульс — 92\хв, ритмічний, АТ - 100\60 мм рт. ст. Укажіть заходи до-медичної допомоги в цьому разі.

A. Дати вжити глюкозовмісні харчові продукти (воду з цукром, грудочку цукру, сік)

B. Увести інсулін

C. Надати пацієнтці горизонтальне положення та підняти ноги вище рівня голови

D. Увести кордіамін

E. Провести інгаляцію киснем

140. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападоподібний біль у ділянці правого підребер'я, що іррадіює в праву ключицю та плече, гіркоту в роті, нудоту, блювання жовчю. В анамнезі: жовчнокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, іктеричність склер та шкірних покривів, пульс - 82\хв, ритмічний, АТ - 110\70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

A. Печінкова коліка

B. Ниркова коліка

C. Гострий гастрит

D. Кишкова коліка

E. Гострий панкреатит

141. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: хронічний пієлонефрит. Яка з нижченаведених лікарських рослин має сечогінні властивості та може використовуватися як фітотерапевтичний засіб для лікування інфекцій сечовивідних шляхів?

A. Хвощ польовий

B. Ехінацея пурпурова

C. Меліса лікарська

D. Мати-й-мачуха

142. У пацієнта віком 45 років під час огляду та об'єктивного обстеження виявлено збільшення розмірів щитоподібної залози. Укажіть основний метод дослідження, що проводиться для визначення її функції.

A. Аналіз крові на тиреоїдні гормони

B. Аналіз крові на глюкозу

C. Загальноклінічний аналіз сечі

D. УЗД щитоподібної залози

143. Для якого ендокринного захворювання характерна поява у пацієнта таких очних симптомів: екзофтальм, рідке моргання (симптом Штельвага), відставання верхньої повіки від райдужки під час переведення погляду вгору (симптом Грефе), блиск очей (симптом Крауса)?

A. Дифузного токсичного зоба

B. Нецукрового діабету

C. Гіпотиреозу

D. Цукрового діабету

144. Сестра медична інструктує пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму, щодо користування індивідуальним аерозольним інгалятором. Яку дію має виконати пацієнт перед тим, як натиснути на дно інгалятора і вдихнути лікарський засіб, щоб забезпечити його кращу ефективність?

A. Глибокий видих (поза інгалятор)

B. Зайняти горизонтальне положення

С. Очистити носову порожнину

Д. Глибокий вдих

145. У пацієнта після проведення скарифікаційної шкірної проби через 15 хв у місці нанесення алергену утворилася папула діаметром 5 мм, оточена ділянкою гіперемії. Проаналізуйте результат проби.

А. Позитивна

В. Сумнівна

С. Негативна

Д. Гіперергічна

146. Медичний працівник проводить запис електрокардіограми пацієнту, в якого виник напад стенокардії, та виконує послідовний аналіз отриманих параметрів. Які зубці на ЕКГ в нормі є завжди негативними (від'ємними)?

А. Q та S

В. R та P

С. P та T

Д. R та T

147. Пацієнт звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на сльозотечу, почервоніння очей та відчуття стороннього тіла («піску» в очах). Лікар встановив діагноз: кон'юнктивіт та призначив закрапувати в очі два лікарські засоби. Який оптимальний інтервал потрібно витримувати між застосуванням препаратів для ефективного лікування?

А. 10-15 хв

В. 30 хв

С. 60 хв

Д. 1-2 хв

148. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата досягла 500 мл і продовжується. Пацієнтка скаржиться на слабкість, пітливість. Об'єктивно спостерігається: слизові оболонки бліді, пульс - 95\хв, слабкого наповнення, АТ - 100\60 мм рт.ст. Під час пальпації матки через передню черевну стінку визначається, що вона щільна, дно розташоване на рівні пупка. Укажіть причину вторинної (пізньої) післяпологової кровотечі.

А. Порушення згортальної системи крові

В. Розрив матки

С. Розрив промежини

Д. Розрив шийки матки

149. Під час догляду за пацієнтом, який хворіє на інфекційне захворювання, медичний працівник поєднує декілька засобів індивідуального захисту. Який предмет індивідуального захисту потрібно одягати останнім?

А. Рукавички

В. Хірургічний костюм

С. Маску

Д. Захисні окуляри

150. Пацієнту терапевтичного відділення з діагностичною метою проводять дуоденальне зондування. На етапі отримання жовчі порції В йому прикладають медичну грілку під праве

підребер'я. Яка основна мета її застосування в цьому разі?

A. Розширення жовчних протоків для покращення відтоку жовчі

B. Зменшення чутливості в ділянці правого підребер'я

C. Зігрівання пацієнта для покращення загального стану

D. Звуження кровоносних судин для запобігання кровотечі

151. Під час лабораторного дослідження мокротиння пацієнта виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена та еозинофіли. Для якого захворювання характерні такі лабораторні зміни в аналізі мокротиння?

A. Бронхіальної астми

B. Бронхоектатичної хвороби

C. Сухого плевриту

D. Гострого бронхіту

152. Укажіть основний синдром, що характерний для перебігу початкового періоду скарлатини.

A. Інтоксикаційний

B. Бронхообструктивний

C. Менінгеальний

D. Геморагічний

153. У пацієнта, який хворіє на рак легень, раптово, під час кашлю розпочалося виділення пінистої яскраво-червоної крові з рота. Які заходи долікарської допомоги доцільно розпочати негайно?

A. Застосувати помірне охолодження грудної клітки

B. Прикласти грілку на грудну клітку

C. Промити шлунок

D. Провести сліпе зондування

154. Укажіть порушення діурезу, що характеризується зменшенням добової кількості сечі.

A. Олігурія

B. Дизурія

C. Поліурія

D. Ніктурія

155. Як називається індивідуальна упаковка, що безпосередньо контактує з лікарським засобом та сприяє збереженню його основних властивостей?

A. Первинна

B. Спеціальна

C. Вторинна

D. Зовнішня

156. Пацієнту призначено фізіотерапевтичну процедуру, під час якої (внаслідок змінення проникності судинної стінки) у шкірі виникають точкові мікрокрововиливи (петехії, плями), до складу яких входять біологічно активні речовини, що надають потужний стимулювальний ефект як на весь організм, так і на певну зону до повного їх розсмоктування. Яку процедуру призначено пацієнту?

A. Вакуум-терапію медичними банками

B. Застосування медичної грілки

C. Накладання зігрівального компресу

D. УВЧ-терапію

157. Пацієнту для лікування геморою призначено ректальне введення супозиторіїв із новокаїном. Укажіть особливості умов зберігання супозиторіїв.

A. За температури повітря не вище ніж 25°C

B. У сухому темному місці

C. В окремій шафі

D. У приміщенні з витяжною вентиляцією

158. Під час операції на неушкоджену шкіру сестри медичної, яка асистує лікарю, потрапила кров. Укажіть засіб, яким необхідно промити шкіру в цьому разі.

A. Водою з милом

B. Дезінфікуючим розчином

C. Етиловим спиртом

D. Фізіологічним розчином

159. Для діагностики якого захворювання використовується реакція Ваалера-Роуза?

A. Ревматоїдного артрити

B. Деформуючого остеоартрозу

C. Дерматоміозиту

D. Системного червоного вовчака

160. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гострий початок, слабо виражені катаральні явища, дрібний блідо-рожевий плямисто-папульозний висип, без тенденції до злиття, з переважною локалізацією на спині, сідницях та розгинальних поверхнях верхніх кінцівок, системне збільшення лімфатичних вузлів?

A. Краснухи

B. Менінгококової інфекції

C. Скарлатини

D. Вітряної віспи

161. Жінка отримала опік передньої поверхні обох ніг, задньої поверхні тулуба та промежини. Визначте площу опікового ураження за «правилом дев'яток».

A. 37%

B. 19%

C. 51%

D. 39%

162. У якому періоді менструального циклу найчастіше виникає апоплексія яєчника?

A. У період овуляції

B. У фолікуліновій фазі

C. У період регресу жовтого тіла

D. У період менструації

163. Щеплення новонароджених дітей від туберкульозу проводиться шляхом внутрішньошкірного введення вакцини БЦЖ. Яке ускладнення розвивається у разі випадкового потрапляння вакцини під шкіру?

A. «Холодний абсцес»

B. Інфільтрат

C. Олійна емболія

D. Виразка

164. Розвиток якого патологічного стану вказує на те, що в пацієнта триває III стадія артеріальної гіпертензії?

A. Ниркової недостатності

B. Печінкової недостатності

C. Діабетичної нефропатії

D. Дихальної недостатності

165. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль у першому плесно-фаланговому суглобі, що виник уночі. Об'єктивно спостерігається: уражений суглоб набряклий, гіперемований, гарячий на дотик, рухи в ньому обмежені. У крові виявлено високий рівень сечової кислоти. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

A. Подагри

B. Ревматоїдного артрити

C. Панарицію

D. Первинного кокс артрозу

166. Споживання продуктів зі збагаченим вмістом якого мікроелемента потрібно порекомендувати пацієнту, який хворіє на хронічну серцеву недостатність?

A. Калію

B. Натрію

C. Заліза

D. Цинку

167. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, утруднення дихання, відчуття страху смерті, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, вкрита холодним потом, дихання часте, поверхневе, пульс — 120\хв, слабкого наповнення, АТ — 70\30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

A. Анафілактичний шок

B. Напад бронхіальної астми

C. Кардіогенний шок

D. Гіповолемічний шок

168. Дорослому пацієнту встановлено діагноз: бронхіальна астма. Який шлях введення ліків має перевагу під час надання невідкладної допомоги пацієнту у разі нападу бронхіальної астми?

A. Інгаляційний

B. Ректальний

C. Ін'єкційний

D. Ентеральний

169. У пульмонологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: бронхоектатична хвороба. Який метод фізіотерапії використовується для покращення відходження слизу та мокротиння з дихальних шляхів?

A. Постуральний дренаж

B. Фонофорез

- C. Кріотерапія
- D. Парафінові аплікації

170. Яке співвідношення розчинника та активної речовини антибіотика використовується у разі стандартного розведення антибіотика?

- A. 1 мл на 100 000 ОД
- B. 5 мл на 100 000 ОД
- C. 1 мл на 500 000 ОД
- D. 2 мл на 200 000 ОД

171. У пацієнтки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після випадкового передозування інсуліну виникло відчуття голоду, з'явилися різка слабкість, запаморочення, занепокоєння, тремтіння рук, підвищене потовиділення, прискорене серцебиття. Свідомість збережена. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнтці насамперед?

- A. Запропонувати вжити прості вуглеводи (цукор, солодку воду)
- B. Запропонувати прийняти 15-20 крапель корвалолу
- C. Увести інсулін підшкірно
- D. Застосувати нітрогліцерин сублінгвально

172. Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хронічного пієлонефриту?

- A. Антибактеріальні
- B. Антитромботичні
- C. Антигістамінні
- D. Діуретики

173. Укажіть найінформативніший метод діагностики набутих вад серця.

- A. Ехокардіографія
- B. Реовазографія
- C. Ангіографія
- D. Пульсоксиметрія

174. Який із нижченаведених фізіотерапевтичних засобів місцевого впливу можна використати для допомоги пацієнту, в якого триває друга стадія гарячки?

- A. Міхур із льодом
- B. Зігрівальний компрес
- C. Медичну грілку
- D. Гірчичники

175. Роділля, у якої триває другий період пологів, відчула різкий біль у ділянці дна матки. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, АТ — 90/60 мм рт. ст., пульс — 96/хв, матка в гіпертонусі, різко болюча, у ділянці її дна пальпується випинання. Положення плода поздовжнє, голівка розташована в порожнині малого таза, серцебиття плода – 180/хв., приглушене, аритмічне. Укажіть подальшу тактику ведення пологів.

- A. Накладання акушерських щипців
- B. Стимуляція пологової діяльності
- C. Кесарів розтин
- D. Плороруйнівна операція

176. Сестрі медичній у приміщеннях для зберігання лікарських засобів потрібно стежити за певними параметрами та щоденно фіксувати отримані дані у відповідній документації. Укажіть ці параметри.

- A. Температура та вологість повітря
- B. Терміни придатності лікарських засобів
- C. Яскравість природного та штучного освітлення
- D. Справність сигналізації та камер відео- спостереження

177. Старша сестра медична інструктує своїх підлеглих щодо правил гігієни рук. Який тип нагадування на робочому місці є найефективнішим для активізації уваги?

- A. Інформаційні плакати
- B. Аудіоповідомлення
- C. Накази
- D. Санбюлетні

178. Укажіть місце накладання електрода із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- A. Ліва нога
- B. Права нога
- C. Ліва рука
- D. Права рука

179. У роділлі триває латентна фаза першого періоду фізіологічних пологів. Пологи I, вагітність II, термін вагітності — 38 тижнів. Укажіть сучасний безпечний метод функціональної діагностики, який застосовується для одночасного динамічного спостереження за внутрішньоутробним станом плода та скоротливою здатністю матки.

- A. Кардіотокографія
- B. Електроміографія
- C. Ультрасонографія
- D. Електрокардіографія

180. У гастроентерологічному відділенні лікується пацієнт із діагнозом: виразкова хвороба шлунка. Які лікарські засоби пригнічують секрецію шлункового соку?

- A. Інгібітори протонної помпи
- B. Антибактеріальні
- C. Антигістамінні
- D. Нестероїдні протизапальні

181. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, головний біль та різкий розпирюючий біль у ділянці задньої поверхні шиї. Об'єктивно спостерігається: на ураженій ділянці шиї візуалізується щільний інфільтрат темно-червоного кольору, діаметром 7-8 см, різко болючий під час пальпації, вкритий дрібними множинними отворами, із яких виділяється гнійна рідина (симптом «сита»). Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- A. Карбункул
- B. Бешиха
- C. Гідраденіт
- D. Фурункульоз

182. Пацієнт віком 14 років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,6°C, пітливість,

головний біль, загальну слабкість. В анамнезі: контакт із хворим на туберкульоз. У крові: лімфоцитоз, підвищення ШОЕ. Виявлено віраж туберкулінових проб. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

A. Первинна туберкульозна інтоксикація

B. Міліарний туберкульоз

C. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

D. Первинний туберкульозний комплекс

183. Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий нападоподібний біль у поперековій ділянці з правого боку, що іррадіює в статеві органи та праве бедро, часте болюче сечовипускання, нудоту, блювання. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, шкіра бліда, волога, температура тіла — 36,7°C, пульс — 92\хв, АТ— 100\60 мм рт. ст., симптом Пастернацького — позитивний праворуч. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнту насамперед на догоспітальному етапі?

A. Прикласти грілку на поперекову ділянку

B. Прикласти холодний компрес на поперекову ділянку

C. Промити шлунок

D. Провести катетеризацію сечового міхура

184. У пацієнтки перебіг цукрового діабету ускладнився розвитком синдрому діабетичної стопи. Які поради по догляду за нижніми кінцівками необхідно надати пацієнтці?

A. Не ходити босоніж

B. Приймати гарячі ванни для ніг

C. Користуватися пемзою

D. Носити відкрите взуття

185. Пацієнту призначено підшкірне введення олійного розчину. Які дії має виконати сестра медична для попередження розвитку медикаментозної емболії під час виконання ін'єкції?

A. Перевірити, чи не потрапила голка в просвіт кровоносної судини

B. Промасажувати місце ін'єкції стерильною ватною кулькою

C. Змінювати місце ін'єкцій

D. Дотримуватися правил асептики

186. У пацієнта розвинувся ангіоневротичний набряк. Лікарські засоби якої фармакологічної групи потрібно застосовувати для надання невідкладної допомоги пацієнту?

A. Антигістамінні

B. Анальгетики

C. Антациди

D. Антибіотики

187. Чоловіку віком 40 років встановлено попередній діагноз: геморагічний інсульт. У якому положенні потрібно транспортувати пацієнта до стаціонару?

A. На спині, з припіднятою головою

B. Сидячи

C. На спині, з припіднятими нижніми кінцівками

D. На животі, з підкладеним під грудну клітку валиком

188. Пацієнт скаржиться на розпираючий біль унизу живота та неспроможність самостійно спорожнити сечовий міхур упродовж 10-ти годин. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. Укажіть

заходи невідкладної допомоги пацієнту в цьому разі.

A. Катетеризація сечового міхура

B. Обмеження вживання рідини

C. Літотрепсія (дроблення каменів у нирках)

D. Прикладання міхура з льодом на низ живота

189. У пацієнта спостерігаються клінічні прояви харчової алергії. Яке з нижченаведених досліджень є найінформативнішим для встановлення причини алергії?

A. Шкірна скарифікаційна проба

B. Біохімічний аналіз крові

C. Загальний аналіз крові

D. Біопсія шкіри

190. Який вид пов'язки використовується для фіксації кінцівки у разі перелому ключиці без зсуву уламків?

A. Дезо

B. Т-подібна

C. Циркулярна

D. Колосоподібна

191. У породіллі через тиждень після пологів підвищилася температура тіла до 39°C, з'явилися біль унизу живота, озноб, нудота, головний біль. Під час гінекологічного дослідження виявляються гнійні виділення з цервікального каналу, потовщення, набряки та біль у ділянці придатків матки. Яке захворювання розвинулося в жінки?

A. Сальпінгоофорит

B. Ендометрит

C. Перитоніт

D. Лохіометра

192. Роділлю проінформовано про активне ведення третього періоду фізіологічних пологів, що передбачає введення утеротоніків — 10 ОД окситоцину. Який шлях його введення в цьому разі?

A. Внутрішньом'язово

B. Ректально

C. Внутрішньошкірно

D. Підшкірно

193. Дорослому пацієнту проведено внутрішньошкірну пробу Манту. На 3-тю добу в місці ін'єкції з'явилася папула діаметром 7 мм. Інтерпретуйте результат проби.

A. Позитивна

B. Сумнівна

C. Гіперергічна

D. Негативна

194. Пацієнтці віком 42 років встановлено діагноз: варикозна хвороба нижніх кінцівок. Укажіть найчастіше ускладнення цього захворювання.

A. Тромбофлебіт

B. Параліч

C. Кардіосклероз

D. Системна склеродермія

195. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність сухого кашлю та прогресуючої задишки?

A. Астматичного

B. Аритмічного

C. Гастралгічного

D. Церебрального

196. Під яким кутом потрібно ввести голку інсулінового шприца в підшкірно-жирову клітковину, якщо її довжина 10 мм?

A. 90°

B. 40°

C. 45°

D. 15°

197. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігастрії з'являється натщесерце, вночі або через 3-4 год після останнього вживання їжі та зникає навіть після незначного вживання будь-яких продуктів харчування?

A. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

B. Хронічного холециститу

C. Хронічного атрофічного гастриту

D. Хронічного панкреатиту

198. Який метод діагностики використовується для визначення прохідності вінцевих артерій?

A. Коронарографія

B. Пневмотахометрія

C. Електроенцефалографія

D. Електрокардіографія

199. Укажіть найнебезпечніше ускладнення, що може розвинути в пацієнта під час блювання.

A. Аспірація шлункового вмісту

B. Метеоризм

C. Відрижка шлунковим вмістом

D. Відрижка повітрям

200. Який із нижченаведених чинників сприяє розвитку виразкової хвороби?

A. Стрес

B. Алергени

C. Переохолодження

D. Молодий вік

201. Пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні в травматологічному відділенні у зв'язку з переломом верхньої кінцівки. Укажіть правильну послідовність одягання натільної білизни (сорочки) на пацієнта в цьому разі.

A. Спочатку на хвору руку, потім через голову, далі на здорову руку і розправити

B. Через голову, потім на здорову руку, далі на хвору руку і розправити

C. Спочатку на здорову руку, потім на хвору руку, далі через голову і розправити

D. Спочатку на хвору руку, потім на здорову руку, далі через голову і розправити

202. Який режим фізичної активності необхідно забезпечити пацієнту, в якого спостерігається активна фаза перебігу хронічного пієлонефриту (температура тіла — 39,0°C, слабкість, біль у поперековій ділянці тощо)?

- A. Ліжковий
- B. Палатний
- C. Кімнатний
- D. Активний

203. Укажіть місце перебування породіллі упродовж найближчих двох годин після завершення фізіологічних пологів.

- A. У пологовій залі
- B. У відділенні екстрагенітальної патології
- C. У гінекологічному відділенні
- D. У післяпологовому відділенні

204. Пацієнту з дихальною недостатністю призначено інгаляції кисню в об'ємі понад 5 л/хв. Які дії потрібно виконати для уникнення висушування слизової оболонки рота та дихальних шляхів?

- A. Зволожити кисень
- B. Регулювати редуктор
- C. Обробити кисневий катетер олійним розчином
- D. Підняти головний кінець ліжка

205. У пацієнта, який довгий час хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, спостерігається зміна симптоматики: біль у животі став оперізувальним постійним, інтенсивним, припинив залежати від уживання їжі. Яке ускладнення основного захворювання, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- A. Пенетрація
- B. Перфорація
- C. Ахалазія кардії
- D. Малігнізація

206. Укажіть співвідношення денного діурезу до нічного в нормі.

- A. 3 до 1
- B. 1 до 1
- C. 1 до 3
- D. 1 до 4

207. Для якого захворювання характерні такі клінічні прояви: гарячка, кашель (сухий, згодом вологий із виділенням слизово-гнійного мокротиння), посилення голосового тремтіння під час пальпації грудної клітки, задишка?

- A. Пневмонії
- B. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту
- C. Спонтанного пневмотораксу
- D. Бронхіальної астми

208. У пацієнта гематологічного відділення на шкірі тулуба візуалізується петехіально-плямистий висип різноманітного кольору (від пурпурно-червоного до зеленуватого і жовтого), у місцях стискання тулуба та кінцівок одягом — дрібні гематоми. В аналізі крові:

тромбоцити — $50 \cdot 10^9/\text{л}$, час кровотечі подовжений. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

A. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури

B. Гомофілії А

C. Гемолітичної анемії

D. Хронічного мієлолейкозу

209. Чоловік скаржиться на періодичні закрепи, випорожнення з домішками крові та переймоподібний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, живіт бере участь в акті дихання, м'який. У лівому підребер'ї пальпується щільне болюче утворення. Який інструментальний діагностичний метод використовується для дослідження всіх відділів товстого кишечника та взяття біопсії?

A. Колоноскопія

B. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

C. Іригоскопія

D. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

210. Сестра медична проводить сортування медичних відходів після виконання лікарських призначень. До якої категорії відходів належить первинна упаковка отруйного лікарського засобу?

A. C

B. D

C. A

D. B

211. Сестра медична проводить заміну та сортування постільної білизни тяжкохворого пацієнта. Класифікуйте ступінь забруднення текстильних виробів, якщо вони значно забруднені кров'ю та іншими біологічними виділеннями пацієнта?

A. IV

B. III

C. I

D. II

212. Укажіть причину ранньої післяпологової кровотечі, яку можна виявити, оглядаючи послід.

A. Затримка частин плаценти в порожнині матки

B. Порушення зсідання крові

C. Щільне прикріплення плаценти

D. Порушення виділення плаценти

213. Пацієнтці віком 52 роки встановлено діагноз: системний червоний вовчак. Які з нижченаведених симптомів характерні для цього захворювання?

A. Еритематозний висип на спинці носа та вилицях у вигляді «метелика», біль у м'язах, підвищення температури тіла до фебрильних цифр

B. Летючий характер болю у великих суглобах, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр

C. «Маскоподібне обличчя», кисетоподібні складки навколо рота, ущільнення шкіри кистей та розвиток їх контрактур

D. Ранкова скутість, біль у дрібних суглобах кистей і стоп, деформація суглобів

214. Пацієнт скаржиться на втрату апетиту, гіркий присмак у роті, біль і відчуття тяжкості у правому підребер'ї, жовтяничність шкіри і склер, свербіж шкіри, біль у суглобах. За результатами біохімічного дослідження крові виявлено: високий рівень прямого білірубину, виражена активність аланінамінотрансферази. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

A. Хронічного гепатиту

- B. Гострого гастриту
- C. Виразкової хвороби шлунка
- D. Хвороби Крона

215. Укажіть ЕКГ- ознаки, що характерні для нападу стенокардії.

A. Високий, гострий зубець Т, сегмент ST нижче ізолінії

- B. Високі зубці Р
- C. Низький вольтаж комплексу QRS
- D. Глибокий і широкий зубець Q

216. Жінка віком 35 років перебуває на 39-му тижні вагітності. Вагітність I, передбачувана маса плода — 4200 г. Діагностовано тазове передлежання плода. Яка тактика ведення пологів у цьому разі?

A. Кесарів розтин

- B. Накладання акушерських щипців
- C. Вакуум-екстракція плода
- D. Пологи через природні пологові шляхи

217. Які лікарські засоби належать до списку «Б»?

A. Сильнодіючі

- B. Імунобіологічні
- C. Наркотичні
- D. Отруйні

218. Яка окружність талії в чоловіків асоціюється з високим ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, хвороб серця, порушень вуглеводного обміну тощо?

A. 102 см

- B. 90 см
- C. 75 см
- D. 60 см

219. Який лікарський засіб використовується для надання невідкладної допомоги пацієнту у разі виникнення колапсу?

A. Кордіамін

- B. Клофелін
- C. Строфантин
- D. Папаверин

220. Укажіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз медичних п'явок.

A. Гірудин

- B. Фібринолізин
- C. Гістамін

D. Лізоцим

221. Який етіологічний фактор має вирішальне значення у розвитку гострого гломерулонефриту?

A. Інфікування β -гемолітичним стрептококом

B. Аутоімунні захворювання

C. Споживання гострої та жирної їжі

D. Професійні інтоксикації

222. У пацієнта, який хворіє на дифузний токсичний зоб, спостерігається симптом «телеграфного стовпа». Укажіть клінічні прояви цього симптому.

A. Тремор всього тіла

B. Девіація язика

C. Атактична хода

D. Переміжна кульгавість

223. У пацієнта після внутрішньовенного введення антибіотика розвинувся анафілактичний шок. Який препарат використовується насамперед для надання невідкладної допомоги пацієнту?

A. Епінефрин

B. Фуросемід

C. Кофеїн

D. Нітрогліцерин

E. Дротаверин

224. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути в пацієнта під час внутрішньовенного введення 1%-го розчину нікотинової кислоти.

A. Відчуття жару в тілі

B. Порушення зору

C. Брадикардія

D. Закреп

E. Сонливість

225. Пацієнту встановлено діагноз: гострий пієлонефрит. Чим зумовлений біль у поперековій ділянці, що характерний для цього захворювання?

A. Розтягненням ниркової капсули

B. Корінцевим синдромом

C. Уремією

D. Дизуричними розладами

226. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на слабкість у правій верхній та нижній кінцівках, утруднення мовлення, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: АТ — 190/90 мм рт. ст., пульс — 72/хв, ритмічний, гіпертонус м'язів правих кінцівок, моторна афазія. За декілька годин спостереження симптоматика регресувала. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

A. Транзиторної ішемічної атаки

B. Гіпертонічного церебрального кризу

C. Ішемічного інсульту

D. Геморагічного інсульту

227. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей виявлено численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні «симптом стружки» (лущення плям у разі пошкрябування) та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Висівкоподібного лишаю

- B. Мікроспорії
- C. Контактного простого дерматиту
- D. Токсикодермії

228. Під час догляду та для допомоги пацієнту, у якого триває друга стадія гарячки (температура тіла — 39°C), сестра медична застосувала охолоджувальний компрес на лоб. Як часто його необхідно змінювати?

A. Кожні 2-3 хв

- B. Кожні 30 хв
- C. Через 1 год
- D. Раз на добу

229. Тяжкохворий пацієнт хоспісу перебуває на ліжковому режимі. З якою метою використовується шкала Braden під час догляду за пацієнтом?

A. Оцінювання ступеня виникнення ризику пролежнів

- B. Планування реабілітаційних заходів
- C. Оцінки психоемоційного стану
- D. Розрахунку індексу маси тіла

230. Який суб'єктивний симптом найхарактерніший для кропив'янки?

A. Свербіж шкіри

- B. Іктеричність шкіри
- C. Мерзлякуватість
- D. Ціаноз шкіри

231. Як називається спосіб комунікації, що передбачає цілеспрямоване використання словесних висловлювань (мовлення) для передачі інформації?

A. Вербальна

- B. Невербальна
- C. Виховна
- D. Офіційна

232. Яка шкала використовується для догоспітальної діагностики гострого порушення мозкового кровообігу?

A. FAST

- B. ABCDE
- C. MMSE
- D. NRS

233. Укажіть метод ендоскопічного дослідження внутрішньої поверхні сечового міхура.

A. Цистоскопія

- B. Езофагогастродуоденоскопія
- C. Колоноскопія

D. Бронхоскопія

234. Які параметри враховуються під час оцінювання ефективності пологової діяльності?

A. Частота, тривалість та інтенсивність перейм

B. Розміри площини входу в малий таз та зовнішньої кон'югати

C. Артеріальний тиск роділлі та частота серцевих скорочень плода

D. Розміри голівки плода та ступінь її конфігурації

235. У пацієнта віком 20 років захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 39,2°C, сильного головного болю та болю у м'язах. Через декілька годин на шкірі тулуба та задньої поверхні стегон з'явився геморагічний висип зірчастої форми. Які менингеальні симптоми потрібно перевірити в пацієнта насамперед?

A. Керніга, Брудзинського

B. Кера, Ортнера

C. Бабінського, Россалімо

D. Хвостека, Труссо

236. Чоловіку віком 37 років для лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки призначено фамотидин. Яка основна фармакологічна дія цього лікарського засобу?

A. Антисекреторна

B. Бактеріостатична

C. Антигістамінна

D. Бактерицидна

237. Упродовж якого терміну часу потрібно провести обстеження на ВІЛ медичного працівника, у якого відбувся контакт із джерелом потенційного інфікування ВІЛ, пов'язаний із виконанням професійних обов'язків?

A. 5-ти днів

B. 2-х місяців

C. 3-х місяців

D. 1-го місяця

238. Вагітній жінці діагностовано тазове передлежання плода. У якому терміні вагітності можна виконати операцію зовнішнього повороту плода, для того, щоб вагітність закінчилася пологами через природні пологові шляхи?

A. 36 тижнів

B. 40 тижнів

C. 28 тижнів

D. 38 тижнів

239. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на сухість у роті, невгамовну спрагу, загальну слабкість, постійне відчуття голоду, втрату маси тіла, свербіж шкіри, часте сечовипускання, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, лущиться, помітні сліди від подряпин, пульс — 78\хв, АТ — 150\85 мм рт. ст. Глюкоза крові — 8,4 ммоль\л. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні симптоми?

A. Цукрового діабету

B. Корости

C. Гіпертиреозу

D. Гіпотиреозу

240. У чоловіка після вживання цитрусових з'явився висип на шкірі у вигляді червоних плям різних розмірів і форми, що супроводжується свербіжем. Для якої патології характерні ці клінічні прояви?

- A. Кропив'янки
- B. Екземи
- C. Псоріазу
- D. Сироваткової хвороби

241. Який вид анестезії доцільно застосувати під час оперативного лікування підшкірного панарицію?

- A. За Оберстом-Лукашевичем
- B. Термінальну
- C. Внутрішньокісткову
- D. За Вишневським

242. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, «гавкаючий кашель», утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра обличчя ціанотична, повіки та губи набряклі, щільні на дотик, свербіжу немає, пульс — 84/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- A. Набряк Квінке
- B. Аспірація стороннього тіла
- C. Кропив'янка
- D. Дифтерійний круп

243. Пацієнту, який хворіє на бронхоектатичну хворобу, призначено масаж грудної клітки та дихальну гімнастику. Укажіть мету проведення цих процедур.

- A. Полегшення процесу відходження мокротиння
- B. Полегшення больових відчуттів
- C. Профілактика набряку легень
- D. Попередження кровохаркання

244. Який вид гастриту (за характером патологічних змін слизової оболонки шлунка) може розвинути в потерпілої особи внаслідок випадкового споживання концентрованої кислоти (зокрема оцтової кислоти)?

- A. Корозивний
- B. Еритематозний
- C. Фібринозний
- D. Флегмонозний

245. Який розмір периферичного венозного катетера переважно використовується для внутрішньовенних інфузій у новонароджених дітей?

- A. 26G
- B. 14G
- C. 18G
- D. 20G

246. Результати клінічного (загального) аналізу сечі пацієнта такі: сеча каламутна, з пластівцями та осадом, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (менше 1 г/л). Для якого захворювання характерні такі лабораторні зміни в аналізі сечі пацієнта?

A. Гострого пієлонефриту

- В. Хронічної ниркової недостатності
- С. Хронічного гломерулонефриту
- D. Гострого гломерулонефриту

247. Пацієнту пульмонологічного відділення встановлено діагноз: пневмонія — та призначено оксигенотерапію через носові канюлі. Через який інтервал часу рекомендується перевіряти стан носових канюль для забезпечення впевненості у їхній прохідності та можливості надходження кисню, а також контролю швидкості подачі кисню і його концентрації?

A. Кожні 8 год

- В. Кожні 2 год
- С. Кожні 40 хв
- D. Кожні 3 год

248. Пацієнту, який хворіє на залізодефіцитну анемію, призначено терапію препаратами заліза. Одночасне приймання якого вітаміну покращує всмоктування та засвоєння заліза.

A. Аскорбінової кислоти

- В. Токоферолу
- С. Кальциферолу
- D. Ціанокобаламіну

249. Жінка перебуває на 30-му тижні вагітності. Вагітність II, багатоплідна (монохоріональна моноамніотична двійня). Стан матері та плодів задовільний. Враховуючи тип розвитку двійні, жінку попередили, що пологи відбуватимуться шляхом кесаревого розтину. У якому терміні вагітності його оптимально провести в цьому разі?

A. 36 тижнів

- В. 38 тижнів
- С. 32 тижні
- D. 37 тижнів

250. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Укажіть метод, що спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

A. Механотерапія

- В. Пневмопресинг
- С. Вісцеральна терапія

251. Як називається графічний запис вимірювання висоти стояння дна матки (ВДМ) з метою динамічного спостереження за зростанням плода, починаючи з 20-го тижня вагітності?

A. Гравідограма

- В. Кардіограма
- С. Міограма
- D. Токограма
- E. Партограма

252. Укажіть інструментальний ендоскопічний метод дослідження прямої та сигмоподібної кишок.

A. Ректороманоскопія

- В. Холангіографія

- C. Фіброгастроскопія
- D. Іригоскопія
- E. Колоноскопія

253. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим у діагностиці бронхоектатичної хвороби?

- A. Бронхографія**
- B. Велоергометрія
- C. Бронхіальна артеріографія
- D. Спірометрія
- E. Ларингоскопія

254. У чоловіка віком 28 років у ділянці верхньої губи візуалізуються гіперемія шкіри та дрібні міхурці з гнійним умістом, вкриті жовтими кірками, відмічається піднижньощелепний лімфаденіт. Для якої патології характерні вказані клінічні прояви?

- A. Сикозу**
- B. Псоріазу
- C. Бешихи
- D. Мікроспорії
- E. Вітиліго

255. Яка анатомічна ділянка тіла людини використовується для введення вакцини БЦЖ?

- A. Зовнішня поверхня верхньої третини лівого плеча**
- B. Підлопаткова ділянка
- C. Верхній зовнішній квадрант сідниці
- D. Середня третина внутрішньої поверхні передпліччя
- E. Передня поверхня стегна

256. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до 38,2°C набряк і почервоніння правої щоки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається інфільтрат, болючий під час пальпації, шкіра над ним напружена, гіперемована, у центрі інфільтрату візуалізується стрижень у вигляді сіро-зелених мас. Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- A. Фурункул**
- B. Флегмона
- C. Абсцес
- D. Карбункул
- E. Гідраденіт

257. Чоловік віком 54 роки скаржиться на зниження апетиту, біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття живота, слабкість. Об'єктивно спостерігається: субіктеричність склер, «судинні зірочки» на шкірі, почервоніння долонь, на передній черевній стінці візуалізуються розширені підшкірні вени («голова медузи»), асцит. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Цирозу печінки**
- B. Хронічного гастриту
- C. Хронічного панкреатиту
- D. Хронічного холециститу
- E. Жовчнокам'яної хвороби

258. У пацієнта нефрологічного відділення під час лабораторного дослідження сечі виявлено: олігурію, гематурію, протеїнурію. В осаді сечі: нирковий епітелій, гіалінові та зернисті циліндри. Для якого захворювання нирок характерні ці лабораторні зміни?

A. Гострого гломерулонефриту

- B. Гострого пієлонефриту
- C. Гострого циститу
- D. Сечокам'яної хвороби
- E. Хронічного пієлонефриту

259. Яке ускладнення може розвинути в пацієнта під час проведення абдомінальної пункції у разі швидкого видалення великого об'єму рідини?

A. Колапс

- B. Блювання
- C. Шлункова кровотеча
- D. Пневмоторакс
- E. Ушкодження внутрішніх органів

260. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда у першу добу захворювання розвинулися такі симптоми: температура тіла — 37,6°C, підвищення рівня лейкоцитів, тропонінів, міоглобіну та С-реактивного протеїну у периферичній крові. Який синдром розвинувся в пацієнта?

A. Резорбтивно-некротичний

- B. Менінгеальний
- C. Бронхообструктивний
- D. Гіпертензивний

261. До перинатального центру у відділення інтенсивної терапії шпиталізовано вагітну жінку (вагітність II, термін вагітності — 37 тижнів) зі скаргами на постійний головний біль, погіршення зору, мерехтіння «мушок» перед очима, блювання, гострий біль в епігастрії. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, генералізовані набряки, АТ — 170/110 мм рт. ст. У загальному аналізі сечі: протеїнурія — 3,5 г/добу. З анамнезу відомо, що підвищення АТ у жінки раніше не спостерігалось. Для якого патологічного стану характерні ці клініко-лабораторні показники?

A. Тяжкої прееклампсії

- B. Хронічної серцевої недостатності
- C. Гестаційної гіпертензії
- D. Помірної прееклампсії

262. Який із нижченаведених методів дослідження є найінформативнішим для діагностики туберкульозу легень?

A. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки

- B. Спірометрія
- C. Біохімічний аналіз крові
- D. Загальний аналіз крові

263. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання в руках, судоми в м'язах кистей. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом 10-ти років працює забійником у шахті. Об'єктивно спостерігається: кисті ціанотичні, холодні на дотик, зниження больової чутливості за типом «рукавичок». Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Вібраційної хвороби

- В. Системної склеродермії
- С. Ревматоїдного артриту
- D. Цукрового діабету

264. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс — 110\хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

A. Психотравма

- В. Куріння
- С. Шкідливі звички
- D. Переохолодження

265. Сестра медична навчає пацієнта, якому діагностовано цукровий діабет 1-го типу, техніці введення інсуліну, зокрема наголошує на важливості дотримання точного дозування цього лікарського засобу. Яке ускладнення може розвинути в пацієнта, якщо він отримуватиме недостатню дозу інсуліну?

A. Гіперглікемія

- В. Гіпоглікемія
- С. Медикаментозна емболія
- D. Ліподистрофія

266. Чоловік віком 52 роки скаржиться на сильний оперізувальний біль у верхній половині живота, нудоту, блювання, рідкі випорожнення, здуття живота та слабкість, які виникли після вживання спиртних напоїв та жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: блідість і сухість шкіри, пульс — 92\хв, ритмічний, АТ — 110\70 мм рт. ст. Яке додаткове дослідження доцільно провести пацієнту з метою уточнення діагнозу?

A. Аналіз крові на α -амілазу

- В. Аналіз крові на глюкозу
- С. Аналіз калу на приховану кров
- D. Загальний аналіз сечі

267. Пацієнт скаржиться на біль у надлобковій ділянці, неможливість випорожнити сечовий міхур. Сечовиділення відсутнє впродовж 12 год. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

A. Гостра затримка сечі

- В. Ніктурія
- С. Поліурія
- D. Ниркова коліка

268. У якому віці згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні проводиться четверте щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця дітям?

A. 18 місяців

- В. 3 роки
- С. 6 років
- D. 6 місяців

269. У чоловіка віком 62 роки після стресу раптово розвинулися загальна слабкість, прискорене серцебиття та різкий стискальний біль за грудниною, що іррадіює в ліву руку та не минає після приймання нітрогліцерину. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в пацієнта?

A. Інфаркт міокарда

B. Міокардит

C. Набряк легень

D. Печінкова коліка

270. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

A. Спірографія

B. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки

C. Бронхоскопія

D. Шкірні алергологічні тести

E. УЗД легень

271. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на різкий біль у правій клубовій ділянці з іррадіацією в пряму кишку, короткочасне запаморочення, які виникли після фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що остання менструація була 3 тижні тому, менструальний цикл регулярний, пацієнтка використовує бар'єрні методи контрацепції. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, АТ — 100/60 мм рт. ст., пульс — 90/хв, живіт напружений у нижніх відділах. Результати гінекологічного дослідження: слизова оболонка шийки матки блідорожевого кольору, матка не збільшена, щільної консистенції, безболісна, придатки матки праворуч різко болючі, зліва — без особливостей, заднє склепіння піхви згладжене, болюче, виділення зі статевих шляхів слизові. Який патологічний стан розвинувся в пацієнтки?

A. Апоплексія яєчника

B. Порушена позаматкова вагітність

C. Гострий апендицит

D. Прогресуюча позаматкова вагітність

E. Гострий сальпінгоофорит

272. Укажіть необхідне оснащення точки догляду за пацієнтом.

A. Диспенсер з антисептиком

B. Диспенсер із рідким милом

C. Диспенсер із паперовими одноразовими рушниками

D. Умивальник

E. Кран із ліктьовим механізмом

273. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на періодичний біль унизу живота, незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів та затримку менструації впродовж 6-ти тижнів. Попередній діагноз: позаматкова вагітність. Рівень якого гормону доцільно дослідити в крові жінки для підтвердження цього діагнозу?

A. Хоріонічного гонадотропіну

B. Пролактину

C. Окситоцину

D. Естрадіолу

E. Прогестерону

274. Пацієнту встановлено діагноз: пептична виразка шлунка. Який із нижченаведених лікарських засобів, що входить до складу квадритерапії цього захворювання, пригнічує продукцію кислоти шлункового соку, сприяє зменшенню больових відчуттів у шлунку та усуває печію?

A. Омепразол

B. Кларитроміцин

C. Вісмуту субцитрат (де-нол)

D. Амоксицилін

275. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги транспортує пацієнта з підтвердженим діагнозом: туберкульоз — до спеціалізованого закладу охорони здоров'я. Який бар'єрний засіб захисту від можливого інфікування необхідно застосувати членам бригади?

A. Респіратор

B. Халат

C. Захисний екран

D. Хірургічні рукавички

E. Хірургічна маска

276. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод використовується для надання долікарської допомоги потерпілій особі у перші 2-3 год після забою колінного суглоба без пошкодження шкіри?

A. Прикладання міхура з льодом до місця травми

B. Занурення травмованої кінцівки в гарячу воду

C. Накладання гірчичників

D. Прикладання грілки до місця травми

E. Накладання зігрівального компресу

277. За призначенням лікаря сестра медична проводить забір венозної крові пацієнта вакуумною системою. Які дії потрібно виконати із заповненою кров'ю пробіркою?

A. Акуратно перевернути її 5-8 разів для повного змішування вмісту

B. Перелити її вміст в іншу ємність

C. Підігріти її вміст до температури 37°C

D. Енергійно струсити до повного змішування її вмісту

278. Дієтотерапія — це метод лікування за допомогою раціонального харчування. Що означає принцип заміщення в дієтотерапії?

A. Уведення в раціон харчування продуктів, у компонентах яких організм має дефіцит

B. Уникання можливості вживання продуктів, забруднених мікробами

C. Виключення з раціону харчування їжі, багатой на клітковину

D. Збалансування раціону харчування щодо білків, жирів, вуглеводів

E. Вживання продуктів харчування з тривалим терміном придатності

279. Укажіть типове ускладнення інтерстиціальної пневмонії.

A. Пневмосклероз

B. Бронхіальна астма

C. Легенева кровотеча

D. Кардіосклероз

280. У жінки віком 25 років після переохолодження з'явилися скарги на загальну слабкість,

озноб, підвищення температури тіла до 38,5°C та тупий біль у поперековій ділянці з правого боку. Об'єктивно спостерігається: симптом Пастернацького позитивний праворуч, сеча каламутна, з гнійним осадом. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Гострого пієлонефриту

- B. Амілоїдозу нирок
- C. Гострого циститу
- D. Сечокам'яної хвороби

281. Який із нижченаведених факторів ризику зумовлює виникнення серцево-судинних захворювань у людей віком понад 40 років?

A. Гіперхолестеринемія

- B. Вірусні інфекції
- C. Диспротеїнемія
- D. Спадковість

282. У пацієнта розвинулися симптоми гострого гастриту в результаті споживання неякісної їжі. Які заходи долікарської допомоги необхідно надати пацієнту насамперед?

A. Промити шлунок

- B. Прикласти міхур із льодом на епігастральну ділянку
- C. Застосувати очисну клізму
- D. Прикласти грілку на епігастральну ділянку

283. У чоловіка після роботи з електроприладом на долоні правої руки візуалізується ділянка некрозу шкіри — біло-сіра пляма діаметром 4 мм. Який вид місцевої електротравми спостерігається в чоловіка?

A. Електричний опік

- B. Електричний знак
- C. Механічне ушкодження
- D. Електроофтальмія

284. До приймального відділення шпиталізовано жінку віком 28 років у непритомному стані. Зі слів родичів з'ясувалося, що вона хворіє на цукровий діабет, 3 дні тому її стан погіршився, з'явилися нудота, блювання, біль у животі, сонливість. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, запах ацетону з рота, ЧД — 30\хв, пульс — 100\хв, слабкого наповнення, АТ — 85\55 мм рт. ст. Для якого виду коми характерні ці клінічні прояви?

A. Гіперглікемічної

- B. Уремичної
- C. Гіпоглікемічної
- D. Печінкової

285. У пацієнта після укусу бджоли раптово виник сильний головний біль, з'явилися психоемоційне збудження, нудота, парестезії, а згодом — судоми з втратою свідомості та мимовільним сечовипусканням і дефекацією. АТ — 70\40 мм рт. ст. Який варіант анафілактичного шоку розвинувся в пацієнта?

A. Церебральний

- B. Абдомінальний
- C. Асфіктичний
- D. Гемодинамічний

286. Чоловік віком 37 років скаржиться на нудоту, блювання, сухість у роті, відчуття «туману» перед очима, утруднення під час ковтання. Вказані симптоми з'явилися через добу після вживання в'яленої риби. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Ботулізму

B. Харчової токсикоінфекції

C. Сальмонельозу

D. Поліомієліту

287. Укажіть оптимальну температуру води для проведення очисної клізми пацієнту з атонічним закрепом.

A. 18-20°C

B. 25-30°C

C. 28-32°C

D. 38-40°C

E. 37-38°C

288. Сестра медична, надаючи медичну допомогу пацієнту, в якого розвинувся напад стенокардії, застосувала нітрогліцерин 0,5 мг сублінгвально. Укажіть фармакологічну властивість цього лікарського засобу.

A. Розширює коронарні судини

B. Розслабляє гладку мускулатуру бронхів

C. Поліпшує функцію ендотелію

D. Підвищує силу і швидкість скоротливості міокарда

289. Яке специфічне ускладнення інсулінотерапії може розвинути, якщо не змінювати місце введення інсуліну?

A. Ліподистрофія

B. Інфільтрат

C. Абсцес

D. Бешиха

E. Гематома

290. Чоловік отримав опік стегна II—III А ст. Вкажіть послідовність дій під час надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі.

A. Охолодження, знеболювання, накладення асептичної пов'язки, іммобілізація

B. Накладання пов'язки з маззю, знеболювання, охолодження, іммобілізація

C. Іммобілізація, накладання пов'язки з маззю, охолодження, знеболювання

D. Знеболювання, іммобілізація, накладення асептичної пов'язки, охолодження

E. Іммобілізація, знеболювання, охолодження, накладання джгута

291. Жінку у терміні вагітності 12 тижнів шпиталізовано до гінекологічного відділення з діагнозом: аборт у ході. Яка лікувальна тактика у цьому разі?

A. Кюретаж стінок порожнини матки

B. Накладання швів на шийку матки

C. Призначення спазмолітичних засобів

D. Призначення утеротонічних засобів

E. Застосування холоду на низ живота

292. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної жінки за допомогою прийомів

Леопольда-Левицького виявлено, що спинка плода обернена до правого боку матки дещо допереду, дрібні частини розміщені ліворуч, голівка плода знаходиться над входом у малий таз. Вкажіть розташування плода в порожнині матки.

- A. Поздовжнє положення, II позиція, передній вид, головне передлежання
- B. Поздовжнє положення, I позиція, передній вид, головне передлежання
- C. Поздовжнє положення, II позиція, задній вид, головне передлежання
- D. Косе положення, I позиція, задній вид, головне передлежання
- E. Поперечне положення, I позиція, задній вид, головне передлежання

293. Який розчинник використовується для проведення діагностичної проби на індивідуальну чутливість до антибіотиків?

- A. 0,9%-й розчин натрію хлориду
- B. 2%-й розчин лідокаїну
- C. 40%-й розчин глюкози
- D. 0,5%-й розчин новокаїну
- E. 10%-й розчин лідокаїну

294. У чоловіка віком 38 років з діагнозом: цукровий діабет 1-го типу, за 20 хвилин після введення 36 ОД інсуліну з'явилися відчуття голоду, загальна слабкість, пітливість та тремор у кінцівках. Для якого патологічного стану характерні ці клінічні ознаки?

- A. Гіпоглікемії
- B. Гіперглікемії
- C. Гострої печінкової недостатності
- D. Гіпертензивного кризу
- E. Колапсу

295. У тримісячної дитини об'єктивно спостерігається: млявість, сонливість, пастозність обличчя, збільшення язика і губ, блідість та сухість шкіри, широке перенісся, холодні кисті та ступні, затримка росту. Для якої патології характерні ці клінічні симптоми?

- A. Вродженого гіпотиреозу
- B. Цукрового діабету
- C. Рахіту
- D. Дифузного токсичного зоба
- E. Хвороби Дауна

296. Який вид анестезії використовується під час оперативного лікування панарицію?

- A. За Лукашевичем-Оберстом
- B. За О. Вишневським
- C. За Школьніковим-Селівановим
- D. За Войно-Ясенецьким
- E. За Брауном

297. Чоловік віком 65 років скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту та багатократне блювання. Під час пальпації живіт різко болючий в епігастральній ділянці, позитивний симптом Мейо-Робсона, Кера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Гострого панкреатиту
- B. Ниркової коліки
- C. Гострого апендициту

- D. Перфоративної виразки шлунку
- E. Гострої кишкової непрохідності

298. Чоловік після падіння скаржиться на біль у грудній клітці справа, що посилюється під час кашлю, дихання і зміни положення тіла. Під час пальпації грудної клітки спостерігається локальний біль, патологічна рухливість відламків і крепітація справа. Для якого ушкодження грудної клітки характерні ці симптоми?

- A. Перелому ребер
- B. Закритого пневмотораксу
- C. Клапанного пневмотораксу
- D. Перелому груднини
- E. Гемотораксу

299. Який сечовий синдром характерний для гострого пієлонефриту?

- A. Піурія
- B. Кетонурія
- C. Глюкозурія
- D. Порфіринурія
- E. Макрогематурія

300. Вкажіть об'єктивний метод діагностики прохідності маткових труб.

- A. Гістеросальпінографія
- B. Біопсія ендометрія
- C. Бімануальне дослідження
- D. Вимірювання базальної температури
- E. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

301. У роділлі за наявності регулярної пологової діяльності та розкритті шийки матки на 4 см відійшли навколоплідні води. Класифікуйте вилиття навколоплідних вод у цьому разі.

- A. Раннє
- B. Запізніле
- C. Передчасне
- D. Своєчасне

302. До якої групи захворювань відноситься дисплазія шийки матки?

- A. Передракових
- B. Злоякісних
- C. Трофобластичних
- D. Доброякісних
- E. Фонових

303. У пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у терапевтичному відділенні, лікар діагностував цукровий діабет та призначив аналіз сечі для визначення концентрації глюкози. Упродовж якого часу треба зібрати сечу для цього дослідження?

- A. Доби
- B. 12 годин
- C. 2-х діб
- D. 3 годин
- E. 8 годин

304. У пацієнта з діагнозом: артеріальна гіпертензія, упродовж останніх 2-х годин погіршився загальний стан: з'явилися запаморочення, нудота, головний біль табіль у ділянці серця, миготіння «мушок» перед очима, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: обличчя гіперемоване, тремор кінцівок, АТ — 190/120 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося у пацієнта?

A. Гіпертензивний криз

- B. Інфаркт міокарда
- C. Прогресуюча стенокардія
- D. Колапс
- E. Субарахноїдальний крововилив

305. Чоловік віком 28 років скаржиться на задишку та біль у ділянці серця. В анамнезі: гостра ревматична гарячка. Об'єктивно спостерігається: акроціаноз, блідість шкірних покривів, рум'янець на щоках. Пальпаторно на верхівці серця виявляється симптом «котячого муркотіння». Аускультативно вислуховується ритм «перепілки». Для якої набутої вади серця характерні ці клінічні симптоми?

A. Мітрального стенозу

- B. Мітральної недостатності
- C. Аортального стенозу
- D. Аортальної недостатності
- E. Комбінованої аортальної вади

306. У новонародженої дитини спостерігається легка гіперемія пупкової рани та серозні виділення з неї. Для якого захворювання це характерно?

A. Катарального омфаліту

- B. Гнійного омфаліту
- C. Некротичного омфаліту
- D. Сепсису новонароджених
- E. Пупкової кили

307. Під час переливань великих доз крові (особливо при великій швидкості переливання) необхідно проводити профілактику цитратного шоку. Який препарат для цього використовується?

A. 10%-й розчин кальцію хлориду

- B. 10%-й розчин натрію хлориду
- C. 0,9%-й розчин натрію хлориду
- D. 25%-й розчин сульфату магнію
- E. 40%-й розчин глюкози

308. У роділлі віком 24 роки триває I період пологів. Після 8 годин нормальної пологової діяльності перейми стали не-достатньо сильними і тривалими, паузи між ними збільшилися. Яка патологія по-логової діяльності виникла у роділлі?

A. Вторинна слабкість пологової діяльності

- B. Надмірно сильна пологова діяльність
- C. Патологічний прелімінарний період
- D. Первинна слабкість пологової діяльності
- E. Дискоординована пологова діяльність

309. Скільки формених елементів у 1 мл осаду сечі визначається в нормі під час дослідження

сечі за методом Нечипоренка?

- A. Лейкоцитів до 2000. еритроцитів до 1000
- B. Лейкоцитів до 3000. еритроцитів до 2000
- C. Лейкоцитів до 4000. еритроцитів до 1000
- D. Лейкоцитів до 5000. еритроцитів до 1000
- E. Лейкоцитів до $2 \cdot 10^6$, еритроцитів до $1 \cdot 10^6$

310. Пацієнтці діагностовано лабіринтит. Вкажіть локалізацію запального процесу у цьому разі.

- A. Внутрішнє вухо
- B. Середнє вухо
- C. Зовнішнє вухо
- D. Соскоподібний відросток
- E. Слухова труба

311. У жінки пологи відбулися 6 тижнів тому, зберігається аменорея. Дитина перебуває виключно на грудному вигодовуванні. Який метод контрацепції можна запропонувати жінці в цьому разі?

- A. Лактаційної аменореї
- B. Застосування сперміцидів
- C. Температурний
- D. Цервікальний
- E. Застосування оральних контрацептивів

312. Чоловік звернувся до лікаря- офтальмолога зі скаргами на сльозотечу. Об'єктивно спостерігається: гіперемія кон'юнктиви та випинання у нижньовнутрішньому куті орбіти, виділення гною із нижньої сльозової точки у разі натискання на це випинання. Для якого запального захворювання ока характерні ці клінічні симптоми?

- A. Дакріоциститу
- B. Кератиту
- C. Блефариту
- D. Дакріoadеніту
- E. Кон'юнктивіту

313. У роділлі віком 25 років триває III період пологів. Яка тактика ведення цього періоду пологів, якщо плацента відшарувалася від стінок матки, а виділення посліду не відбулося?

- A. Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича
- B. Увести утеротонічні засоби
- C. Виконати зовнішній масаж матки
- D. Накласти шов за Лосицькою
- E. Провести ручне відшарування плаценти

314. У жінки на 9 добу після пологів спостерігається різкий біль у животі, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, нудота та блювання. Під час огляду виявлено: шкіра бліда, язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт напружений, здутий, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга, пульс — 120 уд/хв. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся у жінки?

- A. Дифузний (розлитий) перитоніт
- B. Пельвіоперитоніт
- C. Метроендометрит

- D. Сальпінгоофорит
- E. Гостра кишкова непрохідність

315. Жінка скаржиться на свербіж та печіння у піхві, рясні сироподібні виділення зі статевих органів. Для якого урогенітального захворювання найхарактерніші ці симптоми?

- A. Кандидозу
- B. Гонореї
- C. Хламідіозу
- D. Трихомоніазу**
- E. Сифілісу

316. Жінка віком 26 років за 3 дні після штучного абортів скаржиться на біль унизу живота, кров'янисто-гнійні виділення з піхви, підвищення температура тіла до 38,0 C0. Яке захворювання, найімовірніше, розвинулося у жінки?

- A. Ендометрит**
- B. Кольпіт
- C. Аднексит
- D. Лохіометра
- E. Пельвіоперитоніт

317. Яке ушкодження тканин розвивається внаслідок хімічного опіку лугами?

- A. Колікваційний некроз**
- B. Коагуляційний некроз
- C. Утворення міхура
- D. Гіперемія шкіри
- E. Лущення шкіри

318. Вкажіть комплекс заходів, спрямованих на запобігання потрапляння інфекції в рану.

- A. Асептика**
- B. Антисептика
- C. Інфекційна безпека
- D. Інфекційний контроль
- E. Дезінфекція

319. П'ятирічна дитина перебуває у стані клінічної смерті після ураження електричним струмом. З чого необхідно розпочати реанімаційні заходи?

- A. Відновити прохідність дихальних шляхів**
- B. Провести непрямий масаж серця
- C. Увести знеболювальні препарати
- D. Провести ШВЛ

320. Унаслідок передчасних стрімких пологів народилася дитина з масою тіла 1900 г. Об'єктивно спостерігається: стан дитини тяжкий, шкіра бліда, крик пронизливо-монотонний, дихання часте, випинання великого тім'ячка, тремор підборіддя та кінцівок, природжені рефлекси загальмовані, тахікардія. Для якого патологічного стану характерні ці клінічні ознаки?

- A. Внутрішньочерепної пологової травми**
- B. Асфіксії
- C. Гіпокальціємічного синдрому

- D. Внутрішньоутробного інфікування
- E. Гемолітичної хвороби новонароджених

321. Який метод дослідження сечі використовується для визначення концентраційної і фільтраційної здатності нирок?

- A. За Зимницьким
- B. За Нечипоренко
- C. За Аддіса-Каковського
- D. За Амбурже
- E. За Сулковичем

322. Які антропометричні показники враховуються для оцінки фізичного розвитку дитини?

- A. Маса тіла, зріст, обвід голови, грудної клітки та живота
- B. Маса тіла, обвід плеча та грудної клітки
- C. Форма та обвід грудної клітки
- D. Форма стопи та зріст
- E. Зріст, маса тіла та обвід стегна

323. Жінка у терміні вагітності 30 тижнів скаржиться на появу значних набряків на обличчі, руках та нижніх кінцівках, головний біль, порушення зору. Об'єктивно спостерігається: генералізовані набряки, АТ — 190/120 мм рт.ст, протеїнурія — 6 г/л, олігурія. Для якого патологічного стану характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Тяжкої прееклампсії
- B. Гестаційної артеріальної гіпертензії
- C. Прееклампсії легкого ступеня
- D. Прееклампсії середнього ступеня тяжкості
- E. Епілепсії

324. У пацієнта встановлено попередній діагноз: хронічний панкреатит. Яке додаткове дослідження найдоцільніше призначити пацієнту для уточнення діагнозу?

- A. Аналіз сечі на α -амілазу
- B. Фіброгастроскопію
- C. Дуоденальне зондування
- D. Холецистографію
- E. Колоноскопію

325. Під час визначення групи крові пацієнта за допомогою цоліклонів реакція аглютинації відбулася і з цоліклоном анти-А, і з цоліклоном анти-В. Яка група крові у пацієнта?

- A. АВ (IV)
- B. В (III)
- C. А (II)
- D. 0 (I)

326. Чоловік під час пожежі отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей та живота. Визначте площу опікової поверхні.

- A. 36%
- B. 54%
- C. 42%
- D. 27%

Е. 18%

327. У дванадцятирічного хлопчика 6 годин тому виник біль в епігастрії, що перемістився у праву здухвинну ділянку, спостерігається однократне блювання, підвищення температура тіла до 37,2°C. Під час огляду виявлено: дошкоподібний живіт, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Для якої патології характерні ці клінічні ознаки?

A. Гострого апендициту

В. Гострого панкреатиту

С. Гострої кишкової непрохідності

D. Хронічного гастриту

Е. Ниркової коліки

328. У потерпілого під час ДТП чоловіка спостерігається лікворея з вух та носа. Для якого травматичного ушкодження характерний цей симптом?

A. Перелому основи черепа

В. Забою головного мозку

С. Перелому хребта

D. Струсу головного мозку

Е. Перелому склепіння черепа

329. Як називається метод лікування пацієнтів із використанням медичних п'явок?

A. Гірудотерапія

В. Оксигенотерапія

С. Гідротерапія

D. Геліотерапія

Е. Спеліотерапія

330. Який режим фізичної активності призначається пацієнтам із шлунковою кровотечею?

A. Суворий ліжковий

В. Ліжковий

С. Палатний

D. Загальний

Е. Напівліжковий

331. Вкажіть анатомічні особливості будови євстахієвої (слухової) труби у дітей грудного віку, що сприяють швидкому поширенню інфекції в порожнину середнього вуха.

A. Широка і коротка

В. Широка і довга

С. Вузька і довга

D. Вузька і коротка

332. У восьмирічної дитини під час огляду виявлено несиметричні геморагічні висипання різного розміру та кольору. В анамнезі — спонтанні носові кровотечі. У аналізі крові — виражена тромбоцитопенія. Для якого захворювання характерна ці клініко-лабораторні показники?

A. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури

В. Хвороби Шенлейн-Геноха

С. Гемофілії А

D. Залізодефіцитної анемії

333. У новонародженої дитини на прикінці 1-ї хвилини життя об'єктивно спостерігається: відсутність дихання, рефлекс не викликаються, ціаноз кінцівок, ЧСС — менше 100 уд/хв. Оцініть стан дитини за шкалою Апгар.

A. 2 бали

- В. 4 бали
- С. 8 балів
- Д. 9 балів
- Е. 5 балів

334. У пацієнта з діагнозом: пневмонія, добові коливання температури тіла не перевищують 1°C. Вкажіть тип гарячки.

A. Постійна

- В. Іектична
- С. Хвилеподібна
- Д. Послаблювальна
- Е. Ремітуюча

335. Чоловік за 5 днів після переохолодження скаржиться на біль у правій половині грудної клітки під час дихання, підвищення температури тіла до 39°C та задишку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, права половина грудної клітки відстає в акті дихання, ослаблення голосового тремтіння та тупий перкуторний звук справа, аускультативно — нижче кута правої лопатки дихання не вислуховується, пульс — ПО уд/хв, АТ — 100/70 мм рт.ст. Для якого захворювання характерна ці клінічні симптоми?

A. Ексудативного плевриту

- В. Сухого плевриту
- С. Гострого бронхіту
- Д. Раку легень
- Е. Туберкульозу легень

336. Чоловік віком 47 років скаржиться на розпираючий біль у лівій гомілці. З анамнезу відомо, що він декілька днів то-му поранив ногу під час польових робіт. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра лівої гомілки бліда з багряно-ціанотичними плямами, з дна рани виділяється повітря та виявляється набухання м'язів (рана має вигляд «вареного м'яса»), Пальпаторно визначається крепітація та позитивний симптом «лігатури». Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

A. Газової гангрени

- В. Правця
- С. Бешихи
- Д. Сибірки
- Е. Панарицію

337. Жінка скаржиться на гіркоту у роті, нудоту (особливо після вживання жирної та смаженої їжі), ниючий біль у правому підребер'ї, що посилюються під час ходьби, періодичне підвищення температури тіла до 37,5°C. Який позитивний симптом можна виявити під час об'єктивного обстеження в цьому разі?

A. Кера

- В. Пастернацького

- С. Брудзинського
- D. Штельвага
- Е. Менделя

338. Вкажіть засіб транспортної іммобілізації, що використовується у разі травми шийного відділу хребта.

A. Шийний комір Шанця

- В. По в'язка «чепець»
- С. Хрестоподібна пов'язка на потилицю
- D. Пов'язка «вуздечка»
- Е. Шина Крамера

339. У роділлі одразу після народження плода почалася масивна кровотеча зі статевих шляхів, ознак відокремлення плаценти немає. Яка лікувальна тактика у цьому разі?

A. Ручне відокремлення та видалення посліду

- В. Ручна ревзія порожнини матки
- С. Зовнішній масаж матки
- D. Спостереження за роділлем
- Е. Застосування холоду на низ живота

340. Вкажіть об'єктивну ознаку, що підтверджує ефективність проведення серцево-легеневої реанімації.

A. Поява пульсу на сонній артерії

- В. Розширення зіниць
- С. Відсутність свідомості
- D. Блідість шкірних покривів
- Е. Ціаноз шкірних покривів

341. Чоловік віком 53 роки скаржиться на інтенсивний тривалий стискаючий біль за грудниною, що віддає у ліву руку та лопатку, не минає після приймання нітрогліцерину. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, покрита холодним потом, кінчик носа та видимі слизові оболонки ціанотичні, пульс — 96 уд/хв, АТ — 90/60 мм рт.ст. Яке дослідження треба насамперед провести пацієнту для встановлення діагнозу?

A. Електрокардіографію

- В. Біохімічний аналіз крові
- С. Загальний аналіз крові
- D. Загальний аналіз сечі
- Е. Рентгенографію ОГК

342. Який безумовний рефлекс проявляється відкриванням рота під час натискування на підвищення великого пальця новонародженої дитини?

A. Долонно-ротовий Бабкіна

- В. Хапальний Робінсона
- С. Охоплювальний рефлекс Моро
- D. Автоматичної ходи
- Е. Повзання

343. У чоловіка після ДТП об'єктивно спостерігається: стегно деформоване, виявляється рухомість і крепітація відламків у середній третині стегна, локальна болючість під час

пальпації й осьового навантаження. Класифікуйте вид травми.

A. Перелом стегнової кістки

- B. Розрив м'язів стегна
- C. Синдром тривалого стискання
- D. Позиційний синдром
- E. Перелом шийки стегнової кістки

344. Яка анатомічна ділянка тіла використовується для проведення дитині внутрі-шньошкірної проби Манту?

A. Внутрішня поверхня передпліччя

- B. Зовнішня поверхня передпліччя
- C. Передньозовнішня поверхня стегна
- D. Підлопаткова ділянка
- E. Латеральна поверхня живота

345. Яку невідкладну допомогу треба надати дитині з діагнозом: стенозуючий ларинготрахеїт IV ступеня?

A. Трахеостомію

- B. Інгаляцію зволоженого кисню
- C. Застосувати відволікаючу терапію
- D. Інгаляцію протинабрякових препаратів
- E. Увести антигістамінні препарати

346. У жінки з терміном вагітності 35-36 тижнів на тлі прееклампсії об'єктивно спостерігається: загальний стан середнього ступеня тяжкості, шкіра бліда, пульс — 98 уд/хв, АТ — 140/90 мм рт.ст. Матка збільшена відповідно терміну вагітності, напружена, асиметрична у вигляді локального випинання та болюча під час пальпації. Серцебиття плода — 160-170 уд/хв, глухе. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

- B. Гіпертонія матки
- C. Передлежання плаценти
- D. Загроза розриву матки
- E. Загроза передчасних пологів

347. До якого віку у немовлят утримується гіпертонус м'язів-згиначів на нижніх кінцівках?

A. 3-4 місяців

B. 2-3 місяців

- C. 5-6 місяців
- D. 4-5 місяців
- E. 6-7 місяців

348. У шестимісячного немовляти об'єктивно спостерігається: маса тіла — 9400 г (при народженні — 3200 г), блідість та сухість шкіри і слизових оболонок, збільшення товщини підшкірної жирової клітковини, зниження тургору тканин, м'язова гіпотонія. З анамнезу відомо: перебуває на штучному вигодовуванні, часто хворіє на ГРВІ. Для якого патологічного стану характерні ці клінічні ознаки?

A. Паратрофії

B. Гіпотрофії

C. Рахіту

- D. Спазмофілії
- E. Простої диспепсії

349. У дворічної дитини спостерігається підвищення температури тіла до 39°C, посилення слиновиділення, погіршення апетиту. Під час огляду на гіперемованій слизовій оболонці ротової порожнини виявлено білі бляшки, оточені червоним обідком. Який тип стоматиту у дитини?

- A. Афтозний
- B. Катаральний
- C. Ангулярний
- D. Кандидозний**
- E. Виразковий

350. У чоловіка після фізичного навантаження раптово виник «кинджальний біль» в епігастральній ділянці. Об'єктивно спостерігається: язик сухий, шкіра покрита холодним липким потом, дошкоподібне напруження м'язів передньої черевної стінки. В анамнезі у чоловіка — виразкова хвороба шлунку. Для якого ускладнення характерні ці клінічні прояви?

- A. Перфорації**
- B. Пенетрації
- C. Малігнізації
- D. Шлункової кровотечі
- E. Стенозу ворота шлунку

351. Жінка віком 59 років скаржиться на надмірну спрагу та сухість у роті, повільне загоєння ран, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів, часте сечовипускання, нечіткий зір. Яке лабораторне дослідження треба насамперед призначити жінці?

- A. Аналіз крові на глюкозу**
- B. Загальний аналіз крові
- C. Аналіз сечі за Зимницьким
- D. Бакпосів урогенітальних виділень
- E. Аналіз сечі на α -амілазу

352. Пацієнт скаржиться на швидку втомлюваність, загальну слабкість, апатію, депресію, втрату маси тіла, періодичний біль у животі, потемніння шкірних покривів. Об'єктивно спостерігається: гіперпигментація шкіри (бронзовий колір) та слизових оболонок, частіше помітну навколо губ і слизовій оболонці щік, а також на відкритих ділянках тіла, у складках та місцях тертя, АТ — 85/50 мм рт.ст, пульс — 90 уд/хв. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Хвороби Аддісона**
- B. Нецукрового діабету
- C. Акромегалії
- D. Цукрового діабету
- E. Феохромоцитоми

353. Жінка, за годину після вживання полуниці, скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок, що супроводжується свербіжем, головний біль, загальну слабкість. Об'єктивно спостерігається: підвищення температури тіла до 38,5°C*, висипання на шкірі у вигляді папул. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- A. Кропив'янки**
- B. Геморагічного васкуліту

- С. Сироваткової хвороби
- D. Корости
- Е. Полінозу

354. Чоловік віком 35 років, який працює на складі хімічних речовин, скаржиться на запаморочення, зниження гостроти зору, блювання та спастичний біль у животі. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, зіниці різко звужені, реакція їх на світло відсутня, підвищена пітливість, слинотеча та бронхорея, пульс — 46 уд/хв, АТ — 90/50 мм рт.ст, часте сечовипускання. Для якого отруєння характерні ці клінічні симптоми?

A. Фосфоорганічними сполуками

- B. Серцевими глікозидами
- C. Етиловим спиртом
- D. Метиловим спиртом
- Е. Чадним газом

355. Чоловік віком 35 років після фізичного навантаження відчув різкий нападopodobний біль у поперековій ділянці, що іррадіює в промежину та супроводжується частими позивами до сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, шкіра бліда, сеча кров'яни-ста. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

A. Ниркової коліки

- B. Жовчної коліки
- C. Гострого пієлонефриту
- D. Гострого уретриту
- Е. Гострого циститу

356. Під час введення протиправцевої сироватки у пацієнта раптово виникли загальна слабкість, шум у вухах, головний біль, запаморочення, відчуття жару у всьому тілі, нудота. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, АТ — 80/40 мм рт.ст, пульс — 130 уд/хв. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

A. Анафілактичного шоку

- B. Серцевої астми
- C. Кропив'янки
- D. Набряку Квінке
- Е. Набряку легень

357. Який діагностичний тест проводиться дітям і підліткам з метою раннього виявлення туберкульозу?

A. Пробу Манту

- B. Щеплення БЦЖ
- C. Бактеріологічне дослідження мокротиння
- D. Біохімічне дослідження крові
- Е. Загальний аналіз крові

358. Який вид пов'язки використовується для герметизації рани грудної клітки у разі відкритого пневмотораксу?

A. Оклюзійна

- B. Черепашача
- C. Колосоподібна
- D. Дезо

Е. Спіралеподібна

359. Жінка віком 35 років після вжалення оси скаржиться на раптовий набряк губ, обличчя та повік, осиплість голосу. Об'єктивно спостерігається: обличчя набрякле, бліде, очні щілини звужені, АТ — 110/70 мм рт.ст, пульс — 74 уд/хв. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

А. Набряку Квінке

- В. Кропив'янки
- С. Анафілактичного шоку
- Д. Сироваткової хвороби
- Е. Полінозу

360. У чоловіка віком 48 років спостерігається блювання «кавовою гущею» об'ємом до 2-х літрів та поява рідких випорожнень по типу «мелени» об'ємом близько 1-го літра. Під час огляду виявлено: шкіра волога, блідо-ціанотична, холодна, АТ — 80/40 мм рт.ст, пульс — 132 уд/хв, ЧД — 24/хв, ЦВТ — 0 мм рт.ст, олігурія. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

А. Гіповолемічний шок

- В. Кардіогенний шок
- С. Анафілактичний шок
- Д. Гостра кишкова інфекція
- Е. Харчове отруєння

361. Вкажіть злоякісну пухлину, що розвивається із сполучної тканини.

А. Саркома

- В. Папілома
- С. Міома
- Д. Фіброма
- Е. Ангіома

362. Жінка, яка потрапила в ДТП, після відновлення свідомості скаржиться на головний біль, головокружіння, шум у вухах, пітливість, нудоту, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: ушкодження кісток черепа не виявлено, обличчя бліде, пульс — 92 уд/хв, АТ — 135/85 мм рт.ст. Для якого ушкодження характерні ці клінічні прояви?

А. Струсу головного мозку

- В. Забою головного мозку
- С. Перелому основи черепа
- Д. Перелому склепіння черепа
- Е. Стиснення головного мозку

363. У жінки віком 50 років об'єктивно спостерігається: маскоподібне обличчя, кисетоподібні зморшки навколо рота, ущільнення шкіри та деформації кистей рук із зведенням пальців («пташина лапа»), збліднення та оніміння пальців рук і ніг. Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

А. Системної склеродермії

- В. Ревматоїдного артриту
- С. Системного червоного вовчака
- Д. Вузликового поліартеріїту
- Е. Остеоартрозу

364. Юнак віком 19 років скаржиться на сухий кашель, першіння у горлі, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37.2°C. Хворіє 3-й день. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, шкіра звичайного кольору. Перкуторно над легеньми — ясний легеневий звук. Аускультативно вислуховуються сухі хрипи. ЧД — 18\хв, пульс — 80 уд\хв, ритмічний, АТ — 120\70 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Гострого бронхіту

- B. Бронхіальної астми
- C. Негоспітальної пневмонії
- D. Бронхоектатичної хвороби
- E. Туберкульозу легень

365. Чоловік віком 39 років отримав хімічний опік нижньої кінцівки сірчаною кислотою. Вкажіть невідкладні дії на догоспітальному етапі під час надання допомоги пацієнту.

A. Тривале промивання ураженої ділянки проточною водою

- B. Накладання пов'язки з фурациліном на уражену ділянку
- C. Направлення до опікового центру
- D. Виконання хімічної нейтралізації
- E. Промивання ураженої ділянки етиловим спиртом

366. Чоловік віком 45 років за 2 тижні після травмування нижньої кінцівки з пошкодженням шкіри скаржиться на тягучий біль та посмикування м'язів у ділянці рани, утруднене ковтання. Об'єктивно спостерігається: підвищений тонус м'язів і сухожильних рефлексів, напруження м'язів, судоми жувальних м'язів. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Правця

- B. Дифтерії
- C. Дерматоміозиту
- D. Системного червоного вовчака
- E. Сказу

367. Які з нижченаведених симптомів характерні для поліомієліту?

A. Парези та паралічі

- B. Жовтяниця шкіри та склер
- C. Спазматичний кашель та репризи
- D. Вологий кашель та виділення іржавого мокротиння
- E. Геморагічний висип на шкірі та блювання

368. До пологового будинку шпиталізовано жінку з поперечним положенням плода у терміні вагітності 38 тижнів. Вкажіть тактику ведення пологів.

A. Кесарів розтин

- B. Накладання акушерських щипців
- C. Витягання плода за тазову частину
- D. Вакуум-екстракція плода
- E. Плродурійнівна операція

369. У шестирічної дитини, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, діагностовано епідемічний паротит. Вкажіть тривалість карантину для контактних дітей, які не хворіли та не щеплені проти цього захворювання.

A. 21 день

- В. 14 днів
- С. 10 днів
- Д. 9 днів
- Е. 7 днів

370. У дворічної дитини з першого дня хвороби спостерігаються рясні слизові виділення з носа, кашель та підвищення температури тіла до 38°C*. Під час огляду виявлено: застійна гіперемія слизової оболонки ротової частини глотки, набряк язичка, кон'юнктивіт, збільшення шийних лімфовузлів. Для якого захворювання характерні ці клінічні ознаки?

А. Аденовірусної інфекції

- В. Грипу
- С. Краснухи
- Д. Епідемічного паротиту
- Е. Кору

371. Жінка віком 23 роки скаржиться на рясні пінисті з неприємним запахом виділення з піхви сіро-жовтого кольору, печію та свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів. В анамнезі: безладне статеве життя. Під час гінекологічного огляду виявлено: слизова оболонка піхви гіперемована, набрякла, спостерігаються пінисті гнійні виділення та ерозії на шийці матки. Для якого захворювання характерні ці клінічні ознаки?

А. Трихомонадного кольпіту

- В. Хламідіозу
- С. Бактеріального вагінозу
- Д. Кандидозу
- Е. Гонорейного ендоцервіциту

372. Чоловік скаржиться на нестерпний біль у I пальці верхньої кінцівки, що посилюється під час його рухів. Об'єктивно спостерігається: гіперемія, виражене напруження та набряк всього пальця, підвищення місцевої температури. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Панарицію

- В. Флегмони
- С. Бешихи
- Д. Абсцесу
- Е. Еризипилоїду

373. Жінку вкусив бродячий собака. Яким розчином треба промити укушену рану насамперед?

А. Мильним розчином

- В. 3%-м розчином перекису водню
- С. Розчином фурациліну
- Д. 96%-м розчином етилового спирту
- Е. 70%-м розчином етилового спирту

374. Пацієнт скаржиться на стискаючий біль у ділянці серця, часте серцебиття. З анамнезу відомо, що рік тому перехворів на ревматичну хворобу серця. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульсація сонних артерій («танок каротид»), ритмічне кивання голови. Пульс високий і швидкий — 92 уд/хв, АТ — 130/40 мм рт.ст, під час аускультатії серця в точці Боткіна вислуховується діастолічний шум. Яка вада серця розвинулася у пацієнта?

А. Аортальна недостатність

- В. Мітральний стеноз
- С. Недостатність двостулкового клапана
- Д. Аортальний стеноз
- Е. Недостатність тристулкового клапана

375. У чоловіка віком 30 років попередній діагноз: первинний сифіліс. Який метод діагностики використовується для підтвердження діагнозу?

А. Реакція Вассермана

- В. Загальний аналіз крові
- С. Реакція імунофлуоресценції
- Д. Ревмопроби
- Е. Загальний аналіз сечі

376. Яке з нижченаведених захворювань є найчастішою причиною жіночого безпліддя?

А. Хронічний аднексит

- В. Неспецифічний кольпіт
- С. Стафілококовий бартолініт
- Д. Гострий гнійний цистит
- Е. Бактеріальний вагіноз

377. Чоловік скаржиться на біль у ділянці промежини біля відхідника, підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається: болюче, набрякле, флюктуюче та гіперемійоване утворення в ділянці промежини. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Гострого парапроктиту

- В. Раку прямої кишки
- С. Геморою
- Д. Випадіння прямої кишки
- Е. Тріщини відхідника

378. Чоловік віком 60 років скаржиться на біль у ділянці промежини. З анамнезу відомо: упродовж останніх 6-ти місяців спостерігаються тупий біль, виділення крові та слизу під час акту дефекації, діарея чергується з закрепками, зменшення маси тіла. Під час пальцевого дослідження в прямій кишці виявлено бугристе малорухоме ущільнення. Для якого захворювання характерні ці клінічні ознаки?

А. Раку прямої кишки

- В. Анальної тріщини
- С. Геморою
- Д. Поліпу прямої кишки
- Е. Парапроктиту

379. У п'ятирічної дитини під час оцінювання проби Манту виявлено папулу діаметром 18 мм. Інтерпретуйте результат проби.

А. Гіперергічна

- В. Негативна
- С. Позитивна
- Д. Сумнівна
- Е. Віраж

380. Який із нижченаведених лікарських засобів використовується під час надання

невідкладної допомоги дитині з діагнозом: анафілактичний шок, на догоспітальному етапі?

A. Преднізолон

B. Фуросемід

C. Папаверин

D. Анальгін

E. Кордіамін

381. Вкажіть небезпечне ускладнення гіпертермічного синдрому у дітей раннього віку.

A. Фебрильні судоми

B. Бронхоспазм

C. Шлунково-кишкова кровотеча

D. Кишкова коліка

E. Гнвагінація

382. Вкажіть термін припинення виділення лохій із статевих шляхів у породіллі в післяпологовому періоді.

A. До кінця 5-6-го тижня

B. До кінця 2-3-го тижня

C. На 10-й день

D. На 7-й день

E. На 3-й день

383. Який із нижченаведених симптомів характерний для гострого стенозуючого ларинготрахеїту 11 ступеня?

A. Гнспіраторна задишка

B. Експіраторна задишка

C. Тучний вдих («крик півня»)

D. Дистанційні свистячі хрипи

E. Плівчасті нальоти на мигдаликах

384. У пацієнта з діагнозом: гострий інфаркт міокарда, з'явилися інспіраторна задишка, кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, виражена блідість шкіри, профузна пітливість, тахікардія. Аускультативно над поверхнею легень вислуховуються вологі дрібнопухирчасті хрипи. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

A. Набряк легень

B. Негоспітальна пневмонія

C. Кардіогенний шок

D. Легенева кровотеча

E. Тромбоемболія легеневої артерії

385. Жінка віком 49 років скаржиться на слабкість, головний біль, порушення оваріально-менструального циклу, ріст волосся на обличчі. Об'єктивно спостерігається: ожиріння з перерозподілом підшкірної жирової клітковини на обличчя, шию та тулуб, стоншення кінцівок, смуги розтягнення (стрії) на шкірі передньої черевної стінки, гіперпігментація шкіри в місцях тертя. Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

A. Хвороби Іценко-Кушинга

B. Акромегалії

- С. Гігантизму
- D. Феохромоцитоми
- Е. Гіпотиреозу

386. Який лікарський засіб використовується під час надання невідкладної допомоги у разі виникнення у пацієнта шлуночкової пароксизмальної тахікардії?

- A. 10%-й розчин лідокаїну**
- B. 0,25%-й розчин верапамілу
- С. 2%-й розчин еуфіліну
- D. 0,1 %-й розчин атропіну
- Е. 50%-й розчин анальгіну

387. В якому віці у дітей відбувається другий фізіологічний перехрест у лейкоцитарній формулі?

- A. 5-6 років**
- B. 7-8 років
- С. 14—15 років
- D. 1-2 роки
- Е. 10—12 років

388. Вкажіть період внутрішньоутробного розвитку від моменту зачаття до народження дитини.

- A. Гестаційний**
- B. Неонатальний
- С. Інтранатальний
- D. Постнатальний
- Е. Перинатальний

389. Чоловік віком 40 років під час фізичного навантаження раптово відчув сильний головний біль, спостерігалися блювання, шум у вухах та нетривала непритомність. Об'єктивно спостерігається: пацієнт збуджений, пульс — 62 уд/хв, АТ— 140/90 мм рт.ст, підвищення температури тіла до 38°C0, виявляються ригідність потиличних м'язів та симптом Керніга, вогнищева неврологічна симптоматика відсутня. Для якої патології характерні ці клінічні прояви?

- A. Субарахноїдального крововиливу**
- B. Ішемічного інсульту
- С. Менінгіту
- D. Енцефаліту
- Е. Геморагічного інсульту

390. Чоловік віком 60 років скаржиться на інтенсивний, пекучий біль за грудниною, що триває більше 30 хвилин і не минає після приймання нітрогліцерину, іррадіює у ліву руку та нижню щелепу, супроводжується страхом смерті. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта тяжкий, свідомість сплутана, шкіра бліда покрита холодним липким потом, тони серця глухі, пульс — 92 уд/хв, слабкого наповнення, ритмічний, АТ — 60/30 мм рт.ст. На ЕКГ: ознаки Q-інфаркту. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- A. Кардіогенний шок**
- B. Порушення серцевого ритму
- С. Стабільна стенокардія

- D. набряк легень
- E. Гострий перикардит

391. Чоловік віком 20 років скаржиться на загальне нездужання, підвищення температури тіла до 38,9°C, інтенсивний біль у поперековій ділянці, переважно з лівого боку, часте болісне сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: стан середньої тяжкості, шкіра звичайного кольору, волога, гаряча на дотик, пульс — 98 уд/хв, АТ — 120/70 мм рт.ст, різко позитивний симптом Пастернацького зліва. Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

A. Гострого пієлонефриту

- B. Гострого циститу
- C. Гострого гломерулонефриту
- D. Хронічного гломерулонефриту
- E. Сечокам'яної хвороби

392. Чоловік віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, задишку під час ходьби, пощипування язика, втрату смакових відчуттів, порушення сну. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда з лимонно-жовтим відтінком, склери субіктеричні, язик малиново-червоного кольору з атрофією сосочків. Тони серця приглушені, пульс — 92 уд/хв, АТ — 135/80 мм рт.ст. Для якого виду анемії характерні ці клінічні симптоми?

A. B12-дефіцитної

- B. Залізодефіцитної
- C. Постгеморагічної
- D. Апластичної

393. Гемолітичної біль, загальну слабкість, що з'являються в перший день менструації. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

A. Альгодисменореї

- B. Передменструального синдрому
- C. Мастопатії
- D. Посткастраційного синдрому
- E. Вірильного синдрому

394. У вісімнадцятирічної дівчини, яка відмовляється від вживання їжі у зв'язку з психічним розладом, спостерігається відсутність менструації. Яке порушення менструальної функції, наймовірніше, у дівчини?

A. Аменорея на тлі нервової анорексії

- B. Несправжня аменорея
- C. Аменорея внаслідок синдрому Морганьї-Стюарта-Мореля
- D. Первинна гіпофункція яєчників
- E. Аменорея внаслідок гіпотиреозу

395. Вкажіть діагностичний ендоскопічний метод дослідження слизової оболонки прямої, а також дистального відділу сигмоподібної кишки.

A. Ректороманоскопія

- B. Колоноскопія
- C. Фіброгастроскопія
- D. Лапароскопія
- E. Цистоскопія

396. У трирічної дитини діагностовано діабетичну кому. З якого способу введення інсуліну потрібно розпочати невідкладну допомогу дитині?

- A. Внутрішньовенно струминно
- B. Сублінгвально
- C. Підшкірно
- D. Внутрішньовенно краплинно**
- E. Внутрішньошкірно

397. У роділлі з терміном вагітності 41 тиждень під час перебігу II періоду пологів серцебиття плода стало аритмічним, частота 68-84 уд/хв, між потугами не відновлюється, сіднички плода розташовані на тазовому дні. Яка наступна тактика ведення пологів у цьому разі?

- A. Екстракція плода за тазову частину
- B. Накладання акушерських щипців
- C. Кесарів розтин**
- D. Операція комбінованого повороту плода на ніжку
- E. Проведення плодоруйнівної операції

398. Чоловік віком 46 років скаржиться на постійний біль у пальцях кистей рук, обмеження рухів та ранкову скутість у периферичних суглобах. Об'єктивно спостерігається: шкіра кистей бліда, стоншена, симетричний набряк міжфалангових суглобів, пальці деформовані, веретеноподібні, ульнарна девіація кистей. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- A. Ревматоїдного артриту**
- B. Системного червоного вовчака
- C. Системної склеродермії
- D. Гострої ревматичної гарячки
- E. Дерматоміозиту

399. Під час обстеження пацієнта віком 35 років з'ясувалося, що частота пульсу у нього — 96 уд/хв. Вкажіть цей патологічний стан.

- A. Тахікардія**
- B. Гіпертермія
- C. Гіпертензія
- D. Брадикардія
- E. Тахіпное

400. Пацієнту діагностовано інфаркт міокарда. Який лікарський засіб використовуюється для профілактики тромбоемболічних ускладнень у цьому разі?

- A. Гепарин**
- B. Строфантин
- C. Аміодарон
- D. Дофамін
- E. Лідокаїн

401. Чоловік віком 55 років, який хворіє на виразкову хворобу шлунку, упродовж останнього року скаржиться на постійний ниючий біль у епігастрії, погіршення апетиту, слабкість, відразу до м'ясної їжі. Яке ускладнення виразкової хвороби шлунку, найімовірніше, розвинулося у пацієнта?

- A. Малігнізація виразки**

- В. Перфорація виразки
- С. Пенетрація виразки
- Д. Шлункова кровотеча
- Е. Стеноз ворота шлунку

402. Якого положення тіла треба надати дитині у разі виникнення носової кровотечі під час надання невідкладної допомоги?

- А. Напівсидяче з нахилою донизу головою**
- В. Горизонтальне з підвищеним головним кінцем
- С. Напівсидяче з нахилою назад голову
- Д. Горизонтальне з підвищеними нижніми кінцівками
- Е. Лежачи на лівому боці

403. За якою формулою вираховується маса тіла дитини віком 2-11 років? (n — кількість років)

- А. $10 + (2 \times n)$
- В. $20 + (4 \times n)$
- С. $20 + (n - 10)$
- Д. $30 + 5 (n - 1)$
- Е. $30 + 4 (n - 1)$**

404. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до хірургічного відділення з різано-рваною раною верхньої третини лівого стегна за 6 годин з моменту травми. Вкажіть основний захід профілактики гнійно-септичних ускладнень у цьому разі.

- А. Первинна хірургічна обробка рани**
- В. Уведення протигангренозної сироватки
- С. Уведення протиправцевого анатоксину
- Д. Призначення антибіотиків
- Е. Призначення сульфаніламідних препаратів

405. У чоловіка віком 63 роки за 2 години після їжі з'явилися скарги на біль у животі, затримку дефекації і газів. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, шкіра бліда, язик сухий, живіт здутий, напружений, пульс — 124 уд/хв, АТ — 85/60 мм рт.ст, виявлено позитивний синдром Валя та шум кишкового плеску. Для якої патології характерні ці клінічні ознаки?

- А. Кишкової непрохідності**
- В. Ниркової коліки
- С. Гострого апендициту
- Д. Гострого панкреатиту
- Е. Гострого перитоніту

406. У чоловіка віком 32 роки раптово виникло блювання «кавовою гущею». В анамнезі: виразкова хвороба шлунку. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, холодний липкий піт, АТ — 90/70 мм рт.ст., пульс — 104 уд/хв. Який гемостатичний препарат треба увести пацієнту насамперед?

- А. 5%-й розчин діцинону**
- В. 50%-й розчин анальгіну
- С. 0,2%-й розчин платифіліну
- Д. 0,1 %-й розчин атропіну
- Е. 1%-й розчин дімедролу

407. Як називається доза лікарських засобів, що може спричинити отруєння пацієнта?

A. Токсична

B. Терапевтична

C. Фармакологічна

D. Хімічна

E. Добова

408. Чоловік скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до $39,5^{\circ}\text{C}$, біль у грудній клітці, кашель із виділенням мокротиння, задишку. Об'єктивно спостерігається: рум'янець на щоках, ЧД — $28/\text{хв}$, під час пальпації грудної клітки — посилене голосове тремтіння справа, перкуторно — вкорочення перкуторного звуку справа, аускультативно — крепітація справа, пульс — $96 \text{ уд}/\text{хв}$, АТ — $100/60 \text{ мм рт.ст.}$ Для якого захворювання характерні ці клінічні ознаки?

A. Пневмонії

B. Гострого бронхіту

C. Сухого плевриту

D. Раку легень

E. Туберкульозу легень

409. Чоловік віком 37 років скаржиться на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа слизово-гнійного характеру з неприємним запахом, біль у надбрівній ділянці, що посилюється під час постукування та різкий біль при натисканні у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Для якого захворювання приноскових пазух характерні ці клінічні ознаки?

A. Фронтиту

B. Етмоїдиту

C. Риніту

D. Гаймориту

E. Сфеноїдиту

410. За якою формулою вираховується середній зріст дитини, старшої 1-го року? (n — кількість років)

A. $75 + (5 \times n)$

B. $76 + (2 \times n)$

C. $80 + (2 \times n)$

D. $90 + (n - 1)$

E. $100 + (n - 5)$

411. У шестирічної дитини періодично вночі виникають напади сухого кашлю, що супроводжуються експіраторною задишкою та дистанційними свистячими хрипами на видиху, блідістю шкіри обличчя з ціанотичним відтінком. Під час нападу дитина займає вимушене положення тіла (сидить, нахилившись уперед, спираючись на руки). Для якого захворювання характерні ці клінічні симптоми?

A. Бронхіальної астми

B. Гострого трахеїту

C. Кашлюку

D. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту

E. Обструктивного бронхіту

412. У дитини на 4-й день після народження спостерігається виділення сечі жовтувато-цегляного кольору, що залишає на пелюшках червонястий слід. Загальний стан дитини задовільний. Для якого перехідного стану новонародженого це характерно?

A. Сечокиислого інфаркту

B. Статевого кризу

C. Транзиторного дисбактеріозу

D. Транзиторної еритеми

E. Транзиторної лихоманки

413. Жінка віком 23 роки скаржиться на різкий біль унизу живота зліва з іррадіацією в пряму кишку, загальну слабкість та запаморочення. З анамнезу відомо, що остання менструація була 2 місяці тому. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, АТ—90/60 мм рт.ст, пульс — 110 уд/хв, слабкого наповнення, позитивний симптом «крику Дугласа». Для якого патологічного стану характерні ці клінічні ознаки?

A. Порушеної позаматкової вагітності

B. Апоплексії яєчника

C. Гострого апендициту

D. Загрози переривання вагітності

E. Сальпінгоофориту

414. У жінки віком 42 роки упродовж де-кількох годин розвинулися збудження, дифузна пітливість, головний біль, відчуття жару у тілі, блювання, профузна діарея, безладні рухи кінцівок. Об'єктивно спостерігається: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, температура тіла — 39°C, АТ — 190/110 мм рт.ст, тахікардія (пульс — 160 уд/хв), порушення серцевого ритму, тахіпное (ЧД — 40/хв). Для якого патологічного стану характерні ці клінічні прояви?

A. Тиреотоксичного кризу

B. Гіпотиреоїдної коми

C. Гіпертензивного кризу

D. Серцевої астми

E. Діабетичної коми

415. Яка дієта призначається пацієнтам упродовж 2-3 днів для підготовки до рентгенологічного дослідження товстого кишківника (іригоскопії)?

A. Безшлакова

B. Безгемоглобінова

C. Безсольова

D. Калійумісна

E. Іодоумісна

416. Під час переливання еритроцитарної маси у пацієнта виник біль у поперековій ділянці та спостерігається виділення сечі бурого кольору з уретрального катетера. Для якого гемотрансфузійного ускладнення характерні ці симптоми?

A. Гемотрансфузійного шоку

B. Цитратного шоку

C. Повітряної емболії

D. Алергічної реакції

E. Пірогенної реакції

417. У трирічної дитині спостерігається неспокій, погіршення апетиту, свербіж у періанальній ділянці. Яке дослідження необхідно призначити дитині насамперед?

A. Зішкріб на ентеробіоз

- B. Аналіз калу на приховану кров
- C. Біохімічний аналіз крові
- D. ФГДС
- E. Дуоденальне зондування

418. В якому віці дитини, згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, проводиться перше щеплення проти краснухи?

A. 12 місяців

- B. 1 місяць
- C. 6 місяців
- D. 18 місяців
- E. 2 місяці

419. У шестирічної дитини, яка хворіє на скарлатину, спостерігається позитивний симптом «щипка». На що вказує цей симптом?

A. Підвищену ламкість судин шкіри

- B. Гіпертонус периферичних судин
- C. Гіпотонус периферичних судин
- D. Знижений тургор шкіри
- E. М'язову дистонію

420. У чоловіка без свідомості спостерігається відсутність дихання, пульсу на магістральних судинах та усіх рефлексів, закривання м'язів, розм'якшення очних яблук, сухість та помутніння рогівки, поява трупних плям на шкірі. Оцініть стан чоловіка.

A. Біологічна смерть

- B. Клінічна смерть
- C. Смерть мозку
- D. Кома
- E. Передагонія

421. Який розмір площини таза називається акушерською або справжньою кон'югатою?

A. Прямий розмір площини входу в малий таз

- B. Прямий розмір широкої частини поро-жнини малого таза
- C. Прямий розмір вузької частини поро-жнини малого таза
- D. Поперечний розмір площини входу в малий таз
- E. Поперечний розмір широкої частини порожнини малого таза

422. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода при I позиції, повздовжньому положенні та головному передлежанні.

A. Ліворуч нижче пупка

- B. Праворуч вище пупка
- C. Ліворуч вище пупка
- D. Праворуч нижче пупка
- E. Ліворуч на рівні пупка

423. Вкажіть розрив шийки матки III ступеня.

A. Досягає склепіння піхви

B. Не більше 1 см

C. Не більше 2 см

D. Понад 2 см, не досягає склепіння піхви

424. Яка з нижченаведених операцій відносяться до малих гінекологічних операцій?

A. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

B. Резекція яєчника

C. Екстирпація матки

D. Тубектомія (видалення маткової труби)

E. Надпівхова ампутація матки без придатків

425. За результатами аналізу сечі за методом Зимницького виявлено, що добовий діурез пацієнта складає 350 мл. Інтерпретуйте результат аналізу.

A. Олігурія

B. Поліурія

C. Ніктурія

D. Полакіурія

E. Ішурія

426. У пацієнта на другий день після внутрішньом'язової ін'єкції в місці введення ліків з'явилися біль, ущільнення та гіперемія. Яке постін'єкційне ускладнення виникло у пацієнта?

A. Інфільтрат

B. Некроз тканини

C. Медикаментозна емболія

D. Алергічна реакція

E. Повітряна емболія

427. Який біологічний матеріал треба взяти у новонародженої дитини для проведення скринінг-тесту на фенілкетонурію?

A. Кров

B. Сечу

C. Слину

D. Випорожнення

E. Піт

428. У дитини спостерігається виражена сонливість, дезорієнтація в просторі та часі, прокидається під впливом сильних зовнішніх подразників та мляво і повільно відповідає на запитання. Вкажіть ступінь порушення свідомості у дитини.

A. Ступор

B. Помірна кома

C. Глибока кома

D. Ясна свідомість

E. Термінальна кома

429. Чоловік за дві доби після вживання м'ясних консервів скаржитися на головний біль, зниження гостроти зору, двоїння в очах, порушення ковтання, серцебиття, м'язову слабкість, діарею. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

A. Ботулізму

- В. Лептоспірозу
- С. Вірусного гепатиту
- Д. Харчової токсикоінфекції
- Е. Малярії

430. У дитини переважно вночі спостерігаються напади спазматичного кашлю, що складаються з серії видихальних кашльових поштовхів, відокремлених репризами, та закінчуються відходженням густого в'язкого склоподібного мокротиння або блюванням. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Кашлюку

- В. Гострого бронхіту
- С. Негоспітальної пневмонії
- Д. Гострого стенозуючого ларинготрахеїту
- Е. Бронхіальної астми

431. У п'ятнадцятирічного юнака початок захворювання супроводжувався загальною слабкістю, погіршенням апетиту, свербіжем шкіри та підвищенням температури тіла. За 3 дні після цього з'явилися нудота, дворазове блювання, біль у правому підребер'ї. На 6-й день хвороби спостерігається жовтяниця склер та шкіри, потемніння сечі, знебарвлення калу. Для якого захворювання характерна ці клінічні симптоми?

А. Вірусного гепатиту А

- В. Лептоспірозу
- С. Харчової токсикоінфекції
- Д. Загострення хронічного холециститу
- Е. Гострого панкреатиту

432. Яке захворювання є протипоказанням для застосування діадинамотерапії?

А. Тромбофлебіт

- В. Остеохондроз
- С. Нейроміозит
- Д. Невралгія
- Е. Радикуліт

433. Чоловік віком 35 років скаржиться на багаторазове блювання та рясні часті (до 20 разів на добу) випорожнення у вигляді «рисового відвару». Об'єктивно спостерігається: температура тіла 36,2°C. ознаки зневоднення (загострення рис обличчя, хриплий голос, олігурія). Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Холери

- В. Черевного тифу
- С. Шигельозу
- Д. Ботулізму
- Е. Вірусного гепатиту

434. У чоловіка віком 30 років об'єктивно спостерігається: на шкірі волосистої частини голови та симетричних розгинальних поверхнях кінцівок виявлено висип у вигляді вузликів і бляшок рожево-червоного кольору різної інтенсивності, покритих сухими сріблястими лусочками, супроводжується свербіжем. З анамнезу відомо, що висип часто рецидивує, особливо в осінньо-зимовий період. Для якого захворювання характерні ці клінічні ознаки?

А. Псоріазу

- В. Червоного плоского лишая
- С. Системного червоного вовчака
- Д. Сухої себореї
- Е. Нейродерміту

435. Чоловік скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C. біль у животі та часті (до 7-8 разів на добу), рідкі випорожнення зеленого кольору з домішками слизу та прожилками крові («ректальний плевок»). Під час пальпації живота виявляється болюча і спазмована сигмоподібна кишка. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Шигельозу

- В. Сальмонельозу
- С. Лептоспірозу
- Д. Холери
- Е. Ботулізму

436. У чоловіка після переохолодження з'явилися скарги на неможливість заплющити праве око, сльозотечу, нечітку мову. Об'єктивно спостерігається: асиметрія обличчя у стані спокою, горизонтальні складки на лобі не утворюються. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Невриту лицьового нерва

- В. Кон'юнктивіту
- С. Невралгії трійчастого нерва
- Д. Шийного остеохондрозу з корінцевим синдромом
- Е. Гіпертиреозу

437. Чоловік віком 58 років, який хворіє на артеріальну гіпертензію, під час пси-хоемоційного збудження раптово втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: гіперемія обличчя, опущення правого кута рота, шумне дихання, щока «вітрилить», підняті праві кінцівки падають «як батого», м'язовий тонус та рефлекс у них знижені, на лівих кінцівках збережені, визначається патологічний рефлекс Бабінського справа, пульс — 100 уд/хв, напружений, АТ— 230/110 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

А. Геморагічний інсульт

- В. Гіпертензивний криз
- С. Менінгіт
- Д. Ішемічний інсульт
- Е. Субарахноїдальний крововилив

438. Вкажіть типовий елемент висипки для червоного плоского лишая.

А. Папула

- В. Пляма
- С. Вузол
- Д. Пухир
- Е. Везикула

439. Одноразові медичні вироби відразу після використання підлягають:

А. Утилізації

- В. Стерилізації
- С. Передстерилізаційній обробці
- Д. Дезінфекції

Е. Сортунню

440. Новонародженій дитині віком 3 днів заплановано щеплення проти туберкульозу. Який шлях введення вакцини БЦЖ?

А. Внутрішньошкірний

В. Внутрішньом'язовий

С. Пероральний

Д. Підшкірний

Е. Внутрішньовенний

441. Під час обстеження хворої дитини 8 років виявлено несиметричні підшкірні крововиливи різного розміру та кольору. У крові - виражена тромбоцитопенія. Яке захворювання можна припустити?

А. Хвороба Верльгофа

В. Гемофілія А

С. Хвороба Шенлейна-Геноха

Д. Кропивниця

Е. Сепсис

442. Пацієнт 34 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на висип, свербіння, печіння, поприлість та біль у ділянці правої гомілки. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки на шкірі з'явився осередок ураження розміром із долоню. Візуально: шкіра гіперемована, межі ураження чіткі, везикуло-пустульозні елементи на периферії осередку ураження. Яке захворювання можна припустити?

А. Екзема

В. Нейродерміт

С. Кропивниця

Д. Токсикодермія

Е. Атопічний дерматит

443. Фельдшера сільської амбулаторії викликали до пацієнта 46 років, у якого після фізичного навантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече. З'явилися нудота та блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений жовтим нальотом, склери субіктеричні. Позитивний симптом Ортнера. Для якої патології характерні такі ознаки?

А. Жовчної коліки

В. Гострого панкреатиту

С. Гострого гепатиту

Д. Ниркової коліки

Е. Гострого гастриту

444. Пацієнт скаржиться на сильний головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння мушок перед очима, АТ - 220/110 мм рт. ст. Такі ознаки характерні для:

А. Гіпертонічного кризу

В. Гіпоглікемічної коми

С. Анафілактичного шоку

Д. Діабетичної коми

Е. Печінкової коми

445. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік 32 років зі скаргами на появу на шкірі тулуба та кінцівок висипки різного розміру, червоного кольору, значне свербіння шкіри, що з'явилися після вживання полуниці. Пульс 80\хв., АТ 120\70 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні такі ознаки?

A. Кропивниця

- B. Гостра судинна недостатність
- C. Анафілактичний шок
- D. набряк Квінке
- E. Гостра серцева недостатність

446. Пацієнтка скаржиться на дзвін у вухах, порушення слуху, періодичні запаморочення, порушення рівноваги. У неї припускають лабіринтит. Лабіринтит - це запалення:

A. Внутрішнього вуха

- B. Слухової труби
- C. Зовнішнього вуха
- D. Соскоподібного відростка
- E. Середнього вуха

447. Фельдшер сільської амбулаторії проводить обстеження вагітної жінки. Термін вагітності 30 тижнів. Положення плода поздовжнє, ІІ позиція, задній вид, головне передлежання. Де найліпше буде прослуховуватись серцебиття плода в цьому разі?

A. Справа, нижче пупка

- B. -20, Справа, вище пупка
- C. -20, Зліва, вище пупка
- D. -20, На рівні пупка
- E. -20, Зліва, нижче пупка
- F. -20, Немає правильної відповіді

448. Дезінфекція, яка проводиться в осередку інфекції після видалення з нього джерела інфекції, називається:

A. Вогнищева заключна

- B. Немає правильної відповіді
- C. Профілактична
- D. Комбінована
- E. Вогнищева поточна

449. У дитини 3 років, яка хворіє ГРВІ, раптово вночі з'явився грубий гавкаючий кашель, інспіраторна задишка, осиплість голосу, дисфагії не спостерігається. Яке ускладнення розвинулось у дитини?

A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

- B. Справжній круп
- C. Гострий обструктивний бронхіт
- D. Бронхіальна астма
- E. Епіглотит

450. Пацієнт 48 років за декілька хвилин після введення звичайної дози інсуліну відчув голод, тремтіння рук, а потім втратив свідомість. Шкіра бліда, волога, судомні посмикування м'язів. Який стан розвинувся у пацієнта?

A. Гіпоглікемічна кома

- В. Печінкова кома
- С. Уремична кома
- Д. Кетоацидотична кома
- Е. Гіперосмолярна кома

451. У дитини 14 років діагностована алкогольна кома. За якою шкалою оцінюється ступінь тяжкості коми?

А. Глазго

- В. Шкаріна
- С. Мазурина
- Д. Апгар
- Е. Сільвермана

452. У пацієнта 28 років, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово виник біль у епігастральній ділянці, блювання кавовою гущею. АТ - 80/40 мм рт. ст. Які з наведених заходів треба застосувати насамперед?

А. Покласти міхур із льодом на живіт

- В. Дати випити гарячу каву
- С. Промити шлунок
- Д. Увести кордіамін
- Е. Покласти грілку на живіт

453. Роділля перебуває у II періоді пологів. На фоні дуже сильної пологової діяльності жінка відчула різкий біль у животі, раптово перейми припинилися, жінка втратила свідомість. АТ 70/40 мм рт. ст. Жінка бліда, вкрита холодним потом. Яке ускладнення пологів виникло?

А. Розрив матки, що відбувся

- В. Вторинна слабкість пологової діяльності
- С. Загроза розриву матки
- Д. Передчасне відшарування плаценти
- Е. Надмірно сильна пологова діяльність

454. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт, який впав із драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки наявність рани з незначною кровотечею. Під час накладання пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Ці симптоми характерні для:

А. Відкритого перелому

- В. Закритого перелому
- С. Розтягнення зв'язок
- Д. Вивиху
- Е. Розриву зв'язок

455. Пацієнт 45 років скаржиться на біль та почервоніння в ділянці правої нижньої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,5°C. У ділянці правої ступні та гомілки відзначається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Укажіть, для якого захворювання характерні такі ознаки:

А. Бешиха

- В. Флегмона
- С. Немає правильної відповіді
- Д. Гострий тромбофлебіт

Е. Подагра

456. Пацієнту проводять дуоденальне зондування. Який подразник необхідно застосувати для отримання міхурової жовчі?

A. 33% розчин магнію сульфату

В. 5% розчин етилового спирту

С. 9% відвар сухої капусти

Д. 0,2% розчин кофеїну

457. Під час дослідження мокротиння виявлені еозинофіли, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A. Бронхіальна астма

В. Гострий бронхіт

С. Негоспітальна пневмонія

Д. Туберкульоз легень

Е. Сухий плеврит

458. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт 27 років зі скаргами на різкий тягнучий біль у нігтьовій фаланзі ГГ пальця правої кисті. Хворіє протягом 3 днів. Об'єктивно: дистальна фаланга набрякла, гіперемована, пальпаторно - різко болюча. Попередній діагноз - панарицій. Яке знеболення треба провести перед розтином панарицію?

A. Анестезія за Лукашевичем-Оберстом

В. Анестезія за методом Волковича

С. Анестезія за методом Кохера

Д. Анестезія за Школьніковим-Селівановим

Е. Анестезія за О. В. Вишневським

459. Перелом якої з наведених кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

A. Плечової

В. П'яткової

С. Надколінка

Д. Великогомількової

Е. Променевої

460. Пацієнт 34 років скаржиться на біль під час дефекації, появу слизу та крові у випорожненнях протягом півроку, хронічне порушення випорожнень. Який метод обстеження буде найінформативнішим для встановлення діагнозу?

A. Ректороманоскопія

В. ФГДС

С. УЗД ОЧП

Д. Цистоскопія

Е. Гастроскопія

461. Чоловік під час пожежі отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

A. 36%

В. 25%

С. 56%

Д. 18%

Е. 42%

462. Вагітна жінка 25 років надійшла до пологового будинку у терміні вагітності 40 тижнів. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ - 100 см; ВДМ - 42 см. Положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода приглушене, 160/хв. Перейми почалися 6 годин тому, болісні; відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Яке ускладнення виникло в пологах у жінки?

А. Загроза розриву матки

- В. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- С. Емболія навколоплідними водами
- Д. Повний розрив матки
- Е. Кінець I періоду пологів

463. Фельдшер ЕМД надає першу допомогу на місці події потерпілому чоловікові, який унаслідок необережності поранив склом ліве передпліччя. Під час огляду в середній третині лівого передпліччя на передній поверхні виявлена глибока рана 4х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечі доцільно обрати у цьому разі?

А. Давляча пов'язка

- В. Надання кінцівці підвищеного положення
- С. Згинання кінцівки в суглобі
- Д. Пальцьове притискання артерії
- Е. Оклюзійна пов'язка

464. У пацієнта, який раніше хворів на виразкову хворобу шлунка, під час підняття важких предметів виникли кинджальний біль в епігастралії, виражена слабкість, блювання. Шкірні покриви вкриті холодним липким потом, АТ - 90/50 мм рт. ст. Для якого патологічного стану ха-рактерні такі ознаки?

А. Перфорація виразки шлунка

- В. Гострого панкреатиту
- С. Пенетрація виразки шлунка
- Д. Малігнізація виразки шлунка
- Е. Гострого холециститу

465. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік зі скаргами на порушення зору, ковтання, мовлення, виражену сухість у роті. Температура тіла нормальна. З анамнезу відомо, що три дні тому їв консервовані гриби домашнього приготування. Яке захворювання можна припустити?

А. Ботулізм

- В. Дифтерія глотки
- С. Отруєння метиловим спиртом
- Д. Поліомієліт
- Е. Гострий менінгіт

466. Пацієнт 63 років скаржиться на переймоподібний біль у животі, затримку дефекації та невідходження газів. Об'єктивно: язик сухий, живіт твердий, болісний. Під час пальпації виявлено позитивний симптом Валя, шум плеску. Який найімовірніший діагноз?

А. Гостра кишкова непрохідність

- В. Гострий холецистит

- С. Гострий панкреатит
- D. Гострий апендицит
- Е. Гострий гастрит

467. За якого виду передлежання плаценти родорозрішення проводиться тільки шляхом кесаревого розтину?

A. Центральне

- В. Крайове
- С. Синклітичне
- D. Асинклітичне
- Е. Бокове

468. До жіночої консультації звернулася першовагітна жінка. Із анамнезу з'ясувалося, що перші рухи плода вона відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Який термін вагітності?

A. 24 тижні

- В. 20 тижнів
- С. 28 тижнів
- D. 16 тижнів

469. Пацієнт 45 років скаржиться на слабкість, серцебиття, задишку, появу заїдів у куточках рота, випадіння волосся, спотворення смаку, нюху, утруднення ковтання сухої твердої їжі. Шкіра бліда, зеленуватого відтінку, суха, язик червоний з атрофією сосочків. У клінічному аналізі крові виявлено: мікроцитоз, анізоцитоз. Яке захворювання можна припустити?

A. Залізодефіцитна анемія

- В. В12-дсфіцитна анемія
- С. Гіпотиреоз
- D. Гемолітична анемія
- Е. Гострий лейкоз

470. Дитині 7 років проведена проба Манту. За який проміжок часу слід оцінити її результат?

A. 72 год.

- В. 48 год.
- С. 24 год.
- D. 12 год.

471. У роділлі в I періоді пологів виник різкий головний біль, порушення зору, АТ 170/100 мм рт. ст. На висоті однієї з потуг у неї виникла короткочасна втрата свідомості та судоми. Яке ускладнення виникло у роділлі?

A. Еклампсія

- В. Прееклампсія важкого ступеня
- С. Відшарування плаценти
- D. Прееклампсія легкого ступеня
- Е. Прееклампсія середнього ступеня

472. Пацієнта, який отримує інсулінотерапію, потрібно попередити про специфічне ускладнення, яке може виникнути в результаті постійного введення інсуліну в одне й теж саме місце. Назвіть це ускладнення:

A. Ліподистрофія

- В. Бешиха

- C. Інфільтрат
- D. Абсцес
- E. Гематома

473. У пацієнтки під час обстеження виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів належить ця патологія?

A. Передракових станів

- B. Трофобластична хвороба
- C. Злоякісні пухлини
- D. Немає правильної відповіді
- E. Доброякісні пухлини

474. Яку артерію використовують найчастіше для дослідження властивостей пульсу?

A. Променеву

- B. Аорту
- C. Стегнову
- D. Сонну
- E. Скроневу

475. У дитини 4 років констатована біологічна смерть. Серед наведених ознак виберіть основний діагностичний критерій біологічної смерті:

A. Симптом котячого ока

- B. Зміна кольору шкіри
- C. Симптом білої плями
- D. Наявність дихання за відсутності серцевої діяльності
- E. Симптом джгута

476. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік 37 років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у ділянці лоба, який посилюється під час пальпації або простукування передньої стінки лобової пазухи, особливо у разі натискання на верхньовнутрішній кут очної ямки. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий фронтит

- B. Гострий риніт
- C. Гострий сфеноїдит
- D. Гострий етмоїдит
- E. Гострий гайморит

477. У пацієнта під час транспортування в реанімаційне відділення у коматозному стані спостерігається гучне, нечасте дихання з глибоким шумним вдихом та посиленням видихом. Визначте патологічний тип дихання:

A. Дихання Куссмауля

- B. Дихання Чейна-Стокса
- C. Дихання Біота
- D. Тахіпноє
- E. Брадіпноє

478. Пацієнтка 39 років скаржиться на біль у суглобах рук і ніг, підвищення температури тіла, загальну слабкість, схуднення. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, на обличчі - гіперемія у вигляді метелика. У крові виявлено LE-клітини. Для якого захворювання це характерно?

A. Системний червоний вовчак

B. Подагра

C. Немає правильної відповіді

D. Дерматополіміозит

E. Вузликовий періартеріїт

479. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся чоловік 30 років, який годину тому отримав ножове поранення нижньої кінцівки. З рани в ділянці гомілки витікає кров темно-червоного кольору, рівномірною струєю. Це характерно для:

A. Венозної кровотечі

B. Артеріальної кровотечі

C. Пульсуючої кровотечі

D. Капілярної кровотечі

E. Немає правильної відповіді

480. Для якого захворювання найбільш характерні наведені симптоми: поліурія, полідипсія, поліфагія, втрата маси тіла?

A. Цукрового діабету

B. Лейкозу

C. Пієлонефриту

D. Гломерулонефриту

E. Анемії

481. Назвіть інструмент, що використовується під час дослідження ходів нориці та введення дренажів:

A. Гудзикуватий зонд

B. Троакар

C. Ложечка Фолькмана

D. Спиця Кіршнера

E. Коловорот

482. Пацієнт скаржиться на кашель із виділенням гнійного мокротиння, особливо вранці, задишку, серцебиття. Хворіє протягом 30 років. Під час огляду кінцівок пальці рук мають вигляд барабаних паличок, нігті - годинникових скелець. Для якого захворювання це характерно?

A. Бронхоектатична хвороба

B. Ексудативний плеврит

C. Бронхіальна астма

D. Туберкульоз легень

E. Рак легень

483. Фельдшер ЕМД під час дослідження пульсу пацієнта виявив, що його частота складає 42/хв. Оцініть цей показник:

A. Брадикардія

B. Тахікардія

C. Аритмія

D. Гіпертермія

E. Дефіцит пульсу

484. У пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у терапевтичному відділенні, лікар припустив цукровий діабет та призначив зібрати аналіз сечі для оцінки глюкозурії. У цьому разі сечу треба зібрати:

A. Протягом доби

B. Протягом 8 годин

C. Свіжовиділену

D. Протягом 3 годин

E. Протягом 12 годин

485. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся хлопчик 12 років, який порізав палець склом. Під час перев'язки, побачивши кров, він зблід і раптово втратив свідомість. Який стан виник у дитини?

A. Непритомність

B. Гостра дихальна недостатність

C. Гостра серцева недостатність

D. Геморагічний шок

E. Немає правильної відповіді

486. Дитина від доношеної вагітності народилася з масою тіла 3200 г. На 1-шу добу після народження з'явилась жовтяниця. Печінка і селезінка збільшені. Білірубін - 100 мкмоль/л. Група крові матері - B (III), Кь (-), дитини - 0 (I), Rh (+). Який діагноз найімовірніший у цьому разі?

A. Гемолітична хвороба новонароджених

B. Сепсис новонароджених

C. Уроджений гепатит

D. Фізіологічна жовтяниця

E. Атрезія жовчовивідних шляхів

487. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся потерпілий чоловік із ножовим пораненням грудної клітки. Під час огляду виявлено, що під час вдиху повітря крізь рану вільно входить у плевральну порожнину і виходить з неї під час видиху, чути свист. Які з наведених заходів слід застосувати насамперед?

A. Накласти оклюзійну пов'язку

B. Увести кровоспинні препарати

C. Застосувати транспортну іммобілізацію

D. Застосувати давлячу пов'язку

E. Надати горизонтального положення

488. Дитина 7 місяців перебуває на штучному вигодовуванні (коров'яче молоко, манна каша). Надійшла до стаціонару з підвищеною температурою до 37,8°C, короткочасними нападами тоніко-клонічних судом, ознаками рахіту II ступеня. Позитивні симптоми Ерба, Труссо, Маслова. Визначте патологічний стан, що спровокував судоми:

A. Спазмофілія

B. Немає правильної відповіді

C. Менінгоенцефаліт

D. Ниркова еклампсія

E. Епілепсія

489. Пацієнту перед операцією лікар призначив очисну клізму. Яке положення необхідно

надати пацієнту для проведення процедури?

A. На лівому боці

B. На спині

C. На правому боці

D. На животі

E. Стоячи

490. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася мати з 6-місячною дитиною. Мати скаржиться, що у дитини нежить, кашель, світлобоязнь, підвищення температури тіла, слюзотеча, дитина відмовляється від їжі, з'явився висип на обличчі, потім на шиї, а згодом на тулубі і нижніх кінцівках. Хворіє 3-ю добу. Під час огляду: ознаки кон'юнктивіту, на шкірі рясний висип плямисто-папульозного характеру, місцями зливається. Який найімовірніший діагноз?

A. Кір

B. Туберкульоз шкіри

C. Менінгококцемія

D. Скарлатина

E. Краснуха

491. Укажіть вік дитини, коли відбувається перший фізіологічний перехрест у лейкоцитарній формулі крові:

A. 5 днів

B. 1 день

C. 5 років

D. 5 тижнів

492. Пацієнту з діагнозом попереково-крижовий радикуліт призначено діадинамотерапію (ДДТ). Укажіть електроди, які застосовують під час проведення ДДТ:

A. Свинцеві металеві пластини

B. Випромінювачі

C. Скляні вакуумні

D. Аплікатори

E. Конденсаторні пластини

493. Пацієнт госпіталізований до гематологічного відділення з припущенням на гострий лейкоз. Який метод обстеження має важливе діагностичне значення в цьому разі?

A. Стернальна пункція

B. Біохімічний аналіз крові

C. Коагулограма

D. Бактеріологічне дослідження крові

E. ЕКГ

494. Яке дихання під час аускультції легень вислуховується у здорової дитини 7 місяців?

A. Пуерильне

B. Везикулярне

C. Ослаблене

D. Жорстке

E. Бронхіальне

495. Пацієнт 70 років скаржиться на біль у надлобковій ділянці, відчуття переповнення сечового міхура, неможливість самотійного акту сечовипускання протягом 12 год. Яку допомогу необхідно надати пацієнту?

A. Провести катетеризацію сечового міхура

B. Поставити очисну клізму

C. На ділянку сечового міхура покласти міхур із льодом

D. Поставити гіпертонічну клізму

E. Увести сечогінні препарати

496. Під час переливання еритроцитарної маси пацієнту, який перебуває в непритомному стані, фельдшер помітив, що з катетера сечового міхура виділяється сеча бурого забарвлення. Про що найімовірніше свідчить поява бурого забарвлення сечі?

A. Гемотрансфузійний шок

B. Алергічна реакція

C. Цитратний шок

D. Травматичний шок

E. Посттравматична лихоманка

497. Пацієнт 23 років перебуває на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип гарячки у пацієнта?

A. Гектична

B. Хвилеподібна

C. Неправильна

D. Інтермітуюча

E. Ремітуюча

498. Потерпілий під час ДТП чоловік втратив свідомість. Спостерігається лікворея та кровотеча з вух та носа, брадикардія. Яке пошкодження можна припустити?

A. Перелом основи черепа

B. Перелом склепіння черепа

C. Забій головного мозку

D. Стиснення головного мозку

E. Струс головного мозку

499. Роділля 24 роки перебуває у першому періоді пологів. Після 8 годин нормальної пологової діяльності перейми стали недостатньо сильними і тривалими, проміжок часу між ними збільшився. Яка патологія пологової діяльності виникла у роділлі?

A. Вторинна слабкість пологової діяльності

B. Патологічний прелімінарний період

C. Первинна слабкість пологової діяльності

D. Дискоординована пологова діяльність

E. Надмірно сильна пологова діяльність

500. До фельдшера сільської амбулаторії звернулась пацієнтка 49 років зі скаргами на слабкість, головний біль, порушення менструального циклу, ріст волосся на обличчі. Об'єктивно: диспластичне ожиріння з перерозподілом підшкірно-жирової клітковини на обличчі, шиї та тулубі, рожеві смуги на шкірі нижньої частини живота. АТ - 180/100 мм рт. ст. Яке захворювання можна припустити?

A. Хвороба Іценко-Кушинга

B. Ожиріння

C. Акромегалія

D. Гігантизм

E. Феохромоцитома

501. Після народження дитини у роділлі за 10 хвилин з'явилися незначні кров'янисті виділення з піхви. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

A. Ознака Шредера

B. Ознака Клейна

C. Ознака Штрассмана

D. Ознака Кюстнера-Чукалова

E. Ознака Альфельда

502. Пацієнту призначено переливання крові. Під час визначення групи крові за допомогою цоліклонів аглютинація відбулася лише з цоліклоном анти-A. Яка група крові у пацієнта?

A. A(II)

B. O(1)

C. Немає правильної відповіді

D. B(III)

E. AB (IV)

503. У пацієнта спостерігається підвищення температури тіла, головний біль, багаторазове блювання, ригідність м'язів потилиці, позитивний симптом Керніга. Як називається цей синдром?

A. Менінгеальний

B. Поліневритичний

C. Гіпоталамічний

D. Вертеброгенний

E. Бульбарний

504. Пацієнта 72 років госпіталізовано до лікарні зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ видно інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

A. Миготлива аритмія

B. Синусова аритмія

C. Синусова тахікардія

D. Екстрасистолічна аритмія

E. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

505. У дитини напади кашлю складаються з серії коротких кашльових поштовхів із репризами, які повторюються до 15 разів на добу. Обличчя дитини під час нападу червоніє, шийні вени набухають, язик висувається назовні, кінчик його загинається догори, іноді напад закінчується блюванням. Який найімовірніший попередній діагноз?

A. Кашлюк

B. Пневмонія

C. Кір

D. Напад бронхіальної астми

506. Під час патронажу здорової доношеної дитини віком 5 діб фельдшер сільської амбулаторії помітив кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини, набряк вульви та збільшення грудних залоз. Який перехідний стан виник у дитини?

A. Статевий криз

B. Токсична еритема

C. Сечокислий інфаркт

D. Фізіологічна жовтяниця

E. Фізіологічна еритема

507. Вагітна жінка в терміні вагітності 35-36 тижнів звернулася на сільської амбулаторії. Вагітність перебігала на фоні прееклампсії. Загальний стан середнього ступеня тяжкості, шкіра бліда, пульс - 98\хв., АТ - 140\90 мм рт. ст. Матка збільшена відповідно строку вагітності, напружена, асиметрична, болюча зліва від дна матки під час пальпації. Серцебиття плода - 160-170\хв., глухе. Який імовірний діагноз?

A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

B. Загроза передчасних пологів

C. Загроза розриву матки

D. Гіпертонія матки

E. Передлежання плаценти

508. У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Йому потрібно накласти шину Крамера. Визначте рівні накладання цієї шини:

A. Від кінчиків пальців до внутрішнього краю лопатки протилежної верхньої кінцівки

B. Від пальців до плечового суглоба

C. Від ліктьового суглоба до плечового суглоба

D. Від променево-зап'ястного суглоба до лопатки протилежної верхньої кінцівки

509. Яка тріада симптомів найбільш характерна для гострого пієлонефриту?

A. Лихоманка, біль у попереку, дизурія

B. Блювання, діарея, біль у животі

C. Спрага, арефлексія, нудота

D. Дизурія, гематурія, ніктурія

E. Біль у кістках, суглобах, м'язах

510. Як називається положення пацієнта в ліжку, за якого він самостійно не може змінити положення свого тіла?

A. Пасивне

B. Положення Сімса

C. Вимушене

D. Положення Фаулера

E. Активне

511. Чоловік, який отримав травму обличчя під час бійки, не може широко відкрити рот, розмовляти. Об'єктивно: нижня щелепа висунута вперед, відзначається гіперсаливація. Який найімовірніший діагноз?

A. Вивих нижньої щелепи

B. Вивих верхньої щелепи

- C. Струс головного мозку
- D. Перелом нижньої щелепи
- E. Перелом верхньої щелепи

512. Фельдшер сільської амбулаторії під час обстеження вагітної жінки, яку треба взяти на облік, встановив: термін вагітності - 30 тижнів, положення плода поздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Розміри таза: 24-26-28-18. Під час піхвового дослідження мис досягається, діагональна кон'югата - 11 см. Оцініть розміри таза у жінки:

A. Загальнонормальний таз

- B. Нормальний таз
- C. Загальнозвужений плоский таз
- D. Простий плоский таз
- E. Плоскорихитичний таз

513. У дитини 3 місяців виявлені такі симптоми: неспокій, підвищена пітливість, облісіння потилиці, стійкий червоний дермографізм, мязова гіпотонія, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?

A. Початковий

- B. Термінальний
- C. Реконвалесценції
- D. Залишкових явищ
- E. Розпалу

514. Оцінювання стану новонародженої дитини за шкалою Апгар треба проводити на:

A. 1-й і 5-й хвилині життя

- B. 4-й і 8-й хвилині життя
- C. 5-й і 9-й хвилині життя
- D. 3-й і 7-й хвилині життя
- E. 2-й і 6-й хвилині життя

515. Комплекс заходів, спрямованих на запобігання проникненню мікроорганізмів у рану і в організм загалом, називається:

A. Асептика

- B. Дезінфекція
- C. Інфекційний контроль
- D. Антисептика
- E. Інфекційна безпека

516. У дитина, яка народилася на 35-му тижні гестації виявлені множинні вади розвитку: мікроцефалія, катаракта, глухота та вроджена вада серця. З анамнезу відомо, що мати під час вагітності переохворіла на інфекцію, яка супроводжувалась плямистою висипкою, збільшенням лімфатичних вузлів та незначною інтоксикацією. Яке інфекційне захворювання матері стало найімовірнішою причиною патології у дитини?

A. Краснуха

- B. Цитомегаловірусна інфекція
- C. Хламідійна інфекція
- D. Герпетична інфекція
- E. Токсоплазмоз

517. Пацієнтці призначено діадинамотерапію. Яке захворювання є протипоказанням для цього методу електролізування?

A. Тромбофлебіт

- B. Невралгія
- C. Остеохондроз
- D. Деформуючий артроз
- E. Нейроміозит

518. До фельдшера медпункту звернувся робітник, у якого на роботі раптово виник напад задухи. З анамнезу відомо, що він хворіє на бронхіальну астму. Що вислуховується в легенях під час аускультатії у разі нападу бронхіальної астми?

A. Сухі свистячі хрипи

- B. Вологі хрипи
- C. Пуерильне дихання
- D. Шум тертя плеври
- E. Крепітація

519. Пацієнтка скаржиться на свербіння шкіри впродовж тижня, частіше вночі. Об'єктивно: у міжпальцевих проміжках, на животі та сідницях численні висипання у вигляді парних везикул, розчухи. Для якого захворювання це характерно?

A. Короста

- B. Атопічний дерматит
- C. Алергічний дерматит
- D. Рожевий лишай
- E. Екзема

520. Фельдшера ЕМД викликали до жінки 35 років, яка годину тому випила 300 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті та епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Яка перша допомога в цьому разі?

A. Промити шлунок холодною водою через зонд

- B. Промити шлунок теплою водою
- C. Промити шлунок розчином соди через зонд
- D. Викликати блювання
- E. Промити шлунок розчином перманганату калію

521. У пацієнта 55 років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг у пацієнта немає. Яке захворювання системи крові можна припустити?

A. Хронічний лімфолейкоз

- B. Лімфогранулематоз
- C. Гіпопластична анемія
- D. Гострий лейкоз
- E. Хронічний мієлолейкоз

522. Унаслідок поранення шиї у чоловіка раптово з'явилися різка блідість шкіри, сильний біль і свистячий звук із рани. Припинилися серцева діяльність та дихання. Який патологічний стан можна припустити?

A. Повітряна емболія

- B. Гостра анемія

- C. Шок
- D. Жирова емболія
- E. Асфіксія

523. Укажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода, якщо під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної жінки виявлено: положення плода повздовжнє, І позиція, передній вид, головне передлежання:

- A. Нижче пупка ліворуч
- B. Вище пупка ліворуч
- C. Нижче пупка праворуч
- D. На рівні пупка
- E. Вище пупка праворуч

524. Під час огляду пацієнта виявлено такі симптоми: витрішкуватість, позитивні симптоми Грефе, Мебіуса, Штельвага. Яке захворювання можна припустити?

- A. Тиреотоксикоз
- B. Акромегалія
- C. Ендемічний зоб
- D. Цукровий діабет
- E. Мікседема

525. Фельдшер сільської амбулаторії виконує дитині внутрішньошкірну пробу Манту. Яку анатомічну ділянку необхідно використати для проведення проби?

- A. Внутрішню поверхню передпліччя
- B. Передньозовнішню поверхню стегна
- C. Латеральну поверхню живота
- D. Підлопаткову ділянку
- E. Зовнішню поверхню передпліччя

526. Пацієнт 70 років скаржиться на кашель із виділенням мокротиння у вигляді малинового желе, зниження апетиту, схуднення на 15 кг протягом останніх півроку, задишку, що посилюється під час фізичного навантаження. З анамнезу відомо, що він палить приблизно 35 років. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. Рак легень
- B. Пневмонія
- C. Туберкульоз легень
- D. Бронхоектатична хвороба
- E. Бронхіальна астма

527. Який метод дослідження сечі використовують для визначення концентраційної і фільтраційної здатності нирок?

- A. За Зимницьким
- B. За Аддіса-Каковського
- C. За Амбурже
- D. Немає правильної відповіді
- E. За Нечипоренко

528. У дівчинки 9 років відзначається дратівливість, порушення сну, зміна почерку, порушення ходи. За місяць до цього перехворіла на гострий бактеріальний тонзиліт. Під час огляду

спостерігається м'язова гіпотонія, мимовільні скорочення мимічної мускулатури і пальців рук. Яку патологію можна припустити?

A. Ревматична хорея

- B. Гострий ревматичний міокардит
- C. Немає правильної відповіді
- D. Епілепсія
- E. Ревматоїдний артрит

529. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася першовагітна жінка в терміні вагітності 38 тижнів, у якій 2 години тому почалися перейми кожні 10 хвилин по 20-25 секунд. Положення плода повздовжнє, сіднички плода притиснуті до входу в малий таз. Навколоплідні води не виливалися. У якому періоді пологів перебуває роділля?

A. Першому періоді

- B. Другому періоді
- C. Передвісників пологів
- D. Загроза передчасних пологів
- E. Третьому періоді

530. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 35 років зі скаргами на підвищення температури тіла до 40°C, озноб, пітливість, виражену слабкість, задишку, серцебиття, біль у горлі під час ковтання, кровоточивість ясен. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Пальпуються збільшені шийні та підщелепні лімфатичні вузли. Пульс 96/хв., ритмічний, АТ - 90/60 мм рт. ст. Живіт м'який, печінка + 5 см, нижче края реберної дуги. У аналізі крові виявлено: еритроцити - 1,5-10¹²/л, гемоглобін - 50 г/л, лейкоцити - 15 * 10⁹/л, бластні клітини - 80%, ШОЕ - 60 мм/год. Сформулюйте попередній діагноз:

A. Гострий лейкоз

- B. Хронічний лімфолейкоз
- C. Гемофілія
- D. Лімфогранулематоз
- E. Хронічний мієлолейкоз

531. У дитини спостерігається виражена сонливість, дезорієнтація в просторі і часі, знижена реакція на зовнішні подразнення, під час пробудження мляво і повільно відповідає на запитання і одразу засинає. Який тип порушення свідомості у дитини?

A. Ступор

- B. Помірна кома
- C. Немає правильної відповіді
- D. Делірій
- E. Глибока кома

532. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 30 років зі скаргами на біль у литкових м'язах під час ходьби, мерзлякуватість стоп, порушення чутливості, відчуття повзання мурашок. Уважає себе хворим протягом 2 років. В анамнезі - відмороження кінцівок. Палить, зловживає алкоголем. Під час обстеження: шкіра стоп холодна на дотик, пульсація на артеріях стоп відсутня, на підколінній та стегновій - виражена. Сформулюйте попередній діагноз:

A. Облітеруючий ендартеріїт

- B. Хвороба Рейно

- C. Гострий артеріальний тромбоз
- D. Гострий флеботромбоз
- E. Немає правильної відповіді

533. Пацієнт 36 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на озноб, підвищення температури тіла, сухий кашель, виражений біль у правій половині грудної клітки. Займає вимушене положення - лежить на правому боці. Попередній діагноз - сухий плеврит. Які аускультативні ознаки характерні для цієї патології?

A. Шум тертя плеври

- B. Крепітація
- C. Немає правильної відповіді
- D. Сухі свистячі хрипи
- E. Везикулярне дихання

534. Дівчинка 3 місяців втратила за 2 доби 500 г маси тіла внаслідок блювання та діареї. Під час огляду шкіра у дитини сірувато-ціанотичного кольору, риси обличчя загострені, рефлекси знижені. Для якого патологічного стану характерні такі клінічні ознаки?

A. Ексикозу

- B. Печінкової коми
- C. Гіперглікемічної коми
- D. Спазмофілії
- E. Рахіту

535. Пацієнт 63 років скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній частині живота, нудоту, багаторазове блювання. Під час пальпації живота спостерігається різкий біль в епігастрії і лівому підребер'ї, позитивний симптом Мейо-Робсона. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий панкреатит

- B. Гострий апендицит
- C. Гостра кишкова непрохідність
- D. Перфоративна виразка шлунка
- E. Гострий холецистит

536. Молода жінка звернулася до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на виражений, щільний, блідий набряк обличчя, який не супроводжується свербінням, утруднене дихання, слабкість, тривогу. Стан розвинувся за 30 хвилин після ін'єкції антибіотика. Об'єктивно: виражений набряк обличчя, очні щілини майже закриті, язик не вміщається у роті. Пульс - 100/хв. АТ - 130/90 мм рт. ст. Який патологічний стан можна припустити у пацієнтки?

A. Набряк Квінке

- B. Анафілактичний шок
- C. Колапс
- D. Кропив'янка
- E. Гіпертонічний криз

537. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт, у якого забинтовано кожний палець окремо. Як називається ця пов'язка?

A. Лицарська рукавичка

- B. Повертаюча
- C. Колова

D. Спіральна

E. Дезо

538. Бригада ЕМД транспортує пацієнта з гострим інфарктом міокарда до лікарні. Раптово у нього виник напад задухи, з'явилися інспіраторна задишка, кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння. Стан хворого тяжкий, шкіра бліда, пульс - 100\хв., ритмічний. Аускультативно над легенями вислуховуються вологі середньоміхурцеві хрипи. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A. набряк легень

B. негоспітальна пневмонія

C. тромбоемболія легеневої артерії

D. кардіогенний шок

E. легенева кровотеча

539. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася мати 5-річної дитини. Скарги: у дитини раптово підвищилася температура тіла до 40°C, дитина млява, малорухлива, на шкірі з'явилася висипка ге-морагічного характеру, зірчастої форми, підвищується над поверхнею шкіри, не зникає після натискання. Який діагноз найімовірніший?

A. менінгококцемія

B. скарлатина

C. кір

D. вітряна віспа

E. краснуха

540. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася мати дитини 3 місяців зі скаргами на зменшення кількості молока, неспокій та зменшення сечовипускання у дитини. Після проведення зважування дитини та розрахунків виявлено дефіцит маси тіла, який складає 16%. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

A. I ступінь гіпотрофії

B. III ступінь гіпотрофії

C. II ступінь гіпотрофії

D. I ступінь паратрофії

541. У дитини 5 років температура тіла 38,2°C, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болісний під час пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болісна. Яке захворювання можна припустити?

A. шигельоз

B. черевний тиф

C. немає правильної відповіді

D. ботулізм

E. холера

542. Дитина 12 років хворіє на скарлатину протягом 10 діб. Які зміни на шкірі можна виявити на цьому етапі захворювання в місцях попереднього розташування висипу?

A. лущення

B. виразка

C. немає правильної відповіді

D. кірочка

E. рубець

543. Який метод транспортування пацієнта з припущенням на травму хребта?

A. Лежачи на щиті

B. Лежачи на лівому боці

C. Сидячи на кріслі

D. У положенні жаби

E. Лежачи на правому боці

544. Фельдшер сільської амбулаторії веде III період строкових пологів у жінки 25 років. Які заходи слід провести під час кровотечі в цьому періоді пологів, якщо плацента відокремилася, а послід не виділяється?

A. Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича

B. Накласти шов за Лосицькою

C. Виконати зовнішній масаж матки

D. Здійснити ручне відокремлення плаценти

E. Увести утеротонічні засоби

545. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт зі скаргами на озноб, підвищення температури тіла до 39,5°C, біль у правій половині грудної клітки, пов'язаний з актом дихання, сухий кашель, головний біль. Захворів гостро. Об'єктивно: рум'янець на щоках, частота дихання - 28\хв., під час пальпації грудної клітки виявлено посилене голосове тремтіння справа, перкуторно - притуплення перкуторного звука справа, аускультативно - крепітація справа. Пульс - 96\хв., АТ -100\60 мм рт. ст. Який попередній діагноз?

A. Негоспітальна пневмонія

B. Гострий бронхіт

C. Рак легень

D. Туберкульоз легень

E. Сухий плеврит

546. Під час обстеження вагітної жінки на 38-му тижні вагітності виявлено невідповідність розташування дна матки терміну вагітності; виявлено декілька великих частин і велика кількість дрібних під час пальпації живота; 2 точки ясного вислуховування серцебиття плода. Для якої вагітності це характерно?

A. Багатоплідна

B. Завмерша

C. Переношена

D. Пролонгована

E. Недоношена

547. Дитина 5 років перебуває у тяжкому стані. Об'єктивно: збільшення та гіперемія піднебінних мигдаликів, щільні фібринозні сірувато-білі плівки на них, у разі спроби зняття яких спостерігається кровоточивість слизової оболонки. Укажіть найімовірніший попередній діагноз:

A. Дифтерія глотки

B. Гострий тонзиліт

C. Скарлатина

D. Немає правильної відповіді

E. Гострий фарингіт

548. У гінекологічне відділення доставлена пацієнтка зі скаргами на переймоподібний біль у лівій здухвинній ділянці, незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після

8-тижневої затримки менструації, запаморочення. АТ - 85/55 мм рт. ст. Симптом Щоткіна-Блюмберга слабкопозитивний. Матка збільшена до 5 тижнів вагітності, ліва маткова труба збільшена, різко болісна. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

A. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

B. Гістероскопія органів малого таза

C. Метросальпінгографія

D. Кульдоскопія органів малого таза

E. Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки

549. Під час бімануального обстеження вагітної жінки виявлено, що матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, асиметрична, у лівому куті матки пальпується випинання. Матка м'якої консистенції, але під час обстеження скоротилася та ущільнилася, після припинення подразнення знову стала м'якою. Які ознаки вагітності виявлені у жінки?

A. Піскачека і Снегірьова

B. Губарева-Гаусса

C. Снегірьова і Гентера

D. Гентера і Піскачека

E. Горвіца-Геґара

550. Яке захворювання можна припустити, ураховуючи такі показники загального аналізу крові пацієнта: еритроцити - $1,3 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 60 г/л, кольоровий показник - 1,3, лейкоцити - $4,6 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $180 \cdot 10^9/л$, ШОЕ - 15 мм/год, діаметр еритроцитів - 12 мкм, у мазку крові наявні тільця Жоллі і кільця Кебота?

A. B12-дефіцитна анемія

B. Апластична анемія

C. Хронічний лімфолейкоз

D. Залізодефіцитна анемія

E. Гострий лейкоз

551. Пацієнтка 20 років скаржиться на загальну слабкість, дратівливість, серцебиття, підвищену збудливість, поганий сон. Під час огляду: витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тремор кінцівок. Пульс - 120/хв., АТ 150/90 мм рт. ст. Яке обстеження доцільно провести насамперед?

A. Визначення рівня тироксину, трийодтироніну в крові

B. Визначення рівня холестерину в крові

C. Дослідження ревмоироб

D. Визначення рівня ліпідів

E. Визначення рівня глюкози в крові

552. У чоловіка 42 років виник напад задухи із затрудненим видихом. Напад триває понад 12 годин, не піддається корекції бронходилататорами. Пацієнт у свідомості, але його реакції загальмовані, шкіра ціанотична, шийні вени набухші, грудна клітка роздута. Аускультативно: дихання ослаблене, вислуховуються зони німої легені, ЧД - 45/хв, пульс частий, гіпотонія. Ці симптоми характерні для:

A. Астматичний статус, II стадія

B. Астматичний статус, I стадія

C. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

D. Астматичний статус, III стадія

Е. Напад серцевої астми

553. Яке обстеження найдоцільніше провести пацієнту з припущенням на хронічний панкреатит?

А. Аналіз сечі на альфа-амілазу

В. Холецистографію

С. Дуоденальне зондування

Д. Фіброгастроскопію

Е. Колоноскопію

554. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, біль у попереку. Об'єктивно: набряки на обличчі, позитивний симптом Пастернацького, АТ - 160/90 мм рт. ст. Попередній діагноз - гострий гломерулонефрит. Укажіть, які зміни в сечі найбільш характерні для цього захворювання:

А. Протеїнурія та гематурія

В. Бактеріурія та циліндрурія

С. Лейкоцитурія та циліндрурія

Д. Лейкоцитурія та оксалатурія

Е. Лейкоцитурія та протеїнурія

555. Визначте основну клінічну ознаку, характерну для нападу бронхіальної астми:

А. Задишка з утрудненим видихом

В. Задишка з утрудненим вдихом

С. Зупинка дихання

Д. Порушення свідомості

Е. Зупинка серця

556. Який розмір площини таза називають акушерською або справжньою кон'югатою?

А. Прямий розмір площини входу в малий таз

В. Прямий розмір широкої частини порожнини малого таза

С. Поперечний розмір широкої частини порожнини малого таза

Д. Прямий розмір вузької частини порожнини малого таза

Е. Поперечний розмір площини входу в малий таз

557. Чоловік 43 років, який працює на м'ясокомбінаті, захворів раптово. Скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, відчуття печіння в очах, біль у м'язах, особливо литкових, та попереку, жовтяничний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, пальпуються збільшені печінка та селезінка; температура тіла - 37,8°C, пульс - 100/хв., АТ - 90/50 мм рт. ст., олігурія. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

А. Лептоспіроз

В. Бруцельоз

С. Вірусний гепатит

Д. Черевний тиф

Е. Висипний тиф

558. У чоловіка 20 років констатована клінічна смерть. Фельдшер проводить йому серцево-легеневу реанімацію. Що з наведеного свідчить про ефективність закритого масажу серця?

A. Пульсація на сонній артерії

- B. Розширення зіниць
- C. Відсутність свідомості
- D. Зниження температури тіла
- E. Пасивні рухи грудної клітки

559. Під час масивних переливань крові необхідно проводити профілактику цитратного шоку. Який препарат застосовується для цього?

A. 10% розчин натрію хлориду

- B. 10% розчин кальцію хлориду
- C. 25% розчин сульфату магнію
- D. 40% розчин глюкози
- E. 0,9% розчин натрію хлориду

560. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 60 років зі скаргами на біль за грудниною стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку, що триває протягом 4 годин і не знімається нітрогліцерином. Ця симптоматика характерна для:

A. Гострого інфаркту міокарда

- B. Гострого міокардиту
- C. Нападу стенокардії
- D. Хронічного перикардиту
- E. Гострого ендокардиту

561. У дитини 5 років лабораторно діагностовано ентеробіоз. Укажіть збудника цього захворювання:

A. Гострик

- B. Токсокара
- C. Бичачий ціп'як
- D. Аскарида
- E. Волосоголовець

562. Фельдшер ЕМД приймає пологи у жінки 25 років у медичному транспорті. У третьому періоді пологів, за 15 хвилин після народження дитини, почалась незначна кровотеча. Ознаки відокремлення плаценти позитивні. Крововтрата 200 мл. Що з наведеного треба зробити на-самперед?

A. Запропонувати роділлі потужитись

- B. Провести ручне відділення плаценти
- C. Виділити плаценту зовнішніми прийомами
- D. Ввести окситоцин
- E. Провести зовнішній масаж матки

563. Який біологічний матеріал потрібно взяти у новонародженої дитини для проведення скринінг-тесту на фенілкетонурію?

A. Кров

- B. Випорожнення
- C. Піт
- D. Слину
- E. Сечу

564. До фельдшера сільської амбулаторії звернувся пацієнт 60 років зі скаргами на схуднення, біль у ділянці промежини. Упродовж останніх 6 місяців у нього спостерігався дискомфорт під час акту дефекації, були незначні кровотечі, діарея чергувалася із закрепамі. Під час пальцевого ректального дослідження виявлено бугристе ущільнення, малорухоме під час пальпації. Яке захворювання можна припустити?

A. Рак прямої кишки

- B. Поліп прямої кишки
- C. Парапроктит
- D. Геморой
- E. Анальна тріщина

565. Роділля народила хлопчика масою 4000 г. Протягом 30 хв. ознак відокремлення плаценти немає, з'явилися незначні кров'янисті виділення. Яка акушерська тактика в цьому разі?

A. Ручне відокремлення плаценти і видалення посліду

- B. Вичікувальна тактика
- C. Застосувати зовнішні прийоми видалення посліду
- D. Виконати зовнішній масаж матки
- E. Увести утеротонічні засоби

566. Який метод обстеження застосовується для діагностики прохідності маткових труб?

A. Гістеросальпінографія

- B. Вимірювання базальної температури
- C. Біопсія ендометрія
- D. Немає правильної відповіді
- E. Бімануальне дослідження

567. Пацієнту необхідно провести рентгенологічне дослідження шлунка. Яку контрастну речовину найчастіше використовують для цього?

A. Барієву суміш

- B. Холевід
- C. Урографін
- D. Білітраст
- E. Білігност

568. Під час розкриття шийки матки на 4 см у роділлі відійшли води. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

A. Раннє

- B. Передчасне
- C. Запізніле
- D. Немає правильної відповіді
- E. Вчасне

569. На підставі даних анамнезу та результатів лабораторного обстеження у пацієнта діагностовано вірусний гепатит А. Який механізм передачі цього захворювання?

A. Фекально-оральний

- B. Трансмісивний
- C. Повітряно-крапельний
- D. Вертикальний
- E. Контактний

570. У роділлі триває III період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одночасно виділилося 400 мл крові, кровотеча триває. Під час огляду материнської поверхні плаценти виявлена відсутність однієї дольки. Яка тактика в такому разі?

- A. Ручна ревізія порожнини матки
- B. Притиснення черевної аорти кулаком
- C. Введення утеротонічних засобів
- D. Зовнішній масаж матки
- E. Огляд пологових шляхів у дзеркалах

571. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт 57 років, який працює бурильником. Скаржиться на ниючий біль у кистях рук, що найбільше турбує вночі, відчуття повзання мурашок, мерзлякуватість кистей, головний біль, поганий сон, зниження працездатності. Крім того, спостерігається поблідніння пальців після миття рук холодною водою. Яке захворювання можна припустити?

- A. Вібраційна хвороба
- B. Інтоксикаційна полінейропатія
- C. Діабетична полінейропатія
- D. Синдром Рейно
- E. Реактивний артрит

572. До сільської амбулаторії звернулася мати з дитиною віком 12 років. Дитина скаржиться на виражений біль у верхньому відділі живота, який виникає після споживання їжі, відрижку кислим, печію. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, під час пальпації живіт м'який, болісний в епігастральній ділянці. Печінка не збільшена. Яке додаткове інструментальне дослідження є найінформативнішим для встановлення діагнозу в цьому разі?

- A. Фіброгастродуоденоскопія
- B. Ректороманоскопія
- C. Холецистографія
- D. Колоноскопія
- E. УЗД ОЧП

573. Під час огляду в дзеркалах виявлено: шийка матки гіпертрофована, на її верхній губі її відзначається пухлина у вигляді цвітної капусти, кровоточить під час дотику. Який найімовірніший попередній діагноз?

- A. Рак шийки матки
- B. Ерозивний ектропіон
- C. Поліп шийки матки
- D. Дисплазія шийки матки
- E. Ерозія шийки матки

574. У дитини 5 років на 8-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла та везикульозною висипкою, з'явилися сильний головний біль, блювання, загальмованість, тремор кінцівок. У дитини діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого інфекційного захворювання в цьому разі є енцефаліт?

- A. Вітряна віспа
- B. Скарлатина
- C. Кашлюк
- D. Ентеровірусна інфекція

575. Пацієнт 40 років звернувся до фельдшера сільської амбулаторії зі скаргами на раптовий гострий біль у поперековій ділянці зліва, що іррадіює в статеві органи, стегно, часті позиви на сечовипускання. Хворий збуджений, блідий, часто змінює положення тіла. Яку патологію можна припустити у пацієнта?

A. Напад ниркової коліки

- B. Гостра ниркова недостатність
- C. Гострий гломерулонефрит
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гострий цистит

576. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт зі скаргами на появу частих, рідких, водянистих випорожнень, що нагадують рисовий відвар, багаторазове блювання, виражену слабкість, зниження температури тіла до 35,2°C. Яке захворювання можна припустити?

A. Холера

- B. Ботулізм
- C. Черевний тиф
- D. Ієрсиніоз
- E. Шигельоз

577. Роділля перебуває у першому періоді пологів. Передбачувальна маса плода 4500 г. Перейми різко болісні, матка у вигляді піщаного годинника, роділля занепокоєна. Яку допомогу повинен надати фельдшер сільської амбулаторії?

A. Припинити пологову діяльність

- B. Інгаляція киснем
- C. Ввести кровозупинні препарати
- D. Покласти міхур із льодом на низ живота
- E. Немає правильної відповіді

578. До фельдшера медпункту звернувся робітник зі скаргами на різкий біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, загальну слабкість. Біль спочатку локалізувався в епігастрії, потім перемістився в здухвинну ділянку. Позитивні симптоми Сітковського, Бартом'є-Міхельсона. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий апендицит

- B. Гострий ентероколіт
- C. Гострий панкреатит
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гостра кишкова непрохідність

579. Під час проведення зовнішнього акушерського обстеження роділлі було визначено: під час II прийому Леопольда - справа від пупка пальпується щільна, округла, балотуюча частина плода; зліва - м'яка, з нечіткими контурами; під час III прийому Леопольда - передлегла частина плода відсутня. Визначте розташування плода в порожнині матки:

A. Поперечне положення, II позиція

- B. Поздовжнє положення, тазове передлежання, I позиція, передній вид
- C. Поперечне положення, I позиція
- D. Поздовжнє положення, головне передлежання, I позиція, передній вид

580. У дитини 2 років припускають латентну форму спазмофілії. Який симптом характерний для цього захворювання?

A. Хвостека

B. Кера

C. Керніга

D. Ортнера

E. Брудзинського

581. Пацієнт госпіталізований до лікарні з рясною кровотечею, яка почалася після екстракції зуба. З анамнезу з'ясувалось, що пацієнт хворіє на гемофілію А. Який препарат найдоцільніше використовувати для лікування такої кровотечі?

A. Кріопреципітат

B. Хлорид кальцію

C. Аскорутин

D. Амінокапронова кислота

E. Вікасол

582. До фельдшера сільської амбулаторії звернулася жінка, яка годує дитину груддю зі скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5°C, розпирюючий біль у правій молочній залозі. Під час огляду - залоза збільшена, гіперемована, під час пальпації - ущільнена, болісна. Який найімовірніший попередній діагноз?

A. Гострий мастит

B. Фібroadенома молочної залози

C. Фурункул молочної залози

D. Гіпермастія

E. Мастопатія

583. З чого треба розпочати медичну допомогу пацієнту з відкритим переломом правого стегна, ускладненого артеріальною кровотечею?

A. З накладання кровоспинного джгута

B. З туалету рани та накладання пов'язки

C. З введення знеболюючих засобів

D. З активно-пасивної профілактики правця

E. З накладання транспортної шини

584. Чоловік 23 років скаржиться на загальну слабкість, нездужання, головний біль, підвищення температури тіла до 37,5°C, сухий кашель. Хворіє другий день. Об'єктивно: загальний стан задовільний, перкуторний звук над легеньми ясний, дихання жорстке, розсіяні сухі хрипи. ЧДД - 16/хв. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС 72/хв. АТ 120/80 мм рт. ст. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

A. Гострий бронхіт

B. ХОЗЛ

C. Бронхіальна астма

D. Ексудативний плеврит

E. Вогнищева пневмонія

585. Фельдшер сільської амбулаторії здійснює серцево-легеневу реанімацію жінці 38 років. Який вид травми найчастіше виникає під час проведення непрямого масажу серця?

A. Перелом ребер

- В. Перелом хребта
- С. Колапс легень
- D. Ушкодження трахеї
- Е. Ушкодження обличчя

586. Дитина 10 років скаржиться на задуху, нападоподібний настирливий кашель, які найчастіше посилюються вночі. Об'єктивно: емфізематозна грудна клітка, під час аускультативної-різнокаліберні сухі свистячі хрипи. Попередній діагноз - бронхіальна астма. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?

- A. Спірометрія**
- В. Бронхоскопія
- С. Загальний аналіз крові
- D. Загальний клінічний аналіз мокротиння
- Е. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки

587. Після обстеження пацієнтки 25 років з'ясувалось, що у неї затримка менструації, виявлена пігментація шкіри на обличчі та білій лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене до розмірів курячого яйця, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вагітність маткова**
- В. Пухлина матки
- С. Ендометрит
- D. Вагітність позаматкова
- Е. Ендометриоз матки

588. До сільської амбулаторії звернувся пацієнт 45 років зі скаргами на слабкість, підвищення температури до 38,0°C, наявність болісного утворення на задній поверхні шиї. Об'єктивно: на шкірі шиї інфільтрат синюшно-багряного кольору з декількома гнійними голівками. Яку патологію можна припустити?

- A. Карбункул**
- В. Бешиха
- С. Фурункул
- D. Флегмона
- Е. Абсцес

589. У пацієнта скарги на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри в ділянці лівої гомілки. Захворювання почалося гостро. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 39,5°C, у ділянці середньої третини лівої гомілки є набряклість, почервоніння шкіри з чіткими фестончастими краями. Яке захворювання можна припустити?

- A. Бешиха**
- В. Лімфангоїт
- С. Фурункулез
- D. Флегмона
- Е. Гострий тромбофлебіт

590. Пацієнту, хворому на виразкову хворобу шлунка, призначили дихальний тест із сечовиною. Це метод виявлення

- A. Helicobacter pylori**
- В. рН шлункового соку

- С. Атипових клітин у біоптаті
- Д. Прихованої крові в калі
- Е. Нейтрального жиру в калі

591. Медична сестра хірургічного кабінету разом із хірургом оглядає пацієнтку 20 років, яка скаржиться на наявність фурункула в ділянці носа. Назвіть найбільш небезпечне ускладнення цього захворювання:

А. Тромбоз кавернозного синуса

- В. Носова венозна кровотеча
- С. Гострий фронтит
- Д. Гострий гнійний синусит
- Е. Хронічний гнійний риніт

592. До приймального відділення бригадою ЕМД доставлено пацієнта зі скаргами на біль у правому підребр'ї, який іррадіює в праве плече та в праву лопатку. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, склери жовті, біль у точці Кера, позитивний синдром Курвуазьє. Яке захворювання можна припустити?

А. Гострий холецистит

- В. Перитоніт
- С. Правосторонній пієлонефрит
- Д. Хронічний апендицит
- Е. Гострий панкреатит

593. Бригадою ЕМД до інфекційної лікарні госпіталізований пацієнт 42 років із діагнозом: черевний тиф. Назвіть можливе джерело інфекції цього захворювання:

А. Хвора людина або бактеріоносії

- В. Хворі щурі та миші
- С. Інфікована вода
- Д. Інфіковані м'ясопродукти

594. У пацієнта на тлі гіпертонічного кризу розвинувся набряк легень. Який характер мокротиння типовий для цього патологічного стану?

А. Пінисте, рожеве

- В. Склоподібне, в'язке
- С. Слизове, в'язке
- Д. Гнійне, зловонне
- Е. Іржаве, липке

595. Для якого інфекційного захворювання в продромальному періоді характерні енантема та симптом Філатова-Бельського-Копліка?

А. Кір

- В. Скарлатина
- С. Краснуха
- Д. Дифтерія
- Е. Менінгококцемія

596. Дитина 10 місяців госпіталізована до інфекційного відділення з діагнозом менінгококцемія. Який висип характерний для цього захворювання?

А. Геморагічний

- В. Плямисто-папульозний
- С. Розеолюозний
- Д. Папульозний
- Е. Везикульозний

597. У пацієнта 30 років, який має в анамнезі виразкову хворобу шлунка, раптово погіршився загальний стан. З'явилися різка слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору кавової гущі. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

А. Шлункова кровотеча

- В. Пілоростеноз
- С. Малігнізація виразки
- Д. Пенетрація виразки
- Е. Перфорація виразки

598. До пологового будинку госпіталізовано вагітну жінку в терміні вагітності 35 тижнів. Після падіння в неї з'явилися біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: матка напружена, асиметрична, болісна під час пальпації. За даними УЗД встановлено: ехонегативне утворення між маткою та плацентою. Серцебиття плода ритмічне, приглушене, 100 уд/хв. Яку патологію можна припустити?

А. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

- В. Передлежання плаценти
- С. Загроза розриву матки
- Д. Загроза переривання вагітності
- Е. Передчасні пологи

599. Назвіть дослідження калу, під час підготовки до якого за 3-5 днів пацієнту забороняється вживання препаратів заліза, йоду та призначається безгемоглобінова дієта:

А. На приховану кров

- В. На виявлення ентеробіозу
- С. Копрологічне дослідження
- Д. На яйця гельмінтів
- Е. Бактеріологічне дослідження

600. У дитини напади кашлю складаються з серії коротких кашльових поштовхів, що йдуть один за одним, відокремлених репризами і повторюються до 10 разів на добу. Для якої хвороби це характерно?

А. Кашлюк

- В. Ларингіт
- С. Напад бронхіальної астми
- Д. Кір
- Е. Пневмонія

601. У чоловіка після переохолодження підвищилася температура до 38°C, з'явилися озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання. Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

А. Гострий пієлонефрит

- В. Хронічний гломерулонефрит
- С. Сечокам'яна хвороба
- Д. Хронічна хвороба нирок

Е. Гострий гломерулонефрит

602. Пацієнт перебуває в лікарні з підозрою на облітеруючий ендартеріт. Який із наведених симптомів найхарактерніший для цієї патології?

A. Переміжної кульгавості

В. Сітковського

С. Пастернацького

Д. Щоткіна-Блюмберга

Е. Прилиплої п'ятки

603. Під час дослідження пульсу в пацієнтки, яка хворіє на тиреотоксикоз, медична сестра визначила, що частота пульсу становить 98\хв. Оцініть такий пульс:

A. Тахікардія

В. Аритмія

С. Нормальний

Д. Ниткоподібний

Е. Брадикардія

604. Під час пожежі чоловік отримав опік правої кисті. Медична сестра, обстежуючи місце пошкодження, діагностувала опік IV ступеня. Яка характерна ознака свідчить про це?

A. Обвуглення м'яких тканин та кісток

В. Некроз усієї товщі шкіри

С. Поява міхурів із жовтуватим вмістом

Д. Поява міхурів із геморагічним вмістом

Е. Некроз сосочкового шару шкіри

605. Пацієнт 68 років скаржиться на підвищення температури тіла та виділення під час кашлю великої кількості гнійного мокротиння, з неприємним запахом зеленувато-коричневого кольору. Для якої патології це характерно?

A. Абсцес легень

В. Інфаркт легені

С. Пневмонія

Д. Бронхіальна астма

Е. Рак легень

606. У жінки, яка хворіє на цироз печінки, розвинулося варикозне розширення вен стравоходу та ускладнилося кровотечею. Що використовується в разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу?

A. Зонд Блекмора

В. Шлунковий зонд

С. Назогастральний зонд

Д. Назоінтестинальний зонд

Е. Інтубаційна трубка

607. Жінці 25 років діагностовано ерозію шийки матки. Який метод обстеження використовують для діагностики цієї патології?

A. Кольпоскопія

В. Гістероскопія

С. Кульдоскопія

- D. Цистоскопія
- E. Лапароскопія

608. Під час перев'язки хірург помітив, що у пацієнта з'явилися ознаки запалення післяопераційної рани. Оберіть класичні місцеві ознаки запалення з наведених:

- A. Почервоніння, місцеве підвищення температури, набряк, біль та обмеження рухливості в ураженій ділянці
- B. Біль, гематома, патологічна рухливість, інфільтрація
- C. Набряк, ціаноз, підвищена температури тіла, порушення функції
- D. Почервоніння, підвищена температури тіла, крепітація, симптом лігатури
- E. Кровотеча, мерзлякуватість, зниження температури тіла, біль, порушення функції

609. Пацієнту, який перебуває на лікуванні у нейрохірургічному відділенні, заборонено повертатися в ліжку, підніматися та сідати. Такий лікарняний режим називається:

- A. Суворий ліжковий
- B. Палатний
- C. Вільний
- D. Напівліжковий
- E. Розширений ліжковий

610. У чоловіка виник напад бронхіальної астми, що триває понад 24 години та резистентний до терапії бронхолітичними засобами. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Астматичний стан
- B. Легенева кровотеча
- C. Експіраторна задишка
- D. Кардіогенний шок
- E. Анафілактичний шок

611. До приймального відділення інфекційної лікарні доставлено пацієнта на 3-й день хвороби в тяжкому стані. Скарги на раптове підвищення температури, повторну носову кровотечу, біль у литкових м'язах та попереку. Об'єктивно спостерігається: шкіра і склери помірноіктеричні, печінка і селезінка збільшені, відсутність сечовипускання упродовж останніх 8 годин. Яке захворювання можна припустити?

- A. Лептоспіроз
- B. Малярія
- C. Інфекційний мононуклеоз
- D. Вірусний гепатит А
- E. Ієрсиніоз

612. У пацієнта 62 років, у якого є підозра на рак легень, узято мокротиння для мікроскопічного дослідження. Наявність яких клітин у мокротинні характерне для цього захворювання?

- A. Атипових
- B. Еритроцитів
- C. Тромбоцитів
- D. Еозинофілів
- E. Лейкоцитів

613. Патронажна медична сестра амбулаторії сімейної медицини оцінює температуру, вологість та еластичність шкіри новонародженої дитини. За допомогою якого методу

об'єктивного дослідження можна оцінити такі властивості шкіри?

A. Пальпації

B. Аускультції

C. Огляду

D. Розпитування

E. Перкусії

614. Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує біологічний. Який це вид старіння?

A. Сповільнене старіння

B. Фізіологічне старіння

C. Передчасне старіння

D. Прискорене старіння

615. У чоловіка після укусу бджоли з'явилися скарги на задуху, осиплість голосу, гавкаючий кашель. Об'єктивно спостерігається: набряк губ, збільшення розміру язика, шкіра блідо-ціанотична, без висипань, дихання утруднене, АТ у нормі. Який патологічний стан виник у чоловіка?

A. Набряк Квінке

B. Кропивниця

C. Напад бронхіальної астми

D. Анафілактичний шок

616. Першороділля перебуває в II періоді пологів. На тлі дуже сильної пологової діяльності жінка відчула різкий біль у животі, перейми раптово припинилися, жінка втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: АТ - 70/40 мм рт. ст., частий слабкий пульс, шкіра бліда, вкрита холодним потом, через передню черевну стінку пальпуються дрібні частини плода. Яке ускладнення пологів можна припустити?

A. Розрив матки, що відбувся

B. Вторинна слабкість пологової діяльності

C. Загроза розриву матки

D. Передчасне відшарування плаценти

E. Надмірно сильна пологова діяльність

617. Пацієнтці призначено проведення діагностичної процедури для перевірки прохідності маткових труб. Як називається цей метод дослідження?

A. Метросальпінгографія

B. Лапароскопія

C. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

D. Бімануальне піхвове дослідження

E. Тест функціональної діагностики

618. Чоловіка витягли з води за 5 хвилин після утоплення. Пульс на сонних артеріях та самостійне дихання відсутні. Зіниці широкі, на світло не реагують. З чого треба розпочати надання долікарської невідкладної допомоги в цьому разі?

A. Непрямого масажу серця

B. Видалення води з дихальних шляхів

C. Уведення строфантину

D. Прекардіального удару

619. На прийомі в поліклініці лікар оглядає новонароджену дитину віком 1 місяць. Укажіть, між якими кістками розташоване мале тім'ячко в новонароджених дітей.

A. Між потиличною та тім'яними

- B. Між лобними
- C. Між лобними та скроневиими
- D. Між лобними та тім'яними
- E. Між скроневиими та тім'яними

620. Першороділля 25 років госпіталізована до пологового відділення наприкінці I періоду пологів. Яка ознака вказує на його завершення?

A. Повне розкриття шийки матки

- B. Періодичний ниючий біль
- C. Народження посліду
- D. Народження плода
- E. Розкриття шийки матки на 2 см

621. У потерпілого чоловіка діагностовано відкритий пневмоторакс. Яка пов'язка накладається у цьому разі під час надання невідкладної допомоги?

A. Оклюзійна

- B. Колосовидна
- C. Спіральна
- D. Працевидна
- E. Дезо

622. Новонароджена дівчинка народилася від передчасних пологів із гестаційним віком 33 тижні. Маса тіла - 1900 г, зріст - 40 см. Під час огляду спостерігається: кістки черепа м'які, вуха щільно прилягають до голови; шкіра зморшкувата, підшкірно-жирова тканина виражена слабо; пупкове кільце зміщене до лона; відкрита статеві щілина. Укажіть ступінь недоношеності:

A. Недоношеність II ст.

- B. Недоношеність III ст.
- C. Недоношеність I ст.
- D. Недоношеність IV ст.
- E. Недоношеність V ст.

623. Медична сестра проводить огляд дитини віком 3 місяці в кабінеті долікарського прийому. Яку маніпуляцію, окрім антропометрії, вона обов'язково повинна здійснити перед проведенням профілактичного щеплення?

A. Термометрію

- B. Вимірювання АТ
- C. Узяття мазка із зіву та носа
- D. Підрахунок ЧСС

624. У пацієнтки 48 років діагностовано дифузний токсичний зоб. Які симптоми характерні для цього захворювання?

A. Екзофтальм, тахікардія, тремор кінцівок

- B. Р. Задишка, стрії
- C. Одутлуватість обличчя, пастозність гомілок
- D. Ожиріння, набряки, брадикардія

625. У породіллі після народження посліду почалася кровотеча. Під час огляду посліду на цілісність на плодовій оболонці була виявлена обірвана судина. М'які тканини пологових шляхів не ушкоджені. Яка найімовірніша причина кровотечі?

A. Затримка додаткової дольки у порожнині матки

B. Гіпотонічна маткова кровотеча

C. Розрив шийки матки

D. Коагулопатична кровотеча

E. Затримка плідних оболонок у порожнині матки

626. Потрійний прийом Сафара, що проводиться під час серцево-легеневої реанімації, призначений для:

A. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

B. Профілактики респіраторного ацидозу

C. Фіксації шийного відділу хребта

D. Профілактики аспірації шлункового вмісту

E. Профілактика регургітації

627. Дитині, у якої є підозра на аномалію розвитку нирок, призначено проведення екскреторної урографії. Укажіть шлях уведення контрастної речовини під час цього дослідження:

A. Внутрішньовенно

B. У стегнову артерію

C. Підшкірно

D. Внутрішньом'язово

E. У сечовий міхур

628. Медсестрі, яка працює в дитячому садку, потрібно провести розрахунок маси тіла дітей середньої групи. Яку формулу вона використає, щоб вирахувати приблизну масу тіла дитини віком 4-5 років?

A. $10 + (2 \times n)$

B. $100 + 6(n - 4)$

C. $75 + (5 \times n)$

D. Маса тіла одразу після народження + $(800 \times n)$

E. $100 - 8 \times (4 - n)$

629. Пацієнт хворіє на бронхіальну астму протягом 40 років. Яка форма грудної клітки характерна для цієї патології?

A. Бочкоподібна

B. Рахітична

C. Кіфосколиотична

D. Лійкоподібна

E. Паралітична

630. У жінки 33 років періодично повторюються напади експіраторної задишки. Під час мікроскопічного дослідження в мокротинні виявлено спіралі Куршмана та кристали Шарко-Лейдена. Яке захворювання можна припустити?

A. Бронхіальна астма

B. Туберкульоз легень

C. Бронхоектатична хвороба

D. Хронічний бронхіт

631. До ендокринологічного відділення доставлено пацієнта, у якого спостерігається повільне (6-8 дихальних рухів за 1 хв.), шумне, утруднене і глибоке дихання (дихання загнаного звіра). Визначте патологічний тип дихання:

- A. Дихання Куссмауля**
- В. Дихання Біота
- С. Задишка
- D. Дихання Чейна-Стокса
- Е. Брадіпное

632. У комбустіологічному відділенні перебуває пацієнт з опіками передньої поверхні обох стегон та тулуба, а також промежини. Визначте площу опіку:

- A. 28%**
- В. 27%
- С. 18%
- D. 25%
- Е. 36%

633. У пацієнтки з інсулінозалежним цукровим діабетом на зовнішній поверхні лівого плеча спостерігається зникнення підшкірної жирової клітковини. Яка патологія виникла в пацієнтки?

- A. Ліподистрофія**
- В. Некроз
- С. Жирова емболія
- D. Гематома
- Е. Пірогенна реакція

634. Медична сестра процедурного кабінету проводить трифазне дуоденальне зондування пацієнту, хворому на хронічний холецистит. Укажіть, якого кольору повинна бути порція В у нормі під час проведення дуоденального трифазного зондування:

- A. Темно-оливкового**
- В. Блідожовтого
- С. Чорного
- D. Жовтого
- Е. Лимонного

635. Пацієнт 45 років переребуває в травматологічному відділенні через перелом правого стегна. Яку шину потрібно підготувати медичній сестрі для проведення лікування методом скелетного витяжіння?

- A. Шина Белера**
- В. Шина Крамера
- С. Шина Дітерікса
- D. Шина Фільберга
- Е. Шина Томаса-Виноградова

636. До травмпункту надійшов чоловік, якого годину тому вкусив бродячий пес. Під час огляду в ділянці лівої гомілки виявлено рану з нерівними краями, незначну кровотечу. Яке незалежне медсестринське втручання потрібно виконати медсестрі насамперед?

- A. Промити рану мильним розчином**

- В. Накласти давлячу пов'язку
- С. Надати кінцівці підвищене положення
- Д. Накласти асептичну пов'язку
- Е. Промити рану розчином перекису водню

637. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 45 років, який приймає діуретики в зв'язку з лікуванням серцево-судинної патології. Визначивши кількість виділеної сечі за добу (добовий діурез) та порівнявши її із кількістю випитої рідини та введеної парентерально, медична сестра визначила, що пацієнт виділив більше сечі, ніж отримав рідини. Як називається цей вид діурезу?

- А. Позитивний**
- В. Нормальний
- С. Негативний
- Д. Від'ємний
- Е. Незбалансований

638. У дитини 5 місяців підшкірно-жирова основа зникла на животі і кінцівках, дефіцит маси тіла складає 23%. Який хронічний розлад живлення у цієї дитини?

- А. Гіпотрофія II ступені**
- В. Паратрофія
- С. Б. Гіпотрофія III ступені
- Д. Нормотрофія
- Е. Гіпотрофія I ступені

639. У роділлі триває III період пологів. Послід народився нижнім краєм уперед, материнською поверхнею назовні. Який тип відокремлення плаценти?

- А. З периферії**
- В. Центральний
- С. Боковий
- Д. Крайовий
- Е. Змішаний

640. Пацієнтці 43 років, яка перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні з приводу міокардиту, лікар призначив дослідити властивості пульсу. Яка судина найчастіше використовується для визначення властивостей пульсу?

- А. Променева артерія**
- В. Ліктьова артерія
- С. Стегнова артерія
- Д. Скронева артерія
- Е. Сонна артерія

641. Серцево-легенева реанімація - це комплекс лікувальних заходів, спрямованих на відновлення життєвоважливих функцій організму у разі зупинки кровообігу і дихання (клінічної смерті). Яка з наведених ознак свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації?

- А. Поява пульсу на сонній артерії**
- В. Поява трупних плям
- С. Відсутність пульсу на магістральних судинах
- Д. Ціаноз шкіри
- Е. Розширення зіниць

642. Який із наведених діагностичних методів обстеження є найбільш інформативним для діагностики цукрового діабету в дітей?

A. Стандартний глюкозотолерантний тест

- B. Виявлення глюкози в сечі
- C. Біохімічне дослідження крові
- D. Загальний аналіз крові
- E. Загальний аналіз сечі

643. Пацієнт 40 років перебуває на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: хронічний бронхіт. Яким приладом медичній сестрі потрібно виміряти йому життєву ємкість легень?

A. Спірометром

- B. Динамометром
- C. Фонендоскопом
- D. Апаратом Боброва
- E. Тонометром

644. Який основний метод годування недоношених новонароджених дітей з терміном гестації до 30 тижнів?

A. Через зонд

- B. З ложечки
- C. З чашки
- D. Грудне вигодовування

645. На лікуванні в інфекційному стаціонарі перебуває пацієнт, хворий на шигельоз. Який механізм передачі цього захворювання?

A. Фекально-оральний

- B. Парентеральний
- C. Трансмісивний
- D. Контактний
- E. Повітряний

646. Назвіть вид операції, що виконується з метою усунення безпосередньої небезпеки для життя пацієнта або полегшення його стану, але не виліковує його:

A. Паліативна

- B. Радикальна
- C. Термінова
- D. Планова
- E. Екстрена

647. Пацієнту, у якого підозра на туберкульоз, призначено пробу Манту. Для проведення проби Манту використовують препарат:

A. Туберкулін

- B. Ізоніазид
- C. Вакцину БЦЖ
- D. Етамбутол

648. Роділля перебуває в III періоді пологів. Під час візуального спостереження за роділлею акушерка помітила, що за 10 хвилин після пологів дно матки відхилилося в бік правого

підребер'я. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

A. Шредера

B. Кюстнєра-Чукалова

C. Креде-Лазаревича

D. Альфельда

E. Довженка

649. До гінекологічного відділення звернулася жінка 30 років зі скаргами на затримку менструації до 8 тижнів, мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів, тест на вагітність позитивний. Під час бімануального дослідження виявлено: розміри матки не відповідають терміну вагітності, матка щільноеластичної консистенції, за даними УЗД - картина снігової бурі. Ці симптоми характерні для:

A. Міхурцевого занеску

B. Абортів в ході

C. Хоріонепітеліоми

D. Абортів, що не відбувся

E. Загрози переривання вагітності

650. Пацієнт 49 років скаржиться на біль стискаючого характеру за грудиною з іррадіацією в ліву руку, біль триває 1 годину, не минає після приймання нітрогліцерину. Яке захворювання можна припустити?

A. Інфаркт міокарда

B. Остеохондроз

C. Вегетосудинна дисфункція

D. Стенокардія

E. Сухий плеврит

651. У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт, хворий на асцит, якому призначена пункція черевної порожнини. Яким медичним терміном називається ця маніпуляція?

A. Абдомінальна пункція

B. Плевральна пункція

C. Люмбальна пункція

D. Венепункція

E. Стернальна пункція

652. Пацієнтка 45 років скаржиться на діарею до 15-20 разів на добу у вигляді рисового відвару, багаторазове блювання без нудоти, температура тіла 36,4°C. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, чисті, тургор знижений, язик сухий, голос ослаблений. Живіт м'який, безболісний. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Холера

B. Шигельоз

C. Сальмонельоз

D. Ботулізм

E. Червний тиф

653. Під час визначення групи крові за допомогою цоліклонів аглютинація відбулася з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?

A. АВ (IV)

B. В (III)

C. 0 (I)

D. A (II)

654. Медсестра перед кожним переливанням крові виконує проби на сумісність крові реципієнта та донора. Що з наведеного вона готує для їх проведення?

A. Сироватку реципієнта та кров донора

B. Кров реципієнта та кров донора

C. Кров реципієнта та сироватку донора

D. Сироватку реципієнта та сироватку донора

E. Стандартну сироватку та кров донора

655. Пацієнт 50 років перебуває на лікуванні в ендокринологічному відділенні. Скарги на збільшення у розмірах вух, носа, кистей рук та стоп протягом останнього часу. Для ураження якої ендокринної залози характерні такі симптоми?

A. Гіпофіза

B. Статевих залоз

C. Наднирникових залоз

D. Щитоподібної залози

E. Епіфіза

656. Який метод профілактичного обстеження населення використовується для ранньої діагностики туберкульозу та онкопатології?

A. Флюорографія

B. Спірографія

C. Бронхоскопія

D. Бронхографія

657. Під час переливання однокрупної резус-сумісної крові пацієнт почав скаржитися на біль у поперековій ділянці, утруднене дихання, серцебиття, біль за грудиною. Які найперші дії медичної сестри у цьому разі?

A. Припинити переливання крові, викликати лікаря

B. Припинити переливання крові, увести 50% 2 мл анальгін

C. Припинити переливання крові, дати таблетку валідолу під язик

D. Заспокоїти пацієнта, продовжити переливання крові

E. Припинити переливання крові, спостерігати за пацієнтом

658. З моменту запліднення в організмі вагітної жінки відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріона. Яка залоза протягом 4 місяців забезпечує цей процес?

A. Жовте тіло вагітності

B. Гіпофіз

C. Щитоподібна залоза

D. Плацента

E. Надниркові залози

659. У новонародженої дитини на голові в ділянці тім'яної кістки виявлено крововилив, який не виходить за її межі, не пульсує, безболісний, шкіра над ним не змінена. Яку патологію можна припустити?

A. Кефалогематома

- В. Ліпома
- С. Водянка мозку
- Д. Внутрішньочерепна травма
- Е. Пологова пухлина

660. Операційна медсестра готує інструментарій для трахеостомії. Який спеціальний інструмент потрібно підготувати для цієї операції?

- А. Розширювач Труссо**
- В. Розширювач Мікулича
- С. Пилка Джиглі
- Д. Распатор Дуаєна
- Е. Гачки Фарабефа

661. Лікар призначив пацієнту аналіз сечі за методом Зимницького. Інструктуючи пацієнта, медична сестра повинна пояснити, що сечу треба збирати в окрему ємкість:

- А. Кожні 3 години**
- В. Кожні 2 години
- С. Кожні 12 годин
- Д. Протягом доби
- Е. Кожне сечовипускання

662. Медсестра оглядає пацієнта, який має закритий перелом правого стегна. Яка ознака перелому вважається абсолютною?

- А. Патологічна рухливість**
- В. Порушення функції
- С. Біль
- Д. набряк
- Е. Гематома

663. Для підготовки до іригоскопії пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення повинен прийняти пацієнт для проведення цієї маніпуляції?

- А. На лівому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами**
- В. На спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до живота
- С. На животі
- Д. На правому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами
- Е. Колінно-ліктьове

664. У чоловіка після перенесеного бактеріального тонзиліту за 2 тижні з'явилися набряки на обличчі, головний біль, зменшення сечовипускання, сеча набула кольору м'ясних помийів . Для якого захворювання найхарактерніші такі симптоми?

- А. Гострий гломерулонефрит**
- В. Гострий пієлонефрит
- С. Сечокам'яна хвороба
- Д. Гострий уретрит
- Е. Хронічний пієлонефрит

665. Сімейний лікар разом із медичною сестрою проводять медичний огляд учнів школи. Яка проба визначає вихідну тренованість дітей та стан серцево-судинної системи?

- А. Проба Руф'є**

- В. Проба Дельбе-Пертеса
- С. Ортостатична проба
- Д. Проба Тренделенбурга
- Е. Проба Манту

666. Дівчинка 9 років лікується в дитячому відділенні з приводу вогнищевої бронхопневмонії. Після в/м ін'єкції антибіотика в неї з'явилося відчуття жару, утруднене дихання, відчуття нестачі повітря, млявість, запаморочення, згодом втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: різка блідість шкіри, ЧД - 60\хв., пульс ниткоподібний до 130\хв., АТ - 70\40 мм рт. ст. Для якого стану характерні такі симптоми?

- А. Анафілактичний шок**
- В. Астматичний статус
- С. Колапс
- Д. Стенозуючий ларинготрахеїт
- Е. Непритомність

667. Укажіть, який сучасний метод визначення секреторної функції шлунка застосовують для пацієнтів, у яких є підозра на хронічний гастрит:

- А. Інтрагастральна рН-метрія**
- В. Дуоденальне зондування
- С. Фіброгастроудоденоскопія
- Д. Копрологічне дослідження

668. Хірургічна медсестра готує набір інструментів для проведенні операції з приводу геморою. Який спеціальний затискач треба підготувати для захоплення гемороїдальних вузлів?

- А. Затискач Федорова**
- В. Затискач Більрота
- С. Затискач Мікуліча
- Д. Затискач Кохера
- Е. Затискач Люера

669. Пацієнт 20 років скаржиться на підвищення температури тіла, слабкість, головний біль, переймоподібний біль унизу живота зліва, часті випорожнення з прожилками слизу, крові, тенезми. Яке захворювання можна припустити?

- А. Шигельоз**
- В. Неспецифічний виразковий коліт
- С. Ієрсиніоз
- Д. Амебіаз
- Е. Сальмонельоз

670. До шкільної медсестри звернувся школяр, який поранив склом праву гомілку. Під час огляду медична сестра виявила рану 3х1 см, з якої рівномірним струменем витікає темна кров. Який метод тимчасової зупинки кровотечі треба застосувати в цьому разі?

- А. Накладання стискальної пов'язки**
- В. Згинання кінцівки в суглобі
- С. Накладання джгута
- Д. Накладання оклюзійної пов'язки
- Е. Пальцеве притиснення артерії

671. Лікувально-профілактичні заклади, діяльність яких базується на використанні для лікування пацієнтів переважно природних лікувальних факторів, фізіотерапії і лікувальної фізкультури, називаються:

A. Санаторіями

B. Амбулаторіями

C. Медико-санітарними частинами

D. Диспансерами

E. Поліклініками

672. Перед проведенням ревакцинації проти туберкульозу дитині 7-річного віку провели пробу Манту. За 72 години в місці ін'єкції з'явилась папула розміром 4 мм. Зробіть висновок за результатом проби:

A. Сумнівна реакція

B. Негативна реакція

C. Позитивна реакція

D. Суперергічна реакція

E. Гіперергічна реакція

673. У пацієнтки 3-ї доби після закритої черепно-мозкової травми спостерігається симптом окулярів. Яку патологію можна припустити?

A. Перелом основи черепа

B. Перелом склепіння черепа

C. Забій головного мозку

D. Струс головного мозку

E. Перелом кісток носа

674. Пацієнту 49 років після оперативного втручання на стравоході призначили штучне годування через зонд. Для цієї процедури медичній сестрі треба підготувати:

A. Стерильний тонкий шлунковий зонд

B. Катетер

C. Стерильний товстий шлунковий зонд

D. Дуоденальний зонд з оливою

E. Газовідвідну трубку

675. Пацієнт 68 років перебуває на лікуванні у кардіологічному відділенні. Медична сестра визначила, що добовий діурез пацієнта становить 420 мл. Ваші висновки:

A. Олігурія

B. Ішурія

C. Ніктурія

D. Анурія

E. Поліурія

676. Пацієнт хірургічного відділення лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатися, піднімати голову та верхні й нижні кінцівки. Яке це положення?

A. Пасивне

B. Вимушене

C. Вимушене пасивне

D. Вимушене активне

E. Активне

677. У пацієнтки після операції з приводу фіброміоми матки виникла затримка сечі, яка триває понад 12 годин. Рефлекторні прийоми та введення прозерину не дали ефекту. Яка тактика потрібна в цьому разі?

A. Катетеризація сечового міхура

- B. Рясне пиття
- C. Очисна клізма
- D. Промивання сечового міхура
- E. Обмеження рідини

678. У потерпілого чоловіка 24 років із колотою раною грудної клітки під час огляду виявлено, що під час дихання повітря вільно надходить у плевральну порожнину, а назад не виходить. Яку патологію можна припустити в цьому разі?

A. Клапанний пневмоторакс

- B. Відкритий пневмоторакс
- C. Закритий пневмоторакс
- D. Перелом ребер

679. У літній період пацієнт із накладеним артеріальним джгутом транспортується до лікарні. Укажіть максимальний термін накладання джгута в літній період:

A. Не більше ніж 1 година

- B. Не більше ніж 30 хвилин
- C. До прибуття до лікарні
- D. Не більше ніж 3 години
- E. Не більше ніж 2,5 години

680. Під час огляду дитини 1,5 місяця медсестра оцінює стан шкіри лівого плеча після вакцинації БЦЖ. Яка місцева специфічна реакція з'являється за 4-6 тижнів на місці уведення вакцини БЦЖ у первинно вакцинованих дітей?

A. Інфільтрат

- B. Папула
- C. Виразка
- D. Рубчик
- E. Пустула

681. На 3 добу після народження у немовляти з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри. Загальний стан дитини задовільний, печінка та селезінка не збільшені, забарвлення випорожнень не змінилося. Такі ознаки характерні для:

A. Фізіологічної жовтяниці

- B. Сечекислого інфаркту нирок
- C. Токсичної еритеми
- D. Гемолітичної хвороби новонароджених
- E. Механічної жовтяниці

682. До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт із скаргами на біль у животі, загальну слабкість. З анамнезу стало відомо, що три години тому під час бійки отримав удар ногою в ділянку живота. Об'єктивно спостерігається: загальний стан погіршується, шкіра бліда, живіт м'який, локальний біль та напруження м'язів у ділянці удару Ушко-джена частина живота відстає в акті дихання. Які найперші дії слід виконати медичній сестрі?

A. Холод на живіт, негайна госпіталізація

- В. Застосування анальгетиків
- С. Застосування спазмолітиків
- Д. Грілка на живіт, негайна госпіталізація
- Е. Амбулаторне спостереження

683. Пацієнту, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, призначено рентгенологічне дослідження шлунка. Яку контрастну речовину використовують для цього?

А. Барієву суміш

- В. Верографін
- С. Урографін
- Д. Іопогност
- Е. Холевіт

684. У дитини 5 років з'явилися такі симптоми: підвищення температури тіла до 37,5°C, неспокій, висипання, які супроводжуються свербінням. Об'єктивно спостерігається: папульозно-везикулярний висип на волосистій частині голови, обличчі, тулубі. Яке захворювання можна припустити?

А. Вітряна віспа

- В. Кір
- С. Краснуха
- Д. Скарлатина
- Е. Алергічний дерматит

685. У новонародженої дівчинки на 4-й день життя з'явилися кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини, набряк великих статевих губ, набухання грудних залоз. Для якого транзиторного стану новонароджених характерні такі симптоми?

А. Статевий криз

- В. Фізіологічна жовтяниця
- С. Токсична еритема
- Д. Транзиторна гіпертермія
- Е. Сечокислий інфаркт нирок

686. До патронажної медичної сестри амбулаторії сімейної медицини звернулась жінка 25 років зі скаргами на біль і набряк великої статевої губи, незручність під час ходіння, підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається: права статева губа збільшена, набрякла, у нижній її третині пальпується болісне утворення, шкіра над яким гіперемована. Для якої патології характерні такі клінічні ознаки?

А. Бартолініт

- В. Вульвіт
- С. Ліпома
- Д. Гемангіома
- Е. Гематома

687. Медична сестра ендокринологічного відділення після медсестринського обстеження виявила у пацієнта симптоми, характерні для цукрового діабету. Які специфічні симптоми цього захворювання?

А. Полідипсія, поліурія, поліфагія

- В. Блідість, запаморочення, слабкість
- С. Тахікардія, екзофтальм, дратівливість

- D. Набряки, задишка, тахікардія
- E. Гіркота у роті, нудота, блювання

688. Медичній сестрі потрібно надати медичну допомогу чоловіку з електротравмою. Чоловік без свідомості, тримається за електричний дріт. З чого саме слід розпочати надання допомоги чоловіку?

A. Звільнити потерпілого від джерела електроструму

- B. Провести ШВЛ
- C. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- D. Провести непрямий масаж серця

689. У дитини виникла носова кровотеча. На догоспітальному етапі для зупинки кровотечі необхідно застосувати:

A. Холод на перенісся

- B. Холод на підборіддя
- C. Холод на грудину
- D. Холод на п'яти
- E. Тепло на перенісся

690. Пацієнтові нефрологічного відділення призначено аналіз сечі, за допомогою якого можна оцінити функціональну здатність нирок. Укажіть це дослідження:

A. Аналіз сечі за методом Зимницького

- B. Бактеріологічне дослідження сечі
- C. Аналіз сечі за методом Аддіса-Каковського
- D. Аналіз сечі за методом Амбурже
- E. Аналіз сечі за методом Нечипоренка

691. Дитина 13 років під час відпочинку на пляжі відчула пульсуючий головний біль, з'явилися нудота, блювання. Під час обстеження виявлено: шкіра гіперемована, температура тіла 39°C, посилене потовиділення, дратівливість, порушення координації рухів, тахікардія. Який патологічний стан виник у підлітка?

A. Тепловий удар

- B. Гіпоглікемічна кома
- C. Гіперглікемічна кома
- D. Харчове отруєння

692. Пацієнту 60 років призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної та прямої кишок. Як називається цей метод дослідження?

A. Ректороманоскопія

- B. Фіброгастроскопія
- C. Колоноскопія
- D. Цистоскопія
- E. Лапароскопія

693. Сімейним лікарем до шкірно-венерологічного диспансеру направлений пацієнт, у якого є підозра на сифіліс. Який біологічний матеріал потрібно взяти у пацієнта для проведення реакції Вассермана, щоб підтвердити діагноз?

A. Кров із вени

- B. Пунктат лімфовузла

- C. Кал
- D. Слину
- E. Сечу

694. Якого співвідношення вдихів та компресій грудної клітки під час проведення СЛР у дорослих треба дотримуватись як одним, так і двома реаніматорами згідно з новими рекомендаціями Європейської Ради з реанімації 2010 року?

A. 2

- B. 1
- C. 2
- D. 1

695. До гінекологічного відділення надійшла пацієнтка зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, сильний переймоподібний біль унизу живота. Об'єктивно спостерігається: АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс - 90/хв. Під час піхвового дослідження виявлено: зовнішнє вічко шийки матки пропускає палець. Матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності. Зробіть висновок щодо клінічної ситуації:

A. Аборт у ходу

- B. Неповний аборт
- C. Повний аборт
- D. Аборт, що не відбувся
- E. Загроза абарту

696. Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-методом?

A. Глюкометр

- B. Пульсоксиметр
- C. Тонометр
- D. Спірометр

697. У пацієнтки, яка хворіє на ожиріння, під час обстеження виявлено: помірний надлишок маси тіла, розподілення жирової клітковини рівномірне, шкіра ніжна, еластична. З анамнезу відомо, що батьки пацієнтки теж мали надлишкову вагу. Яка форма ожиріння в Пацієнтки?

A. Аліментарно-конституційна

- B. Змішана
- C. Церебральна
- D. Гіпоталамічна

698. У разі якого ускладнення виразкової хвороби шлунка випорожнення мають дьогтеподібний вигляд?

A. Кровотечі

- B. Стенозі
- C. Пенетрації
- D. Перфорації
- E. Малігнізації

699. Пацієнт 35 років скаржиться на біль і судими в гомілці та ступні, болісну напругу в усьому тілі, тризм жувальної мускулатури. З анамнезу відомо, що 7 днів тому пацієнт проколов ногу цвяхом. Яке захворювання можна припустити?

A. Правець

B. Газова гангрена

C. Флегмона гомілки

D. Сепсис

E. Бешиха

700. Пацієнтці гінекологічного відділення призначено взяття мазка на гормональне дзеркало .
Укажіть місце взяття матеріалу для цього дослідження:

A. Із бокового склепіння піхви

B. Із цервікального каналу

C. Із заднього склепіння піхви

D. Із переднього склепіння піхви

E. Із уретри

701. Який розділ клінічної медицини вивчає особливості розвитку, перебігу та лікування патології у людей похилого і старечого віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики та лікування?

A. Геріатрія

B. Герогігієна

C. Загальна гігієна

D. Геронтологія

E. Санологія

702. Під час огляду чоловіка одразу після ДТП виявлено такі ознаки: без свідомості, відсутність пульсації на магістральних артеріях, відсутність спонтанного дихання, розширення зіниць.
Визначте стан потерпілого:

A. Клінічна смерть

B. Агональний стан

C. Соціальна смерть

D. Травматичний шок

E. Біологічна смерть

703. Сімейна медсестра оглядає пацієнта зі скаргами на біль у животі. Під час пальпації живота спостерігається посилення болю, якщо раптово прибрати руку. Як називається цей симптом?

A. Щоткіна-Блюмерга

B. Пастернацького

C. Ровзінга

D. Ортнера

E. Сітковського

704. Медичній сестрі дитячого садочка для розрахунку енергемісткості раціону слід пам'ятати, що енергетична цінність 1 г білків становить:

A. 4 ккал

B. 8 ккал

C. 9 ккал

D. 10 ккал

705. Пацієнтці, яка хворіє на рак молочної залози, проведено курс променевої терапії. Що з наведеного найчастіше спостерігається в загальному аналізі крові після застосування цього

методу лікування?

A. Лейкопенія

B. Тромбоцитоз

C. Лейкоцитоз

D. Еритроцитоз

706. У новонародженої дитини медична сестра помітила набряк м'яких тканин у ділянці лобної кістки, не флюктує, без чітко окреслених меж. Для якої патології це характерно?

A. Пологова пухлина

B. Кефалогематома

C. Набряк мозку

D. Гідроцефалія

E. Парез лицевого нерва

707. Пацієнт 48 років скаржиться на погіршення апетиту, схуднення, слабкість, біль в епігастрії постійного характеру незалежно від приймання їжі, відразу до м'ясної їжі, блювання. З анамнезу відомо, що пацієнт хворів на виразкову хворобу шлунка. Розвиток якого ускладнення в пацієнта можна припустити?

A. Малігнізація виразки

B. Пілоростеноз

C. Шлункова кровотеча

D. Пенетрація виразки

E. Перфорація виразки

708. Під час проведення зовнішнього акушерського дослідження за допомогою I прийому Леопольда-Левицького встановлено, що дно матки знаходиться посередині між пупком та мечоподібним відростком. Визначте імовірний термін вагітності:

A. 32 тижні

B. 20 тижнів

C. 12 тижнів

D. 36 тижнів

709. Під час визначення добових коливань температури тіла пацієнта спостерігалось тривале утримування температури в межах 39,5-41°C, добові коливання її не перевищували 1°C. Для якого типу лихоманки це характерно?

A. Постійна

B. Переміжна

C. Виснажлива

D. Послабляюча

E. Неправильна

710. Укажіть типову найпершу локалізацію набряків у пацієнтів із гострим гломерулонефритом:

A. Обличчя

B. Тулуб

C. Верхні кінцівки

D. Поперекова ділянка

E. Гомілки

711. Жінка 45 років хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Після уведення звичайної дози

інсуліну відчула сильний голод, тремтіння в тілі, різку слабкість, шкіра вкрилася потом. За декілька хвилин жінка втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: шкіра волога, пульс 100\хв., АТ - 150\90 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло в жінки?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Гіпертонічний криз
- C. Непритомність
- D. Епілептичний напад
- E. Гіперглікемічна кома

712. Жінці 55 років діагностовано рак шийки матки з розпадом пухлини. Укажіть об'єм долікарської допомоги у разі кровотечі із шийки матки, зумовленою злоякісною пухлиною:

- A. Виконати тугу тампонаду піхви
- B. Прикласти холод на низ живота
- C. Провести піхвову ванночку
- D. Обробити йодом шийку матки
- E. Увести кровозупинні засоби

713. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на виділення крові із соска під час натискання на праву молочну залозу. Назвіть традиційний метод дослідження молочних залоз у разі припущення онкологічного захворювання:

- A. Мамографія
- B. Сцинтиграфія
- C. Ангіографія
- D. Сонографія

714. Для профілактики застійної пневмонії у пацієнта похилого віку після операції медичній сестрі до заходів із догляду потрібно додати:

- A. Дихальну гімнастику
- B. Профілактику пролежнів
- C. Вимірювання АТ
- D. Корекцію харчування
- E. Термометрію

715. Пацієнтка скаржиться на біль у спині та кінцівках, посилений ріст волосся на обличчі й тулубі, розлади менструального циклу. Протягом останніх 1,5 місяця маса тіла збільшилася на 8 кг. Під час біохімічного дослідження крові виявлено підвищений рівень АКТГ та кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

- A. Хвороба Іценко-Кушинга
- B. Цукровий діабет
- C. Гігантизм
- D. Дифузний токсичний зоб
- E. Феохромоцитома

716. Старша медична сестра пояснює санітарці, що метод, під час якого знищуються патогенні й умовно-патогенні мікроорганізми в середовищі, яке оточує людину, це:

- A. Дезінфекція
- B. Дезінсекція
- C. Антисептика
- D. Стерилізація

Е. Дератизація

717. Новонародженій дитині 3 днів, яка перебуває в пологовому будинку, заплановано щеплення проти туберкульозу. Який спосіб введення вакцини БЦЖ?

A. Внутрішньошкірно

В. Підшкірної

С. Внутрішньовенно

Д. Через рот

Е. Внутрішньом'язово

718. Дитина 4 місяців перебуває на грудному вигодовуванні, нервово- психічний та фізичний розвиток відповідає вікові. З якого віку доцільно ввести дитині перший прикорм?

A. з 6 місяців

В. з 4 місяців

С. з 7 місяців

Д. з 8 місяців

Е. з 3 місяців

719. Медсестра кабінету функціональної діагностики проводить запис ЕКГ пацієнту. Електрод якого кольору слід накласти на ліву руку?

A. Жовтого

В. Чорного

С. Зеленого

Д. Білого

Е. Червоного

720. До акушерського стаціонару доставлена вагітна жінка зі скаргами на сильний головний біль, пелену перед очима, миготіння мушок . Термін вагітності - 36 тижнів. АТ - 170/110 мм рт. ст., генералізовані набряки, протеїнурія - 5 г/л. На пропускнику у вагітної почалися тоніко-клонічні судоми. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

A. Еклампсія

В. Менінгоенцефаліт

С. Епілептичний напад

Д. Пухлина головного мозку

Е. Геморагічний інсульт

721. Дитина 6 років хворіє на грип. Температура тіла 39,6°C. Для клізми, щоб фізично усунути гіпертермію слід застосувати воду, температура якої:

A. 30-31°C

В. 25-26°C

С. 18-20° С

Д. 36-37°C

722. Назвіть інструмент, що використовується для дослідження нориць та введення дренажів:

A. Гудзикуватий зонд

В. Троакар

С. Шпиця Кіршнера

Д. Ложечка Фолькмана

Е. Коловорот

723. Пацієнт 26 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці і його переміщення в праву клубову ділянку, диспепсичні розлади, гіпертермію. Об'єктивно спостерігається: пацієнт блідий, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга та Ровзінга. Для якої патології характерні такі симптоми?

A. Гострий апендицит

- B. Пахвинна грижа
- C. Гострий панкреатит
- D. Вірусний гепатит В
- E. Гострий холецистит

724. Чоловік після падіння скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, запаморочення, не пам'ятає, що з ним трапилося. Для якого патологічного стану найхарактерніші такі симптоми?

A. Струс головного мозку

- B. Перелом склепіння черепа
- C. Порушення мозкового кровообігу
- D. Забій головного мозку
- E. Перелом основи черепа

725. До пологового будинку госпіталізована вагітна жінка в терміні вагітності 40 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження над входом у малий таз пальпується неправильної форми передлегла частина плода, м'якої консистенції, що не балотує. Для якого передлежання це характерно?

A. Тазове передлежання

- B. Ніжне передлежання
- C. Поперечне положення
- D. Лицеве передлежання
- E. Головне передлежання

726. Пацієнт 56 років скаржиться на інтенсивний головний біль, запаморочення, підвищення температури тіла до 39°C, збільшення пахвинного лімфатичного вузла справа до розмірів волоського горіха. Об'єктивно спостерігається: кон'юнктивіт, печінка і селезінка збільшені, на шкірі - розеолезно-папульозний висип. З анамнезу стало відомо, що декілька днів тому після полювання розробляв тушку вбитого зайця. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

A. Туляремія, бубонна форма

- B. Бруцельоз
- C. Лептоспіроз
- D. Менінгококцемія
- E. Чума

727. Чоловік під час прийому їжі раптово схопився руками за шию, почав кашляти, обличчя почервоніло, рот відкритий, дихання неможливе. З чого потрібно розпочати невідкладну допомогу в цьому разі?

A. Прийом Геймлиха

- B. Прийом Селліка
- C. Провести ШВЛ
- D. Потрійний прийом Сафара
- E. Заспокоїти пацієнта

728. Пацієнт 48 років скаржиться на постійну задишку, періодичний біль у грудній клітці,

кашель. Хворіє упродовж 15 років. Тривалий час працював шахтарем. Об'єктивно спостерігається: грудна клітка діжкоподібної форми; перкуторно над легеньми визначається ко-робковий звук, місцями притуплений. Яке захворювання можна припустити?

A. Пневмоконіоз

- B. Бронхоектатична хвороба
- C. Рак легень
- D. Хронічний бронхіт
- E. Туберкульоз легень

729. Медична сестра амбулаторії проводить групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать здорові люди, які не мають скарг і об'єктивних ознак хвороби на час обстеження та не хворіли в минулому?

A. Перша

- B. Четверта
- C. Друга
- D. П'ята
- E. Третя

730. На якому етапі медсестинського процесу проводиться медсестринська діагностика?

A. II

- B. V
- C. IV
- D. III

731. У пологовому будинку народилась доношена, здорова дитина з масою тіла 3,500 кг. Оглядаючи дитину, медсестра визначає частоту дихання. Яка нормальна частота дихання в новонародженої дитини?

A. 40-60\хв

- B. 30-40\хв
- C. 80-90\хв
- D. 16-18\хв
- E. 120-140\хв

732. Під час рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини на знімку виявлені чаші Клойбера. Яке захворювання можна припустити в цьому разі?

A. Кишкову непрохідність

- B. Піддіафрагмальний абсцес
- C. Гострий холецистит
- D. Міжпетельний абсцес
- E. Гострий панкреатит

733. Дитина 11 місяців хворіє декілька днів, температура тіла 37,5°C, незначні катаральні явища. На 3-й день хвороби загальний стан погіршився, з'явився нападоподібний гавкаючий кашель, голос став охриплим. Об'єктивно виявлено: виражений ціаноз носогубного трикутника, інспіраторна задишка. Яке захворювання можна припустити?

A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

- B. Гострий обструктивний бронхіт
- C. Пневмонія
- D. Напад бронхіальної астми

734. Який вид провідникової анестезії використовують під час оперативних втручань на пальцях рук?

A. Анестезію за методом Оберста-Лукашевича

- B. Внутрішньовенну анестезію
- C. Внутрішньокісткову анестезію
- D. Внутрішньом'язову анестезію
- E. Підшкірну анестезію

735. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної жінки виявлено: положення плода повздожнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання. Визначте найкраще місце вислуховування серцебиття плода в цьому разі:

A. Нижче пупка ліворуч

- B. На рівні пупка
- C. Нижче пупка праворуч
- D. Вище пупка ліворуч
- E. Вище пупка праворуч

736. Пацієнт 27 років скаржиться на нудоту та біль в епігастрії, що виникає за 1,5-2 год. після приймання їжі, голодний, нічний біль. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Виразкова хвороба 12-палої кишки

- B. Рак шлунка
- C. Холецистит
- D. Виразкова хвороба шлунка
- E. Панкреатит

737. Пацієнт під час взяття крові із вени відчув запаморочення та знепритомнів. Надаючи першу допомогу, медична сестра повинна надати йому положення:

A. Лежачи, голова нижче тулуба

- B. Лежачи, голова вище тулуба
- C. Сидячи, голова нахилена вперед
- D. Лежачи, голова на рівні тулуба
- E. Сидячи, голова запрокинута назад

738. Дівчинка 5 років скаржиться на свербіння навколо анального отвору, що підсилюється вночі. Дитина дратівлива, погано спить, апетит знижений. З боку внутрішніх органів відхилень не виявлено. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу в цьому разі?

A. Зіскоб на ентеробіоз

- B. Аналіз сечі на глюкозу
- C. Аналіз крові на цукор
- D. Загальний аналіз крові
- E. Загальний аналіз сечі

739. При огляді 9-місячної дитини фельдшер виявив зупинку дихання, тривалістю до 30 секунд при крику та плачу, що супроводжувалася ціанозом шкіри обличчя, «півнячим криком». Який із заходів долікарської допомоги слід застосувати?

A. Відкрити шпателем рот і подразнити корінь язика

- B. Скропити обличчя дитини холодною водою
- C. Покласти дитину на рівну, м'яку поверхню

740. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 35-ти років зі скаргами на підвищення температури тіла до 40°C, остуду, пітливість, виражену слабкість, задишку, серцебиття, біль у горлі під час ковтання, кровоточивість ясен. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Пальпуються збільшені лімфатичні вузли - шийні, підщелепні. Пульс - 96/хв., ритмічний, АТ- 90/60 мм рт.ст. Живіт м'який, печінка +5 см, нижче краю реберної дуги. Аналіз крові: еритроцити - 1,5 - 10¹²/л, гемоглобін - 50 г/л, лейкоцити - 15 - 10⁹/л, бластні клітини - 80%, ШОЕ- 60 мм/год. Який попередній діагноз у хворого?

А. Гострий лейкоз

В. Хронічний мієлолейкоз

С. Гемофілія

741. До фельдшера на ФАП звернувся хворий зі скаргами на підвищення температури тіла до 39-40°C, загальну слабкість, головний біль, набряк та почервоніння правої гомілки. При огляді фельдшер відзначив, що гомілка гіперемована, гіперемія з чіткими контурами у вигляді «географічної мапи». В анамнезі мала місце мікротравма кінцівки. Вкажіть, яке захворювання можна припустити у хворого:

А. Бешиха

В. Остеомієліт

С. Фурункул

742. Хворому 50-ти років з набряком легень фельдшер проводить інгаляційне введення кисню. Чим фельдшер зволожується кисень під час проведення оксигенотерапії?

А. 96° етиловим спиртом

В. Перевареною водою

С. Дистильованою водою

743. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка, у якої на 10 день захворювання на грип з'явилися носові кровотечі, дрібні крововиливи на слизовій ротової порожнини та шкірі, кровоточивість з ясен. Загальний аналіз крові Hb-110 г/л, кольоровий показник - 0,9, лейкоцити - 7,1 - 10⁹/л, тромбоцити - 90,0 - 10⁹/л, ШОЕ - 18 мм/год. Який попередній діагноз може поставити фельдшер?

А. Тромбоцитопенічна пурпура

В. Мієломна хвороба

С. Системний червоний вовчак

744. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик. У хворого відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги:

А. Джгут, знеболення, пов'язка, шина

В. Джгут, шина, знеболення, пов'язка

С. Шина, знеболення, джгут, пов'язка

745. Вагітна в терміні 35-36 тижнів звернулася до фельдшера ФАПУ. Вагітність перебігала на фоні прееклампсії. Загальний стан середнього ступеню важкості, шкіра бліда, пульс - 98/хв., АТ-140/90 мм рт.ст. Матка збільшена відповідно до строку вагітності, напружена.

Спостерігається болючість зліва від дна матки, асиметрія та болючість її при пальпації.

Серцебиття плода - 160-170/хв., глухе. Який імовірний діагноз?

А. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

В. Загроза передчасних пологів

С. Загроза розриву матки

746. До фельдшера на ФАП звернулася мати з 6-місячною дитиною. Мати скаржиться, що у дитини нежить, підвищення температури тіла, сльозотеча, дитина відмовляється від їжі, з'явився висипу на обличчі, шиї. Дитина хворіє 3-ю добу. При огляді: кашель, кон'юнктивіт, світлобоязнь, висип на обличчі, шиї папульозного характеру. Який Ваш діагноз?

A. Кір

В. Скарлатина

С. Туберкульоз шкіри

747. Молода жінка звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на виражений, щільний, блідий набряк обличчя, який не супроводжується свербіжем, утруднене дихання, слабкість, нудоту, підвищення температури до 38°C. Стан розвинувся через 30 хвилин після ін'єкції цефаксона. Об'єктивно: на обличчі виражений набряк, очні щілини майже закриті, язик не вміщається в роті. Пульс - 110/хв. АТ- 150/90 мм рт.ст. Як можна оцінити такий стан?

A. Набряк Квінке

В. Колапс

С. Кропив'янка

748. Швидка медична допомога прибула за викликом. Зі слів дружини, з її чоловіком відбувається «щось незрозуміле». Ввечері у нього з'явився неспокій: заглядає під ліжку і стіл, ніби щось шукає, кидається у сторони, накриває голову руками, вдивляється навкруги, до когось звертається з погрозами. Хворий дезорієнтований у часі і просторі, але реагує на своє ім'я. Як називається такий стан?

A. Делірій

В. Істеричний напад

С. Сомнамбулізм

749. У дівчинки 9-ти років дратівливість, зміна почерку, порушення ходи. За місяць до цього перенесла ангіну. При огляді м'язова гіпотонія, мимовільні скорочення мимічної мускулатури і пальців рук. Який прояв ревматичного ураження можна припустити?

A. Мала хорея

В. Анулярна висипка

С. Ревматичний артрит

D. Ревматичні вузлики

750. Фельдшера ШМД викликали на місце автопригоди. Потерпілий скаржиться на біль внизу живота і неможливість рухати ногами. При пальпації визначається болючість в проекції лобкового зрощення, навантаження на вісь посилює біль. Визначається позитивний симптом прилиплої п'яти. Як необхідно виконати транспортну іммобілізацію?

A. В положенні «жаби»

В. Напівсидячи

С. Лежачи на животі

D. Лежачи на спині

751. Дитина народилася на 35 тижні гестації. У неї виявлено: мікроцефалію, катаракту та вроджену ваду серця. З анамнезу відомо, що мати під час вагітності перехворіла на інфекцію, яка супроводжувалася плямистою висипкою, збільшенням лімфатичних вузлів та незначною інтоксикацією. Яку інфекцію можна припустити?

A. Краснуха

B. Токсоплазмоз

C. Герпетична інфекція

D. Хламідійна інфекція

752. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 58-ми років, який скаржиться на кашель з виділенням гнійного харкотиння до 200 мл на добу переважно зранку, періодичне підвищення температури. Два рази хворів на пневмонію. Шкіра бліда, акроціаноз, пальці у вигляді «барабаних паличок» нігті – «годинникових скелець». При перкусії над легеньми визначаються ділянки з коробковим та притупленим звуком, при аускультатії чути сухі та різноманітні вологі хрипи. Яку патологію можна припустити в першу чергу?

A. Бронхоектатична хвороба

B. Рак легень

C. Абсцес легень

D. Негоспітальна пневмонія

753. У хворого на гострий інфаркт міокарда, якого бригада ШМД транспортує у лікарню, виник приступ ядухи, з'явилися: інспіраторна задишка, кашель з пінистим, кров'янистим харкотинням, стан тяжкий, шкіра бліда. Пульс - 100\хв., ритмічний. Над легеньми - вологі середньопухирчасті хрипи. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Набряк легень

B. Кардіогенний шок

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. Легенева кровотеча

754. Фельдшера ФАПу викликали до хворого зі скаргами на загальну слабкість, переймоподібний біль у животі, підвищення температури тіла до 39,5°C, водянисті випорожнення зеленуватого кольору з домішками слизу. Такі симптоми свідчать про:

A. Сальмонельоз

B. Черевний тиф

C. Ешерихіоз

D. Дизентерію

755. На ФАПі фельдшер оглядає дитину віком 2 тижні, яка народилась доношеною з масою тіла 3400 г. Скарги матері на сухість шкіри, набряки рук, обличчя, уповільнення рухів та смоктання. При огляді: рот напіввідкритий, збільшений язик та губи, під час плачу грубий голос. Вкажіть імовірне захворювання:

A. Гіпотиреоз

B. Гіпертиреоз

C. Епідемічний зоб

D. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода

756. Назвіть комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, спрямованих на знищення гризунів в медичних закладах:

A. Дератизація

B. Детермінація

C. Дезінсекція

D. Дезінфекція

757. Фельдшера ФАПу викликали до хворого, який скаржиться на сильний розпираючий біль в лівій гомілці. При обстеженні гомілка набрякла, холодна на дотик, шкіра вкрита бурими плямами. Шовкова лігатура, зав'язана довкола гомілки, швидко врізається в шкіру. Під час пальпації відзначається крепітація, рани виділяються пухирці газу, краї рани мають вигляд «вареного м'яса». Встановіть попередній діагноз:

A. Газова гангрена нижньої кінцівки

B. Ендартеріт судин нижньої кінцівки

C. Волога гангрена нижньої кінцівки

D. Тромбофлебіт вен нижньої кінцівки

758. Жінка 24-х років з'явилась на прийом до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання. Температура тіла - 37,3°C, захворіла 5 годин назад. Об'єктивно: живіт симетричної форми, бере участь в диханні, при пальпації біль в правій здухвинній ділянці, захисне напруження м'язів, позитивні симптоми Щоткіна-Блюмберга, Сітковського. Пульс - 92\хв., АТ- 110\70 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

A. Гострий апендицит

B. Гостра кишкова непрохідність

C. Гострий аднексит

D. Гострий холецистит

759. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта додому. Пацієнт скаржиться на зниження апетиту, тяжкість у надчеревній ділянці і правому підребер'ї, блювання, здуття живота, слабкість. Об'єктивно: на шкірі обличчя і спини «судинні зірочки» долоні гіперемовані, живіт різко збільшений, навколо пупка венозна сітка у вигляді «голови медузи». Фельдшер запідозрив у пацієнта:

A. Цироз печінки

B. Хронічний гепатит

C. Хронічний холецистит

760. Хворий 15-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на слабкість, знижений апетит, шкірну сверблячку. Захворювання почалося із загального нездужання, погіршення апетиту, підвищення температури. Через 3 дні з'явилась нудота, двічі блювання, зник апетит. На 6-й день хвороби потемнішала сеча, знебарвився кал, з'явився сверблячка, жовтяниця склер і шкіри. При огляді хворого: температура тіла - 37,2°C, жовтяниця склер і шкіри. Пульс - 72\хв., АТ- 100\60 мм рт.ст. Печінка щільна, болюча, збільшена. Вкажіть діагноз:

A. Вірусний гепатит А

B. Вірусний гепатит В

C. Харчова токсикоінфекція

761. Чоловік 40-ка років скаржиться на напади лихоманки через кожні 3 дні, трясучий озноб, різке підвищення температури до 39-40°C, через 6-8 годин сильне потовиділення. Після тривалого сну відчуває себе задовільно. Об'єктивно: збільшені печінка і селезінка. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Малярія

B. Висипний тиф

C. Туляремія

762. Ви працюєте фельдшером сімейної амбулаторії. Пацієнту, який страждає на закреп та загострення геморою, призначена олійна клізма. Що потрібно підготувати для виконання

процедури?

A. 50-100 мл соняшникової олії t° - 37-38° C

B. 50-100 мл 20% розчину магнію сульфату t° 37-38° C

C. 300-500 мл вазелінової олії t° - 40-42° C

763. На ФАП звернувся хворий зі скаргами на постійний ниючий біль в правому підребер'ї, пов'язаний з прийомом їжі, загальну слабкість. Об'єктивно: шкіра жовтушного кольору. Живіт м'який, болючий в правому підребер'ї, печінка виступає з-під правого краю реберної дуги на 2 см, при пальпації болюча. Яке захворювання можна припустити?

A. Хронічний гепатит

B. Хронічний холецистит

C. Хронічний панкреатит

764. Фельдшер проводить санітарно-освітню лекцію на підприємстві з питань профілактики онкозахворювань. Що повинен відповісти фельдшер на питання: «Як часто жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз?»

A. 1 раз на місяць

B. 1 раз на рік

C. 2 рази на рік

765. Ви фельдшер ФАПу. При обстеженні вагітної встановили: положення плода поздовжнє, II позиція, задній вид, головне передлежання. Термін вагітності 30 тижнів. Де, на Вашу думку, найкраще буде прослуховуватись серцебиття плода?

A. Справа, нижче пупка

B. Зліва, вище пупка

C. Зліва, нижче пупка

766. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів «кавової гущі». Випорожнення «мелена» вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

A. Гіповолемічний шок

B. Анафілактичний шок

C. Кардіогенний шок

767. Хворий 28-ми років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°С, загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: лейкоцитів - $30 \times 10^9/\text{л}$, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

A. Абсцес головного мозку

B. Неврит

C. Менінгіт

768. Фельдшер ФАПу оглядає дитину 6-ти років зі скарлатиною. Перевіряє симптом «щипка». Про що свідчить позитивний симптом?

A. Про підвищену ламкість судин шкіри

B. Це фізіологічний стан шкіри

C. Про гіпертонус периферичних судин

769. Фельдшер ШМД транспортує до пологового стаціонару вагітну 28-ми років зі скаргами на кров'янисті виділення зі статевих шляхів, болючість у ділянці дна матки. Термін вагітності 38 тижнів. При обстеженні: вагітна бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 94/хв., матка в гіпертонусі, у ділянці дна матки - болюче випинання; виділення зі статевих шляхів кров'янисті, незначні; частота серцевих скорочень плода - 104/хв., тони приглушені. Назвіть метод розродження, який показаний у даному випадку:

A. Кесарів розтин

В. Накладання вихідних акушерських щипців

С. Пологи через природні статеві шляхи

770. Фельдшер швидкої допомоги оглядає дитину зі стенозуючим ларинготрахеїтом. Які симптоми характерні для цього захворювання?

A. Гавкаючий кашель, захриплість голосу, інспіраторна задишка

В. Бітональний кашель, бронхофонія

С. Нападopodobний кашель, апное

771. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 48-ми років зі скаргами на пронос (15-20 разів на добу), блювання, слабкість, спрагу, сухість у роті. Зі слів пацієнта, захворювання почалося напередодні раптово з проносу без болю в животі, потім приєдналось блювання. Шкіра бліда, суха, голос осиплий, тахіпное, тахікардія, температура тіла - 35,8°C. Фекалії, блювотні маси водянисті, нагадують рисовий відвар. Вкажіть попередній діагноз:

A. Холера

В. Ешерихіоз

С. Шигельоз

772. На ФАПі внаслідок передчасних стрімких пологів народилася дитина з масою тіла 1900 г. Стан дитини важкий, крик слабкий, монотонний, відзначається вибухання великого та малого тім'ячок, тремор підборіддя, кінцівок, періодично спостерігається судомна готовність. Який стан слід діагностувати?

A. Внутрішньочерепна пологова травма

В. Асфіксія новонародженого

С. Незрілість центральної нервової системи

773. У складі бригади ШМД Ви надаєте допомогу чоловіку, який впав з висоти 3 метри. Скаржиться на біль у грудній клітці, задишку. Аускультативно відсутнє дихання у правій половині грудної клітки, там же при перкусії тимпанічний звук. В якому положенні необхідно транспортувати потерпілого?

A. Напівсидячи

В. На правому боці

С. На спині

774. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відзначаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

A. Фолікулярна ангіна

В. Лакунарна ангіна

С. Катаральна ангіна

775. Під час огляду пацієнта 64-х років фельдшер ШМД визначив, що частота пульсу у пацієнта становить 92\хв. Як характеризувати таку частоту серцевих скорочень?

A. Тахікардія

B. Брадикардія

C. Гіпотонія

776. Дитина 5-ти років тиждень тому перехворіла на ГРВІ. На 8-й день стан дитини погіршився, знову підвищилася температура тіла до 39°C, з'явився кашель. При огляді: стан дитини середньої важкості, периоральний ціаноз, задишка змішаного типу - 45\хв. Дитині був встановлений діагноз: гостра пневмонія. При проведенні суб'єктивного обстеження, які дані будуть найбільш інформативними?

A. Крепітуючі хрипи, вкорочення перкуторного звуку у ділянці ураження

B. Великопухирчасті хрипи, ясний легеневий звук

C. Везикулярне дихання, ясний легеневий звук

777. Фельдшера швидкої допомоги, викликали до чоловіка 42-х років, який внаслідок ДТП отримав травми і перелом. Перелом якої з кісток отримав потерпілий, якщо фельдшер іммобілізував три суглоба?

A. Плечової

B. Надколінка

C. Великогомількової

778. Фельдшер ШМД приїхав на виклик до хворого 26-ти років, який скаржиться на виділення під час кашлю червоної крові. Об'єктивно: шкіра бліда, частота дихальних рухів - 28\хв., пульс - 96\хв., АТ- 90\60 мм рт.ст. Яке ускладнення може припустити фельдшер?

A. Легенева кровотеча

B. Ексудативний плеврит

C. Колапс

779. До фельдшера ФАПУ звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль, що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

A. Альгодисменорея

B. Посткастраційний синдром

C. Вірільний синдром

780. Швидка допомога прибула на виклик до пацієнта 60-ти років, який скаржиться на інтенсивний, пекучий біль за грудиною, який триває більше 30 хвилин і не знімається нітрогліцерином та іррадіює в обидві руки та нижню щелепу, супроводжується страхом смерті. Стан хворого тяжкий, свідомість ясна, шкіра бліда з акроціанозом, вкрита холодним липким потом. Тони глухі, пульс - 92\хв., малого наповнення, ритмічний. АТ- 60\30 мм рт.ст. На ЕКГ: ознаки Q-інфаркту. Розвиток якого ускладнення спостерігається у пацієнта?

A. Кардіогенний шок

B. Серцева астма

C. Гострий перикардит

781. Фельдшер ШМД прибув на виклик до дитини 3-х років, яка хворіє на ГРВІ. Раптово вночі стан значно погіршився, дитина неспокійна, плаче, з'явився гавкаючий кашель, осиплість голосу. Дихання часте, його чути на відстані. Що з дитиною?

A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

B. Гострий бронхіт

C. Асмастичний стан

782. Працівник виробництва впав з п'ятиметрової висоти. Фельдшер здоров'я пункту прибув на місце події. Потерпілий без свідомості, дихання поверхнєве, з носа і вух витікає рожева рідина. Що з потерпілим?

A. Перелом основи черепа

B. Перелом склепіння черепа

C. Перелом нижньої щелепи

783. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі, з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6°C, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

A. Гострий розлад травлення функціонального походження

B. Сальмонельоз

C. Дизентерія

784. Фельдшер після проведення проби Манту дітям 7-ми років перед ревакцинацією БЦЖ повинен знати, що інтервал між проведенням проби Манту і ревакцинацією має становити:

A. Не менше ніж 3 дні і не більше ніж 2 тижні

B. Не менше ніж 3 дні і не більше ніж 3 тижні

C. Не менше ніж 1 день і не більше ніж 3 тижні

785. В приймальне відділення лікарні надійшов пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

A. Стерильна вазелінова олія

B. Гліцерин

C. Антисептичний розчин

786. У дитини 10-ти років після фізичного навантаження з'явилися загальна слабкість, тремтіння кінцівок, поверхнєве дихання, підсилене потовиділення, відчуття голоду. З анамнезу відомо, що дитина хворіє на цукровий діабет, отримує ін'єкції за індивідуальною схемою. Які першочергові дії фельдшера в цьому випадку?

A. Дати дитині перорально будь-які «швидкі» вуглеводи

B. Дати випити води

C. Дати понюхати нашатирний спирт

787. Після проведення передстерилізаційної обробки медичних інструментів фельдшер провів фенофталеїнову пробу. Через 30 секунд з'явилося рожево-фіолетове забарвлення. Які подальші дії фельдшера?

A. Повторне промивання проточною водою

B. Висушування інструментів в сухожаровій шафі

C. Повторна дезінфекція інструментів

788. Під час маніпуляції на незахищену шкіру рук фельдшера потрапила кров пацієнта. Вкажіть, які заходи необхідно провести для обробки рук:

A. Промити проточною водою з милом

В. Обробити 6% розчином перексиду водню, помити з милом

С. Обробити 1% розчином хлораміну, помити з милом, знову обробити хлораміном

789. Пацієнт скаржиться фельдшеру ФАПУ на слабкість, серцебиття, задишку, заїди у куточках рота, випадіння волос, спотворення смаку, нюху, утруднення ковтання сухої твердої їжі. Шкіра бліда з зеленуватим відтінком, суха, язик червоний з атрофією сосочків. У клінічному аналізі крові мікроцитоз, анізоцитоз. Яке захворювання можна припустити у хворого?

A. Залізодефіцитна анемія

В. Гіпотиреоз

С. В12-дефіцитна анемія

790. Фельдшер ШМД супроводжує дитину 5-ти днів з внутрішньочерепною пологовою травмою у відділення реанімації. Раптово у дитини з'явилися симптоми асфіксії III ступеня. Фельдшер почав проводити серцево-легеневу реанімацію. Яке співвідношення частоти вдихів і натискань на грудину повинно бути у даному випадку?

A. На 2 вдиха 30 натискань

В. На 1 вдих 1 натискання

С. На 1 вдих 30 натискань

791. В приймальне відділення надійшла дитина у важкому стані. Шкіра бліда, температура тіла - 39°C. На сідницях, стегнах, гомілкях - поодинокі геморагічна висипка. Слизові оболонки ціанотичні. ЧД- 56\хв. Тони серця ритмічні, послаблені, ЧСС- 160\хв. Протягом 30 хвилин висипка на шкірі поширилася, збільшилася в розмірах. Про яке захворювання слід думати?

A. Менінгококова інфекція

В. Вітряна віспа

С. Кір

792. До ФАПУ був доставлений чоловік 60-ти років у коматозному стані. Зі слів родичів після емоційного перенапруження відчув сильний головний біль, втратив свідомість, було блювання. В анамнезі: гіпертонічна хвороба. При огляді: АТ- 210\110 мм рт.ст., шкіра обличчя гіперемована, права щока «парусить» права рука звисає «нагайкою» розбіжна косоокість, ригідність потиличних м'язів. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Геморагічний інсульт

В. Ішемічний інсульт

С. Гіпертонічна енцефалопатія

793. Фельдшера швидкої допомоги викликали до пацієнта 48-ми років, що скаржиться на одноразове блювання, здуття живота, сильний біль у поперековій ділянці справа, що іррадіює в статеві органи, живіт, часте болюче сечовипускання. Об'єктивно: хворий неспокійний, стогне, шкіра бліда, вкрита рясним потом. Р6- 90\хв. АТ-140\90 мм рт.ст., симптом Пастернацького позитивний справа. Поставте найімовірніший діагноз:

A. Ниркова колька

В. Кишкова колька

С. Гострий апендицит

794. Фельдшер ФАПУ поставив діагноз інфаркт міокарда. Які препарати він використає для профілактики тромбоемболічних ускладнень при інфаркті міокарда?

A. Гепарин

В. Дофамін
С. Новокаїнамід

795. На ФАП звернулася хвора 48-ми років зі скаргами на рясну кровотечу зі статевих шляхів після затримки місячних протягом 5 місяців, слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, тахікардія. При гінекологічному обстеженні: тіло матки нормальних розмірів, безболісне, рухоме; придатки з обох боків не визначаються. Який імовірний діагноз?

А. Дисфункціональна маткова кровотеча

В. Міома матки
С. Рак шийки матки

796. У дитини 2-х років температура тіла - 39°C, слизова ротової порожнини гіперемована, з білувато-жовтими бляшками оточеними червоною облямівкою. Вкажіть найбільш імовірний орієнтовний діагноз:

А. Афтозний стоматит

В. Катаральний стоматит
С. Кандидозний стоматит

797. Вагітна звернулася на ФАП до фельдшера зі скаргами на головний біль, нудоту, 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, АТ-180/110 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 175/105 мм рт.ст. Рс - 88/хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС-160/хв. Яке імовірне ускладнення виникло?

А. Прееклампсія тяжкий ступінь

В. Гіпертонічний криз
С. Набряки під час вагітності

798. Хворий 36-ти років звернувся до фельдшера зі скаргами на гострий біль в животі, який виникає через 30 хвилин після прийому їжі. Апетит збережений, але через появу болю після їжі хворий обмежує її прийом. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану відзначає в осінньо-весняний період. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Легені та серце без патології. Язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота відзначається болючість в епігастральній ділянці. Ваш діагноз:

А. Виразкова хвороба шлунка

В. Хронічний панкреатит
С. Хронічний ентерит

799. Фельдшер ФАПу при обстеженні вагітної, яку треба взяти на облік, встановив: термін вагітності 30 тижнів, положення плода поздовжнє, І позиція, передній вид, головне передлежання. Розміри тазу: 24-26-28-18. При піхвовому дослідженні мис досягається, діагональна кон'югата 11 см. Про який таз йдеться?

А. Загальнорівномірнорозвужений таз

В. Нормальний таз
С. Плоскоракітний таз

800. Фельдшера ШМД викликали до дитини 7-ми років. У дитини підвищена температура тіла, головний біль, блідість шкіри, периоральний ціаноз, відсутність апетиту, незначний біль у горлі. Дитина скаржиться на біль в животі, декілька раз було блювання. Різко виражений набряк мигдаликів та м'яких тканин ротоглотки. На поверхні мигдаликів наліт фіброзного характеру, плівчастий, щільний, брудно-сірого кольору який не знімається шпателем. Вкажіть

попередній діагноз:

A. Дифтерія мигдаликів

B. Стоматит

C. Дифтерія гортані

801. При проведенні огляду ротової порожнини у новонародженої дитини фельдшер ФАПу помітив білий наліт на слизовій оболонці рота та язичці. Наліт нагадує молоко, що зсілося. Який найбільш імовірний збудник міг спричинити дане захворювання?

A. *Candida albicans*

B. *Echerichia coli*

C. *Clostridium perfringens*

802. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилася нудота, блювання, біль в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль/л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

A. Кетоацидотична кома

B. Уремична кома

C. Гіперлактацидемічна кома

803. До ФАПу доставлено жінку 42-х років з масивною крововтратою, пульс - 120/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Який кровозамінник слід застосувати для стабілізації артеріального тиску при наданні першої медичної допомоги?

A. Розчин реополіглюкіну

B. Фізіологічний розчин

C. 5% розчин глюкози

804. Фельдшера ФАПу викликали до хворого 63-х років, який скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній частині живота, нудоту, багаторазове блювання. При пальпації живота хворого фельдшер виявив різкий біль в епігастрії і лівому підребер'ї, позитивний симптом Мейо-Робсона. Який попередній діагноз?

A. Гострий панкреатит

B. Гострий апендицит

C. Перфоративна виразка шлунка

805. Фельдшер ФАПу спостерігає за дитиною 5-ти років, хворою на гемофілію. Після травми розвинулася кровотеча, яка не зупиняється. Дитина бліда, акроціаноз, кінцівки холодні, АТ- 60/30 мм рт.ст. З яким діагнозом госпіталізуєте дитину?

A. З геморагічним шоком

B. З гострою наднирковою недостатністю

C. З гострою серцевою недостатністю

806. Фельдшер ФАПу призначив пацієнту 36-ти років внутрішньом'язово пеніцилін по 500000 ОД 4 рази на добу. Готуючись до виконання ін'єкції, він ввів у флакон з 1000000 ОД пеніциліну 5 мл 0,9% хлориду натрію. Скільки мл розчину пеніциліну він повинен набрати в шприц для ін'єкції?

A. 2,5 мл

B. 10 мл

С. 5 мл

807. Хвора 29-ти років доставлена бригадою швидкої допомоги в стаціонар зі скаргами на гострий біль внизу живота, блювання. При огляді: живіт помірно здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга - позитивний. Пульс - 88\хв., температура тіла - 37°C. При бімануальному дослідженні: тіло матки щільне, не збільшене, рухоме, не болюче, справа та спереду від матки пальпується утворення 10x10 см, тугоеластичної консистенції, різко болюче при зміщенні, зліва додатки не визначаються, виділення слизові. Який найімовірніший діагноз?

A. Перекрут ніжки пухлини яєчника

В. Ниркова колька

С. Кишкова непрохідність

808. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 30-ти років зі скаргами на біль в литкових м'язах при ходьбі, мерзлякуватість стоп, порушення чутливості, відчуття повзання мурашок. Вважає себе хворим протягом 2 років. В анамнезі відмороження кінцівок. Курить, зловживає алкоголем. При обстеженні: шкіра стоп холодна на дотик, пульсація на артеріях стоп відсутня, на підколінній та стегновій - виразна. Поставте попередній діагноз:

A. Облітеруючий ендартеріт

В. Гострий артеріальний тромбоз

С. Облітеруючий атеросклероз

809. Під час піхвового дослідження у роділлі встановлено: шийка матки згладжена, відкриття 7 см. Плодовий міхур відсутній, голівка притиснута до входу в малий таз. Визначається передній кут великого тім'ячка, надперенісся, надбрівні дуги, очні западини. Визначте передлежання плода:

A. Лобне передлежання

В. Потиличне, передній вид

С. Передньоголовне передлежання

810. Яке захворювання можна припустити, якщо у вагітної в терміні 20 тижнів скарги на кров'янисті мажучі виділення зі статевих органів з жовтими міхурцями, заповненими рідиною, рухи плода відсутні, матка збільшена до 24 тижнів вагітності?

A. Міхурцевий занесок

В. Багатоплідна вагітність

С. Передлежання плаценти

811. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда, з ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80\хв. Тонічне скорочення м'язів. Перебував біля трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

A. Седуксен, димедрол, аміназин

В. Кордіамін, супрастин, анальгін

С. Цефазолін, манітол, еуфілін

812. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 67-ми років, що скаржиться на слабкість, запаморочення, блювання темно-коричневого кольору, яке з'явилося дві години тому. Протягом двох місяців зауважує на слабкість, зниження працездатності, відразу до м'ясної їжі. Об'єктивно: стан середньої тяжкості, шкіра бліда. Ps- 96\хв., слабого наповнення. АТ- 75/50

мм рт.ст., живіт м'який. Симптом Щоткіна-Блюмберга негативний. Поставте попередній діагноз:

A. Рак шлунку, ускладнений кровотечею

B. Виразкова хвороба 12-палої кишки, ускладнена кровотечею

C. Цироз печінки, ускладнений стравохідною кровотечею

813. До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах «летючого» характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги:

A. Ревматична хвороба

B. Остеохондроз

C. Остеоартроз

814. На ФАП звернувся хворий зі скаргами на різкий біль шиї, обмеження рухів головою. Об'єктивно: задня поверхня шиї набрякла, синюшного кольору, в центрі щільний, різко болючий інфільтрат з багатьма гнійними вогнищами. Яку фіксуючу пов'язку необхідно накласти на гнійник?

A. Восьмиподібну

B. Циркулярну

C. Спиральну

815. До фельдшера на ФАП звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зяяння шкіри з незначною кровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

A. Відкритий перелом

B. Вивих

C. Розрив зв'язок

816. Фельдшер ШМД оглядає пацієнта, який постраждав у результаті ДНІ. При огляді: шкірні покриви з ціанотичним відтінком, задишка, по середньоключичній лінії справа в ділянці V міжребер'я - рана, з якої під час видиху виділяється піниста кров. Який Ваш діагноз?

A. Відкритий пневмоторакс

B. Закритий перелом ребер

C. Клапанний пневмоторакс

817. Повторнородяща, пологи IV строкові, відбулися вдома. Закінчився II період пологів. Через 5 хвилин після народження плода у роділлі почалась кровотеча. Крововтрата - 450 мл, ознак відділення плаценти немає. Яка тактика ведення III періоду пологів?

A. Провести ручне відділення та видалення плаценти

B. Відділити послід зовнішніми прийомами

C. Провести зовнішній масаж матки

818. Фельдшера швидкої допомоги викликали до пацієнта, який скаржиться на раптовий, нападоподібний біль у поперековій ділянці справа. Біль іррадіює у статеві органи, стегно. Хворий неспокійний. Симптом Пастернацького різко позитивний справа. Фельдшер підготує для надання невідкладної допомоги:

A. Баралгін

B. Мезатон

819. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 25-ти років, у якого після фізичного перенапруження відзначався «удар в голову» було блювання, короточасна втрата свідомості. Відзначалось психомоторне збудження. В неврологічному статусі: менінгеальний синдром. Ваш попередній діагноз:

A. Субарахноїдальний крововилив

B. Минуще порушення мозкового кровообігу

C. Геморагічний інсульт

820. Після народження плода у роділлі через 10 хвилин з'явилися незначні кров'янисті виділення. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

A. Ознака Шредера

B. Ознака Штрассмана

C. Ознака Альфельда

821. Хворий 43-х років, працівник м'ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на головний біль, високу температуру, відчуття печіння в очах, біль у м'язах, особливо литкових, попереку, жовтяничний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, пальпуються збільшені печінка та селезінка. Олігурія. Температура тіла - 37,8°C, пульс - 100/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні дані клінічні симптоми?

A. Лептоспіроз

B. Вірусний гепатит

C. Черевний тиф

822. Швидка допомога приїхала на виклик до хворого 52-ти років, який скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, триває декілька хвилин та іррадіює у ліву руку і під ліву лопатку, оніміння пальців рук. Об'єктивно: хворий має надмірну масу тіла. Пульс - 76/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. тони серця звучні, чисті. На ЕКГ: сегмент ST нижче ізолінії на 1 мм. Який попередній діагноз?

A. Стенокардія

B. Перикардит

C. Інфаркт міокарда

823. У хворого з алергічним стенозом гортані медикаментозна терапія була неефективною, стан прогресивно погіршується, і прийнято рішення провести трахеотомію. Який спеціальний інструментарій необхідно підготувати фельдшеру для проведення трахеостомії?

A. Однозубий трахеостомічний гачок, рано-розширювач трахеї Труссо, трахеостомічні канюлі

B. Голка Біра, кровоспинний затискач Більрота, корнцанг

C. Троакар, цапки, кровоспинний затискач Микулича

824. В індивідуальному пологовому залі перебуває роділля. При проведенні зовнішнього акушерського обстеження було визначено: при II прийомі Леопольда - справа від пупка пальпується щільна, округла, балотуюча частина плода; зліва - м'яка, з нечіткими контурами; при III прийомі - передлегла частина плода відсутня. Визначте розташування плода в порожнині матки:

A. Поперечне положення, II позиція

B. Поперечне положення, I позиція

С. Повздовжнє положення, тазове передлежання, І позиція, передній вид

825. У пологовій залі перебуває породілля, яка годину тому народила живого доношеного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скаржиться на запаморочення, слабкість. Під час огляду: спостерігається блідість шкірних покривів та слизових оболонок, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рс- 96/хв., зі статевих шляхів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у породіллі?

А. Гіпотонія матки

В. Атонія матки

С. Гіпоплазія матки

826. До фельдшера на ФАП звернулася пацієнтка 42-х років, яка 2 хвилини тому отримала травму розбитим склом під час прибирання в шафі. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча рана 4х0,9 см з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:

А. Накладання джгута

В. Підвищене положення кінцівки

С. Давляча пов'язка

827. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 20-ти років, який скаржиться на загальне нездужання, інтенсивний розпираючий біль у поперековій ділянці, переважно з лівого боку, підвищення температури - 38,9°C, часте болісне сечовипускання. Стан середньої тяжкості. Шкіра звичайного кольору, волога, гаряча на дотик. Пульс - 98/хв., задовільний. АТ- 120/70 мм рт.ст. Різко позитивний симптом Пастернацького зліва. Визначте попередній діагноз:

А. Гострий пієлонефрит

В. Гострий цистит

С. Хронічний гломерулонефрит

828. Хворий 56-ти років, який тривалий час страждає на виразкову хворобу шлунку, звернувся до фельдшера ФАПу. Останнім часом постійно турбує шлунковий дискомфорт у вигляді втрати апетиту, почуття незадоволення від їжі, розпирання і тяжкість в ділянці шлунку, відрижки. Відзначає зниження маси тіла за місяць до 10 кг. У клінічному аналізі крові анемія. Яке захворювання можна припустити?

А. Малігнізацію виразки шлунку

В. Загострення виразкової хвороби шлунку

С. Аліментарне виснаження

829. Фельдшер ШД виїхав на місце ДТП. Хворий з відкритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У нього діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:

А. 2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії

В. Місце найбільшої тупості, визначеної під час перкусії

С. 6-те міжребер'я по задньопуховій лінії

830. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик. У потерпілого рвана рана передньої черевної стінки, через яку назовні випали петлі тонкого кишечника та прядка великого сальника. Які дії категорично ЗАБОРОНЕНІ при наданні невідкладної допомоги?

A. Вправляти органи що випали

В. Проводити протишокову терапію

С. Вводити кровозупинні препарати

831. Пацієнтка 20-ти років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 38,3°C, гнійні виділення з піхви. З анамнезу: симптоми з'явилися через 5 днів після штучного аборт. Об'єктивно: Рс- 90\хв., АТ- 110\70 мм рт.ст., живіт м'який, болючий у нижніх відділах. При піхвовому дослідженні: матка збільшена у розмірах, м'яка, болюча, придатки без змін, склепіння піхви вільні. Виділення з піхви значні, гноєподібні. Визначте, який діагноз найбільш імовірний:

A. Гострий метроендометрит

В. Гострий аднексит

С. Неповний аборт

832. Хворий скаржиться на різкій біль у серці, який виник після психоемоційного стресу, іррадіює в ліву руку, під ліву лопатку, триває більше 40 хвилин. Прийом нітрогліцерину ефекту не дає. Хворий збуджений, на обличчі жах смерті. Шкіра бліда, волога, губи ціанотичні. Тони серця приглушені, пульс - 68\хв., АТ-100\60 мм рт.ст. Яке захворювання можна припустити у хворого?

A. ІХС, інфаркт міокарда

В. Набута вада серця

С. Гостра судинна недостатність

833. У дитини 9-ти років, яка часто хворіє на респіраторні вірусні інфекції, раптово вночі погіршився стан: з'явився сухий кашель, під час якого мокротиння майже не виділяється, задишка експіраторного характеру з довгим свистячим видихом, який чути на відстані, блідість шкіри з ціанотичним відтінком. Визначте для якого стану характерні дані симптоми?

A. Бронхіальна астма

В. Гострий стенозуючий ларингіт

С. Кашлюк

834. Пацієнту 34-х років з діагнозом цукровий діабет фельдшер виконує п\ш введення інсуліну в кількості 20 МО (1 мл інсуліну = 40 МО). Яку кількість інсуліну фельдшер набиратиме в шприц ємністю 2 мл для виконання ін'єкції?

A. 0,5 мл

В. 2,0 мл

С. 1,0 мл

835. Фельдшер ФАПУ надає допомогу пацієнту 40-ка років, у якого раптово зупинилося дихання, відсутній пульс та АТ, зіниці широкі, не реагують на світло. Йому негайно почали проводити серцево-легеневу реанімацію. Назвіть життєво важливий показник, який свідчить про ефективність реанімації:

A. Поява пульсу на сонній артерії

В. Відсутність свідомості

С. Блідість шкіри

836. До фельдшера ФАП звернулася пацієнтка, яка скаржиться на біль у правому підребер'ї, що віддає у лопатку, гіркоту та сухість у роті. Симптоми з'являються після вживання жирної, смаженої та гострої їжі протягом останнього року. Стан задовільний, шкіра звичайного

зabarвлення. Живіт м'який, помірно болісний в ділянці проекції жовчного міхура. Позитивні симптоми Кера, Ортнера та Мюссі. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

A. Хронічний холецистит в стадії загострення

B. Хронічний коліт

C. Хронічний гепатит в стадії загострення

837. Фельдшер ФАПу прибув на виклик. Роділля 10 хвилин тому народила живу доношену дівчинку. Об'єктивно: послід не народився; при натисканні ребром долоні над симфізом, пуповина не втягується в статеву щілину. Назвіть ознаку відшарування плаценти за автором:

A. Ознака Кюстнера-Чукалова

B. Ознака Штрасмана

C. Ознака Довженка

838. У пацієнтки, яка перебуває на лікуванні у терапевтичному відділенні, лікар підозрює цукровий діабет та призначив зібрати аналіз сечі для визначення глюкози. Фельдшер пояснює пацієнтці, що сечу потрібно зібрати:

A. Протягом доби

B. Протягом 3 годин

C. Свіжовиділену

839. До фельдшера ФАПу звернулася хвора 30-ти років зі скаргами на серцебиття, підвищену дратівливість, плаксивість, тремтіння тіла, загальну слабкість. Температура тіла - 37-37,5°C, пронос, схуднення. В анамнезі: часті нервові перенапруження впродовж 3-х років. Об'єктивно: хвора зниженого живлення. Шкіра волога, тремор пальців рук, екзофтальм. Щитоподібна залоза збільшена, Рs- 115\хв., АТ- 160\70 мм рт.ст., тони серця звучні. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Дифузний токсичний зоб

B. Гіпотиреоз

C. Хвороба Іценка-Кушинга

840. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 50-ти років після приїзду з тривалого відпочинку на морі. Скаржиться на ущільнення шкіри обличчя, шиї, грудей, передпліч, кистей, живота, спини. З'явилися ділянки гіпер- та депігментації. Обличчя - маскоподібне. Характерна форма рота: губи тонкі, зібрані в складки, що направлені до ротової щілини. Кисті рук нагадують «пташину лапу» кінчики пальців бліді, холодні. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A. Системна склеродермія

B. Вузликовий периартеріїт

C. Ревматична хвороба

841. Дитині 3-х років проведена внутрішньо- шкірно проба Манту з 2 ТО. Через 72 години фельдшер прозорою пластмасовою лінійкою перевірів результат туберкулінодіагностики. Діаметр папули становить 3 мм. Визначте результат проведеної проби Манту:

A. Сумнівна

B. Гіперергічна

C. Позитивна

842. На прийомі у фельдшера дівчинка 10-ти років. Скарги на підвищення температури тіла до 37,5-38°C, біль в ділянці серця, втомлюваність, серцебиття. На шкірі кільцеподібна еритема. При перкусії серця - ліва межа на 1,5 см назовні від лівої середньоключичної лінії. Тони серця

приглушені, грубий систолічний шум над верхівкою. Який діагноз можна поставити?

A. Ревмокардит

В. Вроджена вада серця

С. Неревматичний кардит

843. Фельдшер ШМД потрапив на виклик до вагітної жінки, коли у неї розпочався другий період пологів. Фельдшеру доводиться приймати позаклінічні пологи. Вкажіть, коли він повинен починати надавати ручну акушерську допомогу:

A. При прорізуванні голівки плода

В. При вставленні голівки в таз

С. При зовнішньому повороті голівки

844. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 46-ти років, у якого після фізичного навантаження виник напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече, нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений жовтим нальотом. Склери субіктеричні. Симптом Ортнера позитивний. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A. Жовчної кольки

В. Ниркової кольки

С. Гострого гепатиту

845. Пацієнтка 23-х років скаржиться фельдшеру на підвищення температури до 38°C, висипання на обличчі, скутість рухів у дрібних суглобах кистей рук, що з'явилися за місяць після тривалого перебування на сонці. Об'єктивно: на щоках визначається еритематозне висипання у вигляді «метелика». Пульс - 88\хв., АТ-110\70 мм рт.ст. Аналіз крові: еритроцити - 3,5 - 1012, Нb- 112 г\л, лейкоцити - 3,5 - 109, ШОЕ- 35 мм\год. LE-клітини. Визначте попередній діагноз:

A. Системний червоний вовчак

В. Системна склеродермія

С. Дерматоміозит

846. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у ділянці лоба, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання може припустити фельдшер?

A. Гострий фронтит

В. Гострий етмоїдит

С. Гострий риніт

847. Фельдшера швидкої допомоги викликали до дитини 10-ти років. Мати дитини скаржиться на появу ціанозу, задишку. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. На момент огляду дихання затруднене, кашель, ціаноз шкіри. Якої допомоги потребує дитина?

A. Прийом Геймліха

В. Термінова інтубація трахеї

С. Провести трахеотомію

848. Фельдшер ШМД проводить серцево-легенево-церебральну реанімацію. Перший етап серцево-легенево-церебральної реанімації передбачає проведення наступної дії:

A. Відновлення прохідності дихальних шляхів

В. Дефібриляцію

С. Масаж серця

849. Фельдшера ШМД викликали до пацієнтки 23-х років зі скаргами на різкий біль внизу живота зліва з іррадіацією в пряму кишку, загальну слабкість, запаморочення. Остання менструація 2 місяці тому. Об'єктивно: пацієнтка бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв., слабого наповнення. Симптом «крику Дугласа» - позитивний. Який попередній діагноз поставить фельдшер ШМД?

A. Лівостороння порушена позаматкова вагітність

В. Гострий апендицит

С. Сальпінгофорит

850. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

A. Дихання Куссмауля

В. Дихання Біота

С. Брадипное

851. Фельдшера швидкої допомоги викликано до потерпілого 47-ми років, який отримав перелом хребта внаслідок падіння з четвертого поверху. В якому положенні буде проводитись транспортування потерпілого з переломом хребта за відсутності щита?

A. На животі

В. Сидячи

С. На спині

852. Роділля 20-ти років з терміном вагітності 41 тиждень транспортована фельдшером ШМД до пологового стаціонару. У другому періоді пологів серцебиття плода стало аритмічним з частотою 68-84/хв., не відновлюється між потугами; на тазовому дні знаходяться сіднички плода. Вкажіть втручання, яке повинно бути здійснене:

A. Екстракція плода за тазовий кінець

В. Кесарів розтин

С. Накладання акушерських щипців

853. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

A. Гектична

В. Інтермітуюча

С. Хвилеподібна

854. Фельдшер ФАПУ проводить взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менингокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в баклабораторію:

A. 2 години

В. 1 година

С. 3 години

855. До фельдшера звернувся чоловік 45-ти років зі скаргами на ожиріння обличчя, тулуба,

стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевих функцій. На рентгенограмі черепа в ділянці турецького сідла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

A. Хвороба Іценка-Кушинга

B. Нецукровий діабет

C. Гіпофізарний нанізм

856. 6-місячне немовля з місячного віку перебуває на штучному вигодовуванні, часто хворіє на ГРВІ. Об'єктивно: маса - 9400 г (при народженні - 3200 г), спостерігається блідість та сухість шкіри, збільшення товщини підшкірної жирової клітковини, зниження тургору тканин, м'язова гіпотонія. Який Ваш попередній діагноз?

A. Паратрофія

B. Ексудативно-катаральний діатез

C. Спазмофілія

857. У дитини 5-ти років на 8-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла та везикульозною висипкою, з'явилися сильний головний біль, блювання, загальмованість, тремор кінцівок. У дитини діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого інфекційного захворювання може бути енцефаліт?

A. Вітряна віспа

B. Ентеровірусна інфекція

C. Паротит

858. ШМД приїхала на виклик до хворого 32-х років, у якого раптово виникло блювання «кавовою гущею», слабкість, втрата свідомості. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка. При обстеженні шкірні покриви бліді, холодний, липкий піт, АТ- 90/70 мм рт.ст., пульс - 104/хв. Який препарат слід застосувати?

A. Етамзилат

B. Платифілін

C. Баралгін

859. У молодого чоловіка 20-ти років ножове поранення грудної клітки. Положення вимушене, у п'ятому міжребер'ї справа - різана рана розміром 3x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час видиху чути всмоктування повітря. Що необхідно фельдшеру виконати на місці події?

A. Накласти оклюзійну пов'язку

B. Накласти спіральну пов'язку

C. Накласти циркулярну пов'язку

D. Накласти колосоподібну пов'язку

E. Накласти хрестоподібну пов'язку

860. До ФАПУ надійшла хвора 60-ти років зі скаргами на переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, затримку газів та випорожнень. Рік тому оперована з приводу виразки шлунка. Об'єктивно: стан хворої тяжкий, Рс- 120/хв. Язик сухий, живіт здутий, асиметричний, кишкові шуми не прослуховуються. Встановіть попередній діагноз:

A. Гостра кишкова непрохідність

B. Гострий холецистит

C. Післяопераційна защемлена грижа

D. Гострий апендицит

Е. Гострий панкреатит

861. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства звернулася жінка зі скаргами на різкий біль, набряк, почервоніння лівої ступні, озноб, незначне підвищення температури тіла. З анамнезу з'ясовано, що напередодні вона натерла ногу тісним взуттям. При огляді: шкіра в ділянці тильної поверхні лівої ступні гіперемована, пастозна, при пальпації визначається біль, флюктуація. Яке захворювання може припустити фельдшер?

А. Флегмона

В. Карбункул

С. Абсцес

Д. Фурункул

Е. Бешиха

862. Фельдшера ШМД викликали на пологи, що відбулися на дому. Роділля народила живого доношеного хлопчика масою 4000 г. Плацента виділилася самостійно, з усіма дольками і оболонками. Крововтрата у пологах близько 200 мл. Матка періодично розслабляється, зі статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?

А. Гіпотонічна маткова кровотеча

В. Атонічна маткова кровотеча

С. Кровотеча у зв'язку з порушенням зсідання крові

Д. Розрив матки

Е. Розрив шийки матки

863. На черговий прийом до фельдшера ФАПу звернулася вагітна, термін вагітності 35 тижнів, зі скаргами на набряки, головний біль, погіршення зору, що з'явилися напередодні. АТ-160/90-170/100 мм рт.ст. Білок в сечі - 2 г/л. Виражені набряки на ногах, животі, обличчі. Під час вимірювання АТ на другій руці з'явилися судоми. Яке ускладнення можна припустити?

А. Еклампсія

В. Гіпоглікемічна кома

С. Пухлина мозку

Д. Гостра ниркова недостатність

Е. Епілепсія

864. У породіллі 28-ми років на 4 добу після пологів температура тіла підвищилась до 38°C, відзначалось порушення загального стану, лохії набули гнійно-кров'янистого характеру з неприємним запахом. При бімануальному дослідженні матка м'яка, болюча, збільшена. Якому післяпологовому захворюванню відповідає ця клінічна картина?

А. Ендометрит

В. Післяпологова виразка

С. Пельвіоперитоніт

Д. Параметрит

Е. Аднексит

865. До пацієнтки 38-ми років приїхала на виклик ШМД. Жінка поскаржилася, що прокинулася вночі від раптового, різкого, швидко наростаючого болю у правому підребер'ї, який іррадіював у праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою і повторним блюванням. Позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі. Який препарат підготує фельдшер в цій ситуації?

А. Атропін

- В. Анестезин
- С. Церукал
- Д. Димедрол
- Е. Алохол

866. Хворий 28-ми років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на головний біль, набряки під очима, сечу кольору «м'ясних помиїв» тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури до 37,7°C. Об'єктивно: шкіра бліда. Набряки на обличчі. Пульс - 82\хв., ритмічний, напружений. АТ- 180\110 мм рт.ст. Добова кількість сечі - 500 мл. Найімовірніший попередній діагноз:

А. Гострий гломерулонефрит

- В. Хронічний цистит
- С. Хронічний пієлонефрит
- Д. Гіпертонічна хвороба
- Е. Гострий пієлонефрит

867. Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: лице бліде, Рс- 90\хв., ЧД- 16\хв., АТ- 130\80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Струс головного мозку

- В. Перелом основи черепа
- С. Забій головного мозку
- Д. Синдром здавлення головного мозку
- Е. Перелом склепіння черепа

868. До фельдшера на ФАП звернулась мати з тримісячною дитиною. Скарги на неспокійне поведіння дитини, поганий сон, посилену пітливість голови. При об'єктивному обстеженні відзначається облісіння потилиці, зниження м'язового тону кінцівок, м'якість і податливість кісток черепа. Виберіть препарат, який необхідно призначити в даному випадку:

А. Вітамін Д3

- В. Вітамін С
- С. Вітамін В12
- Д. Вітамін В6
- Е. Вітамін А

869. Фельдшер оглядає дитину 6-ти років, у якої скарги на підвищену температуру, біль при відкриванні рота та жуванні. При огляді: в привушній ділянці припухлість, вушна раковина відстовбурчена, шкіра над залозою натягнута, звичайного забарвлення. Дитина відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину при даному захворюванні:

А. 21 день

- В. 9 днів
- С. 14 днів
- Д. 10 днів
- Е. 7 днів

870. Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта з нападом бронхіальної астми. У пацієнта спостерігається шумне дихання, вдих короткий, видих утруднений, тривалий. Яка задишка у хворого?

A. Експіраторна

B. Брадипное

C. Інспіраторна

D. Змішана

E. Тахіпное

871. У пацієнта 32-х років перший період гарячки. Хворий скаржиться на озноб, головний біль, слабкість, задишку, спрагу. Вкажіть, які заходи необхідно надати пацієнту у цей період гарячки:

A. Вкрити пацієнта, прикласти грілку до ніг

B. Часто змінювати натільну і постільну білизну

C. Накласти холодний компрес на чоло

D. Організувати індивідуальний пост

E. Давати багато прохолодного пиття

872. Хвора 58-ми років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на незначні кров'яні виділення зі статевих шляхів. Менопауза 10 років. При вагінальному дослідженні: зовнішні статеві органи та піхва з явищами вікової інволюції. Слизова оболонка піхви легко ранима, суха. Шийка матки чиста. Матка атрофічна, придатки не пальпуються, параметрії вільні. Поставте попередній діагноз:

A. Атрофічний кольпіт

B. Грибковий кольпіт

C. Рак тіла матки

D. Дисфункціональна маткова кровотеча

E. Трихомонадний кольпіт

873. Хвора, що хворіє на ІХС, викликала швидку допомогу. Скаржиться на серцебиття, що з'явилося раптово, після того як відчула поштовх у груді. Загальний стан середньої важкості. Частота дихальних рухів - 28\хв., пульс - 168\хв., ритмічний, тони серця приглушені. На ЕКГ: частота серцевих скорочень - 166\хв., комплекс QRS розширений і змінений. Ви діагностували напад пароксизмальної тахікардії. Які з названих препаратів Ви оберете для надання допомоги?

A. Анаприлін

B. Фенігідин

C. Димедрол

D. Диклофенак

E. Ізадрин

874. При огляді фельдшер ФАПУ у дитини 12-ти років виявив лихоманку, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексію. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка пальпується у вигляді тонкого тяжа. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Дизентерія

B. Сальмонельоз

C. Ешерихіоз

D. Холера

E. Токсична диспепсія

875. Жінка 30-ти років звернулася на профогляд. Скарг не має. В неї були 1 пологи і 1 аборт.

Місячні не порушені, регулярні. Об'єктивно: шийка матки циліндрична, тіло матки нормальних розмірів, щільне, рухоме, безболісне. Пальпується пухлина 8x10 см зліва, тугоеластичної консистенції, з гладенькою поверхнею, рухома, безболісна. Склепіння глибокі, безболісні. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Кіста яєчника

B. Черевна вагітність

C. Фіброматозні вузли на ніжці

D. Рак Крукенберга

E. Ендометріоз яєчників

876. Дитині 9-ти років встановлений діагноз: ГРВІ, гіпертермічний синдром. Була введена внутрішньом'язово літична суміш. Через 40 хвилин дитина різко встала з ліжка і впала. Об'єктивно: температура тіла - 35,2°C, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ- 60/35 мм рт.ст. Оцініть стан дитини:

A. Гостра судинна недостатність, колапс

B. Гостра судинна недостатність, зомління

C. Гіпоглікемічна кома

D. Анафілактичний шок

E. Медикаментозне отруєння

877. Дівчинка 3-х місяців втратила за 2 доби 500 г маси тіла внаслідок блювання та проносу. У дитини шкіра сірувато-ціанотична, риси обличчя загострені, рефлексів знижені. Якому стану відповідає зазначена картина?

A. Ексикозу

B. Рахіту

C. Гіперглікемічній комі

D. Спазмофілії

E. Печінковій комі

878. Фельдшер ІІГМД транспортує роділлю, у якої почався ІІ період пологів у пологовий будинок. Передлежання плода чисто сідничне. До надання якої допомоги в пологах повинен бути готовий фельдшер?

A. Надання допомоги за Цов'яновим I

B. Зовнішнього повороту за Архангельським

C. Класичної ручної допомоги

D. Екстракції плода за тазовий кінець

E. Надання допомоги за Цов'яновим II

879. Пацієнт 45-ти років страждає на ішемічну хворобу серця. Лікар призначив медикаментозне лікування та постановку гірчичників при виникненні болю в серці. На яку ділянку треба накладати гірчичники?

A. Ділянку серця

B. Потилицю

C. Литкові м'язи

D. Верхню частину груднини

E. Під і між лопатками

880. До фельдшера на ФАП за допомогою звернулася жінка 25-ти років, яка скаржиться на різку слабкість, нудоту, головокружіння, порушення зору. Напередодні їла консервовану

телятину домашнього приготування, картоплю варену, мариновані гриби. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Ботулізм

B. Сальмонельоз

C. Харчова токсикоінфекція

D. Холера

E. Ешерихіоз

881. Дитина народилась від ВІЛ-інфікованої матері з оцінкою за шкалою Апгар - 8 балів, масою тіла - 3200 г, довжиною - 50 см. Загальний стан задовільний. Антитретровірусна терапія не проводилась. Через який час можна визначити методом ІФА наявність ВІЛ- інфекції у дитини?

A. Через 18 місяців

B. У перші дні після народження

C. Через 12 місяців

D. У 2 роки

E. У перші 6 місяців

882. Хворий звернувся до фельдшера здоров'я з скаргами на наявність різано-рваної рани нижньої третини правого стегна через 6 годин з моменту травми. Назвіть головний засіб профілактики гнійно-септичних ускладнень в цьому випадку:

A. Первинна хірургічна обробка рани

B. Введення протигангренозної сироватки

C. Призначення антибіотиків

D. Використання сильнодіючих антисептиків

E. Імуностимулююча терапія

883. Фельдшера ШМД викликали до жінки, яка стоїть на обліку по вагітності в ЖК із строком вагітності 11-12 тижнів. Жінка скаржиться на переймоподібний біль внизу живота та значні кров'яністі виділення, які з'явилися після фізичного навантаження. При вагінальному дослідженні видно, що шийка матки вкорочена, пропускає палець, за внутрішнім вічком пальпуються елементи плода, виділення кров'яністі, значні. Ваш діагноз:

A. Аборт у розпалі

B. Загрозливий аборт

C. Артифіціальний аборт

D. Неповний аборт

E. Повний аборт

884. Хворому 36-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової приналежності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВО аглютинація спостерігалася в краплях із сироватками 0(I) і В (III) і не спостерігалася - з сироваткою А(II). Еритроцитарну масу якої групи потрібно перелити пацієнтові?

A. А(II)

B. В (III)

C. 0(1)

D. АВ(IV)

885. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 24-х років зі скаргами на висипку, яка з'явилася через три тижні після статевого контакту. Об'єктивно: на шкірі тіла статевого члена наявна ерозія червоного кольору, з блискучою поверхнею, ущільнена в основі і безболісна при

пальпації. Паховий лімфовузол справа збільшений і безболісний. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Сифіліс

- B. Гонококова інфекція
- C. Трихомоніаз
- D. Хламідіоз
- E. Короста

886. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на головний біль, безсоння, поступове підвищення температури тіла до 39°C протягом 8 діб. З епіданамнезу відомо, що 2 тижні тому купався у ставку. При огляді: пацієнт кволий, повільно відповідає на запитання. Шкірні покриви бліді. Язик сухий, потовщений, вкритий сіро-бурим нальотом, краї - яскраво-червоні з відбитками зубів. На животі розеолезна висипка. АТ - знижений, живіт здутий, печінка, селезінка збільшені. Випорожнення затримані. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A. Черевний тиф

- B. Вірусний гепатит
- C. Холера
- D. Дифтерія
- E. Ботулізм

887. Вночі фельдшера швидкої допомоги викликали на дім до пацієнта 40-ка років, який скаржився на нестачу повітря (він вимушений був сісти на ліжко та спустити ноги), задишку з утрудненим вдихом, сухий кашель, різку слабкість, страх смерті. В анамнезі 2 роки тому назад переніс великовогнищевий інфаркт міокарда. Об'єктивно: шкірні покриви ціанотичні, вологі. Пульс - 98/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Над легеньми на фоні ослабленого везикулярного дихання вислуховуються вологі хрипи, переважно в нижніх відділах. Тони серця глухі, ритмічні. Який стан розвинувся у пацієнта?

A. Гостра лівошлуночкова недостатність

- B. Гіпертонічний криз
- C. Гостра правошлуночкова недостатність
- D. Кардіогенний шок
- E. Колапс

888. На виклик до пацієнта приїхала бригада ШМД. Через ослаблення серцевої діяльності лікар призначив пацієнту парентеральне введення кордіаміну. Який метод введення повинен застосувати фельдшер?

A. Підшкірно, в зовнішню поверхню плеча

- B. Підшкірно, у внутрішню поверхню плеча
- C. Внутрішньовенно струминно
- D. Внутрішньом'язово, в нижній зовнішній квадрант сідниці
- E. Підшкірно, в передньо-внутрішню поверхню стегна

889. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Під час огляду: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації шкіри нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

A. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки

- B. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- C. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки

- D. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- E. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки

890. Перед першим введенням антибіотика фельдшер визначає пробу на індивідуальну чутливість організму до препарату. Назвіть розчинник, який підготує фельдшер для розведення антибіотика:

- A. 0,9% розчин натрію хлориду**
- B. 0,5% розчин новокаїну
- C. 5% розчин глюкози
- D. 0,25% розчин новокаїну
- E. 1% розчин лідокаїну

891. До хворого з підозрою на інфаркт міокарда викликана ШМД. Була надана допомога: нітрогліцерин під язик, в/в анальгін з димедролом. В машині ШМД знову з'явився виражений біль. Який з препаратів доцільно ввести хворому?

- A. Морфіну гідрохлорид**
- B. Спазмалгон
- C. Но-шпа
- D. Баралгін
- E. Папаверину гідрохлорид

892. Фельдшера ФАПу викликали до роділлі додому. По приїзду фельдшера у роділлі триває III період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одночасно виділилося 400 мл крові, кровотеча триває. Під час огляду материнської поверхні плаценти встановлено відсутність однієї дольки. Яка допомога повинна бути надана в такій ситуації?

- A. Ручне обстеження порожнини матки**
- B. Зовнішній масаж матки
- C. Притиснення черевної аорти кулаком
- D. В/в введення утеротонічних засобів
- E. Огляд пологових шляхів в дзеркалах

893. ШМД приїхала на виклик до хворого 63-х років. Об'єктивно: стан важкий, шкіра бліда, пульс - 124/хв. АТ- 85/60 мм рт.ст. Язик сухий, живіт напружений, болісний. Виявлено позитивний синдром Валя, шум плеску. Яку патологію можна запідозрити у даного хворого?

- A. Кишкова непрохідність**
- B. Гострий перитоніт
- C. Гострий панкреатит
- D. Гострий апендицит
- E. Асцит

894. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 22-х років. Два дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помиїв, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: обличчя одутле, набряки повік, незначні набряки на кінцівках і тулубі. Над легеньми в нижніх відділах вологі хрипи. Пульс - 82/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, акцент II тону над аортою. АТ- 160/100 мм рт.ст. Живіт м'який, печінка біля краю реберної дуги. Симптом Пастернацького - позитивний з обох боків. Добовий діурез - 300 мл. Який попередній діагноз у хворого?

- A. Гострий гломерулонефрит**
- B. Хронічний гломерулонефрит

- С. Гострий пієлонефрит
- D. Гіпертонічна хвороба
- Е. Нирковокам'яна хвороба

895. Ви - фельдшер ФАП. До Вас звернувся пацієнт 20-ти років, який скаржиться на загальну слабкість, кровотечу із носа і ясен, крововиливи на шкірі, біль у горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 39°C, збільшення лімфовузлів. У загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Гострий лейкоз

- В. В12-дефіцитна анемія
- С. Гемолітична анемія
- D. Тромбоцитопенічна пурпура
- Е. Постгеморагічна анемія

896. Потерпілий 32-х років після падіння скаржиться на біль в лівому плечі в ділянці ключиці. При обстеженні: стан задовільний, шкіра в ділянці травми не ушкоджена, деформація відсутня. При пальпації: визначається локальна болісність та кісткова крепітація у середній третині лівої ключиці. Вкажіть оптимальну транспортну іммобілізацію при даній травмі:

A. Пов'язкою Дезо

- В. Комірцем Шанца
- С. Колосоподібною пов'язкою на плечовий суглоб
- D. Хрестоподібною пов'язкою
- Е. Шиною Дітеріхса

897. На ФАП з'явилася вагітна жінка зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота та кров'янисті виділення зі статевих шляхів. При вагінальному дослідженні шийка матки відкрита. В ділянці зовнішнього вічка визначається нижній полюс плодового яйця. Попередній діагноз:

A. Аборт в ході

- В. Повний аборт
- С. Кримінальний аборт
- D. Неповний аборт
- Е. Аборт що почався

898. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез за центральним типом та гемігіперестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Ішемічний інсульт

- В. Епідуральна гематома
- С. Геморагічний інсульт
- D. Транзиторна ішемічна атака
- Е. Пухлина мозку

899. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з

того ж боку геміпарез за центральним типом та гемігіпестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Ішемічний інсульт

- B. Епідуральна гематома
- C. Геморагічний інсульт
- D. Транзиторна ішемічна атака
- E. Пухлина мозку

900. В дитячому садочку виявлена дитина, що захворіла на скарлатину. Які профілактичні заходи необхідно провести в вогнищі інфекції?

A. Карантин на 7 днів, огляд контактних

- B. Карантин на 21 день
- C. Поточна дезінфекція, обстеження контактних на менінгокок
- D. Поточна дезінфекція, обстеження на стафілокок
- E. Проведення щеплення контактним

901. У складі бригади швидкої допомоги Ви прибули на місце події. Лікар виявив у потерпілого закритий перелом стегна. Ви набрали у шприц 20 мл 0,25% розчину новокаїну, який лікар ввів у ділянку перелому. Який метод знеболювання застосовано?

A. Блокада місця перелому

- B. Провідникова анестезія
- C. Інфільтраційна анестезія
- D. Стовбурова блокада
- E. Хімічне знеболювання

902. До фельдшера здоров'я звернувся пацієнт, який скаржиться на серцебиття та періодично виникаючий короточасний колючий біль в ділянці серця. Які властивості пульсу визначає фельдшер?

A. Ритм, частоту, наповнення, напруження

- B. Пульсові коливання, наповнення, напруження
- C. Ритм, швидкість, наповнення, висоту
- D. Частоту, висоту, напруження, наповнення

903. Пацієнтці призначено ввести 20 МО інсуліну, 1 мл дорівнює 100 МО. У шприц набрано 0,5 мл. Яке ускладнення може виникнути у пацієнтки?

A. Гіпоглікемічний стан

- B. Ліподистрофія
- C. Гіперглікемічна кома
- D. Колапс
- E. Анафілактичний шок

904. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 34-х років, який отримав різану рану в ділянці підколінної ямки розміром 7х0,3 см. Краї рани зіяють, кровоточать. Кров витікає пульсуючим струменем, яскраво-червоного кольору. Визначте обсяг першої допомоги:

A. Накладення джгута

- B. Накладення стискаючої пов'язки
- C. Імобілізація шиною Дітерікса
- D. Накладання оклюзійної пов'язки
- E. Застосування гемостатичної губки

905. Швидка допомога приїхала на виклик до хворого 35-ти років. Об'єктивно: положення вимушене - сидить у ліжку, впираючись руками в край, на віддалі від хворого, особливо під час видиху, чути свистячі хрипи. Спостерігаються ціаноз губ, кашель з утрудненим виділенням в'язкого харкотиння. Грудна клітка діжкоподібна. Перкуторно визначають коробковий звук. Аускультативно - ослаблене дихання, розсіяні, сухі хрипи. Пульс - 92\хв. АТ- 120\70 мм рт.ст. Який препарат треба призначити?

A. Еуфілін

B. Баралгін

C. Анальгін

D. Строфантин

E. Цефазолін

906. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на свербіж шкіри, який з'явився одночасно з висипанням і значно посилюється увечері та вночі. З анамнезу з'ясовано, що 10 днів тому він прибув з відрядження, де проживав у гуртожитку. Об'єктивно: на шкірі живота, сідниць, променево-зап'ясткових суглобів та бокових поверхонь пальців рук - парні папуло-везикулярні розчули з кров'яними кірочками. Встановіть попередній діагноз:

A. Короста

B. Пруриго

C. Кропив'янка

D. Екзема

E. Токсикодермія

907. Ви фельдшер ФАПУ, надаєте невідкладну допомогу хворому в стані клінічної смерті. Вкажіть, яке співвідношення дихання та закритого масажу серця слід проводити хворому?

A. 30 до 2

B. 10 до 2

C. 15 до 2

D. 5 до 1

E. 15 до 3

908. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

A. Дренажне

B. Активне

C. Вимушене

D. Пасивне

E. Фаулера

909. Хворий 40-ка років скаржиться на біль стискаючого характеру за грудинною з іррадіацією в ліву руку. Після прийому нітрогліцерину приступ припинився. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

A. Стенокардія

B. Гіпертонічна хвороба

C. Ревматизм

D. Інфаркт міокарда

E. Вада серця

910. Хворій 58-ми років, яка скаржиться на біль в ділянці серця, фельдшер ШМД провів ЕКГ-дослідження. Результати електрокардіографії: глибокий, поширений зубець Q, зміщення вище ізолінії інтервалу ST, симптом прапорця, глибокий негативний зубець T. Ваш ймовірний діагноз:

A. Інфаркт міокарда

B. Блокада лівої ніжки пучка Гіса

C. Гіпертонічна хвороба II ст.

D. Стенокардія

E. Повна атріовентрикулярна блокада

911. Хворий 58-ми років, що хворіє на гіпертонічну хворобу, раптово під час психоемоційного збудження втратив свідомість. Об'єктивно: без свідомості, гіперемія обличчя, пульс - 100\хв., напружений, АТ- 230\110 мм рт.ст. Опущений правий кут рота, дихання шумне, щока "вітрилить". Підняті праві кінцівки падають "як батого", м'язовий тонус в них та рефлексі низькі, на лівих кінцівках збережені, симптом Бабінського справа. Який попередній діагноз?

A. Геморагічний інсульт

B. Субарахноїдальний крововилив

C. Менінгіт

D. Гіпертонічний криз

E. Ішемічний інсульт

912. ШМД приїхала на виклик до хворого 32-х років у якого раптово виникло блювання "кавовою гущею", слабкість, втрата свідомості. В анамнезі: виразкова хвороба шлунка. При обстеженні шкірні покриви бліді, холодний, липкий піт, АТ- 90\70 мм рт.ст., пульс - 104\хв. Який препарат слід застосувати?

A. Етамзилат

B. Атропін

C. Анальгін

D. Платифілін

E. Баралгін

913. Хворий 43-х років, працівник м'ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на головний біль, високу температуру, відчуття печіння в очах, біль у м'язах, особливо литкових, попереку, жовтяничний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об'єктивно: на губах - герпетичні висипання, пальпуються збільшені печінка та селезінка. Олігурія. Температура тіла - 37,8°C, пульс - 100\хв., АТ- 90\50 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні дані клінічні симптоми?

A. Лептоспіроз

B. Бруцельоз

C. Вірусний гепатит

D. Черевний тиф

E. Висипний тиф

914. Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри, кровоточивість, жовтяницю, збільшення живота. При обстеженні виявлено: судинні зірочки на шкірі, еритему долонь, ксантоми, асцит. У крові: білірубінемія, збільшення ліпідів. Для якого захворювання це характерно?

A. Цироз печінки

B. Хронічний холецистит

C. Жовчнокам'яна хвороба

D. Виразкова хвороба шлунка

E. Хронічний панкреатит

915. У новонародженої дитини діагностовано гіпотиреоз: потворне набрякле обличчя з товстими губами збільшеним язиком, вузькі очні щілини, широке перенісся, велика голова, коротка товста шия; шкіра дуже суха, холодна на дотик. Що спричинює розвиток даного захворювання?

A. Зниження продукції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози

B. Дефіцит інсуліну

C. Підвищена функція кори наднирників

D. Підвищення продукції тиреоїдних гормонів щитоподібної залози

E. Знижена функція кори наднирників

916. Ви фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся хворий із пораненням грудної клітки. Мри огляді рани фельдшер відмітив, що під час видиху із рани виділяється піниста кров, під час вдиху у рану засмоктується повітря. Турбує виражений біль та задишка. Вкажіть, яку пов'язку слід накласти хворому:

A. Оклюзійна

B. Циркулярна пов'язка на грудну клітку

C. Клейова пов'язка

D. Асептична пов'язка

E. Пов'язка Дезо

917. Пацієнт 35-ти років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на зниження зору, "туман" перед очима, двоїння предметів, які виникли напередодні. Голос гугнявий. При об'єктивному обстеженні виявлено: мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. За 3 дні до захворювання вживав консервовану свинину. Яке захворювання може запідозрювати фельдшер?

A. Ботулізм

B. Стовбуровий енцефаліт

C. Розлади мозкового кровообігу

D. Отруєння молоком

E. Отруєння метиловим спиртом

918. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультції тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

A. Міокардит

B. Вогнищева пневмонія

C. Набута вада серця

D. Гломерулонефрит

E. Сироваткова хвороба

919. Ви фельдшер ШМД, прибули на виклик до пацієнта 40-ка років, який скаржиться на гострий біль в животі, що з'явився раптово після фізичного навантаження. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Живіт дошко- подібний, болючий при пальпації. Симптом Щоткіна-Блумберга різко позитивний. Визначте, яке ускладнення розвинулось у хворого:

A. Перфорація

- В. Пенетрація
- С. Кровотеча
- Д. Малігнізація
- Е. Пілоростеноз

920. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на появу виразки на статевому члені та неволючого утворення в паху. Хворий мав незахищений статевий акт близько 6-7 тижнів тому. При огляді на слизовій оболонці головки статевого члена виявлено виразку округлої форми, 0,5-0,7 см в діаметрі, безболісну, яка має гладеньке, червоне, блискуче дно. В пахвинній ділянці виявлено збільшений, безболісний лімфовузол близько 2-х см в діаметрі. Вкажіть який період сифілісу відповідає такій клінічній картині?

- А. Первинний**
- В. Третинний
- С. Хронічний
- Д. Вторинний
- Е. Інкубаційний

921. Фельдшера вночі викликали до пацієнта, який скаржиться на ядуху з утрудненим вдихом. Кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння. Пацієнт у положенні ортопное. Дихання - шумне, "клекотливе" Пульс - 100\хв., ритмічний. Над легенями - вологі середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший діагноз:

- А. набряк легень**
- В. Міокардит
- С. Бронхіальна астма
- Д. Ексудативний перикардит
- Е. Ендокардит

922. Вам необхідно доставити кал до паразитологічної лабораторії у теплому вигляді. Якого збудника можна визначити ЛИШЕ за умови теплих випорожнень?

- А. Лямблії**
- В. Гострики
- С. Трихінели
- Д. Ехінококи
- Е. Аскариди

923. Транспортування потерпілого з переломом хребта за відсутності щита проводиться в положенні:

- А. На животі**
- В. Сидячи
- С. На спині
- Д. На лівому боці
- Е. На правому боці

924. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

- А. Лімфаденіт**
- В. Лімфангоїт
- С. Правець

D. Флегмона

E. Бешиха

925. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців, мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6°C, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

A. Гострий розлад травлення функціонального походження

B. Ротавірусна інфекція

C. Сальмонельоз

D. Дизентерія

E. Колі-інфекція

926. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у лобовій ділянці, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньовнутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

A. Гострий фронтит

B. Гострий риніт

C. Гострий сфеноїдит

D. Гострий етмоїдит

E. Гострий гайморит

927. Хворий 40-ка років, звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на сильні болі в правій половині живота, поперековій ділянці справа, які віддають в пах, стегно, часте болюче сечовиділення невеликими порціями, блювання. Об'єктивно: хворий стогне, неспокійний. Шкіра бліда, волога, температура тіла - 36,9°C. Пульс - 92/хв. Живіт здутий, болючий при пальпації в правій половині. Симптом Пастернацького позитивний справа. Ваш ймовірний діагноз:

A. Правобічна ниркова колька

B. Гострий гломерулонефрит

C. Гострий пієлонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Хронічний гломерулонефрит

928. У хворого 47-ми років з інфарктом міокарда при транспортуванні в стаціонар раптово виник приступ інспіраторної ядухи, сухий кашель, відчуття стискання у грудях, холодний піт. Яке ускладнення інфаркту міокарда у хворого?

A. Серцева астма

B. ТЕЛА

C. Аневризма аорти

D. Бронхіальна астма

E. Кардіогенний шок

929. На ФАП звернувся хворий із скаргами на постійний ниючий біль в правому підребер'ї, пов'язаний з прийомом їжі, загальну слабкість. Об'єктивно: шкіра жовтушного кольору. Живіт м'який, болючий в правому підребер'ї, печінка виступає з-під правого краю реберної дуги на 2 см, при пальпації болюча. Про яке захворювання можна подумати?

A. Хронічний гепатит

- В. Хронічний холецистит
- С. Жовчнокам'яна хвороба
- Д. Гострий холецистит
- Е. Хронічний панкреатит

930. ШМД приїхала на місце ДТП - потерпілого збив автомобіль. При огляді: свідомість відсутня, зіниці реагують на світло. Шкіра бліда, дихання сповільнене, поверхнєве, пульс частий, слабкий, АТ- 80/60 мм рт.ст., зовнішніх пошкоджень нема. З носа, вух та рота витікає кров. Яке пошкодження слід запідозрити?

А. Перелом основи черепа

- В. Струс головного мозку
- С. Забій головного мозку
- Д. Перелом склепіння черепа
- Е. Здавлення головного мозку

931. Ви фельдшер ШМД. З'явилися на виклик до вагітної, у якої раптово з'явилась кровотеча з піхви. При обстеженні з'ясувалось: вагітність 35 тижнів. Скарг жінка не пред'являє, матка в нормотонусі, безболісна при пальпації, положення плода поздовжнє, І позиція, передній вид, головне передлежання. Серцебиття плода - 120/хв. Виділення з піхви кров'яні, помірні. Пульс - 110/хв. АТ- 110/70 мм рт.ст. Попередній діагноз, тактика фельдшера:

А. Передлежання плаценти. Негайна госпіталізація

- В. Загроза розриву матки. Госпіталізація
- С. Передчасні пологи. Госпіталізація
- Д. Передчасне відшарування плаценти. Кровоспинні
- Е. Мимовільний аборт. Госпіталізація

932. Дитину, яка народилася на 38-му тижні вагітності з довжиною тіла - 45 см і масою - 2500 г, обвід голови - 34 см треба рахувати як:

А. Доношену

- В. Недоношену І ступеню
- С. Переношену
- Д. Недоношену ІІІ ступеню
- Е. Недоношену ІІ ступеню

933. Хвора 50-ти років звернулася до фельдшера ФАП у зі скаргами на рясні контактні кровотечі, біль внизу живота. При огляді в дзеркалах: шийка матки має вигляд "цвітної капусти". Після огляду кровотеча посилилась. Які першочергові дії фельдшера?

А. Провести тугу тампонаду матки

- В. Капіталізувати у супроводі фельдшера
- С. Покласти холод на низ живота
- Д. Ввести кровоспинні препарати
- Е. Викликати бригаду ШМД

934. До фельдшера звернувся чоловік 45-ти років, зі скаргами на ожиріння обличчя, тулуба, стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевої функції. На рентгенограмі черепа - турецького сидла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

А. Хвороба Іценко-Кушинга

- В. Нецукровий діабет
- С. Гіпофізарний нанізм
- Д. Акромегалія
- Е. Хвороба Аддісона

935. У дитини 9-ти років, яка часто хворіє на респіраторні вірусні інфекції, раптово у ночі погіршився стан: з'явився сухий кашель, під час якого мокротиння майже не виділяється, задишка експіраторного характеру з довгим свистячим видихом, який чути на відстані, блідість шкіри з ціанотичним відтінком. Визначте для якого стану характерні дані симптоми?

А. Бронхіальна астма

- В. Гострий стенозуючий ларингіт
- С. Гострий трахеїт
- Д. Обструктивний бронхіт
- Е. Кашлюк

936. У пацієнта скарги на ниючий біль у правому підребер'ї, який іррадіює в праву лопатку і виник після психоемоційного стресу. Склери субектеричні, язик обкладений жовтуватим нальотом, при пальпації живота позитивний симптоми Кера, Ортнера. Яке захворювання виникло у пацієнта?

А. Хронічний холецистит

- В. Цироз печінки
- С. Хронічний коліт
- Д. Виразкова хвороба шлунка
- Е. Хронічний гепатит

937. Через 6 діб після ін'єкції у пацієнтки утворився різко болючий інфільтрат з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла - 37,8°C. Що у пацієнтки?

А. Постін'єкційний абсцес

- В. Панарицій
- С. Флегмона
- Д. Бешихове запалення
- Е. Карбункул

938. Фельдшер ФАПУ проводить вагінальне дослідження жінці 38-ми років, яка звернулася з приводу появи гнійних виділень з неприємним запахом з піхви. Жінка знаходиться на диспансерному обліку з приводу кісти яєчника. Під час бімануального дослідження з'явився гострий різкий біль внизу живота. Виникнення цього стану пов'язане з:

А. Розрив кісти яєчника

- В. Збільшення кісти
- С. Піосальпінкс
- Д. Гідросальпінкс
- Е. Малігнізація кісти

939. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилися нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125\хв., АТ- 80\45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль\л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

A. Кетоацидотична кома

- B. Гіперлактацидемічна кома
- C. Уремична кома
- D. Печінкова кома
- E. Гіперосмолярна кома

940. Фельдшер ФАП у виявив у пацієнта блювання "кавовою гущею" дьогтеподібні випорожнення, слабкість. Який попередній діагноз?

A. Шлунково-кишкова кровотеча

- B. Гастрит
- C. Перфоративна виразка
- D. Геморой
- E. Апендицит

941. До фельдшера ФАП звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на біль в промежині. Впродовж останніх 6 місяців у хворого порушення акту дефекації, проноси чергуються з закрепками, незначна кровотеча, помітно втратив вагу. Під час пальцевого ректального дослідження фельдшер виявив бугристе ущільнення, малорухоме при пальпації. Який попередній діагноз?

A. Рак прямої кишки

- B. Геморой
- C. Анальна тріщина
- D. Парапроктит
- E. Поліп прямої кишки

942. У вагітної жінки з вузьким тазом другого ступеня виникла ситуація загрози розриву матки. Назвіть першочергові дії фельдшера:

A. Зняти пологову діяльність

- B. Акушерські щипці
- C. Стимуляція пологової діяльності
- D. Епізіотомія
- E. Кесарів розтин

943. Ви фельдшер ШМД. Хворий після ДТП має відкритий перелом стегна. Першочергові догоспітальні дії фельдшера полягають в:

A. Зупинці кровотечі, знеболюванні, транспортній іммобілізації

- B. Накладанні джгута, транспортуванні в лікарню
- C. Виклику швидкої допомоги
- D. Зупинці кровотечі, проведенні іммобілізації
- E. Знеболенні, введенні антибіотиків

944. У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділья?

A. Перший період р

- B. Третій період
- C. Другий період
- D. Передвісники пологів

945. До фельдшера ФАПУ звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

- A. Альгодисменорея
- B. Мастопатія
- C. Посткастраційний синдром
- D. Вірильний синдром
- E. Передменструальний синдром

946. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали К — Е різної тривалості, хвилі V. Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

- A. Миготлива аритмія
- B. Синусова тахікардія
- C. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- D. Синусова аритмія
- E. Екстрасистолічна аритмія

947. До Вас звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зіяння шкіри з незначною кровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

- A. Відкритий перелом
- B. Розрив зв'язок
- C. Вивих
- D. Розтягнення зв'язок
- E. Закритий перелом

948. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий зі скаргами на застуду, підвищення температури тіла до 39,5°C, болі в правій половині грудної клітки, пов'язані з актом дихання, сухий кашель, головний біль. Захворів гостро. Об'єктивно: рум'янець на щоках. Частота дихання - 28\хв. Під час пальпації - посилене голосове тремтіння справа, перкуторно - притуплення перкуторного звука справа. Аускультативно - крепітація справа. Пульс - 96\хв., АТ- 100\60 мм рт.ст. Який попередній діагноз у хворого?

- A. Негоспітальна пневмонія
- B. Рак легенів
- C. Гострий бронхіт
- D. Сухий плеврит
- E. Туберкульоз легенів

949. У новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Зазначте, для якого стану характерні дані симптоми:

- A. Фізіологічної жовтяниці новонароджених
- B. Вірусного гепатиту
- C. Аномалій розвитку гепатобіліарної системи
- D. Гемолітичної хвороби новонароджених

Е. Обтураційної жовтяниці

950. Учень 5-го класу після уроку фізкультури звернувся до фельдшера медпункту із скаргами на інтенсивний переймоподібний біль у ділянці правого підребер'я, який іррадіює в праве плече, праву лопатку. При пальпації живота відмічається болючість у точці проекції жовчного міхура. Про яке захворювання можна подумати?

А. Дискінезія жовчних шляхів по гіпертонічному типу

В. Дуоденіт

С. Виразкова хвороба шлунка

Д. Дискінезія жовчних шляхів по гіпотонічному типу

Е. Виразкова хвороба 12-палої кишки

951. У дитини 1,5 року, яка лікується з приводу рахіту на фоні задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. Який препарат застосовують для надання невідкладної допомоги?

А. Сибазон 0,5%

В. Діазепам 0,5%

С. Аміназин

Д. Сульфат магнію 25%

Е. Лазикс

952. Фельдшер ФАПУ виставив діагноз інфаркт міокарда. Які препарати він використає для профілактики тромбоемболічних ускладнень при інфаркті міокарда?

А. Гепарин

В. Строфантин

С. Лідокаїн

Д. Дофамін

Е. Новокаїнамід

953. Перелом якої з перерахованих нижче кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

А. Плечової

В. Великогомількової

С. Надколінка

Д. П'яткової

Е. Променевої

954. Жінка 20-ти років скаржиться на затримку місячних впродовж 8-ми тижнів, інтенсивний біль унизу живота. При вагінальному дослідженні справа пальпується пухлиноподібне утворення, збільшення матки. Визначається позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Які першочергові дії фельдшера на догоспітальному етапі?

А. Покласти холод на низ живота і госпіталізувати в гінекологічний стаціонар

В. Ввести заспокійливі засоби

С. Ввести знеболюючі засоби

Д. Провести тест на вагітність

Е. Порекомендувати звернутись до лікаря гінеколога

955. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані, відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

A. Дихання Куссмауля

B. Тахіпное

C. Дихання Біота

D. Брадипное

E. Дихання Чейн-Стокса

956. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

A. Кольпоскопія

B. Ультразвукове дослідження (УЗД)

C. Зондування порожнини матки

D. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння

E. Діагностичне вишкрібання порожнини матки

957. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

A. Хронічний лімфолейкоз

B. Гіпопластична анемія

C. Хронічний мієлолейкоз

D. Лімфогранулематоз

E. Гострий лейкоз

958. Пацієнту призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Вкажіть, протягом якого часу збирається кожна порція:

A. Через кожні 3 години

B. Ранкова та вечірня порції

C. Порція зібрана за 10 годин

D. Через 6 годин

E. Через кожні 2 години

959. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

A. Стерильна вазелінова олія

B. Антисептичний розчин

C. Розчин перекису водню

D. Розчин фурациліну

E. Гліцерин

960. При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?

A. Кефалогематома

B. Септикопіємія

C. Пухирчатка новонародженого

D. Внутрішньочерепна травма

E. Пологова пухлина

961. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена ШМД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рз-120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A. Перитоніт

- B. Тромбоз мезентеріальних судин
- C. Інфаркт міокарда
- D. Механічна кишкова непрохідність
- E. Перелом основи черепа

962. Через 10 хвилин після народження дитини з'явилися незначні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Ознаки відокремлення посліду позитивні. Крововтрата 280 мл. Яка подальша тактика ведення пологів?

A. Запропонувати роділлі потужитись

- B. Виділити плаценту зовнішніми прийомами
- C. Провести зовнішній масаж матки
- D. Провести ручне відокремлення плаценти
- E. Ввести окситоцин

963. У дитини 2-х років з гіпертермічним синдромом спостерігається блідість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікро- циркуляції судин?

A. Папаверин 2% внутрішньом'язово

- B. Холод на проекцію великих судин
- C. Парацетамол перорально
- D. Анальгін 50% внутрішньом'язово
- E. Оцтові обгортання

964. Хворий 45-ти років скаржиться на біль, почервоніння в ділянці правої нижньої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,5°C. В ділянці правої ступні та гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці скарги:

A. Бешиха

- B. Лімфангоїт
- C. Гострий артрит
- D. Флегмона
- E. Гострий тромбофлебіт

965. До фельдшера ФАПУ звернулась мати 5-річної дитини. Скарги: у дитини раптово підвищилась температура тіла до 40°C, дитина млява, малорухлива, на шкірі з'явилась висипка геморагічного характеру, зірчастої форми, підвищується над поверхнею шкіри, не зникає після натискання. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Менінгококцемія

- B. Вітряна віспа
- C. Краснуха
- D. Кір
- E. Скарлатина

966. Під час піхвового дослідження у роділлі встановлено: шийка матки згладжена, відкриття 7 см. Плодовий міхур відсутній, голівка притиснута до входу в малий таз. Визначається передній кут великого тім'ячка, надперенісся, надбрівні дуги, очні западини. Визначте передлежання плода:

A. Лобне передлежання

B. Лицьове, задній вид

C. Потиличне, передній вид

D. Потиличне, задній вид

E. Передньоголовне передлежання

967. Ви фельдшер ШМД, оглядаєте хворого, який кілька тижнів тому повернувся з відрядження до Африки. Хвороба розпочалася з підвищення температури тіла до 37,6°C і сильного ознобу, який переріс у жар: температура тіла різко підвищилась до 40°C. Турбував сильний головний біль, болі в підребер'ях, спрага. Через деякий час температура різко знизилась до нормальної. Хворий сильно спитнів і заснув. При огляді: пальпуються збільшені та болючі печінка та селезінка. Яку хворобу слід запідозрити?

A. Малярія

B. Грип

C. Черевний тиф

D. Лептоспіроз

E. Бруцельоз

968. Після народження дитини у роділлі через 10 хвилин з'явилися незначні кров'янисті виділення. Матка відхилилася у бік правого підребер'я, дно її піднялося вище пупка. Як називається ця ознака відшарування плаценти?

A. Ознака Шредера

B. Ознака Альфельда

C. Ознака Клейна

D. Ознака Штрассмана

E. Ознака Кюстнера-Чукалова

969. Після вживання великої кількості недозрілих ягід у дитини 5-ти років з'явилася нудота, біль у животі, блювання. З'явився головний біль, слабкість. При огляді: язик сухий, апетит знижений, випорожнення не стійкі. На шкірі тулуба виявлені елементи алергійного висипання. Що першочергово повинен зробити фельдшер при наявності у дитини даних симптомів:

A. Промивання шлунка

B. Ввести анальгін

C. Шлункове зондування

D. Надати хворому кисневу подушку

E. Покласти грілку на живіт

970. При наданні невідкладної допомоги на здоров'я пацієнта з гострим харчовим отруєнням під час введення товстого шлункового зонда раптово з'явилися синюшність обличчя, кашель, втрата голосу. Що є імовірною причиною даного ускладнення?

A. Потрапляння зонда в дихальні шляхи

B. Травма шлунка

C. Потрапляння зонда в дванадцятипалу кишку

D. Невідповідність діаметру зонда для даного пацієнта

971. Вкажіть заходи, які необхідно надати пацієнту у перший період гарячки:

- A. Вкрити пацієнта, прикласти грілку до ніг
- B. Організувати індивідуальний пост
- C. Давати багато прохолодного пиття
- D. Накласти холодний компрес на чоло
- E. Часто змінювати натільну і постільну білизну

972. До фельдшера ФАПУ звернулись батьки з дитиною 2-х років, що хворіла на ГРВІ. Вночі раптово дихання стало гучним, його чути на відстані, з'явився приступоподібний, гавкаючий кашель. Про яке ускладнення можна думати?

- A. Гострий стенозуючий ларингіт
- B. Гострий бронхіт
- C. Назофарингіт
- D. Обструктивний бронхіт
- E. Гострий трахеїт

973. Хворого 28-ми років привезли в лікарню зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°C, загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: лейкоцити – 30·10⁹/л, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

- A. Абсцес головного мозку
- B. Неврит
- C. Радикуліт
- D. Менінгіт
- E. Мозковий інсульт

974. Фельдшер ФАПУ спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

- A. Сидеропенічний
- B. Анемічний
- C. Диспептичний
- D. Астеновегетативний
- E. Геморагічний

975. При дослідженні мокротиння виявлені: еозинофіли, спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні такі зміни?

- A. Бронхіальна астма
- B. Негоспітальна пневмонія
- C. Сухий плеврит
- D. Гострий бронхіт
- E. Туберкульоз легень

976. Після народження дитини на 1-й хвилині життя ЧСС становить менше 100\хв., дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлексі слабкі, тонус м'язів знижений. Синюшність шкіри обличчя, стоп і кистей. Якому патологічному стану відповідає симптоматика?

A. Асфіксія новонародженого

- В. Гостра судинна недостатність
- С. Вроджена вада серця
- D. Внутрішньочерепна пологова травма
- Е. Сепсис новонародженого

977. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до 7-ми річної дитини, у якої під час гри з дрібними іграшками раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свідомості. Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання відсутнє. Що слід фельдшеру виконати в першу чергу?

A. Прийом Геймліха

- В. Прямий масаж серця
- С. Штучну вентиляцію легенів
- D. Прекардіальний удар
- Е. Непрямий масаж серця

978. Фельдшера ФАПу викликали до хворого зі скаргами на переймоподібний біль у животі, підвищення температури тіла до 39,5°C, водянисті випорожнення, зеленуватого кольору з домішками слизу. Такі симптоми свідчать про:

A. Сальмонельоз

- В. Черевний тиф
- С. Дизентерія
- D. Холера
- Е. Неспецифічний виразковий коліт

979. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

A. Зіскоб з періанальних складок

- В. Копрологічне дослідження випорожнень
- С. Фіброгастроудоденоскопія
- D. Бактеріологічне дослідження випорожнень
- Е. Дуоденальне зондування

980. До фельдшера ФАПу звернулася хвора, яка годує дитину груддю із скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5°C, біль в правій молочній залозі. При огляді - залоза збільшена, при пальпації болючість. Який попередній діагноз?

A. Гострий мастит

- В. Фурункул правої молочної залози
- С. Фіброаденома правої молочної залози
- D. Гіпермастія
- Е. Мастопатія

981. Вагітна звернулася на ФАП до фельдшера зі скаргами на головний біль, нудоту, мерехтіння мушок перед очима. 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, АТ- 200/120 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 190/115 мм рт.ст. Рз- 88/хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160/хв. Яке виникло ймовірне ускладнення?

A. Прееклампсія тяжкий ступінь

- В. Прееклампсія легкий ступінь
- С. Ранній гестоз вагітних

D. Набряки під час вагітності

E. Гіпертонічний криз

982. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена" вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

A. Гіповолемічний шок

B. Анафілактичний шок

C. Гостре отруєння

D. Кардіогенний шок

E. Перфорація виразки шлунка

983. Ви працюєте на ФАПі. Для профілактичного огляду звернулась мати з дитиною, якій виповнився один рік. Останні три місяці не хворіла. Профілактичні щеплення на першому році життя проводились згідно з календарним планом. Вкажіть, що необхідно призначити дитині:

A. Вакцинацію проти кору, краснухи, паротиту

B. Вакцинацію проти дифтерії

C. Ревакцинацію проти туберкульозу

D. Вакцинацію проти поліомієліту

E. Ревакцинацію проти епідемічного паротиту

984. На 43-му тижні вагітності народилася дитина в стані апное, в'яла, шкіра бліда, слизові оболонки різко ціанотичні, тонус м'язів знижений, рефлексів немає, серцева діяльність майже цілком пригнічена. Які дії по оживленню дитини треба провести в першу чергу:

A. Відсмоктати слиз із верхніх дихальних шляхів

B. Ввести розчин адреналіну 1 до 10000

C. Провести ШВЛ через маску

D. Провести ШВЛ через інтубаційну трубку

E. Ввести 5% розчин альбуміну

985. Жінка 24-х років звернулась на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4-5 ребер зліва відмічається гематома, набряк м'яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. При пальпації в ділянці 4-5 ребер різка болючість, відчувається хруст. Визначте діагноз:

A. Перелом 4-5 ребер

B. Струс грудної клітки

C. Стиснення грудної клітки

D. Перелом ключиці

E. Перелом груднини

986. Вас, фельдшера ШМД, викликали до хворого, який знаходиться у вкрай важкому стані. Риси обличчя загострені, очі запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки. Скарги на пронос, блювання протягом 2-х днів. Випорожнення по типу "рисового відвару". Температура - 37,5°C. Пульс ниткоподібний. Яке захворювання можна запідозрити?

A. Холера

B. Дизентерія

C. Харчова токсикоінфекція

- D. Колі-ентерит
- E. Сальмонельоз

987. Фельдшер швидкої медичної допомоги прибув на виклик до пацієнтки 18-ти років, яка раптово втратила свідомість. Зі слів родичів відомо, що страждає на цукровий діабет, отримує інсулін короткої дії. Пацієнтка без свідомості. Шкіра волога, судоми м'язів верхніх та нижніх кінцівок. Пульс - 110\хв., АТ- 110\60 мм рт.ст. Із введення яких препаратів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

A. 40% розчин глюкози

- B. 5% розчин глюкози
- C. Інсулін пролонгованої дії
- D. 10% розчин глюкози
- E. Інсулін короткої дії

988. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки 35-ти років. При огляді: свідомість відсутня, шкіра суха, дихання шумне, запах ацетону з рота. Частота дихання - 28\хв., пульс - 98\хв., АТ- 90\60 мм рт.ст. Зі слів родичів жінка тривалий час хворіє на цукровий діабет. Після перенесеної застуди стан її погіршився: посилилась спрага, з'явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Про яке ускладнення можна подумати?

A. Гіперглікемічна кома

- B. Печінкова кома
- C. Гіпоглікемічна кома
- D. Гіперосмолярна кома
- E. Церебральна кома

989. Жінка 30 хвилин тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирі, заповнені світло-жовтою рідиною. Яка площа опіку та його ступінь?

A. 9%, II ступінь

- B. 15%, IIIБ ступінь
- C. 2%, I ступінь
- D. 5%, IIIА ступінь
- E. 25%, IV ступінь

990. Вагітна 25-ти років поступила в пологовий будинок у терміні 40 тижнів вагітності. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ - 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плода повздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода приглушене - 160\хв. Перейми, які почались 6 годин тому, болючі. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пологах:

A. Загроза розриву матки

- B. Емболія навколоплідними водами
- C. Кінець I періоду пологів
- D. Повний розрив матки
- E. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

991. Після обстеження пацієнтки 25-ти років виявлено: скарги на відсутність менструації; пігментацію шкіри на обличчі та білої лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

A. Вагітність маткова

- В. Вагітність позаматкова
- С. Ендометрит
- Д. Ендометриоз матки
- Е. Пухлина матки

992. Фельдшер швидкої допомоги під час дослідження пульсу пацієнта виявив, що його частота складає 42\хв. Назвіть стан пацієнта:

А. Брадикардія

- В. Тахікардія
- С. Аритмія
- Д. Дефіцит пульсу
- Е. Екстрасистолія

993. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу:

А. Лідокаїн

- В. Верапаміл
- С. Атропін
- Д. Еуфілін
- Е. Анальгін

994. У хворого після поранення шиї раптово виникла різка блідість шкіри, сильний біль і свистячий звук в рані. На ваших очах зупинились серце та дихання. Що трапилось з хворим?

А. Повітряна емболія

- В. Жирова емболія
- С. Шок
- Д. Гостра анемія
- Е. Асфіксія

995. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хворої 60-ти років, у якої після стресової ситуації раптово виникли головний біль, запаморочення і серцебиття. Об'єктивно: пульс - 120\хв., АТ- 210\120 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

А. Гіпертонічний криз

- В. Інфаркт міокарда
- С. Приступ стенокардії
- Д. Кардіогенний шок
- Е. Напад бронхіальної астми

996. У пологовій залі перебуває породілля, яка годину тому народила живого доношеного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скаржиться на запаморочення, слабкість. Під час огляду: спостерігається блідість шкірних покривів та слизових оболонок, АТ- 100\70 мм рт.ст., Рз- 96\хв., із статевих шляхів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у породіллі?

А. Гіпотонія матки

- В. Геморагічний шок
- С. Розрив пологових шляхів
- Д. Атонія матки
- Е. Гіпоплазія матки

997. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною віком 5-ти років з такими скаргами: останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

A. Пробіотики

B. Сорбенти

C. Вітаміни

D. Антибіотики

E. Антигістамінні

998. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

A. Седуксен, димедрол, аміназин

B. Ефедрин, алупент, атропін

C. Кордіамін, супрастин, анальгін

D. Цефазолін, манітол, еуфілін

E. Строфантин, адреналін, тавегіл

999. В гінекологічне відділення доставлена хвора зі скаргами на переймоподібні болі в лівій здухвинній ділянці, незначні кров'янисті виділення із статевих шляхів, що з'явилися після 8-тижневої затримки менструації, запаморочення. АТ- 85/55 мм рт.ст. Симптом Щоткіна-Блюмберга слабо позитивний. Матка збільшена до 5 тижнів вагітності, ліва труба збільшена, болюча. Яке дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

A. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння

B. Кульдоскопія органів малого таза

C. Гістероскопія органів малого таза

D. Метросальпінгографія

E. Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки

1000. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

A. Лідокаїн

B. Верапаміл

C. Атропін

D. Еуфілін

E. Анальгін

1001. Хворому, з приводу кровотечі, розпочато переливання крові. Через 5 хвилин стан хворого погіршився, з'явився біль у попереку, потемніння в очах, мерехтіння "мушок", вкрився холодним потом. Виникло відчуття страху. Пульс - 110/хв., ниткоподібний, АТ- 90/40 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A. Гемотрансфузійний шок

B. Повторна шлункова кровотеча

C. Гостре порушення мозкового кровообігу

- D. Анафілактичний шок
- E. Пірогенна реакція на переливання крові

1002. При відвідуванні хворої дитини 4-х років фельдшер виявив: температура тіла до 39,0°C, біль у горлі при ковтанні, головний біль, нудота. На гіперемійованому фоні шкіри дрібноточковий, яскраво-червоний висип, при натисканні шкіра блідне. Висип почався з обличчя та шиї. Носогубний трикутник блідий. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- A. Скарлатина
- B. Сироваткова хвороба
- C. Краснуха
- D. Вітряна віспа
- E. Кір

1003. В поліклініку на прийом звернулася мати з дитиною 3-х років. Скарги на підвищення температури тіла до 38°C, надсадний кашель, який посилюється з кожним днем, має приступоподібний характер і супроводжується блюванням, наявна в'ялість і втрата апетиту. З анамнезу відомо, що таких приступів у дитини 15-20 на добу, хворіє протягом 5 днів. Що з дитиною?

- A. Кашлюк
- B. Бронхіт
- C. Ангіна
- D. Пневмонія
- E. ГРВІ

1004. У дитини 5-ти років температура тіла - 38,2°C, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болючий при пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який попередній діагноз?

- A. Дизентерія
- B. Колі-ентерит
- C. Сальмонельоз
- D. Стафілококовий ентероколіт
- E. Ешерихіоз

1005. У дитини 5-ти років на 8-й день захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла та везикульозною висипкою, з'явилися сильний головний біль, блювання, загальмованість, тремор кінцівок. У дитини діагностовано енцефаліт. Ускладненням якого інфекційного захворювання може бути енцефаліт?

- A. Вітряна віспа
- B. Ентеровірусна інфекція
- C. Краснуха
- D. Скарлатина
- E. Кір

1006. Потерпілий внаслідок ДТП збуджений, голосно кричить, реально не оцінює свій стан. При огляді виявлено: рану середньої третини правої гомілки, в глибині якої видно уламки кісток. Значна артеріальна кровотеча. Що потрібно виконати в першу чергу при наданні першої допомоги потерпілому?

- A. Тимчасова зупинка кровотечі

- В. Асептична пов'язка
- С. Транспортна іммобілізація
- Д. Боротьба з шоком
- Е. Рентгенологічне обстеження

1007. Які головні реанімаційні заходи проводять при клінічній смерті?

А. Закритий масаж серця, штучна вентиляція легень

- В. Штучна вентиляція легень
- С. Переведення на апаратне дихання
- Д. Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання
- Е. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

1008. Дитині 7 місяців, на штучному вигодовуванні (коров'яче молоко, манна каша). Поступила в стаціонар з підвищеною температурою до 37,8°C, короткочасними приступами тоніко-клонічних судом, ознаками рахіту II ступеня. Позитивні симптоми Ерба, Труссо, Маслова. Зазначте патологічний стан, що став причиною судом:

А. Спазмофілія

- В. Епілепсія
- С. Ниркова еклампсія
- Д. Менінгоенцефаліт

1009. При обстеженні вагітної, фельдшер визначив, що позовжня вісь плода і матки перетинається під прямим кутом. Серцебиття плода вислуховується зліва на рівні пупка до 140\хв., ясне, ритмічне. Яке положення та позиція плода?

А. Поперечне, I позиція

- В. Поздовжнє, I позиція
- С. Поперечне, II позиція
- Д. Косе, I позиція
- Е. Поздовжнє, II позиція

1010. ШМД приїхала на місце ДТП. Потерпілого збив автомобіль. Він скаржиться на біль, відсутність рухів в правій верхній кінцівці. Об'єктивно: в середній третині правого передпліччя при пальпації відмічається біль, крепітація, патологічна рухомість. Яке ушкодження отримав потерпілий?

А. Перелом

- В. Розтягнення
- С. Розрив
- Д. Вивих
- Е. Забій

1011. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

А. Баралгін

- В. Алохол
- С. Вікасол
- Д. Нітрогліцерин
- Е. Дицинон

1012. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргою на різку болючість в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 37,2°C, нудота, блювання. Позитивні симптоми: Щоткіна-Блюмберга, Воскресенського, Ровзінга. Який попередній діагноз?

- A. Гострий апендицит
- B. Гострий холецистит
- C. Виразкова хвороба
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий пієлонефрит

1013. Ви фельдшер ФАПу. Проводите взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менінгокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в бак лабораторію:

- A. 2 години
- B. 1 година
- C. 30 хвилин
- D. 6 годин
- E. 3 години

1014. У хворого на бронхіальну астму напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу, в/в введення еуфіліну ефекту не дали. Вимушене положення тіла, частота дихання - 36/хв., кашель з незначним виділенням харкотиння. Рс- 84/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Дистанційні сухі хрипи. Який препарат найбільш доцільно приготувати?

- A. Преднізолон
- B. Ефедрин
- C. Астмопент
- D. Адреналін
- E. Морфін

1015. У пацієнта який звернувся на ФАП виявили туберкульоз та транспортували до спеціалізованого закладу. Який вид дезінфекції буде проведений на ФАПі?

- A. Вогнищева заключна
- B. Механічна
- C. Поточна
- D. Генеральне прибирання
- E. Профілактична

1016. До пацієнтки 38-ми років прийшла на виклик ШМД. Жінка поскаржилася, що прокинулася вночі від раптового, різкого, швидко наростаючого болю у правому підребер'ї, який іррадіював у праву лопатку. Біль супроводжувався нудотою і повторним блюванням. Позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі. Який препарат підготує фельдшер в цій ситуації?

- A. Атропін
- B. Алохол
- C. Церукал
- D. Димедрол
- E. Анестезин

1017. Фельдшера викликано до пацієнта з гострою затримкою сечовипускання після ниркової коліки. Є підозра на сечокам'яну хворобу. Яку першочергову долікарську допомогу повинен надати фельдшер?

- A. Сидячу теплу ванну

- В. Поставити постійний катетер
- С. Застосувати сечогінні засоби
- Д. Застосувати міхур з льодом
- Е. Ніжні гарячі ванни

1018. Повторно народжуюча, в терміні пологів, з регулярною пологовою діяльністю. В анамнезі: кесарів розтин. Під час перейм відчула розлитий біль в ділянці післяопераційного рубця. При піхвовому дослідженні: відкриття шийки матки 5 см. Які подальші дії?

А. Кесарів розтин

- В. Пологи через природні статеві шляхи
- С. Стимуляція пологової діяльності
- Д. Очікувальна тактика ведення пологів
- Е. Накладання акушерських щипців

1019. До фельдшера ФАПу звернулась пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги:

А. Ревматична хвороба

- В. Ревматоїдний артрит
- С. Остеохондроз
- Д. Остеоартроз
- Е. Подагра

1020. Бригаду ШМД викликали до дівчинки 8-ми років, яка після введення самостійно ін'єкцій інсуліну швидко знепритомніла. При огляді: шкіра, слизові оболонки, язик вологі, тризм жувальних м'язів. Для надання невідкладної медичної допомоги фельдшеру необхідно ввести 20% розчин глюкози. Вкажіть найдоцільніший шлях і метод введення даного препарату:

А. Внутрішньовенно струминно

- В. У ротову порожнину поступово
- С. Внутрішньовенно краплинно
- Д. Внутрішньом'язово дробно
- Е. Підшкірно повільно

1021. На ФАП прийшла вагітна. При огляді над входом в малий таз пальпується неправильної форми передлегла частина м'якої консистенції, яка не балотує. У дні матки визначається голівка. Визначте передлежання плоду:

А. Тазове

- В. Косе
- С. Поперечне
- Д. Ніжне
- Е. Головне

1022. При ознайомленні з лабораторними дослідженими загального аналізу сечі виявлено наступні показники: лейкоцити - 5-6 в полі зору, епітелій -1-2 в полі зору, еритроцити - 40-50 в полі зору, циліндри -1-2 в полі зору. Як слід трактувати такі зміни в сечі?

А. Гематурія

- В. Піурія
- С. Глюкозурія
- Д. Лейкоцитурія

Е. Протеїнурія

1023. Мати з 6-ти річною дитиною звернулася до фельдшера ФАП, що її дитину в області обличчя вкусила комаха. При огляді фельдшер виявив еластичну припухлість на щоках, повіках, охриплість голосу. Дитина неспокійна, температура - 38°C. Такий стан відповідає:

A. набряку Квінке

B. Кропив'янці

C. Гнейсу

D. Сінній лихоманці

E. Екламсії

1024. При обстеженні породіллі виявлено: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

A. Лактостаз

B. Лактопоез

C. Мастит

D. Лактогенез

E. Гіпогалактія

1025. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

A. Фолікулярна ангіна

B. Лакунарна ангіна

C. Катаральна ангіна

D. Дифтерія глотки

E. Виразково-плівчаста ангіна

1026. Фельдшер ШМД виїхав на місце ДТП, хворий з відкритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У нього діагностовано: правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:

A. 2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії

B. Проекція плеврального синуса

C. 7-ме міжребер'я по лопатковій лінії

D. 6-те міжребер'я по задньопуховій лінії

E. Місце найбільшої тупості, визначеної під час перкусії

1027. Під час критичного зниження температури тіла пацієнт відчув різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Назвіть ускладнення, яке виникло у пацієнта:

A. Колапс

B. Сопор

C. Шок

D. Марення

E. Кома

1028. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось

прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психо-патологічний синдром:

A. Кандинського-Клерамбо

B. Корсакова

C. Невротичний

D. Маніакальний

E. Астенічний

1029. "Кинджальний біль", виразковий анамнез, напруження м'язів передньої черевної стінки це:

A. Тріада Мондора

B. Тріада Лаффіте

C. Тріада Крисчена

D. Тріада Огюстена

E. Тріада Кондора

1030. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть, для якого захворювання характерні ці скарги:

A. Ревматична хвороба

B. Ревматоїдний артрит

C. Остеоартроз

D. Остеохондроз

E. Подагра

1031. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

A. Гостра кропив'янка

B. Рожевий лишай

C. Алергічний дерматит

D. Синдром Лайєла

E. Токсикодермія

1032. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

A. Фолікулярна ангіна

B. Катаральна ангіна

C. Лакунарна ангіна

D. Дифтерія глотки

E. Виразково-плівчаста ангіна

1033. До ФАПУ машиною швидкої допомоги терміново доставили пацієнта 20-ти років, у якого блювотні маси мають вигляд "кавової гущі". Вкажіть, про що це свідчить:

A. Шлункова кровотеча

B. Легенева кровотеча

C. Стеноз ворота шлунка

D. Анорексія

E. Кровотеча з розширених вен стравоходу

1034. Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 8-ми років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, дрібноточковий висип на гіперемованій шкірі, підвищення температури тіла до 38°C.

Об'єктивно: у зіві яскрава гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідість носо-губного трикутника, язик обкладений білим нальотом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A. Скарлатина

B. Атопічний дерматит

C. Краснуха

D. Вітряна віспа

E. Кір

1035. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

A. Диспансерний нагляд

B. Оперативне лікування

C. Санаторно-курортне лікування

D. Фізіотерапевтичні методи лікування

E. Медикаментозне лікування

1036. До фельдшера звернувся хлопчик 10-ти років зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного забарвлення. Комірка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна запідозрити?

A. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

B. Геморагічний васкуліт

C. Гемофілія

D. Гострий лейкоз

E. Гемолітична анемія

1037. Хвора 36-ти років звернулась зі скаргами на загальну слабкість, швидку стомлюваність, сухість шкіри, набряки обличчя, закрепи. Місяць тому перенесла струментомію з приводу тиреотоксикозу. Шкіра бліда, суха. Ps- 58\хв., слабого наповнення, АТ- 90\55 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м'який, безболісний під час пальпації. Діурез 1,2 л за добу. Виберіть препарат для патогенетичного лікування хворої:

A. L-тироксин

B. Гіпотіазид

C. Йодид калію

D. Мерказоліл

E. Ловастатин

1038. Дитина 3-х місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після

годування, за місяць набрала в масі 400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

A. Недогодовування

B. Перегодовування

C. Кишковий токсикоз

D. Проста диспепсія

E. Парентеральна диспепсія

1039. Хвора 23-х років звернулася на прийом до жіночої консультації зі скаргами на виділення з піхви з неприємним запахом, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. В ході гінекологічного огляду: слизова оболонка піхви гіперемована, на дотик кровоточить, виділення біло-зелені, пінисті, значні. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Трихомоніаз

B. Хламідіоз

C. Гонорея

D. Сифіліс

E. Кандидоз

1040. Фельдшер під час дезінфекції шприців та голок випадково направив струмінь дезрозчину собі в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

A. Промити очі струменем проточної води

B. Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря

C. Промити очі 3% розчином перексиду водню

D. Промити очі перевареною водою

E. Накласти на очну щілину асептичну пов'язку

1041. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання з'явилися задишка, ціаноз носогубного трикутника. Під час аускультатії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

A. Міокардит

B. Вогнищева пневмонія

C. Гломерулонефрит

D. Сироваткова хвороба

E. Набута вада серця

1042. Ви працюєте фельдшером ФАПУ. При проведенні проби Манту у дитини 5-ти років виявлена папула 7 мм. Як оцінюється проба Манту?

A. Позитивна проба Манту

B. Негативна проба Манту

C. Гіперергічна проба Манту

D. Сумнівна проба Манту

E. Віраж туберкульозної проби

1043. Дівчина 14-ти років скаржиться на болі у животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: жовтушність шкірних покривів, збільшення печінки, ахолічні випорожнення, сеча кольору "пива". Який найбільш імовірний діагноз?

A. Вірусний гепатит

B. Гострий холецистит

C. Гострий гастрит

D. Інфекційний мононуклеоз

1044. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 26-ти років, зі скаргами на кашель з виділенням незначної кількості "іржавого" мокротиння, біль в грудній клітці справа під лопаткою, який посилюється на вдиху та при кашлі, різку слабкість. Захворів два дні тому після переохолодження. Об'єктивно: t_o - 39°C , стан тяжкий, шкірні покриви бліді, рум'янець на щоках, дихання поверхневе, задишка. У легенях - при перкусії притуплено-тимпанічний звук, при аускультії крепітація на висоті вдиху. Ps -100\хв., ЧД- 30\хв. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Негоспітальна пневмонія

B. Гострий бронхіт

C. Інфаркт легені

D. Сухий плеврит

E. Ексудативний плеврит

1045. Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

A. Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору при кашлі

B. Відсутність блювання

C. Артеріальна гіпертензія

D. Блювання "кавовою гущею"

E. Кров, що виділяється, має темне забарвлення

1046. Вагітна звернулася на ФАП до фельдшера зі скаргами на головну біль, нудоту, 2 тижні тому з'явилися набряки на ногах. Об'єктивно: вагітна збуджена, AT - 180\110 мм рт.ст. на правій руці, а на лівій - 175\105 мм рт.ст. Ps - 88\хв. Матка в тонусі, дно її на 2 п/п вище пупка. ЧСС- 160\хв. Яке виникло ймовірне ускладнення?

A. Прееклампсія тяжкий ступінь

B. Прееклампсія легкий ступінь

C. Набряки під час вагітності

D. Гіпертонічний криз

E. Ранній гестоз вагітних

1047. Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Алергічний діатез

B. Анемія

C. Гіпотрофія

D. Рахіт

E. Пітниця

1048. Хворий 38-ми років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині груднини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС- 82\хв., AT - 120\80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

A. ІХС. Стенокардія, що вперше виникла

B. ІХС. Гострий інфаркт міокарда

C. ІХС. Стабільна стенокардія напруження III ФК

D. ІХС. Стабільна стенокардія напруження IV ФК

Е. Нейроциркуляторна дистонія

1049. Після автомобільної аварії потерпілий скаржиться на біль у грудній клітці, неможливість глибокого вдиху, задишку. Об'єктивно: обличчя бліде, в лівій половині грудної клітки рана, з якої при видиху виділяється піниста кров. Вкажіть попередній діагноз:

A. Пневмоторакс

- В. Відкритий перелом ребер
- С. Поранення серця
- Д. Поранення м'яких тканин
- Е. Поранення легені

1050. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на нападоподібний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку, нудоту, блювання, гіркий присмак у роті. Пацієнт неспокійний, живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для невідкладної допомоги фельдшер приготує:

A. Ренальган

- В. Холензим
- С. Маалокс
- Д. Альмагель
- Е. Кордіамін

1051. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 65-ти років, який скаржиться на кашель, наявність прожилок крові в мокротинні, задишку, загальну слабкість, швидку втомлюваність, поганий апетит. Ці симптоми з'явилися приблизно місяць тому. Із анамнезу: курить з 20-ти років, за останні 6 місяців схуд на 10 кг. Який діагноз передбачить фельдшер?

A. Рак легень

- В. Хронічний гастрит
- С. Абсцес легень
- Д. Гангрена легень
- Е. Емпієма плеври

1052. Пацієнт 25-ти років із діагнозом грип перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

A. Вогнищева поточна

- В. Вогнищева заключна
- С. Профілактична
- Д. Механічна
- Е. Комбінована

1053. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

A. На животі

- В. На лівому боці
- С. На правому боці
- Д. На спині
- Е. Сидячи

1054. Пацієнтка 29-ти років надійшла до гінекологічного відділення з підозрою на порушену

позаматкову вагітність. Скарги на переймоподібний біль у правій клубовій ділянці. Затримка менструації 5 тижнів. Загальний стан середньої важкості, Рс- 90\хв., АТ- 105\60 мм рт.ст. Пальпаторно: живіт болючий в нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга невиражений. Бімануально: збільшені та болючі додатки справа. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

A. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння

- B. Зондування порожнини матки
- C. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- D. Гістеросальпінгографія
- E. Біопсія ендометрію

1055. Ви прийшли на патронаж до дитини 1 місяць. Оцініть поствакцинальні зміни на місці введення вакцини БЦЖ:

A. Інфільтрат

- B. Кірочка
- C. Рубець
- D. Лімфаденіт
- E. Везикула

1056. До фельдшеру ФАПу звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилася виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Злоякісне новоутворення молочної залози

- B. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- C. Первинний сифіліс
- D. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- E. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

1057. Які головні реанімаційні заходи проводять при клінічній смерті?

A. Закритий масаж серця, штучна вентиляція легень

- B. Відкритий масаж серця, переведення на апаратне дихання
- C. Штучна вентиляція легень
- D. Переведення на апаратне дихання
- E. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

1058. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80\60 мм рт.ст., Рс- 92\хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Апоплексія яєчника

- B. Перекрути ніжки кісти яєчника
- C. Позаматкова вагітність
- D. Гострий апендицит
- E. Фіброміома

1059. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз: ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

A. Кольпоскопія

- B. Зондування порожнини матки
- C. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- D. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- E. УЗД

1060. До фельдшера здоров'я пункту промислового підприємства звернувся хворий, який годину тому отримав травму правого плечового суглоба. При огляді правий плечовий суглоб деформований, відмічається суглобова западина, рухи в суглобі різко обмежені, болючі, носять пружинячий характер. При пальпації головка плечової кістки знаходиться в пахвовій ямці. Назвіть попередній діагноз:

A. Вивих правого плеча

- B. Перелом правої плечової кістки
- C. Розрив м'язів правого плеча
- D. Перелом ключиці
- E. Розрив зв'язок плечового суглоба

1061. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна припустити?

A. Хронічний лімфолейкоз

- B. Хронічний мієлолейкоз
- C. Гострий лейкоз
- D. Гіпопластична анемія
- E. Лімфогранулематоз

1062. До фельдшера ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

A. До дільничного гінеколога

- B. На УЗД
- C. До ВПВ
- D. До гінекологічного відділення
- E. До терапевта

1063. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта. При огляді було виявлено відсутність серцевої та дихальної діяльності, звуження зіниць у вигляді "котячого ока", трупні плями на спині, охолодження тіла. Ці ознаки характерні для:

A. Біологічної смерті

- B. Клінічної смерті
- C. Коми
- D. Непритомності
- E. Агонального стану

1064. У чоловіка раптово розвинувся напад гострого абдомінального болю з іррадіацією у ліву поперекову і пахову ділянки, що супроводжуються нудотою, пітливістю і частим сечовипусканням. Хворий неспокійний, метушиться у ліжку. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Лівобічна ниркова колька

- B. Дивертикул сигмоподібної кишки

- С. Перекрут лівого яєчка
- D. Ретроперитонеальний крововилив
- Е. Герпес Зостера

1065. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

A. Лімфаденіт

- В. Флегмона
- С. Бешиха
- D. Лімфангоїт
- Е. Правець

1066. До хворого з підозрою на інфаркт міокарда викликана ШМД. Була надана допомога - нітрогліцерин під язик, в/в анальгін з димедролом. В машині ШМД знову з'явився виражений біль. Який з препаратів доцільно ввести хворому?

A. Морфіну гідрохлорид

- В. Но-шпу
- С. Баралгін
- D. Папаверину гідрохлорид
- Е. Спазмалгон

1067. Дитина 5-ти місяців після введення вакцини АКДП зблідла, вкрилася холодним потом, знепритомніла. Про яке ускладнення йдеться?

A. Анафілактичний шок

- В. Ларингоспазм
- С. Епісиндром
- D. Еклампсія
- Е. Непритомність

1068. На ФАП звернулася жінка 42-х років, котра 2 хвилини тому отримала травму розбитим склом під час прибирання в шафі. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча рана 4x0,9 см з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:

A. Накладання джгута

- В. Підвищене положення кінцівки
- С. Стискаюча пов'язка
- D. Максимальне згинання в суглобі
- Е. Тампонада рани

1069. У дитини 5-ти років важкий стан. При огляді зіву збільшення та гіперемія мигдаликів, на яких виявлено щільний фібринозний сірувато-білий наліт, при знятті його спостерігається кровоточивість слизової оболонки. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A. Дифтерія мигдаликів

- В. Катаральна ангіна
- С. Скарлатина
- D. Лакунарна ангіна
- Е. Фолікулярна ангіна

1070. Визначте дату пологів, якщо дата останньої менструації 5 жовтня:

A. 12 липня

B. 7 червня

C. 1 травня

D. 15 серпня

E. 17 червня

1071. Ви фельдшер ШМД. Виклик до хворого зі скаргами на гострий біль в правому підребер'ї, який виник після прийому смаженої їжі, іррадіація болю під праву лопатку, у праве плече, гіркоту в роті, блювання жовчю. Хворий збуджений. Ваш попередній діагноз

A. Печінкова коліка

B. Хронічний гастрит

C. Цироз печінки

D. Хронічний панкреатит

E. Виразкова хвороба шлунка

1072. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становлять 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

A. Гектична

B. Неправильна

C. Ремітуюча

D. Хвилеподібна

E. Інтермітуюча

1073. Потерпіла лежить на спині, бліда, байдужа до присутніх, на питання не відповідає. Шкіра покрита холодним липким потом, пульс - 130\хв., слабкого наповнення і напруження, ниткоподібний, АТ- 85\50 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, діяльність серця ритмічна. На внутрішній поверхні лівого стегна різана рана розміром 10х15 см, із якої поштовхами витікає кров яскраво червоного кольору. Який вид кровотечі у потерпілого?

A. Артеріальна

B. Венозна

C. Паренхіматозна

D. Капілярна

E. Ювенільна

1074. У дитини 5-ти років температура тіла - 38,2°C, періодичний біль у животі, випорожнення з домішками слизу і крові, тенезми. Живіт болючий при пальпації, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який попередній діагноз?

A. Дизентерія

B. Сальмонельоз

C. Колі-ентерит

D. Ешерихіоз

E. Стафілококовий ентероколіт

1075. Хворий 20-ти років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на біль в ділянці лівої ключиці, який з'явився після падіння на витягнуту руку. Діагностовано закритий перелом лівої ключиці без зміщення. Вкажіть найбільш оптимальний метод транспортної іммобілізації:

A. Пов'язка Дезо

- В. Зворотня пов'язка
- С. Колосоподібна пов'язка
- Д. Спіралеподібна пов'язка
- Е. Восьмиподібна пов'язка

1076. Перелом якої з наданих кісток потребує іммобілізації трьох суглобів?

А. Плечової

- В. Великогомількової
- С. Променевої
- Д. Надколінка
- Е. П'яtkової

1077. У першороділлі 24-х років з початку регулярних перейм минуло 4 години. АТ-120/80 мм рт.ст. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття плода - 140/хв. Піхове дослідження: шийка матки вкорочена до 1,5 см, відкриття - 3 см. Плідний міхур цілий, напружений. Голівка плода притиснута до входу у малий таз. Назвіть період пологів:

А. I період пологів

- В. Передвісники пологів
- С. Прелімінарний період
- Д. III період пологів
- Е. Початок II періоду пологів

1078. Хворому 36-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової приналежності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалася в краплях із сироватками 0(I) і В(III) і не спостерігалася - з сироваткою А(II). Еритроцитарну масу якої групи потрібно перелити пацієнтові?

А. А(II)

- В. АВ(IV)
- С. 0(I)
- Д. В(III)

1079. У пацієнта 33-х років туберкульоз легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Які дії фельдшера?

А. Покласти міхур із льодом на грудну клітку

- В. Зробити масаж грудної клітки
- С. Поставити банки
- Д. Дати зволожений кисень
- Е. Поставити гірчичники на грудну клітку

1080. В приймальне відділення лікарні поступив пацієнт з гострою затримкою сечі. Фельдшер приготував все необхідне для катетеризації сечового міхура. Чим слід обробити катетер перед введенням його в сечівник?

А. Стерильна вазелінова олія

- В. Гліцерин
- С. Антисептичний розчин
- Д. Вазелін
- Е. Розчин фурациліну

1081. Бригаду ШМД викликали до чоловіка 37-ми років, який хворіє на інсулінозалежний

цукровий діабет. Перехворів на ангіну, після чого посилилась спрага, з'явилася нудота, блювання, болі в животі, сонливість. Вночі втратив свідомість. Об'єктивно: пульс - 125\хв., АТ- 80\45 мм рт.ст. Шкіра суха. Шумне дихання. Язик сухий. Печінка +4 см. Глюкоза крові - 28 ммоль\л. Яке ускладнення основного захворювання виникло у хворого?

A. Кетоацидотична кома

- B. Гіперосмолярна кома
- C. Гіперлактацидемічна кома
- D. Уремична кома
- E. Печінкова кома

1082. До фельдшера ФАПу звернулася хвора, яка годує дитину груддю із скаргами на раптове підвищення температури тіла до 38,5°C, біль в правій молочній залозі. При огляді - залоза збільшена, при пальпації - болючість. Який попередній діагноз?

A. Гострий мастит

- B. Фурункул правої молочної залози
- C. Мастопатія
- D. Фіброаденома правої молочної залози
- E. Гіпермастія

1083. На ФАПі вагітна в терміні 36 тижнів поскаржилася на різкий головний біль, погіршення зору, біль у ділянці черевного сплетіння. Об'єктивно: артеріальний тиск - 170\110 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Який препарат Ви оберете для надання невідкладної допомоги вагітній?

A. 16 мл 25% магнію сульфат

- B. 2 мл 50% анальгін
- C. 150 мг кокарбоксилази
- D. 40 мг лазиксу
- E. 2 мл 1% промедолу

1084. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на ниючий біль унизу живота, що періодично підсилюється, температуру тіла - 37,6°C, загальну слабкість. Остання менструація без затримки і особливостей. В анамнезі - кіста яєчника. Бімануально: матка звичайних розмірів, щільна, рухома, болюча. Біля неї визначається тугоеластичне утворення до 10 см, болюче, малорухоме. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. Перекрут ніжки кісти яєчника

- B. Порушена позаматкова вагітність
- C. Апоплексія яєчника
- D. Гострий аднексит
- E. Розрив капсули кісти яєчника

1085. За викликом прибув фельдшер ШМД до хворого 62-х років, який скаржиться на стискаючий сильний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Хворий прийняв нітрогліцерин, але біль не вщухає вже 2 години. ЧДР- 20\хв., пульс - 85\хв., АТ- 110\70 мм рт.ст. Температура тіла - 37°C. Тони серця приглушені. Вкажіть ймовірний діагноз:

A. Гострий інфаркт міокарда

- B. Кардіогенний шок
- C. Стенокардія спокою
- D. Набряк легень

Е. Стабільна стенокардія напруження

1086. Під час будівельних робіт на нижні кінцівки працівника впала бетонна плита. Після звільнення кінцівок з'явилися різкий набряк, біль, обмеження рухів та чутливості. Встановлено діагноз: симптом тривалого стискання. Функція яких органів страждає першочергово при даному синдромі?

А. Нирки

В. Печінка

С. Серце

Д. Легені

Е. Головний мозок

1087. Хвора бліда, АТ- 95/60 мм рт.ст., частота пульсу - 100/хв. Який із нижче перелічених попередніх діагнозів можна встановити жінці зі скаргами на короткочасну втрату свідомості після раптового гострого болю внизу живота, затримку місячних на 5 тижнів?

А. Позаматкова вагітність

В. Загроза раннього викидня

С. Рак матки

Д. Запальний процес додатків матки

Е. Виразка шлунка

1088. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, поприлість, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально - гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання припустив фельдшер?

А. Екзема

В. Кропив'янка

С. Атопічний дерматит

Д. Токсикодермія

Е. Нейродерміт

1089. Фельдшер швидкої медичної допомоги приїхав на виклик до хворого 50-ти років, який скаржиться на ядуху, що триває близько 2-х годин. Об'єктивно: вимушене положення, хворий сидить нахилившись вниз і спираючись ліктями на край ліжка. Дихання - 34/хв. Чутні дистанційні сухі хрипи. Пульс - 84/хв.; АТ- 130/80 мм рт.ст. Інгаляції астмопентом, в/в введення еуфіліну ефекту не дали. Доцільно застосувати препарат:

А. Преднізолон

В. Папаверин

С. Сальбутамол

Д. Лазолван

Е. Атропін

1090. Фельдшера ФАПу викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом "виразкова хвороба шлунка". Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів "кавової гущі". Випорожнення "мелена", вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ-80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

А. Гіповолемічний шок

В. Кардіогенний шок

- С. Анафілактичний шок
- D. Перфорація виразки шлунка
- Е. Гостре отруєння

1091. В якій дозі вводять преднізолон у разі інфекційно-токсичного шоку II-го ступеня у дитини з менінгококцемією?

- A. 10 мг/кг**
- B. 2-3 мг/кг
- С. 3-5 мг/кг
- D. 0,5-1 мг/кг
- Е. 30 мг

1092. Чому НЕ ДОЦІЛЬНО закапувати в очі більш 1-2 крапель лікарських розчинів?

- A. У кон'юнктивальній порожнині не утримується більш 1 краплі розчину**
- B. Очні краплі містять сильнодіючі речовини
- С. Велика кількість рідини шкодить кон'юктиві
- D. Велика кількість крапель може викликати алергію
- Е. Велика кількість препарату шкідливо впливає на зір

1093. Пацієнт, що звернувся до фельдшера ФАПУ скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, відчуття гіркоти в роті, схуднення. Об'єктивно: "судинні" зірочки на грудях, печінкові долоні, "голова медузи" на передній стінці живота, асцит. Який патологічний стан ймовірний у пацієнта?

- A. Цироз печінки**
- B. Хронічний гастрит
- С. Виразкова хвороба шлунка
- D. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- Е. Рак шлунка

1094. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 28-ми років, у якої 3 дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помиїв, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: шкіра бліда. Набряки на обличчі. Пульс - 82/хв, ритмічний, напружений. АТ- 175/125 мм рт.ст., добова кількість сечі - 350 мл. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. Гострий гломерулонефрит**
- B. Гострий пієлонефрит
- С. Хронічний пієлонефрит
- D. Хронічний гломерулонефрит
- Е. Гіпертонічна хвороба

1095. Вкажіть, за допомогою якого реактиву фельдшер здійснює контроль якості передстерилізаційного очищення інструментарію на предмет виявлення залишків миючого засобу:

- A. Фенолфталеїновий**
- B. Судан-3
- С. Азопірамовий
- D. Бензидиновий
- Е. Фекел-2

1096. Дівчина 15-ти років звернулася до фельдшера зі скаргами на біль по всьому животі, який з'явився раптово, декілька годин тому в епігастральній ділянці, після чого локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла - 38°C. Живіт болісний при пальпації у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Які дії слід виконати в першу чергу?

A. Терміново госпіталізувати

- B. Спостерігати
- C. Викликати маму
- D. Відпустити додому
- E. Промити шлунок

1097. До Вас звернувся пацієнт, який впав з драбини та скаржиться на біль і неможливість ступати на ліву ногу. Об'єктивно: по передній поверхні середньої третини лівої гомілки зіняння шкіри з незначною кровотечею. При накладанні пов'язки відчувається крепітація та патологічна рухливість. Що з хворим?

A. Відкритий перелом

- B. Закритий перелом
- C. Вивих
- D. Розтягнення зв'язок
- E. Розрив зв'язок

1098. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез за центральним типом та гемігіперестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Ішемічний інсульт

- B. Геморагічний інсульт
- C. Транзиторна ішемічна атака
- D. Епідуральна гематома
- E. Пухлина мозку

1099. Чоловік 23-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на загальну слабкість, нездужання, головний біль. Підвищення температури тіла до 37,5°C, сухий кашель. Хворіє другий день. Об'єктивно: температура тіла - 37,2°C. Загальний стан задовільний. Периферичні лімфатичні вузли не збільшені. Перкуторний звук над легень ясный. Дихання жорстке, розсіяні сухі свистячі хрипи. ЧДД- 16\хв. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС- 72\хв. АТ-120\80 мм рт.ст. Ваш діагноз:

A. Гострий бронхіт

- B. ХОЗЛ
- C. Бронхіальна астма
- D. Вогнищева пневмонія
- E. Ексудативний плеврит

1100. Хворий 36-ти років, звернувся до фельдшера зі скаргами на гострі болі в животі, які виникають через 30 хвилин після прийому їжі. Апетит збережений, але через появу болю після їжі хворий обмежує її прийом. Хворіє протягом декількох років, погіршення стану відмічає в

осінньо-весняний період. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Легені та серце без патології. Язик обкладений білим нальотом. При пальпації живота відмічається болючість в епігастральній ділянці. Ваш діагноз:

A. Виразкова хвороба шлунка

- B. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- C. Хронічний холецистит
- D. Хронічний панкреатит
- E. Хронічний ентерит

1101. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психопатологічний синдром:

A. Кандинського-Клерамбо

- B. Корсакова
- C. Маніакальний
- D. Невротичний
- E. Астенічний

1102. Вагітна 25-ти років поступила в пологовий будинок у терміні 40 тижнів вагітності. Розміри тазу: 26-26-31-18 см. ОЖ- 100 см. ВДМ- 42 см. Положення плода повздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода приглушене - 160\хв. Перейми, які почались 6 годин тому, болючі. Відійшли навколоплідні води. Контракційне кільце знаходиться на рівні пупка і косо розташоване. Вкажіть, яке ускладнення виникло у пологах:

A. Загроза розриву матки

- B. Емболія навколоплідними водами
- C. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- D. Повний розрив матки
- E. Кінець I періоду пологів

1103. Ви фельдшер ФАПУ. До Вас звернувся хворий із скаргами на оперізуючі болі в животі, нудоту, блювання. Зі слів хворого зловживає алкоголем та жирною їжею. При пальпації живіт болючий, особливо посередині живота на 6-7 см вище пупка та в лівих відділах живота. Позитивний симптом Мейо-Робсона. Вкажіть, яке захворювання можна запідозрити у хворого:

A. Гострий панкреатит

- B. Гострий холецистит
- C. Гострий апендицит
- D. Кишкова непрохідність
- E. Защемлена кила

1104. До фельдшера ФАПУ звернулась пацієнтка 32-х років зі скаргами на задишку з утрудненим видихом. При огляді грудна клітка в положенні максимального вдиху, при перкусії визначається коробковий звук, аускультативно - дихання послаблене, розсіяні свистячі хрипи. Поставте попередній діагноз:

A. Бронхіальна астма

- B. Пневмонія
- C. Емфізема легень

- D. Серцева астма
- E. Гострий бронхіт

1105. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства звернувся працівник зі скаргами на болі в епігастральній ділянці і правому підребер'ї. При обстеженні виявлені позитивні симптоми Ортнера, Кера, Мерфі. Вкажіть, про яке захворювання можна думати:

A. Холецистит

- B. Панкреатит
- C. Пієлонефрит
- D. Гастрит
- E. Виразкова хвороба шлунка

1106. Назвіть протипоказання до проведення промивання шлунка:

A. Шлунково-кишкова кровотеча

- B. Отруєння ліками
- C. Отруєння концентрованими кислотами
- D. Харчова токсикоінфекція
- E. Алкогольна інтоксикація

1107. Бригада ШМД прибула у навчальний заклад. Студент зі страхом в очах тримався за шию. Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, утруднене. Запідозрено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?

A. Застосувати прийоми Геймліха

- B. Ввести знеболюючі
- C. Вставити товсту голку в трахею
- D. Провести трахеостомію
- E. Ввести спазмолітики

1108. Хвора 25-ти років, госпіталізована зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, було одноразове блювання. Температура тіла - 37,5°C. При пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга, Ровзінга, Сітковського, Воскресенського. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:

A. Гострий апендицит

- B. Гостра кишкова непрохідність
- C. Гострий правобічний аднексит
- D. Правобічний приступ ниркової коліки
- E. Гострий холецистит

1109. Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту. Було одноразове блювання. Об'єктивно: обличчя бліде, Рс- 90\хв., ЧДР-16\хв., АТ- 130\80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний характер ушкоджень?

A. Струс головного мозку

- B. Перелом склепіння черепа
- C. Забій головного мозку
- D. Стиснення головного мозку
- E. Перелом основи черепа

1110. Фельдшер оглядає дитину 6-ти років, в якій підвищилась температура тіла до 39,5°C, з'явився висип на шкірі обличчя, волосистій частині голови, тулубі, кінцівках у вигляді папул, пухирців із гнійним вмістом. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

A. Вітряна віспа пустульозна форма

B. Строфулюс

C. Ексфолюативний дерматит Ріттера

D. Натуральна віспа

E. Стрептодермія

1111. У новонародженої дитини спостерігається пухлина в ділянці кісток черепа. Пухлина не виходить за межі шва. Різко відмежована від нормальної кістки ущільненим і трохи піднятим над її рівнем валиком. Яку пологову травму можна припустити?

A. Кефалогематома

B. Пологова пухлина

C. Внутрішньочерепна пологова травма

D. Гіпоксично-травматична енцефалопатія

E. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія

1112. Ви проводите перший етап оральної регідратації дитині 2-х років з діареєю та зневодненням І-го ступеня. Яким розчином і в якій кількості порекомендуєте матері це робити?

A. Регідрон 50 мл/кг

B. Сік 100 мл після кожної дефекації

C. Солодкі газовані напої 100 мл/кг

D. Гемодез 30 мл/кг

E. Реополіглюкін 50 мл/кг

1113. Виклик фельдшера ШМД до хворого. Стан середньої тяжкості. Скарги на сильний головний біль у потиличній ділянці, шум у вухах, нудоту, біль у ділянці серця. Об'єктивно: АТ- 220/110 мм рт.ст., пульс - 82/хв. Попередній діагноз:

A. Гіпертонічний криз

B. Інфаркт міокарда

C. Стеноз мітрального отвору

D. Стенокардія напруження

E. Гостра лівошлуночкова недостатність

1114. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на нудоту, зниження апетиту, біль в епігастральній ділянці живота оперізувального характеру, проноси, здуття живота. Об'єктивно: дефіцит ваги 10 кг, при пальпації болючість в епігастральній ділянці живота та лівому підребер'ї. Який попередній діагноз фельдшера?

A. Хронічний панкреатит

B. Хронічний гастрит

C. Хронічний гепатит

D. Хронічний ентерит

E. Хронічний коліт

1115. Хворому, який знаходиться на "Д" обліку з приводу гіпертонічної хвороби, призначені препарати з групи інгібіторів АПФ та діуретиків. Вкажіть цю пару препаратів:

A. Каптоприл, фуросемід

B. Атенолол, корвалол

- С. Ніфедипін, нітрогліцерин
- D. Енап, кордарон
- Е. Коринфар, фуросемід

1116. До фельдшера ФАП звернулась вагітна зі скаргами на болісні незначні кров'яністі виділення які з'явилися вночі. Тактика фельдшера:

A. Мобілізувати вену, негайно госпіталізувати

- В. Ввести но-шпу
- С. Ввести окситоцин
- D. Провести піхвове дослідження
- Е. Оглянути шийку в дзеркалах

1117. У 12-річного хлопчика, хворого на гемофілію, температура - 39,5°C. Який з жарознижувальних препаратів ПРОТИПОКАЗАНИЙ?

A. Ацетилсаліцилова кислота

- В. Анальгін
- С. Парацетамол
- D. Піпольфен
- Е. Но-шпа

1118. Фельдшер швидкої допомоги діагностував у хворої 29-ти років пароксизмальну тахікардію, шлуночкову форму. Який лікарський засіб повинен ввести фельдшер в першу чергу?

A. Лідокаїн

- В. Верапаміл
- С. Еуфілін
- D. Атропін
- Е. Анальгін

1119. Яка ознака відрізняє еклампсію від інших видів пізнього гестозу?

A. Судоми

- В. Головний біль
- С. Набряки
- D. Прибавка у вазі
- Е. Блювання

1120. Виклик фельдшера до дитини 8-ми років. Скарги на нудоту, блювання, біль в епігастральній ділянці. Блювотні маси містять частково перетравлену їжу. Дані симптоми з'явилися через 2 години після вживання великої кількості м'ясного салату з майонезом. Які першочергові дії фельдшера?

A. Промити шлунок і госпіталізувати

- В. Залишити хворого дома
- С. Дати протиблювотні ліки
- D. Назначити дієту і залишити дома
- Е. Обмежити їжу і пиття

1121. Під час чергового огляду у лікаря жіночої консультації у вагітної в терміні 33 тижні виникли судоми з короткочасною втратою свідомості. АТ- 170/100 мм рт.ст. Генералізовані набряки. В сечі: білок - 3 г/л, гіалінові циліндри. Встановіть ймовірний діагноз:

A. Еклампсія

B. Епілепсія

C. Артеріальна гіпертензія вагітних

D. Судомний синдром

E. Прееклампсія

1122. Фельдшера ФАП у викликали до хлопчика 5-років з нападом судом. Який препарат слід ввести дитині?

A. Р-н сибазону 0,5%

B. Р-н еуфіліну 2,4%

C. Р-н відехолу 0,125%

D. Р-н димедролу 0,1%

E. Р-н лазиксу 0,1%

1123. У новонародженої дитини на 2-й день життя з'явилась помірна жовтяниця шкіри та склер. Загальний стан задовільний, сон і апетит не порушені. З анамнезу: дитина від II вагітності, у матері - A(II), Rh(+), у дитини A(II), Rh(+). Який стан виник у новонародженого?

A. Фізіологічна жовтяниця

B. Гемолітична хвороба

C. Пологова травма

D. Сепсис

E. Гепатит

1124. Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потиличні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

A. Краснуха

B. Кір

C. Скарлатина

D. Менінгококцемія

E. Вітряна віспа

1125. При відвідуванні вдома фельдшером дитини 7-ми місяців, мама поскаржилася на зригування у дитини, випорожнення 6-8 разів на добу, кашкоподібні, рідкі з білими грудочками. Об'єктивно: температура - 36,6°C, язик з білим нальотом. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

A. Гострий розлад травлення функціонального походження

B. Дизентерія

C. Сальмонельоз

D. Колі-інфекція

E. Ротавірусна інфекція

1126. До фельдшера ФАП звернулася дівчина 16-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, нудоту, блювання, діарею, головний біль що з'являються в перший день менструації. Встановіть діагноз:

A. Альгодисменорея

B. Передменструальний синдром

C. Мастопатія

- D. Посткастраційний синдром
- E. Вірильний синдром

1127. У пацієнтки спостерігається порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

- A. Експіраторна задишка**
- B. Стридорозне дихання
- C. Дихання Біота
- D. Інспіраторна задишка
- E. Дихання Куссмауля

1128. Який препарат вводять із метою ранньої діагностики туберкульозу?

- A. Туберкулін**
- B. БЦЖ
- C. Фтивазид
- D. Рифампіцин
- E. Стрептоміцин

1129. В місті виник спалах кишкової інфекції. Скарги пацієнтів на часті випорожнення без болю, без тенезмів. Багаторазове блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, язик обкладений. Живіт не болючий. Випорожнення у вигляді рисового відвару 10-15 разів на добу. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Холера**
- B. Черевний тиф
- C. Шигельоз
- D. Сальмонельоз
- E. Ботулізм

1130. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125/70 мм рт.ст., пульс - 80/хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

- A. Седуксен, димедрол, аміназин**
- B. Кордіамін, супрастин, анальгін
- C. Строфантин, адреналін, тавегіл
- D. Цефазолін, манітол, еуфілін
- E. Ефедрин, алулент, атропін

1131. Після обстеження пацієнтки 25-ти років виявлено: скарги на відсутність менструації; пігментацію шкіри на обличчі та білій лінії живота, ціаноз слизових оболонок піхви і шийки матки, тіло матки збільшене, м'яко-еластичної консистенції. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вагітність маткова**
- B. Вагітність позаматкова
- C. Пухлина матки
- D. Ендо метріоз матки
- E. Ендо метрит

1132. На виробництві чоловік отримав удар електрострумом кілька хвилин тому. Без

свідомості, обличчя бліде, зіниці розширені, пульс на сонній артерії не визначається. Які Ваші першочергові дії?

A. Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

- B. Приготувати все необхідне для дефібриляції
- C. Вкрити постраждалого ковдрою
- D. Підняти ноги та опустити голову
- E. Чекати приїзду карети ШМД

1133. У дитини 2-х років - IV ступінь гострого стенозуючого ларинготрахеїту. Який метод невідкладної допомоги найдоцільніший в цьому випадку?

A. Трахеотомія

- B. Подавання зволоженого кисню
- C. Відволікальна терапія
- D. Антигістамінні засоби
- E. Парові інгаляції

1134. Після визначення груп крові, резус-фактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби ці результати заносять до:

A. Протоколу переливання крові

- B. Листа інтенсивного нагляду
- C. Температурного листка
- D. Листка лікарняних призначень
- E. Амбулаторної картки

1135. До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х місяців зі скаргами на асиметрію шкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання припустить фельдшер?

A. Природжений вивих стегна

- B. Травматичний вивих стегна
- C. Застарілий вивих стегна
- D. Звичний вивих стегна
- E. Патологічний вивих стегна

1136. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у ділянці лоба, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

A. Гострий фронтит

- B. Гострий етмоїдит
- C. Гострий риніт
- D. Гострий гайморит
- E. Гострий сфеноїдит

1137. У дитини віком 1 рік, яка другий день хворіє на ГРЗ, виник гавкаючий кашель, хриплий голос, вночі з'явилася задишка. При огляді фельдшер виявив, що загальний стан середньої тяжкості, дихання шумне, виражені задишка інспіраторного характеру, участь допоміжних м'язів в акті дихання, блідість шкіри, пероральний ціаноз. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A. Стенозуючий ларинготрахеїт

- В. Обструктивний бронхіт
- С. Вогнищева пневмонія
- Д. Гострий назофарингіт
- Е. Сегментарна пневмонія

1138. Ви фельдшер здоров'я школи. У учня 6-го класу, який хворіє на цукровий діабет на 5-му уроці розвинулась слабкість, запаморочення, втрата свідомості, дитина стала бліда, вкрилась холодним потом, появився тремор кінцівок. Який стан розвинувся у дитини?

А. Гіпоглікемічна кома

- В. Гіперглікемічна кома
- С. Непритомність
- Д. Колапс
- Е. Ацетонемічний синдром

1139. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

А. Баралгін

- В. Вікасол
- С. Дицинон
- Д. Алохол
- Е. Нітрогліцерин

1140. До фельдшера ФАПУ із поля, яке оброблене фосфорорганічними отрутохімікатами, доставили пацієнта 35-ти років. Свідомість пацієнта потьмарена, спостерігаються слинотеча, нудота, блювання, порушення дихання, брадикардія, звуження зіниць. Який препарат необхідно застосувати як антидот у даному випадку?

А. Атропін

- В. Адреналін
- С. Унітіол
- Д. Прозерин
- Е. Пентацин

1141. Фельдшер проводить санітарно-освітню лекцію на підприємстві з питань профілактики онкозахворювань. Що повинен відповісти фельдшер на питання: "Як часто жінка повинна проводити самообстеження молочних залоз?"

А. 1 раз на місяць

- В. 1 раз на тиждень
- С. 1 раз на рік
- Д. 2 рази на рік
- Е. 2 рази на тиждень

1142. Дівчину 12-ти років витягнуто з холодної води через 15 хвилин після утоплення без ознак життя. Які першочергові заходи необхідно проводити фельдшеру при наданні долікарської допомоги?

А. Звільнити дихальні шляхи від води і почати серцево-легеневу реанімацію

- В. Не проводити реанімаційних заходів
- С. Транспортувати дитину в найближчий лікувальний заклад

D. Розпочати серцево-легеневу реанімацію

E. Ввести кордіамін 1,0 в/м

1143. Фельдшер ШМД оглядає роділля в терміні 38-39 тижнів вагітності. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено: положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, II позиція, передній вид. Де найкраще вислуховується серцебиття плоду?

A. Справа нижче пупка

B. Зліва нижче пупка

C. Справа вище пупка

D. Справа на рівні пупка

E. Зліва вище пупка

1144. Ви фельдшер ФАП. Проводите взяття мазка з носоглотки для обстеження на наявність менінгокока. Вкажіть максимальний термін доставки матеріалу в баклабораторію:

A. 2 години

B. 1 година

C. 3 години

D. 30 хвилин

E. 6 годин

1145. У потерпілої 20-ти років констатовано клінічна смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?

A. Пульсація на сонній артерії

B. Пасивні рухи грудної клітки

C. Зниження температури тіла

D. Розширені зіниці

E. Відсутність свідомості

1146. При обстеженні хворої фельдшер ФАП виявив: схуднення на 10 кг за 2 місяці, дратівливість, витрішкуватість, тахікардію навіть у спокої. Для гіперфункції якої ендокринної залози характерні дані симптоми?

A. Щитоподібна

B. Підшлункова

C. Надниркові

D. Паращитоподібні

E. Яєчники

1147. Виклик ШМД до жінки зі скаргами на сильний ріжучий біль у правому підребер'ї, який віддає у праве плече, шию, щелепу, повторне блювання. Живіт здутий, болісний у ділянці правого підребер'я. Больовий напад почався після повернення з автобусної екскурсії. Які лікарські препарати слід застосовувати в даній ситуації?

A. Папаверин, баралгін

B. Анальгін, алохол

C. Но-шпа, фуросемід

D. Фестал, бісептол

E. Карсил, ентеросгель

1148. Ви - фельдшер ФАП, оглядаєте 4-денну дитину після виписки з пологового стаціонару.

Під час огляду виявлено, що сеча дитини має жовтувато-цегляний колір, на пелюшці залишається червонуватий слід, місцями видно дрібні жовто-червоні кристалики. Який із станів новонароджених спостерігається у дитини?

A. Сечокислий інфаркт

B. Токсична еритема

C. Статевий криз

D. Транзиторна гіпертермія

E. Транзиторний дисбактеріоз

1149. Робітник 25-ти років раптово знепритомнів і впав на спину. Об'єктивно: шкіра обличчя стала блідою з ціанотичним відтінком. З'явилися спочатку тонічні, а потім клонічні судоми, піна з рота, забарвлена кров'ю, мимовільне сечовипускання. Який невідкладний стан може запідозрити фельдшер?

A. Епілептичний напад

B. Істеричний напад

C. Геморагічний інсульт

D. Гіперглікемічна кома

E. Гіпокальціємічна кома

1150. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. Об'єктивно: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

A. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки

B. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки

C. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки

D. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки

E. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

1151. На ФАП звернулася жінка 25-ти років, зі скаргами на утруднене носове дихання і ковтання, які з'явилися після укусу оси. Обличчя, слизова оболонка носа, гортані та язик набрякли. Фельдшер виставив діагноз: набряк Квінке і ввів в/м димедрол. Стан хворої не покращився. Який з перелічених препаратів потрібно ввести для покращення стану?

A. Преднізолон

B. Кофеїн

C. Мезатон

D. Кордіамін

E. Баралгін

1152. Скільки см дорівнює акушерська кон'югата:

A. 11 см

B. 12 см

C. 13 см

D. 21 см

E. 25 см

1153. III-й період пологів. Послід виділено за допомогою методу Абуладзе. Одномоментно виділилося 400 мл крові, кровотеча продовжується. Під час огляду встановлено відсутність однієї часточки. Яка тактика акушерки при затримці часток плаценти в матці?

A. Ручне обстеження порожнини матки і видалення часточки плаценти

- В. В/в введення утеротонічних засобів
- С. Зовнішній масаж матки
- Д. В/в введення інгібіторів фібринолізу
- Е. Випускання катетером сечі

1154. До ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у лівому колінному суглобі, який посилюється під час ходьби, обмеження рухів. Фельдшер призначив вологий зігрівальний компрес. Вкажіть тривалість процедури:

А. 8-10 годин

- В. 40-60 хвилин
- С. 1-2 години
- Д. 2-4 години
- Е. 4-6 годин

1155. До Вас у медпункт заводу доставили потерпілого 42-х років, який внаслідок необережності отримав сильний удар у праву поперекову ділянку. Непокійть біль у поперековій ділянці з іррадіацією у сечовід, травмований помочився сечею кольору м'ясних помиїв. При огляді блідий, пульс - 90/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку першу допомогу Ви надасте?

А. Холод на поперекову ділянку, викликати швидку допомогу

- В. Тепло на поперекову ділянку, направити хворого до хірурга
- С. Покласти спиртовий компрес на поперекову ділянку, викликати терапевта
- Д. Розтерти поперекову ділянку маззю "Рятівник"
- Е. Ввести катетер у сечовий міхур

1156. Ви фельдшер ШМД. На вулиці знепритомнів хворий на цукровий діабет (в кишені знайдена картка хворого на інсулінозалежний цукровий діабет). При огляді: шкіра волога, високий тонус м'язів, судоми, високі сухожильні рефлексії, розширені зіниці. Дихання звичайне, запаху ацетону з рота немає. Пульс - 80/хв. АТ- 120/80 мм рт.ст. Ваші дії:

А. В/в струменево ввести 40-60 мл 40% глюкози

- В. Ввести інсулін короткої дії
- С. Ввести кордіамін
- Д. Зачекати аналізу рівня глюкози в крові
- Е. Ввести глюкокортикостероїди

1157. Ви виїхали на виклик до потерпілого з переломом основи черепа. Виберіть основний симптом цієї травми:

А. Кровотеча з ліквореєю з носа та вуха

- В. Наявність крововиливу на потилиці
- С. набряк шиї
- Д. Головний біль
- Е. Кровотеча з рани на голові

1158. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В ході оглядової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

А. Перитоніт

- В. Механічна кишкова непрохідність
- С. Інфаркт міокарда
- Д. Перелом основи черепа
- Е. Тромбоз мезентеріальних судин

1159. Який метод дослідження найдоцільніший для встановлення діагнозу раку шийки матки?

А. Гістологічне дослідження

- В. Огляд шийки матки в дзеркалах
- С. Проба Шиллера
- Д. Кольпоскопія
- Е. Мазок на онкоцитологію

1160. Хвора з кістомою яєчника обстежується для планового оперативного лікування. Після різких рухів виник біль внизу живота, нудота, блювання. З яким діагнозом фельдшер КШД госпіталізував пацієнтку?

А. Розрив кісти яєчника

- В. Гострий апендицит
- С. Гострий холецистит
- Д. Перекрут ніжки субсерозного фіброматозного вузла
- Е. Порушена позаматкова вагітність

1161. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йде мова?

А. Миготлива аритмія

- В. Синусова тахікардія
- С. Екстрасистолічна аритмія
- Д. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- Е. Синусова аритмія

1162. Дитина народилась від ВІЛ-інфікованої матері з оцінкою за шкалою Апгар - 8 балів, масою тіла - 3200 г, довжиною - 50 см. Загальний стан задовільний. Антиретровірусна терапія не проводилась. Через який час можна визначити методом ІФА наявність ВІЛ-інфекції у дитини?

А. Через 18 місяців

- В. Через 12 місяців
- С. У перші дні після народження
- Д. У перші 6 місяців
- Е. У 2 роки

1163. До фельдшера ФАПу звернулася мати з дитиною віком 5 років. Останнім часом у дитини спостерігається зниження апетиту, поява випорожнень зеленуватого кольору з неприємним запахом, іноді закрепи. Які препарати слід призначити з метою відновлення мікрофлори кишківника?

А. Пробіотики

- В. Вітаміни
- С. Сорбенти
- Д. Антибіотики
- Е. Антигістаміни

1164. До Вас звернулась пацієнтка 60-ти років зі скаргами на біль внизу живота серозно-гнійні виділення із статевих шляхів. На шийці матки виявлено утворення яке має вигляд кольорової капусти, яка кровоточить. Ваш діагноз:

A. Рак шийки матки

B. Крауроз

C. Поліп шийки матки

D. Ерозія шийки матки

E. Лейкоплакія

1165. Хвора, 35-ти років, скаржиться на часті водянисті випорожнення, блювання, спрагу, слабкість та запаморочення. Об'єктивно: $t_{\text{о}} - 36,0^{\circ}\text{C}$, відмічається сухість слизових оболонок, тургор шкіри знижений, АТ- 80/50 мм рт.ст., живіт м'який, неbolючий, діурез знижений. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика з боку фельдшера ШМД?

A. Регідратаційна терапія

B. Введення адреналіну

C. Введення преднізолону

D. Введення ентеросорбентів

E. Введення сечогінних препаратів

1166. Вкажіть клінічні ознаки струсу головного мозку:

A. Втрата свідомості, головний біль, блювання

B. Парези та паралічі, головний біль, блювання

C. Головний біль, блювання, апраксія

D. Апраксія, атаксія, розлади мови

E. Розлади мови, втрата свідомості, парези та паралічі

1167. До ФАПУ звернувся хворий зі скаргами на нудоту, блювання, рідкі випорожнення 2-3 рази на добу світло-жовтого кольору. Об'єктивно: температура - $37,2^{\circ}\text{C}$, порушення зору (косоокість, двоїння в очах, сітка перед очима), порушення ковтання. З анамнезу: хворіє 2 дні, після вживання консервованих грибів. Яке захворювання може бути у цього хворого?

A. Ботулізм

B. Отруєння грибами

C. Шигельоз

D. Сальмонельоз

E. Холера

1168. На прийом до фельдшера ФАПУ привели хворого 52-х років, який зловживає алкоголем. Фельдшер помітив, що хворий збуджений, відмічається тремтіння всього тіла. Хворий заглядає під кушетку, щось ніби ловить там. Ваш попередній діагноз

A. Алкогольний делірій (біла гарячка п'яниць)

B. Депресивний стан

C. Параноїд

D. Маніакальний стан

E. Реактивний стан

1169. До хворого, що повернувся із Африки викликана ШМД. Скарги хворого на раптове підвищення температури тіла до $39,9^{\circ}\text{C}$. При огляді шкіра гіперемійована, слизові оболонки сухі. Язик обкладений білим нальотом. Тони серця приглушені, тахікардія. Відмічається гепатоспленомегалія. Зі слів дружини 2 дні тому також був напад гарячки, який закінчився

рясним потовиділенням. Яке захворювання можна запідозрити?

A. Малярія

B. Пневмонія

C. Черевний тиф

D. Грип

E. Туберкульоз

1170. Хворий 28-ми років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний головний біль, нудоту, блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення температури до 39°C, загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічному статусі: сенсорна афазія, нюхові, слухові, смакові галюцинації. В крові: $L - 30 \cdot 10^9/\text{л}$, швидкість осідання еритроцитів - 42 мм/год. Що можна діагностувати у хворого?

A. Абсцес головного мозку

B. Мозковий інсульт

C. Менінгіт

D. Радикуліт

E. Неврит

1171. Основні ознаки менінгіту:

A. Ригідність потиличних м'язів, симптоми Брудзинського, Керніга, зміни ліквору

B. Підвищення температури тіла, блювання, жар, пітливість

C. Запаморочення, судоми тіла, блювання, підвищення температури тіла

D. Лихоманка, слабкість, нудота, симптоми Нері, Ласега

E. Марення, судоми, жар, сопор

1172. Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

A. 2,25-2,5 ммоль/л

B. 1-1,5 ммоль/л

C. 1,75-2,0 ммоль/л

D. 2,5-2,75 ммоль/л

E. 2,75-3,0 ммоль/л

1173. Пацієнт скаржиться на озноб, підвищення температури тіла до 39°C, біль у попереку зліва. Хворіє 2-й день. Загальний аналіз сечі: густина - 1008, каламутна, білок - 0,3 г/л, лейкоцити - 35-40 у полі зору, еритроцити - 1-2 у полі зору, бактерії. Найімовірніший попередній діагноз:

A. Гострий пієлонефрит

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічний пієлонефрит

D. Нирковокам'яна хвороба

E. Хронічний гломерулонефрит

1174. До фельдшера звернувся чоловік 33-х років, який скаржиться на загальну слабкість, пітливість, підвищення температури тіла до 37,6°C, вологий кашель. Такий стан триває останні 3 місяці. У колективі нещодавно працював колега, у якого пізніше був діагностований туберкульоз легень. Найімовірніший попередній діагноз:

A. Туберкульоз легень

B. Гострий бронхіт

- С. Хронічний бронхіт
- D. Рак легень
- Е. Гостра пневмонія

1175. До фельдшера звернувся чоловік 38-ми років, який скаржиться на кашель з виділенням гнійного мокротиння неприємно-го запаху до 300 мл за добу, переважно вранці, задишку при фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 37,2°C, хворіє з 10 років. Об'єктивно: губи ціанотичні. Пальці у вигляді барабаних паличок. Частота дихальних рухів - 24/хв. Аускультативно: над правою легенею вислуховуються середньопухирчасті вологі хрипи, які зменшуються після відкашлювання мокротиння. Найімовірніший попередній діагноз:

A. Бронхоектатична хвороба

- В. Абсцес легень
- С. Емфізема легень
- D. Гостра пневмонія
- Е. Хронічний бронхіт

1176. На ФАП звернувся чоловік 28-ми років, який скаржиться на різку загальну слабкість, біль у горлі, кістках, підвищення температури тіла до 39,6°C. Хворіє 2 тижні. Загальний стан тяжкий. Шкіра бліда. Загальний аналіз крові: еритроцити - $1,4 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 70 г/л, колірний показник - 1,0, лейкоцити - $22,3 \cdot 10^9/л$, паличкоядерні - 3%, сегментоядерні - 8%, лімфоцити - 5%, моноцити - 3%, бластні клітини - 75%, швидкість осідання еритроцитів - 47 мм/год. Найімовірніший попередній діагноз:

A. Гострий лейкоз

- В. Залізодефіцитна анемія
- С. Хронічний лімфолейкоз
- D. Хронічний мієлолейкоз
- Е. Лімфогранулематоз

1177. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 32-х років, який скаржиться на інтенсивний біль у правій половині грудної клітки, що посилюється при кашлі, глибокому диханні, сухий кашель, підвищення температури тіла до 37,4°C. Захворів 2 дні тому після переохолодження. Об'єктивно: лежить на правому боці. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Справа на тлі везикулярного дихання вислуховується шум тертя плеври. Найімовірніший попередній діагноз:

A. Сухий плеврит

- В. Гострий бронхіт
- С. Рак легень
- D. Гостра пневмонія
- Е. Ексудативний плеврит

1178. До фельдшера ФАПу звернувся чоловік 22-х років, у якого 2 дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помій, тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі. Пульс - 62/хв., ритмічний, напружений. Артеріальний тиск - 170/120 мм рт.ст., добова кількість сечі -

A. 300 мл. Найімовірніший попередній діагноз

В. Гострий гломерулонефрит

- С. Гострий пієлонефрит
- D. Хронічний пієлонефрит

Е. Хронічний гломерулонефрит

Ф. Гіпертонічна хвороба

1179. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка 22-х років, яка скаржиться на підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги:

А. Ревматична хвороба

В. Ревматоїдний артрит

С. Остеоартроз

Д. Остеохондроз

Е. Подагра

1180. Хвора, що хворіє на ІХС, викликала швидку допомогу. Скаржиться на серце-биття, що з'явилося раптово, після того як відчула поштовх у груди. Загальний стан середньої важкості. Частота дихальних рухів - 28/хв., пульс - 168/хв., ритмічний, тони серця приглушені. На ЕКГ: частота серцевих скорочень - 166/хв., комплекс QRS розширений і змінений. Ви діагностували напад пароксизмальної тахікардії. Які з названих препаратів Ви оберете для надання допомоги?

А. Анаприлін

В. Диклофенак

С. Ізадрин

Д. Димедрол

Е. Фенігидин

1181. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки 37-ми років, яка страждає на мітральний стеноз. Вночі раптово погіршився стан - швидко зростає задишка, дихання "клекочуче", кашель із виділенням пінистого рожевого харкотиння. Які ваші першочергові дії?

А. Інгаляції піногасниками

В. Гірчичник на ділянку серця

С. Гірчичник на потилицю

Д. Інгаляції сальбутамолу

Е. ЕКГ

1182. Хворий 35-ти років, скаржиться на часте похолодання стоп, біль в литкових м'язах, що посилюється при ходьбі. Вважає себе хворим останні 3 роки. Палить. При огляді - шкіра на ступнях холодна, бліда. Пульсація артерій стоп послаблена на обох ногах. Про що свідчать дані симптоми:

А. Облітеруючий ендартеріт

В. Варикозне розширення вен

С. Облітеруючий атеросклероз

Д. Бешиха

Е. Хвороба Рейно

1183. Дитині 3 роки. Мати звернулася до фельдшера зі скаргами на часте дихання, кашель, кволість дитини, підвищення температури тіла до 39°C. При огляді: стан важкий, шкіра бліда, ціаноз носогубного трикутника. При перкусії вкорочення перкуторного звуку паравертебрально, при аускультції - велика кількість крепитуючих хрипів. Про що свідчать дані симптоми?

А. Гостра пневмонія

- В. Бронхіальна астма
- С. Гострий бронхіт
- Д. Гострий ларинготрахеїт
- Е. Хронічна пневмонія

1184. Фельдшер здоровпункту оглядає дитину 4-х років. Скарги на підвищення температури тіла до 38^оС , висипання на шкірі, кволість. При огляді: дитина квола, шкіра бліда, на волосистій частині голови, обличчі, тулубі поліморфний висип у вигляді плям, папул, везикул, наповнених прозорою рідиною. Дитина до захворювання відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину в даному випадку:

А. 21 день

- В. 5 днів
- С. 9 днів
- Д. 14 днів
- Е. 25 днів

1185. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хлопчика 4-х місяців. Скарги матері на підвищення температури тіла до 39^оС , неспокій, плач. При огляді: стан хлопчика важкий, шкіра суха, гаряча на дотик, гіперемія кон'юнктив та слизової оболонки зів, утруднене дихання через ніс. Який невідкладний стан виник у дитини?

А. Гіпертермічний синдром

- В. Астматичний стан
- С. Судомний синдром
- Д. Ларинготрахеїт
- Е. Анафілактичний шок

1186. Фельдшера швидкої допомоги викликали до роділлі: І період пологів, передбачувана маса плода - 4500 г, на висоті болючих перейм виник різкий біль, пологова діяльність припинилась. Роділля бліда. Якій патології відповідає дана клінічна картина?

А. Розрив матки, що відбувся

- В. Розрив шийки матки
- С. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- Д. Передлежання плаценти
- Е. Розрив плідного міхура

1187. До першовагітної у терміні 38 тижнів був викликаний фельдшер ФАП. Об'єктивно: перейми через 10 хвилин по 30-35 секунд, що розпочалися 3 години тому. Положення плода поздовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?

А. Перший період

- В. Другий період
- С. Третій період
- Д. Передвісники пологів
- Е. Загроза передчасних пологів

1188. До фельдшера здоровпункту проми-слового підприємства звернулась робітниця 36-ти років із скаргами на загальну слабкість, біль і відчуття розпирання у правій статевій губі. Об'єктивно: температура - 37,5 С ; зовнішні статеві органи гіперемовані, права велика статева губа набрякла, гіперемована, болюча. Виділення із піхви гнійні. Із приводу якого захворювання

необхідно скерувати пацієнтку у гінекологічне відділення?

A. Гострий бартолініт

B. Гострий вульвовагініт

C. Рак вульви

D. Гематома правої статевої губи

E. Кіста бартолінової залози

1189. У породіллі 30-ти років у ранньому пі-сляпологовому періоді виявлено крово-течу із зовнішніх статевих органів. Жінка народила дівчинку вдома - 4540 г. Поло-ги були повторні, стрімкі, розрив проме-жини при перших пологах. В анамнезі: кандидозні кольпіти. При об'єктивному дослідженні фельдшером ФАПу виявле-но: розрив слизової піхви і розрив проме-жини до ануса. Вкажіть степінь розриву промежини:

A. II

B. I

C. III

D. IV

1190. На ФАП звернулась вагітна, 20-ти років в терміні вагітності 20 тижнів, зі скаргами на набряки на нижніх кінцівках, животі, головний біль, погіршення зору. Об'єктивно: загальний стан важкий, ар-теріальний тиск - 170/100 мм рт.ст. на обох руках, білок сечі - 5,0 г/л. Під час огляду з'явився напад судом. Про яку патологію ви подумали?

A. Еклампсія

B. Гіпертонічна хвороба

C. Набряки вагітних

D. Пієлонефрит вагітних

E. Прееклампсія легкого ступеня

1191. У дитини 2-х років з гіпертермі-чним синдромом, спостерігається блі-дість шкірних покривів, остуда, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

A. Папаверин 2% внутрішньом'язово

B. Оцтові обгортання

C. Анальгін 50% внутрішньом'язово

D. Холод на проекцію великих судин

E. Парацетамол всередину

1192. Ви - фельдшер ФАПу, оглядаєте дити-ну віком 6 діб після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено на-брякання грудних залоз, виділення з них незначної кількості рідини кольору мо-лока. Забарвлення шкіри над залозами не змінене. Який із перехідних станів но-вонароджених спостерігається у дитини?

A. Статева криза

B. Токсична еритема

C. Сечокислий інфаркт

D. Транзиторна гіпертермія

E. Транзиторний дисбактеріоз

1193. Ви - фельдшер ФАПу, проводите антропометрію дитині 2-х місячного віку, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Якою є належна маса тіла дитини, якщо її маса тіла одразу після народжен-ня становила 3200 г?

A. 4600 г

B. 5600 г

C. 3750 г

D. 5400 г

E. 4000 г

1194. Ви - фельдшер ФАПу, проводите па-тронаж дитини віком 10-ти днів. Об'є-ктивно: легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей, шкіра бліда, акроціаноз. Під час аускультатії серця вислуховується грубий систо-лічний шум. З анамнезу стало відомо, що мати в перші місяці вагітності перенесла вітряну віспу. Яку хворобу Ви запідозрите у дитини?

A. Природжену ваду серця

B. Спазмофілію

C. Рахіт

D. Асфіксію

E. Бронхіт

1195. До фельдшера швидкої допомоги звернувся чоловік 35-ти років, у якого впродовж 12-ти років при контакті з квітковим пилком розвивалася ядуха. При зверненні: дихання за участю додаткових м'язів, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 30/хв., при аускультатії з обох боків - ді-лянки "німих легень". Введення яких медикаментозних препаратів фельдшером доцільне в даній ситуації?

A. Глюкокортикостероїдів

B. Антибіотиків

C. Бета-адреноблокаторів

D. Бета-адреноміметиків

E. Спазмолітиків

1196. Пацієнт 36-ти років, доставлений в приймальне відділення машиною швид-кої допомоги. Скарги: раптовий біль в епігастрії і за грудиною протягом 2 годин. Впродовж року мав подібні болі без зв'яз-ку з навантаженням, що самостійно зникали. Пацієнт блідий, стогне, холодний піт. Частота серцевих скорочень - 100/хв., екстрасистолія, артеріальний тиск - 90/65 мм рт.ст. Живіт болючий, напружений. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

A. Електрокардіографію

B. Загальний аналіз крові

C. Фіброгастродуоденоскопію

D. Рентгенографію ОГК

E. Рентгенографію шлунка

1197. Бригаду швидкої допомоги викликали до пацієнта 47-ми років, який скаржиться на інтенсивний стискальний біль в ділянці серця, загальну слабкість, запаморочен-ня, нудоту, задишку в спокої. Стан тяж-кий, блідість шкірних покривів, акроціа-ноз. Артеріальний тиск - 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв. ЕКГ: ознаки гострого ін-фаркту міокарда. Який препарат слід ви-користати фельдшеру для корекції артеріального тиску?

A. Допамін

B. Мезатон

C. Адреналін

D. Сульфокамфокаїн

1198. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПу зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживан-ня цитрусових. Висипання місцями зли-вається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37, 6оС . Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

А. Гостра кропив'янка

В. Рожевий лишай

С. Алергічний дерматит

Д. Синдром Лайєла

Е. Токсикодермія

1199. Чоловік 42-х років, звернувся на ФАП зі скаргами на біль, деформацію і пору-шення функції правої кінцівки після па-діння на витягнуту руку. При обстеженні: рука знаходиться у відведеному положен-ні, пошкоджене плече опущене, хворий тримає руку зігнутою в лікті, передпліч-чя підтримує здоровою рукою. Під дзьо-боподібним відростком пальпується ви-вихнута голівка. Визначте діагноз:

А. Вивих правого плеча

В. Перелом плечової кістки

С. Забій плечового суглоба

Д. Розтягнення зв'язок плечового суглоба

Е. Перелом акроміального відростка лопатки

1200. Чоловіку 51 рік, звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру ті-ла. При фарингоскопії на А. іперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдали-ків відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз

В. Фолікулярна ангіна

С. Катаральна ангіна

Д. Лакунарна ангіна

Е. Дифтерія глотки

Ф. Виразково-плівчаста ангіна

1201. Жінка 22-х років, що годує груддю, звернулась на ФАП зі скаргами на під-вищену температуру тіла до 39оС , біль у грудній залозі, слабкість, головний біль. Об'єктивно: грудна залоза збільшена в об'ємі, шкіра гіперемована, пальпаторно - болюча, збільшені підпахвові лімфатичні вузли. Ваш діагноз:

А. Мастит лактаційний

В. Рак молочної залози

С. Мастопатія

Д. Фібroadенома

Е. Рак Педжета

1202. На ФАП звернувся пацієнт зі скарга-ми на тягнучий біль у рані, сіпання м'язів навколо рани правої ступні. Зі слів хво-рого захворів гостро: з'явилась значна стомлюваність жувальних м'язів і їх на-пруження. З анамнезу - 4 дні назад отри-мав колото-різану рану правої ступні. За допомогою не звертався. Що з хворим?

А. Правець

В. Гостра гнійна інфекція

- C. Газова гангрена
- D. Дифтерія рани
- E. Сказ

1203. До вас на ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, озноб. При обстеженні: права гомілка набрякла, почервоніння шкіри з чіткими межами, місцями пухирі різної величини, наповнені серозним ексудатом. Ваш діагноз:

- A. Бешиха, бульозна форма**
- B. Бешиха, еритематозна форма
- C. Еризипеліод
- D. Бешиха, некротична форма
- E. Флебін

1204. Фельдшер ШМД приїхав на виклик до пацієнтки з нападом бронхіальної астми. Пацієнтка сидить, спираючись руками в край ліжка. Як називається таке положення пацієнтки?

- A. Вимушене**
- B. Активне
- C. Пасивне
- D. Сімса
- E. Фаулера

1205. Фельдшер ФАПу оглядає дитину 8-ми років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, дрібноточковий висип на гіперемованій шкірі, підвищення температури тіла до 38,0°C. При огляді: у зі-ві яскрава гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідість носо-губного трикутника, язик обкладений білим нальотом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Скарлатини**
- B. Атопічного дерматиту
- C. Краснухи
- D. Вітряної віспи
- E. Кору

1206. На профілактичний огляд до фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 1-го місяця. Який режим годування повинен призначити фельдшер?

- A. За вимогою дитини**
- B. Кожні 2 години
- C. Кожні 3 години
- D. Кожні 3,5 години
- E. Кожні 5 годин

1207. При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 38 тижнів фельдшер ФАПу визначив над входом в малий таз округлу, помірної щільності балотуючу частину плода. Спинка плода зліва. Яка це позиція та передлежання плода?

- A. I позиція, головне передлежання**
- B. II позиція, головне передлежання
- C. II позиція, сідничне передлежання
- D. I позиція, сідничне передлежання
- E. Косе положення плода

1208. Пацієнтка 15-ти років. Менархе в 13 років. Статеві контакти заперечує. Мен-струації у дівчинки нерегулярні, з затрим-ками. Чергова кровотеча більш рясна, триває 16 днів, настала після 3-х тижневої затримки. При огляді дівчинка бліда, Нb-70 г/л. З піхви рясні кров'яністі виділен-ня з дрібними згустками. При ректаль-ному дослідженні визначається маленька матка, безболісна, рухома. Придатки не пальпуються. Визначте тип кровотечі:

A. Ювенільна кровотеча

- B. Викидень
- C. Фіброміома матки
- D. Рак шийки
- E. Клімактерична кровотеча

1209. Ви фельдшер ФАПу. До вас звернувся пацієнт. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, затрим-ку газів, стілець. При огляді ви запідозрили перитоніт. Яку надати долікарську допомогу?

A. Покласти холод на живіт, викликати швидку допомогу

- B. Знеболити, покласти холод на живіт
- C. Знеболити, покласти грілку на живіт
- D. Знеболити, спостерігати за пацієнтом
- E. Обмежити прийом їжі та води

1210. Ви фельдшер ФАПу. До вас звернувся пацієнт. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, затрим-ку газів, стілець. При огляді ви запідо-зрили перитоніт. Яку надати долікарську допомогу?

A. Покласти холод на живіт, викликати швидку допомогу

- B. Знеболити, покласти холод на живіт
- C. Знеболити, покласти грілку на живіт
- D. Знеболити, спостерігати за пацієнтом
- E. Обмежити прийом їжі та води

1211. Повторновагітна, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на ниючі болі внизу живота і кров'яністі виділення зі стате-вих шляхів. Піхове дослідження: канал шийки матки пропускає палець, в ньо-му визначаються елементи плодового яй-ця. Величина матки не відповідає терміну вагітності. Придатки матки не визначаю-ться. Кровотеча рясна. Оцініть ситуацію:

A. Неповний аборт

- B. Саркома матки
- C. Передчасні пологи
- D. Передлежання плаценти
- E. Міхуровий занесок

1212. До фельдшера ФАПу звернулась мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання "фонтаном" без домішок жовчі. Блюво-тні маси мають кислий запах. Дитина по-гано збільшує масу тіла. При огляді жи-вота з'являється симптом "пісочного го-динника". Визначить попередній діагноз у дитини:

A. Пілоростеноз

- B. Пілороспазм
- C. Диспепсія
- D. Гострий гастрит
- E. Виразкова хвороба

1213. У третьому періоді пологів пройшло більше 30-ти хвилин, ознаки відшарування плаценти позитивні. Зовнішні прийоми видалення посліду неефективні. Яка повинна бути подальша тактика?

A. Ручне видалення посліду під знеболюванням

B. Очікування самостійного видалення посліду

C. Повторно застосувати зовнішні прийоми видалення посліду

D. Застосувати препарати які збільшують скорочувальну діяльність матки

E. Ввести окситоцин

1214. Пацієнтка 45-ти років, викликала фельдшера ФАПУ додому. Скаржиться на сильний напад болю у правому підребер'ї, який з'явився після прийому надто жирної їжі. Біль віддає у праву руку. В анамнезі: жовчнокам'яна хвороба. Об'єктивно: шкіра звичайного забарвлення, температура тіла - 36,7°C, позитивний симптом Ортнера, Кора. Сеча і кал звичайного забарвлення. Вкажіть найімовірніший попередній діагноз:

A. Напад печінкової коліки

B. Хронічний гепатит

C. Цироз печінки

D. Гострий гастрит

E. Напад ниркової кольки

1215. Дитина 5-ти років отруїлась невідомою речовиною. Фельдшер ШМД для негайного промивання шлунку використає воду, одноразова кількість якої складає:

A. 300-350 мл

B. 100-110 мл

C. 150-180 мл

D. 200-250 мл

E. 40-50 мл

1216. До фельдшера звернувся хлопчик 10-ти років зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного забарвлення. Лунка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна запідозрити?

A. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)

B. Геморагічний васкуліт

C. Гемофілія

D. Гострий лейкоз

E. Гемолітична анемія

1217. У дитини 7-ми місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом: менінгококова інфекція. Які першочергові дії при наданні невідкладної допомоги?

A. Провести профілактику западання язика

B. Подразнювати корінь язика зігріти дитину грілками

C. Повісити міхур з льодом до голови

D. Провести ШВЛ, закритий масаж серця

1218. Жінка 25-ти років на 8-му добу після пологів звернулася до фельдшера зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури. При огляді залоза гіперемована, в верхньо-зовнішньому квадранті пальпується інфільтрат. Що запідозрила акушерка?

A. Лактаційний мастит

- B. Рак молочної залози
- C. Мастопатія
- D. Аденома молочної залози
- E. Бешиха

1219. Пацієнт 20-ти років годину тому відчув "кинджальний" біль в животі, було одноразове блювання. Під час обстеження: положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Що з пацієнтом?

A. Перфорація виразки

- B. Гострий живіт (перитоніт)
- C. Шлунково-кишкова кровотеча
- D. Гострий гастрит
- E. Загострення виразкової хвороби

1220. У передпологовій палаті знаходиться першороділля 22-х років з нормальною пологовою діяльністю. Стан роділлі і плода задовільний. Положення плода по-здовжнє. Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка розташована до лівого боку матки. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода:

A. Нижче пупка ліворуч

- B. Нижче пупка праворуч
- C. На рівні пупка
- D. Вище пупка праворуч
- E. Вище пупка ліворуч

1221. Хвора 42 роки, звернулася зі скаргами на біль внизу живота, нудоту, блювання, що з'явилися після різких рухів. Об'єктивно: напруження м'язів черевної стінки, симптоми подразнення очеревини позитивні. Вагінальне обстеження: матка не збільшена, ліворуч від матки пальпується утвір 7-8 см в діаметрі, округлої форми, щільно-еластичної консистенції, різко болючий при зміщенні. Який діагноз є найбільш ймовірний?

A. Перекрут ніжки пухлини

- B. Розрив піксальнікса
- C. Позаматкова трубна вагітність
- D. Гострий аднексит
- E. Апоплексія яєчника

1222. Хвора 68-ми років, з діагнозом рак шийки матки скаржиться на значну кровотечу зі статевих шляхів. При огляді в дзеркалах виявлено: шийка матки збільшена, деформована, на її піхвовій частині визначається кратероподібна виразка, що кровоточить. Що необхідно зробити в першу чергу при наданні долікарської допомоги?

A. Провести тугу тампонаду піхви

- B. Ввести утеротоніки
- C. Ввести кровоспинні засоби
- D. Покласти холод на низ живота
- E. Провести біопсію шийки матки

1223. Фельдшер ФАП, не з'ясувавши алергологічного анамнезу у пацієнта, виконав ін'єкцію вітаміну B6. Після ін'єкції у пацієнта з'явилося виражене збудження, стишення в грудях, загальне почервоніння шкіри, напад кашлю, погіршення ритму дихання, зниження

артеріального тиску. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A. Анафілактичний шок

- B. Медикаментозна емболія
- C. Пірогенна реакція
- D. Колапс
- E. Повітряна емболія

1224. У дитини з гемофілією А почалася но-сова кровотеча. Який препарат доцільно використати для зупинки кровотечі?

A. Кріопреципітат

- B. Діцинон
- C. Вікасол
- D. Хлористий кальцій
- E. Вітамін С

1225. Фельдшер здоров'я пункту проводить бесіду серед робітниць цукрового заводу. Як слід відповісти на запитання: в якому віці починається клімактеричний період?

A. 45-50 років

- B. 52-55 років
- C. 40-45 років
- D. 60-65 років
- E. 65-70 років

1226. Лікар призначив пацієнту застосування газовідвідної трубки в ранній післяопераційний період, щоб усунути метеоризм. На скільки сантиметрів фельдшеру необхідно ввести газовідвідну трубку?

A. 20-30 см

- B. 18-20 см
- C. 15-18 см
- D. 10-15 см
- E. 7-10 см

1227. Під час виклику фельдшера хворий скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що відчув хворий після швидкого зниження температури. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A. Колапс

- B. Непритомність
- C. Шок
- D. Кома
- E. Марення

1228. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка 40-ка років зі скаргами на виділення калу чорного кольору. З анамнезу відомо, що пацієнтка знаходиться на "Д" обліку з виразковою хворобою 12-ти пальців кишки. До якого обстеження слід підготувати пацієнтку?

A. Кал на приховану кров

- B. Копрологічне дослідження калу
- C. Кал на яйця гельмінтів
- D. Кал на бактеріологічне дослідження

Е. Загальний аналіз калу

1229. Пацієнт 60-ти років, госпіталізований каретою швидкої допомоги до приймального відділення зі скаргами на головний біль у потиличній ділянці, підвищений артеріальний тиск - 170/95 мм рт.ст., мерехтіння мушок перед очима. На яку ділянку тіла фельдшер повинен накласти гірчичники?

A. Потиличну

B. Грудину

C. Серце

D. Поперекову ділянку

E. Спину

1230. Чоловік 48-ми років, звернувся до фельдшера здоровпункту промислового підприємства з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: артеріальний тиск - 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

A. Артеріальна гіпертензія

B. Артеріальна гіпотензія

C. Гіпертермія

D. Тахікардія

E. Брадикардія

1231. До фельдшера ФАПу звернулася повторно вагітна в терміні 30 тижнів вагітності зі скаргами на мажучі кров'яністі виділення зі статевих шляхів, болі не турбують. Відзначається високе стояння передлежачої частини плода над площиною входу в малий таз. Запідозрено передлежання плаценти. Яка подальша тактика фельдшера?

A. Термінова госпіталізація в акушерський стаціонар

B. Госпіталізація в стаціонар у плановому порядку

C. Подальше спостереження в жіночій консультації

D. Проведення піхвового дослідження в умовах жіночої консультації

E. Амніоскопія

1232. Пацієнтка 24-х років скаржиться на гострий біль у лівій здухвинній ділянці з іррадіацією в пряму кишку, який виник раптово після статевого акту. Остання менструація була 2 тижні тому. При пальпації визначаються біль та позитивні симптоми подразнення очеревини зліва. Який попередній діагноз поставить фельдшер ШМД?

A. Апоплексія лівого яєчника

B. Загроза переривання вагітності

C. Трубний аборт

D. Розрив маткової труби

E. Сальпінгоофорит

1233. Фельдшер ФАПу обстежував жінку з терміном вагітності 24 тижні. Запідозрив багатоплідну вагітність. Який метод обстеження підтвердить діагноз?

A. Вислуховування серцебиття плода в двох точках

B. Вимірювання артеріального тиску та пульсу жінки

C. Вислуховування серцебиття плода в одній точці

D. Вимірювання розмірів таза

E. Вимірювання ОЖ, ВДМ

1234. У чоловіка 57-ми років, що протягом 10-ти років страждає на стабільну сте-нокардію напруження, раптово виник ін-тенсивний здавлюючий біль за грудни-ною, відчуття нестачі повітря. Після при-йому 3-х таблеток нітрогліцерину біль зменшився, але не пройшов, через 30 хвилин став нестерпним, наростала зади-шка. Об'єктивно: блідість шкіри, гіпергі-дроз. Пульс - 100\хв., артеріальний тиск - 100\60 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

A. ІХС. Гострий інфаркт міокарда

- B. ІХС. Прогресуюча стенокардія
- C. Гострий перикардит
- D. Нейроциркуляторна дистонія
- E. Тромбоемболія легеневої артерії

1235. До фельдшера звернулась жінка 42-х років зі скаргами на кровотечі із носа, ясен, різнокольорові геморагії на тілі, які локалізуються під гумками панчів, у місцях тертя одягу. Об'єктивно: "шкіра леопарда", позитивні симптоми щипка та джгута. Найімовірніший попередній діагноз?

A. Тромбоцитопенічна пурпура

- B. Гемофілія А
- C. Гострий лейкоз
- D. Гемолітична анемія
- E. Залізодефіцитна анемія

1236. Вкажіть об'єм долікарської допомоги при кровотечі із шийки матки, зумовленої злоякісною пухлиною:

A. Провести тампонаду піхви

- B. Провести піхвову ванночку
- C. Ввести гінекологічний тампон
- D. Термінова госпіталізація
- E. Обробити йодом

1237. Роділля 25-ти років народила живо-го доношеного хлопчика вагою - 3600 г. Прошло 15 хвилин послідового періо-ду, ознак відокремлення посліду немає. Вкажіть, яка максимальна тривалість по-слідового періоду?

A. 30 хвилин

- B. 15 хвилин
- C. 60 хвилин
- D. 2 години
- E. 40 хвилин

1238. На виклику фельдшер ШМД встано-вив, що у дитини 5-ти років блювання, болі в животі, були рідкі випорожнен-ня, температура - 38,0оС , хворий 4 годи-ни. Батько пов'язує захворювання з тим, що дитина їла в кафе тістечко. Хлопчик неспокійний, шкіра блідо-землиста, та-хікардія, живіт болючий. Симптоми го-стро-го живота негативні. З чого потрі-бно почати надання допомоги?

A. Промити шлунок і кишечник

- B. Ввести антибіотик
- C. Ввести антигістамінні препарати
- D. Ввести 50% розчин анальгін
- E. Почати інфузійну терапію

1239. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт зі скаргами на нападоподібний біль у правому підребер'ї, що іррадіює в праву лопатку, нудоту, блювання, гіркий при-смак у роті. Пацієнт неспокійний, живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Для невідкла-дної допомоги фельдшер приготує:

A. Ренальган

- B. Холензим
- C. Маалокс
- D. Альмагель
- E. Кордіамін

1240. Фельдшер ФАПу оглядає хлопчика 12-ти років. Мати пояснює, що дитина скаржиться на біль в правому підребер'ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, швидку втомлюваність. При огляді: пе-чінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати?

A. Вірусний гепатит В

- B. Гострий холецистит
- C. Дискінезія жовчовивідних шляхів
- D. Залізодефіцитна анемія
- E. Лейкоз

1241. До фельдшера здоровпункту звернув-ся робітник, який наколов стопу цвяхом. На підшві рана - 0,2x0,3 см. Щеплен-ня проти правця проведено 2 роки тому. Який препарат для вакцинації повинен першочергово підготувати фельдшер?

A. ПА 0,5 мл

- B. ППС 3000 МО
- C. ППС 3000 МО та ПА 1,0 мл
- D. ПА 1,0 мл
- E. Щеплення не потрібне

1242. У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник напад апное, але ціаноз і брадикар-дія не спостерігаються. Що буде першо-черговим у наданні невідкладної допомо-ги дитині?

A. Тактильна стимуляція вздовж спини

- B. Негайно розпочати ШВЛ
- C. Розпочати зігрівання
- D. Перевірити рівень глюкози в крові
- E. Постійно підтримувати правильне положення

1243. На травмпункт доставлений чоловік 25-ти років, що з ним сказати не може, рот широко відкритий, нижня щелепа ви-сунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час бійки. Який най-більш вірогідний діагноз?

A. Вивих нижньої щелепи

- B. Перелом нижньої щелепи
- C. Перелом верхньої щелепи
- D. Остеомієліт нижньої щелепи
- E. Остеома нижньої щелепи

1244. Під час патронажу новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сі-дниць, стегон,

природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

A. Везикулопустульоз

- B. Псевдофурункулез
- C. Пухирчатка новонароджених
- D. Ексфоліативний дерматит Ріттера
- E. Попрілості

1245. На ФАП привезли хворого з черепно-мозковою травмою. Свідомість відсутня, крововилив у навколоочну клітковину, з носа виділяється кров та ліквор, з вух витікання ліквору. Артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 50/хв. Поставте попередній діагноз:

A. Перелом основи черепа

- B. Струс мозку
- C. Стиснення мозку
- D. Перелом кісток носа
- E. Перелом кісток склепіння черепа

1246. Транспортування потерпілого з переломом хребта при відсутності щита проводиться в положенні:

A. На животі

- B. На лівому боці
- C. На правому боці
- D. На спині
- E. Сидячи

1247. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 35-ти років з скаргами на сіпаючий біль в II пальці лівої кисті, яка 3 дні тому поранила палець при чистці риби. Останню ніч жінка не спала внаслідок нестерпного болю. При огляді: нігтьова фаланга лівої кисті різко набрякла, гіперемована. Яке захворювання у жінки?

A. Панарицій

- B. Пароніхія
- C. Артрит
- D. Бурсит
- E. Остеомієліт

1248. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., пульс - 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Апоплексія яєчника

- B. Перекрут ніжки кісти яєчника
- C. Позаматкова вагітність
- D. Гострий апендицит
- E. Фіброміома

1249. До фельдшера ФАПу звернулася жінка, яка отримала 20 хвилин тому опік лівої кисті та передпліччя гарячою водою. При огляді на ураженій ділянці пухирі, наповнені прозорою рідиною, шкіра гіперемована. Яке втручання повинен здійснити фельдшер?

A. Промити холодною водою

B. Накласти мазеву пов'язку

C. Накласти оцтовий компрес

D. Покласти грілку

E. Промити етиловим спиртом

1250. У хворого 55-ти років під час диспан-серного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гум-прехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна запідозрити?

A. Хронічний лімфолейкоз

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Гострий лейкоз

D. Гіпопластична анемія

E. Лімфогранулематоз

1251. До фельдшера ФАПу звернулася вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. В ході огляду фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

A. До дільничного гінеколога

B. На УЗД

C. До ВПВ

D. До гінекологічного відділення

E. До терапевта

1252. Фельдшер ШМД прибув по виклику до пацієнта 50-ти років, який скаржиться на головокружіння, слабкість, блювання за типом "кавової гущі", рідкий чорного кольору кал. При обстеженні: пульс - 120\хв., артеріальний тиск - 90\60 мм рт.ст. Що з пацієнтом?

A. Шлунково-кишкова кровотеча

B. Проривна виразка шлунку

C. Гостра кишкова непрохідність

D. Гострий геморагічний панкреатит

E. Гострий холецистит

1253. Після важкої фізичної роботи, хворий цукровим діабетом раптово втратив свідомість, з'явилися судоми, при пальпації шкірні покриви вологі, очні яблука тверді. Ваш попередній діагноз:

A. Гіпоглікемічна кома

B. Непритомність

C. Колапс

D. Гіперглікемічна кома

E. Уремична кома

1254. Потерпілий непритомний, у правій його руці обірваний електричний провід, наявне судорожне посмикування тіла. Проведено знеструмлення. Об'єктивно: дихання та пульс на магістральних артеріях відсутні, на долонній поверхні кисті продовгувата припухлість з обвугленням. Встановіть попередній діагноз:

A. Електротравма

B. Епілептичний напад

C. Інфаркт міокарда

D. Тромбоз легеневої артерії

E. Ларингоспазм

1255. Фельдшера ШМД викликали до по-терпілої 35-ти років, яка 6 годин тому ви-пила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спра-гу, біль у роті й епігастрії, слинотечу. Сли-зова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

A. Промити шлунок холодною водою через зонд

B. Викликати блювання

C. Не промивати шлунок

D. Промити шлунок розчином соди через зонд

E. Промити шлунок розчином перманга-нату калію

1256. Пацієнту хворому на цукровий діабет призначено підшкірне введення інсуліну в кількості 20 МО (1 мл інсуліну = 100 МО). Вкажіть, яку кількість інсуліну (в мл) необхідно набрати в шприц ємністю 2 мл:

A. 0,2 мл

B. 0,3 мл

C. 0,4 мл

D. 0,5 мл

E. 0,6 мл

1257. До фельдшера ФАПУ звернувся паці-єнт із скаргами на зниження чутливості у ділянці тильної поверхні 4 і 5 пальців правої кисті, неможливість зігнути 4 і 5 пальці. При огляді: м'язовий тонус та м'я-зова сила у правій руці знижені, обсяг рухів обмежений, згинально-ліктьовий рефлекс справа знижений. В анамнезі - травма правого передпліччя. Встановіть попередній діагноз:

A. Невропатія ліктьового нерву

B. Невропатія променевого нерву

C. Невропатія серединного нерву

D. Центральний параліч правої руки

E. Невропатія великогомілкового нерву

1258. Вас викликали до хворого. Пацієнт збуджений, тремтить, не спить, бачить під ліжком "маленьких пацюків", струшує простирadlo і подушку. Зі слів родичів зловживає алкоголем. Який діагноз по-ставить фельдшер ФАПУ?

A. Алкогольний делірій

B. Маніакально-депресивний психоз

C. Старечий параноїд

D. Шизофренія

E. Епілептичний психоз

1259. Для якого елемента висипки хара-ктерні раптовий початок, нетривале існування, безплідне зникнення, свербіж:

A. Уртикарного елемента

B. Плями

C. Вузлика

D. Везикули

E. Вузла

1260. У хворого на ГРВІ на 4-ту добу стан погіршився, температура підвищилася до 38 оС , з'явилася задишка, досі сухий кашель став вологим, з серозно-гнійним харкотинням. В легенях - притуплення перкуторного звуку. Яке ускладнення можна припустити?

A. Бактеріальна пневмонія

B. Гострий бронхіт

C. Вірусна пневмонія

D. Ексудативний плеврит

E. Сухий плеврит

1261. Фельдшер оглянув на дому 70-річного чоловіка у якого відмічався помірний головний біль, на фоні якого протягом двох діб з'явилися і поглибилися розлади мови, слабкість у правих кінцівках. В анамнезі: інфаркт міокарда, страждає на аритмію. В неврологічному статусі: елементи моторної афазії, центральний парез VII і XII пар черепних нервів з правого боку; з того ж боку геміпарез по центральному типу та гемігіперестезія. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Ішемічний інсульт

B. Геморагічний інсульт

C. Транзиторна ішемічна атака

D. Епідуральна гематома

E. Пухлина мозку

1262. До фельдшера звернулася дитина зі скаргами на періодичну нудоту, свербіж у ділянці ануса, зниження апетиту. Який метод обстеження слід призначити для постановки діагнозу?

A. Зіскоб з періанальних складок

B. Кoproлогічне дослідження випорожнень

C. Дуоденальне зондування

D. Бактеріологічне дослідження випорожнень

E. Фіброгастродуоденоскопія

1263. При відвідуванні ФАПУ мати 3-місячної дитини поскаржилась на неспокій дитини, пітливість. При огляді: на шкірі елементи пітниці, в ділянці потилиці облісіння, краї переднього тім'ячка м'які. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:

A. Рахіт

B. Гіпокальціємічний синдром

C. Ексудативно-катаральний діатез

D. Нервово-артритичний діатез

E. Лімфатико-гіпопластичний діатез

1264. Дитині 2 роки. Скарги батьків на раптове підвищення температури тіла до 39 оС , млявість, неспокій, блювання, судоми. Об'єктивно: на спині, сідницях, бокових частинах тулуба, задній поверхні стегон висип у вигляді геморагічних зіркоподібних елементів. Вкажіть найбільш ймовірне захворювання:

A. Менінгококова інфекція

B. Кір

C. Краснуха

D. Скарлатина

E. Вітряна віспа

1265. У пацієнта при транспортуванні в реанімаційне відділення у коматозному стані,

відзначається рідке (6-8 дихальних рухів за хвилину), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

A. Дихання Куссмауля

- B. Трахіпное
- C. Брадипное
- D. Дихання Біота
- E. Дихання Чейн-Стокса

1266. Ви фельдшер ФАПУ. До вас звернулася пацієнтка зі скаргами на нудоту, сухість в роті. Ввечері відмічала двоїння предметів, "туман в очах", розлади ковтання. При огляді було виявлено: $t_{0-37,2^{\circ}\text{C}}$, птоз, мідріаз, анізокорію. Оберіть захворювання, на яке вказують зазначені ознаки:

A. Ботулізм

- B. Гостре порушення мозкового кровообігу
- C. Вірусний менінгоенцефаліт
- D. Герпетичний менінгоенцефаліт
- E. Отруєння блідою поганкою

1267. Жінка 27-ми років, тривожна, підозріла, постійно озирається, весь час до чогось прислухається, стверджує, що в неї у мозку "працює мобільний телефон", а також, що вона чує голос рідного брата, який наказує їй робити різні дивні вчинки "ображати перехожих, когось вдарити, розбити скло, тощо". Виглядає пригніченою, усамітненою. На основі клінічних даних зазначте психопатологічний синдром:

A. Кандинського-Клерамбо

- B. Корсакова
- C. Маніакальний
- D. Невротичний
- E. Астенічний

1268. Пацієнтка, прокинувшись уночі, не змогла встати з ліжка через слабкість в правих кінцівках, хотіла покликати на до-помогу, але не змогла сказати ні слова. До ранку всі ці явища зникли. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Вкажіть, який патологічний стан розвинувся у хворої:

A. Транзиторна ішемічна атака

- B. Гіпертонічний криз
- C. Ішемічний інсульт
- D. Геморагічний інсульт
- E. Субарахноїдальний крововилив

1269. Фельдшер проводить передстерилізаційну обробку медичного інструмента-рію. На затискач наносить кілька крапель 1% р-ну фенолфталеїну. Вкажіть, про що свідчить рожеве забарвлення на інструменті?

A. Наявність залишків мийного розчину

- B. Наявність залишків крові
- C. Наявність залишків дезактину
- D. Наявність залишків дезоксону
- E. Наявність залишків жиру

1270. Фельдшер ФАПУ виконав внутрішньом'язову ін'єкцію, попередньо підігрітого олійного

розчину, але не пере-вірив, чи не потрапив у судину. Вкажіть ускладнення, яке може виникнути у дано-му випадку:

A. Медикаментозна емболія

B. Інфільтрат

C. Некроз

D. Алергічна реакція

E. Повітряна емболія

1271. Фельдшер ШМД проводить ін'єкцію антибіотика. Попередньо була проведе-на проба на чутливість до розчинника - новокаїну. Проба дала позитивний ре-зультат. Назвіть, який розчинник можна використовувати для розведення антибі-отика?

A. 0,9% розчин натрію хлориду

B. 10% розчин натрію хлориду

C. 0,25% розчин новокаїну

D. 0,5% розчин новокаїну

E. 0,1% розчин натрію хлориду

1272. До фельдшера ФАПу звернувся хво-рий зі скаргами на почервоніння і заки-сання очей, різь в очах. Під час обсте-ження - гіперемія кон'юнктиви, наявність гнійних виділень. Який попередній діа-гноз можна поставити?

A. Кон'юнктивіт

B. Блефаріт

C. Ячмінь

D. Керотит

E. Склерит

1273. Фельдшер прибув на виклик до дити-ни 5-ти років, яка протягом 2-х днів хво-ріє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрі-бноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. По-тиличні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

A. Краснуха

B. Кір

C. Скарлатина

D. Менінгококцемія

E. Вітряна віспа

1274. До Вас на ФАП звернувся хворий 63-х років, який скаржиться на посту-пове зниження гостроти зору правого ока. Протягом півроку за призначенням офтальмолога закапував вітамінні кра-плі. При огляді під капсулою кришталі-ка видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру зіниці. Вкажіть імовірний діагноз:

A. Катаракта

B. Глаукома

C. Кон'юнктивіт

D. Блефарит

E. Дакріoadеніт

1275. У дитини 4,5 років підвищення тем-ператури тіла до 39оС , порушення загаль-ного стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфний висип у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для

лікування при тяжкому перебігу даного захворювання:

A. Ацикловір

- B. Брильянтовий зелений
- C. Цефтріаксон
- D. Фулорцин
- E. Феністил

1276. Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до пацієнтки, яка втратила свідомість в переповненій маршрутці. Об'єктивно: виражена блідість шкіри, пульс - 90\хв., артеріальний тиск - 85\50 мм рт.ст. Назвіть заходи, які необхідно надати пацієнтці:

A. Надати положення лежачи, з припіднятим нижнім кінцем

- B. Посадити на стілець, розстебнути стискаючий одяг
- C. Надати положення Сімса
- D. Надати положення з опущеними ногами
- E. Надати положення Фаулера

1277. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння:

A. Дренажне

- B. Активне
- C. Пасивне
- D. Вимушене
- E. Фаулера

1278. Бригада ШМД обслуговує виклик до хлопчика 14-ти років. При обстеженні: свідомість дитини збережена, шкіра бліда із ціанотичним відтінком. На шкірі правої руки - глибокі опіки. Артеріальний тиск - 125\70 мм рт.ст., пульс - 80\хв. Тонічне скорочення м'язів. Знаходився коло трансформаторної будки через кілька годин після грози. Вкажіть препарати, які необхідно ввести дитині першочергово:

A. Седуксен, димедрол, аміназін

- B. Кордіамін, супрастин, анальгін
- C. Строфантін, адреналін, тавегіл
- D. Цефазолін, манітол, еуфілін
- E. Ефедрин, алулент, атропін

1279. Після виконання маніпуляції інструменти потрібно занурити у дезінфікуючий розчин, потім промити під проточною водою. Назвіть наступний етап у проведенні передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення:

A. Занурення у миючий засіб

- B. Висушування та стерилізація в авто-клаві
- C. Промивання у дистильованій воді
- D. Контроль якості передстерилізаційного очищення
- E. Стерилізація

1280. Ви - фельдшер ФАПУ. При обстеженні породіллі виявили: загальний стан не порушений, права молочна залоза болюча та щільна на дотик. Ваш попередній діагноз:

A. Лактостаз

- B. Гіпогалактія

- C. Мастит
- D. Лактогенез
- E. Лактопоез

1281. Роділля у терміні пологів, доставле-на у першому періоді пологів з матковою кровотечею. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Шийка матки згладжена, від-крита на 6 см. На всьому протязі вічка визначається плацентарна тканина. Кровотеча підсилюється. Яка тактика ведення пологів?

- A. Кесарів розтин**
- B. Консервативне ведення пологів
- C. Стимуляція пологової діяльності
- D. Рання амніотомія
- E. Накладення порожнинних акушерських щипців

1282. У дитини 2-х років - IV ступінь го-строого стенозуючого ларинготрахеїту. Який метод невідкладної допомоги найдоцільніший в цьому випадку?

- A. Трахеотомія**
- B. Подавання зволоженого кисню
- C. Відволікальна терапія
- D. Антигістамінні засоби
- E. Парові інгаляції

1283. Ви фельдшер швидкої допомоги, приїхали на виклик до потерпілої, яка ви-падково вилила на себе окріп. При обстеженні: потерпіла кричить від болю, передня поверхня обох нижніх кінцівок яскраво-гіперемована, вкрита пухирцями з серозним вмістом. Яка ступень та площа опіка у потерпілої?

- A. III А ст., 18%**
- B. II ст., 36%
- C. III Б ст., 45%
- D. I ст., 9%
- E. III А ст., 27%

1284. До фельдшера здоровпункту заво-ду звернувся робітник, який скаржиться на слабкість, підвищення температури до 38 оС , наявність болючого інфільтрату на задній поверхні шиї. При огляді: на-явність інфільтрату синюшно-багрового кольору з кількома гнійними крапками. Відмічається збільшення та болючість потиличних лімфовузлів. Який попередній діагноз?

- A. Карбункул**
- B. Фурункул
- C. Абсцес
- D. Флегмона
- E. Бешиха

1285. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 45-ти років, скаржиться на загаль-ну слабкість, неприємні відчуття в ділянці серця, утруднене дихання, ковтання. Про-тягом 40-ка років жила на Закарпатті. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, волога. Щитоподібна залоза збільшена, пульс - 72/хв., артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Який попередній діагноз?

- A. Ендемічний зоб**
- B. Гіпотеріоз
- C. Акромегалія

- D. Дифузний токсичний зоб
- E. Нецукровий діабет

1286. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 63-х років зі скаргами на затруднене сечовипускання, особливо вночі. Хворий відзначає, що цівка сечі стала слабкою, час від часу переривається. Яке обстеження проведе фельдшер для уточнення діагнозу?

A. Пальцеве дослідження прямої кишки

- B. Цистоскопію
- C. Хромоцистоскопію
- D. Іригоскопію
- E. Ректороманоскопію

1287. Фельдшера ФАПУ запросили оглянути пацієнта 43-х років, який після вживання алкоголю скаржиться на оперізувальний біль, нудоту, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення. Об'єктивно: пацієнт збуджений, живіт здутий, при пальпації - болючість в проекції підшлункової залози. Які лікарські препарати застосує фельдшер при наданні першої до-помоги?

A. Но-шпу, гордокс

- B. Дицинон, етамзілат
- C. Гепарин, фібринолізин
- D. Прозерін, ацеклідін
- E. Сибазон, димедрол

1288. Після визначення груп крові, резус-фактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби їх результати заносять до:

A. Протоколу переливання крові

- B. Листа інтенсивного нагляду
- C. Температурного листка
- D. Листка лікарняних призначень
- E. Амбулаторної картки

1289. До фельдшера ФАПУ звернувся чоловік 37-ми років зі скаргами на підвищення температури тіла, утруднення носового дихання, виділення з носа, біль у лобовій ділянці, який посилюється під час пальпації або постукування по передній стінці лобової пазухи, особливо в разі натискання у верхньо-внутрішньому куті очної ямки. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

A. Гострий фронтит

- B. Гострий етмоїдит
- C. Гострий риніт
- D. Гострий гайморит
- E. Гострий сфеноїдит

1290. Дитину, яка народилася на 38-му ти-жні вагітності з довжиною тіла - 45 см і масою - 2500, обвід голови - 34 см треба рахувати як:

A. Доношену

- B. Переношену
- C. Недоношену I ступеню
- D. Недоношену II ступеню
- E. Недоношену III ступеню

1291. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка 25-ти років, зі скаргами на свербіж, печію в піхві, що з'явилися після випадкового статевого акту. Об'єктивно: слизова оболонка піхви гіперемована, набрякла, з точковими геморагіями. Виділення піністі, з неприємним запахом. Ваш ймовірний діагноз:

A. Трихомонадний кольпіт

B. Мікозний кольпіт

C. Хламідіоз

D. Ендометриїт

E. Цервіцит

1292. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання, яке не принесло полегшення.

Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера.

Який з медикаментів необхідно ввести першочергово?

A. Баралгін

B. Вікасол

C. Дицинон

D. Алохол

E. Нітрогліцерин

1293. До фельдшера ФАПу принесли дитину 7 днів зі скаргами на блідість шкіри і слизових оболонок. Загальний стан задовільний. В загальному аналізі крові знижена кількість еритроцитів та Hb, Rh (+), у матері Rh (-). На яке захворювання вказують дані симптоми?

A. Гемолітична хвороба, анемічна форма

B. Гемолітична хвороба, жовтянична форма

C. Гемолітична хвороба, набрякова форма

D. Гіпохромна анемія

E. Залізодефіцитна анемія

1294. Ви фельдшер ФАПу, берете на облік вагітну. Остання менструація була 2 місяці тому. Дно матки на 2 пальці вище лона, виділення з піхви кров'яні з міхурцями. У жінки набряки на ногах та передній черевній стінці, артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., пульс - 60/хв. Що Ви запідозрити у вагітної? Ваші дії?

A. Міхуровий занесок. Негайна госпіталізація

B. 12 тижнів вагітності. Направити в жіночу консультацію

C. 8 тижнів вагітності. Аборт, що розпочався

D. Хоріонепітеліома. Госпіталізація

E. Вагітність, що завмерла. Госпіталізація

1295. До ФАП звернувся пацієнт із загостренням хронічного холецистити. Який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю?

A. Грілку

B. Міхур з льодом

C. Холодний компрес

D. Холодну примочку

E. Зігрівальний компрес

1296. Ви фельдшер ШМД. Проводите серцево-легеневу реанімацію дитини 15-ти днів. На яку глибину повинна прогинатися грудина під час виконання закритого масажу серця?

A. 1-1,5 см

B. 0,5 см

C. 2 см

D. 3 см

E. 2-2,5 см

1297. Фельдшер ШД виїхав на місце ДТП, хворий з відкритою травмою грудної клітки та переломом ребер з правого боку. У нього діагностований правобічний пневмоторакс. Хворому терміново показано дренування плевральної порожнини. Вкажіть місце проведення плевральної пункції:

A. 2-ге міжребер'я по середньоключичній лінії

B. Місце найбільшої тупості, визначеної під час перкусії

C. 6-те міжребер'я по задньопуховій лінії

D. 7-ме міжребер'я по лопатковій лінії

E. Проекція плеврального синуса

1298. Фельдшер ФАПУ спостерігає за пацієнткою з залізодефіцитною анемією. Він визначив, що у хворої суха шкіра, тріщини у кутиках рота, ламкі нігті, посилене випадіння волосся. Який синдром характеризує ці ознаки?

A. Сидеропенічний

B. Анемічний

C. Геморагічний

D. Астеновегетативний

E. Диспептичний

1299. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 54-х років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. При огляді: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

A. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки

B. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки

C. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки

D. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки

E. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

1300. На ФАП звернулася дівчинка 14-ти років зі скаргами на болі в суглобах та підвищення температури тіла до 37,5°C. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому перехворіла на ангіну. Після обстеження дитини фельдшер поставив попередній діагноз: ревматизм. Які із великих критеріїв ревматизму підтверджують діагноз?

A. Поліартрит, кардит, хорея

B. Гіпертермія, анемія, артралгія

C. Анемія, збільшення швидкості осідання еритроцитів, підвищення артеріального тиску

D. Анемія, лейкопенія, артралгія

E. Зміни ЕКГ, анемія, гіпертермія

1301. Діагностика перфоративної виразки шлунку базується на головних ознаках (тріада Мандора):

A. "Кинджальний" біль, "дошкоподібний" живіт, виразковий анамнез

B. Нудота, блювання, затримка стулу

C. Головний біль, запаморочення, загальна слабкість

- D. Кровотеча, зіяння країв рани, порушення функції
- E. Зниження артеріального тиску, тахікардія, втрата свідомості

1302. Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих пере-бував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, головокру-жіння, нудоту. Було одноразове блюван-ня. Об'єктивно: лице бліде, пульс - 90\хв., частота дихання - 16\хв., артеріальний тиск - 130\80 мм рт.ст. Який найбільш ві-рогідний діагноз?

A. Струс головного мозку Забій головного мозку

- B. Синдром здавлення головного мозку
- C. Перелом основи черепа
- D. Перелом склепіння черепа

1303. Ви фельдшер ФАПУ. До Вас зверну-лась пацієнтка, якій було проведено стру-мектомію. У неї виявлені проблеми: в'я-лість, загальна слабкість, зниження пра-цездатності, зниження пам'яті, мерзля-куватість, сонливість вдень, шкіра суха, лущиться, не береться в складку, сухість, ламкість, випадіння волосся. Про яке за-хворювання можна подумати?

A. Гіпотиреоз

- B. Гіпертироз
- C. Цукровий діабет
- D. Атеросклероз
- E. Акромегалія

1304. Хвора 76-ти років впала з висоти близько 3-х м на деревину. Доставлена МШД через 6 годин після травми. Стан тяжкий. Артеріальний тиск - 80\60 мм рт.ст., пульс - 120\хв. Позитивні симпто-ми подразнення очеревини. В ході огля-дової рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполом ді-афрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвинулося у хворої?

A. Перитоніт

- B. Механічна кишкова непрохідність
- C. Інфаркт міокарда
- D. Перелом основи черепа
- E. Тромбоз мезентеріальних судин

1305. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скарга-ми на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f . Про яке порушення серцевого ритму йдеться?

A. Миготлива аритмія

- B. Синусова тахікардія
- C. Екстрасистолічна аритмія
- D. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- E. Синусова аритмія

1306. До фельдшера звернувся чоловік 45-ти років, зі скаргами на ожиріння облич-чя, тулуба, стегон, червоно-фіолетові смуги на шкірі живота, плечей, грудних залоз, а також на сонливість, слабкість, депресію та порушення статевої функції. На рентгенограмі черепа - турецького сі-дла є базофільна аденома аденогіпофіза, у крові - підвищений рівень кортизолу. Для якого захворювання це характерно?

A. Хвороба Іценко-Кушинга

- B. Акромегалія

- С. Нецукровий діабет
- D. Хвороба Аддісона
- Е. Гіпофізарний нанізм

1307. До фельдшера звернувся хворий 20-ти років зі скаргами на пігментацію шкіри, яка виникла недавно (золотисто-коричневого кольору), потемнішання во-лосся, відсутність апетиту, нудоту, діарею, біль у животі, схуднення. Дихання везикулярне, артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., пульс - 60/хв. Аускультативно: то-ни серця ослаблені. Живіт при пальпації болісний в епігастрії. Ніктурія. Зниження функції статевих залоз. Яке захворюван-ня виникло у пацієнта?

- A. Хвороба Аддісона**
- В. Хвороба Іценко-Кушинга
- С. Подагра
- D. Панкреатит
- Е. Ожиріння

1308. Дитина народилась від ВІЛ-інфікованої матері з оцінкою за шкалою Апгар - 8 балів, масою тіла - 3200 г, дов-жиною - 50 см. Загальний стан задовіль-ний. Антиретровірусна терапія не прово-дилась. Через який час можна визначити методом ІФА наявність ВІЛ-інфекції у дитини?

- A. Через 18 місяців**
- В. Через 12 місяців
- С. У перші дні після народження
- D. У перші 6 місяців
- Е. У 2 роки

1309. Ви фельдшер ФАПУ. У доношеної клінічно здорової дитини на третю добу після народження виникла блювота із до-мішками крові, мелена. Який препарат потрібно було ввести для профілактики геморагічної хвороби новонароджених на другу добу життя?

- A. Вітамін К**
- В. Вітамін D
- С. Етамзилат
- D. Амінокапронову кислоту
- Е. Препарати заліза

1310. Ви фельдшер ФАПУ. Виклик до дити-ни 4-х років. Скарги на розлад сну, втра-ту апетиту, блювання, болі в кінцівках. Об'єктивно: дитина млява, голова мокра від поту, гіперестезія шкіри. При спробі посадити дитину в ліжку - дитина плаче, скаржиться на біль в спині, заводить руки за спину та спирається на них ("симптом триніжка"). Профілактичні щеплення не проводились. Встановіть попередній діагноз:

- A. Поліомієліт**
- В. Грип
- С. Менінгококова інфекція
- D. Гемофільна інфекція
- Е. Нейротоксикоз

1311. Пацієнтка 25-ти років звернулась із скаргами на часте, болісне сечовипускан-ня малими порціями, болі в надлобковій ділянці, субфебрильну температуру тіла, порушення сну, які з'явилися після перео-холодження. Який ймовірний діагноз поставите?

- A. Гострий цистит**

- В. Гострий гломерулонефрит
- С. Сечокам'яна хвороба
- Д. Гострий апендицит

1312. Хворий 72-х років скаржиться на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, появу набряків на ногах, тяжкість у правому підребер'ї. Хворіє на гіпертонічну хворобу. Що є найбільш вірогідною причиною розвитку такого стану?

А. Хронічна серцева недостатність

- В. Анемія
- С. Бронхіальна астма
- Д. Набута вада серця
- Е. Хронічний гепатит

1313. Хворий скаржиться фельдшеру ФА-Пу на оперізуючий біль в надчеревній ділянці, в лівому та правому підребер'ях, нудоту, метеоризм, бурчання в животі, рідкі випорожнення, які мають кашкопо-дібний вигляд, жирні, блискучі. Симптоми спостерігаються протягом року. Який попередній діагноз?

А. Хронічний панкреатит

- В. Цироз печінки
- С. Хронічний гастрит
- Д. Хронічний гепатит
- Е. Хронічний холецистит

1314. Хвора 35-ти років звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на загальну слабкість, різкий біль у великих суглобах, підвищення температури тіла до 38,2°C, пітливість. З анамнезу відомо, що два тижні тому хвора перенесла стрептококовий фарингіт. Об'єктивно: блідість шкіри, артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Гомілкові-ступневі та колінні суглоби гарячі на дотик, червоні, набряклі. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Ревматичний поліартрит

- В. Ревматичний ендокардит
- С. Ревматичний перикардит
- Д. Ревматична хорея
- Е. Ревматичний міокардит

1315. На ФАП звернувся хворий 22-х років, на 2-й день захворювання з профузним проносом і блюванням, судомами м'язів нижніх кінцівок. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 35,8°C. Шкіра бліда, акроціаноз. Риси обличчя загостренні, очі та щоки запалі. Голос сиплий. Задишка - 32/хв. Тони серця глухі, пульс - 130/хв., слабкого наповнення і напруження, артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт запалий, пальпація безболісна. Випорожнення водянисті без кольору і запаху. Під час огляду - блювота "фонтаном". Протягом останніх 24 годин виділив 350 мл сечі. Три дні тому приїхав з Криму, де відпочивав з родиною. Члени родини здорові. Сформулюйте і обґрунтуйте попередній діагноз:

А. Холера. Зневоднення III ступеню

- В. Сальмонельоз. Зневоднення III ступеню
- С. Харчова токсикоінфекція. Зневоднення III ступеню
- Д. Дизентерія
- Е. Коліінфекція

1316. Хворий 28-ми років звернувся на ФАП зі скаргами на сильний головний біль, нудоту,

блювання, мовні розлади, порушення слуху, смаку, підвищення тем-ператури до 39оС , загальну слабкість. В анамнезі: гнійний отит. В неврологічно-му статусі: сенсорна афазія, нюхові, слу-хові, смакові галюцинації. В крові: L-30 · 109\л, швидкість осідання еритроци-тів - 42 мм\год. Що можна діагностувати у хворого?

A. Абсцес головного мозку

- B. Мозковий інсульт
- C. Менінгіт
- D. Радикуліт
- E. Неврит

1317. До фельдшера з'явився хворий 45-ти років, який скаржиться на наявність висипу на грудній клітці. Об'єктивно: на правій половині грудної клітки в міжреберних проміжках виявляються згруповані міхури з серозним та каламутним вмістом. З анамнезу: впродовж 3-х днів до появи висипу відмічалось підвищення температури, головний біль, невралгічний біль у зоні майбутнього висипу. Встановіть діагноз:

A. Оперезувальний герпес Герпес простий

- B. Стафілострептодермія
- C. Бешиха
- D. Себорея

1318. Фельдшеру здоров'я пункту необхідно провести оцінювання фізичного розвитку учнів. Фельдшер визначив індекс Кетле. Як його розраховувати?

A. Ділення маси тіла в грамах на зріст у сантиметрах

- B. Множення маси тіла на зріст у сантиме-трах
- C. Ділення зросту на масу тіла
- D. Множення зросту на масу тіла
- E. Сума показників зросту та маси тіла

1319. Дитина 5 років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:

A. геморагічний васкуліт, шкірна форма

- B. кір
- C. гемофілія
- D. геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- E. хвороба Верльгофа

1320. Фельдшер ФАПУ стерилізує гумові вироби медичного призначення 6% розчином перексиду водню. Яким розчином потрібно тричі промити вироби після стерилізації?

A. Стерильний ізотонічний розчин

- B. 2% розчин натрію гідрокарбонату
- C. 0,5% розчин нашатирного спирту
- D. Розчин фурациліну 1
- E. Дистильована вода

1321. Хвора жінка скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. При обстеженні звертає увагу рівень АТ- 210\110 мм рт.ст. Який препарат треба ввести у даному випадку?

- A. Аналгін 50% - 2,0 в\мл
- B. Димедрол 1% - 1,0 в\мл

- С. Атропін 0,1% - 0,5 п/шк
- Д. Платифілін 0,2% - 1,0в/м
- Е. Клофелін 0,01% - 1,0мл**

1322. У хворого 55-ти років під час диспансерного огляду вперше виявлено невеликий лейкоцитоз, абсолютний лімфоцитоз за рахунок зрілих лімфоцитів, тіні Гумпрехта. Скарг хворий не має. Яке захворювання системи крові можна запідозрити?

- А. Лімфогранулематоз
- В. Гіпопластична анемія
- С. Хронічний лімфолейкоз**
- Д. Гострий лейкоз
- Е. Хронічний мієлолейкоз

1323. Фельдшер здоров'я повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- А. Модульований
- В. Постійний**
- С. Імпульсний
- Д. Змінний
- Е. Високочастотний

1324. До фельдшеру ФАПУ звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилась виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Первинний сифіліс
- В. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- С. Злоякісне новоутворення молочної залози**
- Д. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- Е. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт

1325. Фельдшер ШМД оглянув пацієнта 30-ти років, який упав з висоти 2 метрів на ноги. Об'єктивно: болючість у ділянці другого поперекового хребця, яка збільшується при навантаженні по вісі хребта. Вкажіть положення, у якому необхідно транспортувати пацієнта:

- А. На спині**
- В. На правому боці
- С. Напівсидячи
- Д. У положенні "жаби"
- Е. На лівому боці

1326. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

- А. Рожевий лишай
- В. Гостра кропив'янка**
- С. Синдром Лайєла
- Д. Токсикодермія
- Е. Алергічний дерматит

1327. У хворого 67-ми років діагностовано початкову стадію старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані?

- A. Кріодеструкція
- B. На цій стадії хвороби лікування не проводиться
- C. Лазеротерапія
- D. Хірургічні
- E. Медикаментозні**

1328. Мати звернулась до фельдшера з дитиною 4-х років зі скаргами на поганий апетит, неспокійний сон, періодичні болі в животі навколо пупка. Ранком спостерігається нудота, блювання, запаморочення. Дитина схудла. Тиждень тому на шкірі була висипка. Визначте попередній діагноз:

- A. Ентеробіоз
- B. Аскаридоз**
- C. Гострий гастроентерит
- D. Гострий панкреатит
- E. Дуоденіт

1329. У дитини з ГРВІ на 5-й день від початку захворювання, з'явилися задишка, ціаноз носо-губного трикутника. При аускультії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- A. Вогнищева пневмонія
- B. Гломерулонефрит
- C. Набута вада серця
- D. Сироваткова хвороба
- E. Міокардит**

1330. Фельдшер ШМД на виклику у дитини 7-ми років. Скарги на озноб, підвищення температури тіла до 39°C, головний біль, кашель. Дитина бліда, тремтить, шкіра "мрамурова", кінцівки холодні, сухий кашель, зів гіперемований, тони серця приглушені, тахікардія. Розчин якого лікарського препарату повинен ввести фельдшер у першу чергу?

- A. 2,5% аміназину
- B. 20% глюкози
- C. 2,4% еуфіліну
- D. 1% димедролу
- E. 1% дибазолу**

1331. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворої зі скаргами на різкий біль внизу живота справа, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 92/хв. Живіт напружений, болючий більше справа в нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в нижніх відділах живота. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Апоплексія яєчника**
- B. Фіброміома
- C. Перекрути ніжки кісти яєчника
- D. Позаматкова вагітність
- E. Гострий апендицит

1332. Хворий 38-й років протягом двох тижнів відзначає стискаючий біль у верхній третині груднини, що виникає при підйомі на 3-й поверх та триває до 5-10 хвилин. Об'єктивно: ЧСС-

82Vхв., АТ- 120V80 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. ІХС. Гострий інфаркт міокарда
- B. ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІV ФК
- C. Нейроциркуляторна дистонія
- D. ІХС. Стабільна стенокардія напруження ІІІ ФК
- E. ІХС. Стенокардія, що вперше виникла**

1333. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, біль та домішки крові під час акту дефекації. При огляді виявлено варикозні вузли в ділянці анального отвору. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Геморой**
- B. Поліпи прямої кишки
- C. Рак прямої кишки
- D. Тріщина заднього проходу
- E. Гострий парапроктит

1334. Який максимальний об'єм лікувального засобу можна ввести підшкірно пацієнтові одноразово?

- A. 2 мл
- B. 5 мл**
- C. 1 мл
- D. 10 мл
- E. 15 мл

1335. Фельдшера ШМД викликали до потерпілої 35-ти років, яка 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті і епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка рота гіперемована. Перша допомога:

- A. Промити шлунок розчином соди через зонд
- B. Промити шлунок розчином перманганату калію
- C. Викликати блювання
- D. Промити шлунок холодною водою через зонд**
- E. Промити шлунок теплою водою

1336. До фельдшера ФАПУ звернулась вагітна в терміні 35 тижнів за консультацією. При огляді фельдшером визначено: голівка плоду зліва, серцебиття вислуховується на рівні пупка, передлегла частина відсутня. Фельдшер повинен направити вагітну:

- A. На УЗД
- B. До дільничного гінеколога**
- C. До терапевта
- D. До ВПВ
- E. В гінекологічне відділення

1337. Фельдшер ФАПУ проводить зовнішнє акушерське обстеження вагітної 30-ти років. Вкажіть, де він повинен покласти стетоскоп при першій позиції, щоб найкраще вислухати серцебиття плоду:

- A. Справа на рівні пупка
- B. Зліва на рівні пупка**
- C. Зліва нижче пупка
- D. Справа нижче пупка

1338. Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углиб слід натискати на груднину?

- A. 3-4
- B. 4-5
- C. 2-3
- D. 0,5-0,8
- E. 1-1,5

1339. Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться, коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків?

- A. В 4 роки
- B. В 6-7 років
- C. В 1 рік
- D. В 5-6 років
- E. У 2-3 роки

1340. Хворий 34-х років звернувся до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висип в ділянці правої гомілки, свербіж, печіння, мокнуття, біль. Захворів тиждень тому, коли після травми правої гомілки в середній третині з'явився осередок ураження розміром з долоню. Межі ураження чіткі, візуально –гіперемія, везикуло-пустульозні елементи по периферії осередку ураження. Яке захворювання запідозрив фельдшер?

- A. Токсикодермія
- B. Атопічний дерматит
- C. Нейродерміт
- D. Екзема
- E. Кропив'янка

1341. Оглядаючи вагітну 30-ти тижнів, фельдшер ФАПУ діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- A. Внутрішньовенно гініпрал
- B. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- C. Сублінгвально ніфедипін
- D. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду
- E. Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг

1342. Фельдшера ФАПУ викликали до хворої. Родичі повідомили, що 2 години тому в хворої відмічалась слабкість правої руки і правої ноги, зник голос. Хвора обстежена фельдшером, який патології нервової системи не виявив. Як називається таке порушення мозкового кровообігу?

- A. Ішемічний інсульт
- B. Субарахноїдальний інсульт
- C. Тромбоемболія судин мозку
- D. Транзиторна ішемічна атака
- E. Геморагічний інсульт

1343. Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту призначенням відеїну. Визначте

початок та добову дозу призначення вітаміну D3:

- A. З 10-го дня по 2000 МО
- B. З 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- C. З 10-14-го дня по 500-1000 МО**
- D. На 2-му тижні по 4000 МО
- E. На 2-му місяці життя по 500 МО

1344. До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народженні 3200 г, зріст 50 см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- A. 5400 г**
- B. 4800 г
- C. 6000 г
- D. 5800 г
- E. 5200 г

1345. Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10-ти років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- A. Краснуха
- B. Менінгококова інфекція**
- C. Кір
- D. Скарлатина
- E. Вітряна віспа

1346. До фельдшера ФАПУ звернулася пацієнтка, яка хворіє на гіпертиреоз. Після психоемоційної травми з'явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла, тахікардія, АТ- 160/70 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- A. Тиреотоксичний криз**
- B. Напад стенокардії
- C. Напад бронхіальної астми
- D. Порушення мозкового кровообігу
- E. Гіпертонічний криз

1347. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: положення плода повздовжнє, I позиція, передній вид, головне передлежання. Визначить місце найкращого вислуховування серцебиття плода:

- A. Зліва нижче пупка**
- B. Ділянка пупка
- C. Зліва вище пупка
- D. Справа нижче пупка
- E. Справа вище пупка

1348. Фельдшер ШМД прибув на виклик до пацієнта, який скаржиться на різку слабкість, запаморочення, що виникли після швидкого зниження температури тіла. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, риси обличчя загострені, пульс ниткоподібний. Яке ускладнення виникло?

- A. Непритомність

B. Колапс

C. Шок

D. Марення

E. Кома

1349. Фельдшера швидкої допомоги визвано до роділлі, яка скаржиться на сильні болючі перейми. При огляді неспокійна, контракційне кільце високо і косо розміщене, матка у формі піщаного годинника, зовнішні статеві органи набряклі. Яке ускладнення слід запідозрити:

A. Розрив шийки матки

B. Розрив матки

C. Загроза розриву матки

D. Надмірно сильна пологова діяльність

E. Розрив промежини

1350. Пацієнтка, 49 років, звернулася зі скаргами на кров'яні виділення зі статевих шляхів після статевих зносин. В анамнезі вагітності 4: пологів-2, аборти-2. Другі пологи ускладнилися розривами шийки матки. Останній раз була у гінеколога 6 років тому. Гінекологічний статус – вульва розвинена правильно. В дзеркалах: стінки піхви чисті. Шийка у вигляді “кольорової капусти”, кровоточить при дотику. При дворучному дослідженні тіло матки і придатки без особливостей, інфільтратів і пухлинних утворень у малому тазі немає. Оцініть ситуацію.

A. Ендоцервіцит

B. Ендометрит

C. Рак матки

D. Рак піхви

E. Рак шийки матки

1351. Дівчинка 12 років звернулася до фельдшера ФАП у зі скаргами на біль у ділянці промежини, кровотечу зі статевих шляхів. Із анамнезу: 12 годин тому забилася, впавши з велосипеда. Об'єктивно: у ділянці правої малої соромітної губи наявна рана, що слабо кровоточить, пальпаторно до 3 мм завглибшки і 2 см завдовжки. Встановіть діагноз.

A. Дисфункційна маткова кровотеча

B. Метроендометрит

C. Передчасне статеве дозрівання

D. Травма зовнішніх статевих органів

E. Позаматкова вагітність

1352. Фельдшера ШМД викликали до чоловіка, у якого блювання “кавовою гущею”, загальна слабкість, шум у вухах, запаморочення, тахікардія, зниження АТ. Який препарат необхідно ввести першочергово?

A. Преднізолон

B. Дицинон

C. Лазікс

D. Но-шпа

E. Анальгін

1353. До фельдшера звернувся чоловік, який скаржиться на нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, який виник після їзди на велосипеді. Об'єктивно: склери жовтяничні. Живіт болючий у правому підребер'ї, позитивний симптом Ортнера. Найімовірніший попередній діагноз?

- A. Цироз печінки
- B. Хронічний гастрит
- C. Виразкова хвороба
- D. Жовчокам'яна хвороба**
- E. Хронічний гепатит

1354. Фельдшера викликали до чоловіка 47 років, який скаржиться на нападоподібний біль у лівій поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи. Пацієнт постійно змінює положення тіла, але полегшення не відчуває. Найімовірніший попередній діагноз?

- A. Лівобічна ниркова колька**
- B. Гострий гломерулонефрит
- C. Виразкова хвороба
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий пієлонефрит

1355. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 45 років зі скаргами на різке здуття живота, нестійкий стул, нудоту, яка з'являється після вживання жирної та солодкої їжі. Хворіє близько року. Багато курить, зловживає спиртними напоями. Об-но: шкіра жовтяничного забарвлення; наявність телеангіектазій, гіперемія долонь, асцит. Пальпаторно печінка збільшена, щільна, край загострений. Про яку найбільш вірогідну патологію йдеться мова?

- A. Цироз печінки**
- B. Виразкова хвороба шлунку
- C. Рак шлунку
- D. Хронічний гастрит
- E. Хронічний холецистит

1356. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт 38 років зі скаргами на біль в поперековій ділянці, часте, болісне сечовипускання, сеча каламутна, $t^{\circ} - 37,6^{\circ}\text{C}$. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Ваш попередній діагноз?

- A. Гострий гломерулонефрит
- B. Нирковокам'яна хвороба
- C. Хронічний гломерулонефрит
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Хронічний пієлонефрит**

1357. Пацієнтка 24 років, яка хворіє на хронічний гастрит типу "А", скаржиться на слабкість, запаморочення, задишку, серцебиття, ламкість нігтів і випадіння волосся, порушення смаку: їсть крейду. Шкіра бліда, суха. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Пульс – 102 за хв. АТ – 90/65 мм рт. ст. Анамнез крові: Ер – 2,71012 л., Нв – 80 ч/л, К.п. – 0,7, ШОЕ – 18 мм/год, анізоцитоз, пойкилоцитоз. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

- A. Гіпопластична анемія
- B. Залізодефіцитна анемія**
- C. В₁ фолієводефіцитна анемія
- D. Загострення хронічного гастриту
- E. Гемолітична анемія

1358. Чоловік 25 років протягом 2-3 років скаржиться на посилення головних болів, мерзлякуватість, апатію, збільшення ваги, закрепи. Хворий адинамічний, шкіра бліда, суха,

холодна, волосся рідке. Щитоподібна залоза не збільшена. Тони серця глухі, АТ 90/60 мм рт. ст., пульс – 55 за хв., температура тіла - 35,8°C. Визначте попередній діагноз?

- A. Первинний альдостеронізм
- B. Хвороба Іценка-Кушинга
- C. Акромегалія
- D. Гіпертиреоз
- E. Гіпотиреоз

1359. Хворий 35 років скаржиться на слабкість, сухість у роті, часте сечовипускання вночі, свербіння шкіри, погіршення зору. Захворювання нирок спостерігається протягом 20 років. Шкіра сіро-бліда, язик сухий обкладений бурим нальотом, відчувається запах аміаку із рота. Тони серця глухі, акцент II тону на аорті, пульс 92/хв., АТ 180/90 мм. рт. ст. Живіт м'який, болючий при пальпації вздовж товстої кишки та навколо пупка. Яке дослідження сечі необхідно призначити для визначення порушення концентраційної функції нирок?

- A. Проба за Нечипоренком
- B. Загальний аналіз сечі
- C. Проба Аддіса-Каковського
- D. Проба Амбурже
- E. Проба за Зимницьким

1360. Вас викликали до пацієнта, який вдарився головою, був непритомний 5 хвилин, скарги на сильний головний біль, неодноразове блювання. На МРТ-патології не виявлено. Поставте попередній діагноз.

- A. Струс головного мозку
- B. Здавлення головного мозку
- C. Енцефаліт
- D. Менінгіт
- E. Забій головного мозку

1361. У хворого на ГРВІ на 4 добу стан погіршився, температура підвищилась до 38°C, з'явилася задишка, досі сухий кашель став вологий з серозно – гнійним харкотинням. В легенях притуплення перкуторного звуку. Яке ускладнення слід запідозрити?

- A. Ексудативний плеврит
- B. Сухий плеврит
- C. Гострий бронхіт
- D. Вірусна пневмонія
- E. Бактеріальна пневмонія

1362. Хворий 43 років скаржиться на головний біль, що виникає періодично протягом 2-х місяців, головним чином під ранок і супроводжується блюванням. Напади головного болю виникають також під час фізичного навантаження, залежить від положення голови. Для якого захворювання це характерно?

- A. Пухлина головного мозку
- B. Невралгія трійчастого нерва
- C. Гіпертонічна хвороба
- D. Ішемічний інсульт
- E. Гострий менінгіт

1363. Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний,

періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта:

- A. У положенні сидючи
- B. У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову хворого на бік
- C. У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами
- D. У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого на бік**
- E. У горизонтальному положенні лежачи на животі

1364. Хвора 40 років звернулася до фельдшера ФАПУ зі скаргами на різке почервоніння, закидання правого ока, що з'явилося сьогодні вранці після сну. Об'єктивно: слизова оболонка повік та очного яблука різко гіперемійована, набрякла, багато гнійного виділення. Поставте діагноз.

- A. Міопія середнього ступеню
- B. Гострий кон'юнктивіт правого ока**
- C. Хронічний дакриоцистит
- D. Гострий приступ глаукоми
- E. Герпетичний деревовидний кератит

1365. Чоловік випадково випив 100 мл метилового спирту. Через 2 години відчув нудоту, головний біль, блимання в очах, наростаючу спрагу. Було блювання. Слизові оболонки гіперемійовані, з ціанотичним відтінком, зіниці розширені. Який антидот Ви застосуєте?

- A. Вікасол
- B. Атропіну сульфат
- C. Унітіол
- D. Етиловий спирт**
- E. Магнію оксид

1366. Для очисної клізми фельдшер ФАПУ найчастіше використовує воду, оптимальна температура якої:

- A. 10 – 12[°]C
- B. 16 – 18[°]C
- C. 24 – 26[°]C
- D. 28 – 32[°]C**
- E. 20 – 22[°]C

1367. Пацієнт 36 років, після внутрішньовенного введення ліків скаржиться на біль, гіперемію і наявність ущільнення по ходу вени. Назвіть ускладнення, яке виникло у пацієнта:

- A. Повітряна емболія
- B. Сепсис
- C. Гематома
- D. Некроз
- E. Флебіт**

1368. У дитини 2 років з гіпертермічним синдромом, спостерігається блідість шкірних покривів, озноб, холодні на дотик кінцівки. Що слід застосувати для поліпшення мікроциркуляції судин?

- A. Холод на проекцію великих судин
- B. Парацетамол всередину
- C. Оцтові обгортання
- D. Анальгін 50% внутрішньом'язово

Е. Папаверин 2% внутрішньом'язево

1369. Пацієнт 20 років годину тому відчув "кинджальний" біль в животі, було одноразове блювання. При огляді положення вимушене, блідий, живіт напружений, дошкоподібний, температура тіла підвищується. Що з пацієнтом?

- А. Шлунково-кишкова кровотеча
- В. Гострий живіт (перитоніт)

С. Перфорація виразки

- Д. Гострий гастрит
- Е. Загострення виразкової хвороби

1370. Під час внутрішньом'язового введення ампіциліну у дитини, 10-ти років, з'явилися відчуття жару, нудота, блідість шкіри. Артеріальний тиск 75/40 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз.

- А. Гостра серцева недостатність

В. Анафілактичний шок

- С. Кропив'янка
- Д. набряк Квінке
- Е. Гостра судинна недостатність

1371. У дитини 4,5 років підвищення температури тіла до 39°C, порушення загального стану, відмова від їжі, неспокій. На шкірі волосистої частини голови, обличчі, тулубі, кінцівках поліморфна висипка у вигляді папул, везикул, кірочок. Вкажіть етіотропний препарат для лікування при тяжкому перебігу даного захворювання.

- А. Фулорцин
- В. "Феністил"
- С. Діамантовий зелений
- Д. Цефтриаксон

Е. Ацикловір

1372. У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:

- А. ревматизмі
- В. вегето-судинній дистонії

С. природженій ваді серця

- Д. малій хорей
- Е. інфекційному міокардиті

1373. Фельдшер ФАПУ оглядає дитину з метою оцінки нервово-психічного розвитку. Дитина стежить і повертає голову за рухами яскравого предмету, у напрямку звука, добре утримує голову у вертикальному положенні. Якому віку відповідають дані показники?

- А. 9 міс

В. 3 міс

- С. 6 міс
- Д. 1 рік
- Е. 1 міс

1374. Мати дитини 6 місяців скаржиться фельдшеру ФАПУ, що дитина неспокійна, погано

спить, пітніє. При об'єктивному обстеженні: виражені лобні та тім'яні горби, велике тім'ячко 3-4см, краї його потовщені. На ребрах «чотки», виражена м'язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про що свідчать дані симптоми?

A. Гіпотрофія

B. Ексудативно – катаральний діатез

C. Рахіт

D. Диспепсія

E. Гіпокальціємічний синдром

1375. Фельдшер прибув на виклик до дитини 2 років, яка хворіє третій день, має хрипкий голос, «гавкаючий» кашель. Вночі з'явилася задишка, шкіра ціанотична, в акті дихання приймає участь допоміжна мускулатура. Якому невідкладному стану відповідають ці симптоми?

A. Напад бронхіальної астми

B. Ларингоспазм

C. Стенозуючий ларинготрахеїт

D. Стороннє тіло в дихальних шляхах

E. Ларингіт

1376. Дівчинка 10 років звернулася до фельдшера з приводу ниючого болю у правому підребер'ї, поганого апетиту, нудоти, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, періодичне блювання. Біль посилюється після вживання жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. Під час пальпації живота печінка виступає з-під ребрової дуги на 2,5 см, щільна і болісна при пальпації. Позитивні симптоми Ортнера, Кера справа в підребер'ї. Вкажіть найвірогідніший діагноз:

A. Глистна інвазія

B. Холецистохолангіт

C. Хронічний гастрит

D. Гострий панкреатит

E. Виразкова хвороба

1377. До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на тупий біль в правій здухвинній ділянці, підвищення температури тіла до 37,2°C, нудоту. Які першочергові дії фельдшера?

A. Негайно викликати чергового хірурга

B. Ввести кровоспинні засоби

C. Промивання шлунку

D. Холод на живіт

E. Ввести знеболюючі

1378. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий, який розповів, що 7 діб тому він наступив на цвях. До лікаря не звертався, рану обробив йодом. В даний час його турбують тягнучі болі в рані, сіпання м'язів навколо рани. Що можна запідозрити у першу чергу?

A. Правець

B. Бешиха

C. Сказ

D. Облітеруючий ендартеріїт

E. Газова гангрена

1379. У жінки 25-ти років скарги на різкий гострий біль внизу живота, запаморочення. Остання

менструація 2 тижні тому, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність негативний. Для якої патології характерна така клінічна картина?

A. Апоплексія яєчника

- B. Позаматкова вагітність
- C. Хронічний аднексит
- D. Апендицит
- E. Рак яєчника

1380. У дитини 4-х років з'явились лихоманка до 39°C, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмо видна кишка палькується у вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?

- A. Ешерихіоз
- B. Сальмонельоз

C. Дизентерія

- D. Токсична диспепсія
- E. Холера

1381. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшились, стали болючими, шкіра над ними почервоніла. Яке ускладнення рани можна припустити?

A. Лімфаденіт

- B. Лімфангоїт
- C. Флегмона
- D. Правець
- E. Бешиха

1382. До фельдшера ФАПУ звернувся пацієнт зі скаргами на кашель з виділенням великої кількості харкотиння, особливо вранці. Вкажіть, яке положення слід надати пацієнту, для полегшення відходження харкотиння?

A. Дренажне

- B. Активне
- C. Пасивне
- D. Вимушене
- E. Фаулера

1383. Після виконання маніпуляції інструменти потрібно занурити у дезінфікуючий розчин, потім промити під проточною водою. Назвіть наступний етап у проведенні передстерилізаційного очищення виробів медичного призначення?

A. Занурення у миючий засіб

- B. Висушування та стерилізація в автоклаві
- C. Промивання у дистильованій воді
- D. Контроль якості передстерилізаційного очищення
- E. Стерилізація

1384. До фельдшера ФАПУ звернулась пацієнтка зі скаргами на біль у правому підребер'ї, який виник після споживання жирної їжі, нудоту та блювання. Об'єктивно: живіт болючий у правому підребер'ї, позитивний симптом Ортнера, Мерфі, Кера. Який із медикаментів необхідно ввести першочергово?

A. Баралгін

B. Вікасол

C. Дицинон

D. Алохол

E. Нітрогліцерин

1385. До фельдшера звернувся хворий 20 років зі скаргами на пігментацію шкіри, яка виникла недавно, (золотисто-коричневого кольору), потемніння волосся, відсутність апетиту, нудоту, діарею, біль у животі, схуднення. Дихання везикулярне АД- 100/70 мм рт.ст., Рс- 60/хв. Аускультативно - тони серця ослаблені. Живіт при пальпації болісний в епігастрії. Ніктурія. Зниження функції статевих залоз. Яке захворювання виникло у пацієнта?

A. Хвороба Аддісона

B. Хвороба Іценко-Кушинга

C. Подагра

D. Панкреатит

E. Ожиріння

1386. У хворого на середньо-важку форму черевного тифу на 18 день хвороби різко знизилась температура тіла, артеріальний тиск впав до 60/30 мм рт.ст., прискорився пульс до 120/хв., з'явилась різка слабкість, головокружіння. Який ще симптом буде свідчити про серйозне ускладнення?

A. Мелена

B. Закреп

C. Галюцинації

D. Апатія

E. Адинамія

1387. До фельдшера ФАПу звернувся хворий, зі скаргами на появу виразки на статевих органах. Об'єктивно: виразка, розміром 0,5 см у діаметрі з чіткими кратероподібними краями вкрита нальотом у вигляді "старого сала", не турбує хворого. Що можна запідозрити?

A. Сифіліс

B. Гонорея

C. Трихомоніаз

D. Хламідоз

E. СНІД

1388. Після визначення груп крові, резус-фактора, проведення проб на індивідуальну сумісність та біологічної проби їх результати заносять до:

A. Протоколу переливання крові

B. Листа інтенсивного нагляду

C. Температурного листка

D. Листка лікарняних призначень

E. Амбулаторної картки

1389. До фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 3-х місяців з скаргами на асиметрію шкірних складок на стегнах у дитини. Яке захворювання запідозрить фельдшер?

A. Природжений вивих стегна

B. Травматичний вивих стегна

C. Застарілий вивих стегна

- D. Звичний вивих стегна
- E. Патологічний вивих стегна

1390. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 54 років зі скаргами на біль та набряк у ділянці нижньої третини правої гомілки, судоми литкових м'язів уночі. При огляді: поверхневі вени розширені, видно зони гіперпігментації нижньої третини гомілки. Вкажіть діагноз:

- A. Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки**
- B. Флебіт поверхневих вен правої нижньої кінцівки
- C. Гостра венозна недостатність правої нижньої кінцівки
- D. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- E. Тромбоз поверхневих вен правої нижньої кінцівки

1391. Хвора 76 років, впала з висоти близько 3 м на деревину. Доставлена КШД через 6 год. після травми. Стан тяжкий. АТ- 80/60 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. При оглядовій рентгенографії виявлено вільний газ у черевній порожнині під куполам діафрагми. Діагноз: розрив порожнистого органа. Яке ускладнення розвилось у хворої?

- A. Перитоніт**
- B. Механічна кишкова непрохідність
- C. Інфаркт міокарда
- D. Перелом основи черепа
- E. Тромбоз мезентеріальних судин

1392. До фельдшера ШМД звернулася жінка 20 років зі скаргами на різкий біль внизу живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Була короточасна втрата свідомості. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 80/60 мм рт.ст., пульс - 91/хв., затримка менструації - 20 днів. Живіт різко болючий у нижніх відділах, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який пріоритетний метод діагностики даної патології?

- A. Пункція заднього склепіння**
- B. Діагностична лапароскопія
- C. Гістеросальпінгографія
- D. Кульдоскопія
- E. Біопсія шийки матки

1393. До приймального відділення доставили хворого з імовірним гострим панкреатитом. Які з нижченаведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?

- A. Аналіз сечі на цукор
- B. Аналіз крові на білірубін
- C. Аналіз крові на цукор
- D. Загальний аналіз крові
- E. Аналіз сечі на діастазу**

1394. До ФАП звернулася хвора зі скаргами на різкий переймоподібний біль внизу живота. При проведенні дворучного дослідження виявлена справа у малому тазі пухлина круглої форми з рівною поверхнею, рухлива, болюча при подразненні очеревини. Який попередній діагноз фельдшера?

- A. Перекрут ніжки кісти**
- B. Оофорит
- C. Злоякісне переродження пухлини

- D. Апоплексія яєчника
- E. Порушена позаматкова вагітність

1395. До ФАПу доставлено хворого зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому обприскував город хлорофосом. Встановлено діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидот найдоцільніше застосувати?

- A. Розчин унітіолу 5%
- B. Розчин тіосульфату 20%
- C. Антидот Стрижевського
- D. Розчин натрію гідрокарбонату 3%
- E. Розчин атропіну сульфату 0,1%

1396. Пацієнт 25-ти років з діагнозом грип перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- A. Вогнищева поточна
- B. Комбінована
- C. Механічна
- D. Вогнищева заключна
- E. Профілактична

1397. Жінка 45-ти років скаржиться на сезонний біль в епігастральній ділянці, який виникає натще, відрижку кислим, періодичне блювання на висоті болю, печію. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу захворювання?

- A. Рентгенографія шлунку
- B. Фіброгастроскопія
- C. Дослідження калу
- D. Загальний аналіз крові
- E. УЗД

1398. Жінка 27-ми років звернулася до фельдшера ФАПу за консультацією. Скарг немає. Протягом останніх 3-х років приймала протизаплідні гормональні контрацептиви. На даний час припинила їх прийом і намагається завагітніти. Менструальний цикл 34 дні, регулярний. Який день її циклу є найсприятливішим для виникнення вагітності?

- A. 20-й день
- B. 12-й день
- C. 14-й день
- D. 13-й день
- E. 24-й день

1399. До ФАП звернувся чоловік зі скаргами на тяжкість у правому підребер'ї, загальну слабкість. Три роки тому хворів на вірусний гепатит В. Об'єктивно: склери та шкіра жовтяничні. Судинні зірочки на шкірі грудної клітки. Печінка збільшена на 3 см. У крові: підвищений рівень білірубіну і трансаміназ. Найімовірніший попередній діагноз:

- A. Хронічний гепатит
- B. Жовчнокам'яна хвороба
- C. Хронічний панкреатит
- D. Дискінезія жовчного міхура
- E. Хронічний холецистит

1400. Хворий 20-ти років звернувся до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль в ділянці лівої ключиці, який з'явився після падіння на витягнуту руку. Діагностовано закритий перелом лівої ключиці без зміщення. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації:

A. Колосоподібна пов'язка

B. Спіралевидна пов'язка

C. Пов'язка Дезо

D. Восьмиподібна пов'язка

E. Зворотна пов'язка

1401. До фельдшера звернувся хворий, який скаржиться на печіння, свербіння, відчуття жару, болючість в місці дії подразника - невідомої хімічної речовини. Об'єктивно: спостерігається наявність еритеми, яка з'явилася через 20 хвилин після дії подразника. Яку хворобу можна припустити?

A. Екзема

B. Алергічний контактний дерматит

C. Простий контактний дерматит

D. Стрептостафілодермія

E. Токсикодермія

1402. Фельдшер прийшов на патронаж до 3-місячної дитини. Дитина народилася з масою 3300 г, довжиною 53 см. При визначенні маси тіла отримано результат 4500 г. Який дефіцит маси тіла?

A. 1000 г

B. 900 г

C. 600 г

D. 800 г

E. 700 г

1403. До ФАП звернувся хворий 68-ми років зі скаргами на різкий біль у правій стопі, набряк пальців та потемнішання шкіри IV пальця. На цукровий діабет хворіє протягом 15-ти років, лікується нерегулярно. Яке ускладнення цукрового діабету виникло у хворого?

A. Панарицій

B. Перелом IV пальця правої стопи

C. Гематома

D. Бешиха

E. Гангрена IV пальця правої стопи

1404. У новонародженої дитини, що народилася від патологічних пологів, в ході яких було застосовано накладання щипців, спостерігається згладження складки носогубного трикутника, опущення кута рота і звуження повікової щілини зліва. Загальний стан і акт ссання не порушені. На що вказують дані симптоми?

A. Кефалогематома

B. Пологова пухлина

C. Неврит трійчастого нерва

D. Парез лицьового нерва

E. Черепно-мозкова пологова травма

1405. У пологовій залі перебуває породілля, яка годину тому народила живого доношеного хлопчика вагою 3900 г. Жінка скаржиться на запаморочення, слабкість. Під час огляду:

спостерігається блідість шкірних покривів та слизових оболонок, АТ- 100/70 мм рт.ст., Рs- 96/хв., із статевих шляхів порціями виділяється кров, що утворює згустки. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- А. Атонія матки
- В. Розрив пологових шляхів
- С. Гіпотонія матки**
- Д. Гіпоплазія матки
- Е. Геморагічний шок

1406. Ви - фельдшер ФАПУ, оглядаєте 4-денну дитину після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено, що сеча дитини має жовтувато-цегляний колір, на пелюшці залишається червонуватий слід, місцями видно дрібні жовто-червоні кришталіки. Який із станів новонароджених спостерігається у дитини?

- А. Транзиторний дизбактеріоз
- В. Транзиторна гіпертермія
- С. Сечокислий інфаркт**
- Д. Токсична еритема
- Е. Статевий криз

1407. Фельдшер пункту охорони здоров'я промислового підприємства проводить бесіду з жінками. Для прикладу використав наступний випадок: у пацієнтки 32-х років при обстеженні виявлено непрохідність маткових труб. В анамнезі: 2 артифіціальні аборти. Дітей немає. У шлюбі 3 роки, вагітностей не було, статеве життя регулярне, без контрацепції. Яке з виявлених в анамнезі захворювань може бути причиною безпліддя?

- А. Ожиріння
- В. Бартолініт
- С. Хронічний аднексит**
- Д. Хронічний гепатит
- Е. Ерозія шийки матки

1408. Фельдшер прибув на виклик до дитини 7-ми років зі скаргами на слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури до 39°C, висип. В ході огляду: палаючий зів, дрібнокрапковий висип по всьому тілі, інтенсивно виражений в природніх складках та на згинальній поверхні кінцівок, блідість носогубного трикутника на тлі гіперемованої шкіри. Поставте діагноз:

- А. Краснуха
- В. Менінгококцемія
- С. Скарлатина**
- Д. Вітряна віспа
- Е. Кіп

1409. В ході профобстеження в ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

- А. Диспансерний нагляд**
- В. Санаторно-курортне лікування
- С. Фізіотерапевтичні методи лікування
- Д. Оперативне лікування
- Е. Медикаментозне лікування

1410. У пацієнтки спостерігається порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

A. Експіраторна задишка

- B. Інспіраторна задишка
- C. Дихання Куссмауля
- D. Стридорозне дихання
- E. Дихання Біота

1411. Ви - фельдшер швидкої допомоги. Вас викликали до пацієнта 21-го року, який через декілька хвилин після введення гентаміцину відчув нестачу повітря, свербіння долонь, почервоніння обличчя, запаморочення в голові. АТ знизився до 75/50 мм рт.ст., ЧД- 24/хв., Рс- 105/хв. З якого препарату Ви розпочнете невідкладну допомогу?

- A. Кордіамін
- B. Гідрокарбонат натрію
- C. Папаверин
- D. Кофеїн

E. Гідрокортизон

1412. Під час будівельних робіт на нижні кінцівки працівника впала бетонна плита. Після звільнення кінцівок з'явилися різкий набряк, біль, обмеження рухів та чутливості. Встановлено діагноз: симптом тривалого стискання. Функція яких органів страждає першочергово при даному синдромі?

A. Печінка

B. Нирки

- C. Головний мозок
- D. Легені
- E. Серце

1413. До фельдшера ФАПу доставлено жінку 36-ти років зі скаргами на блювання, нудоту, печію. Дані симптоми з'явилися після випадкового вживання оцтової кислоти. Назвіть, яку до лікарську допомогу повинен надати фельдшер:

- A. Забезпечити доступ свіжого повітря
- B. Поставити очисну клізму
- C. Промити шлунок розчином перманганату калію
- D. Дати вживати надмірну кількість рідини
- E. Промити шлунок розчином гідрокарбонату натрію**

1414. В жіночій консультації пацієнтці рекомендували обстеження. Який метод дослідження функціональної активності яєчників пацієнтка може застосувати вдома?

A. Симптом зіниці

B. Вимірювання базальної температури

- C. Визначити рівень гормонів в крові
- D. Симптом папороті
- E. Кольпоцитологію

1415. До ФАП звернувся пацієнт із загостренням хронічного холецистити. Який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю?

- A. Холодний компрес
- B. Холодну примочку

C. Грілку

D. Міхур з льодом

E. Зігрівальний компрес

1416. Ви - фельдшер пункту охорони здоров'я промислового підприємства, до вас звернувся хворий з опіком. Вкажіть та сплануйте найефективніший елемент першої медичної допомоги на місці події при обмежених опіках 1-2-го ступеня:

A. Накладання сухої асептичної пов'язки

B. Застосування масляно-бальзамічної емульсії за А.В. Вишневським

C. Охолодження протягом 8-10 хвилин під проточною водою

D. Обробка опікової поверхні вазеліновою олією

E. Накладання пов'язки з розчином антисептика

1417. До пологового будинку надійшла роділья з переймами по 20 секунд через 5-6 хв. Води не відходили, термін вагітності 38 тижнів. Серцебиття плоду - 130\хв. Через 2 години спостереження перейми стали коротші, по 10-15 секунд, паузи між ними по 8-10 хв. Серцебиття плоду - 180\хв. Яка аномалія пологової діяльності виникла в даному випадку і що необхідно зробити?

A. II період пологів. Акушерські щипці

B. Надмірна пологова діяльність. Кесарів розтин

C. Дискоординована пологова діяльність. Введення спазмолітиків

D. Первинна слабкість пологової діяльності. Стимуляція пологів

E. Вторинна слабкість пологової діяльності, дистрес плоду. Кесарів розтин

1418. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнтки 40-ка років, яку під час роботи на полі вкусила бджола. Хвора знепритомніла, різка блідість шкірних покривів, набряк губ і повік, тони серця глухі, пульс ниткоподібний, АТ- 50\20 ммрт.ст., дихання поверхневе. З чого почне невідкладну допомогу фельдшер ФАПУ?

A. Ввести коргликон

B. Ввести папаверин

C. Ввести промедол

D. Ввести адреналін

E. Ввести баралгін

1419. Фельдшер ФАПУ оглядає пацієнта, який скаржиться на біль в животі, нудоту. В ході обстеження: загальний стан тяжкий. Шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком. Страждальницький вираз обличчя. Живіт рівномірно здутий, м'язи напружені, пальпація болісна. Визначається позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

A. Гострий панкреатит

B. Неспецифічний виразковий коліт

C. Гострий апендицит

D. Гострий перитоніт

E. Хвороба Крона

1420. У дитини 13-ти років, що перебуває на амбулаторному лікуванні з діагнозом епідемічний паротит, на 8-й день захворювання виникли різкий біль в ділянці мошонки, гіперемія, набряк, піднялася температура до 39оС, яєчка збільшилися у розмірах. Встановіть діагноз:

A. Бешиха

- B. Перитоніт
- C. Цистит
- D. Пієлонефрит
- E. Орхіт**

1421. Ви працюєте фельдшером ШМД. Виклик до дитини 6-ти років. Під час прийому їжі дитина раптово закашлялася, посиніла, виникло стридорозне дихання. Після відновлення прохідності дихальних шляхів Ви негайно розпочали штучну вентиляцію легень. Якою повинна бути частота вдувань?

- A. 40 за 1 хвилину
- B. 10 за 1 хвилину
- C. 18 за 1 хвилину
- D. 20 за 1 хвилину**
- E. 30 за 1 хвилину

1422. Під час дослідження мазку піхвового вмісту на визначення ступеню його чистоти, виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слабколужна. Це характерно для такого ступеню чистоти піхви:

- A. I
- B. III**
- C. IV
- D. II
- E. -

1423. На початку II періоду пологів роділля зблідла, пульс - 105\хв., слабкого наповнення, АТ- 85\50 мм рт.ст. Під час огляду: матка в гіпертонусі, різко болюча в ділянці дна матки справа, асиметрична, серцебиття плоду глухе, аритмічне. Водипідтікають, забарвленні кров'ю. Про яку патологію йде мова?

- A. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**
- B. Емболія навколоплідними водами
- C. Крайове передлежання плаценти
- D. Загроза розриву матки
- E. Центральне передлежання плаценти

1424. Машина швидкої допомоги прибула на виклик до дитини 10-ти років, яка скаржиться на сильний біль у лівій гомілці. Захворіла гостро, 6 годин тому. Травми не було. Тиждень тому була ангіна. Під час огляду: стан дитини важкий, $t_{\text{о}}=38,9^{\circ}\text{C}$, ЧДР- 30\хв., АТ- 105\80 мм рт.ст., пульс - 120\хв., ритмічний. Ліва кінцівка зігнута у колінному суглобі, рухати нею дитина відмовляється. Шкіра без змін, біль при пальпації, при навантаженні на вісь. Ваш діагноз:

- A. Забій м'яких тканин гомілки
- B. Гострий гематогенний остеомієліт**
- C. Контрактура колінного суглоба
- D. Гострий артрит колінного суглоба
- E. Гострий бурсит колінного суглоба

1425. Фельдшер пункту охорони здоров'я щоденно проводить дезінфекцію приміщення пункту охорони здоров'я та використаного інструментарію. Як називається такий вид дезінфекції?

- A. Санітарна
- B. Вогнищева поточна

С. Вогнищева заключна

D. Камерна

E. Профілактична

1426. До ФАП звернувся чоловік 44-х років зі скаргами на кашель з виділенням невеликої кількості слизово-гнійного мокротиння, задишку під час незначного фізичного навантаження, підвищення температури тіла до 37,4°C, загальну слабкість. Хворіє близько 10-ти років. Робота пов'язана з переохолодженнями. Палить з юнацького віку по 1-й пачці цигарок на день. Грудна клітка діжкоподібної форми. Перкуторно: коробковий звук. Аускультативно: середньопухирчасті хрипи. Найімовірніший попередній діагноз:

A. Бронхоектатична хвороба

B. Бронхіальна астма

C. Хронічний обструктивний бронхіт

D. Гострий бронхіт

E. Хронічний катаральний бронхіт

1427. З місця аварії доставлено хворого зі скаргами на біль в ділянці таза, який посилюється під час рухів ногами. Хворий загальмований, на запитання відповідає односкладно. Під час пальпації болісність в проекції лонного сполучення. Спостерігається симптом прилиплої п'яти. Визначте діагноз:

A. Перелом кісток таза

B. Вивих стегна

C. Перелом стегна

D. Забій м'яких тканин

E. Перелом поперекового відділу хребта

1428. Ви - фельдшер ФАПу. До Вас звернувся хворий зі скаргами на наявність утворення, яке з'являється в правій пахвинній ділянці при фізичному навантаженні. Об'єктивно: утворення округлої форми діаметром біля 4-х см, при пальпації м'яко-еластичної консистенції. Утворення розташоване з внутрішнього боку від сіяного канатика. Який попередній діагноз?

A. Варикозне розширення вен правого стегна

B. Правостороння пахвинна грижа

C. Перелом діяфіза бедра

D. Правостороння стегнова грижа

E. Ліпома правої пахвинної ділянки

1429. Фельдшер прибув на виклик до дитини 5-ти років, яка протягом 2-х днів хворіє на ГРВІ. 2 години тому з'явився дрібноплямистий висип рожевого кольору на тлі незміненої шкіри, не схильний до злиття, розташований на розгинальних поверхнях кінцівок, спині, сідницях. Потиличні та задньошийні лімфатичні вузли збільшені до 1,0 см в діаметрі. Встановіть діагноз:

A. Скарлатина

B. Кір

C. Менінгококцемія

D. Вітряна віспа

E. Краснуха

1430. У дитини 1-го року, яка лікується з приводу рахіту на тлі задовільного самопочуття раптово виникли клоніко-тонічні судоми. З введення якого препарату слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- A. Діазепам
- B. Лазикс
- C. Сульфат магнію
- D. Глюконат кальцію

E. Сібазон

1431. З метою профілактики СНІДу фельдшер здоров'я пункту промислового підприємства керується нормативним наказом за №:

A. 288

B. 955

C. 59

D. 720

E. 38

1432. До гінекологічне відділення надійшла хвора 24-х років зі скаргами на болі внизу живота, кров'янисті виділення, то- 38,2оС. 4 дні тому було проведено штучне переривання вагітності при терміні в 7-8 тижнів. В ході бімануального обстеження матка збільшена та болюча. Поставте діагноз:

A. Пельвіоперитоніт

B. Параметрит

C. Аднексит

D. Ендометриїт

E. Кольпіт

1433. Фельдшеру пункту охорони здоров'я необхідно провести оцінювання фізичного розвитку учнів. Фельдшер визначив індекс Кетле. Як його підрахувати?

A. Ділення маси тіла в грамах на зріст у сантиметрах

B. Ділення зросту на масу тіла

C. Множення маси тіла на зріст у сантиметрах

D. Множення зросту на масу тіла

E. Сума показників зросту та маси тіла

1434. В ході огляду шийки матки за допомогою дзеркал фельдшер ФАПу звернув увагу на ціанотичність шийки матки та піхви. Ознакою чого це являється?

A. Достовірний ознака вагітності

B. Імовірний ознака вагітності

C. Ознака порушення менструального циклу

D. Сумнівний ознака вагітності

E. Ознака запального захворювання

1435. Фельдшер ФАПу оглядає пацієнта, у якого після прийому ципрофлоксацину з'явилися висип та свербіння шкіри. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тулуба та кінцівок рожевий уртикарний висип, Рс- 78\хв., АТ- 120\80 мм рт.ст. Найімовірніший діагноз:

A. Набряк Квінке

B. Поліноз

C. Анафілактичний шок

D. Кропив'янка

E. Системна склеродермія

1436. Фельдшер ФАПУ оглядає потерпілого 25-ти років який 30 хвилин тому отримав ножове поранення грудної клітки справа. При огляді стан середньої важкості, з рани виділяється піниста кров. Фельдшер припускає пневмоторакс. Який вид повязки він має застосувати?

- A. Циркулярну
- B. Колосовидну
- C. Спіралевидну
- D. Гемостатичну
- E. Оклюзійну**

1437. Хворий 36-ти років скаржиться на напади задухи з переважно утрудненим видихом, що відбуваються до 2-3 разів на день та знімаються інгаляціями в2-адреноміметиків. Хворіє протягом 10-ти років. Грудна клітка розширена, над легенями коробковий перкуторний тон. Під час аускультатії: жорстке дихання з подовженим видихом. В аналізі харкотиння багато еозинофілів, кристали Шарко-Лейдена і спіралі Куршмана. Який попередній діагноз?

- A. Спонтанний пневмоторакс
- B. Бронхіальна астма**
- C. Пневмонія
- D. Хронічний обструктивний бронхіт
- E. Серцева астма

1438. До ФАП звернулася пацієнтка зі скаргами на біль у лівому колінному суглобі, який посилюється під час ходьби, обмеження рухів. Фельдшер призначив вологий зігрівальний компрес. Вкажіть тривалість процедури:

- A. 40-60 хвилин
- B. 1-2 години
- C. 4-6 годин
- D. 2-4 години
- E. 8-10 годин**

1439. До фельдшера пункту охорони здоров'я звернувся пацієнт зі скаргами на розпиральний біль голови, шум у вухах, стискальний біль у ділянці серця, АТ- 180/110 мм рт.ст. Які медикаменти доцільно буде обрати фельдшеру для надання невідкладної допомоги?

- A. Дибазол, клофелін, лазикс**
- B. Но-шпа, анальгін, папаверин
- C. Кокарбоксілаза, анальгін, еуфілін
- D. Преднізолон, нітрогліцерин, димедрол
- E. Кальцію глюконат, АТФ, калію оротат

1440. У хворої 30-ти років 4 години тому виник біль в епігастральній ділянці, було одноразове блювання. М'язи в правій здухвинній ділянці напружені, виражені симптоми подразнення очеревини. Ваш попередній діагноз:

- A. Гострий апендицит**
- B. Гострий аднексит
- C. Гострий холецистит
- D. Печінкова колька
- E. Правостороння ниркова колька

1441. Фельдшера ФАПУ викликали до пацієнта 48-ми років з діагнозом виразкова хвороба шлунку. Вдома виникло блювання, виділилося до 2-х літрів кавової гу щі.

Випорожнення мелена, вмістом до 1 л. Об'єктивно: шкіра холодна, бліда. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 132/хв., ЧД- 24/хв., ЦВТ- 0 мм рт.ст. Вкажіть причину гіпотонії:

A. Гіповолевмічний шок

B. Гостре отруєння

C. Кардіогенний шок

D. Перфорація виразки шлунку

E. Анафілактичний шок

1442. У пологовий будинок бригадою швидкої допомоги доставлено непритомну жінку після трьох нападів судом при терміні вагітності 32 тижні. Стан тяжкий, АТ- 180/120 мм рт.ст., анурія. Серцебиття плоду глухе, 142/хв. Шийка матки відхилена дозад, щільна, канал шийки матки закритий, води не виливалися. Яка тактика ведення вагітної?

A. Розродження впродовж 48-ми годин

B. Розродження впродовж 24-х годин

C. Плродоруйнівна операція

D. Термінове розродження

E. Вичікувальна тактика

1443. Бригада ШМД прибула до навчального закладу. Студент зі страхом в очах тримався за шию. Шкіра ціанотична. Дихання свистяче, утруднене. Припущено стороннє тіло гортані. Які дії слід виконати в першу чергу?

A. Ввести знеболювальні

B. Вставити товсту голку в трахею

C. Ввести спазмолітики

D. Застосувати прийом Геймліха

E. Провести трахеостомію

1444. Під час патронажу новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природніх складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

A. Псевдофурункульоз

B. Везикулопустульоз

C. Пухирчатка новонароджених

D. Попрілості

E. Ексфоліативний дерматит Ріттера

1445. Ви - фельдшер ШМД. У дитини 2-х років гостра кишкова інфекція, яка супроводжується токсико-ексикозом II ступеню. Яку кількість рідини з розрахунку на кг маси тіла треба призначити дитині для проведення I етапу регідратаційної терапії?

A. 140-160 мл

B. 60-100 мл

C. 30-50 мл

D. 110-130 мл

E. 170-200 мл

1446. Визначте, який термін гестації вагітної є періодом ризику для розвитку природженої вади серця і судин у разі дії несприятливих чинників навколишнього середовища:

A. 38-40 тижнів вагітності

B. 2-8 тижнів вагітності

- С. 20-24 тижні вагітності
- D. 35-37 тижнів вагітності
- E. 10-12 тижнів вагітності

1447. До приймального відділення гінекологічного стаціонару бригадою швидкої допомоги доставлено жінку 28-ми років зі скаргами на різкий біль внизу живота, короточасну втрату свідомості вдома, незначні кров'яністі виділення із статевих шляхів. Затримка менструації - 7 днів. До якого додаткового методу потрібно підготувати жінку для уточнення діагнозу?

- A. Діагностичне вишкрібання
- B. Кольпоскопія
- C. Мазок на цитологію
- D. УЗД**
- E. Мазок на ступінь чистоти

1448. Хворого 72-х років госпіталізовано фельдшером швидкої допомоги зі скаргами на біль у серці, задишку. Об'єктивно: межі серця зміщені ліворуч на 1 см, тони послаблені, аритмічні. На ЕКГ інтервали R-R різної тривалості, хвилі f. Про яке порушення серцевого ритму йде мова?

- A. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- B. Екстрасистолічна аритмія
- C. Синусова аритмія
- D. Миготлива аритмія**
- E. Синусова тахікардія

1449. До проктолога в поліклініку звернувся пацієнт 72-х років зі скаргами на неприємні відчуття в ділянці прямої кишки, наявність слизу, крові в калі. Протягом останніх тижнів помітив, що кал набув стрічкової форми. Яке захворювання можна припустити?

- A. Парапроктит
- B. Рак прямої кишки**
- C. Тріщини відхідника
- D. Геморой
- E. Нориці прямої кишки

1450. В ході огляду пацієнта 47-ми років Ви встановили діагноз проривна виразка шлунку. Вкажіть характерну симптоматику болю при цій патології:

- A. Переймоподібний біль
- B. Кинджальний біль**
- C. Тупий біль
- D. Оперізувальний біль
- E. Інтенсивний біль з іррадіацією в плече і лопатку

1451. До Вас на ФАП звернулися родичі тяжкохворого з проханням оглянути його з приводу здуття живота. В ході огляду Ви зясували, що в пацієнта метеоризм. На яку відстань фельдшер введе газовивідну трубку до прямої кишки?

- A. На 45-50 см
- B. На 35-40 см
- C. На 40-45 см
- D. На 20-30 см**
- E. На 20-25 см

1452. Хлопець 20-ти років під час бійки зазнав удару в обличчя. Скаржиться на виділення крові з порожнини носа у кількості до 50 мл. Загальний стан задовільний, АТ- 120/80 мм рт.ст. Яку допомогу слід надати постраждалому?

А. Припікання трихлороцтовою кислотою

В. Передня тампонада 3% перекисом водню, холод на ніс

С. Ввести амінокапронову кислоту внутрішньомязево

Д. Перевязка привідних артеріальних судин

Е. Ввести вікасол 1 мл внутрішньомязево

1453. До ФАП звернувся пацієнт, провідник потягу, на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, підвищення температури тіла. Обличчя гіперемоване, набрякле, на перехідній складці кон'юнктиви петехії. Під ключицями, на бічних поверхнях грудної клітки рясний розеолезно-петехіальний висип. Спостерігається симптом Говорова-Годельє. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Висипний тиф

В. Грип

С. Черевний тиф

Д. Сказ

Е. Лептоспіроз

1454. Пацієнтка, 45-ти років звернулася до ФАП. Скарги на кров'янисті виділення з піхви протягом 3-х тижнів, що виникли після 1,5-місячної затримки менструації. Турбують припливи жару. Менструації з 12-ти років, встановилися за 1 рік, по 4 дні, через 28 днів, помірні, безболісні. Протягом останніх 8-ми місяців спостерігалися затримки менструацій, після чого відновилися, але стали рясними й тривалими. В ході гінекологічного дослідження: змін не виявлено. Оцініть ситуацію:

А. Анемічний синдром

В. Гіпоталамічний синдром

С. Клімактеричний синдром

Д. Геморагічний синдром

Е. Адреногенітальний синдром

1455. Хвора 23-х років звернулася на прийом до жіночої консультації зі скаргами на виділення з піхви з неприємним запахом, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. В ході гінекологічного огляду: слизова оболонка піхви гіперемована, на дотик кровоточить, виділення біло-зелені, піністі, значні. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Кандидоз

В. Хламідіоз

С. Гонорея

Д. Сифіліс

Е. Трихомоніаз

1456. Фельдшера викликали до чоловіка 26-ти років, який був у непритомному стані. З дитинства хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: дихання шумне, із запахом ацетону. Шкіра суха, холодна на дотик. Зіниці звужені. Пульс - 100/хв., ниткоподібний. Живіт здутий, черевна стінка напружена. Найімовірніший попередній діагноз:

А. Гіперглікемічна кома

В. Печінкова кома

- C. Алкогольна кома
- D. Уремична кома
- E. Гіпоглікемічна кома

1457. До фельдшера пункту охорони здоров'я металургійного підприємства звернувся працівник зі скаргами на головний біль, запаморочення, стомлюваність, солодкий присмак у роті, переймоподібні болі у животі, не пов'язані з вживанням їжі, закрепи. В ході об'єктивного обстеження: шкіра землисто-бліда, бузково-сіра смужка навколо ясен та зубів, нижній край печінки +4 см з-під краю реберної дуги, АТ- 150/100 мм рт.ст., Рс- 98/хв. Отруєння якою токсичною речовиною ви припустите у пацієнта?

- A. Алкоголем
- B. Миш'яком
- C. Свинцем
- D. Хлором
- E. Фосфором

1458. Ви - фельдшер ФАП. У дитини 10-ти років після перенесених двох нападів ревматизму, сформувалася вада серця. Протягом якого терміну необхідно проводити вторинну профілактику біциліном-5?

- A. Пожиттєво
- B. 5 років
- C. 10 років
- D. 3 роки
- E. 1 рік

1459. До фельдшера ФАП звернулася вагітна в терміні 36 тижнів, у якої з'явилися набряки на нижніх кінцівках. Об'єктивно: АТ- 160/100 мм рт.ст., виражені набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці, в сечі білок. Чим ускладнився перебіг даної вагітності?

- A. Артеріальною гіпертензією вагітних
- B. Прееклампсією легкого ступеню
- C. Прееклампсією середнього ступеню
- D. Набряками вагітних
- E. Протеїнурією вагітних

1460. Фельдшера швидкої невідкладної допомоги викликано до вагітної у якої проходять пологи вдома. Потуги через 2-3 хвилини, по 45-50 сек. В ході обстеження прийомом Піскачека голівка легко досягається на відстані 2-2,5 см від статевої щілини. Яку тактику має обрати фельдшер для подальшого ведення родів?

- A. Викликати акушерку
- B. Доставити до ФАП
- C. Закінчити роди вдома з подальшою госпіталізацією
- D. Ввести промедол, анальгін, димедрол для зупинки родів
- E. Негайно госпіталізувати до пологового відділення у власному супроводі

1461. В ході дослідження пульсу пацієнта з високою температурою тіла виявлено частоту серцевих скорочень 98/хв. Родичам пацієнта фельдшер повинен пояснити, що підвищення температури тіла на 1оС прискорює пульс на:

- A. 5-6 ударів на хвилину
- B. 8-10 ударів на хвилину

- С. 1-2 удари на хвилину
- Д. Понад 20 ударів на хвилину
- Е. 3-4 удари на хвилину

1462. Бригаду швидкої допомоги викликали до пацієнта 47-ми років, який скаржиться на інтенсивний стискальний біль в ділянці серця, загальну слабкість, запаморочення, нудоту, задишку в спокої. Стан тяжкий, блідість шкірних покривів, акроціаноз. АТ- 70/20 мм рт.ст., пульс - 110/хв., ЕКГ: ознаки гострого інфаркту міокарда. Який препарат слід використати фельдшеру для корекції АТ?

- А. Допамін**
- В. Мезатон
- С. Сульфокамфокаїн
- Д. Кофеїн
- Е. Адреналін

1463. В ході профілактичного огляду хворого на шкірі виявлено папули і бляшки вкриті сріблястими лусочками. Феномени стеаринова пляма, точкова кровотеча різко позитивні. Яке захворювання у пацієнта?

- А. Червоний плескатий лишай
- В. Червоний вовчак
- С. Сифіліс
- Д. Псоріаз**
- Е. Нейродерміт

1464. Дитину 2-х років у праву долоню вкусила комаха. На місці укусу з'явилося почервоніння, поширився набряк тканин. Температура тіла підвищилася до 38оС. Такий стан діагностують у разі:

- А. Молочного струпу
- В. Кропив'янки
- С. Набряку Квінке**
- Д. Сінної лихоманки
- Е. Анафілактичного шоку

1465. В лікарню після аварії в шахті доставлений шахтар зі скаргами на біль, наявність гематоми, порушення функції кінцівки, набряк м'яких тканин. Виберіть з переліку абсолютну ознаку перелому:

- А. Порушення функції кінцівки
- В. Наявність гематоми
- С. Набряк м'яких тканин в зоні перелому
- Д. Патологічна рухливість в зоні перелому**
- Е. Біль

1466. У 10-річної дитини після загострення тонзиліту з'явилися порушення мови, письма, ходи. До якого дослідження крові потрібно підготувати пацієнта?

- А. Вміст глюкози
- В. Вміст холестерину
- С. Вміст загального білірубіну
- Д. Вміст залишкового азоту
- Е. Ревмопроби**

1467. Доношена дитина народилася з оцінкою по шкалі Апгар 3 бали. Самостійне дихання нерегулярне, рідкі вдихи, ЧСС- 100\хв. Після народження голівки відсмоктано рідину з носа та рота. Яким має бути перший етап подальшої реанімації?

- A. Інтубація трахеї
- B. Введення натрію гідрокарбонату
- C. ШВЛ масочним способом**
- D. Непрямий масаж серця
- E. Введення адреналіну

1468. Який продукт харчування слід першочергово рекомендувати пацієнтці з діагнозом залізодефіцитної анемії?

- A. Квасоллю
- B. Банани
- C. Лимони
- D. М'ясо**
- E. Манна каша

1469. Фельдшер ФАПУ під час об'єктивного обстеження пацієнта 53-х років виявив посмикування м'язів і болючість у ділянцірани правої стопи, тризм, дисфагію, ригідність потиличних м'язів (рану отримав 3 дні тому). Зазначте попередній діагноз:

- A. Гангрена
- B. Правець**
- C. Сказ
- D. Сепсис
- E. Остеомієліт

1470. Фельдшер швидкої допомоги доставив породіллю в пологове відділення. Що необхідно зробити при кровотечі в пологах, якщо плацента відділилась, а послід не виділився?

- A. Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича
- B. Наложити шви за Лосицькій
- C. Провести ручне обстеження порожнини матки
- D. Ввести утеротонічні препарати
- E. Провести зовнішній масаж матки**

1471. Фельдшер здоров'я пункту повинен виконати гальванізацію комірцевої зони за Щербаком. Який струм використовується при класичній методиці гальванізації?

- A. Змінний
- B. Імпульсний
- C. Високочастотний
- D. Модульований
- E. Постійний**

1472. До фельдшера медичного коледжу звернувся студент 16-ти років зі скаргами на біль в колінних суглобах, їх припухлість, температура - 38,8оС. Такий стан після перенесеної ангіни 2 тижня тому. Об'єктивно: шкіра бліда, зниженого харчування, рухи в колінних суглобах різко болісні. Тони серця приглушені, м'який систолічний шум над верхівкою. АТ- 100\60 мм рт.ст., Рс- 90\хв. Зів гіперемований, мигдалики пухкі з гнійними пробками. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гострий міокардит

- В. Ревматоїдний артрит
- С. Інфекційно-алергійний поліартрит
- Д. Гострий інфекційний ендокардит

Е. Гостра ревматична лихоманка

1473. На профілактичному огляді фельдшер виявив у жінки 23-х років на шийці матки оксамитового вигляду виразку. Діагноз:ерозія. Який метод інструментального обстеження треба використати для підтвердження діагнозу?

- А. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- В. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
- С. Зондування порожнини матки
- Д. УЗД

Е. Кольпоскопія

1474. Потерпілий внаслідок ДТП збуджений, голосно кричить, реально не оцінює свій стан. При огляді виявлено рану середньої третини правої гомілки, в глибині якої видно уламки кісток. Значна артеріальна кровотеча. Що потрібно виконати в першу чергу при наданні першої допомоги потерпілому?

- А. Рентгенологічне обстеження
- В. Боротьба з шоком

С. Тимчасове спинення кровотечі

- Д. Асептична пов'язка
- Е. Транспортна іммобілізація

1475. У хворого діагностували відкритий пневмоторакс. Що потрібно зробити в першу чергу для покращення його стану?

- А. Накласти спіральну пов'язку
- В. Накласти пов'язку Дезо
- С. Ввести дихальні аналептики
- Д. Накласти хрестоподібну пов'язку

Е. Накласти оклюзійну пов'язку

1476. Хлопчику 4-х років з відставанням у фізичному розвитку та залізодефіцитною анемією з рівнем гемоглобіну 90 г/л призначено комплексне лікування препаратами заліза . Протягом якого періоду фельдшер ФАПу буде спостерігати залікуванням дитини?

- А. 2 місяці
- В. До нормалізації рівня гемоглобіну

С. 6 місяців

- Д. 2 роки
- Е. 1 рік

1477. Хвора 58-ми років скаржиться на спрагу, сухість у роті, збільшення виділення сечі, слабкість. Хворіє близько року. За останній час значно схудла. Об'єктивно: шкіра суха, на щоках, підборідді рум'янець, нігті ламкі. Тони серця приглушені, Ps- 76\хв., АТ- 140\85 мм рт.ст. Яке обстеження слід призначити першочергово для встановлення діагнозу?

А. Аналіз крові на холестерин

В. Аналіз крові на глюкозу

- С. Загальний аналіз крові
- Д. Загальний аналіз сечі

1478. Фельдшер ШМД прибув на виклик. Пацієнтка пред'являє скарги на біль у правому підребер'ї, багаторазове блювання без полегшення, підвищення температури до 39оС. При обстеженні: живіт болісний в правому підребер'ї, де визначається локальне напруження м'язів, пальпується овальне щільне утворення. Клінічні ознаки є характерними для такого захворювання:

- А. Хвороба Крона
- В. Неспецифічний виразковий коліт
- С. Гострий панкреатит
- Д. Гострий апендицит
- Е. Гострий холецистит**

1479. У вагітної при зовнішньому акушерському дослідженні дно матки визначається на рівні мечоподібного відростку, у правій бічній стороні матки - гладенька, широка частина плода, у лівій - дрібні частини. Передлегла частина крупна, щільна. Серцебиття плода прослуховується справа нижче пупка. Визначте положення і позицію плода:

- А. Поперечне положення, друга позиція
- В. Поздовжнє положення, друга позиція**
- С. Поперечне положення, перша позиція
- Д. Косе положення, перша позиція
- Е. Поздовжнє положення, перша позиція

1480. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства звернувся робітник 30-ти років, який протягом останніх 10-ти років страждає на виразкову хворобу шлунка. Скаржиться на слабкість, запаморочення. Спостерігалось одноразове блювання "кавовою гущею". Об'єктивно: блідість шкіри, живіт м'який, безболісний. Який попередній діагноз?

- А. Виразкова хвороба шлунка
- В. Атрофічний гастрит
- С. Рак шлунка
- Д. Шлунково-кишкова кровотеча**
- Е. Синдром Мелорі-Вейса

1481. Фельдшер ФАПу оглядає пацієнта, який пред'являє скарги на біль в животі, нудоту. При обстеженні: загальний стан важкий. Шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком. Страждальницький вираз обличчя. Живіт рівномірно роздутий, м'язи напружені, пальпація болісна. Визначається позитивний симптом Блюмберга-Щоткіна. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

- А. Гострий перитоніт**
- В. Неспецифічний виразковий коліт
- С. Гострий апендицит
- Д. Гострий панкреатит
- Е. Хвороба Крона

1482. До фельдшеру ФАПу звернулася пацієнтка 60-ти років, у якої два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилась виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт**

- В. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- С. Первинний сифіліс
- Д. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- Е. Злоякісне новоутворення молочної залози**

1483. Пацієнту з гострою серцевою недостатністю проведено кровопускання. З метою попередження якого ускладнення фельдшер повинен слідкувати за дотриманням суворого ліжкового режиму та здійснювати контроль за пульсом та артеріальним тиском?

- А. Непритомність
- В. Напад ядухи
- С. Ортостатичний колапс**
- Д. Тромбоемболія
- Е. Шок

1484. Мама викликала фельдшера ФАПУ до дитини 7-ми років у якої в анамнезі вірусний міокардит. Дитина скаржиться на серцебиття, виражену слабкість, утруднене дихання. Фельдшер виявив ознаки гострої лівошлуночкової недостатності. В якому положенні потрібно госпіталізувати дитину до лікарні?

- А. На лівому боці
- В. На правому боці
- С. З опущеним головним кінцем
- Д. Напівсидячи**
- Е. Лежачи на щиті

1485. В лікарню звернувся хворий зі скаргами на біль в ділянці промежини та відхідного каналу, лихоманку. Біль посилюється при рухах та дефекації. Об'єктивно: справа на 3 см від ануса овальної форми червоне випинання, різко болісне, з розм'якшенням в центрі. Який із лікувальних заходів є найбільш ефективним в даному випадку?

- А. Компреси з розчином димексиду та інших медпрепаратів
- В. Розтин та дренування гнояка**
- С. Масивна антибактеріальна терапія
- Д. Дезитоксикаційна терапія
- Е. УВЧ

1486. Чоловік 35-ти років в бійці отримав удар по голові, знепритомнів. На час прибуття фельдшера швидкої допомоги постраждалий непритомний, в ділянці скроневої кістки забита рана 4х5 см, сильно кровоточить; кровотеча та лімфорей з вух та носа. Який стан визначить фельдшер в діагнозі?

- А. Забій головного мозку
- В. Забита рана м'яких тканин голови
- С. Перелом кісток склепіння черепа
- Д. Перелом основи черепа**
- Е. Струс головного мозку

1487. До фельдшера ФАПУ звернувся хворий 53-х років зі скаргами на оніміння, парестезії кінцівок, незначне похитування при ходьбі, печіння у кінчику язика, слабкість, адинамію. Вісім років тому - субтотальна резекція шлунка. Об'єктивно: шкіра бліда із жовтяничним відтінком. Язик яскраво-червоний, "лакований", зниження чутливості кінцівок. У крові: ер.- $2,6 \cdot 10^{12}/л$, Нb- 72 г/л, Кp- 1,3, тільки Жолі. Який попередній діагноз?

- A. Гемолітична анемія
- B. Залізодефіцитна анемія
- C. B12-дефіцитна анемія**
- D. Гіпопластична анемія
- E. Хронічний лімфолейкоз

1488. Хвора 36-ти років звернулася зі скаргою на загальну слабкість, швидку стомлюваність, сухість шкіри, набряки обличчя, закрепи. Місяць тому перенесла стумектомію з приводу тиреотоксикозу. Шкіра бліда, суха. Рс- 58\хв., слабого наповнення, АТ- 90\55 мм рт.ст. Діяльність серця ритмічна, тони приглушені. Живіт м'який, безболісний під час пальпації. Діурез 1,2 л за добу. Виберіть препарат для патогенетичного лікування хворої:

- A. Гіпотіазид
- B. Ловастатин
- C. Йодид калію
- D. Мерказоліл
- E. L-тироксин**

1489. У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник напад апное, але ціаноз і брадикардія не спостерігаються. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?

- A. Негайно розпочати ШВЛ
- B. Розпочати зігрівання
- C. Тактильна стимуляція вздовж спини**
- D. Перевірити рівень глюкози в крові
- E. Постійно підтримувати правильне положення

1490. Хвора 48-ми років звернулася до фельдшера здоров'я із скаргами на сильний головний біль у потиличній ділянці, який виник 2 години тому після стресової ситуації, запаморочення, нудоти, біль у ділянці серця. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, межі серця розширені вліво на 1 см. Тони серця ритмічні, акцент II тону над аортою. АТ- 190\100 мм рт.ст., пульс напружений, ритмічний. Який стан виник у хворої?

- A. Гостра лівошлуночкова недостатність
- B. Гіпертонічна хвороба, неускладнений гіпертензивний криз**
- C. Стабільна стенокардія напруження
- D. Гіпертонічна хвороба, ускладнений гіпертензивний криз
- E. Інфаркт міокарда

1491. У хворого відкритий перелом плеча, із рани пульсуючим струменем витікає кров яскраво-червоного кольору. З чого слід розпочати невідкладну допомогу?

- A. Введення серцево-судинних засобів
- B. Накладання джгута**
- C. Введення кровоспинних засобів
- D. Проведення транспортної іммобілізації
- E. Накладання стискаючої пов'язки

1492. До першовагітної у терміні 38 тижнів був викликаний фельдшер ФАП. Об'єктивно: перейми через 10 хвилин по 30-35 секунд, що розпочалися 3 години тому. Положення плода поздовжнє, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплідні води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?

- A. Третій
- B. Другий
- C. Загроза передчасних пологів
- D. Передвісники пологів

E. Перший

1493. У дитини 3-х років висока температура (39°C), кашель, нежить, слезотеча, з'явилася плямисто-папульозний висип на обличчі, дитина неспокійна. Яку невідкладну допомогу має надати фельдшер ШМД?

A. Ввести 10% розчин кальцію глюконату

B. Ввести 50% розчин анальгін

C. Ввести 2,5% розчин аміназину

D. Поставити гірчичники

E. Ввести 2.0% розчин еуфіліну

1494. В нормі добова кількість сечі у здорової людини становить:

A. 1000-1200 мл

B. 1500-2000 мл

C. 2500-3000 мл

D. 2000-2500 мл

E. 500-1000 мл

1495. При профобстеженні на ФАПі у жінки 40-ка років була виявлена безсимптомна фіброміома матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?

A. Медикаментозне лікування

B. Фізіотерапевтичні методи лікування

C. Санаторно-курортне лікування

D. Диспансерний нагляд

E. Оперативне лікування

1496. Роділля в I періоді пологів. Виникла загроза розриву матки. Вказати першочергові заходи невідкладної долікарської допомоги:

A. Зняти пологову діяльність

B. З'ясувати причини загрози

C. Провести піхве дослідження

D. Стимулювати пологову діяльність

E. Ввести спазмолітики

1497. До фельдшера ФАПу звернувся хлопчик 12-ти років, який скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. В загальному аналізі крові бластні клітини. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Геморагічний васкуліт

B. Системний червоний вівчак

C. Гострий лейкоз

D. Ревматоїдний артрит

E. Туберкульоз

1498. У дитини 12-ти діб почервоніння шкіри та поодинокі ерозії поверхневого шару шкіри в пахових складках. Про яке захворювання може подумати фельдшер?

- A. Пітниця
- B. Везикулопустульоз
- C. Вітряна віспа
- D. Попрілості II ступеня**
- E. Попрілості I ступеня

1499. До фельдшера ФАПу звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для діагностики цієї патології?

- A. Комп'ютерна томографія
- B. Рентгенологічне дослідження
- C. Біопсія**
- D. Пальпація
- E. УЗД

1500. Оглядаючи жінку з терміном вагітності 26 тижнів, фельдшер ФАПу діагностував початок передчасних пологів. З метою профілактики дистрес-синдрому він введе:

- A. Сублінгвально ніфедипін
- B. Окситоцин 5 ОД та 500 мл 0,9% натрію хлориду
- C. Внутрішньовенно гініпрал
- D. Внутрішньом'язово дексаметазон 24 мг
- E. Внутрішньом'язово дексаметазон 6 мг**

1501. Після проведення туберкулінодіагностики дитині п'яти років фельдшером ФАПу була виявлена вперше позитивна реакція Манту, без клінічних ознак. Якому стану це відповідає?

- A. Віраж туберкулінових проб**
- B. Вроджена вада серця
- C. Ревматична хвороба
- D. Пневмонія
- E. Бронхіальна астма

1502. До фельдшера здоров'я звернувся робітник, який наколов стопу цвяхом. На підошві рана 0,2x0,3 см. Щеплення проти правця проведено 2 роки тому. Який препарат для вакцинації повинен першочергово підготувати фельдшер?

- A. Щеплення не потрібне
- B. ПА 1,0 мл
- C. ППС 3000 МО
- D. ППС 3000 МО та ПА 1,0 мл
- E. ПА 0,5 мл**

1503. Фельдшер прибув на виклик до дитини 6-ти років, хворої на бронхіт. Раптово вночі погіршився стан дитини, з'явилася задишка з довгим свистячим видихом. При огляді: шкіра бліда з ціанотичним відтінком, напруження шийних м'язів, переляк в очах, грудна клітка бочкоподібна. Для якого стану характерні такі симптоми?

- A. Астматичний**
- B. Ларингоспазм
- C. Судомний
- D. Коматозний
- E. Гіпертермічний

1504. Фельдшер здоров'я пункту проводить бесіду серед робітниць цукрового заводу. Як слід відповісти на запитання: в якому віці починається клімактеричний період?

- A. 52-55 років
- B. 60-65 років
- C. 65-70 років
- D. 40-45 років
- E. 45-50 років**

1505. Працівник лабораторії випадково пролив на кисть 30% сірчану кислоту. Що в першу чергу повинен виконати фельдшер здоров'я пункту?

- A. Обробити антидотом
- B. Ввести анальгетики
- C. Накласти асептичну пов'язку
- D. Промити проточною водою**
- E. Накласти мазеву пов'язку

1506. Чоловіка 76-ти років протягом року турбує часте, особливо вночі, сечовипускання, безболісне, іноді утруднене. Вранців день звернення до фельдшера ФАПУ не зміг помочитися. При огляді над лоном кулеподібне безболісне утворення, перкуторно дає тупий звук. Яка тактика фельдшера?

- A. Введення спазмолітиків, виклик швидкої допомоги
- B. Застосування грілки, тактика очікування
- C. Катетеризація сечового міхура, спостереження
- D. Пункція сечового міхура, призначення антибіотиків
- E. Катетеризація сечового міхура, направлення до уролога**

1507. Фельдшер прибув до дитини 12-ти років, у якої після ін'єкції інсуліну почалися судоми. Об'єктивно: дитина непритомна, шкіра бліда, волога, спостерігається ригідність м'язів. Підберіть препарат для надання допомоги:

- A. Сибазон**
- B. Інсулін
- C. Еуфілін
- D. Ефедрин
- E. Кофеїн

1508. Якого основного принципу слід дотримуватися фельдшеру ФАПУ в профілактиці інфікування себе СНІДом та вірусним гепатитом?

- A. Мікротравми шкіри на руках закривати лейкопластирем
- B. Обробляти руки антисептиком
- C. Усі маніпуляції проводити в масці
- D. Усі маніпуляції проводити в гумових рукавичках**
- E. Ретельно мити руки з милом

1509. У постраждалого 42-х років виявлено поранення черепа вибуханням головного мозку. Волосся навколо поранення обстрижене, шкіра оброблена йодонатом, на вибухання накладена стерильна серветка з ізотонічним розчином натрію хлориду. Що необхідно покласти навколо вибухання, щоб не відбулося здавлення головного мозку?

- A. Стерильний ватно-марлевий тампон
- B. Шину Крамера

- С. Шину Бакшеева
- Д. Шину Еланського

Е. Ватно-марлевий бублик

1510. Хворий скаржиться на оперізуючий біль у животі після вживання смаженої їжі та алкоголю, нудоту, метеоризм, пронос. Симптоми спостерігаються протягом року, пов'язані з порушенням дієти. Фельдшер має запідозрити у хворого:

- А. Хронічний гепатит
- В. Хронічний холецистит
- С. Цироз печінки

Д. Хронічний панкреатит

- Е. Хронічний гастрит

1511. При огляді шийки матки за допомогою дзеркал фельдшер ФАПу звернув увагу на ціанотичність шийки матки та піхви. Ознакою чого це являється?

- А. Ознака порушення менструального циклу
- В. Ознака запального захворювання
- С. Вірогідна ознака вагітності
- Д. Сумнівна ознака вагітності

Е. Імовірна ознака вагітності

1512. Фельдшера ФАПу викликаний до дитини 1-го року, яка хворіє на парагрип. Вночі стан дитини погіршився: з'явились задишка, шумне дихання з участю допоміжної мускулатури у акті дихання, "гавкаючий" кашель, охриплий голос. Чим ускладнився парагрип?

- А. Вогнищева пневмонія
- В. Напад бронхіальної астми
- С. Серцева недостатність
- Д. Ларингоспазм

Е. Стенозуючим ларинготрахеїт

1513. Пацієнтка доставлена до фельдшера ФАПУ зі скаргами на висипання на шкірі, яке з'явилося 2 дні тому після вживання цитрусових. Висипання місцями зливається, супроводжується свербінням та підвищенням температури тіла до 37,6°C. Яке захворювання можна запідозрити у пацієнтки?

А. Гостра кропив'янка

- В. Токсикодермія
- С. Синдром Лайєла
- Д. Алергічний дерматит
- Е. Рожевий лишай

1514. У жінки 28-ми років через два дні після переохолодження з'явилося часте і болісне сечовипускання (через кожні 30-40 хв.), кров у сечі наприкінці сечовипускання. Об'єктивно: при пальпації болючість в надлонній ділянці. Температура тіла 37°C. Найімовірніший попередній діагноз?

А. Гострий цистит

- В. Гострий гломерулонефрит
- С. Нецукровий діабет
- Д. Ниркова колька
- Е. Гострий пієлонефрит

1515. Пацієнтка 22-х років звернулася до фельдшера здоров'я з приводу попередження небажаної вагітності. Жінка в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено. Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати даній пацієнтці?

- A. Бар'єрний
- B. Посткоїтальний
- C. Гормональний
- D. Хірургічний
- E. Внутрішньоматковий**

1516. Пацієнт 25-ти років, із діагнозом грип, перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Для попередження інфікування членів родини необхідно провести дезінфекцію. Який вид дезінфекції доцільно провести у даній ситуації?

- A. Профілактична
- B. Механічна
- C. Комбінована
- D. Вогнищева заключна
- E. Вогнищева поточна**

1517. Фельдшера ШМД викликали вночі до чоловіка, в якого раптово з'явилась ядуха з утрудненим вдихом, кашель із виділенням рожевого пінистого харкотиння. Пацієнт у положенні ортопное. Дихання шумне. Рс- 100\хв., ритмічний, слабкого наповнення. Над легеньми - вологі дрібнопухирчасті хрипи. Виберіть препарат, який необхідно застосувати?

- A. Фероплект
- B. Панангін
- C. Метопролол
- D. Лазикс**
- E. Ессенціале

1518. Хворий 52-х років скаржиться на виражений постійний біль за грудниною, що іррадіює в ліву руку, під ліву лопатку, плече. Хворий збуджений, переляканий, стогне. Біль виник 2 години тому на роботі після нервового перенапруження. Неодноразове вживання нітрогліцерину біль не зняло. Яке захворювання можна запідозрити у хворого?

- A. Ревматизм
- B. Гіпертонічна хвороба
- C. Інфаркт міокарда**
- D. Стенокардія
- E. Серцева астма

1519. Жінка 25-ти років на 8-му добу після пологів звернулася до фельдшера зі скаргами на біль в лівій молочній залозі, підвищення температури. При огляді залоза гіперемована, в верхньо-зовнішньому квадранті пальпується інфільтрат. Що запідозрила акушерка?

- A. Мастопатія
- B. Лактаційний мастит**
- C. Аденома молочної залози
- D. Бешиха
- E. Рак молочної залози

1520. У третьому періоді пологів пройшло більше 30-ти хвилин, Ознаки відшарування плаценти позитивні. Зовнішні прийоми видалення посліду неефективні. Яка повинна бути подальша

тактика?

- A. Очікування самостійного видалення посліду
- B. Застосувати препарати які збільшують скорочувальну діяльність матки
- C. Ввести окситоцин

D. Ручне видалення посліду під знеболюванням

- E. Повторно застосувати зовнішні прийоми видалення посліду

1521. До фельдшера здоровпункту промислового підприємства (наявність проф. шкідливості) звернулася жінка з питанням про терміни проходження профогляду. Яка частота профогляду в даному випадку?

- A. 1 раз на рік
- B. Через 3 місяці
- C. 2 рази на рік**
- D. Через місяць
- E. 1 раз на 2 роки

1522. Бригада ШМД Ви надає допомогу на місці автотранспортної аварії. У потерпілої 42-х років ліва гомілка у верхній третині деформована, визначається патологічна рухливість кісток. Який засіб слід використати для іммобілізації кінцівки?

- A. Шина Белера
- B. Шина Крамера**
- C. Апарат Ілізарова
- D. Шина Єланського
- E. Апарат Єдинака

1523. Пацієнта укусила бджола. Скарги на ядуху, нудоту. Об'єктивно: обличчя набрякле, шкіра блідо-ціанотична, дихання утруднене, охриплість голосу, надсадний кашель. Рс- 88\хв., АТ- 125\80 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

- A. Анафілактичний шок
- B. Кропив'янка
- C. Сироваткова хвороба
- D. Серцева астма
- E. Набряк Квінке**

1524. Мати звернулась до фельдшера з дитиною 4-х років зі скаргами на поганий апетит, неспокійний сон, періодичні болі вживоті навколо пупка. Ранком спостерігається нудота, блювання, запаморочення. Дитина схудла. Тиждень тому на шкірі була висипка. Визначте попередній діагноз:

- A. Гострий панкреатит
- B. Гострий гастроентерит
- C. Аскаридоз**
- D. Дуоденіт
- E. Ентеробіоз

1525. На профілактичний прийом до фельдшера прийшла мати з 4-місячною дитиною. Стан задовільний. Психомоторний і фізичний розвиток дитини відповідає віку. Дитина здорова. Проти яких інфекційних захворювань слід запропонувати зробити щеплення даній дитині?

- A. Туберкульоз, дифтерія, правець, поліомієліт, гепатит В
- B. Кір, краснуха, епідемічний паротит, гемофільна інфекція, туберкульоз

C. Дифтерія, кашлюк правець, поліомієліт, гемофільна інфекція

D. Дифтерія, кашлюк правець, поліомієліт, кір

E. Дифтерія, правець, гепатит В, поліомієліт, краснуха

1526. До фельдшера ФАПу звернулася пацієнтка із підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Який з методів найпростішої фізіотерапії доцільно застосувати?

A. Холодний компрес

B. Холодна ванна

C. Міхур з льодом

D. Мішечок з теплим піском

E. Грілка

1527. Пацієнт 23-х років знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4^оC. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

A. Гектична

B. Інтермітуюча

C. Ремітуюча

D. Хвилеподібна

E. Неправильна

1528. Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

A. 2,75-3,0 ммоль/л

B. 1-1,5 ммоль/л

C. 1,75-2,0 ммоль/л

D. 2,25-2,5 ммоль/л

E. 2,5-2,75 ммоль/л

1529. Де спостерігається стоншення підшкірно-жирової клітковини в разі гіпотрофії II ступеня?

A. Тільки на кінцівках

B. На тулубі, кінцівках, обличчі

C. На тулубі та кінцівках

D. Тільки на тулубі

E. На животі

1530. Перша допомога фельдшером ФАПу при апное у малюка, хворого на кашлюк, починається з:

A. Звільнення ротової порожнини від харкотиння та слизу

B. Проведення інгаляцій з протеолітичними ферментами

C. Штучна вентиляція легень методом "рот в рот"

D. Введення спазмолітичних препаратів

E. Проведення закритого масажу серця

1531. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 30-ти років. Після вживання великої кількості цитрусових у хворого виник щільний набряк на обличчі, губах, без свербіння, головний біль, "гавкаючий" кашель. Об'єктивно: Рс- 76/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?

A. Анафілактичний шок

- В. Кропив'янка
- С. Медикаментозний дерматит
- Д. Сироваткова хвороба

Е. Набряк Квінке

1532. Фельдшер ШМД на виклику у дитини 7-ми років. Скарги на озноб, підвищення температури тіла до 39°C, головний біль, кашель. Дитина бліда, тремтить, шкіра "мармурова", кінцівки холодні, сухий кашель, зів гіперемований, тони серця приглушені, тахікардія. Розчин якого лікарського препарату повинен ввести фельдшер у першу чергу?

А. 2,4% еуфіліну

В. 1% дибазолу

С. 1% димедролу

Д. 2,5% аміназину

Е. 20% глюкози

1533. Вагітна 19-ти років звернулася до фельдшера ФАП, щоб стати на облік по вагітності. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримані дані: 26-29-30-20. Який таз у жінки?

А. Загальнорівномірнорозвужений

В. Плоскоракітичний

С. Нормальний

Д. Простий плоский

Е. Чоловічий

1534. Фельдшер ШМД застосував джгут для зупинки артеріальної кровотечі. На який час максимально накладається джгут на кінцівку взимку?

А. 3 години

В. 0,5 години

С. 2 години

Д. 2,5 години

Е. 1 година

1535. На ФАП доставлений хворий зі скаргами на головний біль, погіршення зору, пітливість, біль у животі, слинотечу, нудоту. 6 годин тому оприскував город хлорофосом. Встановлено діагноз: гостре отруєння хлорофосом. Який антидотнайдоцільніше застосувати?

А. Розчин натрію гідрокарбонату 3%

В. Розчин атропіну сульфату 0,1%

С. Антидот Стрижевського

Д. Розчин тіосульфату 20%

Е. Розчин унітіолу 5%

1536. Лікар призначив пацієнту застосування газовідвідної трубки в ранній післяопераційний період, щоб усунути метеоризм. На скільки сантиметрів фельдшеру необхідно ввести газовідвідну трубку?

А. 20-30 см

В. 15-18 см

С. 7-10 см

Д. 18-20 см

Е. 10-15 см

1537. Який з методів ведення пологів слід обрати, якщо у роділлі з кровотечею встановлено діагноз центрального передлежання плаценти?

- A. Амніотомія з наступною епізіотомією
- B. Поворот за Архангельським
- C. Накладання акушерських щипців
- D. Поворот плоду на ніжку і витягнення на ніжку
- E. Кесарів розтин**

1538. Фельдшер ШМД оглядає постраждалого на місці ДТП. Пацієнт скаржиться на головний біль, нудоту, запаморочення, одноразове блювання. Зі слів дружини, був непритомний кілька хвилин. Який попередній діагноз?

- A. Забій головного мозку
- B. Психоемоційний стрес
- C. Синкопальний синдром
- D. Струс головного мозку**
- E. Вегетативний криз

1539. Повторновагітна народила на дому живу доношену дитину. Після народження дитини пройшло 30 хвилин. Ознаки відділення плаценти відсутні. Кровотечі з пологових шляхів немає. Яка тактика фельдшера ШМД?

- A. Транспортувати у пологовий стаціонар**
- B. Покласти холод на низ живота
- C. Ввести утеротонічні засоби
- D. Зробити ручне відділення та видалення плаценти
- E. Зробити ручну ревізію порожнини матки

1540. Виклик фельдшера ФАПу до дитини 4-х років, яка хворіє 5-й день. Скарги на кашель, світлобоязнь, сльозотечу, $t_{\text{о}} = 38,2^{\circ}\text{C}$. На слизовій оболонці щік білі крапкові плями, на піднебінні червоні плями. Який висип з'явиться у дитини при подальшому розвитку хвороби?

- A. Пустульозний
- B. Геморагічний
- C. Поліморфний
- D. Одномоментний плямисто-папульозний
- E. Поетапний плямисто-папульозний**

1541. Фельдшер ФАПу оглядає пацієнтку 47-ми років зі скаргами на біль, почервоніння передньої поверхні правої гомілки, температуру тіла до 39°C , які з'явилися після незначної подряпини шкіри. Об'єктивно: на передній поверхні правої гомілки визначається гіперемія шкіри до 15×10 см з чіткими контурами, незначний набряк. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Карбункул гомілки
- B. Бешиха гомілки**
- C. Абсцес гомілки
- D. Флегмона гомілки
- E. Фурункул гомілки

1542. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 45-ти років зі скаргами на різке здуття живота, нестійкий стул, нудоту, яка з'являється після вживання жирної та солодкої їжі. Хворіє близько року. Багато курить, зловживає спиртними напоями. Об'єктивно: шкіра жовтяничного забарвлення; наявність телеангіектазій, гіперемія долонь, асцит. Пальпаторно печінка

збільшена, щільна, край загострений. Про яку найбільш імовірну патологію йдеться?

A. Цироз печінки

- B. Виразкова хвороба шлунка
- C. Хронічний гастрит
- D. Рак шлунка
- E. Хронічний холецистит

1543. Пацієнт скаржиться на біль в грудній клітці зліва, який посилюється під час кашлю, дихання. Аускультативно: дихання послаблене, шум тертя плеври. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Сухий плеврит

- B. Стенокардія вазоспастична
- C. Ексудативний плеврит
- D. Ексудативний перикардит
- E. Сухий перикардит

1544. Швидко допомогу викликано до залізничної станції, де очікується прибуття потягу з роділєю. Під час огляду роділлі фельдшером діагностовано повне ніжне передлежання плода. Яку допомогу надасть фельдшер в пологах?

- A. Виконає зовнішній поворот плода
- B. Проведе епізіотомію
- C. Проведе захист промежини
- D. Допомогу за методом Цов'янова I

E. Допомогу за методом Цов'янова II

1545. У дитини часте блювання, біль в епігастрії, рідкий стілець до 8 разів на добу з неприємним запахом, зеленуватого кольору, водянистий. Хворіє 3-тю добу, з анамнезу - вживав тістечко з кремом. Яке обстеження потрібно призначити для уточнення діагнозу?

A. Копрологічне дослідження випорожнень

B. Бактеріологічне дослідження випорожнень

- C. Загальний аналіз крові
- D. Дослідження випорожнень на яйця гельмінтів
- E. Загальний аналіз сечі

1546. На четверту добу після отримання колотої рани правої стопи у хворого підвищилася температура тіла до 38°C, пахвинні лімфатичні вузли збільшилися, стали болючі, шкіра над ними почервоніла. Про яке ускладнення рани можна думати?

- A. Флегмона
- B. Бешиха
- C. Лімфангоїт
- D. Правець

E. Лімфаденіт

1547. До фельдшера ФАПУ звернулася жінка 25-ти років, яка скаржиться на затримку місячних. В анамнезі 2 пологів. При гінекологічному огляді: шийка "бочкоподібна", матка в anteflexio, тіло матки збільшене до 5 тижнів, безболісне. Придатки не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Шийкова вагітність

B. Рак шийки матки

- C. Порушення менструального циклу
- D. Ерозія шийки матки
- E. Аборт в ходу

1548. На 2-му тижні захворювання спостерігається пластинчасте лущення на долонях. Для якого захворювання це характерно?

- A. Червона висипка
- B. Скарлатина**
- C. Кір
- D. Вітряна віспа
- E. Менінгококова інфекція

1549. До фельдшера ФАПу звернувся хворий 28-ти років, зі скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту одноразове блювання. Об'єктивно: живіт бере участь в акті дихання, при пальпації болючий в правій здухвинній ділянці, є незначне напруження м'язів живота, слабо позитивний симптом Ровзінга, Щоткіна-Блумберга. Які дії фельдшера?

- A. Введення спазмолітиків
- B. Госпіталізація**
- C. Покласти грілку на живіт
- D. Промивання шлунка
- E. Введення знеболюючих

1550. Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться, коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків, що народилися доношеними?

- A. В 2-3 роки**
- B. В 1 рік
- C. В 4 роки
- D. В 5-6 років
- E. В 6-7 років

1551. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 38-ми років зі скаргами на біль у поперековій ділянці, часте та болісне сечовипускання; сеча каламутна, температура тіла 37,6оС. Вважає себе хворим 2 роки. Об'єктивно: шкіра бліда, невеликі набряки під очима, симптом Пастернацького позитивний. Який попередній діагноз?

- A. Гострий гломерулонефрит
- B. Хронічний пієлонефрит**
- C. Нирковокам'яна хвороба
- D. Хронічний гломерулонефрит
- E. Гострий пієлонефрит

1552. Пацієнту 35-ти років призначено внутрішньом'язове введення антибіотика після проби на індивідуальну чутливість. Який розчинник повинен використати фельдшер ФАПу, розводячи антибіотик для проведення проби?

- A. 5% розчин глюкози
- B. 0,5% розчин новокаїну
- C. 0,25% розчин новокаїну
- D. Ізотонічний розчин хлориду натрію**
- E. Дистильована вода

1553. При огляди дитини 10-ти років фельдшер ФАПу виявив гіпостатуру на тлі вродженої вади серця. Які ознаки є характерними для гіпостатури?

- A. Надмірна вага при середньому зрості
- B. Збільшення обводу голови при дефіциті маси тіла
- C. Пропорційне зменшення маси і довжини тіла дитини**
- D. Дефіцит ваги при високому зрості
- E. Пропорційне збільшення ваги та довжини тіла

1554. В школі фельдшером ФАПу діагностовано скарлатину. Дитина госпіталізована. Накладений карантин. Контактні обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме карантин?

- A. 10
- B. 3
- C. 21
- D. 14
- E. 7**

1555. У потерпілого внаслідок ДТП спостерігається відсутність дихання, пульсу на сонній артерії, широкі зіниці. Вкажіть першочергову дію фельдшера:

- A. Розпочати серцево-легеневу реанімацію**
- B. Викликати міліцію
- C. Дати вдихнути нашатирного спирту
- D. Викликати швидку допомогу
- E. Ввести хлористий кальцій

1556. До фельдшера ФАПу звернулася хвора із скаргами на підвищену подразливість, поганий сон, зниження працездатності, пам'яті, апетиту, відчуття тривоги. Захворювання пов'язує з психічною травмою. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Хвороба Альцгеймера
- B. Істерія
- C. Неврастенія**
- D. Біполярний психоз
- E. Епілепсія

1557. Пацієнт 45-ти років скаржиться на сильні болі в поперековій ділянці справа, які іррадіюють вздовж сечоводу в статеві органи. Пацієнт стогне "не знаходить собі місця". Об'єктивно: Рс- 80\хв. АТ- 130\80 мм рт.ст., у сечі - кров. Позитивний симптом Пастернацького справа. Який найбільш імовірний діагноз поставить фельдшер?

- A. Гострий гломерулонефрит
- B. Гострий пієлонефрит
- C. Гострий цистит
- D. Хронічно-ниркова недостатність
- E. Нирково-кам'яна хвороба**

1558. До фельдшера ФАПу звернувся хворий зі скаргами на різке здуття живота, незначні випорожнення, нудоту, загальну слабкість. Вважає себе хворим близько року. Багато курить, зловживає спиртним. Об'єктивно: на шкірі обличчя і спини- судинні "зірочки". Шкіра суха, помірно бліда, долоні гіперемовані, гомілки і стопи набряклі. Волосся на голові тонке, рідке. Живіт різко збільшений, пупок випнутий. Навколо пупка венозна сітка у вигляді "голови

медузи". У черевній порожнині виявлено вільну рідину. Який попередній діагноз у хворого?

- A. Хронічний гастрит
- B. Хронічний панкреатит
- C. Хронічний гепатит

D. Цироз печінки

- E. Рак шлунка

1559. Фельдшер прибув на місце автокатастрофи. Один з пасажирів у стані клінічної смерті. Є підозра на перелом хребта в шийній ділянці. Що слід робити в цьому випадку для забезпечення прохідності дихальних шляхів?

- A. Запрокинути голову потерпілого

B. Вивести вперед нижню щелепу

- C. Підкласти валик під лопатки
- D. Повернути голову потерпілого
- E. Опустити голову потерпілого

1560. ШМД викликали до хворого 63-х років. Зі слів родичів хворий впродовж 20-ти років страждає на цукровий діабет. В останні дні був сонливим, скаржився на нудоту, блювання, пив багато рідини, часто мочився. Годину назад знепритомнів. Об'єктивно: хворий в непритомному стані, шкіра суха. Дихання глибоке, шумне (Кусмауля), в повітрі запах - ацетону. Очні яблука м'які. Рефлекси відсутні. Який стан розвинувся у хворого?

- A. Печінкова кома
- B. Церебральна кома
- C. Гіпоглікемічна кома

D. Кетоацидотична кома

- E. Уремична кома

1561. Хвора 40-ка років на прийомі у фельдшера раптово втратила свідомість, упала. З'явилися тонічні, а потім клонічні судоми. Із рота виділяється піна з розовим відтінком. Відмічено мимовільне сечовиділення. Яку невідкладну допомогу необхідно надати хворій?

- A. Ввести серцеві засоби

B. Притримати хвору за голову і кінцівки, повернути голову набік

- C. Викликати лікаря
- D. Виміряти артеріальний тиск
- E. Ввести магнію сульфат

1562. Фельдшер ШМД прибув на виклик до хворого зі скаргами на біль за грудниною після перенесеного стресу. За об'єктивними ознаками фельдшер припустив стенокардію. Які препарати доцільно застосувати для покращення стану хворого?

A. Валідол, нітрогліцерин

- B. Кордіамін, корглікон
- C. Строфантин, кофеїн
- D. Гепарин, анальгетики
- E. Клофелін, дибазол

1563. У породіллі на 11-ту добу післяпологового періоду спостерігається гіпертермія 39,0°C, болі в правій молочній залозі. Загальний стан - середньої важкості. При пальпації виявлено ущільнення в молочній залозі з ділянкою розм'якшення та флюктуації посередині. Яка тактика фельдшера ФАП?

A. Припинення грудного вигодовування, хірургічне втручання

B. Туге перев'язування грудей, сечогінні

C. Припинення грудного вигодовування, госпіталізація

D. Антибіотики, спостереження

E. Припинення грудного вигодовування, антибіотики

1564. На ФАП звернулася жінка 23-х років із затримкою менструації на 2 тижні, кровомажучі виділення з піхви. Фельдшер запідозрив порушену позаматкову вагітність, так як під час огляду пацієнтка втратила свідомість. Яке обстеження підтвердить цей діагноз?

A. Пункція через заднє склепіння

B. Лапаротомія

C. Біопсія шийки матки

D. Бактеріоскопічне дослідження

E. Діагностичне вишкрібання матки

1565. Під час виконання внутрішньовенного струминного введення ліків фельдшеру на незахищену шкіру рук потрапила кров пацієнта. Які запобіжні заходи слід виконати?

A. Двічі обробити руки 5% спиртовим розчином йоду

B. Обробити руки 3% розчином хлораміну

C. Вимити руки з милом, обробити 1% розчином хлораміну

D. Вимити руки з милом, протерти ватною кулькою, змоченою 70% розчином етилового спирту

E. Зняти кров сухою стерильною серветкою

1566. На ФАП доставлений пацієнт 50-ти років з пупковою грижею, після фізичного навантаження виник раптовий біль у ділянці випинання, збільшення об'єму і напруження грижі. Яка тактика фельдшера є найбільш доцільною в даному випадку?

A. Міхур з льодом на місце випинання

B. Надання лежачого положення

C. Обмеження прийому їжі

D. Спокій

E. Терміново госпіталізувати в хірургічне відділення

1567. Мати звернулася до фельдшера ФАПу з запитанням, які коливання температури тіла протягом доби допустимі для дітей перших трьох тижнів життя?

A. 1-1,5°C

B. 0,3-0,5°C

C. 0,5-0,7°C

D. 0,5-1,0°C

E. 1,5-2,0°C

1568. На ФАП звернувся пацієнт 38-ми років з скаргами на біль у попереку, підвищення температури тіла до 38°C, втрату працездатності. Захворів 5 днів тому. Об'єктивно: у ділянці попереку справа спостерігається набряк, почервоніння, у центрі - щільний різко болючий інфільтрат з декількома гнійними отворами з яких виділяється густий зеленуватий гній. Вкажіть захворювання для якого характерні ознаки:

A. Флегмона

B. Лімфаденіт

C. Карбункул

D. Абсцес

Е. Фурункул

1569. При дослідженні пульсу фельдшер ФАПУ виявив, що у пацієнта частота пульсу становить 110\хв. Як він повинен оцінити такий пульс?

А. Гіпертензія

В. Тахікардія

С. Ниткоподібний пульс

Д. Аритмія

Е. Брадикардія

1570. Фельдшер ФАПУ спостерігає за пацієнтом з лейкемією у якого раптово з'явилися загальна слабкість, головний біль, пітливість вночі, підвищення температури до 38оС. Для якого синдрому характерні ці симптоми?

А. Гіперпластичний

В. Геморагічний

С. Інтоксикаційний

Д. Імунодефіцитний

Е. Анемічний

1571. У жінки ниючий біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, гіркий присмак у роті. Хворіє 5 років. Об'єктивно: позитивний симптом Ортнера. Дайте пораду дружині з дієтичного харчування:

А. Вживати йодовмісні продукти

В. Не вживати багато рідини

С. Не вживати багато вуглеводів

Д. Не вживати соленої їжі

Е. Не вживати жирної і смаженої їжі

1572. Фельдшер ШМД прибув до пацієнта 35-ти років. Пацієнт непритомний. Шкіра - жовтянична. Печінка на 2 см випинається з-під краю реберної дуги. Від пацієнта чути специфічний солодкуватий печінковий запах. Оберіть медикаменти для надання невідкладної допомоги:

А. Папаверин, баралгін

В. Анальгін, димедрол

С. Амінокапронова кислота, баралгін

Д. Кальцію хлорид, вікасол

Е. Глюкоза, ессенціале

1573. До фельдшера ФАПУ звернувся юнак 17-ти років, який скаржиться на різкий біль у колінних суглобах, що виник 20 хвилин тому після забиття. Хворіє з дитинства. В анамнезі часті ясенні кровотечДід по материнській лінії хворів на таке саме захворювання. Об'єктивно: на шкірі верхніх та нижніх кінцівок гематоми різних розмірів, болючі при пальпації. Колінні суглоби деформовані. Який найімовірніший попередній діагноз?

А. Геморагічний васкуліт

В. Тромбоцитопенічна пурпура

С. Гострий лейкоз

Д. Гемофілія

Е. Апластична анемія

1574. На ФАП звернувся пацієнт із забитою раною носа. Проведено туалет рани. Яку пов'язку слід накласти на ніс?

- A. Вуздечка
- B. Пращоподібна**
- C. Восьмиподібна
- D. Бінокулярна
- E. Хрестоподібна

1575. У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки. Після цього, протягом останніх 7-ми років, на місці перелому періодично з'являється гостре запалення з утворенням нориці, через яку виділяється гнійний вміст з елементами кісткової тканини. Через деякий час нориця закривається. Про яке ускладнення перелому слід думати?

- A. Трофічна виразка
- B. Флегмона м'якої тканини
- C. Бешиха
- D. Гострий остеомієліт
- E. Хронічний остеомієліт**

1576. Пацієнтка 53-х років, доярка, звернулася до фельдшера ФАПу зі скаргами на біль у дрібних суглобах кистей рук, "ранкову скутість" даних суглобів. Об'єктивно: дрібні суглоби кистей рук припухлі, деформовані. Кисті рук відхилені у бік ліктя. У крові: Hb- 100 г/л, ер.- $3,0 \cdot 10^{12}/л$, лейкоц.- $10 \cdot 10^9/л$, ШОЕ- 45 мм/год, гострофазові показники крові підвищені. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A. Гонорейний артрит
- B. Деформуючий артрит
- C. Ревматичний артрит
- D. Ревматоїдний артрит**
- E. Туберкульозний артрит

1577. До фельдшера ФАПу звернувся пацієнт 36-ти років, зі скаргами на гарячку до $39^{\circ}C$, біль у правій половині грудної клітки, який посилюється під час глибокого дихання, кашель з виділенням незначної кількості "іржавого" харкотиння, виражену слабкість. Вкажіть найбільш імовірний попередній діагноз:

- A. Бронхоектатична хвороба
- B. Абсцес легень
- C. Сухий плеврит
- D. Негоспітальна пневмонія**
- E. Гострий бронхіт

1578. Фельдшера ФАПу викликали до дитини 9-ти років, у якої на фоні грипозної пневмонії розвинулась легенева кровотеча: з'явилась рожева піна з рота, кашель з виділенням яскраво-червоного пінистого харкотиння. Застосуйте кровоспинний препарат:

- A. Дицинон**
- B. Парацетамол
- C. Анальгін
- D. Корглікон
- E. Аспірин

1579. Пацієнтці лікар призначив сифонну клізму з приводу непрохідності кишок. Яку кількість

рідини повинен приготувати фельдшер для проведення цієї процедури?

- A. 1,5 л
- B. 2 л
- C. 10 л**
- D. 3 л
- E. 5 л

1580. Фельдшер ШМД на виклику у хворої 42-х років. Скарги на сильний головний біль, мерехтіння "мушок" перед очима. Такий стан після сварки з чоловіком. При огляді: хвора збуджена, шкіра в червоних плямах, волога. АТ- 190/100 мм рт.ст., Ps- 92/хв., напружений. Тони серця ритмічні. Ліва межа серця розширена. Часте сечовипускання. Яка невідкладна допомога необхідна цієї хворій?

- A. Платифілін гідротартрат 0,2% - 1,0 мл підшкірно
- B. Анальгін 50% - 2,0 мл внутрішньом'язово
- C. Клофелін 0,01% - 1,0 мл внутрішньовенно**
- D. Димедрол 1% - 1,0 мл внутрішньом'язово
- E. Атропіну сульфат 0,1% -1,0 мл внутрішньом'язово

1581. Фельдшер здоров'я щоденно проводить дезінфекцію у приміщенні здоров'я, використаного інструментарію. Як називається такий вид дезінфекції?

- A. Камерна
- B. Вогнищева заключна
- C. Вогнищева поточна
- D. Санітарна
- E. Профілактична**

1582. У дитини 10 років під час уроку почалась носова кровотеча. Яку допомогу необхідно надати дитині?

- A. Ввести в носові ходи тампони, змочені в розчині фурациліну 1
- B. Надати дитині горизонтальне положення
- C. Ввести кордіамін підшкірно
- D. Закрапати в ніс 0,05\% розчин нафтизину
- E. Ввести в носові ходи тампони з 3% розчином перекису водню**

1583. У стаціонар за направленням фельдшера здоров'я поступив 27-річний робітник зі скаргами на голодні, нічні болі в животі, з переважною локалізацією в епігастральній ділянці. З анамнезу відомо, що з 18-річного віку хворіє на хронічний гастрит типу В. Який імовірний діагноз?

- A. Виразкова хвороба 12-палої кишки**
- B. Гострий ентерит
- C. Хронічний панкреатит
- D. Хронічний холецистит
- E. Виразкова хвороба шлунка

1584. Фельдшер з'явився додому до хворого 56-ти років, який скаржиться на задишку з утрудненим видихом, напади кашлю з незначною кількістю харкотиння, відчуття стискання в грудях. Хворіє на бронхіальну астму. Які лікувальні заходи доречні?

- A. Введення мезатону
- B. Введення папаверину

С. Введення баралгіну

Д. Накладання мішура з льодом на грудну клітку

Е. Інгаляція сальбутамолу

1585. Через 6 діб після ін'єкції анальгіну на сидниці у хворої утворився різко болючий інфільтрат з гіперемією шкіри над ним, місцевим підвищенням температури. Температура тіла 38оС.

Відображена картина дозволяє запідозрити:

А. Бешиха

В. Флегмона

С. Післяін'єкційний абсцес

Д. Карбункул

Е. Фурункул

1586. До фельдшера звернулася жінка 38-ми років, у якої після четвертої вагітності виникло варикозне розширення підшкірних вен обох гомілок. Надайте рекомендації:

А. Дотримуватись режиму

В. Носити еластичні панчохи

С. Застосовувати гірудотерапію

Д. Приймати антикоагулянти

Е. Накладати зігріваючий компрес

1587. При дослідженні мазка піхвового вмісту на визначення ступеня його чистоти, виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слабколужна. Це характерно для такого ступеню чистоти піхви:

А. IV

В. III

С. II

Д. I

1588. Дитина 2-х місяців, народилась у грудні з масою тіла 3100 г, перебуває на природному вигодовуванні. Зараз маса тіла становить 4500 г, нервово-психічний розвиток відповідає віку. Патології внутрішніх органів немає. Яку профілактику рахіту слід призначити цій дитині?

А. Аскорбінова кислота по 30 мг з рази на добу

В. Жовток курячого яйця

С. Вітамін D по 500 МО щоденно

Д. Кальцію глюконат по 400-500 мг на добу

Е. Вітамін D по 200 МО на добу

1589. Назвіть показання для годування пацієнта через шлунковий зонд:

А. При пухлинах глотки

В. Тривала непритомність

С. Після операції на стравоході

Д. При опіках стравоходу

Е. Непрохідність кишок

1590. У дитини 12-ти років гостро розвинувся набряк по всьому тілу, систолічний АТ- 140 мм рт.ст., діурез різко зменшився. Які показники аналізу сечі будуть характерними для такого стану?

А. Оксалатурія, ацетонурія

- В. Глюкозурія, холестеринурія
- С. Піурія, альбумінурія
- Д. Піурія, бактеріурія
- Е. Макрогематурія, протеїнурія**

1591. У дитини 12-ти років важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка; кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для такого захворювання:

- А. Дифтерія гортані**
- В. Набряк Квінке
- С. Обструктивний бронхіт
- Д. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- Е. Вогнищева пневмонія

1592. Ви, фельдшер ФАП, прийшли на патронаж до хлопчика 10 місяців. Дитина розвивається гармонійно, фізичний розвиток відповідає віковій нормі. Скільки зубів повинно бути у дитини?

- А. 7
- В. 4
- С. 5
- Д. 3
- Е. 6**

1593. На ФАП звернулася мама з 13-річною дочкою. Після ретельного обстеження діагностовано атрезія дівочої пліви. Якою має бути тактика?

- А. Гормональна терапія
- В. Повторний огляд через 6 місяців
- С. Симптоматична терапія
- Д. Повторний огляд через 3 місяці
- Е. Хірургічний розтин пліви**

1594. Бригада ШМД на виклику у пацієнта 42-х років з туберкульозом легень, у якого після кашлю відійшла піниста яскраво-червона кров. Шкірні покриви бліді. АТ- 90/60 мм рт.ст. Які медикаменти слід вибрати фельдшеру для надання невідкладної допомоги?

- А. Глюкоза, адреналін
- В. Амінокапронова кислота, кальцію хлорид**
- С. Стрептоміцин, індометацин
- Д. Анальгін, лазикс
- Е. Кордіамін, коргліконт

1595. Фельдшер ФАП на виклику у пацієнта 22-х років. Скарги на набряки обличчя, болі у попереку з обох боків, головний біль, підвищення температури тіла до 39°C, АТ- 150/90 мм рт.ст. Сеча червонувата. Який найбільш імовірний діагноз?

- А. Гострий пієлонефрит
- В. Гострий цистит
- С. Гострий гломерулонефрит**
- Д. Хронічний пієлонефрит
- Е. Сечокам'яна хвороба

1596. Каретою швидкої допомоги в гінекологічний стаціонар доставлена 23-х річна жінка зі

скаргами на різкий біль внизу живота, який іррадіює у пряму кишку. Була втрата свідомості. Біль виник раптово після затримки менструації. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт, пульс частий, слабого наповнення, живіт здутий. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який попередній діагноз?

A. Порушена позаматкова вагітність

- B. Аборт в ході
- C. Прогресуюча позаматкова вагітність
- D. Перекрут ніжки пухлини
- E. Апоплексія яєчника

1597. Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз:

- A. Псевдофурункульоз
- B. Ексфоліативний дерматит Ріттера
- C. Попрілості

D. Везикулопустульоз

- E. Пухирчатка новонароджених

1598. Фельдшер відкрила бікс із перев'язувальним матеріалом, і побачила, що індикатор стерильності не розплавився. Які подальші дії в даній ситуації?

- A. Прокип'ятити в дистильованій воді 45 хвилин
- B. Відправити матеріал з бікса на бактеріологічне дослідження
- C. Занурити в дезінфекційний розчин

D. Відправити бікс на повторну стерилізацію

- E. Використовувати матеріал для роботи

1599. У хворого 32-х років сечокам'яна хвороба. Дієти не дотримується. Фельдшером ШМД госпіталізований з нирковою колькою та затримкою сечі. Яку першу медичну допомогу потрібно надати пацієнту?

- A. Поставити гірчичники на гомілки
- B. Поставити холодний компрес на гомілки

C. Помістити хворого в гарячу ванну

- D. Включити кран з водою
- E. Провести катетеризацію

1600. До фельдшера ФАПУ звернулася вагітна 26-27 тижнів зі скаргами на набряки гомілок, передньої черевної стінки. АТ- 160/105 мм рт.ст., протеїнурія - 0,1 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Прееклампсія II ступеня

- B. Нефропатія II ступеня
- C. Протеїнурія
- D. Гіпертонічна хвороба
- E. Еклампсія