

1. Визначте тип лікування, яке призначається особам, що мали статевий або тісний побутовий контакт із пацієнтом, хворим на заразну форму сифілісу, якщо з моменту відносин минуло не більше ніж 3 місяці.

- a. Традиційне
- b. Пробне
- c. Профілактичне
- d. Скринінгове
- e. Превентивне**

2. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість та відчуття задишки під час незначного фізичного навантаження, дискомфорт через стягування шкіри верхніх кінцівок, грудної клітки, відзначає напади побіління пальців рук, особливо у разі емоційного стресу, біль у суглобах кистей. Об'єктивно спостерігається: обличчя маскоподібне, на шкірі верхніх кінцівок індуративні осередки з ділянками атрофії, відзначається синдром Рейно, рубчики на фалангах пальців та їх деформація. Аускультативно вислуховується жорстке дихання та розсіяні хрипи над легеньми, тони серця приглушені. У загальному аналізі крові: еритроцити -  $3,5 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін - 102 г/л, ШОЕ - 24 мм/год. За результатами біохімічного аналізу крові виявлено: СРБ - (+ +), фібриноген - 5,2 г/л, загальний білок - 90 г/л. Який найімовірніший діагноз?

a. Системний червоний вовчак

**b. Системна склеродермія**

- c. Червоний плоский лишай
- d. Розповсюджений псоріаз
- e. Піогенний артрит

3. Куди потрібно направити пацієнта з клінікою синдрому Лайєлла (площа ураження шкіри близько 50%)?

- a. На проведення алергопроб
- b. До дерматовенерологічного відділення
- c. На консультацію до алерголога
- d. До реанімаційного відділення**
- e. До сімейного лікаря

4. Пацієнт віком 50 років для лікування розповсюдженого бляшкового псоріазу самостійно використовував 20% саліцилову мазь, що спровокувало прогресування процесу аж до еритродермії. Який лікарський засіб системної терапії потрібно призначити пацієнту в цьому разі?

**a. Метотрексат**

- b. Пеніцилін
- c. Дексаметазон
- d. Дапсон
- e. Хлорохін

5. Пацієнт віком 17 років скаржиться на рясні виділення з уретри, біль на початку сечовипускання. Хворобу пов'язує зі статевим контактом, який був 4 дні тому. Об'єктивно спостерігається: з уретри помітні виділення гною, губки отвору набряклі. Проба Ядасона позитивна, каламутність у першій склянці. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено диплококи. Який найімовірніший діагноз?

a. Латентна гонорея

**b. Передній гонорейний уретрит**

- c. Тотальний гонорейний уретрит
- d. Задній гонорейний уретрит
- e. Гонорейний уретропростатит

6. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі ступень, дискомфорт у ділянці висипу, свербіж. Об'єктивно спостерігається: шкіра міжпальцевих ділянок ступень еритематозна, мацерована, дрібно лущиться, у III та VI міжпальцевих складках є поодинокі тріщини шкіри, що мокнуть. Який найімовірніший діагноз?

**a. Дерматофітія ступні**

- b. Псоріаз
- c. Оніходистрофія

- d. Короста
- e. Піодермія

7. Пацієнтка віком 39 років звернулася зі скаргами на масивне випадіння волосся по всій поверхні скальпа. З анамнезу відомо, що 3 місяці тому перенесла коронавірусну інфекцію (підтвердження позитивним тестом ПЛР), перебувала у стаціонарі через прояви дихальної недостатності, гарячки. Об'єктивно спостерігається: дифузне порідіння волосся, явища атрофії або рубцювання відсутні. Трихоскопічно: вертикально відростаюче волосся, переважання одиничних фолікулярних юнітів, жовті точки, стоншене термінальне волосся. Який найімовірніший діагноз?

- a. Трихотиломанія
- b. Фронтальна фіброзуюча алопеція
- c. Гніздова алопеція
- d. Себорейний дерматит

**e. Телогенова алопеція**

8. Пацієнт віком 20 років скаржиться на сильний свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що хворіє з тримісячного віку, захворювання загострюється в холодну пору року. Батько має алергічний риніт. Об'єктивно спостерігається: стійкий білий дермографізм, еритеми, ліхеніфікації, екскоріації на вухах, шиї, тулубі, у ліктьових і підколінних ямках. Який найімовірніший діагноз?

- a. Себорейна екзема
- b. Короста
- c. Псоріаз

**d. Атопічний дерматит**

e. Простий контактний дерматит

9. Що з нижченаведеного належить до клінічних ознак нейрофіброматозу?

- a. Кератодермія вздовж ліній Блашко
- b. Телеангіоектазії
- c. Кавернозна мальформація обличчя

**d. Пляма "кава з молоком"**

e. Множинні базаліоми

10. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів. Із анамнезу відомо, що місяць тому мала статевий контакт без застосування бар'єрних засобів захисту. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої великої соромітної губи візуалізується щільний безболісний набряк ціанотично-червоного кольору, від натискування пальцем сліду на ньому не залишається. Пахвинні регіонарні лімфовузли односторонньо збільшені (з боку набряку), щільно-еластичні, безболісні, рухливі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Сифіліс вторинний. Сифілітична ектима
- b. Генітальний герпес
- c. Еритразма

**d. Сифіліс первинний. Індуративний набряк**

e. Пахова епідермофітія

11. У пацієнтки віком 38 років на тлі лікування папуло-пустульозної форми розацеа досягнуто стан клінічної ремісії. Що необхідно заборонити з метою профілактики рецидивів захворювання?

**a. Відвідування лазні**

- b. Прийом йодовмісних препаратів
- c. Застосування метронідазолу
- d. Вживання морепродуктів
- e. Застосування системних нестероїдних протизапальних препаратів

12. У пацієнта віком 34 роки зі встановленим діагнозом: вторинний рецидивний сифіліс - у першу добу пеніцилінотерапії в шкірно-венерологічному диспансері розвинулась реакція Лукашевича-Яриша-Герксгеймера. Якою має бути лікарська тактика в цьому разі?

**a. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта**

- b. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта
- c. Замінити пеніцилін на інший антибіотик

- d. Ввести пацієнту розчин атропіну
- e. Спостерігати за станом пацієнта

13. Пацієнту віком 24 роки встановлено попередній діагноз: короста. Які елементи висипу характерні для корости?

- a. Плями
- b. Вузлики
- c. Вузол
- d. Коростяні ходи

e. Міхурці

14. Лікар після огляду пацієнта з ВІЛ-інфекцією встановив діагноз: генітальний герпес. З метою вибору терапевтичної тактики ознайомився із даними, опублікованими Центром із контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention). Якому принципу відповідає використання міжнародних протоколів у практиці лікаря-дерматовенеролога?

a. Коректної обробки персональних даних

b. Доказової медицини

c. Конфіденційності

d. Дотримання права на безкоштовну медицину

e. Академічної доброчесності

15. Пацієнт скаржиться на гарячку, слабкість, задишку, біль у дрібних суглобах кистей, висип у ділянці обличчя. Об'єктивно спостерігається: температура тіла -  $38,4^{\circ}\text{C}$ , дифузна алопеція, еритематозний висип на щоках і спинці носа. У загальному аналізі крові: лейкоцити -  $3,51 \cdot 10^9/\text{л}$ , гемоглобін - 102 г/л, ШОЕ - 56 мм/год, С-реактивний білок - (+ +). Рентгенологічно виявлено: ексудативний плеврит та перикардит. За результатами біопсії виявлено: гематоксилінові тільця, набухлі ядра загнаних клітин з лізованим хроматином. У загальному аналізі сечі: протеїнурія, змінені еритроцити, лейкоцити. Який найімовірніший діагноз?

a. Системний червоний вовчак

b. Системний васкуліт

c. Розацеа

d. Ревматоїдний артрит

e. Себорейний дерматит

16. Пацієнт віком 32 роки, пожежник, після ліквідації пожежі скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, відчуття жару по всьому тілу. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик, температура тіла  $40^{\circ}\text{C}$ , пульс - 110/хв, дихання часте, поверхневе, м'язові посіпування. Який найімовірніший діагноз?

a. Тепловий удар

b. ЧМТ

c. Симпато-адrenalова криза

d. Сонячний удар

e. Отруєння чадним газом

17. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на свербіж у ділянці міжпальцевих складок кистей, передньої поверхні пахвових ямок і статевих органів, що виникає переважно у вечірній час. Встановлено попередній діагноз: короста. Який метод дослідження використовують для діагностики корости?

a. Діаскопію

b. Посів на поживне середовище Сабуро

c. Метод тонких зрізів лезом

d. Метод Дем'яновича

e. Гратаж

18. Пацієнт віком 35 років скаржиться на свербіж, печіння та помірний біль у ділянці підборіддя і щік. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти років, періодично лікувався різними мазями з тимчасовим успіхом. Останні роки процес повільно прогресує. Об'єктивно спостерігається: у ділянці підборіддя та щік візуалізується велика кількість остіофолікулітів на запальному тлі. Покришка деяких пустул розкрилася та засохла з утворенням зеленкуватих або брудно-жовтих кірочок, під якими помітна ерозивна поверхня. Також спостерігається незначна кількість запальних папул по периферії вогнища. Який найімовірніший діагноз?

- a. Атопічний дерматит
- b. Вугрова хвороба
- c. Герпес простий

**d. Стафілококовий (вуглярний) сикоз**

- e. Екзема мікробна

19. Жінка віком 31 рік звернулася до лікаря через 10 днів після статевих контактів зі скаргами на виділення з піхви, що мають запах "тухлої риби". Який найімовірніший діагноз?

**a. Гарднерельоз**

- b. Трихомоніаз
- c. Мікоплазмоз
- d. Хламідіоз
- e. Гонорея

20. У чоловіка на шкірі тулуба раптово з'явився сверблячий висип у вигляді розеола, вузликів, міхурів, що розташовуються неупорядковано. Із анамнезу відомо, що висип виник після вживання в їжу креветок. Який найімовірніший діагноз?

- a. Екзема
- b. Алергічний контактний дерматит
- c. Простий контактний дерматит
- d. Нейродерміт

**e. Токсикодермія**

21. Пацієнтка віком 46 років скаржиться на наявність висипу в ділянці геніталій, свербіж та печію. Об'єктивно спостерігається: на шкірі зовнішніх статевих органів наявні згруповані міхурці, заповнені прозорим, місцями каламутним вмістом. Який найімовірніший діагноз?

**a. Генітальний герпес**

- b. СНІД
- c. Везикулопустульоз
- d. Сифіліс
- e. Пахова гранульома

22. Пацієнта віком 43 роки шпиталізовано зі встановленим діагнозом: токсикодермія. Під час перебування в стаціонарі пацієнт ігнорує факт тяжкості захворювання, вважає, що в такому стані може продовжувати працювати. Укажіть яку позицію відносин лікаря та пацієнта потрібно використати з таким пацієнтом в контексті ентологічного підходу.

- a. Інформаційну - безпристрасний лікар та автономний пацієнт
- b. Патерналістську - лікар-опікун, наставник та підопічний

**c. Інтерпретаційну - переконливий лікар, тривале спілкування лікаря з пацієнтом**

- d. Колегіальну - рівноправ'я та взаємна довіра
- e. Ліберальну - активна позиція пацієнта

23. Лікар-дерматолог у зв'язку із виробничою необхідністю зайняти посаду завідувача відділення має отримати підвищення кваліфікаційного рівня. Яка вимога повинна бути обов'язково дотримана для отримання лікарем-дерматовенерологом вищої кваліфікаційної категорії?

- a. Спеціалізація за фахом "Клінічна імунологія"

**b. Стаж роботи за фахом понад 10 років**

- c. Стаж роботи за фахом до 5 років
- d. Наявність двох закордонних стажувань
- e. Участь у трьох професійних об'єднаннях\асоціаціях

24. Пацієнт віком 24 роки скаржиться на свербіж та випадіння волосся. Об'єктивно на волосистій ділянці голови виявлено: візуалізується кільцеподібна пляма червоно-рожевого кольору розміром до 5 см, волосся в місці ураження обламане на одному рівні - вище від поверхні шкіри на 3-6 мм, шкіра гіперемована, вкрита сіруватими дрібними лусочками. Встановлено попередній діагноз: мікроспорія. Який метод дослідження використовують для діагностики мікроспорії?

- a. Пробу з розчином срібла

**b. Посів на поживне середовище Сабуро**

- c. Діаскопію

- d. Мікроскопію
- e. Посів на поживне середовище Плоскірева

25. Під час огляду пацієнтки віком 32 роки виявлено: у ділянці живота, тулуба візуалізуються рожево-червоні плями округлої та овальної форми розмірами 9x11 см та 4x7 см, на тлі деяких плям наявні ущільнення, шкіра суха, блискуча з жовтуватим відтінком. Волосся у вогнищах ураження шкіри відсутнє. Який найімовірніший діагноз?

- a. Трихофітія гладенької шкіри
- b. Дерматит
- c. Бляшкова склеродермія (локалізована)
- d. Себорейна екзема (білий пітиріаз)
- e. Обмежений нейродерміт

26. Які мікроорганізми спричиняють лепру?

- a. Гриби
- b. Віруси
- c. Пріони

d. Бактерії

- e. Найпростіші

27. Пацієнт віком 20 років скаржиться на свербіж і біль у ділянці кінчики мізинця правої кисті. Об'єктивно спостерігається: на кінчику мізинця правої кисті візуалізуються згруповані везикули та пустули на еритематозному тлі. Який діагностичний метод дозволить підтвердити діагноз і верифікувати збудник?

a. ПЛР

- b. Реакція пасивної гемаглютинації
- c. УЗД шкіри
- d. Флуоресценція під лампою Вуда
- e. Дерматоскопія

28. У пацієнтки віком 14 років на шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються еритеми, папули, екскоріації. Шкіра дуже суха, відтворюється білим дермографізмом. Загострення виникають після стресу. За результатами дослідження крові виявлено: підвищений вміст імуноглобуліну Е. Який найімовірніший діагноз?

- a. Пітиріаз рожевий (Жібера)

b. Атопічний дерматит

- c. Кропив'янка
- d. Екзема
- e. Алергічний контактний дерматит

29. У пацієнтки віком 30 років під час огляду виявлено: на волосистій частині голови візуалізуються два нумулярних вогнища облісіння, діаметром 4 та 3,5 см. Позитивний тест натягнення волосся. Під час трихоскопії спостерігається: чорні крапки, обламане волосся, волосся у формі знаку оклику. Встановлено діагноз: гніздова алопеція. Яка тактика лікування пацієнта (I лінія терапії)?

a. Топічні кортикостероїди

- b. JAK-інгібітори
- c. Системні кортикостероїди
- d. Топічний міноксидил
- e. Системні імуносупресанти

30. Пацієнт віком 38 років понад п'ять років тому лікувався через вторинний рецидивуючий сифіліс, лікування не закінчив, змінив місце проживання. Об'єктивно спостерігається: на шкірі чола та носа наявний висип у вигляді горбиків. Реакції РІБТ, РІФ позитивні. Який найімовірніший діагноз?

- a. Вузлуватий васкуліт
- b. Вторинний сифіліс
- c. Туберкульоз шкіри
- d. Туберкульозний вовчак

e. Третинний сифіліс

31. Яке порушення відбулося при передачі діагнозу пацієнта сторонній людині?

а. Право на обов'язковий медичний огляд

**б. Право на медичну таємницю**

с. Право на вибір лікаря

д. Право на реабілітаційну допомогу

е. Право на медичне обслуговування

32. Пацієнт віком 26 років скаржиться на наявність висипань на спині й волосистій частині голови, на розгинальних поверхнях кінцівок. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та волосистої частини голови візуалізуються численні папули яскраво-червоного кольору, поверхня елементів вкрита сріблястими лусочками, подекуди папули зливаються та утворюють бляшки значних розмірів. Який найімовірніший діагноз?

а. Себорейний дерматит

**б. Розповсюджений псоріаз**

с. Мікроспорія

д. Алергічний контактний дерматит

е. Плоский червоний лишай

33. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на наявність сосочкоподібних розростань у ділянці зовнішніх статевих органів. Встановлено попередній діагноз: гострокінцеві кондиломи. Яка найімовірніша причина цієї патології?

а. Мікоплазми

б. Сифіліс

с. Вірус простого герпесу

**д. Вірус папіломи людини**

е. Хламідії

34. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на відчуття дискомфорту, збільшення розмірів губ, язика. Із анамнезу відомо, що 10 хв тому пацієнтку вкусила бджола. Об'єктивно спостерігається: набряклі губи та шия, язик ледве вміщається в роті. Набряклі ділянки напружені, неbolючі під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

а. Анафілактичний шок

б. Гостра кропив'янка

с. Напад бронхіальної астми

**д. Набряк Квінке**

е. Симпато-адреналова криза

35. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на ураження шкіри правої гомілки та свербіж. Із анамнезу відомо, що пацієнтка 3 тижні тому травмувала праву гомілку, після чого на шкірі з'явилася рана, яка не загоювалася. Об'єктивно спостерігається: вогнище ураження має чіткі межі, вздовж краю якого наявне відшарування епідермісу, у центрі вогнища на фоні еритеми з ціанотичним відтінком і набряку визначаються мокнучі ерозії, серозно-гнійні кірки, позитивний симптом "серозні колодязі". Який найімовірніший діагноз?

а. Піодермія

б. Істинна екзема

с. Професійна екзема

**д. Паратравматична екзема**

е. Себорейна екзема

36. Мати скаржиться, що у дитини на 6-й день після народження підвищилася температура тіла і з'явився висип на шкірі. Об'єктивно спостерігається: загальний стан дитини тяжкий, температура тіла - 39<sup>o</sup>C, на шкірі тулуба в навколупупкової зоні з поширенням на живіт, а також на сідницях, стегнах, у великих складках - численний висип у вигляді плоских бульозних елементів із тонкою покришкою та серозно-гнійним вмістом та ерозії яскраво-червоного кольору із серозно-гнійним виділенням, які мають тенденцію до поширення. Шкіра навколо висипу різко гіперемована, набрякла. Який найімовірніший діагноз?

**а. Пухирчатка епідемічна немовлят**

б. Попрілість

с. Кандидоз складок

д. Вроджений бульозний епідермоліз

е. Імпетиго контагіозне



37. Пацієнт віком 48 років скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, закладеність вух, оніміння правої кисті й утруднення рухів пальцями. Захворювання почалося гостро. Під час обстеження виявлено зниження тактильної та больової чутливості правої кисті, КСР титр 1:5. Який найімовірніший діагноз?

- a. Базальний менінгіт
- b. Сифілітичний менгомієліт
- c. Спинномозкова сухотка
- d. Сифілітичний неврит
- e. Менінговаскулярний нейросифіліс**

38. Пацієнт віком 46 років, будівельник, скаржиться на появу протягом останніх 6-ти місяців новоутворення на шкірі чола, що періодично кровоточить. Об'єктивно спостерігається: папула із перламутрово-білою поверхнею, судинами в центральній частині та геморагічною кіркою. Який найімовірніший діагноз?

- a. Саркома Капоші
- b. Контагіозний молюск
- c. Псоріаз
- d. Себорейна кератома
- e. Базальноклітинний рак шкіри**

39. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на сверблячий висип на шкірі гомілок впродовж 5-ти місяців. Із анамнезу відомо, що після самолікування спиртовими розчинами стан на шкірі погіршився, курить, хворіє на хронічний гепатит. Об'єктивно спостерігається: на шкірі передньої та бокових поверхонь гомілок - округлі чи з нерівними краями припідняті червоно-ціанотичні та буруваті бляшки з гіперкератотичною бородавчастою поверхнею. По периферії бляшок - дисеміновані лентикулярні плоскі полігональні червоно-фіолетові блискучі папули з точковим заглибленням у центрі, подекуди - екскоріації. Який найімовірніший діагноз?

- a. Пруріго дорослих хронічне
- b. Червоний плоский лишай, верукозна форма**
- c. Т-лімфома, інфільтративно-бляшкова форма
- d. Туберкульоз шкіри бородавчастий
- e. Хромомікоз

40. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці зовнішніх статевих органів та промежини. Об'єктивно спостерігається: у ділянці промежини та зовнішніх статевих органів візуалізуються напівкруглі папули тілесного кольору з восковим відтінком, величиною з горошину та із заглибленням у центрі (під час стискання папули виділяється біла сирниста маса). Який найімовірніший діагноз?

- a. Контагіозний молюск**
- b. Базаліома
- c. Червоний вовчак
- d. Гострокінцеві кондиломи
- e. Сифіліс

41. Пацієнт віком 30 років скаржиться на погіршення самопочуття та появу впродовж останніх 3-х місяців помірно болючого висипу на шкірі. Об'єктивно спостерігається: пацієнт астеничної статури, на шкірі верхньої половини тулуба, статевому члені та твердому піднебінні візуалізуються дисеміновані соковито-вишневого кольору лентикулярні вузлики з гладенькою поверхнею, а також гіперпігментні плями діаметром 1,5–2 см фіолетового та ціанотично-чорного кольору. За результатами загального аналізу крові виявлено лімфопенію. Який найімовірніший діагноз?

- a. Множинні невуси
- b. Саркома Капоші**
- c. Червоний плоский лишай
- d. Різнокольоровий лишай
- e. Сифіліс вторинний

42. Який метод використовують для патоморфологічного дослідження пухирчастих уражень шкіри?

- a. Визначення симптому Нікольського**

- b. Діаскопію
- c. Пробу Томпсона
- d. Дермографізм
- e. Шкірні проби

43. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на виділення з уретри, що супроводжуються болем і різцю під час сечовипускання. Із анамнезу відомо, що симптоматика з'явилася на тлі фізичного навантаження через 3 дні після статевих контактів. Об'єктивно спостерігається: головка статевого члена гіперемована та набрякла, губки зовнішнього отвору уретри почервонілі. З уретри виділяється велика кількість жовто-зеленого гною. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цьому разі?

- a. Уреаплазмоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест
- b. Трихомоніаз, взяти мазок із уретри на визначення збудника
- c. Гонорея, взяти мазок із уретри на визначення збудника**

- d. Гарднерельоз, мазок із уретри для ДНК-тестування
- e. Хламідіоз, взяти мазок із уретри та провести ПЛР-тест

44. Пацієнтка віком 73 роки скаржиться на свербіж шкіри лівої гомілки, особливо навколо трофічної виразки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці виразки шкіра червоного кольору, набрякла, місцями мокнуща, вузлики, пустули, кірочки жовтого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- a. Алергічний контактний дерматит

**b. Мікробна екзема**

- c. Васкуліт
- d. Туберкульоз шкіри
- e. Стрептодермія

45. У дитини віком 12 років діагностовано дерматит атопічний, ліхеноїдну форму. Після проведеного лікування вогнища ліхеніфікації на шкірі ліктьових і підколінних складок регресували. Який із лікарських засобів необхідно призначити дитині на ці ділянки шкіри у період клінічної ремісії для профілактики загострень атопічного дерматиту?

- a. Крем із клобетазолом пропіонатом 0,05%

**b. Мазь такролімусу 0,03%**

- c. Мазь такролімусу 0,1%
- d. Крем із мометазоном 0,1%
- e. Мазь метилпреднізолону ацепонат 0,1%

46. У трирічної дитини після відвідування басейну з'явився висип на шкірі, що впродовж 4-х днів помітно поширився. Об'єктивно спостерігається: загальний стан дитини задовільний, на шкірі обличчя, шиї та згинальній поверхні передпліч візуалізуються чисельні плоскі бульозні елементи діаметром 1,5-2 см з тонкою покривкою та серозно-гнійним вмістом, ерозії округлої форми з обривками покривки та тоненькі серозно-гнійні кірочки. Шкіра навколо висипу гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

- a. Червоний вовчак
- b. Сифіліс

**c. Імпетиго**

- d. Контагіозний моллюск
- e. Алергічний контактний дерматит

47. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла, біль у суглобах та м'язах, появу висипу на шкірі. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 5-ий день після прийому антибіотиків із приводу застуди. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта середньої тяжкості, температура тіла - 39°C, на шкірі розгинальних поверхонь передпліч, тильної сторони кистей, гомілок та стоп - множинний плямисто-папульозний висип, міхури. За результатами аналізу крові виявлено: лейкоцитоз, лімфопенія, еозинопенія, збільшення ШОЕ. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цьому разі?

- a. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення
- b. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування

**c. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування**

- d. Оперізувальний герпес, визначити ступінь ураження та призначити лікування



е. Герпетичний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

48. Пацієнт віком 30 років скаржиться на біль під час сечовипускання та виділеннями з уретри. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри гіперемовані, набряклі, наявні гнійні виділення. Під час проведення двосклянкової проби в першій порції сеча дифузно-каламутна. За результатами бактеріоскопічного дослідження в мазку виявлено підвищену кількість лейкоцитів до 100 в полі зору, розміщені диплококи. Який найімовірніший діагноз?

a. Гострий тотальний гонорейний уретрит

b. Асимптомний гонорейний уретрит

c. Гострий передній гонорейний уретрит

d. Торпідний гонорейний уретрит

e. Хронічний гонорейний уретрит

49. Пацієнтка віком 22 роки мала одноразовий статевий контакт без застосування бар'єрних засобів контрацепції з хлопцем, у якого нещодавно було виявлено вторинний свіжий сифіліс. Під час огляду шкіри та досяжних для огляду слизових оболонок висипів не знайдено. Якою повинна бути тактика лікаря-дерматовенеролога у цій ситуації?

a. Провести серологічне обстеження на сифіліс

b. Спостерігати за станом пацієнтки

c. Проконсультувати у сімейного лікаря

d. Провести превентивне лікування сифілітичної інфекції

e. Проконсультувати у лікаря-гінеколога

50. Що з нижченаведеного належить до групи речовин зі шкірноаривною дією?

a. Синильна кислота

b. Іприт

c. Хлорацетофенон

d. Зарин

e. Фосген

51. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на наявність вузлів на обох гомілкках. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обох гомілок, переважно у ділянці литок візуалізуються вузли завбільшки з квасолину, щільної консистенції, трохи болісні на дотик. Шкіра над ними інтенсивно-червоного кольору з коричневим відтінком. Подекуди на гомілкках відзначаються запальні плями до 5-10 мм у діаметрі, виразки відсутні. Який найімовірніший діагноз?

a. Індуративна еритема Базена

b. Мікробна екзема

c. Вузуватна еритема

d. Третинний сифіліс

e. Ліпоїдний некробіоз

52. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипань на шкірі внутрішньої поверхні передпліч, променевоzap'ястних та гомілковостопних суглобів. Об'єктивно спостерігається: мономорфний висип у вигляді лентикулярних запальних, блискучих, полігональних папул, на поверхні яких опалоподібні білі або сіруваті смужки. У центрі деяких папул є пупкоподібні вдавлення. Який найімовірніший діагноз?

a. Атопічний дерматит

b. Контагіозний молюск

c. Токсикодермія

d. Псоріаз

e. Червоний плоский лишай

53. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на значні слизово-гнійні виділення зі статевих шляхів, свербіж, печіння в ділянці зовнішніх статевих органів, біль під час сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: гіперемія шкірних покривів і слизових оболонок зовнішніх статевих органів, внутрішньої частини стегон і перианальної ділянки. Із анамнезу відомо, що мати дитини хворіє на гонорею. Який найімовірніший діагноз?

a. Гонококовий вульвовагініт

b. Урогенітальний трихомоніаз

- c. Бактеріальний вагіноз
- d. Уреаплазмозний вагініт
- e. Кандидозний вульвовагініт

54. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на відчуття печіння у ділянці підборіддя та щік. Об'єктивно спостерігається: у ділянці щік і підборіддя візуалізуються нечисленні папули та пустули на тлі яскравої гіперемії, шкіра в цих місцях чутлива. Який найімовірніший діагноз?

- a. Розацеа
- b. Себорейний дерматит
- c. Червоний вовчак
- d. Пероральний дерматит
- e. Акне

55. Який із нижченаведених діагнозів є підставою для виключення пацієнтів із військового обліку?

- a. Множинні себорейні кератоми
- b. Алергічний дерматит із дисемінованим ураженням
- c. Атопічний дерматит із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву
- d. Піодермія дисемінована
- e. Мікоз волосистої частини голови

56. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу висипу на червоній облямівці нижньої губи. Об'єктивно спостерігається: висип у вигляді одиначної округлої ерозії кольору свіжо-розрізаного м'яса розміром 5 мм в діаметрі. Під час пальпації в її основі визначається інфільтрат. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені з обох боків, щільно-еластичної консистенції, рухливі, неболучі. Якою повинна бути тактика лікаря для встановлення діагнозу: сифіліс?

- a. Обстежити за допомогою РІФ на сифіліс
- b. Обстежити за допомогою RW
- c. Обстежити за допомогою ІФА на сифіліс
- d. Спостерігати за станом пацієнтки
- e. Провести визначення блідої спірохети за допомогою методу темнопольної мікроскопії

57. До якого класу сили дії належать мазь клобетазолу?

- a. Потужної
- b. Надслабкої
- c. Слабкої
- d. Надпотужної
- e. Середньої

58. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу висипу та свербіж у ділянці кистей. Із анамнезу відомо, що працює малярем. Об'єктивно спостерігається: шкіра кистей і пальців яскраво-рожевого кольору, трохи набрякла, вогнища запальних плям мають схильність до периферійного росту і злиття, без чітких меж. Свербіж у ділянці висипу посилюється в разі контакту з водою. Який найімовірніший діагноз?

- a. Простий контактний дерматит
- b. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- c. Червоний плоский лишай
- d. Короста
- e. Алергічний контактний дерматит

59. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на безболісне збільшення однієї соромітної губи. З анамнезу відомо, що місяць тому мала випадковий статевий контакт, три тижні тому - переохолодження на катку. Об'єктивно спостерігається: права соромітна губа значно збільшена, ціанотично-червоного кольору, ущільнена під час пальпації, ямка при натискуванні на поверхню губи не утворюється. Пахові лімфатичні вузли помірно збільшені, ущільнені, безболісні та рухомі під час пальпації, шкіра над ними без змін. Серореакції на сифіліс негативні. Який метод діагностики необхідно застосувати першочергово для уточнення діагнозу?

- a. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на хламідії
- b. Бактеріологічне дослідження виділень бартолінової залози на піогенну флору

с. Обстеження на туберкульозну інфекцію

d. Мікроскопічне дослідження пунктату соромітної губи на бліду спірохету

е. Патогістологічне дослідження біоптату соромітної губи

60. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув різкий головний біль, запаморочення. Скаржиться на напади задишки, бронхоспазму. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкірних покривів, підвищене слиновиділення, міоз, тремор, м'язове посмикування кінцівок. АТ - 110/60 мм рт. ст., ЧСС - 40/хв. Який антидот необхідно застосувати для надання невідкладної допомоги пацієнту?

a. Гіпербарична оксигенація

b. Атропін

с. Унітіол

d. Налоксон

е. Гідрокарбонат натрію

61. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль, печіння під час сечовипускання. Об'єктивно спостерігається: гіперемія, набряклість губок уретри, крихкий "сирний" наліт, густі білі виділення з уретри з грудками, що нагадують сир. Який найімовірніший діагноз?

a. Кандидозний уретрит

b. Бактеріальний уретрит

с. Хламідійний уретрит

d. Дріжджовий уретрит

е. Гонорейний уретрит

62. Який шлях інфікування *Mycobacterium leprae* є основним?

a. Через укуси москітами роду *Phlebotomus*

b. Вживання з їжею моллюсків

с. Вживання в їжу термічно не обробленого м'яса

d. Через укуси комарів роду *Anopheles*

е. Тривалий побутовий контакт

63. Хто найчастіше хворіє на симптоматичний уrogenітальний кандидоз?

a. Молоді жінки дітородного віку

b. Діти

с. Хворі на цукровий діабет

d. Вагітні жінки

е. Молоді чоловіки

64. Пацієнт віком 38 років скаржиться на свербіж, почервоніння, набряклість і мокнуття шкіри кистей. Із анамнезу відомо, що пацієнт працює на цементному заводі. Хворіє впродовж року з періодичним поліпшенням під час відпустки. Об'єктивно спостерігається: межі ураження нечіткі, на інших ділянках шкіри висип відсутній. Який найімовірніший діагноз?

a. Професійна екзема

b. Себорейна екзема

с. Істинна екзема

d. Хронічна виразкова піодермія

е. Ексфолювативний дерматит

65. Призначення якого препарату варто уникати під час вагітності?

a. Магнію сульфату

b. Фолієвої кислоти

с. Тетрацикліну

d. Лоратадину

е. Цетиризину

66. У пацієнта віком 22 роки після внутрішньовенного введення антибіотику розвинувся анафілактичний шок. Яку невідкладну допомогу необхідно надати першочергово?

a. Ввести в/м 0,5 мл 0,1% розчину адреналіну

b. Ввести в/м преднізолон у дозі 0,5 мг/кг маси тіла пацієнта

с. Виконати електричну дефібриляцію

d. Вести в/в еуфілін у дозі 5 мг/кг маси тіла пацієнта

е. Виконати прийом Геймліха

67. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу безболісної виразки у ділянці статевих губ. Із анамнезу відомо, що мала статевий контакт із малознайомим чоловіком. Яке дослідження потрібно зробити першочергово в цьому разі?

- a. На гонококи
- b. На хламідії
- c. На трихомонади
- d. На бліду трепонему**
- e. На гриби

68. Пацієнт віком 28 років скаржиться на висип та випадіння волосся. Об'єктивно спостерігається: дрібновогнищева алопеція волосистої частини голови, численні рожевуваті папульозні висипи на долонях та підшвах. Суб'єктивні відчуття в ділянці висипів відсутні. Пахові, пахові та підщелепні лімфовузли дещо збільшені, неболючі, мають щільно-еластичну консистенцію, рухливі. Загальний стан - без змін. Який найімовірніший діагноз?

- a. Трихофітія
- b. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- c. Сифілітична алопеція, долоне-підшововий папульозний сифілід**
- d. Псоріаз
- e. Андрогенна алопеція

69. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на появу висипу на обличчі. Об'єктивно спостерігається: у ділянці обличчя візуалізуються численні асимптомні плоскі, тілесного кольору папули. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 2-х років. Який найімовірніший діагноз?

- a. Акне
- b. Бородавки плоскі**
- c. Бородавки вульгарні
- d. Сикоз
- e. Розацеа

70. Яка форма сифілісу проявляється появою на ділянці геніталій виразки блюдцеподібної форми, округлих обрисів, із рівними краями, гладким, блискучим дном, безболісної під час пальпації зі щільно-еластичним інфільтратом в основі, що утворилася через 4 тижні після незахищеного сексуального контакту?

- a. Вроджений сифіліс
- b. Прихований сифіліс
- c. Третинний сифіліс
- d. Нейросифіліс
- e. Первинний сифіліс**

71. Яка форма первинної облікової документації заповнюється про випадки захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, уrogenітальний мікоплазмоз та трихомоніаз?

- a. № 089-2/о
- b. № 063-2/о
- c. № 089/о
- d. № 089-1/о**
- e. № 090/о

72. Пацієнт віком 38 років скаржиться на появу гнійних виділень із уретри, різкий біль на початку сечовипускання. Із анамнезу відомо, що 4 дні тому мав незахищений статевий контакт. Об'єктивно спостерігається: гіперемовані, набряклі губки уретри, рясні гнійні виділення з уретри. За результатом проведення двохстаканної проби: сеча у першій порції каламутна. Яке дослідження із нижченаведених допоможе встановити потенційний збудник?

- a. Зішкріб на *Demodex folliculorum*
- b. Дерматоскопія
- c. Мікроскопічне дослідження: фарбування за Грамом**
- d. Посів на поживне середовище Сабуро
- e. Огляд під лампою Вуда

73. Пацієнту віком 25 років із пневмонією призначено введення цефтріаксону в/м. Через 10 хв після ін'єкції пацієнт скаржиться на напад задишки, стиснення за грудниною, посилюється

кашель, захриплість голосу. Об'єктивно спостерігається: набряк шиї та обличчя, АТ - 85/40 мм рт. ст., ЧСС - 120/хв. Аускультативно в легенях вислуховується велика кількість свистячих та дзижчачих хрипів. Який найімовірніший діагноз?

- a. Пневмоторакс
- b. Набряк легень
- c. Анафілактичний шок**
- d. Ортостатичний колапс
- e. Напад астми

74. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: короста - та призначено місцеве лікування. Який метод місцевого лікування призначається в цьому разі?

- a. 3% сірчано-саліцилова мазь на 3 доби
- b. 33% сірчана мазь на 5 діб**
- c. 2% саліцилова мазь на 5 діб
- d. 5% бензілбензоат на 7 діб
- e. 15% сірчана мазь на 3 доби

75. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на м'язову слабкість, біль у суглобах і підвищення температури тіла до 37,5<sup>о</sup>С) Об'єктивно спостерігається: на шкірі розгинальних поверхонь п'ястно-фалангових суглобів візуалізуються папули рожево-ціанотичного кольору, що частково вкриті лусками. У загальному аналізі крові: ШОЕ - 19 мм/год, лейкоцити - 11·10<sup>9</sup>/л. КФК - 404 Од/л. Який клінічний симптом може доповнювати цей стан?

- a. Бен'є-Мещерського
- b. "Медяних стільників"
- c. Нікольського
- d. Дар'є-Унни
- e. Периорбітальної "геліотропної еритеми"**

76. Пацієнтка віком 54 роки скаржиться на появу висипу в ділянці лівої молочної залози, дискомфорт у ділянці висипу. Із анамнезу відомо, що впродовж 2-х років жінка періодично лікувалася з приводу екземи соска. Ефект був нестійким та невиразним, захворювання поступово прогресувало. Об'єктивно спостерігається: ареола та частково шкіра лівої молочної залози ерозовані, яскраво-червоного кольору, межі вогнища ураження фестончасті, чіткі, місцями валкоподібні. Лівий сосок виглядає як дещо сплюснений, частково утягнений. Пахвові лімфатичні вузли з лівого боку збільшені, неболючі, рухомі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хвороба Реклінгаузена
- b. Спіноцелюлярний рак шкіри
- c. Хвороба Боуена
- d. Базальноклітинний рак шкіри (базаліома)
- e. Хвороба Педжета**

77. Пацієнт віком 63 роки скаржиться на висип на шкірі бокової поверхні носа. Із анамнезу відомо, що вперше помітив невеликий висип близько 2-х років тому, лікувався самостійно мазями без клінічного ефекту. Об'єктивно спостерігається: на боковій поверхні носа з одного боку візуалізується неболюча виразка завбільшки з горошину, вкрита геморагічною кіркою, якщо шкіру натягнути, навколо неї стає помітним щільний незапальний валик із дрібними (до 2 мм) білуватими блискучими папулами по периферії. Який найімовірніший діагноз?

- a. Демодикоз
- b. Базально-клітинний рак шкіри (базаліома)**
- c. Герпес
- d. Пітиріаз рожевий (Жібера)
- e. Червоний вовчак

78. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на появу плям темного кольору на обличчі та шиї, що поступово збільшуються та темнішають. Із анамнезу відомо, що хворіє близько 2-х років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обличчя та шиї візуалізуються дві темні плями з нерівним контуром до 5 см в діаметрі, із лущенням на поверхні. Яке дослідження потрібно провести пацієнту?

- a. Трихологічне
- b. Мікроскопічне

### с. Дерматоскопічне

- d. Імунологічне
- e. Культуральне

79. У хлопчика віком 13 років батьки помітили вогнище на голові та втрату волосся. Під час огляду виявлено: загальний стан пацієнта задовільний, на шкірі волосистої частини голови у потиличній ділянці круглий осередок правильної форми з білими лусочками, вогнище діаметром близько 3 см з обламаним волоссям на висоті 3-5 мм. Показники загального аналізу крові та сечі в нормі. За результатами мікроскопічного дослідження виявлено *Microsporum lanosum*. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту?

- a. Ретарпен
- b. Пеніцилін
- c. Цинктерал
- d. Тетрациклін

### e. Грізеофульвін

80. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на появу висипу, що має вигляд численних лентикулярних, нумулярних вузликів (папул), бляшок, укритих сріблястими лусочками. За результатами гістологічного дослідження рогового шару епідермісу виявлено: ядра та розрив міжклітинних зв'язків. Який найімовірніший патогістологічний діагноз?

- a. Паракератоз

### b. Акантоз

- c. Папіломатоз
- d. Гіперкератоз
- e. Гранульоз

81. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль під час сечовипускання, виділення жовто-зеленого кольору із зовнішнього отвору уретри. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти днів. Об'єктивно спостерігається: губки уретри червоного кольору, набряклі. За результатами мікроскопії досліджуваного матеріалу, забарвленого за Грамом, у нейтрофілах виявлено розташовані попарно диплококи рожевого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хламідійний уретрит
- b. Трихомонадний уретрит
- c. Кандидозний уретрит
- d. Бактеріальний уретрит

### e. Гонорейний уретрит

82. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу висипу в ділянці тулуба та кінцівок, виражений свербіж шкіри. В анамнезі: хронічний тонзиліт, хронічний гастрит, коліт. Захворювання почалося раптово після укусів комарів. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок візуалізується безліч уртикарних, набряклих плям, папул розміром від шпилькової головки до зливних великих вогнищ із фестончастими краями. На окремих ділянках висип регресує. Який найімовірніший діагноз?

- a. Алергічний контактний дерматит
- b. Екзема мікробна

### с. Кропив'янка

- d. Екзема справжня
- e. Токсидермія

83. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу безболісного висипу у ділянці правого стегна. Об'єктивно спостерігається: висип у вигляді кільця яскраво-червоного кольору діаметром 10 см, у центрі еритеми на тлі незміненої шкіри наявна папула яскраво-червоного кольору. Із анамнезу відомо, що декілька днів тому жінку вкусив кліщ. Який найімовірніший діагноз?

- a. Бешиха
- b. Системний червоний вовчак

### с. Хвороба Лайма

- d. Гостра ревматична гарячка
- e. Кропив'янка

84. Який препарат є першою лінією терапії у пацієнтів з конглобатним акне?

- a. Топічні ретиноїди



b. Антиандрогенні препарати

c. Топічний бензоїлпероксид

d. Системні ретиноїди

e. Системні антибіотики

85. Пацієнт віком 28 років скаржиться на постійний свербіж та сухість шкіри на руках, ногах і обличчі. Об'єктивно спостерігається: ліхенізація шкіри в місцях згинів, на фоні почервоніння візуалізуються папули та плями на шкірі обличчя, верхніх та нижніх кінцівок. За результатами загального аналізу крові виявлено підвищений рівень еозинофілів. Який найімовірніший діагноз?

a. Атопічний дерматит

b. Бешиха

c. Пітиріаз рожевий (Жібера)

d. Розповсюджений псоріаз

e. Розповсюджена короста

86. Пацієнт віком 27 років під час проходження військово-лікарської комісії отримав статус <<придатний>>. Згідно зі Змінами до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, з яким діагнозом пацієнт вважається придатним до військової служби?

a. Герпетичний дерматит

b. Пухирчатка звичайна

c. Вітиліго

d. Псоріатична еритродермія

e. Дифузний атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією

87. У восьмирічної дівчинки на волосистій частині голови виявлено одиничне вогнище діаметром 3 см обламаного волосся на рівні 5-7 мм над шкірою, "муфтами" та лущенням в основі фолікулів. За результатами мікроскопії встановлено діагноз: мікоз волосистої частини голови. Яке передбачуване джерело інфікування?

a. Ґрунт

b. Худоба

c. Забруднені водойми

d. Кішка

e. Миші

88. Пацієнт віком 45 років скаржиться на незначні серозно-гнійні виділення з уретри переважно зранку до сечовипускання та біль під час сечовипускання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 8-ми днів. Об'єктивно спостерігається: незначна набряклість і почервоніння губок уретри. За результатами бактеріоскопічного дослідження зішкрібів з уретри виявлено тільця Гальберштедтера-Провачека. Який найімовірніший діагноз?

a. Гострий гонорейний уретрит

b. Гострий хламідійний уретрит

c. Трихомонадний уретрит

d. Бактеріальний уретрит

e. Хронічний гонорейний уретрит

89. У шестирічного хлопчика діагностовано стрептококове імпетиго. Який із нижченаведених лікарських засобів використовується для лікування цієї патології?

a. Мазь Дермовейт

b. Мазь Герпесвір

c. Мазь Нізорал

d. Тетрациклінова мазь

e. Сірчана мазь

90. Пацієнт віком 25 років скаржиться на появу висипу в ділянці головки статевого члена. Об'єктивно спостерігається: на головці статевого члена візуалізується безболісна виразка розміром до 1,5 см у діаметрі без вогнищево-запальних змін, правильною округлою формою, з чіткими межами, піднесена над навколишніми здоровими тканинами. Дно виразки гладке, блискуче, яскраво-червоного кольору, краї пологі (блюдеподібні), незначна серозна ексудація, в основі - "хрящеподібний" щільноеластичний інфільтрат, пахові лімфатичні вузли збільшені з

обох боків, близько 1 см у діаметрі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Вторинний сифіліс
- b. Третинний сифіліс
- c. Первинний сифіліс
- d. Простий герпес
- e. Шанкріформна піодермія

91. У пацієнтки віком 62 роки в ділянці носогубної складки протягом останніх 1,5-2 років з'явилося новоутворення діаметром 6-7 мм з дерматоскопічними ознаками базально-клітинного раку шкіри. Яка подальша тактика ведення пацієнтки?

- a. Термінове лікування в онколога
- b. Проведення променевої терапії
- c. Лікування топічним іміквімодом
- d. Видалення новоутворення шляхом електрокоагуляції
- e. Проведення діагностичної біопсії

92. Який препарат є 3-ю лінією у лікуванні уrogenітального хламідіозу?

- a. Пеніцилін
- b. Карбопенем
- c. Офлоксацин
- d. Канаміцин
- e. Біцилін-3

93. Пацієнт віком 45 років скаржиться на висип шкіри обличчя та незначний дискомфорт у ділянці висипу. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х років, висип повільно прогресує. Відзначає, що скарги посилюються у спеку та під час відвідування лазні. Об'єктивно спостерігається: на шкірі спинки носа з переходом на обидві щоки візуалізується суцільна інфільтрована червона пляма у формі метелика з ціанотичним відтінком, що місцями вкрита білуватими дрібними лусочками. Під час пошкрябування лусочок пацієнт відчуває помірний біль. У центрі ураження шкіри по обидва боки від носа відзначаються невеликі островці рубцевої атрофії, оточені зоною гіперкератозу. Скарг з боку інших органів та систем немає. Який найімовірніший діагноз?

- a. Акне
- b. Розацеа
- c. Дискоїдний червоний вовчак
- d. Системний червоний вовчак
- e. Демодикоз

94. Пацієнт віком 40 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла до 38°C, появу "вузлів" на волосистій частині голови. Із анамнезу відомо, що працює скотарем. Об'єктивно спостерігається: на шкірі волосистої частини голови візуалізуються осередки уражень, що різко обмежені та вкриті гнійними кірками, після зняття яких із волосяних фолікулів виділяється гній, що нагадує мед у медових стільниках. Який найімовірніший діагноз?

- a. Сифілітична алопеція
- b. Карбункул
- c. Мікроспорія
- d. Фавус
- e. Інфільтративно-гнійна трихофітія

95. У пацієнта віком 24 роки під час огляду виявлено: на шкірі тулуба спостерігаються три круглі плями білого кольору з чіткими межами, по краю одного з вогнищ візуалізується гіперпігментація, в уражених ділянках волосся білого кольору. Який найімовірніший діагноз?

- a. Сифілітична лейкодерма
- b. Туберозний склероз
- c. Вітиліго
- d. Різнокольоровий лишай
- e. Стрептодермія

96. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на свербіж, біль і появу висипу у ділянці головки статевого члена. В анамнезі: цукровий діабет. Об'єктивно спостерігається: на головці

статевого члена та внутрішньому листку крайньої плоті візуалізуються плямисто-папульозний висип, білі бляшки, пустули, ерозії, набряк, тріщини крайньої плоті. Який найімовірніший діагноз?

- a. Первинний сифіліс
- b. Пріапізм
- c. Контагіозний молюск
- d. Простий герпес

**e. Кандидозний баланопостит**

97. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на вогнище ураження на шкірі спини впродовж 2-х років, яке останнім часом почало "мокріти". Об'єктивно спостерігається: на шкірі спини візуалізується вогнище інфільтрації у вигляді бляшки з чіткими контурами овальної форми 2x4 см, застійно-червоного кольору, на поверхні якого є ерозії, поверхневі виразки, кірки, лусочки. Встановлено попередній діагноз: хвороба Боуена. Який метод діагностики необхідно застосувати для підтвердження діагнозу?

- a. Дослідження мазків-відбитків на акантолітичні клітини
- b. Мікологічне дослідження лусочок

**c. Патогістологічне дослідження**

- d. Дослідження мазків-відбитків на атипові клітини
- e. Дослідження виділень з ерозій і виразок на піогенну флору

98. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на виділення із піхви, що супроводжувались рибним запахом. За результатами мікроскопічної діагностики виділень виявлено: наявність <<ключових клітин>> у всьому полі зору. Який із нижченаведених лікарських засобів є препаратом першої лінії в лікуванні цього стану?

- a. Офлоксацин
- b. Пеніцилін
- c. Доксидиклін
- d. Цефтріаксон

**e. Метронідазол**

99. Пацієнт віком 26 років скаржиться на появу виразки, що розташована на статевому члені. Об'єктивно спостерігається: на статевому члені візуалізується виразка круглої форми з чіткими краями, пахові лімфатичні вузли збільшені, не болючі, рухливі. На шкірі тулуба виявлено дрібні рожеві плями, що не змиваються, не лущаться. Який найімовірніший діагноз?

- a. Первинний сифіліс
- b. Шанкриформна піодермія
- c. Коростяна ектима

**d. Вторинний сифіліс**

**e. Епітеліома**

100. Пацієнт віком 16 років звернувся зі скаргами на множинні закриті та відкриті комедони на шкірі обличчя. Яких правил має дотримуватися пацієнт при призначенні топічного адапалену?

**a. Не перебувати довго на відкритому повітрі без використання сонцезахисних засобів**

- b. Приймати антигістамінні засоби у двократному дозуванні
- c. Не контактувати з водою
- d. Уникати публічних місць, використовувати респіраторну маску
- e. Приймати паралельно системні пробіотики

101. У пацієнта діагностовано свіжий гонорейний і хламідійний уретрит. Які антибактеріальні лікарські засоби найефективніші в цьому разі?

- a. Доксидиклін + метронідазол
- b. Ванкоміцин + ципрофлоксацин
- c. Гентаміцин + ампіцилін
- d. Меропенем + хлорамфінекол

**e. Цефтріаксон + азитроміцин**

102. Пацієнт віком 50 років, співробітник санепідемстанції, під час дезінфекції приміщення відчув різкий головний біль, запаморочення. Скаржиться на напади задишки, бронхоспазму. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкірних покривів, підвищене слиновиділення, міоз, тремор, м'язове посмикування кінцівок. АТ - 110/60 мм рт. ст., ЧСС - 40/хв. Яка речовина, ймовірно,

викликала отруєння?

**a. ФОС**

b. Сірководень

c. Аміак

d. Хлор

e. Азот

103. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на появу висипу в ділянці зап'ястка обох рук, гомілкях, що супроводжується сильним свербіжем. Із анамнезу відомо, що захворювання почалося тиждень тому з появи висипу в ротовій порожнині. Чітко вказати причину появи висипу не може, ні в кого з родичів подібних висипань немає. Об'єктивно спостерігається: у ділянці зап'ястка обох рук, передній поверхні гомілок візуалізуються полігональні, з восковидним блиском папули, червоно-фіолетового кольору з пупкоподібним втисненням у центрі. Наявна сітка Уікхема. Позитивний симптом Кебнера. У ротовій порожнині на слизовій оболонці щік виявлено білі блискучі папули, що зливаються між собою та утворюють малюнок мережива. Який найімовірніший діагноз?

a. Псоріаз

b. Стрептодермія

**c. Червоний плоский лишай**

d. Герпетиформний дерматит

e. Кандидоз

104. Пацієнт віком 30 років скаржиться на появу висипу на статевому члені. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня. Об'єктивно спостерігається: на головці статевого члена візуалізується ерозія блюдцеподібної форми з чіткими межами, червоного кольору, з "лакованою" поверхнею. Під час пальпації визначається щільно-еластична консистенція ерозії, пахові лімфовузли збільшені до розміру квасолини, безболісні. Реакція Васермана негативна. За результатами темнопольної мікроскопії виявлено бліду трепонему. Який найімовірніший діагноз?

a. Туберкульоз шкіри

**b. Сифіліс первинний серонегативний**

c. Лепра

d. Сифіліс вторинний рецидивний

e. Третинний активний сифіліс

105. Мати скаржиться на появу у чотирирічної дитини сверблячого висипу на шкірі, який виник після гостювання у бабусі, де вживала полуницю та гралася з кішкою в садку на траві. Із анамнезу відомо, що у віці 7-9 місяців після прикорму у дитини виникало почервоніння і набряк шкіри обличчя та сідниць. Бабуся дівчинки хворіє на бронхіальну астму. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба і згинальній поверхні кінцівок - еритематозні вогнища округлої та овальної форми без чітких меж, на поверхні - незначне лущення, екскоріації. Також виявлено помірний ксероз шкіри, заїди, потемніння шкіри навколо очей, тріщини за вухами. Який найімовірніший діагноз?

a. Мікроспорія гладкої шкіри

**b. Дерматит atopічний, еритемо-сквамозна форма**

c. Дерматит atopічний, ліхеноїдна форма

d. Дерматит контактний простий (фітодерматит)

e. Дерматит контактний алергічний

106. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на ураження шкіри кистей і нижньої третини передпліч. Об'єктивно спостерігається: на фоні гіперемії та інфільтрації візуалізується поліморфний висип у вигляді везикул, ерозій, тріщин і кірок. Який найімовірніший діагноз?

a. Хвороба Коксаки

b. Atopічний дерматит

c. Хвороба Рейно

d. Вітряна віспа

**e. Справжня екзема**

107. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкірних покривів із визначенням цільової ділянки. Проводить дерматоскопію, фіксує матеріал для подальшої програмної обробки, оцінює стан

шкірних покривів своїх пацієнтів, які мають ризик розвитку онкопроліферативних захворювань шкіри. За якою шкалою оцінюється ризик пігментних уражень шкіри?

a. Фіцпатрика

b. IMT

c. Кларка

d. АПГАР

e. Бреслоу

108. Пацієнт скаржиться на сильний свербіж протягом місяця та висип між пальцями рук, пахвових западинах, у нижній частині живота, що посилюється у вечірній час. Об'єктивно спостерігається: на шкірі між пальцями рук, пахвових западинах, у нижній частині живота візуалізуються папульозні попарні елементи, екскоріації. Дерматоскопічно виявлено звивисті ходи білувато-брудного кольору з крапинками на кінцях. Який найімовірніший діагноз?

a. Короста

b. Педикульоз

c. Дерматофаг

d. Демодекоз

e. Міаз

109. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на появу сверблячих висипань на шкірі. Із анамнезу відомо, що висип з'явився 2 тижні тому після проживання в тимчасовому гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб та контакту з тваринами. Об'єктивно спостерігається: на шкірі живота, міжпальцевих проміжків - папуло-везикулярні елементи, сліди розчухувань, кірочки. Який оптимальний план діагностики для пацієнтки?

a. Виконання алергенних проб для визначення можливих причин алергічної реакції

b. Проведення бактеріологічного дослідження висипань для виявлення патогенних мікроорганізмів

c. Консультація з ветеринарним лікарем для вивчення можливого впливу домашніх тварин на здоров'я пацієнта

d. Виконання експрес-тесту на алергічну реакцію до будь-яких домашніх тварин

e. Проведення мікроскопічного дослідження на коростяний кліщ

110. У трирічної дівчинки після вживання 2-х пігулок еритроміцину спостерігаються такі симптоми: підвищення температури тіла до 40°C, запаморочення, плями на шкірі. Об'єктивно спостерігається: на шкірі тулуба та кінцівок візуалізуються міхури до 2-3 см у діаметрі, відшарування епідермісу з утворенням великих ерозій. Симптоми Нікольського позитивні. Ураження на шкірі нагадують опіки 2-го ступеня. Який найімовірніший діагноз?

a. Синдром Лайєлла

b. Звичайна пухирчатка

c. Бульозний дерматит

d. Псоріаз

e. Поліморфозна ексудативна еритема

111. Пацієнт віком 27 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок, що супроводжується свербіжем. Об'єктивно спостерігається: на боковій поверхні тулуба, зап'ястках, згинальній поверхні передпліч, гомілкях і слизових оболонках - велика кількість папульозних елементів червоного кольору з ціанотичним відтінком, папули полігональної форми з перламутровим блиском і вдавленням у центрі. На слизовій оболонці порожнини рота візуалізуються ціанотично-червоні папули з білуватою сіткою. Який найімовірніший діагноз?

a. Папульозний сифілід

b. Ексфолюативний дерматит

c. Розповсюджений псоріаз

d. Пітиріаз рожевий (Жібера)

e. Червоний плоский лишай

112. Яку специфічну клінічну ознаку виявляють під час кольпоскопії у жінок, хворих на трихомоніаз?

a. Ерозії

b. Виразку з блискучим дном

c. Лейкоплакію

d. Фібринозні плівки

e. Точкові крововиливи на шийці матки - "сунична" шийка матки

113. Яка терапевтична комбінація є ефективною та безпечною у лікуванні вітиліго?

a. Івермектин + фотодинамічна терапія

b. Топічний такролімус + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм

c. Пульс-терапія ітраконазолом+ фототерапія із псораленом PUVA

d. Циклоспорин + фототерапія вузькосмугова UVB 311 нм

e. Пеніцилін + полівітамінний комплекс

114. Пацієнт віком 27 років скаржиться на свербіж та печіння у ділянці сечівника, біль у колінному суглобі та відчуття дискомфорту в очах (сльозотеча, свербіж). Який збудник, найімовірніше, спричинив захворювання?

a. *Neisseria gonorrhoea*

b. *Chlamydia trachomatis*

c. *Candida albicans*

d. *Trichomonas vaginalis*

e. *Gardnerella vaginalis*

115. Який із нижченаведених дерматозів є спадковим?

a. Еритродермія Лейнера

b. Гемангіома

c. Пухирчатка акантолітична

d. Бульозний епідермоліз

e. Псоріаз

116. Жінка віком 20 років на прийомі у лікаря-дерматовенеролога поводить себе метушливо, неспокійно, хоче впевнитися, що про факт звернення по медичну допомогу та встановлений діагноз не дізнаються її батьки. Лікар заспокоїла пацієнтку, наголосивши, що згідно зі статтею Цивільного кодексу вона має право на таємницю про стан свого здоров'я. Яка це стаття?

a. Ст. 268

b. -

c. Ст. 286

d. Ст. 289

e. Ст. 230

117. Чоловік віком 38 років скаржиться на свербіж, печіння шкіри в ділянках міжпальцевих проміжків кистей та стоп. Об'єктивно спостерігається: ерозії, ділянки, вкриті густими нашаруваннями білого кольору з периферичним лущенням. Лікарські засоби якої групи найбільш доцільно застосувати в цьому разі?

a. Антимікотики

b. Антибактеріальні

c. Глюкокортикоїди

d. Антигістамінні

e. -

118. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на появу висипу, значний свербіж на шкірі обличчя та кінцівок після укусу оси. Об'єктивно спостерігається: моноформна уртикарна висипка рожевого кольору округлої форми з чіткими контурами, яка незначно підвищується над рівнем шкіри. Який найімовірніший діагноз?

a. Псоріаз

b. Уртикарний васкуліт

c. Набряк Квінке

d. Спадковий ангіонабряк

e. Кропив'янка

119. Пацієнт віком 28 років скаржиться на появу після незначної гарячки пухирців на шкірі обличчя та слизовій оболонці рота. Об'єктивно спостерігається: на червоній облямівці губ, крилах носа та слизовій оболонці рота ліворуч візуалізуються міхурці діаметром до 2 мм, згруповані по 3-5 міхурців із прозорим та мутним вмістом, ерозії яскраво-червоного кольору з поліциклічними обрисами. Який найімовірніший діагноз?

a. Пухирчатка еритематозна



- b. Стрептококове імпетиго
- c. Дерматит герпетиформний

**d. Герпес простий**

- e. Стафілококове імпетиго

120. Пацієнтка віком 49 років скаржиться на появу висипу на шкірі тулуба та кінцівок. Із анамнезу відомо, що захворювання розпочалося з появи на шкірі тулуба, кінцівок та інших ділянках множинних набряклих овальних плям, спочатку їхній колір був рожевий із фіолетовим відтінком. Діаметр плям поступово збільшувався до 1-20 см і більше, у центрі сформувалось ущільнення. В окремих місцях плями зблідли, по периферії (зона росту) зберігалось кільце фіолетового кольору. Об'єктивно спостерігається: шкіра у місці уражень кольору слонової кістки, гладенька, не збирається у складку, на поверхні немає волосся, пото- та саловиділення. По мірі прогресування захворювання бузкове кільце зникає, з'являються телеангіектазії та пігментація. З розвитком атрофії ущільнення розсмоктується, шкіра стає тонкою (вигляд «цигаркового паперу»), легко береться в складку і западає. Який найімовірніший діагноз?

- a. Фіксована еритема
- b. Обмежений нейродерміт
- c. Дерматит
- d. Трихофітія гладенької шкіри

**e. Бляшкова склеродермія (локалізована)**

121. Що з нижченаведеного належить до клінічних проявів первинного періоду сифілісу?

- a. Сифілітична алопеція
- b. Горбиковий сифілід
- c. Сифілітичний гоніт
- d. Лейкодерма

**e. Регіонарний лімфаденіт**

122. Дівчина віком 18 років скаржиться на появу папул, пустул на шкірі обличчя, які, за її словами, псують її зовнішній вигляд. Об'єктивно спостерігається: на шкірі лоба, щік і підборіддя є папули та пустули, d=3-5 мм. Більшість пустул з видимим центральним стрижнем із гною. Який найімовірніший діагноз?

- a. -
- b. Розацеа
- c. Фолікулярний кератоз
- d. Алергічний дерматит

**e. Акне**

123. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на запалення слизових оболонок очей, порожнини рота, носа та статевих органів, появу висипу на шкірі, підвищення температури тіла, слабкість. Із анамнезу відомо, що симптоми виникли після введення протиправцевої сироватки 3 дні тому. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, температура тіла -  $41^{\circ}\text{C}$ , свідомість сплутана, на всій шкірі візуалізуються еритематозні плями з коричневим відтінком, в'ялі міхури, яскраво-червоні зливні ерозії. Виявлено болючість шкіри, під час дотику епідерміс зморщується, на кистях та стопах - відшарування епідермісу у вигляді "рукавичок та шкарпеток". Симптом Нікольського різко позитивний. На слизових оболонках поодинокі яскраво-червоні ерозії. Для якого захворювання характерна така клінічна картина та яка тактика лікаря в цій ситуації?

- a. Фіксована токсикодермія, визначити ступінь ураження та призначити лікування
- b. Синдром Стівенса-Джонсона, скерувати пацієнта на стаціонарне лікування
- c. Вульгарна пухирчатка, визначити ступінь ураження та призначити лікування

**d. Синдром Лайєлла, скерувати пацієнта до реанімаційного відділення**

- e. Герпетиформний дерматоз Дюринга, визначити ступінь ураження та призначити лікування

124. Пацієнт віком 53 роки скаржиться на появу виразки на статевому члені. Об'єктивно спостерігається: виразка округлої форми з чіткими межами, пологими краями, гладеньким дном, дно має вигляд свіжого м'яса, у центрі сальний наліт, шкіра навколо виразки не змінена, пахові лімфатичні вузли з правого боку збільшені, щільні, рухомі, неболючі. На тулубі візуалізуються дрібні рожеві плями, які не лущаться, не турбують. Який найімовірніший діагноз?

- a. Шанкροїд

б. Третинний активний сифіліс

с. Вторинний сифіліс

д. Короста

е. Первинний сифіліс

125. Яку лікарську форму для місцевого застосування необхідно порадити пацієнтам із гострою екземою з явищами мокнуття шкіри?

а. Примочки

б. Лініменти

с. Мазі

д. Анілінові барвники

е. Паста

126. Пацієнт віком 57 років скаржиться на появу висипу на волосистій частині голови, у ділянці шкіри тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Появу висипу пов'язує з нещодавно перенесеною операцією та стресовою ситуацією. Об'єктивно спостерігається: на шкірі візуалізуються запальні папули, що мають тенденцію до розповсюдження та вкриті рихлими сріблясто-білими лусочками. Під час пошкрябування елементів висипу спостерігається симптом "стеаринової плями", "термінальної плівки", "кров'яної роси". Генеалогічний анамнез не обтяжений. Який найімовірніший діагноз?

а. Парапсоріаз

б. Псоріаз

с. Червоний плоский лишай

д. Дерматофітія

е. Пітиріаз рожевий (Жібера)

127. У шестимісячної дитини з'явився висип на обличчі, що супроводжується свербіжем. Із анамнезу відомо, що дитина захворіла 3 тижні тому після введення прикорму. Об'єктивно спостерігається: на шкірі щік еритема, набряк, дрібні везикули, мокнуття, серозні кірочки. Який найімовірніший діагноз?

а. Дитяча екзема

б. Імпетиго

с. Мікробна екзема

д. Алергічний контактний дерматит

е. Токсикодермія

128. Пацієнтка віком 45 років після денного відпочинку на пляжі скаржиться на головний біль, задишку, відчуття пульсації у скронях, шум у вухах, вказує, що 30 хв тому було блювання. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви гіперемовані, шкіра обличчя яскраво-червона, гаряча на дотик, пульс - 100/хв. Який найімовірніший діагноз?

а. Отруєння опіатами

б. Сонячний удар

с. Отруєння метанолом

д. Тепловий удар

е. Симпато-адrenalова криза

129. Пацієнтка віком 63 роки скаржиться на печію та біль у кутах рота. В анамнезі: цукровий діабет середньої тяжкості. Об'єктивно спостерігається: свербіж та обмеження відкриття рота, у кутах рота - рожево-червоні тріщини з білуватим нальотом. У загальному аналізі крові та сечі - нормальні показники. Глюкоза крові - 9 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

а. Періоральний дерматит

б. Вульгарна пухирчатка

с. Щелеподібне імпетиго

д. Гальванічний хейліт

е. Ангулярний кандидоз

130. У дівчинки віком 15 років після вживання двох таблеток ацетилсаліцилової кислоти через 4-5 годин температура тіла підвищилася до 39-40°C. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів і відшаровуванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Об'єктивно спостерігається: ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеня. Симптом Нікольського - позитивний. Який

найімовірніший діагноз?

a. Пемфігоїд

b. Токсичний епідермальний некроліз (Лайєлла)

c. Поліморфна ексудативна еритема

d. Герпетиформний дерматит

e. Пухирчатка

131. У доношеної дитини на 4-ту добу життя на шкірі різних ділянок спостерігаються: еритема, множинні ерозії та тріщини, ділянки відшарування епідермісу. Зовнішній вигляд нагадує опік від окропу. Симптом Нікольського позитивний. Який найімовірніший діагноз?

a. Ексфолювативний дерматит Ріттера

b. Справжня екзема

c. Імпетиго

d. Бульозний епідермоліз

e. Везикулопустульоз

132. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан шкіри з визначенням та розробкою тактики лікування, динамічного спостереження, та реабілітації пацієнта, хворого на atopічний дерматит. За якою шкалою оцінюється тяжкість atopічного дерматиту?

a. PGA

b. DLQI

c. SCORAD

d. BSA

e. PASI

133. Яка тривалість інкубаційного періоду при гонорейі?

a. 7 днів

b. від 2-х до 8-ми діб

c. 7-14 днів

d. 1 місяць

e. 2-14 днів

134. Пацієнта віком 40 років шпиталізовано до відділення реанімації без свідомості. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви рожево-червоного кольору з геморагіями, теплі на дотик, зіниці розширені, пульс поверхневий частий, АТ - 110/60 мм рт. ст. Виявлено патологічні рефлекс Бабинського та ригідність потиличних м'язів. Отруєння якою речовиною, ймовірно, відбулося у пацієнта?

a. Бензолом

b. Фенолом

c. ФОС

d. Синільною кислотою

e. Чадним газом

135. У пацієнта віком 30 років на розгинальній поверхні кінцівок, шкірі спини спостерігається симетрична висипка вузликів яскраво-рожевого кольору розміром від сечовиці до срібної монети. Поверхня їх вкрита білого кольору лусочками. Симптом Аушпіца позитивний. На схоже захворювання в сім'ї хворіють батько та рідний брат. Який найімовірніший діагноз?

a. Червоний плоский лишай

b. Атопічний дерматит

c. Вторинний сифіліс

d. Туберкульоз шкіри

e. Псоріаз

136. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на висип у ділянці бороди та вусів, що супроводжується почуттям печії, свербіжу, поколювання. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 1-го місяця, спочатку на підборідді з'явилися окремі пустули з гнійним вмістом, які підсихали з утворенням кірок. На момент огляду процес локалізується на шкірі підборіддя та носогубного трикутника. Шкіра під час пальпації щільна, інфільтрована, ціанотично-червоного кольору. Об'єктивно спостерігається: у ділянці ураження - велика кількість пустульозних елементів, багато з яких пронизані волоссям, множинні брудно-жовті кірки. Який найімовірніший діагноз?

a. Імпетиго вульгарне

- b. Мікроспорія
- c. Герпетична інфекція

d. Сикоз стафілококовий

- e. Мікробна екзема

137. Який серологічний тест необхідно виконати на першому етапі обстеження враховуючи сучасний алгоритм проведення серологічного скринінгу та підтвердження діагнозу: сифіліс?

- a. РЗК (реакція зв'язування комплементу з ліпідним антигеном)
- b. РПР (експрес тест на реакіни плазми)
- c. VDRL (мікрофлокуляційний тест)
- d. РМП (реакція мікропреципітації)

e. РПГА (реакція пасивної гемаглютинації)

138. Які з рідкісних захворювань призводять до скорочення тривалості життя пацієнтів або їх інвалідизації?

- a. Дерматит Дюринга
- b. Мікробна екзема
- c. Порокератоз

d. Бульозний епідермоліз

- e. Вульгарний псоріаз

139. Які препарати для зовнішнього застосування призначають для лікування корости?

- a. Мазь Дермовейт

b. Емульсію бензілбензоату 20%

- c. Цинкову пасту
- d. Мазь Нізорал
- e. Спиртовий розчин йоду

140. Який мікроорганізм спричиняє бешиху?

- a. *Corinebacterium minutissimum*

b. *Streptococcus haemolyticus*

- c. *Staphylococcus aureus*
- d. *Erysipelotrix insidiosa*

e. -

141. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, появу 2-х болючих вузлів у лівій пахвовій ямці та підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно спостерігається: у лівій пахвовій ділянці візуалізуються два вузли до 2 см в діаметрі з бугристою соскоподібною поверхнею, шкіра над ними ціанотично-червона, пальпаторно присутня флюктуація. Який збудник найчастіше спричинює це захворювання?

- a. *Streptococcus agalactiae*
- b. *Proteus vulgaris*
- c. *Pityrosporum orbiculare*

d. *Staphylococcus aureus*

- e. *Pseudomonas aeruginosa*

142. Які обов'язкові лабораторні тести необхідно виконати перед початком прийому ізотретиноїну в лікуванні конглобатних акне?

- a. Лютеїнізуючий гормон, вільний тестостерон, фолікулостимулюючий гормон
- b. Обстеження на гепатити
- c. С-реактивний білок, кортизол, сечова кислота

d. Ліпідограму, печінкові проби, тест на вагітність

- e. Тест на толерантність до глюкози, загальний рівень IgE

143. У пацієнтки віком 22 роки під час огляду виявлено: на шкірі лівого крила носа з переходом на шкіру щоки спостерігається вогнище ураження, на еритематозному тлі є горбки розміром з дрібну горошину, коричнево-рожевого кольору, м'якої тістоподібної консистенції з гладенькою, трохи блискучою поверхнею. Висип зрідка вкритий лусочками. Із анамнезу відомо, що хворіє з десятирічного віку. Який найімовірніший діагноз?

- a. Червоний вовчак
- b. Вугрова хвороба
- c. Червоні (рожеві) вугрі, демодекоз

**d. Туберкульозний (вульгарний) вовчак**

е. Себорейний дерматит

144. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу утворень у ділянці статевих органів та промежини. Об'єктивно спостерігається: на шкірі геніталій наявні сосочкоподібні утворення, що мають ніжку та нагадують кольорову капусту, консистенція їх м'яка, не болючі. Який найімовірніший діагноз?

**a. Папіломавірусна інфекція**

b. Сифілітичні широкі кондиломи

c. Вульгарні бородавки

d. Плоскоклітинний рак

е. Гострий кандидоз

145. Пацієнт віком 30 років скаржиться на свербіж у ділянці волосистої частини голови. Об'єктивно виявлено: у ділянці волосистої частини голови спостерігається ураження шкіри, що має вигляд ліхеніфікацій, укритих нашаруванням лусочок, волосся не ушкоджене. Яку лікарську форму для місцевого застосування найбільш доцільно призначити пацієнту в цьому разі?

a. Мазь

b. Крем

c. Пластир

**d. Лосьйон**

е. Пасту

146. Пацієнт скаржиться на появу сверблячого висипу, що з'явився близько 2-х років тому після стресу. Із анамнезу відомо, що висип посилюється восени та взимку, а влітку майже повністю зникає. Об'єктивно спостерігається: на шкірі ліктів, колін візуалізуються червоні плоскі папули зі сріблястим лущенням. Який симптом необхідно перевірити у пацієнта для підтвердження діагнозу?

a. Горчакова-Арді

b. Пospelова

c. Нікольського

d. Уйкхема

**е. Ауспіца**

147. Лікар-дерматовенеролог оцінює стан утворення з визначенням цільового методу видалення. Проводить електрокоагуляцію, фіксує отриманий матеріал для подальшого патогістологічного дослідження. За яким методом електрокоагуляції видаляють епідерматологічні утворення?

a. Кріодеструкції

b. Фотодеструкції

c. Діатермокоагуляції

**d. Електрофульгурації**

е. Термокаутеризації

148. Пацієнт віком 40 років скаржиться на слабкість, головний біль, підвищену температуру тіла, болючий висип на бічній поверхні тулуба з лівого боку. Об'єктивно спостерігається: скупчення міхурців із прозорим вмістом, розташованих на гіперемованій шкірі тулуба з лівого боку. Який найімовірніший діагноз?

a. Мікробна екзема

**b. Оперізувальний герпес**

c. Герпетичний дерматоз Дюрінга

d. Простий контактний дерматит

е. Пухирчатка

149. У пацієнтки віком 33 роки під час огляду виявлено: на згинальних поверхнях верхніх кінцівок візуалізуються багаточисленні лентикулярні папули, полігональної форми, ціанотично-червоного кольору, місцями з блиском та западінням по центру вузлика. На слизовій порожнині рота спостерігається білого кольору утворення за типом "листя папороті". Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє протягом 1-го року. Який найімовірніший діагноз?

a. Парапофіаз

**b. Червоний плоский лишай**

c. Дерматит

d. Псоріаз

e. Короста

150. До якої рубрики, згідно з МКХ-10, належить герпетиформний дерматит?

a. Папулосквамозні порушення

**b. Інші бульозні порушення**

c. Інші місцеві інфекції шкіри та підшкірної клітковини

d. Гранулематозні хвороби шкіри та підшкірної клітковини

e. Пемфігоїд