

1. Під час профілактичного огляду пацієнта на ортопантограмі в ділянці верхівки кореня зуба 12 виявлено осередок просвітлення кісткової тканини з нечіткими межами у вигляді язиків полум'я. Об'єктивно спостерігається: зуб змінений у кольорі, на яснах у ділянці проєкції верхівки кореня наявний рубець. Для якого захворювання характерна ця рентгенологічна картина?

- a. Хронічний фіброзний періодонтит
- b. Хронічний гранулюючий періодонтит**
- c. Хронічний гангренозний пульпіт
- d. Хронічний гранулематозний періодонтит
- e. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

2. Лікар-стоматолог проводить лікування гострого глибокого карієсу зуба 27. Який метод дослідження можна застосувати для визначення рівня некректомії?

- a. Метод транслюмінації
- b. Люмінесцентну діагностику
- c. Фарбування карієс-маркером**
- d. ЕОД
- e. Термопробу

3. Після стоматологічного прийому необхідно виконати повну обробку інструментів. Яка послідовність обробки використаного стоматологічного інструментарію?

- a. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація**
- b. -
- c. Передстерилізаційне очищення, стерилізація, дезінфекція
- d. Передстерилізаційне очищення, стерилізація
- e. Передстерилізаційне очищення, дезінфекція, стерилізація

4. Жінка віком 46 років звернулася до лікаря-стоматолога-хірурга для видалення зуба 16 зуба. Коронкова частина зуба збережена. Які щипці треба підготувати в цьому разі?

- a. Прямі
- b. S-подібні ліві
- c. Багнетоподібні кореневі
- d. Багнетоподібні коронкові
- e. S-подібні праві**

5. Перед початком прийому пацієнта лікар-стоматолог провів оброблення рук із метою видалення та знищення транзитornoї патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Яку назву має оброблення, що попереджає розповсюдженню інфекції через руки?

- a. -
- b. Гігієнічна обробка рук**
- c. Хірургічна обробка рук
- d. Миття рук
- e. Стерилізація рук

6. Як, за перебігом, називається карієс, що супроводжується множинним ураженням практично всіх зубів, часто в одному зубі виникають 2-3 каріозні порожнини?

- a. Хронічним
- b. Рецидивним
- c. Ускладненим
- d. Квітучим**
- e. Гострим

7. Яка кислота і в якій концентрації використовується для протравлювання дентину та емалі в разі застосування адгезивної техніки пломбування каріозних порожнин?

- a. 10%-ий розчин ортофосфорної кислоти
- b. 15%-ий розчин полікарбонових кислот
- c. 37%-ий розчин ортофосфорної кислоти**
- d. 3%-ий розчин ортофосфорної кислоти

е. 5%-ий розчин полікарбонових кислот

8. Дівчина віком 17 років скаржиться на печіння та сухість слизової оболонки порожнини рота. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на цукровий діабет протягом трьох років. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка щік суха, укрита білим нальотом, що легко знімається. Установлено діагноз: кандидозний стоматит. Яку мазь доцільно рекомендувати для лікування в цьому разі?

а. Преднізолонову

б. Інтерферонову

с. Клотримазолову

д. Ланолінову

е. Еритроміцинову

9. Укажіть, яке ускладнення може виникнути під час проведення операції видалення зубів нижньої щелепи.

а. Проштовхування зуба в гайморову пазуху

б. Перелом коронки або кореня зуба

с. Відламування горба щелепи

д. Альвеоліт лунки зуба

е. Неврит нижньоальвеолярного нерва

10. Які інструменти використовують для оброблення твердих тканин зуба під час препарування каріозних порожнин?

а. Кулясті бори, екскаватор

б. Кулясті бори, плагери

с. Карборундові головки, плагери

д. Кулясті бори, матриці

е. Карборундові головки, фініри

11. У чотирирічної дівчинки під час огляду лікар-стоматолог виявив каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 55 у межах плащового дентину з широким вхідним отвором. Дно та стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, під час зондування безболісні. Який матеріал найдоцільніше застосувати для пломбування?

а. Цинк-фосфатний цемент

б. Амальгаму

с. Силікофосфатний цемент

д. Склоіономерний цемент

е. Полікарбоксилатний цемент

12. Лікар-стоматолог готується до останнього етапу пломбування зуба. Які інструменти йому знадобляться?

а. Фініри, поліри, оклюзійний папір, штрипси

б. Фініри, поліри, оклюзійний папір, матриці

с. Фреза, поліри, екскаватор, штрипси

д. Штопфер, поліри, оклюзійний папір, штрипси

е. Фініри, гладилка, оклюзійний папір, штопфер

13. Пацієнту проводиться ендодонтичне лікування зуба 43. Для антисептичного оброблення та видалення ошурків з кореневого каналу використовується розчин гіпохлориту натрію. Яка концентрація цього антисептика використовується для іригації кореневого каналу?

а. 9%

б. 3%

с. 0,03%

д. 12%

е. 6%

14. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці зуба верхньої щелепи праворуч. Після огляду встановлено попередній діагноз: гострий обмежений пульпіт зуба 14. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Які показники ЕОД характерні для гострого

обмеженого пульпіту?

- a. 80-90 мкА
- b. 60-70 мкА
- c. 30-40 мкА
- d. 100 мкА
- e. 15-30 мкА

15. Який інструментарій на ортопедичному прийомі використовує лікар-стоматолог для вигинання кламерів?

- a. Зонд
- b. Крампонні щипці
- c. Байонетні щипці
- d. Елеватор
- e. Пінцет

16. Після використання стоматологічного інструментарію асистенту лікаря-стоматолога необхідно провести його дезінфекцію, передстерилізаційне очищення та стерилізацію. Який режим стерилізації стоматологічних інструментів у сухожаровій шафі?

- a. При температурі 200<sup>o</sup>C - 30 хв
- b. При температурі 140<sup>o</sup>C - 45 хв
- c. При температурі 120<sup>o</sup>C - 90 хв
- d. При температурі 160<sup>o</sup>C - 120 хв
- e. При температурі 180<sup>o</sup>C - 60 хв

17. Потерпілий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав черепно-мозкову травму та перелом щелепи. Як здійснити тимчасову зупинку сильної кровотечі в щелепно-лицьовій ділянці?

- a. Накласти холодний компрес
- b. Надати пацієнту положення з опущеною головою
- c. Накласти міхур з льодом
- d. Накласти джгут
- e. Притиснути загальну сонну артерію

18. Для проведення розширення кореневих каналів зуба 27 лікарю-стоматологу треба подати К-ример. Яким графічним символом позначено цей вид ендодонтичних інструментів?

- a. Трикутник
- b. Квадрат
- c. Коло
- d. Восьмикінцева зірочка
- e. П'ятикінцева зірочка

19. У пацієнта діагностовано дефект коронкової частини зуба 34, що відповідає II класу каріозних порожнин за Блеком. Визначте топографічне розміщення каріозної порожнини на поверхні зуба в цьому разі.

- a. Контактна поверхня
- b. Різальний край
- c. Жувальна поверхня
- d. Пришийкова ділянка
- e. Контактна поверхня з ураженням різального краю

20. Назвіть поверхню зуба, на якій найчастіше для профілактики карієсу проводять герметизацію?

- a. Контактна
- b. Оральна
- c. Жувальна
- d. -
- e. Вестибулярна

21. Вагітна жінка віком 26 років звернулася до лікаря-стоматолога для професійної гігієни

порожнини рота. Які насадки треба підготувати для проведення завершального етапу видалення зубних відкладень?

- a. Флосети
- b. Міжзубні стимулятори
- c. Міжзубні йоржики
- d. Гумові ковпачки**
- e. Мануальні скейлери

22. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект. Під час огляду виявлено, що зуб 11 змінений у кольорі (рожево-фіолетового відтінку). З анамнезу відомо: зуб був раніше ендодонтично лікований. Яка помилка під час ендодонтичного лікування може спричинити ці наслідки?

- a. Перфорація стінки кореневого каналу
- b. Недостатнє механічне оброблення кореневого каналу
- c. Травма периапікальних тканин
- d. Неправильний вибір пломбувального матеріалу**
- e. Виведення пломбувального матеріалу за верхівку кореневого каналу

23. Пацієнт скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці видаленого зуба 46, неприємний запах з рота. З анамнезу відомо, що п'ять днів тому проведено видалення зуба 46. Об'єктивно спостерігається: комірка видаленого зуба виповнена залишками згустка сірого кольору, слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий остеомієліт
- b. Невропатія трійчастого нерва
- c. Хронічний остеомієліт
- d. Гострий альвеоліт**
- e. Гострий періостит

24. Скільки зубів має повний сформований тимчасовий прикус?

- a. 12
- b. 20**
- c. 24
- d. 18
- e. 32

25. На якому етапі пломбування каріозної порожнини композитним матеріалом світлової полімеризації треба проводити <<фінішне>> засвічування матеріалу?

- a. Після внесення останньої порції матеріалу
- b. Після формування пломби
- c. Після остаточного оброблення пломби**
- d. Після шліфування пломби
- e. Після внесення кожної порції пломбувального матеріалу

26. Під час препарування каріозних порожнин використовуються алмазні бори різного ступеня зернистості. Який колір має маркувальне кільце алмазного бору, призначеного для кінцевого полірування композиційних реставрацій?

- a. Чорний
- b. Синій
- c. Білий**
- d. Зелений
- e. Червоний

27. Для індивідуального догляду за порожниною рота лікар-стоматолог порекомендував семирічній дівчинці зубну пасту з мікроелементами та призначив курс ремінералізаційної терапії. Який із нижченаведених методів належить до екзогенної профілактики карієсу?

- a. Уживання таблеток фториду натрію
- b. Додавання в їжу фторованої солі
- c. Уживання морепродуктів

- d. Уживання продуктів, багатих на кальцій та фтор  
e. Накладання фторвмісних лаків на поверхню зубів

28. На ортопантограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено осередок просвітлення округлої форми розміром до 5 мм у ділянці верхівки кореня зуба 34, кореневий канал якого частково заповнений пломбувальним матеріалом. З анамнезу відомо: раніше зуб 34 був ендодонтично лікований. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки?

- a. Гострий дифузний пульпіт  
b. Гострий серозний періодонтит  
c. Хронічний гранулематозний періодонтит  
d. Хронічний гранулюючий періодонтит  
e. Хронічний фіброзний пульпіт

29. Для лікування карієсу I класу за Блекум у постійних зубах використовують амальгаму. Який складник амальгами підвищує пластичність матеріалу та забезпечує щільне крайове прилягання пломби?

- a. Мідь  
b. Срібло  
c. Цинк  
d. Ртуть  
e. Олово

30. Що треба підготувати для лікаря-стоматолога з метою видалення надлишків композитного матеріалу та для попереднього полірування приясених ділянок реставрацій у ділянці переходу пломбувального матеріалу на емаль на контактних поверхнях зубів?

- a. Полірувальні штрипси  
b. Фінішні алмазні бори  
c. Полірувальні диски  
d. Полірувальні щітки  
e. Гумові головки

31. Яку температуру застосовують під час стерилізації паровим методом?

- a. 170-200<sup>°</sup>С  
b. 155-170<sup>°</sup>С  
c. 110-134<sup>°</sup>С  
d. 200-220<sup>°</sup>С  
e. 135-155<sup>°</sup>С

32. Укажіть відбитковий матеріал, що належить до групи на основі окису цинку й евгенолу та використовується для отримання відбитків індивідуальною ложкою при повній відсутності зубів на щелепі.

- a. Ортокор  
b. Speedex  
c. Фторакс  
d. Уреен  
e. Репін

33. Під час виконання азопірамової проби протягом 1 хв на одному інструменті з усієї партії з'явилося фіолетово-бузкове забарвлення. Що потрібно зробити в цьому разі?

- a. Промити всю партію інструментів під проточною водою  
b. Промити інструмент під проточною водою  
c. Здійснити повторне передстерилізаційне очищення всієї партії інструментів  
d. Простерилізувати всі інструменти, за винятком того, на якому виявилася позитивна азопірамова проба  
e. Ополоснути інструмент дистильованою водою та висушити

34. Яку пробу треба виконати для контролю якості передстерилізаційного очищення стоматологічного інструментарію від залишків крові?

- a. -
- b. Фенолфталеїнову
- c. Амідопіринову**
- d. Тетрациклінову
- e. З Суданом III

35. Як називається методика ендодонтичного лікування зубів під час якої кореневу частину пульпи насичують речовинами, що глибоко дифундують, муміфікують і перетворюють її на септичний тяж або склоподібну масу?

- a. Екстирпація
- b. Ремінералізація
- c. Імпрегнація**
- d. Девіталізація
- e. Ампутація

36. Які лампи використовують для знезараження повітря та поверхонь у стоматологічному кабінеті?

- a. Розжарювання
- b. Бактерицидні**
- c. Світлодіодні
- d. Люмінесцентні
- e. Фотополімерні

37. Укажіть, яку першу допомогу необхідно надати потерпілому при переломі нижньої щелепи в ментальному відділі без зміщення.

- a. Накласти пращоподібну пов'язку та скерувати потерпілого до щелепно-лицевого відділення**
- b. Накласти стискальну пов'язку в ділянці поранення та скерувати потерпілого до щелепно-лицевого відділення
- c. Накласти стискальну пов'язку в ділянці поранення та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення
- d. Накласти головну та стискальну пов'язки та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення
- e. Накласти пращоподібну пов'язку та скерувати потерпілого до отоларингологічного відділення

38. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубі 46 під час вживання гарячого. Після огляду встановлено попередній діагноз: хронічний гангренозний пульпіт. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Який діапазон показників ЕОД характерний для хронічного гангренозного пульпіту?

- a. Більше 100 мкА
- b. 50-90 мкА**
- c. -
- d. 15-30 мкА
- e. 30-40мкА

39. Лікар-стоматолог під час профілактичного огляду запропонував пацієнту розжувати таблетку синього кольору, а потім сполоснути ротову порожнину. Для чого лікар проводить цю процедуру?

- a. Виявлення запального процесу в яснах
- b. Контролю крайового прилягання пломб на зубах
- c. Виявлення каріозних порожнин
- d. Виявлення запального процесу на слизовій оболонці ротової порожнини
- e. Контролю гігієнічних навичок пацієнта**

40. Після стоматологічного обстеження підлітка віком 16 років лікар-стоматолог встановив діагноз: хронічний фіброзний пульпіт зуба 36. Пацієнту проведено ендодонтичне лікування. Яким інструментом проводять видалення судинно-нервового пучка?

- a. Плагером

- b. Спредером
- c. Римером
- d. Каналонаповнювачем
- e. Пульпоекстрактором

41. На якому тижні вагітності починається мінералізація зачатків перших молочних зубів?

- a. 23-му
- b. 30-му
- c. 9-му
- d. 6-му
- e. 17-му

42. Які інструменти необхідно підготувати для проведення обстеження стоматологічного пацієнта?

- a. Екскаватор, гладилка, дзеркало стоматологічне
- b. Зонд зубний зігнутий, дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний
- c. Дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний, екскаватор
- d. Штопфер, дзеркало стоматологічне, пінцет
- e. Зонд зубний зігнутий, шпатель, пінцет

43. Укажіть, за допомогою якої групи матеріалів лікарю-стоматологу найдоцільніше зняти відбиток для виготовлення металокерамічної коронки.

- a. Гіпсу медичного
- b. Термопластичних мас
- c. Композитних матеріалів
- d. Силіконових відбиткових матеріалів
- e. Альгінатних відбиткових матеріалів

44. Лікар-стоматолог під час препарування каріозної порожнини II класу за Блекум вибрав техніку тунельного методу. Який пломбувальний матеріал раціонально застосовувати в разі вибору цієї методики?

- a. Макрофільний композит
- b. Мікрофільний композит
- c. Склоіономерний цемент
- d. Текучий композит
- e. Гібридний композит

45. На прийомі в лікаря-стоматолога через емоційне напруження та страх перед маніпуляцією пацієнт відчув дискомфорт, відчуття нудоти, запаморочення, шум у вухах, неясність зору, нестачу повітря, появу холодного поту, оніміння язика, губ, кінчика носа. Який невідкладний стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

- a. Колапс
- b. Непритомність
- c. Алергічна реакція
- d. Анафілактичний шок
- e. Асфіксія

46. Укажіть, яке ускладнення може виникнути в пацієнта після операції з видалення зуба.

- a. Проштовхування зуба в м'які тканини
- b. Ушкодження зуба-антагоніста
- c. Альвеоліт лунки зуба
- d. Вивих нижньої щелепи
- e. Потраплення зуба в дихальні шляхи

47. Який найімовірніший шлях передачі вірусних гепатитів В, С та ВІЛ-інфекції в лікувально-профілактичних закладах у разі порушення правил асептики та санітарно-протиепідемічного режиму?

- a. Водний
- b. Аліментарний

с. Парентеральний

d. Контактний

е. Повітряно-краплинний

48. Дев'ятирічна дівчинка отримала опік шкіри обличчя оцтовою кислотою. Який розчин можна застосувати для нейтралізації травмуючої речовини в цьому разі після тривалого промивання ураженої ділянки водою?

a. 10%-ий розчин аміаку

b. 0,05%-ий хлоргексидину біглюконат

с. 5%-ий спиртовий розчин таніну

d. 2-5%-ий натрію гідрокарбонат

е. 96%-ий етиловий спирт

49. Для хірургічної дезінфекції рук рекомендовано застосовувати засоби на основі спирту. Яка частка спирту має бути в дезінфікуючих розчинах?

a. 65%

b. 40%

с. 30%

d. 55%

е. 100%

50. Під час стоматологічного обстеження підлітку віком 16 років встановлено діагноз: хронічний фіброзний пульпіт зуба 36 та проведено ендодонтичне лікування. Який ендодонтичний інструмент застосовують під час пломбування кореневих каналів?

a. Каналонаповнювач

b. К-ридер

с. U-файл

d. Пульпоекстрактор

е. К-файл

51. У клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт для видалення зуба 13. Які щипці треба приготувати лікарю-стоматологу-хірургу для проведення цієї операції?

a. Прямі

b. Зігнуті по ребру із щічками, що змикаються

с. Зігнуті по ребру із щічками, що не змикаються

d. Багнетоподібні

е. S-подібні

52. До устаткування стоматологічного кабінету належить електричний мікромотор. Який діапазон регулювання швидкості обертання бора має електричний мікромотор?

a. -

b. Від 100 до 1000 об/хв

с. Від 1000 до 40000 об/хв

d. Від 50000 до 100000 об/хв

е. Від 100000 до 300000 об/хв

53. Яка кістка належить до кісток лицьового черепа?

a. Вилична (парна)

b. Лобова

с. Клиноподібна

d. Тім'яна (парна)

е. Решітчаста

54. Під час обстеження тринадцятирічного хлопчика лікар-стоматолог виявив прогнатичний прикус. До патології в якій площині належить цей прикус?

a. Орбітальний

b. Мезіальний

с. Трансверзальний

d. Сагітальний



е. Вертикальний

55. Дівчина віком 15 років скаржиться на біль та кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх і верхніх фронтальних зубів набрякла, гіперемована, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки кровоточать від дотику, збільшені в розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 їхньої висоти. На зубах верхньої та нижньої щелеп встановлена незнімна ортодонтчна конструкція (брекет-система). Установіть попередній діагноз.

**а. Гіпертрофічний гінгівіт**

б. Виразковий гінгівіт

с. Генералізований пародонтит

д. Фіброматоз ясен

е. Катаральний гінгівіт

56. Під час роботи виїзної стоматологічної станції проводилося лікування карієсу зубів у дітей молодших класів. Який пломбувальний матеріал використовується під час застосування ART-методики лікування карієсу в дітей?

а. Текучий композит

**б. Склоіономерний цемент**

с. Компомер

д. Силікатний цемент

е. Композит хімічної полімеризації

57. Який термін зберігання простерилізованих медичних виробів у стерилізаційних коробках з фільтром?

а. 16 діб

**б. 20 діб**

с. 10 діб

д. 3 доби

е. 28 діб

58. Під час стоматологічного прийому лікар одягнув нову медичну маску. Як часто треба змінювати маску?

а. Кожні 4 год

б. Кожні 6 год

с. Кожні 5 год

**д. Кожні 2 год**

е. Кожні 3 год

59. Під час профілактичного огляду пацієнту проводили оцінку гігієнічного стану порожнини рота за допомогою фарбування жувальними таблетками. Окрім зубних відкладень на вестибулярній поверхні зубів 42, 43 виявлено плями, що зафарбувалися барвником. Про який патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

**а. Гострий початковий карієс**

б. Ерозія емалі

с. Гіоплазія емалі

д. Хронічний поверхневий карієс

е. Гострий поверхневий карієс

60. Який інструмент використовують для механічного розширення корневих каналів?

а. Коренева голка

б. Каналонаповнювач

с. Плагер

**д. Дрильбор**

е. Спредер

61. Стоматологічне дзеркало застосовують для огляду порожнини рота. Яке зображення дає поверхня дзеркала?

а. Пряме, зменшене, дійсне

- b. Пряме, зменшене, уявне
- c. Обернене, збільшене, уявне
- d. Пряме, збільшене, уявне
- e. Обернене, збільшене, дійсне

62. Ротова порожнина є початком травної системи і складається з присінка та власне порожнини рота. Укажіть межі власне порожнини рота.

- a. Зверху - вуздечка верхньої губи, знизу - вуздечка нижньої губи, спереду - зуби, знизу - язик
- b. Зверху та знизу - присінок ротової порожнини, спереду - язик та зуби, з боків - ясна та зуби
- c. Зверху - тверде піднебіння, знизу - м'язи дна порожнини рота, спереду - альвеолярний відросток, з боків - щоки
- d. Зверху та знизу - альвеолярний відросток, вкритий слизовою оболонкою, спереду - присінок, з боків - слизова оболонка щік
- e. Зверху - тверде та м'яке піднебіння, знизу - язик та дно порожнини рота, спереду та з боків - ясна та зуби

63. Пацієнт скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи, кровотечу з носа. Об'єктивно спостерігається: рухомість верхньої щелепи, подовження середньої третини обличчя, кровотеча з носа, нудота, блювання, крововилив у кон'юнктиву. Яке травматичне ушкодження виникло?

- a. Вивих верхньої щелепи
- b. Перелом нижньої щелепи
- c. Вивих нижньої щелепи
- d. Перелом зуба
- e. Перелом верхньої щелепи

64. Пораненому надається допомога згідно з алгоритмом MARCH. Якою літерою позначено етап виявлення черепно-мозкових травм?

- a. C
- b. M
- c. H
- d. R
- e. A

65. Одним із етапів препарування каріозної порожнини є некректомія розм'якшеного дентину. Який інструмент треба підготувати для проведення цього етапу препарування?

- a. Твердосплавний бор
- b. Фінір
- c. Алмазний бор
- d. Полір
- e. Карборундова головка

66. Укажіть, чи можна накладати стискальну пов'язку або джгут при пораненні в шию та кровотечі з сонної артерії.

- a. Так, можна. Але з протилежного боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка
- b. Так, можна. Але з боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка
- c. Ні, не можна. Інакше буде механічна асфіксія, бо пов'язка накладається на усю шию
- d. Ні, не можна. Інакше буде гіпоксія мозку, що не сумісна з життям
- e. Так, можна. Але проводиться трахеотомія

67. На терапевтичному прийомі лікар-стоматолог використовує алмазні бори, що відрізняються за розміром робочої частини, властивостями алмазу, щільністю посадки алмазного зерна. Який середній розмір зерна в алмазного бора з червоним маркуванням?

- a. 135 мкм
- b. 100 мкм
- c. 50 мкм

- d. 30 мкм
- e. 180 мкм

68. Батьки шестимісячної дівчинки скаржаться на наявність сироподібного нальоту на слизовій оболонці щік та язика в дитини. Після огляду лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий кандидозний стоматит. Який збудник викликає це захворювання?

- a. Вірус герпесу
- b. Спірохета Венсана
- c. Паличка Леффлера
- d. Веретеноподібна паличка
- e. Дріжджоподібні гриби

69. Пацієнтці віком 35 років встановлено діагноз: ерозія твердих тканин зубів 11, 21, 34, 35, 44, 45. Який матеріал треба підготувати для пломбування в цьому разі?

- a. Склоіономерний цемент
- b. Композитний матеріал світлової полімеризації
- c. Композитний матеріал хімічної полімеризації
- d. Силікатний цемент
- e. Амальгаму

70. П'ятнадцятирічному хлопцю планується видалення зуба 14 за ортодонтичними показаннями. Коронка зуба збережена. Які щипці треба підготувати для видалення?

- a. Дзьобоподібні зі щічками, що сходяться
- b. Прямі
- c. S-подібні
- d. Байонетні
- e. Дзьобоподібні зі щічками, що не сходяться

71. Після стоматологічного прийому необхідно провести стерилізацію медичних виробів, у конструкції яких використовуються термолабільні матеріали. Який метод стерилізації доцільно застосувати?

- a. Кип'ятіння
- b. Паровий
- c. Хімічний
- d. Повітряний
- e. -

72. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування зуба 37. Який метод дослідження треба виконати для контролю якості проведеного лікування?

- a. Рентгенологічне дослідження
- b. Глибоке зондування
- c. Бактеріологічне дослідження
- d. Термопробу
- e. ЕОД

73. Після використання стоматологічного інструментарію була проведена його дезінфекція та передстерилізаційне очищення. Яка мета передстерилізаційного очищення?

- a. Знищення всіх видів мікроорганізмів
- b. Видалення білкових, жирових та механічних забруднень
- c. Знищення патогенних видів мікроорганізмів
- d. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- e. Знищення вірусів

74. Що із нижченаведеного належить до загальної профілактики карієсу?

- a. Покриття поверхні зубів фторлаком
- b. Герметизація фісур
- c. Вживання таблеток фториду натрію
- d. Полоскання ремінералізаційними розчинами
- e. Раціональна гігієна порожнини рота

75. Чим треба закапати очі після їх промивання проточною водою у разі потрапляння стороннього тіла на слизову оболонку очей?

- a. 0,1%-м розчином перманганату калію
- b. 30%-м розчином альбуциду**
- c. 0,12%-м розчином хлоргексидину
- d. 0,0002%-м розчином кетаміну
- e. 1%-м розчином фурациліну

76. Одним із найрозповсюдженіших та доступних засобів місцевої профілактики карієсу зубів у наш час треба вважати використання фторвмісних зубних паст. Яка найнижча межа норми фтору в питній воді?

- a. 1 мг/л
- b. 0,3 мг/л
- c. 1,2 мг/л
- d. 2 мг/л
- e. 0,5 мг/л**

77. У пацієнта виявлено каріозну порожнину, розташовану на різальному краї різця, що утворилася через стирання емалі і оголення дентину. До якого класу за класифікацією Блека належить ця каріозна порожнина?

- a. VI**
- b. III
- c. IV
- d. II
- e. I

78. У пацієнта діагностовано передпухлинний процес слизової оболонки порожнини рота. Лікар пояснив, що без належного лікування з часом він обов'язково призведе до розвитку раку. Який діагноз встановлено пацієнту?

- a. Кератоакантома
- b. Обмежений гіперкератоз**
- c. Шкірний ріг
- d. Лейкоплакія
- e. Папіломатоз

79. Дівчина віком 16 років під час тренування на спортивній секції отримала травму. Скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи праворуч. Під час огляду порушення цілісності шкірних покривів не виявлено, спостерігається незначний набряк у ділянці тіла нижньої щелепи праворуч, відкривання рота не обмежене. Яку невідкладну допомогу треба надати в цьому разі?

- a. Холод на травмовану ділянку в перші 30 хв**
- b. Компрес 2-5%-им розчином натрію гідрокарбонату
- c. Застосувати слабодезінфікуючу мазь
- d. Призначити протинабрякову терапію
- e. Обробити ділянку шкіри антисептиком

80. Яка помилка під час пломбування каріозних порожнини може призвести до виникнення папіліту, гінгівіту, пародонтиту?

- a. Неправильне накладання ізоляційної прокладки
- b. Завищення висоти оклюзії на пломбі
- c. -
- d. Відсутність контактного пункту**
- e. Неправильний вибір пломбувального матеріалу

81. Після проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичний інструментарій є підготовленим до етапу стерилізації. Хто має право проводити стерилізацію медичних інструментів?

- a. Середній медичний персонал, який має відповідну підготовку**

- b. Будь-які працівники відділення
- c. Працівники, які пройшли навчання
- d. Медичний персонал, який пройшов інструктаж із техніки безпеки
- e. Санітарки

82. Укажіть назву частини порожнини рота, що обмежена губами і щоками зовні та зубами і яснами зсередини.

- a. Власне порожнина рота
- b. Ретромоларна ділянка
- c. Слизова оболонка рота
- d. Перехідна складка рота
- e. Присінок порожнини рота

83. Пацієнту з гострим періодонтитом зуба 47 проведено інфільтраційну анестезію в ділянці набряклих тканин навколо зуба. Після введення анестетика пацієнт не відчув змін. Чому ефект знеболювання не настав?

- a. -
- b. Неправильно вибраний вид анестезії
- c. Недостатня кількість введенного препарату
- d. Лікування не потребує знеболювання
- e. Алергічна реакція на анестетик

84. У пацієнтки віком 26 років під час лікування гострого глибокого карієсу зуба 36 випадково була відкрита пульпова камера зуба. Який лікарський засіб треба підготувати в цьому разі?

- a. Склоіономерний цемент
- b. Пасту на основі параформальдегіду
- c. Ізоляційну прокладку
- d. Одонтотропну пасту
- e. Пасту на основі миш'яку

85. Назвіть відбитковий матеріал, що належить до силіконової групи і застосовується під час виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза.

- a. Speedex
- b. Редонт
- c. Уреен
- d. Ортокор
- e. Репін

86. Під час лікування карієсу пацієнту було встановлено пломбу з амальгами без ізоляційної прокладки. Яке ускладнення може розвинути в цьому разі?

- a. Випадіння пломби
- b. Запалення пульпи
- c. Папіліт
- d. Верхівковий періодонтит
- e. Вторинний карієс

87. Пацієнту віком 50 років на прийомі в лікаря-стоматолога потрапило стороннє тіло у верхні дихальні шляхи, що спричинило обтураційну асфіксію. Укажіть подальші дії лікаря, якщо дістати стороннє тіло неможливо.

- a. Проводимо трахеотомію
- b. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо непрямий масаж серця
- c. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо штучну вентиляцію легень
- d. Проводимо інтубацію
- e. Проводимо поштовхи за Геймліхом

88. Яке положення треба надати пацієнту в разі стану непритомності?

- a. На боці
- b. Сімса
- c. Тренделенбурга

- d. На животі
- e. Фаулера

89. Назвіть блок стоматологічної установки, до складу якого входять скейлер та наконечники.

- a. Стоматологічне крісло
- b. -
- c. Блок управління
- d. Освітлювальний блок
- e. Блок інструментів

90. До лікаря-стоматолога звернувся хлопець віком 18 років зі скаргами на випадіння зуба 11 після отриманої травми годину тому. Було вирішено зуб помістити у власну комірку альвеолярного відростка та провести шинування. Як називається ця операція?

- a. Гемісекція
- b. Імплантація
- c. Ампутація
- d. Трансплантація
- e. Реплантація

91. Одним із етапів проведення ендодонтичного лікування в постійних зубах є розширення корневих каналів. Яким ендодонтичним інструментом проводиться розширення корневих каналів?

- a. Каналонаповнювачем
- b. Спредером
- c. Пульпоекстрактором
- d. К-файлом
- e. Плагером

92. У стоматологічній клініці провели стерилізацію використаних інструментів паровим методом без індивідуального пакування. Ці інструменти склали на стерильних столах та накрили стерильними простирадлами. Скільки часу інструменти можуть зберігати свою стерильність у цьому разі?

- a. 6 год
- b. 9 год
- c. 12 год
- d. 48 год
- e. 24 год

93. Для постійного пломбування каріозної порожнини I класу за Блекум був використаний пломбувальний матеріал світлового затвердіння. Які компоненти входять до складу композитів світлового затвердіння?

- a. Тільки порошок
- b. Тільки паста
- c. Порошок-рідина
- d. Паста-паста
- e. Паста-рідина

94. Лікар-стоматолог-хірург планує видалення зуба пацієнту через загострення хронічного періодонтиту. Лікар просить подати йому багнетоподібні щипці. Який зуб планується видаляти?

- a. 46 зі збереженою коронковою частиною
- b. 36 зі зруйнованою коронковою частиною
- c. 33 зі збереженою коронковою частиною
- d. 16 зі зруйнованою коронковою частиною
- e. 26 зі збереженою коронковою частиною

95. Під час огляду семирічної дівчинки лікар-стоматолог виявив на присінкових поверхнях зубів 11, 21, 31, 41 і на горбиках зубів 16, 26, 36, 46 темні плями. З анамнезу відомо, що зуби прорізалися ураженими. Лікар встановив діагноз: флюороз. Надлишок якого хімічного

елемента в питній воді буде причиною виникнення цього захворювання?

- a. Фосфору
- b. Фтору**
- c. Йоду
- d. Заліза
- e. Кальцію

96. Який комплекс заходів буде здійснювати асистент лікаря-стоматолога для знищення мікроорганізмів у рані та в патологічному осередку?

- a. Антисептику**
- b. Асептику
- c. Передстерилізаційне очищення
- d. Дезінфекцію
- e. Стерилізацію

97. Розуміння будови та функцій різних частин ясен допомагає лікарям-стоматологам в ефективному веденні лікування пацієнтів та догляду за здоров'ям порожнини рота. Укажіть, на які частини поділяють ясна.

- a. Прикріплені та вільні**
- b. Тверді та м'які
- c. Внутрішні та зовнішні
- d. Епітеліальні та базальні
- e. -

98. У пацієнта віком 45 років лікар-стоматолог діагностував гострий обмежений пульпіт зуба 44. Об'єктивно спостерігається: порожнина рота санована, гігієна в задовільному стані. З анамнезу відомо: пацієнт соматично здоровий. Що є протипоказанням до лікування пульпіту біологічним методом у цьому разі?

- a. Соматичні захворювання
- b. Інтенсивність каріозного процесу
- c. Вік понад 30-35 років**
- d. Вік понад 18-20 років
- e. Стан гігієни порожнини рота

99. На ортопантограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня зуба 35. Скарг немає, перкусія і термопроба негативні, раніше зуб 35 був лікований з приводу глибокого карієсу. Для якого захворювання характерні ці рентгенологічні ознаки?

- a. Хронічний гранулюючий періодонтит
- b. Хронічний фіброзний періодонтит**
- c. Гострий дифузний пульпіт
- d. Хронічний фіброзний пульпіт
- e. Гострий серозний періодонтит

100. Назвіть відбитковий матеріал, що належить до альгінатної групи і використовується для виготовлення часткового знімного пластинкового протеза.

- a. Уреен**
- b. Протакрил
- c. Ортокор
- d. Репін
- e. Speedex

101. Виберіть метод лікування хронічного середнього карієсу тимчасового моляра в шестирічної дитини.

- a. Протезування
- b. Пломбування**
- c. Ремінералізація
- d. Видалення

е. Герметизація

102. Під час обстеження порожнини рота пацієнта було виявлено, що внаслідок звуження верхньої зубної дуги щічні горбки нижніх бічних жувальних зубів розташовані назовні від однойменних верхніх, фронтальні зуби змикаються правильно. Який прикус має пацієнт?

а. Відкритий

б. Глибокий

с. Перехресний

д. Прогенічний

е. Прогнатичний

103. Пацієнту віком 25 років проводять пломбування зубів 44, 45 та 46. Для ізоляції відпрепарованих порожнин від ротової рідини використовують тонкий квадрат з латексу. За допомогою якого інструмента зроблено отвори для ізоляції зубів?

а. Щипці-затискачі

б. Крампонні щипці

с. Щипці-пробійник

д. Щипці для накладання кламерів

е. Байонетні щипці

104. Для яких маніпуляцій використовують спредер під час ендодонтичного лікування?

а. Горизонтальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

б. Внесення пломбувального матеріалу в кореневий канал

с. Розпломбування корневих каналів під час повторного ендодонтичного лікування

д. Латеральної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

е. Вертикальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

105. Яка кількість коренів та корневих каналів найчастіше спостерігається в нижньому першому і другому премолярах?

а. Два корені, один канал

б. Два корені, два канали

с. Три корені, три канали

д. Один корінь, один канал

е. Один корінь, два канали

106. Під час лікування карієсу зуба 16 у підлітка віком 15 років для пломбування застосовано композитний матеріал, що має розмір частинок наповнювача 8-45 мкм. Який композитний матеріал застосовано для пломбування?

а. Гібридний

б. Макрофільний

с. Нанонаповнений

д. Мікрофільний

е. Мікрогібридний

107. Підліток віком 14 років звернувся до лікаря-стоматолога для планової санації. Під час стоматологічного огляду лікар виявив порушення крайового прилягання пломби в зубі 16. Яким інструментом проводять визначення крайового прилягання пломби?

а. Зондом

б. Шпателем

с. Штопфером

д. Екскаватором

е. Гладилкою

108. Пацієнтка скаржиться на самовільний наростаючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч, що посилюється під час накушування. З анамнезу відомо: тиждень тому було проведено лікування глибокого карієсу зуба 44. Об'єктивно спостерігається: вертикальна перкусія зуба 44 різкоболісна, ЕОД - 100 мкА, рентгенологічно виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня зуба 44. Яка тактика надання допомоги?



- a. Видалити зуб
- b. Розкрити порожнину зуба та кореневий канал**
- c. Провести корекцію пломби
- d. Видалити пломбу
- e. Замінити пломбу

109. Яка помилка, що виникла під час препарування каріозної порожнини, може викликати виникнення вторинного карієсу?

- a. Обламування стінки каріозної порожнини
- b. Ушкодження бором прилеглих зубів
- c. Недостатнє препарування**
- d. Перфорація дна каріозної порожнини
- e. Перфорація стінки каріозної порожнини

110. Який з елементів будови скронево-нижньощелепного суглоба має еліпсоподібну форму, у 2-3 рази більший за суглобову головку, укритий хрящем, знаходиться на скроневій кістці?

- a. Суглобовий горбок
- b. Суглобова ямка**
- c. Внутрішньосуглобовий диск
- d. Суглобова капсула
- e. Суглобова головка

111. Під час стоматологічного прийому пацієнт знепритомнів, почалися клонічні та тонічні судоми, спостерігається посилене пінисте слиновиділення, мимовільне сечовипускання та дефекація. Який стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

- a. Анафілактичний шок
- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Епілептичний напад**
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Колапс

112. Під час препарування каріозної порожнини лікар повинен працювати з перервами за відповідної кількості обертів бора та його охолодження. Яке ускладнення виникає у разі недотримання цієї рекомендації?

- a. Збільшення пилу у повітрі
- b. Швидке зношування наконечника
- c. Запалення або загибель пульпи**
- d. Ушкодження прилеглих зубів
- e. Швидке затуплення борів

113. У пацієнтки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину на жувальній поверхні зуба 35 зі світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини зуба дещо болюче. Який інструмент треба вибрати для некректомії?

- a. Зонд
- b. Штопфер
- c. Алмазний бор
- d. Екскаватор**
- e. Гладилку

114. Під час оброблення каріозної порожнини лікар-стоматолог видаляє всі патологічно змінені тканини зуба. Що спричиняє зміну кольору коронки зуба після неякісного препарування каріозної порожнини?

- a. Значне стоншення шару емалі
- b. Опік твердих тканин зуба
- c. Запалення та пошкодження ясенного сосочка
- d. Перегрів та запалення пульпи зуба
- e. Розм'якшений дентин насичується пігментами**

115. Лікар-стоматолог планує провести обстеження первинного пацієнта. Для цього він

просить асистента подати градуированный зонд. З якою метою лікар-стоматолог використовує цей інструмент?

- a. Провести замірювання довжини вуздечки язика
- b. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах верхньої щелепи
- c. Провести дослідження міжзубних сосочків
- d. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах нижньої щелепи
- e. Дослідити глибину зубо-ясенного прикріплення**

116. Під час ортопедичного прийому планується зняття відбитків щелеп. Укажіть, який інструментарій необхідний лікарю-стоматологу-ортопеду для отримання відбитка альгінатною масою.

- a. Каталізатор та інгібітор
- b. Шпатель для замішування та стоматологічне скельце
- c. Гумові рукавички та каталізатор для затвердіння
- d. Блокнот для замішування та стоматологічне скельце
- e. Гумова колба та шпатель для замішування**

117. Що насамперед треба зробити у випадку потрапляння хімічної речовини в око під час надання першої допомоги?

- a. Закапати в уражене око очні краплі
- b. Накласти пов'язку на уражене око
- c. Накласти антисептичну мазь
- d. Промити уражене око чистою водою**
- e. -

118. Під час профілактичного огляду дітей віком 8-12 років лікар-стоматолог іноді виявляє білі плями на вестибулярних поверхнях фронтальної групи зубів верхньої щелепи, що прорізалися з цими дефектами. Під час вітального фарбування плями не зафарбовуються. Про який імовірний діагноз свідчать ці ознаки?

- a. Гострий початковий карієс
- b. Ерозія емалі
- c. Некроз емалі
- d. Гострий поверхневий карієс
- e. Гіпоплазія емалі**

119. Який препарат треба підготувати в разі виникнення гіпоглікемічної коми в пацієнта?

- a. 0,05%-ий строфантину
- b. 0,5%-ий розчин дибазолу
- c. 40%-ий розчин глюкози**
- d. 2,4%-ий розчин еуфіліну
- e. 20 ОД інсуліну

120. Який час перебування (експозиції) стоматологічного інструментарію в дезінфекційному розчині 3%-го хлораміну?

- a. 60 хв**
- b. 90 хв
- c. 45 хв
- d. 30 хв
- e. 50 хв

121. Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного середнього карієсу зуба 11. Пломбування каріозної порожнини буде здійснюватися композитним матеріалом світлового твердіння. Яка лампа необхідна для роботи з композитними матеріалами світлового твердіння?

- a. Солюксова
- b. Фотополімерна**
- c. Світлодіодна
- d. Люмінесцентна
- e. Кварцева

122. Пацієнту показано видалення зубів 21, 22 через загострення хронічного періодонтиту. Коронкові частини зубів 21, 22 зруйновані на 1/2. Який інструмент треба вибрати для видалення?

- a. Дзьобоподібні щипці
- b. Кутовий елеватор
- c. Байонетні щипці
- d. S-подібні щипці
- e. Прямі щипці**

123. Для дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у стоматологічній клініці передбачено проведення генерального прибирання в комплексі заходів, спрямованих на попередження поширення інфекції. Укажіть, з якою кратністю проводиться цей вид прибирання.

- a. На початку робочої зміни
- b. Щодня
- c. 1 раз на місяць
- d. 1 раз на тиждень**
- e. У кінці робочої зміни

124. Пацієнт віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби та наявність великої каріозної порожнини в зубі 37. З анамнезу відомо, що раніше в зубі було проведено ендодонтичне лікування. Для відновлення анатомічної форми зуба лікар вирішив застосувати методику <<сэндвіч-техніки>>. Які матеріали потрібно підготувати асистенту лікаря-стоматолога для пломбування каріозної порожнини?

- a. Композит та склоіономерний цемент**
- b. Текучий композит та компомер
- c. Текучий композит та силікатний цемент
- d. Композит та силікофосфатний цемент
- e. Компомер та силікатний цемент

125. У підлітка віком 17 років для пломбування карієсу зуба 16 лікар-стоматолог застосував амальгаму. Яким інструментом амальгамову масу вносять у підготовлену порожнину?

- a. Екскаватором
- b. Гладилкою
- c. Кюретою
- d. Штопфером
- e. Амальгамтрегером**

126. До комплексної програми профілактики основних стоматологічних захворювань входить обстеження стану тканин пародонту. Який діагностичний індекс треба застосувати, щоб оцінити потребу в лікуванні захворювань тканин пародонту в дітей віком 15 років?

- a. РМА (Парма)
- b. ОНІ-S (Гріна-Вермільйона)
- c. PI (Рассела)
- d. CPITN (BOO3)**
- e. Індекс Рамф'єрда

127. Під час препарування каріозної порожнини в межах емалі використовують турбінні наконечники. Яку швидкість обертання бора може забезпечити цей наконечник?

- a. 15000-20000 об/хв
- b. 300000-400000 об/хв**
- c. 20000-70000 об/хв
- d. 50000-100000 об/хв
- e. 100000-200000 об/хв

128. Лікар-стоматолог проводить визначення індексу гігієни Федорова-Володкіної в дітей молодшого шкільного віку. Який розчин треба підготувати для проведення цієї процедури?

- a. Фурациліну

- b. Метиленового синього
- c. Еритрозину
- d. Фуксину

**e. Йодисто-калієвий**

129. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект переднього зуба. Після огляду встановлено діагноз: гострий середній карієс зуба 23 із локалізацією каріозної порожнини в пришийковій ділянці. Для якого класу каріозних порожнин за Блекум характерна ця локалізація дефекту?

- a. II
- b. IV
- c. III
- d. I

**e. V**

130. Яку назву має хейліт, спричинений підвищеною чутливістю червоної облямівки губ до інсоляції?

**a. Актинічний**

- b. Метеорологічний
- c. Ексфоліативний
- d. Атопічний
- e. Екзематозний

131. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування першого премоляра верхньої щелепи. Який варіант рентгенологічного дослідження треба провести асистенту лікаря-стоматолога?

- a. Прикусний рентген
- b. Контрастний рентген
- c. Тривимірний рентген
- d. Панорамний рентген

**e. Прицільний рентген**

132. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт віком 40 років зі скаргами на виникнення післяопераційної чутливості в ділянці зуба 21 після проведення значної реставрації. Який препарат треба приготувати асистенту для усунення чутливості твердих тканин зубів?

**a. Кондиціонер**

**b. Десенситайзер**

- c. Компомер
- d. Ормокер
- e. Пасту з тимолом

133. Асистент лікаря-стоматолога проводить рентгенологічне дослідження зубів 24, 25 та 26. Які з обстежуваних зубів мають найчастіше три корені?

- a. Верхні премоляри
- b. Нижні премоляри

**c. Верхні моляри**

- d. Нижні моляри
- e. Верхні ікла

134. Чим обумовлена поява трем та діастем між молочними зубами в період підготовки заміни їх на постійні?

- a. Короткими комірковими відростками щелеп
- b. Подовженими комірковими відростками щелеп
- c. Ростом щелеп, більшим розміром зачатків постійних зубів**
- d. Надмірним жувальним навантаженням
- e. Широкою коронковою частиною молочного зуба

135. Які антисептики належать до групи окисників?

- a. Хлорамін Б, хлоргексидину біглюконат

- b. Карболова кислота, соляна кислота
- c. Фурацилін, фуразолідон
- d. Мурашина кислота, борна кислота
- e. Перекис водню, калію перманганат**

136. Як називається патологічний процес, що розвивається після прорізування зубів і характеризується демінералізацією та руйнуванням твердих тканин зуба із подальшим утворенням дефекту у вигляді порожнини.

- a. Періодонтит
- b. Пульпіт
- c. Пародонтит
- d. Карієс**
- e. Остеомієліт

137. Назвіть, з яких частин складається перший постійний моляр на верхній щелепі праворуч.

- a. Коронка, шийка, корінь**
- b. Ясна, корінь, пародонт
- c. Коронка, корінь, альвеолярний відросток
- d. Корінь, пародонт, альвеолярний відросток
- e. Коронка, шийка, ясна

138. Яке з передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ належить до факультативних передраків із низькою потенційною злоякісністю?

- a. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ
- b. Еритроплакія Кейра
- c. Бородавчастий передрак червоної облямівки губ
- d. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті
- e. Папіломатоз піднебінний**

139. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка віком 17 років зі скаргами на наявність глибокої каріозної порожнини в зубі. Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий глибокий карієс зуба 26. Для проведення лікування асистент лікаря-стоматолога підготувала пасту на основі кальцію гідроксиду. Яка дія препарату?

- a. Знеболювальна, седативна
- b. Седативна, адгезивна
- c. Адгезивна, протизапальна
- d. Протизапальна, одонтотропна**
- e. Антисептична, знеболювальна

140. Після використання ендодонтичного інструментарію помічник лікаря-стоматолога провів його дезінфекцію та передстерилізаційне очищення. Яка мета дезінфекції?

- a. Знищення патогенних та умовно-патогенних видів мікроорганізмів**
- b. Знищення білкових, жирових забруднень
- c. Механічне знищення забруднень
- d. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- e. Знищення залишків лікарських препаратів

141. Що належить до допоміжного обладнання стоматологічного кабінету?

- a. Стоматологічна установка
- b. Стоматологічне крісло
- c. Стоматологічний пересувний стілець
- d. Рукомийник для миття рук
- e. Стоматологічний рентген апарат**

142. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляду виявлено каріозну порожнину в зубі 45 в межах плащового дентину світлого кольору, що легко знімається за допомогою екскаватора. З анамнезу відомо, що пацієнт відзначає больові відчуття під час вживання солодкого в ділянці цього зуба. Про який

патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

- a. Гострий поверхневий карієс
- b. Гострий середній карієс**
- c. Хронічний глибокий карієс
- d. Гострий глибокий карієс
- e. Хронічний середній карієс

143. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт, якому три тижні тому було видалено зуб, зі скаргами на наявність незакритого дефекту слизової оболонки в ділянці видаленого зуба. Об'єктивно спостерігається: порушення закриття лунки в місці видаленого зуба, розростання грануляцій, слизова оболонка в ділянці лунки синюшна. Про яке захворювання можуть свідчити ці ознаки?

- a. Хронічний остеомієліт
- b. Абсцес
- c. Хронічний періостит
- d. Хронічний альвеоліт**
- e. Гострий остеомієліт

144. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення коренів зубів 37 та 36. Пацієнту планується проведення аплікаційної анестезії перед проведенням провідникової анестезії. Яка концентрація розчину лідокаїну використовується для аплікаційної анестезії?

- a. 30%
- b. 15%
- c. 20%
- d. 25%
- e. 10%**

145. Вагітна жінка віком 25 років скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, що з'явилися на п'ятому місяці вагітності. Для диференційної діагностики захворювання лікар вирішив провести кольоровий тест. Який барвник треба підготувати для проведення тесту?

- a. 2%-ий розчин метиленового синього**
- b. 0,2%-ий розчин хлоргексидину
- c. 2%-ий розчин фтористого натрію
- d. Йодинол
- e. Йодовмісний розчин Шіллера-Писарєва

146. Під час огляду порожнини рота дванадцятирічної дівчинки виявлено, що верхні фронтальні зуби повністю перекривають нижні. Бічні зуби в сагітальній і трансверзальній площинах зникають в межах норми. Установлено діагноз: глибокий прикус. Порушенням яких функцій супроводжується ця аномалія?

- a. Дихання, ковтання
- b. Відкушування їжі, дихання
- c. Жування, ковтання
- d. Дихання, порушення дикції
- e. Відкушування їжі, вимова звуків**

147. Уявіть, що ви стали свідком надзвичайної ситуації та помітили постраждалого. Виберіть крок, згідно з алгоритмом MARCH, який є найпріоритетнішим до виконання?

- a. Відновлення дихання
- b. Накладання шини
- c. Запобігання гіпотермії
- d. Зупинка кровотечі**
- e. Особиста безпека

148. Пацієнтка віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття оскоми на зубах верхньої щелепи протягом двох тижнів. Під час огляду в пришийковій ділянці зубів 11 та 21 виявлено білі плями з матовим відтінком та нечіткими контурами, що

інтенсивно сприймають барвники. Що треба підготувати для проведення лікування?

- a. Муміфікуючу пасту
- b. Композитний матеріал
- c. Антисептичні розчини
- d. Нітрат срібла для імпрегнації
- e. Ремінералізаційні розчини**

149. Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини II класу за Блекум. У каріозну порожнину після нанесення адгезивної системи потрапила кров. Яка тактика в цьому разі?

- a. Повторне кислотне протравлювання емалі та дентину та нанесення адгезиву**
- b. Провести повторне протравлювання дентину, нанести адгезив
- c. Промити та висушити каріозну порожнину, нанести адгезив
- d. Обробити каріозну порожнину 3%-м перекисом водню, нанести адгезив
- e. Обробити каріозну порожнину спиртом, нанести адгезив

150. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубах нижньої щелепи від термічних та хімічних подразників. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці зубів 35, 34, 44, 45 дефекти в межах дентину з гладкими, блискучими стінками, що сходяться під кутом. Який найімовірніший діагноз?

- a. Клиноподібний дефект**
- b. Некроз твердих тканин
- c. Системна гіоплазія емалі
- d. Ерозія емалі
- e. Гострий середній карієс