

1. В залежності від шляхів впливу на стан твердих тканин зуба профілактика здійснюється, як через вплив на організм так і безпосередньо на тверді тканини зуба. У чому полягає ендогенна профілактика карієсу зубів?

a. Використання ремінералізуючих розчинів

b. Системне призначення сполук фтору

c. Раціональна гігієна порожнини рота

d. Покриття поверхні зубів фторвмісними лаками

e. Герметизація фісур

2. Пацієнт звернувся до стоматологічної клініки для санації ротової порожнини. Під час огляду гігієніст зубний виявив рухомість 34 зуба. Об'єктивно спостерігається: зуб вітальний, слизова оболонка навколо зуба блідо-рожевого кольору, візуалізується рецесія ясен у ділянці кореня зуба. Установлено, що зуб рухомий у напрямку вестибулярної та оральної поверхонь. Який ступінь рухомості зуба визначено у цьому разі?

a. -

b. II

c. III

d. I

e. IV

3. На консультацію до гігієніста зубного звернувся юнак віком 19 років зі скаргами на чутливість зубів від солодкого та кислого. Об'єктивно спостерігається: у пришийкових ділянках 11, 12, 21, 42 зубів крейдяного вигляду плями білого кольору з матовою поверхнею, безболісні під час зондування. Установлено попередній діагноз: гострий початковий карієс 11, 12, 21, 42 зубів, V клас за Блекум. Який метод діагностики карієсу в стадії білої плями доцільно застосувати?

a. Термодіагностику

b. Рентгенографію

c. Вітальне фарбування

d. Електроодонтометрію

e. Перкусію

4. Сітка Уїкхема використовується для діагностики:

a. Міхурника

b. Псоріазу

c. Рожевого лишая

d. Червоного плоского лишая

e. Екземи

5. Пацієнт звернувся до гігієніста зубного з метою профілактичного огляду, але очікуючи в кріслі він раптово почав задихатися, обличчя покритися липким потом, розвинувся акроціаноз, дихання стало клекочучим, на губах з'явилася рожева піна. Який патологічний стан міг розвинутися у пацієнта?

a. набряк легень

b. Анафілактичний шок

c. набряк Квінке

d. Непритомність

e. Напад епілепсії

6. Гігієніст зубний проводить процедуру видалення твердих зубних відкладень за допомогою ультразвукового скейлера. Як називається явище, що виникає у воді під дією ультразвукових коливань та без зміни сили тиску руйнує зубний камінь?

a. Імпрегнація

b. Кавітація

c. Вакуум-масаж

d. Іригація

e. Оксигенотерапія

7. У постраждалого різана рана передньої поверхні передпліччя. З рани витікає тонка цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки кровотечі треба застосовувати першочергово?

a. Накладання турнікету вище рани

b. Накладання тиснучої пов'язки

c. Використання перекису водню

d. Накладання міхура з льодом

e. Пальцеве притискання артерії

8. Який лікарський препарат регулює обмін кальцію, фосфору та сприяє формуванню кісткового скелета та зубів у дітей?

a. Вітамін А

b. Кальцію гліцерофосфат

c. Вітамін D₃

d. Натрія гліцерофосфат

e. Кальцію глюконат

9. Під час профілактичного огляду в дитини віком 9 років на зубах виявлено масивний зубний наліт. Для визначення гігієнічного стану порожнини рота користувались індексом Федорова-Володкіної. За якою системою здійснюють кількісну оцінку даного індексу?

a. П'ятибальною

b. Двобальною

c. Чотирибальною

d. Трибальною

e. Шестибальною

10. Санітарно-просвітня діяльність входить до набору компетентностей гігієніста зубного. Відвідуючи заклади дошкільної, шкільної освіти він може донести інформацію про основні стоматологічні захворювання та з метою їх профілактики навчити користуватися предметами, засобами гігієни ротової порожнини. До яких профілактичних заходів належить санітарна освіта?

a. Вторинної профілактики

b. Системної профілактики

c. Третинної профілактики

d. Первинної профілактики

e. Місцевої профілактики

11. Пацієнт звернувся у стоматологічну клініку зі скаргами на кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Після обстеження встановлено попередній діагноз: хронічний генералізований пародонтит II ступеня важкості. Який метод дослідження цього пацієнта треба застосувати для встановлення остаточного діагнозу?

a. Серологічне дослідження

b. Проба Кулаженко

c. Мікроскопічне дослідження

d. Електроодонтодіагностика

e. Рентгенографія

12. Пацієнт під час стоматологічного прийому поскаржився на різкий головний біль, запаморочення, нудоту. Об'єктивно спостерігається: артеріальний тиск - 220/115 мм рт. ст., тахікардія, гіперемія обличчя. Для якого стану характерні ці симптоми?

a. набряк Квінке

b. Анафілактичний шок

c. Інсульт

d. Гіпертонічний криз

e. Колапс

13. Вкажіть із чого розпочинають огляд порожнини рота.

a. Ріжучого краю фронтальної групи зубів

b. Окремих зубів

- c. Щічних залоз
- d. Зубних рядів
- e. Червоної облямівки губ

14. Підліток віком 14 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргою на випадіння пломби. Було проведено стоматологічне обстеження. Що належить до додаткових методів об'єктивного стоматологічного обстеження пацієнта?

- a. Зондування
- b. Огляд
- c. Перкусія
- d. Рентгенографія**
- e. Пальпація

15. Який індекс вказує на інтенсивність карієсу?

- a. КПВ (каріозні+ пломбовані+видалені)**
- b. Проба Шиллера-Писарева
- c. Індекс потреби в лікуванні тканин пародонту BOOЗ (CPITN)
- d. Пародонтальний індекс--- PI
- e. Папілярно-маргинально-альвеолярний індекс (РМА)

16. Перед процедурою кабінетного відбілювання зубів гігієніст зубний провів пацієнту професійну гігієну ротової порожнини. У комплексі проведення процедури гігієніст зубний провів зняття під'ясенних, над'ясенних зубних відкладень з подальшим шліфуванням, поліруванням твердих тканин зубів і нанесенням фторвмісного гелю. Що з комплексу заходів гігієни ротової порожнини може призвести до неефективного відбілювання зубів одразу після гігієни?

- a. Ремінералізуюча терапія**
- b. Полірування твердих тканин зубів
- c. Зняття під'ясенних твердих зубних відкладень
- d. Шліфування твердих тканин зубів
- e. Зняття над'ясенних твердих зубних відкладень

17. Під час проведення огляду стоматологічного пацієнта було візуально виявлено над'ясенні тверді зубні відкладення жовтого кольору. До якого типу за походженням вони належать?

- a. Сироваткового
- b. -
- c. Слинного**
- d. Тютюнового
- e. Медикаментного

18. Пацієнту віком 45 років встановлено діагноз генералізований пародонтит, III ступінь, загострений перебіг з абсцедуванням. Яка група фармакологічних препаратів повинна бути призначена першочергово у цій клінічній ситуації?

- a. Антигістамінні препарати
- b. Нестероїдні протизапальні препарати
- c. Протівірусні препарати
- d. Антибактеріальні препарати**
- e. Кортикостероїди

19. Для оцінки загальносоматичного здоров'я дитини під час обстеження використовується поділ на групи здоров'я. До якої групи здоров'я належить здорова дитина із функціональними та деякими морфологічними відхиленнями?

- a. Четвертої
- b. Третьої
- c. Першої
- d. Другої**
- e. П'ятої

20. Застосування хімічного методу є актуальним тоді, коли важко провести механічне чищення.

У клінічних ситуаціях коли наявна сильна рухомість зубів, висока густина зубного каменю, тобто за неможливості провести механічне очищення використовують хімічний метод зняття зубних відкладень. Які речовини використовуються для видалення зубних відкладень хімічним методом?

- a. Антисептики
- b. Ферменти
- c. Окисники
- d. Фосфати

e. Кислоти

21. Під час огляду було виявлено каріозну порожнину із широким входним отвором на жувальній поверхні 55 зуба у межах плащового дентину. Дно та стінки порожнини щільні, пігментовані. Зондування та перкусія негативні. Якому діагнозу відповідає описана клінічна картина?

- a. Хронічний глибокий карієс
- b. Хронічний фіброзний пульпіт
- c. Хронічний фіброзний періодонтит

d. Хронічний середній карієс

e. Гострий середній карієс

22. Під час профілактичного огляду дітей в школі гігієніст зубний записав зубну формулу у вигляді двозначних цифр, перша з яких означає квадрант ротової порожнини, а друга номер зуба. Яку формулу записав гігієніст зубний?

- a. За Zsigmondy
- b. Клінічну
- c. Анатомічну
- d. Гігієнічну

e. За BOO3 (міжнародну)

23. У медичній документації стоматологічного пацієнта під час обстеження гігієністом зубним вказується наявний вид прикусу. У яку медичну документацію гігієніст зубний фіксує інформацію про прикус пацієнта?

a. Форма 043-о

- b. Форма 039-3/о
- c. Форма 069-о
- d. Форма 037-2/о
- e. Форма 037-о

24. До стоматологічної клініки звернувся пацієнт для проведення відбілювання зубів через естетичний дефект у ділянці фронтальних зубів верхньої щелепи. Під час огляду гігієніст зубний виявив дисколорит зубів фронтальної ділянки, наявність змінених у кольорі пломб на вестибулярних поверхнях 12, 11, 21, 23, 24 зубів. Спостерігається наявність м'яких та твердих зубних відкладень, ознаки катарального ураження ясенного краю, ясенних сосочків. Після обстеження пацієнта гігієніст зубний відмовив йому у проведенні процедури відбілювання. Яке абсолютне протипоказання до відбілювання зубів виявлено під час огляду цього пацієнта?

- a. Наявність катарального гінгівіту
- b. Наявність твердих зубних відкладень

c. Наявність пломб

- d. Наявність катарального папіліту
- e. Наявність м'яких зубних відкладень

25. Пацієнтка звернулася у стоматологічну клініку зі скаргами на кровоточивість ясен. У ділянці яких зубів будуть досліджувати стан ясен під час визначення індексу гінгівіту (Silness-Loe)?

a. 16, 11, 24, 36, 31, 44

- b. 16, 24, 36, 44
- c. 16, 11, 36
- d. 33, 32, 31, 41, 42, 43
- e. 16, 11, 26, 36, 31, 46

26. Що означає термін адентія?

- a. Збільшення кількості зубів
- b. Патологія, для якої характерно повна або часткова відсутність зубів**
- c. Затримка прорізування нормально сформованого постійного зуба
- d. Анатомічно неправильне положення одного або кількох зубів у зубному ряду
- e. Розміри коронок, що виходять за межі норми у бік збільшення

27. У дитини віком 15 років під час стоматологічного обстеження визначено КПВ=7. Два роки тому інтенсивність карієсу у цієї дитини складала 5. Який приріст інтенсивності (індекс захворюваності) у цюї пацієнтки?

- a. 8
- b. 12
- c. 10
- d. 2**
- e. 0

28. Під час профілактичного огляду чотирирічної дівчинки виявлено протрузію зубів фронтальної ділянки верхньої щелепи. Яка шкідлива звичка може призвести до виникнення цієї патології?

- a. -
- b. Тиск язиком на зуби та щічки
- c. Смоктання та прикушування губ
- d. Смоктання соски та пустушки**
- e. Підкладання кулачка під щоку

29. Батьки шестирічної дитини звернулися до гігієніста зубного з проханням планування профілактичних заходів для убезпечення зубів постійного прикусу від карієсу. Стоматологічний фахівець порекомендував обробити поверхні зубів сполуками ремінералізуючих речовин (препарати фтору, кальцію, фосфору і мікроелементів). Який вид профілактики карієсу передбачає програма створена гігієністом зубним для цієї дитини?

- a. Екзогенна профілактика**
- b. Локальна профілактика
- c. Індивідуальна профілактика
- d. Ендогенна профілактика
- e. Системна профілактика

30. Пацієнтка віком 28 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на появу невеликої ерозії у ділянці нижньої губи з дещо піднятими й рівними краями. Під час пальпації ерозії відзначається хрящеподібний інфільтрат. Підщелепний лімфатичний вузол збільшений, щільний, невеликий. Яке захворювання можна припустити?

- a. Герпес
- b. Імпетиго
- c. Хейліт
- d. Сифіліс**
- e. Контактний дерматит

31. Про який стан гігієни порожнини рота свідчить оцінка 1,33 бали під час визначення гігієнічного індексу Green-Vermillion?

- a. Поганий
- b. Добрий
- c. Задовільний**
- d. Дуже добрий
- e. Дуже поганий

32. Батьки чотирирічної дитини звернулися до гігієніста зубного з метою проведення профілактичного огляду. Після обстеження дитини було рекомендовано проведення неінвазивної герметизації фісур тимчасових зубів. Які матеріали доцільно обрати гігієністу зубному для цієї процедури?

- a. Фосфатні цементи
- b. Силікатні цементи

c. Геліокомпозитні матеріали

- d. Композитні матеріали хімічної полімеризації
- e. Силікофосфатні цементи

33. Під час обстеження стоматологічного пацієнта в ході рентгенологічного дослідження у ділянці верхівки кореня 35 зуба виявлено обмежене просвітлення діаметром 5 мм, що має округлу форму. Для якої форми періодонтиту характерне це утворення?

a. Хронічний фіброзний періодонтит

b. Хронічний гранулематозний періодонтит

- c. Загострення хронічного гранулюючого періодонтиту
- d. Хронічний гранулюючий періодонтит
- e. Хронічний гангренозний пульпіт

34. Під час визначення гігієнічного стану ротової порожнини гігієніст зубний використовує препарат, основу якого складає барвник. Який препарат використовує фахівець з метою виявлення зубного нальоту?

- a. Розчин хлоргексидину
- b. Фурацилін

c. Йодовмісний розчин Шиллера-Писарева

- d. Хлорофіліп
- e. Метронідазол

35. Пацієнт звернувся у стоматологічну клініку зі скаргами на естетичний дефект. Об'єктивно спостерігається: 13 зуб змінений у кольорі, депульпований. Прийнято рішення провести внутрішнє відбілювання 13 зуба. Куди вводять відбілюючий препарат у цьому разі?

- a. В індивідуальну капу
- b. На ясна по перехідній складці у ділянці зуба

c. У порожнину зуба

- d. На поверхню коронки зуба
- e. Рекомендують полоскати

36. Дівчина віком 16 років скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних подразників. Які речовини повинні бути наявні в групі зубних паст, що рекомендовані в цьому разі?

a. Натрію борат

b. Сполуки калію

- c. Мінеральні солі
- d. Сполуки фтору
- e. Сполуки кальцію

37. На рентгенограмі виявлено рівномірне потовщення періодонтальної щілини у навколоврхівковій частині кореня постійного зуба. Якому діагнозу відповідають результати цього дослідження?

a. Хронічний гранулюючий періодонтит

b. Хронічний фіброзний періодонтит

- c. Гострий травматичний періодонтит
- d. Хронічний гранулематозний періодонтит
- e. Гострий гнійний періодонтит

38. Під час проведення стоматологічних маніпуляцій у пацієнта з'явився шум у вухах, оніміння пальців на руках і ногах, холодний піт, виникла нудота. Пацієнт знепритомнів. Дайте визначення поняттю <<непритомність>>.

- a. Один із видів шоку, комплекс стрімких тяжких патологічних зрушень в організмі
- b. Алергічна реакція

c. Раптове короткочасне порушення свідомості, що виникає як наслідок гострого розладу кровопостачання головного мозку

d. Форма гострої судинної недостатності, пов'язана з вираженим падінням тону судин

е. Знижений АТ

39. Під час обстеження стоматологічного пацієнта гігієніст зубний проводить визначення індивідуального ризику виникнення карієсу в пацієнта. Який метод дослідження використовується для визначення стійкості емалі до дії кислот?

а. Люмінесцентна діагностика

б. ТЕР-тест

с. Рентгенографія

д. Термометрія

е. ЕОД

40. Під час роботи з ультразвуковим скейлером використовують постійну подачу струменя води до операційного поля під час зняття зубних відкладень. З якою метою використовують воду використовуючи ультразвуковий метод у професійній гігієні ротової порожнини?

а. Виявлення прихованих каріозних порожнин на зубах

б. Дезодорація ротової порожнини

с. Антисептична обробка ротової порожнини

д. Охолодження насадки та створення ефекту кавітації

е. Запобігання травмуванню слизової оболонки ротової порожнини

41. Який фізіотерапевтичний метод можна застосувати для зупинки кровотечі?

а. Магнітотерапію

б. Діатермокоагуляцію

с. УВЧ-терапію

д. Депофорез

е. Струми Дарсонваля

42. Пацієнт після проведеного кабінетного відбілювання зубів із застосуванням 44%-ого перекису карбаміду скаржиться на больові відчуття під час вживання гарячої та холодної їжі, напоїв. Який патологічний стан міг розвинути у цього пацієнта?

а. Періодонтит

б. Ксеростомія

с. -

д. Гіперкаліємія

е. Гіперестезія

43. До гігієніста зубного звернувся пацієнт для проведення професійної гігієни ротової порожнини. Після профілактичних процедур пацієнту було рекомендовано застосовувати 0,12%-й розчин хлоргексидину. Які негативні дії чинить хлоргексидин на ротову порожнину?

а. Дисбактеріоз, зафарбовування зубів

б. Підвищення чутливості до температурних подразників

с. Гіперестезія емалі

д. Десенсибілізація

е. Малігнізація

44. У клініку звернувся пацієнт для профілактичного огляду ротової порожнини. Які стоматологічні інструменти треба використати гігієністу зубному для огляду?

а. Штопфер, гладилка

б. Елеватори, щипці

с. Екскаватори, гачки стоматологічні

д. Скейлери

е. Стоматологічне дзеркало, зонд, пінцет

45. З якою частотою передаються коливання на робочу частину інструмента під час використання магнітострикційних систем для видалення мінералізованих зубних відкладень?

а. 60000-70000 Гц

б. 20000-50000 Гц

с. -

д. 5000-10000 Гц

е. 10000-20000 Гц

46. Герметизація фісур - ефективний метод екзогенної профілактики. В якому періоді життя дитини після прорізування зубів найдоцільніше проводити цей метод профілактики?

а. Через 2 роки

б. Відразу після прорізування

с. Через 1 рік

д. Через 3 роки

е. Термін не має значення

47. Гігієніст зубний проводить епідеміологічне обстеження певних вікових груп по вивченню поширеності ознак ураження тканин пародонту і потреб у лікуванні. За допомогою якого індексу вивчаються ці показники?

а. РМА (Парма)

б. ОНІ-S (Гріна-Вермільйона)

с. СРІТН (ВООЗ)

д. Індекс Рамф'єрда

е. РІ (Рассела)

48. Пацієнт звернувся до гігієніста зубного з метою проведення професійної гігієни ротової порожнини. Під час проведення процедури у пацієнта раптом з'явилися судоми. Об'єктивно спостерігається: шкіра обличчя ціанотична, утруднене дихання, зниження артеріального тиску, піна з ротової порожнини, аритмічний пульс. Який патологічний стан ймовірно розвинувся у пацієнта?

а. Анафілактичний шок

б. Колапс

с. Епілептичний напад

д. Гіпертонічний криз

е. Гострий живіт

49. Які із наведених нижче індексів застосовують для діагностики захворювань тканин пародонту?

а. Індекс КПВ (каріозні+пломбовані+видалені)

б. Індекс Гріна-Вермільйона

с. Індекс Федорова-Володкіної

д. Індекс КПВ+кп

е. Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (РМА)

50. Під час профілактичного огляду ротової порожнини восьмирічної дівчинки зубний гігієніст звернув увагу на широку, щільну, низько прикріплену вуздечку верхньої губи. До якої аномалії зубного ряду може призвести це розташування вуздечки верхньої губи?

а. Утворення проміжку між центральними зубами верхнього зубного ряду

б. Подовження верхнього зубного ряду

с. Вкорочення верхнього зубного ряду

д. Протрузії верхніх фронтальних зубів

е. Звуження верхнього зубного ряду

51. До гігієніста зубного звернувся пацієнт віком 16 років зі скаргами на неприємний запах з порожнини рота. Під час обстеження виявлено велику кількість м'якого зубного нальоту та зубні бляшки. Після проведеної професійної гігієни порожнини рота були надані рекомендації по догляду за порожниною рота. Які речовини, що входять до складу зубних паст, розчиняють органічний матеріал зубного нальоту та не пошкоджують живі тканини зубів, утилізують токсичні та подразнюючі продукти життєдіяльності мікроорганізмів зубної бляшки?

а. Мінералізуючі агенти

б. Антибактеріальні агенти

с. Амінофториди

д. Ферменти

е. Антисептики

52. Пацієнтці гігієніст зубний проводить професійну гігієну ротової порожнини з використанням системи Air-Flow. Що є протипоказом до застосування апарату Air-Flow?

- a. Видалення забарвлених відкладень
- b. Очищення гладких зубних поверхонь перед фіксацією брекетів
- c. Очищення пломб із композитних матеріалів**
- d. Очищення фісур жувальних поверхонь зубів
- e. Полірування зубних поверхонь після скейлінга

53. Пацієнт віком 48 років звернувся в стоматологічну клініку для професійної гігієни ротової порожнини. Під час обстеження гігієніст зубний виявив значні мінералізовані зубні відкладення. Яким інструментом треба контролювати видалення під'ясенного зубного каменя за наявності патологічних зубоясенних кишень?

- a. Зондом**
- b. Долотом
- c. Скейлером
- d. Гачком
- e. Кюретажною ложкою

54. Після проведення профілактичного огляду пацієнту встановлено діагноз: гострий середній карієс 26 зуба та хронічний глибокий карієс 37 зуба, I клас за Блемом. Які основні діагностичні методи застосував гігієніст зубний під час дослідження карієсу зубів?

- a. Огляд, зондування**
- b. Електроодонтодіагностику та зондування
- c. Функціональні методи та електроодонтодіагностику
- d. Рентгенологічні та функціональні методи
- e. Лабораторні та рентгенологічні методи

55. На сліді радіоактивної хмари радіаційне опромінювання отримали військовослужбовці мотострілкової роти. Насамперед необхідно:

- a. Евакуювати особистий склад з осередку ураження**
- b. Прийняти протиблювотний засіб
- c. Прийняти радіозахисний засіб
- d. Провести часткову санітарну обробку
- e. Ввести знеболюючі препарати

56. Під час огляду пацієнта гігієніст зубний виявив, що щічні горбки молярів та премоларів верхньої щелепи праворуч знаходяться у серединних фісурах молярів та премоларів нижньої щелепи, а ліворуч - повне перекриття верхніми молярами та премолярами нижніх відповідної групи. Який вид прикусу спостерігається?

- a. Прогнатичний
- b. Прямий
- c. Перехресний**
- d. Відкритий
- e. Прогенічний

57. Пацієнт звернувся до стоматологічної клініки для профілактичного огляду. Проведено індексну оцінку стану ротової порожнини. Який індекс гігієни ротової порожнини визначається шляхом забарвлення вестибулярних поверхонь нижніх шести фронтальних зубів йодовмісними розчинами?

- a. Сілнесс-Лоу
- b. РМА
- c. Грін-Вермільона
- d. СРІТН
- e. Федорова-Володкіної**

58. У пацієнта віком 18 років було виявлено ознаки катарального гінгівіту та наявність рясних під'ясенних зубних відкладень. Гігієніст зубний, з лікувальною метою, використав ультразвуковий скейлер. Які переваги використання ультразвукового скейлінгу перед ручним?

a. Зменшення ризику бактеріємії у пацієнтів, які мають хронічні захворювання

b. Якісна обробка поверхні зубів без пошкодження емалі та безболісність процедури

c. Зниження чутливості зубів

d. Собівартість процедури

e. Надання блиску поверхні зубів

59. Пацієнт під час стоматологічного прийому поскаржився на погане самопочуття. Об'єктивно спостерігається: пацієнт апатичний, шкірні покриви бліді, ціанотичні, укриті холодним липким потом, пульс ниткоподібний, тахікардія, різке зниження артеріального тиску, дихання часте і поверхневе. Для якого стану характерні ці симптоми?

a. Стенокардії

b. Непритомності

c. Гіпоглікемічної коми

d. Гіперглікемічної коми

e. Колапсу

60. Після профілактичного огляду порожнини рота пацієнту діагностовано хронічний катаральний гінгівіт. Який метод лікування покращить кровообіг у тканинах пародонту, ліквідує застійні явища, активізує обмін речовин та посилить виведення продуктів обміну?

a. Гідромасаж ясен

b. Кріотерапія

c. Діатермокоагуляція

d. Електрофорез антибіотиків

e. Аерозольне введення протеолітичних ферментів

61. Гігієніст зубний проводить дослідження пацієнта за допомогою індексів з метою визначення гігієнічного стану ротової порожнини. Згідно аналізу дослідження гігієнічний стан ротової порожнини за індексом Гріна-Вормільйона (OHI-S) до професійної гігієни становив --- 2,5, а після --- 0,2. Охарактеризуйте гігієнічний стан цього пацієнта.

a. До лікування гігієна порожнини рота була незадовільна, після лікування --- задовільна

b. До лікування гігієна порожнини рота була хороша, після лікування --- незадовільна

c. До лікування гігієна порожнини рота була задовільна, після лікування --- задовільна

d. До лікування гігієна порожнини рота була незадовільна, після лікування --- хороша

e. До лікування гігієна порожнини рота була погана, після лікування --- незадовільна

62. У підлітка віком 16 років після стоматологічного обстеження діагностовано множинний карієс. Після проведеного лікування пацієнту рекомендовано фторвмісну зубну пасту. Який вміст фтору має містити зубна паста для цього пацієнта?

a. 1000 ppm

b. 500 ppm

c. 200 ppm

d. 800 ppm

e. 1450 ppm

63. Робітник одержав електротравму, тримає дріт у руці. Що першочергово треба зробити?

a. Викликати бригаду ЕМД

b. Ввести знеболюючі препарати

c. Прибрати дріт

d. Звільнити постраждалого від джерела електроструму

e. Провести ШВЛ

64. Пацієнту проводять оцінку гігієнічного стану ротової порожнини за допомогою індексу Грін-Вормільйона. Вестибулярні поверхні яких зубів підлягають фарбуванню?

a. 12, 11, 21, 22

b. 16, 15, 26, 25

c. 46, 45, 36, 35

d. 16, 11, 26, 31

e. 42, 41, 31, 32

65. Гігієніст зубний проводив профілактичний огляд дев'ятирічної дитини. Під час обстеження діагностовано гострий поверхневий карієс у 26 та 36 зубах, виявлено пломби в 16, 46, 55 та 65 зубах, 64 зуб відсутній. Укажіть інтенсивність карієсу у цьому разі.

- a. 5
- b. 3
- c. 4
- d. 7
- e. 6**

66. Пацієнту віком 23 роки проводиться профілактичний огляд порожнини рота. Прийнято рішення провести пробу Шиллера-Писарева. Для визначення чого використовують цю пробу?

- a. Кровоточивості ясен
- b. Запальних змін у яснах**
- c. Наявності ексудату в зубо-ясенній кишені
- d. Гігієнічного стану ротової порожнини
- e. Ступеня тяжкості гінгівіту

67. Під час проведення професійної гігієни порожнини рота у пацієнтки виник біль від дії холодового подразника в ділянці між 31, 32, 41 та 42 зубами. Під час візуального обстеження спостерігається скупченість зубів у фронтальній ділянці нижньої щелепи, контактні поверхні неможливо обстежити через щільне розташування зубів. Гігієніст зубний припустив наявність карієсу на контактних поверхнях цих зубів. Який метод дослідження доцільно застосувати?

- a. Зондування
- b. Холодова проба
- c. Електроодонтодіагностика
- d. Метод вітального фарбування
- e. Рентгенографічне дослідження**

68. До стоматологічної клініки звернулась пацієнтка для профілактичного огляду. Під час визначення якого індексу гігієни ротової порожнини забарвлюються вестибулярні поверхні 11, 16, 26 і 31-го зубів та язикові поверхні 36 і 46-го зубів йодовмісними розчинами?

- a. СРІТН
- b. РМА
- c. Федорова-Володкіної
- d. Сілнесс-Лоу
- e. Грін-Вермільона**

69. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги приїхала на виклик до пацієнтки, яка випадково вилила на себе окріп. Потерпіла кричить від болю, передня поверхня обох нижніх кінцівок яскраво-гіперемована, вкрита пухирцями з прозорим вмістом. Визначте ступінь опіку у потерпілої?

- a. I ступінь
- b. III ступінь
- c. I-II ступінь
- d. IV ступінь
- e. II ступінь**

70. На прийомі у лікаря-стоматолога після видалення зуба у пацієнта 55 років, раптово з'явився пульсуючий головний біль, запаморочення, шум у вухах, тахікардія. Під час вимірювання артеріального тиску отримано показники --- 220/160 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Гіпертонічний криз**
- b. набряк Квінке
- c. Стенокардія
- d. Інфаркт міокарду
- e. Колапс

71. Яке положення лікаря відносно пацієнта рекомендовано для ретельного очищення щічних

поверхонь верхніх і нижніх лівих молярів та премолярів, а також піднебінних поверхонь верхніх правих і язикових поверхонь нижніх правих молярів та премолярів?

a. Позаду, голова пацієнта повернута в правий бік

b. -

c. Позаду пацієнта

d. Позаду, голова пацієнта повернута в лівий бік

e. Попереду пацієнта

72. Пацієнту для попередження розвитку захворювань пародонта рекомендовано провести заходи екзогенної лікарської профілактики. Які заходи належать до цієї групи профілактики?

a. Обмежене вживання вуглеводів, реєстрація стану зубів

b. Фторування питної води, видалення зубного каменю

c. Призначення вітамінів Р, Е, обстеження ротової порожнини

d. Полірування пломб та зубів, збалансоване харчування

e. Видалення зубних відкладень, полірування зубів та пломб

73. Батьки шестирічної дитини привели її на профілактичний огляд до зубного гігієніста. Під час обстеження пацієнта було рекомендовано батькам провести герметизацію фісур постійних зубів. Вкажіть покази до герметизації фісур зубів.

a. Закінчена мінералізація поверхні зубів

b. Гіперсалівація

c. Наявність глибоких інтактних фісур та мінімальний термін з моменту прорізування

d. Незадовільна гігієна ротової порожнини

e. Наявність каріозних порожнин

74. Пацієнту віком 15 років проведено профілактичний огляд ротової порожнини. Прийнято рішення провести місцеві екзогенні профілактичні заходи за допомогою розчину фториду натрію. Як ефективно застосовувати розчин фториду натрію?

a. Ірригації

b. Аплікації

c. Інстиляції

d. Полоскання

e. Ротові ванночки

75. Під час обстеження стоматологічного пацієнта гігієніст зубний повинен застосовувати суб'єктивний метод --- опитування. Що в першу чергу під час застосування даного методу дослідження пацієнта потрібно визначити?

a. Терміни прорізування зубів

b. Рівень гігієнічного догляду за ротовою порожниною

c. Скарги пацієнта

d. Спадковість

e. Шкідливі звички

76. До карієсогенних факторів належать:

a. Фактори, що запобігають утворенню зубних відкладень

b. Фактори, що стимулюють утворення дентину

c. Фактори, що сприяють виникненню карієсу

d. Фактори, що зміцнюють структуру твердих тканин

e. Фактори, що запобігають виникненню карієсу

77. Який з перерахованих методів чистки зубів відомий як метод <<від червоного до білого>> --- від ясен до зуба?

a. Леонарда

b. Фейте

c. Сміта-Бела

d. Басса

e. Метод обертання щітки

78. У дитини віком 4 роки наявна велика кількість зубів уражених карієсом. З анамнезу життя

відомо, що під час вагітності у мами був токсикоз. Чи міг вплинути токсикоз вагітних під час виношування дитини на карієсогенну ситуацію?

- a. Так, як ситемний чинник
- b. Ні
- c. Так, як місцевий чинник
- d. Так, як екзогенний фактор
- e. Так, як ендогенний фактор**

79. Пацієнт підліткового віку звернувся до стоматологічної клініки для проведення професійної гігієни порожнини рота. Під час обстеження зубних рядів та слизової оболонки виявлено жовтуваті зубні відкладення липкої консистенції. До якого ускладнення може призвести цей тип нашарувань?

- a. Запалення маргінального пародонту**
- b. Запалення слизової оболонки порожнини рота
- c. Запалення верхівкового періодонту
- d. -
- e. Гіпоплазії емалі

80. Батьки десятирічної дитини скаржаться на косметичний дефект 22 зуба, який прорізався з дефектом емалі. В анамнезі відмічається передчасне видалення 62 зуба з приводу ускладненого карієсу. На вестибулярній поверхні 22 зуба виявлена пляма білувато-жовтого кольору з чіткими обрисами, з гладкою, блискучою поверхнею. Який додатковий метод обстеження необхідно провести для встановлення діагнозу?

a. Метод вітального зафарбовування

- b. Електроодонтодіагностику
- c. Електроодонтодіагностику
- d. Візіографію
- e. Рентгенологічне дослідження

81. Показник інтенсивності карієсу в групі дванадцятирічних дітей становить 3,2. Якому рівню інтенсивності карієсу він відповідає?

a. Середньому

- b. Низькому
- c. Дуже високому
- d. Високому
- e. Дуже низькому

82. Вестибулярні поверхні яких зубів зафарбовують розчинами, що містять йод, для визначення індексу Федорова-Володкіної?

- a. Нижніх різців
- b. Верхніх молярів

c. Нижніх шести фронтальних зубів

- d. Нижніх чотирьох фронтальних зубів
- e. Верхніх фронтальних зубів

83. Пацієнту, після санації ротової порожнини, гігієніст проводить навчання індивідуальній гігієні ротової порожнини. Фахівець демонструє стандартний метод чищення зубів мануальною зубною щіткою. Яка тривалість процедури чищення зубів за цієї методики?

- a. 1 хвилина
- b. 0,5 хвилин
- c. 3 хвилини**
- d. 4 хвилини
- e. 5 хвилин

84. Визначте протипокази до відбілювання зубів.

a. Хвороби серцево-судинної системи

b. Алергія на перекисні сполуки

c. Хвороби нирок

- d. Хвороби шлунково-кишкового тракту
- e. Флюороз

85. Пацієнт віком 20 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у верхньому бічному зубі праворуч від вживання солодкої їжі. Було проведено стоматологічне обстеження. Що відноситься до основних методів об'єктивного стоматологічного обстеження пацієнта?

- a. Зондування**
- b. Електроодонтометрія
- c. Рентгенографія
- d. Капіляроскопія
- e. Термодіагностика

86. Серед стоматологічного інструментарію, виділяють інструменти, які використовуються для обстеження ротової порожнини. Які інструменти відносяться до цієї групи?

- a. Дзеркало, гладилка, стоматологічний пінцет
- b. Пінцет, екскаватор
- c. Штопфер, гладилка, шпатель, стоматологічне дзеркало
- d. Дзеркало, стоматологічний зонд, пінцет**
- e. Стоматологічний зонд, екскаватор, штопфер

87. Пацієнту, який звернувся до стоматологічного кабінету для проведення професійної гігієни ротової порожнини, гігієністом зубним було рекомендовано використовувати предмети інтердентальної гігієни. Які предмети інтердентальної гігієни можна рекомендувати пацієнту?

- a. Флоси, щітки-йоржики, монопучкові зубні щітки**
- b. Ополіскувачі для рота
- c. Жувальні гумки
- d. Ортодонтичну зубну щітку
- e. Спреї для рота

88. При потраплянні у стоматологічну клініку пацієнта з приводу консультації та лікування, обов'язково проводиться його дослідження. Вкажіть, який з перерахованих методів дослідження відноситься до суб'єктивних.

- a. Рентгенологічне дослідження
- b. Зовнішній огляд
- c. Опитування**
- d. Лабораторне дослідження
- e. Огляд ротової порожнини

89. Виберіть найефективніший метод профілактики карієсу фісур постійних молярів у семирічної дитини із індексом КРВ+кп, що становить 2,5 бали, та хорошим станом гігієни ротової порожнини.

- a. Аплікація фісур постійних молярів 3% розчином ремоденту
- b. Імпрегнація фісур постійних молярів азотнокислим сріблом
- c. Герметизація фісур постійних молярів**
- d. Аплікація фісур постійних молярів 0,2% розчином натрію фториду
- e. Покриття фісур постійних молярів фторлаком

90. Дайте визначення поняттю <<професійна гігієна органів порожнини рота>>.

- a. Комплекс заходів, які усувають розвитку карієсу зубів
- b. Комплекс заходів, які усувають запальні хвороби пародонта шляхом механічного видалення з поверхонь зуба зубних відкладень
- c. Видалення зубних відкладень
- d. Комплекс заходів, які усувають та запобігають розвитку карієсу зубів і запальних хвороб пародонта
- e. Комплекс заходів, які усувають та запобігають розвитку карієсу зубів і запальних хвороб пародонта шляхом механічного видалення з поверхонь зуба зубних відкладень**

91. На кінцевих етапах проведення комплексу заходів професійної гігієни ротової порожнини застосовуються полірувальні паста. Вкажіть, які основні функції покладено на цей засіб?

a. Обробка поверхонь зубів після видалення зубних відкладень

- b. Видалення немінералізованих зубних відкладень
- c. Видалення мінералізованих зубних відкладень
- d. Видалення незрілого зубного нальоту
- e. Видалення пігментованого зубного нальоту

92. Гігієніст зубний рекомендує пацієнту, якому проведено професійну гігієну ротової порожнини, використовувати флос. Яка функція флосу, як предмету індивідуальної гігієни ротової порожнини?

a. Очищення міжзубних проміжків

- b. Чищення вестибулярних поверхонь зубів
- c. Зняття зубного нальоту з дистальних поверхонь зубів
- d. Видалення зубного каменю
- e. Зняття зубного нальоту з медіальних поверхонь зубів

93. Під час проведення професійної гігієни ротової порожнини, гігієніст зубний використовує апарат Air Flow. Вкажіть принцип дії цього апарату.

a. Подає на поверхню зуба розчин соди, води та стислого повітря під тиском

- b. Генерує ультразвукові хвилі різної частоти і довжини
- c. Створює ультразвукові коливання, які згубно діють на бактерії, що зібралися в пародонтальних кишнях
- d. Розпізнає під?ясенні відкладення
- e. Випаровує з зубних відкладень вологу, що призводить до їх крихкості

94. У пацієнта виявлено тверді зубні відкладення. Гігієністом зубним прийнято рішення застосувати ультразвуковий скейлер. При яких патологічних станах протипоказано використання цього методу професійної гігієни органів порожнини рота?

a. Захворювання опорно-рухового апарату

b. Серцево-судинних захворюваннях за наявності кардіостимулятора

- c. Захворюваннях ендокринної системи
- d. Хворобах шлунково-кишкового тракту
- e. Захворюваннях сечовидільної системи

95. Під час профілактичного огляду чотирирічної дитини встановлено: тимчасові зуби інтактні; слизова оболонка ротової порожнини без патологічних змін. Яку абразивність (RDA) зубної пасти необхідно рекомендувати гігієністу зубному при наданні рекомендацій про щоденний догляд за зубами батькам даної дитини?

- a. 120--200
- b. Більш 200
- c. 100--120

d. 30--50

e. 60--100

96. Під час первинного обстеження стоматологічного пацієнта віком 41 рік гігієніст зубний уточнює інформацію про стан здоров'я ротової порожнини у батьків, підозрюючи генетичну схильність до пародонтозу. Який вид обстеження передбачає збір інформації цього характеру?

- a. Анамнез захворювання
- b. Алергологічний анамнез
- c. Збір скарг
- d. Наявність супутніх захворювань

e. Анамнез життя

97. Пацієнту проводять професійну гігієну ротової порожнини. В процесі професійної гігієни зубний гігієніст використовував штрипси. З якою метою застосовуються штрипси?

- a. Видалення м'якого зубного нальоту в ділянці природних заглиблень
- b. Видалення м'якого зубного нальоту в ділянці шийки зуба

c. Очищення апроксимальних поверхонь

d. Полірування жувальних поверхонь

е. Видалення м'якого зубного нальоту в ділянці фісур

98. Під час огляду пацієнта гігієніст зубний використовував порівняльну перкусію. Стан яких тканин він оцінював?

- а. Вуздечок губи і язика
- б. Слизової оболонки твердого піднебіння
- с. Сконево-нижньощелепного суглобу
- д. Твердих тканин зуба

е. Тканини періодонту

99. Батьки восьмирічної дитини у терміновому порядку звернулися до стоматологічної поліклініки зі скаргами на травму м'яких тканин верхньої губи, кровотечу. Під час огляд окрім травми м'яких тканин відзначається відсутність 11 зуба. За результатами рентгенологічного обстеження - у лунці відсутній 11 зуб. Встановіть діагноз дотримуючись класифікації травми зубів.

- а. Вколочений вивих 11 зуба
- б. Повний вивих 11 зуба
- с. Неповний вивих 11 зуба
- д. Повздовжній перелом кореня 11 зуба
- е. Перелом коронкової частини 11 зуба

100. На консультацію до стоматологічного кабінету лікарем-педіатром скеровано дев'ятирічну дитину, що скаржиться на головний біль, біль в горлі, біль у животі, блювання. Температура тіла підвищена до 38,3°C. Під час обстеження виявлено помірно гіперемовану слизову оболонку м'якого піднебіння, передніх піднебінних дужок. На мигдаликах містяться ерозивні ділянки та дрібні пухирці. Гігієністом зубним встановлено діагноз герпетична ангіна. Вкажіть на основі яких даних обстеження фахівець встановив діагноз?

- а. Імунологічне дослідження
- б. Алергологічні проби
- с. Цитологічне дослідження
- д. Мікробіологічне дослідження

е. Огляд

101. До оглядового набору гігієніста зубного входить стоматологічний зонд. Вкажіть з якою метою використовується цей інструмент?

- а. Для оцінки глибини норицевого ходу
- б. Для виявлення гирл корневих каналів; обстеження пародонтальних кишень
- с. Для виявлення каріозних порожнин; обстеження фісур; виявлення перфораційного отвору; гирл корневих каналів
- д. Для визначення глибини пародонтальних кишень і глибини корневих каналів
- е. Для виявлення перфораційного отвору; гирл корневих каналів

102. На прийом до гігієніста зубного звернувся пацієнт для проведення професійної гігієни ротової порожнини. Після завершення лікувально-профілактичних заходів, фахівець підібрав предмети та засоби гігієни ротової порожнини та надав рекомендації по догляду. Як часто пацієнту необхідно змінювати зубну щітку?

- а. Щомісяця
- б. Щотижня
- с. Один раз в рік
- д. Через кожні 6 місяців
- е. Один раз на три місяці

103. У підлітка віком 14 років проведено визначення спрощеного індексу гігієни порожнини рота Green-Vermillion та отримано результат 2 бали. Який гігієнічний стан порожнини рота?

- а. Відносний
- б. Задовільний
- с. Добрий
- д. Поганий

е. Незадовільний

104. До гігієніста зубного звернулися батьки десятирічного хлопчика для профілактичного огляду. Під час обстеження порожнини рота спостерігається відсутність 14, 24 зубів. Пацієнтові була проведена ортопантомографія. На рентгенологічному знімку було виявлено, що зачатки 14, 24 зубів розміщені під кутом 75° до альвеолярного відростка щелепи. Як називається така затримка прорізування зубів?

- a. Реплантація
- b. Атриція

с. Ретенція

- d. Ретракція
- e. Абразія

105. Гігієніст зубний проводив професійну гігієну ротової порожнини із застосуванням аплікаційної анестезії гелем з вмістом лідокаїну гідрохлориду. Пацієнт почав скаржитися на головний біль, утруднене ковтання, дихання. Об'єктивно відзначається набряк обличчя, підвищення температури тіла, тахікардія. Який патологічний стан розвинувся у цій клінічній ситуації?

- a. Гіпертонія
- b. Тромбоемболія легеневої артерії

с. Набряк Квінке

- d. Гостра серцева недостатність
- e. Епілептичний напад

106. Під час профілактичного огляду дитини гігієніст зубний заповнив карту стоматологічного пацієнта і позначив зуби наступним чином: 16, 55, 54, 53, 12, 11, 21, 22, 63, 64, 65, 26, 36, 75, 74, 73, 32, 31, 41, 42, 83, 84, 85, 46. Скільки найімовірніше років дитині?

- a. 12
- b. 6
- c. 14
- d. 8**
- e. 10

107. Якою є профілактична ефективність ендогенних методів профілактики із застосуванням перпаратів фтору у порівнянні з екзогенними методами?

- a. Менша
- b. Рівнозначна

с. Більша

- d. Незначно менша
- e. Однакова

108. Після проведеного профілактичного огляду пацієнта віком 15 років встановлено попередній діагноз: хронічний катаральний гінгівіт. Який пародонтальний індекс потрібно застосувати, щоб визначити ступінь тяжкості захворювання?

- a. Індекс ОНІ-S

b. РМА

- c. Індекс Федорова-Володкіної
- d. CPITN
- e. PI

109. Пацієнт втретє відвідує стоматологічний кабінет з метою проведення професійної гігієни порожнини рота. Які дії гігієніста зубного і пацієнта на цьому етапі?

- a. Проведення уроку гігієни і здоров'я
- b. Проведення професійної гігієни ротової порожнини
- c. Проведення бесіди про значення індивідуальної гігієни ротової порожнини
- d. Навчання гігієністом зубним пацієнта методиці чищення зубів

е. Демонстрація пацієнтом навичок чищення зубів та міжзубних проміжків

110. Під час огляду постраждалого із вогнепальним пораненням правого стегна у рані

відзначаються уламки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Якими будуть першочергові дії для надання медичної допомоги?

- a. Проведення транспортної іммобілізації
- b. Введення знеболюючого препарату
- c. Підняття ураженої кінцівки доверху
- d. Накладання асептичної пов'язки

e. Накладання джгута

111. Пацієнт віком 28 років скаржиться на постійний пульсуючий, наростаючий біль у 23 зубі, що різко посилюється від накушування на зуб. Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий гнійний періодонтит 23 зуба. Які показники електроодонтодіагностики характерні для цього діагнозу?

- a. 20 мкА
- b. 120 мкА**
- c. 90 мкА
- d. 6 мкА
- e. 40 мкА

112. Для ефективного лікування захворювань тканин пародонту інколи необхідно провести дослідження вмісту пародонтальних кишень. Для цього використовують мікробіологічний метод. Для чого використовують цей метод, як діагностику захворювань тканин пародонту?

- a. Для ідентифікації вірусних збудників захворювання
- b. Визначення показників місцевого імунітету
- c. Вивчення видового складу мікрофлори**
- d. Вивчення вмісту ферментів в слині
- e. Вивчення клітин, їх окремих структур

113. Пацієнт віком 60 років звернувся до гігієніста зубного для проведення професійної гігієни порожнини рота. З анамнезу відомо, що чоловік зловживає курінням. Під час огляду виявлено, що зуби з оральної та вестибулярної поверхонь вкриті щільним шаром пігментованого зубного нальоту. Яку систему для очищення зубного нальоту раціонально застосувати у цьому разі?

- a. Магнітостриктивну
- b. Ультразвукову
- c. Повітряно-абразивну**
- d. Звукову
- e. П'єзоелектричну

114. Батьки дівчинки віком 11 років звернулися за допомогою до гігієніста зубного у зв'язку з кровоточивістю ясен під час чищення зубів та прийому їжі, що турбує протягом року. Ясна на верхній та нижній щелепах набряклі, застійно гіперемовані. Гігієнічний стан ротової порожнини незадовільний. Прикус ортогнатичний. Під час рентгенологічного дослідження пародонту патологічних змін виявлено. Який імовірний діагноз встановить гігієніст зубний?

- a. Генералізований пародонтит III ступеня
- b. Гострий катаральний гінгівіт
- c. Хронічний катаральний гінгівіт**
- d. Генералізований пародонтит II ступеня
- e. Локалізований пародонтит II ступеня

115. Пацієнт із наявними ознаками локалізованого пародонтиту під час обстеження гігієністом зубним відзначає біль під час перкусії 41 зуба. Про ураження, яких анатомічних структур свідчить скарга пацієнта?

- a. Губчастого шару кісткової тканини
- b. -
- c. Пульпи
- d. Періодонтальних зв'язок**
- e. Ясенного сосочка

116. Гігієніст зубний для видалення м'яких зубних відкладень планує застосувати

медикаментозні засоби. Які з них належать до групи поверхнево-активних речовин?

a. Хлоргексидин, катамін

- b. Хлоргексидин, гліцерофосфат
- c. Хлоргексидин, монофторфосфат
- d. Гліцерофосфат, катамін
- e. Монофторфосфат, катамін

117. Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення в ділянку нижньої третини правого стегна. Які дії бойового медика роти під час надання першої медичної допомоги?

a. Зупинити зовнішню кровотечу; знеболити; накласти асептичну пов'язку; провести іммобілізацію кінцівки

- b. Накласти асептичну пов'язку; ввести внутрішньом'язево 1 мл. будаксиму; зупинити зовнішню кровотечу; провести іммобілізацію
- c. Накласти асептичну пов'язку; ввести внутрішньом'язево 1 мл. атропіну; зупинити зовнішню кровотечу
- d. Зупинити зовнішню кровотечу; накласти асептичну пов'язку; провести іммобілізацію
- e. Зупинити зовнішню кровотечу; знеболити; накласти асептичну пов'язку; провести дегазацію

118. До стоматологічної поліклініки звернувся пацієнт зі скаргами на деформацію лівої частини обличчя, біль у ділянці лівої щоки та підвищення температури тіла до 39°C. Під час обстеження пацієнта було встановлено діагноз: абсцес щічної ділянки зліва. Який об'єм лікувальних заходів передбачено у цій клінічній ситуації?

a. Проведення оперативного втручання в амбулаторних умовах поліклініки

b. Направлення у відділення щелепно-лицевої хірургії, оперативне втручання

- c. Направлення до лікаря сімейної медицини
- d. Направлення додому, призначення знеболюючих препаратів
- e. Направлення у поліклініку для проведення фізіотерапевтичних процедур

119. Під час стоматологічного прийому після проведення анестезії у пацієнта спостерігається обмежений набряк шкіри та підшкірної клітковини обличчя та шиї, утруднене шумне дихання, інспіраторна задишка, ціаноз шкіри обличчя. Який стан ймовірно розвинувся?

- a. Анафілактичний шок
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Гіпоглікемічна кома
- d. Епілептичний напад

e. набряк Квінке

120. У тринадцятирічної дівчинки стороннє тіло потрапило у верхні дихальні шляхи (обтураційна асфіксія). Укажіть, які дії необхідно виконати насамперед, за умови, що дістати мануально стороннє тіло неможливо.

a. Провести поштовхи за Геймліхом

- b. Застосувати штучну вентиляцію легень
- c. Застосувати непрямий масаж серця
- d. Надати пацієнту положення Тренделенбурга
- e. Провести трахетомію

121. У пацієнта під час стоматологічного обстеження виявлено незадовільну гігієну ротової порожнини з множинним зубним нальотом. З анамнезу відомо: вживання великої кількості вуглеводів та солодких газованих напоїв. До розвитку якого захворювання зубів може це призвести?

a. Карієсу

- b. Гіперестезії
- c. Гіпоплазії
- d. Гіперплазії
- e. Флюорозу

122. Первинна стоматологічна профілактика передбачає низку заходів. Вкажіть, які заходи забезпечують цей вид профілактики захворювань органів ротової порожнини.

а. Лікування карієсу на початковій стадії

б. Запобігання виникненню карієсу і захворювань пародонту

с. Диспансеризацію населення

д. Реабілітаційні заходи

е. Ранню діагностику карієсу і захворювань пародонту

123. Пацієнтка звернулася до стоматологічної клініки з метою проведення відбілювання зубів. Після проведеного обстеження гігієніст зубний відмовив у здійсненні даної процедури. Які існують протипокази до відбілювання зубів?

а. Період лактації, захворювання пародонту, наявність м'яких та твердих зубних відкладень

б. Вік до 18 років, вагітність і період лактації, захворювання пародонту, наявність м'яких та твердих зубних відкладень

с. Наявність твердих зубних відкладень

д. Немає протипоказів

е. Наявність ортопедичних конструкцій

124. За якими показниками проводять оцінку первинної профілактики карієсу у дітей молодших класів?

а. Інтенсивність карієсу

б. Розповсюдженість захворювань тканин пародонта

с. Розповсюдженість карієсу

д. Приріст інтенсивності карієсу

е. Кількість ускладненого карієсу

125. Пацієнт звернувся до стоматологічної клініки для відбілювання зубів. У процесі відбілювання використовувалася лампа, яка генерує синє світло з довжиною хвилі від 480 до 520 нанометрів. Яка функція цього приладу для відбілювання зубів?

а. Висушування відбілюючого гелю

б. Активація відбілюючого гелю

с. Захист ясен

д. Знезараження поверхні зубів

е. Освітлення робочої ділянки

126. Які основні методи ендогенної профілактики карієсу зубів?

а. Дотримання основних правил прийому їжі

б. Лікарські засоби для місцевої профілактики карієсу, які впливають безпосередньо на зубну емаль

с. ---

д. Дотримання правил здорового способу життя

е. Дотримання максимально правильного раціону харчування, цілеспрямоване застосування відповідних препаратів для профілактики карієсу

127. Якій кількості балів за Мюлеманом відповідає стан, коли під час зондування ясенного жолобка виявляються множинні точкові або лінійні кровотечі?

а. 0

б. 4

с. 2

д. 1

е. 3

128. У стоматологічну поліклініку для проведення профілактичного огляду звернувся пацієнт. Під час огляду ротової порожнини було встановлено діагноз --- чорний волохатий язик. Які лікарські засоби необхідно призначити цьому пацієнту?

а. Противірусні

б. Антибактеріальні

с. Кератолітичні

д. Антисептичні

е. Кератопластичні

129. Гігієніст зубний порадив батькам семирічного хлопчика провести ремінералізуючу терапію за допомогою фторвмісного лаку. Які групи зубів найдоцільніше покрити фторвмісним лаком у цієї дитини?

a. Перші тимчасові моляри та різці

b. Перші постійні моляри та різці

c. Премоляри та постійні ікла

d. Премоляри та тимчасові ікла

e. Другі моляри та премоляри

130. У стоматологічну клініку звернувся пацієнт для проведення відбілювання зубів. Під час проведення маніпуляцій гігієністом зубним у пацієнта з'явилися судоми. Шкіра обличчя набула ціанотичного відтінку, з'явилося утруднене дихання та поява посиленого пінистого слиновиділення з ротової порожнини. Який патологічний стан найімовірніше розвинувся в пацієнта?

a. Колапс

b. набряк Квінке

c. Епілептичний напад

d. Непритомність

e. Шок

131. Гігієніст зубний брав участь у стоматологічному огляді учнів школи. У деяких дітей на зубах виявлено зубний камінь. Вкажіть речовини, які беруть участь у виникненні твердих зубних відкладень?

a. Фосфат кальцію

b. Гетерополісахариди

c. Імуноглобуліни слини

d. Ензими

e. Глікопротеїни

132. У пацієнта діагностовано пародонтит у стадії ремісії. Надайте рекомендації стосовно жорсткості щетини зубної щітки для застосування цим пацієнтом.

a. М'яка щетина

b. Дуже м'яка

c. Жорстка

d. Середньої жорсткості

e. Дуже жорстка

133. Під час заповнення медичної картки стоматологічного пацієнта гігієніст зубний провів збір анамнезу пацієнта. Які питання відносяться до анамнезу життя стоматологічного пацієнта?

a. Шкідливі звички, перебіг захворювання, умови побуту

b. Спадковість, шкідливі звички, умови праці

c. Перенесені захворювання, супутні захворювання, скарги

d. Спадковість, скарги, перенесені травми

e. Сімейне життя, загальні біографічні відомості, особливості початкового періоду хвороби

134. Які фактори ризику, визначені ВООЗ, мають найбільше практичне значення для профілактики карієсу?

a. Некаріозні ураження зубів

b. Зубний наліт, надлишок цукру в їжі, дефіцит фтору

c. Кровоточивість ясен у поєднанні з карієсом

d. Передчасне прорізування зубів

e. Зубний камінь, кровоточивість ясен

135. Під час проведення непрямого масажу серця Ви відчули характерний хрускіт, що свідчить про перелом ребер. Які Ваші дії?

a. Вірно розташувати руки на грудині

b. Викликати швидку

c. Перейти до прямого масажу серця

- d. Констатувати біологічну смерть
- e. Припинити реанімаційні заходи

136. У пацієнта, який знаходиться у непритомному стані почалося блювання. Яке ускладнення особливо небезпечне у цей момент?

- a. Аспірація блювотних мас
- b. Шлунково-кишкова кровотеча
- c. Зневоднення організму
- d. Розвиток патологічного дихання
- e. Легенева кровотеча

137. У восьмирічної дитини проведено визначення індексу гігієни порожнини рота Федорова-Володкіної та отримано результат 2,0 бали. Який гігієнічний стан порожнини рота?

- a. Задовільний
- b. Незадовільний
- c. Дуже поганий
- d. Добрий
- e. Поганий

138. Пацієнту, який звернувся до стоматологічної поліклініки, на підставі скарг та даних об'єктивного обстеження було вставлено діагноз --- гострий псевдомембранозний кандидоз. Який спеціальний метод обстеження дозволить підтвердити діагноз?

- a. Мікроскопічний
- b. Гістологічний
- c. Серологічний
- d. Біохімічний
- e. Цитологічний

139. До добового раціону дітей молодшого шкільного віку повинні входити жири. Яка потреба у жирах на 1 кг/маси тіла у цей віковий період?

- a. 3,5--4г
- b. 3--3,5г
- c. 2--2,5г
- d. 2,5--3г
- e. 1,5--2г

140. Після відбілювання зубів може виникнути гіперстезія зубів. Які зубні пасти необхідно рекомендувати пацієнтам для попередження гіперстезії зубів після процедури відбілювання?

- a. Фторвмісні
- b. З ферментами
- c. З екстрактами трав
- d. З антисептиками
- e. З сольовими добавками

141. До гігієніста зубного звернувся пацієнт зі скаргами на больові відчуття та підвищену чутливість зубів до різних видів подразників. З анамнезу відомо, що у пацієнта захворювання травної системи. На чутливу поверхню твердих тканин була нанесена речовина, яка на поверхні зубів утворила захисну плівку. Як називається група препаратів, що герметизують та блокують переміщення зубної рідини в дентинних трубочках та знижують чутливість зубів?

- a. Кондиціонери
- b. Кислоти
- c. Силанти
- d. Десенситайзери
- e. Герметики

142. Після профілактичного огляду шестирічної дівчинки діагностовано перехресний прикус. Яка шкідлива звичка може призвести до виникнення цієї патології?

- a. Тиск язиком на зуби та щічки
- b. Смоктання та прикушування губ

- c. Неправильне ковтання та дихання
- d. Смоктання пальців та сторонніх предметів

e. Підкладання кулачка під щоку

143. На стоматологічному прийомі під час проведення лікувальних заходів пацієнт поскаржився на головний біль, головокружіння, шум у вухах, відчуття жару, нудоту, сухість у роті, оніміння кінцівок. Обличчя асиметричне, носогубна складка з однієї сторони згладжена, порушення мови. Який патологічний стан імовірно розвинувся у пацієнта?

- a. Діабетична кома
- b. Непритомність

c. Гостре порушення мозкового кровообігу

- d. Колапс
- e. Анафілактичний шок

144. Пацієнтка звернулася до стоматологічної клініки для профілактичного огляду та підбору індивідуальних засобів гігієни. Запит пацієнтки полягав у підборі відбілюючої зубної пасту для щоденного використання. З яким показником RDA треба підбирати зубну пасту?

- a. 140-170 RDA
- b. 0-20 RDA

c. 80-110 RDA

- d. 40-60 RDA
- e. 50-80 RDA

145. Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення живота. Шкірні покриви бліді. Свідомість постраждалого затьмарена. Під час укладання на носі у пораненого зупинилося дихання, серцева діяльність. Визначте об'єм першої медичної допомоги.

- a. Негайна евакуація в окремий медичний батальйон
- b. Зупинити внутрішню кровотечу і провести штучне дихання
- c. Прямий масаж серця одночасно зі штучним диханням
- d. Введення знеболюючого засобу і проведення штучного дихання

e. Непрямий масаж серця одночасно з проведенням штучного дихання

146. До гігієніста зубного звернувся пацієнт для відбілювання зубів. У порожнині рота велика кількість реставрацій зубів, керамічних коронок. Яка тактика гігієніста зубного?

- a. Поєднати зовнішнє та внутрішнє відбілювання зубів

b. Відбілювання зубів протипоказане

- c. Рекомендувати кабінетне відбілювання зубів
- d. Рекомендувати зовнішнє відбілювання зубів
- e. Рекомендувати внутрішнє відбілювання зубів

147. У дитини віком 10 років під час профілактичного огляду на вестибулярній поверхні 11 зуба виявлено дефект твердих тканин зуба у вигляді чашоподібного заглиблення. Емаль в області дефекту гладка, блискуча, барвниками не фарбується. З анамнезу відомо, що у віці трьох років був вивих 51 зуба. Вкажіть наймовірніший діагноз.

- a. Флюороз
- b. Ерозія емалі
- c. Системна гіоплазія емалі

d. Місцева гіоплазія

- e. Вогнищева гіоплазія емалі

148. Пацієнту віком 35 років проводять професійну гігієну ротової порожнини. З якою частотою передаються коливання на робочу частину інструмента під час використання ультразвукових систем для видалення мінералізованих зубних відкладень?

- a. 10 000 Гц
- b. 25 000--50 000 Гц

c. 40 000--60 000 Гц

- d. 20 000--35 000 Гц
- e. 15 000 Гц

149. Гігієніст зубний провів пацієнту процедуру зняття зубних відкладень за допомогою ультразвукового скейлера. Яким буде кінцевий етап професійної гігієни органів порожнини рота при застосуванні ультразвукової технології?

- a. Зняття надясенного зубного каменю
- b. Зняття м'якого зубного нальоту
- c. Антисептична обробка порожнини рота
- d. Зняття підясенного зубного каменю

e. Фторування емалі

150. Під час профілактичного огляду дітей у закладі освіти гігієніст зубний виявив на зубах хлопчика рясний зубний наліт. Для визначення гігієнічного стану ротової порожнини прийнято рішення використати індекс OHI-S. Який барвник треба застосувати для визначення цього індексу?

- a. Розчин метиленового синього
- b. Розчин еритрозину

c. Розчин Шиллера-Писарева

- d. Розчин перекису водню
- e. Розчин фуксину

151. У пацієнта під час лікування хронічного фіброзного пульпіту 36 зуба методом вітальної екстирпації раптово виникло відчуття страху, що супроводжувалося загальною слабкістю, болем за грудиною та втратою свідомості. Об'єктивно спостерігається: зіниці розширені, виражена блідість шкіри з ділянками гіперемії, зниження артеріального тиску, тахікардія. Прояви якого стану виявлено у пацієнта?

- a. Колапсу
- b. Набряку Квінке
- c. Непритомності
- d. Гострого порушення мозкового кровообігу

e. Анафілактичного шоку

152. Пацієнту із встановленими дентальними імплантатами показано проведення професійної гігієни ротової порожнини. Яка особливість проведення професійної гігієни у ділянці імплантатів?

- a. Використання зоноспецифічних кюрет Грейсі
- b. Використання апарату Air-Flow з гліцином**
- c. Використання лише полірувальної пасти та щітки
- d. Використання апарату Air-Flow з бікарбонатом натрію
- e. Використання ручних скейлерів

153. Десятирічна дитина народилася та проживає в ендемічній зоні флюорозу. Батьки дитини звернулися до стоматологічної клініки з метою санації ротової порожнини. Під час огляду виявлено: на вестибулярній поверхні 12, 11, 21, 22, 31, 32, 41, 42 зубів темні плями, що виявилися під час прорізування. Визначте основний етіологічний фактор захворювання.

- a. Недостатність вітаміну D
- b. Ранні гестози мами
- c. Пізні гестози мами
- d. Порушення білкового обміну

e. Токсичний вплив фтору

154. Жінка віком 20 років звернулася до гігієніста зубного зі скаргами на наявність крейдоподібних плям 11, 12, 21, 22 зубів, відчуття оскоми. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці 11, 12, 21, 22 зубів виявлено білі плями розміром 0,2x0,3 см з шорсткою поверхнею, що забарвлюються розчином метиленового синього. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Гострий поверхневий карієс
- b. Флюороз
- c. Хронічний початковий карієс

d. Гострий початковий карієс

е. Гіпоплазія емалі

155. Пацієнт звернувся до стоматологічної клініки зі скаргами на біль у зубі. За результатами обстеження було встановлено діагноз --- гострий дифузний пульпіт 36 зуба. Під провідниковим знеболюванням 4% розчином артикаїну гідрохлориду було проведено розкриття порожнини зуба під час якого пацієнт відчув різкий біль у зубі, після чого збліднів та втратив свідомість. АТ --- 70/40мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Який діагноз у пацієнта?

а. Біологічна смерть

б. Непритомність

с. Анафілактичний шок

д. Напад стенокардії

е. Набряк Квінке

156. Батьки дитини віком 11 років звернулися до стоматологічної клініки за консультацією з приводу дефектів коронкових частин зубів. Обстеження дозволило встановити діагноз --- ендемічний флюороз. Порекомендуйте зубну пасту з однією з діючих речовин для цього пацієнта.

а. Фторид олова

б. Гліцерофосфат кальцію

с. Натрію монофторфосфат

д. Фторид натрію

е. Амінофторид

157. Під час профілактичного обстеження ротової порожнини дітей семирічного віку гігієніст зубний оглядає фісури зубів. Які за формою фісури зубів вважаються відкритими, більш карієсрезистентними та добре мінералізуються за рахунок ротової рідини?

а. -

б. І-подібні

с. Лійкоподібні

д. Краплеподібні

е. Зворотньоконусні

158. Батькам для індивідуального догляду за ротовою порожниною п'ятирічної дитини рекомендовано використовувати зубну пасту низької абразивності. Якому індексу RDA відповідає низький ступінь абразивності?

а. 80

б. 250

с. 20

д. 50

е. 150

159. Пацієнт звернувся до стоматологічної клініки для санації ротової порожнини. Первинний огляд проводить гігієніст зубний і визначає, що у пацієнта відсутній контакт між фронтальними зубами через наявність сагітальної щілини, ріжучі краї нижніх різців знаходяться дистальніше піднебінних поверхонь верхніх різців на 4 мм. Який вид прикусу виявлено у пацієнта?

а. Відкритий

б. Прогнатичний

с. Прямий

д. Прогенічний

е. Перехресний

160. Підліток віком 16 років скаржиться на появу на язиці болючої виразки. Об'єктивно спостерігається: на бічній поверхні язика зліва виявлено виразку з підритими краями та брудно-сірим дном, розміром 0,8x1,5 см, болючу під час пальпації. Підщелепні та шийні лімфатичні вузли збільшені. Для якого діагнозу характерна описана клінічна картина?

а. Лейкоплакія, м'яка форма

б. Набутий сифіліс

с. Туберкульоз

- d. Синдром Стівенса-Джонса
- e. Пухирчатка

161. До гігієніста зубного звернулася пацієнтка віком 17 років зі скаргами на наявність плям білого кольору на вестибулярних поверхнях пришийкової ділянки 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубів. Після обстеження встановлено діагноз: гострий початковий карієс 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубів. Яку комбінацію розчинів найраціональніше застосувати для ремінералізуючої терапії?

a. 10%-й розчин кальцію глюконату і 1-2%-й розчин натрію фториду

- b. 1-2%-й розчин натрію фториду і тифенфлюорид
- c. 1-2%-й розчин натрію фториду і 4%-й розчин фториду олова
- d. Тифенфлюорид і 4%-й розчин фториду олова
- e. 4%-й розчин фториду олова і фторлак

162. Під час мікробіологічного дослідження зубного нальоту п'ятирічної дівчинки виявлено: різні види стрептококів, стафілококів, лактобацили, дріжджові гриби. Рівень інтенсивності карієсу дорівнює 6. Який з мікроорганізмів зубного нальоту має виражені карієсогенні властивості?

- a. Staphylococcus
- b. Str. Salivarius
- c. Candida albicans
- d. Str. mitis

e. Str. mutans

163. До гігієніста зубного звернулися батьки восьмимісячної дівчинки для профілактичного огляду дитини. Який засіб індивідуальної гігієни доцільно рекомендувати до використання для очищення зубів дитини у віці до одного року?

a. Середню зубну щітку

b. М'яку гумову щітку-напальцівник

- c. Дуже м'яку зубну щітку
- d. Жорстку зубну щітку
- e. М'яку зубну щітку

164. До відділення щелепно-лицевої хірургії шпиталізовано пацієнта з ознаками задухи. Після огляду встановлено уламковий перелом нижньої щелепи у підборідковому відділі, дислокаційна асфіксія. Які невідкладні маніпуляції необхідно здійснити?

- a. Провести конікотомію
- b. Негайно накласти трахеостому
- c. Звільнити просвіт ротоглотки від стороннього тіла
- d. Зафіксувати рухомі клапті слизової оболонки

e. Зафіксувати язик лігатурою

165. Гігієніст зубний запропонував пацієнту провести кабінетне відбілювання із застосуванням 44%-ого перекису карбаміду. Які заходи по ізоляції слизової оболонки порожнини рота повинен провести гігієніст зубний?

- a. -
- b. Змазування ясен гліцерином
- c. Нанесення на слизову оболонку вазеліну
- d. Внесення у присінок рота ватні валики

e. Нанесення рідкого коффердаму

166. Пацієнту вперше проводять кабінетне відбілювання зубів. Що з нижченаведеного не є протипоказанням до проведення цієї маніпуляції?

a. Наявність захворювань ясен в зоні усмішки

b. Системна гіоплазія емалі

- c. Вагітність і період лактації
- d. Вік молодше 18 років
- e. Алергічна реакція на перекис водню

167. До гігієніста зубного звернувся пацієнт зі скаргами на наявність пігментованого нальоту

на вестибулярних та оральних поверхнях всіх груп. Під яким кутом уздовж поверхні емалі та дентину направляють струмінь стисненого повітря з частинками порошку під час використання повітряно-абразивної системи?

- a. Не менше 90°
- b. Більше 70°
- c. Більше 135°
- d. Не менше 120°
- e. Не більше 50°**

168. Для проведення пацієнту професійної гігієни ротової порожнини гігієніст зубний обрав зоноспецифічні кюрети Грейсі. Який інструмент обрати для зняття зубних відкладень з вестибулярної та оральної поверхонь фронтальної групи зубів і премолярів?

- a. Кюрета Грейсі 5--6**
- b. Кюрета Грейсі 1--2
- c. Кюрета Грейсі 11--12
- d. Кюрета Грейсі 2--3
- e. Кюрета Грейсі 9--10

169. Для встановлення діагнозу стоматологічному пацієнту проводять зовнішній огляд. Який об'єм дослідження передбачає цей метод?

- a. Оцінка співвідношення зубів верхньої і нижньої щелеп між собою, при їх змиканні
- b. Оцінка стану слизової оболонки ротової порожнини
- c. Оцінка стану тканин пародонту
- d. Оцінка стану твердих тканин зуба
- e. Оцінка шкірних покривів, пропорційності та симетричності обличчя**

170. Батьки восьмирічної дитини звернулися у стоматологічну клініку зі скаргами на зубний біль у дитини у ділянці нижньої щелепи зліва. Під час огляду було виявлено каріозну порожнину у 36 зубі з широким входним отвором у межах припульпарного дентину. Дно та стінки порожнини щільні, пігментовані. Зондування та перкусія негативні. Зі скарг пацієнта біль спричиняє потрапляння їжі у каріозну порожнину, що зникає за деякий час після очищення залишків їжі з наявного дефекту. Який діагноз відповідає описаній клінічній картині?

- a. Хронічний середній карієс
- b. Гострий середній карієс
- c. Хронічний гангренозний пульпіт
- d. Гострий глибокий карієс
- e. Хронічний глибокий карієс**

171. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися місяць тому. Об'єктивно спостерігається: міжзубні сосочки набряклі, ціанотичного відтінку, відзначаються значні зубні нашарування. Гігієнічний індекс - 2,5 бали. Який етап плану лікування пацієнтки треба виконати у перше відвідування?

- a. Протизапальну терапію
- b. Професійну гігієну порожнини рота**
- c. Електрофорез лікарських засобів
- d. Шинування зубів
- e. Призначити антисептичні полоскання

172. У підлітка віком 15 років під час планової санації діагностовано хронічний катаральний гінгівіт. Які речовини, у найбільшій мірі, повинні міститися у групі зубних паст, що рекомендовані у цьому клінічному випадку?

- a. Натрію борат
- b. Амінофториди
- c. Екстракти лікарських рослин**
- d. Сполуки калію
- e. Гліцерофосфат кальцію

173. Зазначте, що входить у поняття <<пародонт>> як комплекс морфо-функціональних

одиниць.

- a. Періодонт, маргінальні ясна, циркулярна зв'язка
- b. Ясна, цемент кореня зуба, періодонтальні зв'язки
- c. Компактний шар альвеолярного відростка, вільноприкріплені ясна
- d. Ясна, кісткова тканина, цемент кореня зуба, періодонт**
- e. Ясна, кісткова тканина

174. У пацієнта під час санації ротової порожнини з'явилася гіперемія шкіри обличчя, виникла нудота, головний біль, шум у вухах, поява туману перед очима. Яка першочергова тактика гігієніста зубного?

- a. Продовжити санацію
- b. Виміряти артеріальний тиск**
- c. Ввести димедрол 1% розчин 1,0 мл внутрішньом'язово
- d. Дати пацієнту випити солодкий напій
- e. Дати вдихнути пари нашатирного спирту

175. Перед хірургічним втручанням з метою дентальної імплантації до гігієніста зубного скеровано пацієнта для проведення професійної гігієни ротової порожнини. Під час огляду гігієніст зубний виявив рясні тверді зубні відкладення темного відтінку. Які інструменти треба застосувати гігієністу зубному для зняття наявних зубних відкладень?

- a. Зоноспецифічні кюрети Грейсі**
- b. Рашпіль
- c. Екскаватор
- d. Штрипси
- e. Апарат Air-Flow

176. Під час профілактичного огляду дівчини віком 14 років гігієніст зубний виявив гіперемію та набряк ясен. Зуби вкриті м'яким зубним нальотом. У фронтальній ділянці нижньої щелепи виявлено наявність твердих зубних відкладень. Які інструменти треба застосувати для видалення твердих відкладень у межах вільного краю ясен?

- a. Інтердентальні щітки
- b. -
- c. Торцеві щітки
- d. Спеціальні кюрети
- e. Серпоподібні гачки**

177. Пацієнту віком 18 років після зняття зубних відкладень було призначено ремінералізувальну терапію. Під час цієї процедури зуби висушили від слини, наклали на них марлеві серветки, змочені у розчині фториду натрію. На зуби та передпліччя пацієнта зафіксували електричні провідники. Укажіть, яку саме процедуру було призначено?

- a. Дарсонвалізація
- b. Електрофорез**
- c. -
- d. Гальванізація
- e. Електроодонтодіагностика

178. Під час проведення професійної гігієни порожнини рота пацієнту віком 38 років гігієніст зубний помітив пляму темно-коричневого кольору на дистальній поверхні 48 зуба. Установлено діагноз хронічного початкового карієсу. Якою має бути тактика гігієніста зубного у цьому разі?

- a. Видалення 48 зуба
- b. Спостереження за вогнищем ураження**
- c. Препарування та пломбування каріозної порожнини
- d. Проведення відбілювання
- e. Застосування аплікацій розчинами з вмістом фтору

179. До гігієніста зубного для проведення професійної гігієни ротової порожнини звернувся пацієнт, але під час дослідження у нього було виявлено захворювання тканин пародонту. Вкажіть основні методи дослідження при захворюваннях тканин пародонту.

- a. Рентгендіагностика
- b. Мікробіологічне дослідження
- c. Огляд, зондування, перкусія, пальпація**
- d. Методи функціональної діагностики
- e. Імунологічне дослідження

180. Під час профілактичного огляду семирічної дитини прийнято рішення провести герметизацію фісур. Коли рекомендовано проводити герметизацію фісур зубів?

- a. Одразу після прорізування зубів**
- b. Через 2 роки після прорізування зубів
- c. Через 1 рік після прорізування зубів
- d. Протягом життя
- e. Через 3--4 роки після прорізування зубів

181. Під час огляду пацієнта лікарем-стоматологом у ротовій порожнині виявлено болючі ерозії з яскраво-червоним дном та поодинокі пухирі із серозним вмістом діаметром до 1,5 см. Якому дерматозу відповідає ця клінічна картина?

- a. Вульгарна пухирчатка**
- b. Дерматоз Дюрінга
- c. Себорейна пухирчатка
- d. Листоподібна пухирчатка
- e. Вегетуюча пухирчатка

182. Алгоритм стоматологічного обстеження пацієнта складається з суб'єктивної та об'єктивної частини. Який із нижченаведених методів належить до об'єктивного стоматологічного обстеження?

- a. Скарги
- b. -
- c. Анамнез життя
- d. Анамнез захворювання

e. Пальпація

183. Після профілактичного огляду чотирирічного хлопчика лікар порекомендував використання зубної пасти. Який вміст фторидів у зубній пасті відповідає віку пацієнта?

- a. 1200 ч/млн
- b. 1000 ч/млн
- c. 1500 ч/млн

d. 500 ч/млн

e. Пасті без фтору

184. Пацієнт звернувся до стоматологічної клініки для відбілювання зубів. Після обстеження гігієніст зубний розпочав підготовку пацієнта до процедури відбілювання. На ізольовані ватними валиками ясна у пришийковій ділянці зубів гігієніст зубний наніс зі шприца рідкий коффердам. Яким має бути наступний крок?

- a. Змивання нанесеного коффердаму струменем води
- b. Очікування 15 сек із метою полімеризації
- c. Просушування нанесеного коффердаму струменем повітря
- d. Очікування 30 сек з метою полімеризації

e. Полімеризація нанесеного коффердаму фотополімерною лампою

185. Під час профілактичного огляду у хлопця віком 11 років на зубах виявлено масивний зубний наліт. Для визначення гігієнічного стану порожнини рота користувалися індексом Сілнесс-Лоу. За якою шкалою здійснюють оцінку даного індексу?

- a. Двобальною
- b. П'ятибальною
- c. Шестибальною
- d. Трибальною

e. Чотирибальною

186. До стоматологічної клініки звернувся пацієнт зі скаргами на неприємний запах із ротової порожнини, гноєтечу з ясен, рухомість зубів. Під час огляду виявлено глибокі пародонтальні кишені, виповнені грануляціями та гнійним ексудатом у ділянці центральної групи зубів обох щелеп. Зуби мають патологічну рухомість II ступеня. Рентгенологічно спостерігається резорбція міжкоміркових перетинок на 2/3 їх висоти. Який найімовірніший діагноз?

- a. Генералізований пародонтит II ступеня, хронічний перебіг
- b. Локалізований пародонтит II ступеня, загострений перебіг
- c. Генералізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг**
- d. Локалізований пародонтит III ступеня, загострений перебіг
- e. Локалізований пародонтит III ступеня, хронічний перебіг

187. До гігієніста зубного звернувся пацієнт віком 55 років для проведення санації. Під час обстеження виявлено рясні під'ясенні тверді зубні відкладення. Було прийнято рішення провести закритий кюретаж, що у процесі призвело до неприємних та болісних відчуттів. Під час втручання пацієнт раптово зблід та спітнів, поскаржився на сильний за груднинний біль з іррадіацією в ліву лопатку. Після прийому таблетки нітрогліцерину біль зменшився. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Тромбоз легеневої артерії
- b. Міжреберна невралгія
- c. Інфаркт міокарда
- d. Напад стенокардії**
- e. Бронхоспазм

188. Пацієнту, який звернувся для консультації до гігієніста зубного було діагностовано генералізований пародонтит у стадії загострення. Які рекомендації щодо жорсткості щетини зубної щітки повинен надати гігієніст зубний?

- a. Обрати щітину середньої жорсткості
- b. Обрати натуральну щітину
- c. Обрати м'яку щітину**
- d. Обрати дуже жорстку щітину
- e. Обрати жорстку щітину

189. Одним з етапів санаційних заходів у ротовій порожнині є антисептична обробка. Які антисептичні препарати можна застосовувати для обробки ротової порожнини?

- a. Клорсепт
- b. Лізоформін
- c. Бланідак Актив
- d. Стериліум
- e. Хлоргексидину біглюконат**

190. Лікар-стоматолог-хірург направив до гігієніста зубного пацієнта для проведення професійної гігієни ротової порожнини. Ознайомившись з формою 043/о цього пацієнта, гігієніст зубний виявив, що раніше йому проводилася дентальна імплантація. За допомогою чого гігієніст зубний може провести зняття зубних відкладень в ділянці дентальних імплантів?

- a. Зоноспецифічних кюрет Грейсі
- b. Ручних скейлерів
- c. Пластикових імплакерів**
- d. Рашпіїв
- e. Екскаваторів

191. Під час рентгенологічного дослідження у проєкції кореня 13 зуба виявлено осередок просвітлення контури якого нагадують язички полум'я. Простежується послідовний перехід від ділянки кісткової деструкції до здорової кістки у вигляді легкого затемнення. Для якого захворювання характерні ці зміни?

- a. Хронічний гранулематозний періодонтит
- b. Хронічний фіброзний періодонтит
- c. Хронічний гранулюючий періодонтит**

- d. Хронічний фіброзний пульпіт
- e. Хронічний гангренозний пульпіт

192. У клініку для профілактичного огляду звернулася пацієнтка. Під час обстеження виявлено гострий початковий карієс 43, 44 зубів. Які клінічні прояви дозволяють встановити такий діагноз?

- a. Відсутність зубної емалі
- b. Жовті плями або смужки на поверхні зубної емалі
- c. Вогнище демінералізації у вигляді білої, матової плями**
- d. Дефекти клиноподібної форми
- e. Наявність тріщин твердих тканин зуба

193. До стоматологічної клініки звернувся пацієнт, якому гігієніст зубний встановив діагноз --- генералізований пародонтит III ступеня у стадії загострення. Для підтвердження об'єктивних даних він використовував рентгенологічні методи дослідження. До рентгенологічного методу обстеження належить все окрім:

- a. Прицільна рентгенографія
- b. Реографія**
- c. Комп'ютерна томографія
- d. Панорамна рентгенографія
- e. Сіалогія

194. Батьки шестирічного хлопчика звернулися до гігієніста зубного для профілактичного огляду дитини. Порожнина рота санована. Нещодавно у малюка прорізались 36 та 46 зуби. Який метод профілактики фісурного карієсу є найдоцільнішим у цьому разі?

- a. Полоскання фторидом натрію
- b. Герметизація фісур**
- c. Покриття зубів фторлаком
- d. Електрофорез з гліцерофосфатом кальцію
- e. Аплікації натрію фториду

195. У пацієнта, який звернувся у стоматологічну клініку з метою санації ротової порожнини, з анамнезу відомо про цукровий діабет. Під час проведення лікування, пацієнт поскаржився на гостре відчуття голоду. Водночас з'явилися слабкість та рясний піт. Через 10 хвилин почалися клонічні та тонічні судоми. Артеріальний тиск у межах 120/80 мм рт.ст., пульс --- 82 уд/хв. Дихання часте, поверхневе. Який патологічний стан міг стати причиною такої клінічної картини?

- a. Гіпоглікемічна кома**
- b. Стенокардія
- c. Колапс
- d. Непритомність
- e. Гіперглікемічна кома

196. У восьмилітньої дитини під час планової санації було діагностовано множинний карієс. Які речовини повинні міститися у групі зубних паст, що рекомендовані у цьому разі?

- a. Вітаміни
- b. Ферменти
- c. Натрію борат
- d. Сполуки калію
- e. Фосфати**

197. Пацієнт звернувся до гігієніста зубного з метою проведення санації ротової порожнини. Зайшовши в кабінет, пацієнт дуже нервувався та відчував неспокій. Під час проведення професійної гігієни він почав відмічати загрудинний тиснучий біль, який ірадіює в ліву лопатку. Після прийому нітрогліцерину біль не зменшився. Який патологічний стан розвинувся у цього пацієнта?

- a. Анафілактичний шок
- b. Інфаркт міокарда**

- с. Стенокардія
- д. Тромбоемболія легеневої артерії
- е. Серцево-судинний колапс

198. Аналіз показників захворюваності карієсом на території України вказує на різний рівень по регіонам. У дванадцятирічних дітей Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей індекс КРВ - 5. Якому рівню інтенсивності карієсу відповідає цей показник?

- а. Середньому
- б. Дуже низькому
- с. Низькому
- д. Дуже високому
- е. Високому**

199. Під час огляду пацієнта гігієніст зубний виявив наявність діастеми та трем. Стан зубів та слизової оболонки без патологічних змін. Які засоби оральної гігієни доцільно порекомендувати цьому пацієнту?

- а. Суперфлос
- б. Тейп**
- с. Зубочистка
- д. Ультрафлос
- е. Флос

200. Пацієнту, який звернувся до стоматологічної клініки з метою санації, було рекомендовано провести професійну гігієну ротової порожнини. Вкажіть, що забезпечує професійна гігієна ротової порожнини.

- а. Видалення з поверхонь зубів зубних відкладень**
- б. Діагностику ранніх стадій карієсу
- с. Діагностику хвороб пародонта
- д. Контроль якості індивідуальної гігієни
- е. Діагностику хвороб слизової оболонки порожнини рота

201. Завершення професійної гігієни ротової порожнини передбачає проведення полірування поверхонь зубів. Оберіть інструменти, які використовуються для полірування зубів?

- а. Полірувальні голівки, сталі стріпси, алмазні бори
- б. Стріпси лавсанові, алмазні бори
- с. Сталі стріпси, металеві матриці
- д. Торцеві щітки, стріпси лавсанові, полірувальні голівки**
- е. Ручні скейлери, зоноспецифічні кюрети Грейсі

202. До гігієніста зубного звернувся пацієнт для відбілювання зубів. Під час огляду порожнини рота виявлено велику кількість м'яких та твердих зубних відкладень. Гігієнічний індекс Федорова-Володкіної --- 3,5. Яка тактика гігієніста зубного?

- а. Кабінетне відбілювання зубів
- б. Домашнє відбілювання зубів
- с. Зовнішнє відбілювання зубів
- д. Професійна гігієна з подальшим відбілюванням зубів**
- е. Рекомендувати відбілюючі зубні пастки

203. Пацієнту було виготовлено повний знімний пластинковий протез з акрилової пластмаси. Який метод догляду за цією ортопедичною конструкцією повинен запропонувати гігієніст зубний пацієнту?

- а. Механічний+хімічний**
- б. Хімічний
- с. Мануальний
- д. Механічний
- е. Медикаментозний+мануальний

204. Пацієнт, якому встановлено незнімні ортодонтічні конструкції на зуби верхньої та нижньої щелеп, звернувся до гігієніста зубного для профілактичного огляду. Яку з нижченаведених

процедур не можна виконувати цьому пацієнту?

- a. Проведення ремінералізуючої терапії
- b. Очищення міжзубних проміжків

c. Відбілювання зубів

- d. Шліфування зубів
- e. Полірування зубів

205. Під час огляду пацієнта було виявлено каріозну порожнину із вузьким вхідним отвором на апроксимальній поверхні 13 зуба у межах плащового дентину. Після розкриття та розширення отвору виявлено розм'якшений дентин. Якому діагнозу відповідає описана клінічна картина?

a. Хронічний гранулюючий періодонтит

b. Гострий середній карієс

- c. Хронічний середній карієс
- d. Гострий глибокий карієс
- e. Гострий пульпіт

206. Який відтінок мають тимчасові зуби?

- a. Сірі
- b. Жовтуватий
- c. Мають білі плями
- d. Рожевий зеленкуватий

e. Блакитний

207. Пацієнту встановлена незнімна ортодонтична конструкція типу брекет-системи. Яку зубну щітку необхідно рекомендувати для догляду за ротовою порожниною цьому пацієнту?

- a. Зубну щітку з натуральною щетиною
- b. Шкребок для язика

c. Монопучкову зубну щітку

- d. М'яку зубну щітку
- e. Тверду зубну щітку

208. Під час проведення професійної гігієни порожнини рота, на етапі зняття твердих зубних відкладень, гігієніст зубний використав звуковий скелер, що працює за рахунок дії струменю повітря. З якою частотою відбувається коливання робочої частини звукового скелера?

a. 20000-30000 Гц

b. 2000-6500 Гц

- c. 10000-15000 Гц
- d. 1000-1500 Гц
- e. 500-1000 Гц

209. Під час проведення профілактичного огляду ротової порожнини у пацієнтки виявлено значні тверді та м'які зубні відкладення. Що відноситься до твердих зубних відкладень?

a. Зубний камінь

- b. Пелікула
- c. Зубний камінь, пелікула, кутикула
- d. Кутикула
- e. Пігментація

210. Пацієнт віком 27 років звернувся до гігієніста зубного зі скаргами на наявність зубного каменю та неприємний запах із порожнини рота. Під час проведення професійної гігієни порожнини рота апаратним методом для видалення зубного каменю виникла незначна кровотеча. Який лікарський засіб раціонально використати у цьому разі?

- a. 5%-й розчин йодиду калію
- b. -
- c. 2%-й розчин гіпохлориту натрію
- d. 5%-й розчин глюконату кальцію

e. 3%-й розчин перекису водню

211. Яке забарвлення має слизова оболонка порожнини рота в нормі?

- a. Червоне
- b. Фіолетове
- c. Синюшне
- d. Яскраве

e. Блідо-рожеве

212. Для проведення професійної гігієни ротової порожнини використовуються ультразвукові скейлери, які окрім зняття зубних відкладень також можуть чинити негативний вплив на тканини органів ротової порожнини. Назвіть правила, яких необхідно дотримуватися під час роботи з ультразвуковими апаратами.

- a. Не використовувати апарат без зрошення водою
- b. Користуватися відсмоктувальними пристроями
- c. Ізолювати м'які тканини

d. Не ставити кінчик робочого інструмента перпендикулярно до поверхні зуба

e. Не тиснути на поверхню зуба

213. У дівчинки віком 11 років при визначенні гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною забарвлено 3/4 поверхні кожного зуба. Який стан гігієни ротової порожнини в неї буде визначений при обчисленні даного індексу?

a. Незадовільний

b. Дуже поганий

c. Добрий

d. Поганий

e. Задовільний

214. У пацієнта віком 11 років, під час визначення індекса Грін-Вермільйона біля 16 зуба гігієніст зубний оцінив площу забарвленого зубного нальоту в 3 бала. Якому клінічному стану відповідає такий результат?

a. Камінь відсутній

b. Зубний наліт вкриває 1/4 поверхні зуба

c. Зубний наліт вкриває 2/3 поверхні зуба

d. Зубний наліт відсутній

e. Зубний наліт вкриває 1/3 поверхні зуба

215. Під час профілактичного огляду семирічної дитини виявлено крейдоподібну пляму на вестибулярній поверхні 21 зуба, яка локалізована в пришийковій ділянці. Пляма має матову поверхню. Суб'єктивні скарги дитини відсутні. Який найбільш ймовірний діагноз?

a. Карієс у стадії пігментної плями

b. Системна гіоплазія емалі

c. Флюороз

d. Місцева гіоплазія емалі

e. Карієс у стадії білої плями

216. У восьмирічної дівчинки виявлено шкідливу звичку - "лінощі жування" та рекомендовано використання жувальної гумки після їжі, 3-4 рази на день. Із якою метою лікар надав цю рекомендацію?

a. Для освіження подиху

b. Для покращення гігієнічного стану

c. Як елемент міогімнастики

d. Для регуляції pH слини

e. Для профілактики карієсу

217. Під час обстеження пацієнта гігієніст зубний використовує ряд індексів завдяки яким можна оцінити: площу, товщину, а також фізичні, хімічні, мікробіологічні параметри зубного нальоту. Вкажіть, до якої групи належать індекси завдяки яким можна визначити вищезазначені параметри.

a. Загальні індекси

b. Гігієнічні індекси

- c. Пародонтальні індекси
- d. Пародонтологічні індекси
- e. Індекси дослідження слизової оболонки ротової порожнини

218. До гігієніста зубного звернувся пацієнт для проведення професійної гігієни порожнини рота. Під час зняття під'ясенних твердих зубних відкладень пацієнт поскаржився на біль і порушення свідомості. Після надання горизонтального положення тілу та обприскування обличчя холодною водою у пацієнта відновилася свідомість протягом 30 сек. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. Колапс
- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Шок
- d. Гіперглікемічна кома

e. Непритомність

219. Який вік формує ключову групу для індексної оцінки стану тканин пародонту?

- a. 6 років
- b. 18 років
- c. 15 років
- d. 12 років
- e. 16 років

220. Під час проведення професійної гігієни ротової порожнини використовують апарат, за допомогою якого якісно очищаються зуби від пігментацій. Як називається цей апарат?

- a. Piezon Master
- b. Air Flow
- c. PerioScan
- d. Ультрастом
- e. Ультрадент

221. Дівчина віком 18 років скаржиться на підвищену чутливість зубів від хімічних подразників. Якої абразивності пасту треба рекомендувати пацієнтці для догляду за ротовою порожниною?

- a. Дуже низької
- b. Помірної
- c. Низької
- d. Високої
- e. Дуже високої

222. Пацієнтці, під час обстеження органів ротової порожнини, збору анамнезу та скарг встановлено попередній діагноз --- хронічний генералізований пародонтит. Яке дослідження слід застосувати для встановлення остаточного діагнозу?

- a. Прицільну рентгенографію
- b. Комп'ютерну томографію
- c. Лабораторне дослідження
- d. Панорамну рентгенографію
- e. Функціональне дослідження

223. Однією із ознак правильного проведення реанімаційних заходів при клінічній смерті є?

- a. Звуження зіниць
- b. Помутніння рогівки
- c. Розширення зіниць
- d. Відсутність реакції зіниць на світло
- e. Просвітлення рогівки

224. Пацієнту провели професійну гігієну ротової порожнини, підібрали предмети та засоби індивідуальної гігієни. Як часто потрібно виконувати професійну гігієну для дорослих зі здоровими тканинами пародонту?

- a. Раз у 9 місяців
- b. Раз у 3 місяці

- c. За потреби
- d. Раз у 12 місяців
- e. Раз у 6 місяців

225. Батьки восьмирічної дитини звернулися до гігієніста зубного з метою санації. Під час обстеження було виявлено високу інтенсивність каріозного процесу ($KPV + kp = 7$), індекс Федорова-Володкіної становив 3,0. Яка форма активності каріозного процесу у цього пацієнта?

- a. Компенсована форма
- b. ---
- c. Субкомпенсована форма
- d. Декомпенсована форма
- e. Некомпенсована форма

226. У постраждалого констатовано клінічну смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з перерахованого нижче свідчить про ефективність непрямому масажу серця?

- a. Пульсація на сонній артерії
- b. Почервоніння шкірних покривів кінцівок
- c. Рухи епігастральної ділянки
- d. Почервоніння шкірних покривів обличчя
- e. Мимовільні рухи грудної клітки

227. Важливим показником резистентності емалі є співвідношення Ca/P . Яке співвідношення Ca/P є критерієм переходу процесу в патологічний та неспроможності емалі протистояти декальцинації?

- a. 1,5
- b. 1,37
- c. 1,67
- d. 1,25
- e. 2,1

228. До гігієніста зубного звернулася пацієнтка віком 16 років для профілактичного огляду. Під час обстеження показник гігієнічного індексу Green-Vermillion - 1,7. На обстежуваних зубах чітко візуалізуються зубні бляшки. Яке значення рН виникає під зубною бляшкою, що викликає демінералізацію твердих тканин зубів?

- a. 6
- b. 7,5
- c. 4
- d. 7
- e. 6,5

229. Під час обстеження пацієнта гігієніст зубний виявив наявність пігментацій на зубах верхньої та нижньої щелеп. Для проведення гігієнічних процедур пацієнту гігієніст зубний вибрав хендібластер. Укажіть протипоказання до використання цього апарату.

- a. Очищення фісур жувальних поверхонь
- b. Очищення ділянок оголеного цементу кореня зуба
- c. Видалення забарвлених зубних відкладень
- d. Полірування зубних поверхонь після скейлінгу
- e. Очищення поверхонь коронок зубів перед фіксацією брекетів

230. Під час стоматологічного прийому пацієнт поскаржився на погане самопочуття. З анамнезу відомо, що у пацієнта цукровий діабет 2-го типу. Об'єктивно спостерігається: вологість шкіри, дезорієнтація, порушення координації рухів, судоми, тахікардія. Для якого стану характерні ці симптоми?

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Колапс
- c. Епілептичний напад
- d. Діабетична кома
- e. Анафілактичний шок

231. Яку з перелічених хімічних речовин найчастіше використовують, як відбілюючий агент для зубів?

- a. Ортофосфорна кислота
- b. Фтор
- c. Перекис водню**
- d. Хлор
- e. Кальцій

232. Пацієнту було проведено процедуру кабінетного відбілювання зубів із застосуванням 44%-ого перекису карбаміду. Відбілювання проводилося із дотриманням інструкцій щодо процедури. Після проведеної процедури пацієнт поскаржився на відчуття печії в ділянці зубів, які відбілювалися. Під час огляду спостерігається побіління ясенного краю з гіперемією навколишніх тканин. Що могло спричинити ці клінічні симптоми у пацієнта?

- a. Випаровування відбілюючого гелю
- b. Реакція ротової рідини з відбілюючим гелем
- c. Дія відбілюючої лампи
- d. Низька резистентність тканин пародонту
- e. Порушення герметичності коффердаму**

233. До стоматологічної клініки звернулися батьки дитини віком 13 років. Під час обстеження пацієнта було визначено індекс карієсу КПВ, що відповідав значенню --- 7. Які зубні паста доцільно призначити для профілактики карієсу цьому пацієнту?

- a. З ферментами
- b. З сольовими добавками
- c. Зі сполуками фтору**
- d. З антисептиками
- e. З екстрактами трав

234. Пацієнту із санованою ротовою порожниною рекомендовано домашнє відбілювання зубів із використанням кап. До яких негативних наслідків може призвести нещільне прилягання капи до зубів?

- a. Некаріозних уражень
- b. Пульпіту
- c. Подразнення тканин ясен**
- d. Карієсу
- e. Періодонтиту

235. Пацієнтка звернулася у клініку для профілактичного огляду. Гігієніст зубний проводить оцінку гігієнічного стану порожнини рота. Який індекс треба виконати з цією метою?

- a. РМА
- b. PI
- c. Індекс Федорова-Володкіної**
- d. Індекс КПВ
- e. Індекс КПВ+ кп

236. У стоматологічний кабінет звернувся пацієнт з метою профілактичного огляду. Зубному гігієністу необхідно визначити індекс Грін-Вермільйона. Вкажіть його критерії.

- a. Зубний наліт, зубний камінь**
- b. Наявність пародонтальної кишені
- c. Інтенсивність карієсу
- d. Ступінь запалення ясен
- e. Кровоточивість ясен

237. До гігієніста зубного звернувся пацієнт для проведення професійної гігієни порожнини рота. Проведення процедури завершили покриттям зубів фторвмісним лаком. З якою метою проводиться флюоризація після професійного чищення зубів?

- a. Профілактики розвитку пародонтиту
- b. Повного видалення зубної бляшки

с. Повного видалення зубних відкладень

д. Профілактики розвитку гінгівіту

е. Профілактики карієсу та гіперестезії

238. Під час огляду ротової порожнини дитини віком 8 років, проведено індексне визначення стану гігієни ротової порожнини за Федоровим-Володкіною. Отриманий результат дорівнює 1,1 балам. Якому стану гігієни ротової порожнини відповідає цей показник?

а. Незадовільний

б. Дуже поганий

с. Поганий

д. Хороший

е. Задовільний

239. До стоматологічної клініки звернувся пацієнт з ознаками флюорозу зубів. З анамнезу життя відомо, що пацієнт проживає в області, де вода має надлишок фтору. Вкажіть, які показники вмісту фтору у воді вказують на його нормальну концентрацію.

а. 0,2--0,3 мг/л

б. 0,5--0,7 мг/л

с. 1,2--1,5 мг/л

д. 0,7--1,2 мг/л

е. 1,5--2,0 мг/л

240. Для оцінки загальносоматичного здоров'я дитини під час обстеження використовується поділ на групи здоров'я. До якої групи здоров'я належить дитина з довготривалою хронічною хворобою - субкомпенсований стан?

а. 1

б. 5

с. 3

д. 4

е. 2