

1. В якому терміні вагітності доцільно шпиталізувати жінку до акушерського закладу охорони здоров'я

a. 41 тиждень

b. 37 тижнів

c. 39 тижнів

d. 42 тижні

e. 35 тижнів

2. В якому терміні вагітності доцільно шпиталізувати жінку до акушерського закладу охорони здоров'я

a. 41 тиждень

b. 42 тижні

c. 39 тижнів

d. 37 тижнів

e. 35 тижнів

3. Вагітна жінка віком 25 років перебуває на обліку в жіночій консультації. Вагітність перша, протік

a. Порекомендувати продовжити планові візити до жіночої консультації до настання регулярних перейм

b. Виписати направлення для шпиталізації до хірургічного відділення

c. Спостерігати за станом вагітної жінки в оглядовому кабінеті жіночої консультації впродовж години

d. Забезпечити лікування в денному стаціонарі

e. негайно шпиталізувати до пологового відділення

4. Вагітна жінка віком 25 років перебуває на обліку в жіночій консультації. Вагітність перша, протік

a. негайно шпиталізувати до пологового відділення

b. Порекомендувати продовжити планові візити до жіночої консультації до настання регулярних перейм

c. Спостерігати за станом вагітної жінки в оглядовому кабінеті жіночої консультації впродовж години

d. Забезпечити лікування в денному стаціонарі

e. Виписати направлення для шпиталізації до хірургічного відділення

5. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика з гр

a. 10 мл

b. 1,5 мл

c. 35 мл

d. 3,5 мл

e. 5 мл

6. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика з гр

a. 5 мл

b. 3,5 мл

c. 35 мл

d. 10 мл

e. 1,5 мл

7. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спос

a. Вродженого гіпотиреозу

b. Акромегалії

c. Рахіту

d. Вродженої вади серця

e. Дифузного токсичного зоба

8. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спос

a. Дифузного токсичного зоба

b. Рахіту

c. Вродженої вади серця

d. Акромегалії

e. Вродженого гіпотиреозу

9. Для зменшення інтенсивності спастичного болю, що супроводжує перебіг хронічного холециститу, па

a. 40^oC

b. 80^oC

c. 90^oC

d. 60^oC

e. 50^oC

10. Для зменшення інтенсивності спастичного болю, що супроводжує перебіг хронічного холециститу, п

- a. 50^oC
- b. 40^oC
- c. 90^oC
- d. 60^oC
- e. 80^oC

11. Для лікування подагричного артриту в стадії загострення препаратами першої лінії є швидкодіючі Н

- a. Після вживання їжі
- b. Запивати невеликою кількістю води
- c. Незалежно від вживання їжі
- d. За 2 год до вживання їжі
- e. Натщесерце

12. Для лікування подагричного артриту в стадії загострення препаратами першої лінії є швидкодіючі Н

- a. Після вживання їжі
- b. Натщесерце
- c. За 2 год до вживання їжі
- d. Запивати невеликою кількістю води
- e. Незалежно від вживання їжі

13. Для механічного видалення (вимивання) сірчаної пробки з вуха пацієнта необхідно підготувати осна

- a. Відмороження вушної раковини
- b. Зовнішній отит
- c. Звуження слухових проходів
- d. Опік вушної раковини
- e. Перфорація барабанної перетинки

14. Для механічного видалення (вимивання) сірчаної пробки з вуха пацієнта необхідно підготувати осна

- a. Звуження слухових проходів
- b. Опік вушної раковини
- c. Зовнішній отит
- d. Відмороження вушної раковини
- e. Перфорація барабанної перетинки

15. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягн

- a. Медикаментозної емболії
- b. Некрозу
- c. Повітряної емболії
- d. Інфільтрату
- e. Гематоми

16. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягн

- a. Інфільтрату
- b. Гематоми
- c. Некрозу
- d. Повітряної емболії
- e. Медикаментозної емболії

17. Для якого ендокринного захворювання характерна поява у пацієнта таких очних симптомів: екзофт

- a. Аутоімунного тиреоїдиту
- b. Нецукрового діабету
- c. Гіпотиреозу
- d. Цукрового діабету
- e. Дифузного токсичного зоба

18. Для якого ендокринного захворювання характерна поява у пацієнта таких очних симптомів: екзофт

- a. Аутоімунного тиреоїдиту
- b. Цукрового діабету
- c. Гіпотиреозу
- d. Нецукрового діабету
- e. Дифузного токсичного зоба

19. Для якого захворювання сечостатевої системи характерний такий симптомокомплекс: підвищення а

- a. Гострого гломерулонефриту

- b. Хронічного пієлонефриту
- c. Гострого циститу
- d. Сечокам'яної хвороби
- e. Гострого уретриту

20. Для якого захворювання сечостатевої системи характерний такий симптомокомплекс: підвищення а

a. Гострого гломерулонефриту

- b. Хронічного пієлонефриту
- c. Сечокам'яної хвороби
- d. Гострого циститу
- e. Гострого уретриту

21. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігас

a. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

- b. Виразкової хвороби шлунка
- c. Хронічного панкреатиту
- d. Хронічного атрофічного гастриту
- e. Хронічного холециститу

22. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігас

- a. Хронічного холециститу
- b. Хронічного панкреатиту

c. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

- d. Хронічного атрофічного гастриту
- e. Виразкової хвороби шлунка

23. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: "маскоподібне обличчя", кисетопод

a. Системної склеродермії

- b. Червоного системного вовчака
- c. Гострої ревматичної гарячки
- d. Вузликового періартеріїту
- e. Ревматоїдного артрити

24. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: "маскоподібне обличчя", кисетопод

- a. Ревматоїдного артрити
- b. Гострої ревматичної гарячки

c. Системної склеродермії

- d. Червоного системного вовчака
- e. Вузликового періартеріїту

25. Для якого захворювання характерні такі результати аналізу сечі пацієнта: сеча каламутна, з осадом

- a. Сечокам'яної хвороби
- b. Гострого гломерулонефриту
- c. Гострої ниркової недостатності
- d. Хронічного гломерулонефриту

e. Гострого пієлонефриту

26. Для якого захворювання характерні такі результати аналізу сечі пацієнта: сеча каламутна, з осадом

- a. Хронічного гломерулонефриту
- b. Гострої ниркової недостатності

c. Гострого пієлонефриту

- d. Гострого гломерулонефриту
- e. Сечокам'яної хвороби

27. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наяв

- a. Ангінозного
- b. Церебрального

c. Астматичного

- d. Аритмічного
- e. Гастралгічного

28. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наяв

- a. Церебрального
- b. Аритмічного

- c. Гастралгічного
- d. Ангінозного

e. Астматичного

29. До гастроентеролога звернулася пацієнтка віком 65 років, яка довгий час хворіє на виразкову хвор

- a. Раку нирки
- b. Гострого гастроентероколіту

c. Раку шлунка

- d. Хронічного холециститу
- e. Гострого панкреатиту

30. До гастроентеролога звернулася пацієнтка віком 65 років, яка довгий час хворіє на виразкову хвор

- a. Раку нирки
- b. Гострого панкреатиту
- c. Гострого гастроентероколіту
- d. Хронічного холециститу

e. Раку шлунка

31. До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу висипань на кистях рук. Після об

- a. Гель
- b. Крем
- c. Паста
- d. Мазь

e. Розчин

32. До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу висипань на кистях рук. Після об

- a. Крем
- b. Мазь
- c. Паста

d. Розчин

e. Гель

33. Жінка віком 19 років, яка перебуває на 37-му тижні вагітності, цікавиться методом епідуральної а

a. Подовження другого періоду пологів

- b. Збільшення ризику розвитку прееклампсії
- c. Негативний вплив на серцебиття плода
- d. Збільшення ризику розвитку еклампсії
- e. Гіперстимуляція яєчників

34. Жінка віком 19 років, яка перебуває на 37-му тижні вагітності, цікавиться методом епідуральної а

a. Негативний вплив на серцебиття плода

b. Подовження другого періоду пологів

- c. Збільшення ризику розвитку еклампсії
- d. Збільшення ризику розвитку прееклампсії
- e. Гіперстимуляція яєчників

35. Жінка віком 20 років скаржиться на сильний переймоподібний біль унизу живота та попереку, кров'

- a. Альгодисменорея
- b. Загроза переривання вагітності
- c. Передчасні пологи
- d. Апоплексія яєчника

e. Аборт у ході

36. Жінка віком 20 років скаржиться на сильний переймоподібний біль унизу живота та попереку, кров'

a. Передчасні пологи

b. Аборт у ході

- c. Загроза переривання вагітності
- d. Апоплексія яєчника
- e. Альгодисменорея

37. Жінці віком 48 років після комплексного обстеження встановлено діагноз: ендемічний зоб. Укажіть

- a. Дефіцит кальцію в продуктах харчування
- b. Надлишкове споживання харчових продуктів, що містять йод
- c. Надлишкове споживання кухонної солі

d. Недостатнє споживання йоду з їжею та водою

e. Недостатнє надходження заліза до організму

38. Жінці віком 48 років після комплексного обстеження встановлено діагноз: ендемічний зоб. Укажіть

a. Надлишкове споживання кухонної солі

b. Надлишкове споживання харчових продуктів, що містять йод

c. Дефіцит кальцію в продуктах харчування

d. Недостатнє надходження заліза до організму

e. Недостатнє споживання йоду з їжею та водою

39. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно

a. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів

b. Медичну карту амбулаторного хворого

c. Медичну карту стаціонарного хворого

d. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

e. Контрольну карту диспансерного нагляду

40. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно

a. Медичну карту амбулаторного хворого

b. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

c. Медичну карту стаціонарного хворого

d. Контрольну карту диспансерного нагляду

e. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів

41. Маніпуляційна сестра медична контролює термін стерильності матеріалу в біксі, який не був розкритий

a. 1-го тижня

b. 6-ти днів

c. 3-х діб

d. 8-ми год

e. 1-го дня

42. Маніпуляційна сестра медична контролює термін стерильності матеріалу в біксі, який не був розкритий

a. 8-ми год

b. 1-го дня

c. 3-х діб

d. 6-ти днів

e. 1-го тижня

43. Медичний працівник проводить запис електрокардіограми пацієнту, в якого виник напад стенокардії

a. -

b. R та T

c. R та P

d. Q та S

e. P та T

44. Медичний працівник проводить запис електрокардіограми пацієнту, в якого виник напад стенокардії

a. R та T

b. P та T

c. Q та S

d. R та P

e. -

45. На машинобудівному заводі проводиться позапланова перевірка у зв'язку з зафіксованим збільшенням

a. Оптимізація температурних умов робочої зони

b. Надання додаткових днів відпустки

c. Зменшення запиленості в повітрі робочої зони

d. Скорочення тривалості робочої зміни

e. Проведення позапланового інструктажу для працівників

46. На машинобудівному заводі проводиться позапланова перевірка у зв'язку з зафіксованим збільшенням

a. Оптимізація температурних умов робочої зони

b. Проведення позапланового інструктажу для працівників

c. Скорочення тривалості робочої зміни

d. Надання додаткових днів відпустки

е. Зменшення запиленості в повітрі робочої зони

47. Операційна сестра медична комплектує стерилізаційний бікс та укладає все необхідне (операційну

a. Універсальна

b. Цілеспрямована

c. Видова

d. Спеціалізована

е. -

48. Операційна сестра медична комплектує стерилізаційний бікс та укладає все необхідне (операційну

a. Видова

b. Універсальна

c. Цілеспрямована

d. -

е. Спеціалізована

49. П'ятирічна дитина каталася на самокаті і впала. На місці забою виникла гематома без пошкодження

a. Застосування міхура з льодом

b. Накладання зігрівального компресу

c. Прикладання медичної грілки

d. -

е. Застосування гірчичників

50. П'ятирічна дитина каталася на самокаті і впала. На місці забою виникла гематома без пошкодження

a. Накладання зігрівального компресу

b. -

c. Застосування міхура з льодом

d. Застосування гірчичників

е. Прикладання медичної грілки

51. Пацієнт відчув раптовий біль за грудниною та стиснення у грудях. Сестра медична, надаючи невідк.

a. Напад стенокардії

b. Колапс

c. Кардіогенний шок

d. Напад бронхіальної астми

е. Гіпертензивний криз

52. Пацієнт відчув раптовий біль за грудниною та стиснення у грудях. Сестра медична, надаючи невідк.

a. Гіпертензивний криз

b. Напад бронхіальної астми

c. Кардіогенний шок

d. Напад стенокардії

е. Колапс

53. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$, набряк і почервонін

a. Фурункул

b. Карбункул

c. Флегмона

d. Гідраденіт

е. Абсцес

54. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$, набряк і почервонін

a. Карбункул

b. Гідраденіт

c. Флегмона

d. Абсцес

е. Фурункул

55. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприєм

a. Ексудативного плевриту

b. Сухого плевриту

c. Бронхоектатичної хвороби

d. Негоспітальної пневмонії

е. Гострого бронхіту

56. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом.

- a. Сухого плевриту
- b. Бронхоектатичної хвороби
- c. Негоспітальної пневмонії
- d. Гострого бронхіту
- e. Ексудативного плевриту

57. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападоподібний біль у ділянці правого підребра.

- a. Печінкова коліка
- b. Ниркова коліка
- c. Гострий панкреатит
- d. Гострий гастрит
- e. Кишкова коліка

58. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападоподібний біль у ділянці правого підребра.

- a. Гострий гастрит
- b. Печінкова коліка
- c. Ниркова коліка
- d. Гострий панкреатит
- e. Кишкова коліка

59. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на задишку, колючий біль та відчуття скутості в грудній клітці.

- a. Силікозу
- b. Пневмонії
- c. Сухого плевриту
- d. Гострого бронхіту
- e. Антракозу

60. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на задишку, колючий біль та відчуття скутості в грудній клітці.

- a. Гострого бронхіту
- b. Силікозу
- c. Антракозу
- d. Сухого плевриту
- e. Пневмонії

61. Пацієнт віком 56 років скаржиться на появу висипань на відкритих ділянках тіла (долонях, обличчі).

- a. Вплив холоду та низьких температур
- b. Контакт із паперовими матеріалами
- c. Контакт із фарбами та лаками
- d. Роботу на автоматизованій виробничій лінії
- e. Вплив ароматизаторів у повітрі робочої зони

62. Пацієнт віком 56 років скаржиться на появу висипань на відкритих ділянках тіла (долонях, обличчі).

- a. Контакт із паперовими матеріалами
- b. Вплив ароматизаторів у повітрі робочої зони
- c. Контакт із фарбами та лаками
- d. Вплив холоду та низьких температур
- e. Роботу на автоматизованій виробничій лінії

63. Пацієнт віком 60 років скаржиться на пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву ногу.

- a. Інфаркту міокарда
- b. Колапсу
- c. Гіпертензивного кризу
- d. Кардіогенного шоку
- e. Нападу стенокардії

64. Пацієнт віком 60 років скаржиться на пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву ногу.

- a. Гіпертензивного кризу
- b. Колапсу
- c. Кардіогенного шоку
- d. Нападу стенокардії
- e. Інфаркту міокарда

65. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів свідчить про прогресування захворювання?

- a. Шум у вухах
- b. Біль у кістках
- c. Свербіж шкіри
- d. Екзофтальм
- e. Тризм жувальних м'язів

66. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів свідчить про

- a. Шум у вухах
- b. Екзофтальм
- c. Свербіж шкіри
- d. Біль у кістках
- e. Тризм жувальних м'язів

67. Пацієнт звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на слюзотечу, почервоніння очей та відчутт

a. 10-15 хв

- b. 3-5 хв
- c. 30 хв
- d. 60 хв
- e. 1-2 хв

68. Пацієнт звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на слюзотечу, почервоніння очей та відчутт

a. 1-2 хв

b. 10-15 хв

- c. 30 хв
- d. 3-5 хв
- e. 60 хв

69. Пацієнт перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні після дорожньо-транспортної пригоди, як

- a. Застосування гірчичників
- b. Прикладання міхура з льодом
- c. Імобілізація кінцівки

d. Накладання зігрівального компресу

e. Накладання охолоджувального компресу

70. Пацієнт перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні після дорожньо-транспортної пригоди, як

- a. Прикладання міхура з льодом
- b. Застосування гірчичників
- c. Імобілізація кінцівки

d. Накладання зігрівального компресу

e. Накладання охолоджувального компресу

71. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість та біль у правій половині

a. Оперізувального герпесу

- b. Простого герпесу
- c. Імпетиго
- d. Справжньої екземи
- e. Токсикодермії

72. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість та біль у правій половині

a. Оперізувального герпесу

- b. Простого герпесу
- c. Імпетиго
- d. Токсикодермії
- e. Справжньої екземи

73. Пацієнт скаржиться на часткову втрату чутливості в правій нижній кінцівці після внутрішньом'язов

a. Сідничний нерв

- b. Клубова кістка
- c. Зовнішня клубова артерія
- d. Стегнова артерія
- e. Стегновий нерв

74. Пацієнт скаржиться на часткову втрату чутливості в правій нижній кінцівці після внутрішньом'язов

a. Зовнішня клубова артерія

- b. Стегновий нерв
- c. Стегнова артерія

d. Сідничний нерв

- e. Клубова кістка

75. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рід

a. Кишкової (ентерогенної)

- b. -

c. Шлункової

d. Панкреатогенної

e. Печінкової (гепатобіліарної)

76. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рід

- a. -

b. Панкреатогенної

c. Шлункової

d. Кишкової (ентерогенної)

e. Печінкової (гепатобіліарної)

77. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання у руках, судоми в м'язах кистей. З

a. Системної склеродермії

b. Ревматоїдного артрити

c. Цукрового діабету

d. Пневмоконіозу

e. Вібраційної хвороби

78. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання у руках, судоми в м'язах кистей. З

a. Цукрового діабету

b. Вібраційної хвороби

c. Пневмоконіозу

d. Ревматоїдного артрити

e. Системної склеродермії

79. Пацієнт, у якого триває I стадія гарячки, скаржиться на головний біль, м'язове тремтіння, мерзля

a. Застосування медичної грілки

b. Прикладання мішечків із сухим льодом на ділянку великих судин шиї

c. Накладання охолоджувального компресу

d. Прикладання міхура з льодом

e. Застосування гірчичників

80. Пацієнт, у якого триває I стадія гарячки, скаржиться на головний біль, м'язове тремтіння, мерзля

a. Прикладання міхура з льодом

b. Застосування медичної грілки

c. Накладання охолоджувального компресу

d. Застосування гірчичників

e. Прикладання мішечків із сухим льодом на ділянку великих судин шиї

81. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий, дуже інтенсивний ("кин

a. Пенетрація виразки

b. Малігнізація виразки

c. Стеноз пілоричної частини шлунка

d. Перфорація виразки

e. Шлунково-кишкова кровотеча

82. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий, дуже інтенсивний ("кин

a. Стеноз пілоричної частини шлунка

b. Перфорація виразки

c. Шлунково-кишкова кровотеча

d. Малігнізація виразки

e. Пенетрація виразки

83. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні на 5-ту добу захворювання зі скаргами на сильни

a. Гепатиту

b. Лептоспірозу

- с. ВІЛ-інфекції
- d. Малярії
- е. Бешихи

84. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні на 5-ту добу захворювання зі скаргами на сильни

- a. Малярії
- b. ВІЛ-інфекції
- с. Бешихи
- d. Гепатиту

е. Лептоспірозу

85. Пацієнта віком 65 років шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом: неспецифічний виразкови

- a. Фіброгастроскопія
- b. Цистоскопія
- с. Лапароскопія
- d. Холецистографія

е. Колоноскопія

86. Пацієнта віком 65 років шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом: неспецифічний виразкови

- a. Фіброгастроскопія
- b. Цистоскопія
- с. Холецистографія
- d. Лапароскопія

е. Колоноскопія

87. Пацієнтка віком 18 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на часте і болісне сечовипус

- a. Гострого пієлонефриту
- b. Полікістозу нирок
- с. Сечокам'яної хвороби

d. Гострого циститу

е. Гострого аднекситу

88. Пацієнтка віком 18 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на часте і болісне сечовипус

- a. Сечокам'яної хвороби
- b. Гострого аднекситу
- с. Полікістозу нирок
- d. Гострого пієлонефриту

е. Гострого циститу

89. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу в лівій пахвовій ділянці щільного болючого утворенн

a. Остеомієліту

b. Гідраденіту

- с. Сикозу
- d. Фурункулу
- е. Карбункулу

90. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу в лівій пахвовій ділянці щільного болючого утворенн

a. Сикозу

b. Гідраденіту

- с. Карбункулу
- d. Фурункулу
- е. Остеомієліту

91. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливіст

- a. Гострого бронхіту
- b. Пневмосклерозу

с. Абсцесу легень

- d. Раку легень
- е. Вогнищевої пневмонії

92. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливіст

- a. Гострого бронхіту
- b. Раку легень
- с. Пневмосклерозу

d. Абсцесу легень

e. Вогнищевої пневмонії

93. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на біль у поперековій ділянці, часте сечовипускання, озноб, п

a. Лейкоцитурія (піурія)

b. Парапротеїнурія

c. Міоглобінурія

d. Гематурія (сеча кольору "м'ясних помиїв")

e. Глюкозурія

94. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на біль у поперековій ділянці, часте сечовипускання, озноб, п

a. Глюкозурія

b. Гематурія (сеча кольору "м'ясних помиїв")

c. Лейкоцитурія (піурія)

d. Парапротеїнурія

e. Міоглобінурія

95. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, задишку під час фізичн

a. Залізодефіцитної

b. Вітамін В₁₂-дефіцитної

c. Постгеморагічної

d. Апластичної

e. Гіпопластичної

96. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, задишку під час фізичн

a. Постгеморагічної

b. Гіпопластичної

c. Залізодефіцитної

d. Апластичної

e. Вітамін В₁₂-дефіцитної

97. Пацієнтка віком 56 років після вживання гострої їжі відчула різкий біль у правому підребер'ї, що

a. Антибіотики

b. Антиагреганти

c. Гепатопротектори

d. Снодійні

e. Спазмолітики

98. Пацієнтка віком 56 років після вживання гострої їжі відчула різкий біль у правому підребер'ї, що

a. Снодійні

b. Гепатопротектори

c. Антибіотики

d. Антиагреганти

e. Спазмолітики

99. Пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції. Лікар призначив введення по

a. 1 мл

b. 6 мл

c. 8 мл

d. 10 мл

e. 2 мл

100. Пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції. Лікар призначив введення п

a. 8 мл

b. 6 мл

c. 2 мл

d. 10 мл

e. 1 мл

101. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратів

a. Куріння

b. Шкідливі звички

c. Порушення дієти

d. Психотравма

е. Переохолодження

102. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратів

а. Переохолодження

б. Психотравма

с. Куріння

д. Порушення дієти

е. Шкідливі звички

103. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниже

а. Деформуючого остеоартрозу

б. Ревматичного поліартриту

с. Системного васкуліту

д. Системного червоного вовчака

е. Ревматоїдного артрити

104. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниже

а. Системного червоного вовчака

б. Деформуючого остеоартрозу

с. Системного васкуліту

д. Ревматичного поліартриту

е. Ревматоїдного артрити

105. Пацієнтка, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність, скаржиться на наростаючу задишку під ч

а. Кистях рук

б. Нижніх кінцівках

с. Поперековій ділянці

д. Обличчі

е. Животі

106. Пацієнтка, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність, скаржиться на наростаючу задишку під ч

а. Кистях рук

б. Поперековій ділянці

с. Нижніх кінцівках

д. Животі

е. Обличчі

107. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на біль у правому підребер'ї, що іррадіює в епіг

а. Геморагічного коліту

б. Гострого пієлонефриту

с. Виразкової хвороби шлунка

д. Вірусного гепатиту

е. Жовчнокам'яної хвороби

108. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на біль у правому підребер'ї, що іррадіює в епіг

а. Гострого пієлонефриту

б. Жовчнокам'яної хвороби

с. Виразкової хвороби шлунка

д. Вірусного гепатиту

е. Геморагічного коліту

109. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий інтенсивний біль у поперековій ділян

а. Гострого аднекситу

б. Ниркової коліки

с. Гострого апендициту

д. Жовчної (печінкової) коліки

е. Перитоніту

110. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий інтенсивний біль у поперековій ділян

а. Жовчної (печінкової) коліки

б. Гострого апендициту

с. Перитоніту

д. Ниркової коліки

е. Гострого аднекситу

111. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати

a. Цитостатики

b. Протівірусні

c. Антибіотики

d. Кардіопротектори

e. Гепатопротектори

112. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати

a. Кардіопротектори

b. Протівірусні

c. Гепатопротектори

d. Цитостатики

e. Антибіотики

113. Пацієнту віком 30 років встановлено діагноз: псоріаз. Який специфічний клінічний прояв вказуват

a. Висип у вигляді "метелика"

b. Симптом Кебнера

c. Симптом Нікольського

d. Кільцеподібна еритема

e. Плями Бельського-Філатова-Копліка

114. Пацієнту віком 30 років встановлено діагноз: псоріаз. Який специфічний клінічний прояв вказуват

a. Плями Бельського-Філатова-Копліка

b. Симптом Кебнера

c. Кільцеподібна еритема

d. Симптом Нікольського

e. Висип у вигляді "метелика"

115. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: хронічний пієлонефрит. Яка з нижченаведених лікарс

a. Меліса лікарська

b. Ехінацея пурпурова

c. Подорожник великий

d. Мати-й-мачуха

e. Хвощ польовий

116. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: хронічний пієлонефрит. Яка з нижченаведених лікарс

a. Подорожник великий

b. Меліса лікарська

c. Ехінацея пурпурова

d. Мати-й-мачуха

e. Хвощ польовий

117. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для

a. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, "повним ротом"

b. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв

c. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфе

d. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння

e. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік

118. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для

a. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв

b. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, "повним ротом"

c. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік

d. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння

e. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфе

119. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Вер

a. Тромбоцитопенія

b. Ретикулоцитопенія

c. Еритроцитоз

d. Еозинофілія

e. Лейкопенія

120. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Вер

- a. Ретикулоцитопенія
- b. Еозинофілія
- c. Лейкопенія
- d. Еритроцитоз
- e. Тромбоцитопенія

121. Пацієнту віком 37 років встановлено попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба. Який рентгеноло

- a. Іригоскопія
- b. Холецистографія

- c. Гастрографія
- d. Урографія
- e. Цистографія

122. Пацієнту віком 37 років встановлено попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба. Який рентгеноло

- a. Цистографія
- b. Урографія
- c. Гастрографія

- d. Холецистографія
- e. Іригоскопія

123. Пацієнту віком 42 роки встановлено попередній діагноз: гостра ниркова недостатність. Рівень яки

- a. α -амілази, трипсину
- b. Білірубіну, трансаміназ
- c. С-реактивного білка, сіалових кислот
- d. Загального білка та його фракцій

- e. Креатиніну, сечовини

124. Пацієнту віком 42 роки встановлено попередній діагноз: гостра ниркова недостатність. Рівень яки

- a. С-реактивного білка, сіалових кислот
- b. Загального білка та його фракцій

- c. Креатиніну, сечовини

- d. Білірубіну, трансаміназ
- e. α -амілази, трипсину

125. Пацієнту віком 50 років, у якого триває затяжне і тяжке загострення бронхіальної астми, признач

- a. Пневмотахометр

- b. Небулайзер

- c. Пікфлоуметр
- d. Пульсоксиметр
- e. Спірометр

126. Пацієнту віком 50 років, у якого триває затяжне і тяжке загострення бронхіальної астми, признач

- a. Пікфлоуметр
- b. Пульсоксиметр
- c. Спірометр
- d. Пневмотахометр

- e. Небулайзер

127. Пацієнту віком 65 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія. Підвищення рівня якого бі

- a. Креатиніну
- b. Загальних ліпідів
- c. Глюкози
- d. Загального білірубіну
- e. Лужної фосфатази

128. Пацієнту віком 65 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія. Підвищення рівня якого бі

- a. Глюкози
- b. Загальних ліпідів
- c. Лужної фосфатази
- d. Загального білірубіну

- e. Креатиніну

129. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено с

- a. Жовтувато-зеленуватий

b. Безбарвний

c. Червоний

d. Прозорий

e. Каламутний

130. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено с

a. Прозорий

b. Безбарвний

c. Жовтувато-зеленуватий

d. Червоний

e. Каламутний

131. Пацієнту після гастректомії в післяопераційному періоді призначено парентеральне харчування. Як

a. Внутрішньовенний

b. Ректальний

c. Пероральний

d. Інгаляційний

e. Внутрішньом'язовий

132. Пацієнту після гастректомії в післяопераційному періоді призначено парентеральне харчування. Як

a. Ректальний

b. Пероральний

c. Інгаляційний

d. Внутрішньовенний

e. Внутрішньом'язовий

133. Пацієнту терапевтичного відділення з діагностичною метою проводять дуоденальне зондування. Н

a. Розширення жовчних протоків для покращення відтоку жовчі

b. Звуження кровоносних судин для запобігання кровотечі

c. Зменшення чутливості в ділянці правого підребер'я

d. Зігрівання пацієнта для покращення загального стану

e. Зменшення продукції шлункового соку для зниження кислотності

134. Пацієнту терапевтичного відділення з діагностичною метою проводять дуоденальне зондування. Н

a. Зменшення продукції шлункового соку для зниження кислотності

b. Звуження кровоносних судин для запобігання кровотечі

c. Розширення жовчних протоків для покращення відтоку жовчі

d. Зменшення чутливості в ділянці правого підребер'я

e. Зігрівання пацієнта для покращення загального стану

135. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимн

a. 3:1

b. 1:1

c. 1:3

d. 1:4

e. -

136. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимн

a. 1:4

b. 1:1

c. 3:1

d. 1:3

e. -

137. Пацієнту, який страждає на цукровий діабет 1-го типу, сестра медична пояснює методи та способи

a. Інсулінова помпа

b. Інсулінова ручка

c. Внутрішньокісткова канюляція

d. Інфузомат

e. Шприц-дозатор

138. Пацієнту, який страждає на цукровий діабет 1-го типу, сестра медична пояснює методи та способи

a. Внутрішньокісткова канюляція

b. Інсулінова ручка

с. Шприц-дозатор

d. Інсулінова помпа

е. Інфузомат

139. Пацієнтці віком 35 років діагностовано недостатність мітрального клапана. Яке захворювання в анамнезі?

а. Туберкульоз

б. Грип

с. Гостра ревматична гарячка

d. Інфекційний мононуклеоз

е. Поліомієліт

140. Пацієнтці віком 35 років діагностовано недостатність мітрального клапана. Яке захворювання в анамнезі?

а. Туберкульоз

б. Грип

с. Гостра ревматична гарячка

d. Поліомієліт

е. Інфекційний мононуклеоз

141. Пацієнтці, яка хворіє на хронічну недостатність кровообігу, для зменшення набряків призначено сечовипускання.

а. Вимірювання артеріального тиску

б. Вимірювання нічного діурезу

с. Підрахунок кількості сечовипускань за добу

d. Визначення водного балансу

е. -

142. Пацієнтці, яка хворіє на хронічну недостатність кровообігу, для зменшення набряків призначено сечовипускання.

а. Вимірювання нічного діурезу

б. Підрахунок кількості сечовипускань за добу

с. Вимірювання артеріального тиску

d. -

е. Визначення водного балансу

143. Породіллі після народження плода введено 10 ОД окситоцину, процес народження посліду проведено за допомогою вакуум-екстрактора.

а. Балонна тампонада матки

б. -

с. Масаж матки через передню черевну стінку

d. Інструментальна ревізія порожнини матки

е. Пункція заднього склепіння піхви

144. Породіллі після народження плода введено 10 ОД окситоцину, процес народження посліду проведено за допомогою вакуум-екстрактора.

а. Пункція заднього склепіння піхви

б. Масаж матки через передню черевну стінку

с. Інструментальна ревізія порожнини матки

d. -

е. Балонна тампонада матки

145. Під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції сестра медична ввела голку шприца в м'яз на всю довжину голки.

а. Спробувати витягнути голку пальцями

б. Провести хірургічне втручання для видалення голки

с. Прикласти мазь Вишневського до місця уколу

d. Видалити голку за допомогою хірургічного пінцета

е. Спробувати витягнути голку, скориставшись магнітом

146. Під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції сестра медична ввела голку шприца в м'яз на всю довжину голки.

а. Спробувати витягнути голку, скориставшись магнітом

б. Прикласти мазь Вишневського до місця уколу

с. Видалити голку за допомогою хірургічного пінцета

d. Провести хірургічне втручання для видалення голки

е. Спробувати витягнути голку пальцями

147. Під час вимірювання артеріального тиску пацієнтці сестра медична звернула увагу на те, що різни-

а. Капілярний пульс

б. Центральний тиск

с. Хвилинний об'єм крові

d. Систолічний об'єм крові

e. Пульсовий тиск

148. Під час вимірювання артеріального тиску пацієнтці сестра медична звернула увагу на те, що різни

a. Систолічний об'єм крові

b. Хвилинний об'єм крові

c. Центральний тиск

d. Капілярний пульс

e. Пульсовий тиск

149. Під час внутрішньовенного введення розчину антибіотика у пацієнта раптово виникли такі симпто

a. Лоратадин

b. Цетиризин

c. Парацетамол

d. Хлоропірамін

e. Епінефрин

150. Під час внутрішньовенного введення розчину антибіотика у пацієнта раптово виникли такі симпто

a. Цетиризин

b. Парацетамол

c. Лоратадин

d. Хлоропірамін

e. Епінефрин

151. Під час догляду за пацієнтом, який хворіє на інфекційне захворювання, медичний працівник поєдн

a. Рукавички

b. Захисні окуляри

c. Респіратор

d. Хірургічний костюм

e. Маску

152. Під час догляду за пацієнтом, який хворіє на інфекційне захворювання, медичний працівник поєдн

a. Хірургічний костюм

b. Захисні окуляри

c. Маску

d. Рукавички

e. Респіратор

153. Під час дослідження пульсу пацієнтки сестра медична з'ясувала, що після притискання променево

a. Напружений (твердий)

b. М'який

c. Нормального наповнення

d. Ниткоподібний

e. Слабкого наповнення

154. Під час дослідження пульсу пацієнтки сестра медична з'ясувала, що після притискання променево

a. Напружений (твердий)

b. Ниткоподібний

c. М'який

d. Слабкого наповнення

e. Нормального наповнення

155. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним ар

a. Вакуумний масаж

b. Вісцеральна терапія

c. Пневмопресинг

d. Міостимуляція

e. Механотерапія

156. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним ар

a. Міостимуляція

b. Вісцеральна терапія

c. Пневмопресинг

d. Вакуумний масаж

е. Механотерапія

157. Сестра медична готує доповідь щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ). Який найп

а. Контактний

б. Внутрішньоутробний

в. Трансплацентарний

г. Статевий

е. Трансмісивний

158. Сестра медична готує доповідь щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ). Який найп

а. Контактний

б. Статевий

в. Трансплацентарний

г. Внутрішньоутробний

е. Трансмісивний

159. Сестра медична проводить запис електрокардіограми пацієнту кардіологічного відділення. Якому

а. V1

б. V4

в. V5

г. V2

е. V3

160. Сестра медична проводить запис електрокардіограми пацієнту кардіологічного відділення. Якому

а. V1

б. V2

в. V4

г. V3

е. V5

161. Сестра медична інструктує пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму, щодо користування індивіду

а. Глибокий вдих

б. Зайняти горизонтальне положення

в. Глибокий видих (поза інгалятор)

г. Затримати дихання

е. Очистити носову порожнину

162. Сестра медична інструктує пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму, щодо користування індивіду

а. Зайняти горизонтальне положення

б. Глибокий видих (поза інгалятор)

в. Очистити носову порожнину

г. Глибокий вдих

е. Затримати дихання

163. Сестра медична, виконуючи призначення лікаря, вводить лікарський засіб пацієнту внутрішньом'яз

а. 1 мл за 10 с

б. 1 мл за 5 с

в. 1 мл за 1 с

г. 0,5 мл за 10 с

е. 0,5 мл за 5 с

164. Сестра медична, виконуючи призначення лікаря, вводить лікарський засіб пацієнту внутрішньом'яз

а. 0,5 мл за 5 с

б. 1 мл за 1 с

в. 0,5 мл за 10 с

г. 1 мл за 10 с

е. 1 мл за 5 с

165. Старша сестра медична навчає медичний персонал її підрозділу правилам гігієни рук. Який тип на

а. Конференції

б. Санбюлетні

в. Інформаційні плакати

г. Аудіоповідомлення

е. Накази

166. Старша сестра медична навчає медичний персонал її підрозділу правилам гігієни рук. Який тип на

- a. Санбюлетні
- b. Аудіоповідомлення
- c. Накази
- d. Інформаційні плакати
- e. Конференції

167. У вагітної жінки віком 28 років раптово розпочався судомний напад. Об'єктивно спостерігається:

- a. На спині
- b. На лівому боці
- c. На правому боці
- d. Сидячи
- e. На животі

168. У вагітної жінки віком 28 років раптово розпочався судомний напад. Об'єктивно спостерігається:

- a. Сидячи
- b. На животі
- c. На правому боці
- d. На лівому боці
- e. На спині

169. У дитячому дошкільному закладі зареєстровано спалах кору. Укажіть характер елементів висипу у

- a. Плямисто-папульозний
- b. Геморагічно-зірчастий
- c. Уртикарний
- d. Везикульозний
- e. Петехіальний

170. У дитячому дошкільному закладі зареєстровано спалах кору. Укажіть характер елементів висипу у

- a. Геморагічно-зірчастий
- b. Уртикарний
- c. Плямисто-папульозний
- d. Везикульозний
- e. Петехіальний

171. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової д

- a. Мікроспорії
- b. Висівкоподібного лишаю
- c. Токсикодермії
- d. Екземи
- e. Дерматиту

172. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової д

- a. Токсикодермії
- b. Екземи
- c. Висівкоподібного лишаю
- d. Дерматиту
- e. Мікроспорії

173. У жінки віком 28 років після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явилися висипання,

- a. Антиагреганти
- b. Антидепресанти
- c. Антациди
- d. Антигістамінні
- e. Антибіотики

174. У жінки віком 28 років після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явилися висипання,

- a. Антидепресанти
- b. Антациди
- c. Антибіотики
- d. Антигістамінні
- e. Антиагреганти

175. У жінки віком 42 роки, яка впродовж 10-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію, після емоцій

a. Гіпертензивний криз

b. Геморагічний інсульт

c. Гіпоглікемічна кома

d. Ішемічний інсульт

e. Гіперглікемічна кома

176. У жінки віком 42 роки, яка впродовж 10-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію, після емоцій

a. Гіперглікемічна кома

b. Геморагічний інсульт

c. Гіпоглікемічна кома

d. Ішемічний інсульт

e. Гіпертензивний криз

177. У жінки віком 55 років раптово виник напад стенокардії. Для зняття нападу вона застосувала препарат

a. Метапрололу

b. Верапамілу

c. Торасеміду

d. Нітрогліцерину

e. Розувастатину

178. У жінки віком 55 років раптово виник напад стенокардії. Для зняття нападу вона застосувала препарат

a. Метапрололу

b. Торасеміду

c. Розувастатину

d. Нітрогліцерину

e. Верапамілу

179. У жінки на 35-му тижні вагітності з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі виділення

a. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

b. Неповне передлежання плаценти

c. Аборт у ході

d. Розрив матки, що відбувся

e. Загроза розриву матки

180. У жінки на 35-му тижні вагітності з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'яністі виділення

a. Неповне передлежання плаценти

b. Аборт у ході

c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

d. Загроза розриву матки

e. Розрив матки, що відбувся

181. У жінки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну з'явилися загальна слабкість

a. Надати пацієнтці горизонтальне положення та підняти ноги вище рівня голови

b. Дати вжити глюкозовмісні харчові продукти (воду з цукром, грудочку цукру, сік)

c. Увести інсулін

d. Провести інгаляцію киснем

e. Увести кордіамін

182. У жінки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну з'явилися загальна слабкість

a. Провести інгаляцію киснем

b. Увести кордіамін

c. Дати вжити глюкозовмісні харчові продукти (воду з цукром, грудочку цукру, сік)

d. Увести інсулін

e. Надати пацієнтці горизонтальне положення та підняти ноги вище рівня голови

183. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховано

a. Зовнішня кон'югата

b. Справжня кон'югата

c. Міжостьова відстань

d. Міжгребенева відстань

e. Міжвертлюгова відстань

184. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховано

a. Міжгребенева відстань

b. Міжвертлюгова відстань

c. Справжня кон'югата

d. Зовнішня кон'югата

e. Міжостьова відстань

185. У п'ятирічної дитини упродовж 2-х діб спостерігаються підвищення температури тіла до 38°C , рід

a. Сальмонельозу

b. Лептоспірозу

c. Ротавірусної інфекції

d. Шигельозу

e. Холери

186. У п'ятирічної дитини упродовж 2-х діб спостерігаються підвищення температури тіла до 38°C , рід

a. Холери

b. Лептоспірозу

c. Шигельозу

d. Сальмонельозу

e. Ротавірусної інфекції

187. У пацієнта виразкова хвороба шлунка ускладнилася шлунково-кишковою кровотечею. Який вигляд

a. Мутнувато-білого кольору, водянисті

b. Чорного кольору, дьогтеподібні

c. Зеленого кольору, водянисті

d. Коричневого кольору, нормальної консистенції

e. Знебарвлені, пастоподібні

188. У пацієнта виразкова хвороба шлунка ускладнилася шлунково-кишковою кровотечею. Який вигляд

a. Мутнувато-білого кольору, водянисті

b. Зеленого кольору, водянисті

c. Коричневого кольору, нормальної консистенції

d. Чорного кольору, дьогтеподібні

e. Знебарвлені, пастоподібні

189. У пацієнта віком 35 років спостерігаються симптоми туберкульозу: тривалий кашель, субфебрильн

a. Western blot

b. ELISA

c. FISH

d. Sanger sequencing

e. GeneXpert

190. У пацієнта віком 35 років спостерігаються симптоми туберкульозу: тривалий кашель, субфебрильн

a. Western blot

b. FISH

c. Sanger sequencing

d. ELISA

e. GeneXpert

191. У пацієнта віком 45 років під час огляду та об'єктивного обстеження виявлено збільшення розмірі

a. Аналіз крові на глюкозу

b. УЗД щитоподібної залози

c. Загальноклінічний аналіз крові

d. Аналіз крові на тиреоїдні гормони

e. Загальноклінічний аналіз сечі

192. У пацієнта віком 45 років під час огляду та об'єктивного обстеження виявлено збільшення розмірі

a. Аналіз крові на глюкозу

b. УЗД щитоподібної залози

c. Загальноклінічний аналіз сечі

d. Загальноклінічний аналіз крові

e. Аналіз крові на тиреоїдні гормони

193. У пацієнта з діагнозом: цироз печінки - виникла кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

a. Шлунковий зонд

b. Гудзиковий зонд

с. Діатермокоагулятор

d. Зонд Блекмора

е. Катетер Фолея

194. У пацієнта з діагнозом: цироз печінки - виникла кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

а. Шлунковий зонд

б. Гудзиковий зонд

с. Катетер Фолея

d. Зонд Блекмора

е. Діатермокоагулятор

195. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилюється

а. набряк легень

б. Кардіогенний шок

с. Тромбоемболія легеневої артерії

д. Серцева астма

е. Нестабільна стенокардія

196. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилюється

а. Серцева астма

б. Кардіогенний шок

с. набряк легень

д. Тромбоемболія легеневої артерії

е. Нестабільна стенокардія

197. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття

а. Напад бронхіальної астми

б. набряк Квінке

с. Анафілактичний шок

д. Гіповолемічний шок

е. Кардіогенний шок

198. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття

а. Напад бронхіальної астми

б. набряк Квінке

с. Гіповолемічний шок

д. Кардіогенний шок

е. Анафілактичний шок

199. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, "гавкаючий кашель"

а. набряк Квінке

б. Аспірація стороннього тіла

с. Дифтерійний круп

д. Анафілактичний шок

е. Кропив'янка

200. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, "гавкаючий кашель"

а. Анафілактичний шок

б. Кропив'янка

с. Дифтерійний круп

д. набряк Квінке

е. Аспірація стороннього тіла

201. У пацієнта після проведення скарифікаційної шкірної проби через 15 хв у місці нанесення алергену

а. -

б. Гіперергічна

с. Позитивна

д. Сумнівна

е. Негативна

202. У пацієнта після проведення скарифікаційної шкірної проби через 15 хв у місці нанесення алергену

а. Сумнівна

б. Негативна

с. -

d. Позитивна

e. Гіперергічна

203. У пацієнта раптово підвищилася температура тіла, з'явилася болючість шкіри. З анамнезу відомо,

a. Токсичного епідермального некролізу

b. Алергійного контактного дерматиту

c. Простого контактного дерматиту

d. Фіксованої медикаментозної еритеми

e. Герпетиформного дерматиту Дюрінга

204. У пацієнта раптово підвищилася температура тіла, з'явилася болючість шкіри. З анамнезу відомо,

a. Простого контактного дерматиту

b. Фіксованої медикаментозної еритеми

c. Токсичного епідермального некролізу

d. Герпетиформного дерматиту Дюрінга

e. Алергійного контактного дерматиту

205. У пацієнта терапевтичного відділення під час об'єктивного обстеження виявлено випинання надкл

a. Бронхіальної астми

b. Ексудативного плевриту

c. Пневмонії

d. Гострого бронхіту

e. Раку легень

206. У пацієнта терапевтичного відділення під час об'єктивного обстеження виявлено випинання надкл

a. Пневмонії

b. Гострого бронхіту

c. Раку легень

d. Бронхіальної астми

e. Ексудативного плевриту

207. У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна ампл

a. Чейна-Стокса

b. Куссмауля

c. Біота

d. Гаспінг

e. Тахіпноє

208. У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна ампл

a. Гаспінг

b. Куссмауля

c. Біота

d. Тахіпноє

e. Чейна-Стокса

209. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово розвинулася шлунково-кишкова кро

a. Тахікардія, зниження АТ

b. Брадикардія, підвищення АТ

c. Аритмія, АТ не змінюється

d. Тахікардія, підвищення АТ

e. Брадикардія, зниження АТ

210. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово розвинулася шлунково-кишкова кро

a. Тахікардія, підвищення АТ

b. Брадикардія, підвищення АТ

c. Брадикардія, зниження АТ

d. Аритмія, АТ не змінюється

e. Тахікардія, зниження АТ

211. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження темп

a. Астматичний статус

b. Анафілактичний шок

c. Колапс

d. Кардіогенний шок

е. Набряк легень

212. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження темп

а. Кардіогенний шок

б. Набряк легень

с. Астматичний статус

д. Анафілактичний шок

е. Колапс

213. У пацієнта, який хворіє на рак легень, розвинулася легенева кровотеча. Медична сестра надає йому

а. Лежачи на животі

б. Високе Фаулера

с. Тренделенбурга

д. Сімса

е. Низьке Фаулера

214. У пацієнта, який хворіє на рак легень, розвинулася легенева кровотеча. Медична сестра надає йому

а. Тренделенбурга

б. Лежачи на животі

с. Високе Фаулера

д. Сімса

е. Низьке Фаулера

215. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти діб спостерігаються часті рідкі вип

а. Гіпергідратація (затримка води)

б. Зневоднення (дегідратація)

с. Дефіцит вітаміну D

д. Гіпокальціємія

е. Дефіцит заліза

216. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти діб спостерігаються часті рідкі вип

а. Гіпокальціємія

б. Дефіцит вітаміну D

с. Зневоднення (дегідратація)

д. Гіпергідратація (затримка води)

е. Дефіцит заліза

217. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченав

а. Підвищення температури тіла

б. Гіперемія шкірних покривів

с. Збільшення лімфатичних вузлів

д. Запах аміаку з рота

е. Підвищення апетиту

218. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченав

а. Підвищення температури тіла

б. Підвищення апетиту

с. Запах аміаку з рота

д. Збільшення лімфатичних вузлів

е. Гіперемія шкірних покривів

219. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, швидкість клубочкової фільтрації ста

а. Гемодіалізу

б. Літотрипсії

с. Лапароцентезу

д. Шунтування

е. Фонофорезу

220. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, швидкість клубочкової фільтрації ста

а. Літотрипсії

б. Лапароцентезу

с. Гемодіалізу

д. Шунтування

е. Фонофорезу

221. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести

- a. -
- b. Плевральну
- c. Абдомінальну
- d. Люмбальну
- e. Сternalьну

222. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести

- a. Плевральну
- b. Сternalьну
- c. Абдомінальну
- d. -
- e. Люмбальну

223. У пацієнтки віком 52 роки після фізичного навантаження виник напад стенокардії. Який основний

- a. Кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння
- b. Набряки на нижніх кінцівках
- c. Інспіраторна задишка
- d. Стискальний біль за грудниною
- e. Експіраторна задишка

224. У пацієнтки віком 52 роки після фізичного навантаження виник напад стенокардії. Який основний

- a. Набряки на нижніх кінцівках
- b. Кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння
- c. Інспіраторна задишка
- d. Стискальний біль за грудниною
- e. Експіраторна задишка

225. У пацієнтки на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився стан: з'явилися задиш

- a. Антибіотикотерапія
- b. Інгаляційне введення гормональних препаратів
- c. Киснева терапія
- d. Фізіотерапевтичні процедури
- e. Інгаляція сальбутамолу

226. У пацієнтки на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився стан: з'явилися задиш

- a. Фізіотерапевтичні процедури
- b. Інгаляційне введення гормональних препаратів
- c. Інгаляція сальбутамолу
- d. Антибіотикотерапія
- e. Киснева терапія

227. У пацієнтки напад бронхіальної астми минув після застосування інгаляційного глюкокортикоїдного

- a. Із прожилками крові
- b. Склоподібне
- c. "Іржаве"
- d. У вигляді "малинового желе"
- e. Гнійне

228. У пацієнтки напад бронхіальної астми минув після застосування інгаляційного глюкокортикоїдного

- a. Гнійне
- b. Склоподібне
- c. У вигляді "малинового желе"
- d. Із прожилками крові
- e. "Іржаве"

229. У пацієнтки, якій призначено накладання гірчичників, на момент проведення процедури спостеріга

- a. До місця накладання гірчичників попередньо прикласти холодний компрес
- b. Накласти гірчичники і запропонувати прийняти жарознижувальний засіб
- c. Обмежити час накладання гірчичників до 5 хв
- d. Накласти гірчичники, не зважаючи на обставини
- e. Накладати гірчичники не можна

230. У пацієнтки, якій призначено накладання гірчичників, на момент проведення процедури спостеріга

- a. Накласти гірчичники і запропонувати прийняти жарознижувальний засіб
- b. Накласти гірчичники, не зважаючи на обставини
- c. Обмежити час накладання гірчичників до 5 хв

d. Накладати гірчичники не можна

- e. До місця накладання гірчичників попередньо прикласти холодний компрес

231. У породіллі на 4-ту добу після пологів з'явилися ознаки гіпогалакції, грудне молоко виділяється

- a. Обмежити кількість прикладань до грудей до 3 разів на добу
- b. Запропонувати лише нічні годування
- c. Призначити дитині адаптовану молочну суміш

d. Збільшити частоту прикладань дитини до грудей

- e. Порекомендувати фітозасоби для підвищення лактації

232. У породіллі на 4-ту добу після пологів з'явилися ознаки гіпогалакції, грудне молоко виділяється

- a. Призначити дитині адаптовану молочну суміш
- b. Обмежити кількість прикладань до грудей до 3 разів на добу

c. Збільшити частоту прикладань дитини до грудей

- d. Запропонувати лише нічні годування
- e. Порекомендувати фітозасоби для підвищення лактації

233. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри промежи

- a. IV
- b. -
- c. III
- d. II
- e. I

234. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри промежи

- a. II
- b. I
- c. III
- d. IV
- e. -

235. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата

a. Затримка частин плаценти в порожнині матки

- b. Порушення згортальної системи крові
- c. Розрив шийки матки
- d. Розрив промежини
- e. Розрив матки

236. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата

- a. Порушення згортальної системи крові
- b. Розрив матки
- c. Розрив шийки матки

d. Затримка частин плаценти в порожнині матки

- e. Розрив промежини

237. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності - 39 тиж

a. Кожні 30 хв

- b. Кожні 15 хв
- c. 3 інтервалом 10 хв
- d. 3 інтервалом 20 хв
- e. Раз на 1 год

238. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності - 39 тиж

- a. 3 інтервалом 10 хв
- b. Кожні 15 хв
- c. Раз на 1 год
- d. 3 інтервалом 20 хв

e. Кожні 30 хв

239. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період фізіологічних пологів. Під час прорізуванн

- a. Продовжити очікувальну тактику

b. Провести епізіотомію під місцевою анестезією

- c. Негайно провести кесарів розтин
- d. Увести епінефрин 0,01 мг/кг
- e. Накласти акушерські щипці

240. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період фізіологічних пологів. Під час прорізуванн

- a. Увести епінефрин 0,01 мг/кг
- b. Продовжити очікувальну тактику

c. Провести епізіотомію під місцевою анестезією

- d. Негайно провести кесарів розтин
- e. Накласти акушерські щипці

241. У чоловіка віком 35 років після контакту із хлорофосом під час польових робіт з'явилися такі си

a. Фосфорорганічними сполуками

- b. Хлорорганічними сполуками
- c. Нітратами
- d. Метанолом
- e. Ртуттю

242. У чоловіка віком 35 років після контакту із хлорофосом під час польових робіт з'явилися такі си

- a. Ртуттю
- b. Метанолом
- c. Нітратами
- d. Хлорорганічними сполуками

e. Фосфорорганічними сполуками

243. У чоловіка віком 40 років унаслідок падіння з висоти стався перелом кісток передпліччя. Укажіть

- a. Контрактури
- b. Некроз кістки

c. Жирова емболія

- d. Укорочення кінцівки
- e. Анкілоз

244. У чоловіка віком 40 років унаслідок падіння з висоти стався перелом кісток передпліччя. Укажіть

- a. Укорочення кінцівки
- b. Некроз кістки
- c. Контрактури

d. Жирова емболія

e. Анкілоз

245. Укажіть групу лікарських засобів, що використовується у лікуванні пацієнтів, які хворіють на ат

- a. Антиагреганти
- b. Інгібітори АПФ
- c. β -адреноблокатори

d. Статини

e. Антикоагулянти

246. Укажіть групу лікарських засобів, що використовується у лікуванні пацієнтів, які хворіють на ат

- a. Антиагреганти
- b. Інгібітори АПФ
- c. β -адреноблокатори
- d. Антикоагулянти

e. Статини

247. Укажіть засіб, яким потрібно промити неушкоджену шкіру, у разі потрапляння на неї крові або інш

a. Дезінфікуючим розчином

b. Водю з милом

- c. Антисептиком
- d. Фізіологічним розчином
- e. Етиловим спиртом

248. Укажіть засіб, яким потрібно промити неушкоджену шкіру, у разі потрапляння на неї крові або інш

- a. Етиловим спиртом
- b. Дезінфікуючим розчином

- c. Антисептиком
- d. Фізіологічним розчином

e. Водою з милом

249. Укажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіогра

a. Права нога

b. Ліва нога

c. Права рука

d. Ліва рука

e. -

250. Укажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіогра

a. Права рука

b. -

c. Ліва нога

d. Ліва рука

e. Права нога

251. Укажіть основний метод пренатальної інвазивної діагностики для виявлення генетичної патології у

a. -

b. Амніоцентез

c. Кордоцентез

d. Ультразвукове дослідження

e. Дослідження ворсин хоріона

252. Укажіть основний метод пренатальної інвазивної діагностики для виявлення генетичної патології у

a. Ультразвукове дослідження

b. -

c. Дослідження ворсин хоріона

d. Амніоцентез

e. Кордоцентез

253. Укажіть особливість приймання ферментних препаратів.

a. За 2 год до вживання їжі

b. Через 1 год після вживання їжі

c. Під час вживання їжі

d. Через 2 год після вживання їжі

e. Натщесерце

254. Укажіть особливість приймання ферментних препаратів.

a. Натщесерце

b. За 2 год до вживання їжі

c. Через 2 год після вживання їжі

d. Через 1 год після вживання їжі

e. Під час вживання їжі

255. Укажіть період пологів, який починається з моменту повного розкриття шийки матки і закінчується

a. Перший

b. Четвертий

c. Третій

d. Другий

e. -

256. Укажіть період пологів, який починається з моменту повного розкриття шийки матки і закінчується

a. Четвертий

b. Третій

c. -

d. Перший

e. Другий

257. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути у пацієнта під час внутрішньовенного введе

a. Брадикардія

b. Сонливість

c. Відчуття жару в тілі

- d. Закреп
- e. Порушення зору

258. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути у пацієнта під час внутрішньовенного введе

- a. Сонливість
- b. Відчуття жару в тілі**

- c. Порушення зору
- d. Закреп
- e. Брадикардія

259. Чоловік віком 35 років після падіння з висоти скаржиться на виражений біль у ділянці правого пл

- a. Блідість шкіри
- b. Гіперемія шкіри
- c. Кісткова крепітація**

- d. набряк шкіри
- e. Локальний біль

260. Чоловік віком 35 років після падіння з висоти скаржиться на виражений біль у ділянці правого пл

- a. набряк шкіри
- b. Кісткова крепітація**

- c. Локальний біль
- d. Блідість шкіри
- e. Гіперемія шкіри

261. Чоловік віком 49 років скаржиться на біль у грудній клітці та утруднене дихання. Після первинно

- a. Торакоцентез**
- b. Стернальна пункція
- c. Бронхоскопія
- d. Спірометрія
- e. Абдомінальна пункція

262. Чоловік віком 49 років скаржиться на біль у грудній клітці та утруднене дихання. Після первинно

- a. Бронхоскопія
- b. Спірометрія
- c. Абдомінальна пункція
- d. Торакоцентез**

- e. Стернальна пункція

263. Чоловіка вкусив пес, який, імовірно, був хворий на сказ. Який із нижченаведених симптомів може

- a. Гіперестезії**
- b. Паралічі
- c. Гіперсалівація
- d. Аерофобія
- e. Фотофобія

264. Чоловіка вкусив пес, який, імовірно, був хворий на сказ. Який із нижченаведених симптомів може

- a. Гіперсалівація
- b. Гіперестезії**

- c. Паралічі
- d. Аерофобія
- e. Фотофобія

265. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичн

- a. Голку Дюфо
- b. Голку Біра**

- c. Троакар
- d. Біопсійну голку
- e. Голку Касирського

266. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичн

- a. Голку Касирського
- b. Голку Дюфо
- c. Голку Біра**
- d. Біопсійну голку

е. Троакар

267. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться д

а. Бронхоскопія

б. Шкірні алергологічні тести

с. УЗД легенів

д. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки

е. Спірографія

268. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться д

а. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки

б. Спірографія

с. Шкірні алергологічні тести

д. Бронхоскопія

е. УЗД легенів

269. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину ма

а. Гістероскопія

б. Кольпоскопія

с. Гідротубація

д. Пертубація

е. Лапароскопія

270. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину ма

а. Кольпоскопія

б. Гідротубація

с. Лапароскопія

д. Гістероскопія

е. Пертубація

271. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пац

а. Листок лікарських призначень

б. Реєстраційна генетична карта

с. Консультативний висновок спеціаліста

д. Журнал обліку процедур

е. Температурний листок

272. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пац

а. Температурний листок

б. Журнал обліку процедур

с. Листок лікарських призначень

д. Консультативний висновок спеціаліста

е. Реєстраційна генетична карта

273. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини, що с

а. Біологічна

б. -

с. Термічна

д. Електролітична

е. Магнітна

274. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини, що с

а. Біологічна

б. Електролітична

с. Термічна

д. Магнітна

е. -

275. Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хроні

а. Антибактеріальні

б. Антигістамінні

с. Антитромботичні

д. Діуретики

е. Нестероїдні протизапальні

276. Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хронічного гепатиту А?

a. Антибактеріальні

b. Нестероїдні протизапальні

c. Антигістамінні

d. Антитромботичні

e. Діуретики

277. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики ішемічної хвороби серця?

a. Нейроміографія

b. Спірографія

c. Енцефалографія

d. Аудіометрія

e. Велоергометрія

278. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики ішемічної хвороби серця?

a. Спірографія

b. Нейроміографія

c. Енцефалографія

d. Аудіометрія

e. Велоергометрія

279. Який ендоскопічний метод дослідження сечового міхура використовується для діагностики захворювань сечового міхура?

a. Ультразвукове дослідження

b. Цистоскопія

c. Колоноскопія

d. Холецистографія

e. Цистографія

280. Який ендоскопічний метод дослідження сечового міхура використовується для діагностики захворювань сечового міхура?

a. Цистографія

b. Колоноскопія

c. Ультразвукове дослідження

d. Цистоскопія

e. Холецистографія

281. Який метод дослідження дає можливість провести транцервікальний огляд нижнього полюса плоду?

a. Гістероскопія

b. Кольпоскопія

c. Амніоскопія

d. Лапароскопія

e. Цервікоскопія

282. Який метод дослідження дає можливість провести транцервікальний огляд нижнього полюса плоду?

a. Цервікоскопія

b. Амніоскопія

c. Лапароскопія

d. Гістероскопія

e. Кольпоскопія

283. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення бактеріальних забруднень?

a. Інструментальний

b. Бактеріологічний

c. Фізичний

d. Хімічний

e. Візуальний

284. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення бактеріальних забруднень?

a. Фізичний

b. Візуальний

c. Інструментальний

d. Хімічний

e. Бактеріологічний

285. Який метод лікування доцільно запропонувати пацієнтці з неускладненою формою жовчнокам'яної хвороби?

a. Гепатопротекторну терапію

b. Холецистектомію

c. Ударно-хвильову літотрипсію

d. Електрофорез жовчного міхура з магнію сульфатом

e. Жовчогінну терапію

286. Який метод лікування доцільно запропонувати пацієнтці з неускладненою формою жовчнокам'яної

a. Холецистектомію

b. Гепатопротекторну терапію

c. Електрофорез жовчного міхура з магнію сульфатом

d. Ударно-хвильову літотрипсію

e. Жовчогінну терапію

287. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується в II періоді гарячки

a. Гірчичники

b. Міхур із льодом

c. Медичні банки

d. Медична грілка

e. Зігрівальний компрес

288. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується в II періоді гарячки

a. Медична грілка

b. Гірчичники

c. Медичні банки

d. Міхур із льодом

e. Зігрівальний компрес

289. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної обробки

a. 1 мл

b. 9 мл

c. 5 мл

d. 6 мл

e. 3 мл

290. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної обробки

a. 6 мл

b. 1 мл

c. 5 мл

d. 9 мл

e. 3 мл

291. Який із нижченаведених продуктів рекомендовано виключити з раціону харчування пацієнтки, яка

a. Броколі

b. Вівсянку

c. Кабачки

d. Картопля

e. Шоколад

292. Який із нижченаведених продуктів рекомендовано виключити з раціону харчування пацієнтки, яка

a. Вівсянку

b. Шоколад

c. Броколі

d. Картопля

e. Кабачки

293. Який із нижченаведених факторів має найбільший вплив на стан дихальних шляхів і може значно з

a. Підвищення фізичної активності

b. Відмова від тютюнопаління

c. Використання засобів для чищення повітря

d. Зволоження повітря в приміщенні

e. Нормалізація маси тіла

294. Який із нижченаведених факторів має найбільший вплив на стан дихальних шляхів і може значно з

a. Підвищення фізичної активності

b. Зволоження повітря в приміщенні

c. Нормалізація маси тіла

d. Відмова від тютюнопаління

e. Використання засобів для чищення повітря

295. Якої тактики необхідно дотримуватися для запобігання некрозу тканин під час внутрішньовенного

a. Змінювати місце введення лікарського засобу

b. Не допускати потрапляння розчину в паравенозний простір

c. Ретельно мити руки перед процедурою

d. Перед застосуванням розчин потрібно підігріти

e. Перевірити кут і глибину введення голки

296. Якої тактики необхідно дотримуватися для запобігання некрозу тканин під час внутрішньовенного

a. Перевірити кут і глибину введення голки

b. Не допускати потрапляння розчину в паравенозний простір

c. Перед застосуванням розчин потрібно підігріти

d. Змінювати місце введення лікарського засобу

e. Ретельно мити руки перед процедурою

297. Яку процедуру потрібно провести медичному працівнику після контакту з потенційно інфікованим

a. Гігієнічну обробку рук

b. Одягання нових рукавичок

c. Висушування рук

d. Миття рук із милом

e. Хірургічну обробку рук

298. Яку процедуру потрібно провести медичному працівнику після контакту з потенційно інфікованим

a. Одягання нових рукавичок

b. Гігієнічну обробку рук

c. Висушування рук

d. Хірургічну обробку рук

e. Миття рук із милом

299. Які з нижченаведених лікарських засобів найчастіше викликають медикаментозну алергію?

a. Гіпотензивні

b. Проносні

c. Ентеросорбенти

d. Антибіотики

e. Сечогінні

300. Які з нижченаведених лікарських засобів найчастіше викликають медикаментозну алергію?

a. Проносні

b. Ентеросорбенти

c. Сечогінні

d. Гіпотензивні

e. Антибіотики