

1. Приватний медичний заклад очолює керівник, який виконує всі функції управління. Йому підпорядкований кожен з членів колективу медичної установи. Всі виконують тільки його вказівки. Зазначте тип управління:

A. Лінійний тип управління

B. Функціональний тип управління

C. Дивізіональний тип управління

D. Лінійно-штабний тип управління

E. Матричний тип управління

2. Медична статистика потрібна для того, щоб:

A. Знати рівень здоров'я населення та планувати відповідні заходи з його поліпшення

B. Знати число осіб, померлих в медичних закладах

C. Слідкувати за використанням державних коштів

D. Скласти опис країни та її населення

E. Складати звіти медичних закладів

3. У стаціонар надійшов пацієнт з гострим отруєнням фосфорорганічними пестицидами. Яку хімічну речовину застосовують для проведення антидотної терапії при даній інтоксикації?

A. Атропіну сульфат

B. Унітіол

C. Метиленовий синій

D. Пентацин

E. Зволожений кисень

4. Пацієнтка 35-ти років звернулась із скаргами на ранкову скутість, біль і деформацію дрібних суглобів кистей рук і стоп. При огляді: кисті рук у вигляді «ластів моржа». Для якого захворювання характерні дані клінічні ознаки?

A. Ревматоїдного артриту

B. Деформуючого остеоартрозу

C. Остеохондрозу

D. Ревматичного поліартриту

E. Системного червоного вовчака

5. До медсестри сімейного лікаря звернулась пацієнтка зі скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Ps- 94\хв., АТ- 190\100 мм рт.ст. Який лікарський препарат за призначенням лікаря потрібно підготувати медсестрі для надання невідкладної допомоги?

A. Дибазол

B. Строфантин

C. Дицинон

D. Кофеїн

E. Анальгін

6. Пацієнтка 45-ти років госпіталізована до терапевтичного відділення зі скаргами на головний біль пульсуючого характеру в потиличній ділянці, нудоту, мерехтіння мушок перед очима, біль в ділянці серця. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, пульс - 78\хв., АТ-170\100 мм рт.ст. Вкажіть імовірний попередній діагноз:

A. Гіпертонічна хвороба

- В. Ішемічна хвороба серця
- С. Стенокардія напруги
- Д. Миготлива аритмія
- Е. Інфаркт міокарда

7. На прийомі дитина 3-х років. Скарги на біль в горлі, утруднене ковтання, ознаки інтоксикації. При огляді: на мигдаликах біло-сірі плівки, які важко знімаються шпателем. Яке захворювання можна припустити?

- А. Дифтерію зіву**
- В. Кандидозний стоматит
- С. Лакунарну ангіну
- Д. Афтозний стоматит
- Е. Хронічний тонзиліт

8. Інвентаризація медикаментів у терапевтичному відділенні лікарні виявила надлишок спирту медичного та нестачу шприців одноразових. Хто несе матеріальну відповідальність за результати?

- А. Старша медсестра відділення**
- В. Заступник головного лікаря
- С. Завідувач відділенням
- Д. Головна медсестра лікарні
- Е. Головний лікар

9. Операція з приводу мендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- А. Налоксон**
- В. Атропін
- С. Прозерин
- Д. Адреналін
- Е. Мезатон

10. Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, ведуть постійну реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та інших. Який вид статистичного спостереження за часом вони використовують?

- А. Поточний**
- В. Несуцільний
- С. Гніздовий
- Д. Вибірковий
- Е. Суцільний

11. На медсестринській нараді головна медична сестра лікарні довела до відома присутніх старших медичних сестер розпорядження щодо правил проведення контролю за роботою підпорядкованого їм середнього і молодшого медичного персоналу у відділеннях. Яка форма такої наради?

- А. Інструктивна**
- В. Звітна
- С. Оперативна

- D. Диспетчерська
- E. Проблемна

12. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відвідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю?

- A. Один раз на місяць
- B. Три рази на місяць
- C. П'ять разів на місяць
- D. Два рази на місяць
- E. Чотири рази на місяць

13. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцево-судинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- A. Кожен випадок хвороби серцево-судинної системи, виявлений на медичному огляді
- B. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
- C. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи
- D. Кожен випадок захворювання серцево-судинної системи за даними звертань по медичну допомогу
- E. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням

14. В ЦРЛ проводиться аналіз організації роботи стаціонарів. Які показники будуть залучені до цього аналізу?

- A. Середня зайнятість ліжка, середня тривалість госпіталізації хворих, летальність
- B. Первинна та загальна захворюваність, інвалідність, летальність
- C. Первинна та загальна захворюваність, смертність, летальність
- D. Обґрунтованість направлення хворих до стаціонару, середня тривалість госпіталізації хворих, захворюваність госпіталізованих
- E. Середня тривалість госпіталізації хворих, захворюваність госпіталізованих, частота співпадіння діагнозів поліклініки та стаціонару

15. Делегування повноважень - це передача підлеглим:

- A. Завдань, прав і відповідальності за прийняті рішення
- B. Прав на контроль
- C. Прав на управління
- D. Прав з управління з поділом відповідальності
- E. Завдань, відповідальність за виконання яких несе керівник

16. Мама дитини, у якої діагностовано вроджену ваду серця, звернулась до медичної сестри з питанням: «Чому у дитини спостерігається ціаноз губ та кінцівок?»

- A. Через змішування артеріальної та венозної крові
- B. Як результат анемії
- C. Внаслідок слабкості лівого шлуночка
- D. Через звуження повітроносних шляхів
- E. Внаслідок паралічу дихального центру

17. Обов'язковому посерійному контролю на відповідність вимогам підлягають:

- A. Лікарські засоби для приготування ін'єкційних розчинів і очних крапель

- В. Сильнодіючі лікарські засоби
- С. Тверді лікарські форми
- Д. Рідкі лікарські форми
- Е. Лікарські засоби загального призначення

18. У пацієнта, який перебуває в кардіологічному відділенні з інфарктом міокарда, розвинувся кардіогенний шок. Підберіть за призначенням лікаря медикаменти для надання невідкладної допомоги:

А. Допамін, морфін

- В. Папаверин, магнію сульфат
- С. Еуфілін, преднізолон
- Д. Баралгін, платифілін
- Е. Нітрогліцерин, анальгін

19. До сімейної медсестри звернулась пацієнтка зі скаргами на загальну слабкість, зниження працездатності, головний біль, запаморочення, задишку, кровоточивість ясен, носові кровотечі, субфебрильну температуру. В загальному аналізі крові панцитопенія. Для якої анемії це характерно?

А. Апластичної

- В. Постгеморагічної
- С. Гемолітичної
- Д. Мегалобластної
- Е. Залізодефіцитної

20. Пацієнтка 37-ми років надійшов в хірургічне відділення. Проведена операція: лапаротомія, спленектомія. В черевній порожнині 1,5 л крові. Під час операції перелито 1 л консервованої крові. Вкажіть препарат, який необхідно ввести для профілактики цитратного шоку:

А. 10% розчин кальцію хлориду

- В. 0,9% розчин натрію хлориду
- С. 1% розчин вікасолу
- Д. 12,5% розчин дицинону
- Е. 5% розчин амінокапронової кислоти

21. Створення необхідних умов праці та її регламентування є важливою передумовою підвищення ефективності роботи апарату управління. Де фіксуються вимоги до режиму роботи?

А. У правилах внутрішнього розпорядку

- В. У положенні про апарат управління
- С. У графіку роботи організації
- Д. У статуті організації
- Е. В окремо виданому наказі

22. Протягом звітного року в місті з населенням 20000 зареєстровано 14000 випадків вперше в житті виявлених захворювань. Який показник здоров'я можна обчислити, використовуючи ці дані?

А. Первинна захворюваність

- В. Окремі види захворюваності
- С. Поширеність захворювань
- Д. Структура захворюваності

23. Енергія першого розряду при використанні біполярного дефібрилятора має становити:

- A. 150-200 Дж
- B. 200-250 Дж
- C. 250-300 Дж
- D. 300-350 Дж
- E. 350-400 Дж

24. Старшій медичній сестрі терапевтичного відділення необхідно постійно виконувати контролюючі функції. Гнучкість контролю є однією з них, вона полягає в:

- A. Адекватній реакції на зміни зовнішнього середовища
- B. Здатності не допускати впливу сторонніх факторів на суб'єкти контролю
- C. Адекватному впливі на підлеглих
- D. Здатності не зважати на різні чинники
- E. Пристосуванні до впливу обставин

25. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?

- A. Народжуваність
- B. Інвалідність
- C. Летальність
- D. Травматизм
- E. Первинна захворюваність

26. Дитина 3-х місяців за наявними протипоказаннями не була вчасно щеплена вакциною БЦЖ. На теперішній час здорова. За яких умов можна розпочати профілактичні щеплення дитині?

- A. Після ретельного обстеження та негативної проби Манту
- B. Після наступної планової вакцинації за календарем
- C. Відкласти щеплення до виповнення 7 років
- D. Після обстеження та позитивної проби Манту
- E. Після ретельного обстеження

27. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат за призначенням лікаря необхідно ввести хворому?

- A. Кордіамін
- B. Адреналін
- C. Еуфілін
- D. Фенобарбітал
- E. Мезатон

28. Медична сестра кардіологічного відділення викликана в палату о 3 годині ночі до пацієнта, який скаржиться на сильну ядуху, біль за грудиною, серцебиття. Об'єктивно: обличчя ціанотичне, частота дихання - 30\хв., пульс - 130\хв., АТ- 110\60 мм рт.ст.; на відстані чути клекочучі вологі хрипи. Яке втручання необхідно виконати в першу чергу?

- A. Надати напівсидяче положення
- B. Дати відхаркувальні засоби

- С. Покласти горизонтально
- D. Провести інгаляцію бронхолітиками
- Е. Дати заспокійливі засоби

29. У дітей, які страждають на холецистит, визначають наступні симптоми:

A. Позитивні симптоми Ортнера та Кера

- B. Позитивний симптом Василенка та Куча
- С. Позитивний симптом Мейо-Робсона та Спіжарного
- D. Позитивний симптом Воскресенського та Сітковського
- Е. Позитивний симптом Образцова та Ровзинга

30. Старша медична сестра терапевтичного відділення, готує доповідь на наукову конференцію. Тема доповіді: «Контроль - як функція управління». Дайте визначення поняттю «контроль»:

A. Це управлінська функція й управлінська операція, за допомогою яких здійснюють зіставлення того, що повинно бути, з тим, що є фактично

- B. Це особливий вид управлінської діяльності, конкретні форми управлінського впливу на діяльність системи, які зумовлюють і визначають зміст ділових взаємовідносин
- С. Це процес вибору цілей для організації і прийняття рішень щодо найкращого способу їх досягнення
- D. Це регулярний і систематизований збір інформації про стан і розвиток керованої системи, яка характеризує кількісну та якісну сторони діяльності організації
- Е. Це процес, за допомогою якого керівництво спонукає працівників діяти так, як було заплановано та організовано

31. В ендокринологічне відділення бригадою швидкої медичної допомоги доставлено семирічну дитину, у якої в анамнезі цукровий діабет, свідомість відсутня, шкіра блідо-рожева, волога, відзначається тризм щелеп, посмикування м'язів кінцівок, запах ацетону відсутній. Який стан можна припустити?

A. Гіпоглікемічну кому

- B. Ниркову кому
- С. Гіперглікемічну кому
- D. Церебральну кому
- Е. Печінкову кому

32. На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну становить 300 мкмоль/л за рахунок непрямой фракції. Група крові дитини - A (II) III (+), у матері - кров групи 0(1)III (+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?

A. Гемолітична хвороба новонароджених за системою ABO

- B. Кон'югаційна жовтяниця
- С. Атретія жовчовивідних проток
- D. Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором
- Е. Вроджений гепатит

33. При проведенні патронажу дитини 5-ти років медсестра виявила наступні проблеми: млявість, незначний нежить та кашель. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на незміненому фоні шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях, збільшення потиличних, задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. Яке захворювання можна припустити?

A. Краснуха

B. Скарлатина

C. Кір

D. Геморагічний васкуліт

E. Атопічний дерматит

34. У пацієнта при копрологічному дослідженні випорожнень було виявлено наявність стеатореї, креатореї, амілореї. Отримані результати свідчать про:

A. Екзокринну недостатність підшлункової залози

B. Підвищення секреції шлунка

C. Наявність кишкового дисбіозу

D. Нормальний результат копрологічного дослідження

E. Ендокринну недостатність підшлункової залози

35. Пацієнт скаржиться на постійний біль в епігастрії, загальну слабкість, відсутність апетиту, відразу до м'ясної їжі. В анамнезі виразкова хвороба шлунка. Який метод обстеження є найінформативнішим у диференціальній діагностиці виразкової хвороби та раку шлунка?

A. Гістродуоденоскопія з біопсією

B. Цитологічне дослідження промивних вод шлунка

C. Рентгенологічне обстеження

D. Дослідження шлункової секреції з гістаміном

E. Дослідження калу на приховану кров

36. Новонародженій дитині, яка перебуває у відділенні патології новонароджених з діагнозом вродженої пневмонії, внутрішньовенно 2 рази на добу вводиться антибіотик пеніцилінового ряду, захищений клавулановою кислотою, а саме:

A. Амоксиклав

B. Ампіокс

C. Амікацин

D. Ампіцилін

E. Амоксицилін

37. У хворого 37-ми років скарги на біль у грудній клітці, який посилюється під час дихання, кашлю, нахилу тулуба у здоровий бік, та на непродуктивний кашель із посиленням під час рухів. Рухомість грудної клітки обмежена з ураженого боку. При аускультатії легенів - шум тертя плеври. Яку патологію можна припустити у пацієнта?

A. Сухий плеврит

B. Гострий бронхіт

C. Бронхоектатична хвороба

D. Хронічний бронхіт

E. Стенозуючий ларингіт

38. Дитині 2 роки. Протягом останніх днів відзначались катаральні явища, головний біль, сіпання м'язів, млявість, потім з'явився біль в хребті, рідкі випорожнення. На шостий день захворювання знову підвищилася температура тіла до 37,8°C, з'явився параліч нижніх кінцівок. В анамнезі при народженні пологова травма, профілактичні щеплення не проводились. Яке захворювання можна припустити?

A. Поліомієліт

B. Шигельоз

- C. Менінгококова інфекція
- D. Ротавірусна інфекція
- E. Внутрішньомозкова травма

39. Дитині 7 днів, народилась масою 4200 г, довжина тіла 59 см. Пологи стрімкі, в потиличному передлежанні. В ділянці потиличної кістки пальпується пухлина м'якої консистенції, обмежена цією кісткою, не болюча. При пальпації підчутно флюктуацію і немовби валик по периферії. Загальний стан не порушений. Про яку пологову травму свідчать дані симптоми?

A. Кефалогематома

- B. Водянка головного мозку
- C. Запалення головного мозку
- D. Підшкірний крововилив
- E. Пологова пухлина

40. Хворий 32-х років з вогнепальним пораненням стегна звернувся по допомогу на прийом до хірурга поліклініки. Скаржиться на наростаючий біль та набряк, пов'язка стала тісною та врізалась в тканини. З рани виділяється геморагічна рідина, при пальпації - крепітація. Який діагноз?

A. Газова гангрена

- B. Абсцес
- C. Фурункул
- D. Флегмона
- E. Правець

41. Медична сестра оглядає потерпілого на місці автопригоди. Він скаржиться на біль в правому підребер'ї. Вкажіть, що має припустити медична сестра, якщо при огляді вона виявила симптом "Іванця-Киванця":

A. Розрив селезінки

- B. Розрив печінки
- C. Розрив тонкого кишечника
- D. Розрив шлунка
- E. Розрив сечового міхура

42. Медична сестра приймального відділення оглядає чоловіка 34-х років, який отримав травму в побуті. При огляді виявлено в середній третині лівого стегна рану 4x2 см, з рваними краями, з якої повільно витікає кров темного кольору. Який метод тимчасової зупинки кровотечі застосує медична сестра?

A. Накладання стискальної пов'язки

- B. Згинання кінцівки в суглобі
- C. Накладання джгута вище рани
- D. Накладання джгута нижче рани
- E. Підняття кінцівки вгору

43. Вивчення динаміки явищ є важливим складником аналізу здоров'я та діяльності системи охорони здоров'я. Назвати, які показники застосовують для аналізу динаміки?

A. Темп росту, абсолютний приріст, темп приросту

- B. Показник співвідношення, наочності, інтенсивності
- C. Середні величини, відносні величини
- D. Відносні величини, абсолютні величини

Е. Мода, медіана, частота, амплітуда

44. Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на виробництві "якісних" електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружних рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тону, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

А. Марганець

В. Карбофос

С. Бензол

Д. Тетраетил свинець

Е. Дихлоретан

45. У приймальне відділення ЦРЛ доставили потерпілого 30-ти років після дорожньо-транспортної пригоди. Потерпілий у непритомному стані, АТ- 90/60 мм рт.ст., пульс - 97/хв., із носа і вух витікає рідина червоного кольору. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

А. Перелом основи черепа

В. Перелом лицевої частини черепа

С. Перелом склепіння черепа

Д. Субдуральна гематома

Е. Струс мозку

46. Назвіть симптом, який характерний для латентної форми спазмофілії і проявляється короткочасною зупинкою дихання внаслідок больового подразнення голкою:

А. Симптом Маслоу

В. Симптом Пастернацького

С. Симптом Філатова

Д. Симптом Керніга

Е. Симптом Щоткіна-Блумберга

47. У хірургічне відділення надійшов хворий 35-ти років з діагнозом: гострий апендицит. Операція буде виконуватись під інгалаційним наркозом. Хворий вдома поїв 3 години тому. Як медична сестра у даному випадку повинна готувати шлунково- кишковий тракт пацієнта?

А. Відсмоктати шлунковий вміст

В. Зробити сифонну клізму

С. Поставити очисну клізму

Д. Дати проносні засоби

Е. Зробити премедикацію

48. Між старшою медичною сестрою ендокринологічного відділення та завідувачем зазначеного відділення виникла конфліктна ситуація з приводу розподілу відпусток на наступний рік між співробітниками відділення до Дня медичного працівника. Зазначте тип конфлікту:

А. Міжособистий конфлікт

В. Внутрішньогруповий конфлікт

С. Безособистісний конфлікт

Д. Міжгруповий конфлікт

Е. Внутрішньоособистий конфлікт

49. У потерпілого з колотою раною грудної клітки виявлено, що в момент видиху повітря зі свистом заходить крізь рану у плевральну порожнину. Хворий скаржиться на біль у правій половині грудної клітки, наростаючу задиху, запаморочення. При огляді: ціаноз шкіри обличчя та розширення вен шиї. Аускультативно: дихання справа не вислуховується. У якому невідкладному втручанні повинна взяти участь медична сестра у даному випадку?

A. Проведення плевральної пункції

- B. Інтубація трахеї та штучна вентиляція легень
- C. Проведення вагосимпатичної блокади
- D. Накладання оклюзійної пов'язки на грудну клітку
- E. Проведення міжребрової новокаїнової блокади

50. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

A. Вартість медичних послуг

- B. Співвідношення збуту й цін
- C. Показники повторних купівель
- D. Загальні та відносні витрати
- E. Імовірні стратегії конкурентів

51. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відзначаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий гематогенний остеомієліт

- B. Гострий артрит колінного суглоба
- C. Флегмона правої гомілки
- D. Вивих правого колінного суглоба
- E. Перелом правого колінного суглоба

52. Пацієнт перебуває у реанімаційному відділенні. Загальний стан вкрай тяжкий, свідомість відсутня. Пульс частий, напружений. АТ- 160/110 мм рт.ст. Під час аускультатії серця - шум тертя перикарда. Тонус м'язів підвищений, гіперрефлексія. У повітрі запах аміаку. Рівень креатиніну в крові - 1060 мкмоль/л. Для якого стану це характерно?

A. Уремична кома

- B. Алкогольна кома
- C. Гіпоглікемічна кома
- D. Аддісоновий криз
- E. Гіперглікемічна кома

53. Впродовж двох тижнів дитину 3-х років турбував сухий кашель, незначні виділення з носа. Стан дитини погіршився, кашель набув спазматичного характеру. Напади кашлю закінчуються блюванням. Запідозрено кашлюк. Критеріями легкої форми захворювання є:

A. Частота нападів кашлю - до 15 на добу, репризів до 5

- B. Частота нападів кашлю - 1-2 на добу, репризів немає
- C. Частота нападів кашлю - більше 25 на добу, репризів більше 10
- D. Частота нападів кашлю - до 25 на добу, репризів до 10
- E. Напади закінчуються блюванням, крововиливом в слизові, носові кровотечі

54. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 38,2°C, пульс - 150\хв., АТ- 165\90 мм рт.ст. Яке захворювання можна припустити?

A. Тиреотоксикоз

B. Гіпотиреоз

C. Гіпертонічна хвороба

D. -

E. Інфаркт міокарда

55. Медичне страхування - це система організаційних та фінансових заходів забезпечення охорони здоров'я людей. Що таке медичне страхування з позиції економіки?

A. Створення соціального грошового фонду

B. Організація дослідження ринку медичних послуг

C. Оплата послуг із резервів промислових підприємств

D. Ведення пацієнтами тарифної системи оплати за послуги

E. Систематизація оплати послуг за рахунок держави і людини

56. Пацієнтка 32-х років доставлена в приймальне відділення з нападом ниркової кольки. Взяли сечу на загальний аналіз. Які зміни в сечі найтипівіші для сечокам'яної хвороби у разі ниркової кольки?

A. Свіжих еритроцити, кристали солей

B. Протеїнурія, циліндрурія

C. Лейкоцитурія, слиз

D. Вилужені еритроцити, циліндри

E. Бактеріурія, глюкозурія

57. Горизонтальний розподіл праці передбачає:

A. Розділення всієї роботи на складові компоненти

B. Розподіл роботи серед осіб різного фаху

C. Розподіл роботи серед аналогічних ланок

D. Розподіл всієї роботи на однакові процедури

E. Розподіл роботи серед осіб однакового фаху

58. У дитини 5-ти років важкий стан, шкіра бліда, на ній крововиливи, системне ураження лімфатичних вузлів, збільшення печінки, селезінки, біль у кістках і суглобах.

A. В аналізі крові - різна кількість незрілих клітин, бластні клітини у лейкоцитарній формулі, гемоглобін - 80 г\л, еритроцити - 2,5 - 10¹²\л. Визначте захворювання

B. Лейкоз

C. Гемофілія

D. Геморагічний васкуліт

E. Тромбоцитопенія

F. Хвороба Верльгофа

59. Дитині 3 роки. Часто хворіє на респіраторні інфекції. Малорухлива. Швидко втомлюється. Об'єктивно: дитина підвищеного живлення, відзначається блідість шкірних покривів, знижений тургор тканин. Дихання через ніс утруднене, дихає ротом. При пальпації відзначаються болючі, не спаяні з навколишніми тканинами лімфовузли. Зів блідий, мигдалики гіпертрофовані, виступають з-за дужок. З боку внутрішніх органів патології не виявлено. При рентгенологічному обстеженні виявлено збільшення вилочкової залози. Який діагноз є

найбільш імовірним?

A. Лімфатико-гіпопластичний діатез

B. Алергічний діатез

C. Нервово-артритичний діатез

D. Ексудативно-катаральний діатез

E. Геморагічний діатез

60. Ви старша медична сестра дитячого дошкільного закладу, де захворіла дитина з підозрою на дизентерію. Протягом якого часу будете спостерігати за дітьми, які були в контакті з хворим?

A. 7 днів

B. 9 днів

C. 14 днів

D. 21 дня

E. 10 днів

61. Сімейна медична сестра складає план проведення I ревакцинації проти дифтерії, кашлюку та правця згідно з «Календарем профілактичних щеплень в Україні». Дітей якого віку вона запросить до дитячої поліклініки у кабінет щеплень?

A. 18 місяців

B. 3 місяці

C. 6 місяців

D. 3 роки

E. 12 місяців

62. Дитині 5 років. Скарги на біль в горлі, головний біль, нежить, сльозоточивість, світлобоязнь, підвищення температури тіла до 39°C , висипання на шкірі. Об'єктивно: на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок має місце плямисто-папульозний висип з тенденцією до зливання на незміненому фоні шкіри. З анамнезу відомо, що висип в перший день з'явився за вухами, потім на обличчі, на другий день на тулубі, кінцівках. Яке захворювання можна припустити?

A. Кір

B. Менінгококцемія

C. Краснуха

D. Скарлатина

E. Вітряна віспа

63. У нейрохірургічному відділенні перебуває пацієнт з черепно-мозковою травмою та наростаючим набряком мозку. Що буде запропоноване лікарем для лікування цього ускладнення?

A. Дегідратаційну терапію

B. Баротерапію

C. Фізіотерапію

D. Оксигенотерапію

E. Механотерапію

64. Дитині 8 років. Протягом останнього тижня мали місце симптоми гострого циститу. Мати за медичною допомогою не зверталась, проводила дитині зігрівальні ванни. Вчора дитина поскаржилася на загальну слабкість, головний біль, нудоту, підвищення температури тіла до $38,9^{\circ}\text{C}$, біль попереку, сеча стала каламутна з пластівцями та осадом. Яке захворювання

можна припустити?

A. Пієлонефрит

B. Цистит

C. Гломерулонефрит

D. Сечокислий інфаркт нирок

E. Сечокам'яна хвороба

65. Старша медична сестра, отримує готові лікарські засоби з аптеки. Визначте перший етап товарознавчого аналізу готових лікарських засобів (ГЛЗ):

A. Перевірка супровідної документації на лікарські засоби

B. Перевірка штрих-коду лікарського засобу

C. Проведення органолептичного контролю упаковки ліків

D. Перевірка відповідності найменувань і кількості лікарських засобів

E. Перевірка маркування ГЛЗ

66. У хворого на гострий інфаркт міокарда на ЕКГ реєструється шлуночкова екстрасистолія. Лікування за призначенням лікаря слід почати з введення:

A. Лідокаїну гідрохлориду

B. Обзидан

C. Кордарон

D. Новокаїнамід

E. Верапаміл

67. Хворого 39-ти років госпіталізовано в хірургічне відділення з масивною крововтратою внаслідок шлунково-кишкової кровотечі. Ризик виникнення якого шоку має цей пацієнт?

A. Геморагічного

B. Цитратного

C. Анафілактичного

D. Кардіогенного

E. Гемотрансфузійного

68. Як відомо, матеріали володіють рядом властивостей. Як називається здатність матеріалу набувати нової форми під дією сили і зберігати цю форму після припинення дії сили?

A. Пластичність

B. Міцність

C. Пружність

D. Твердість

E. Втома

69. До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), належить:

A. Цироз печінки

B. Хронічний гастрит

C. Хронічний панкреатит

D. Гіпертонічна хвороба I стадії

E. Нирковокам'яна хвороба

70. Пацієнт 19-ти років скаржиться на біль у правому колінному суглобі. Вважає себе хворим з

дитинства, часто відзначає носові кровотечі. Об'єктивно: правий колінний суглоб припухлий, болючий при пальпації. Під час видалення зуба виникла сильна кровотеча. Який препарат введе медсестра пацієнту за призначенням лікаря щоб зупинити кровотечу?

A. Антигемофільна плазма

- B. Еритроцитарна маса
- C. Тромбоцитарна маса
- D. Фізіологічний розчин
- E. Поліглюкін

71. Медсестра хірургічного відділення здала на стерилізацію перев'язувальний матеріал. Вкажіть температурний режим і тривалість стерилізації перев'язувального матеріалу у паровому стерилізаторі:

A. При температурі 120°C, 45 хв.

- B. При температурі 100°C, 90 хв.
- C. При температурі 180°C, 20 хв.
- D. При температурі 132°C, 10 хв.
- E. При температурі 150°C, 20 хв.

72. Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху - розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

A. Крепітація

- B. Шум тертя плеври
- C. Дрібноміхурцеві хрипи
- D. Шум тертя перикарда
- E. Плевроперикардіальний шум

73. Хворого госпіталізовано в терапевтичне відділення з діагнозом сухого плевриту. Хворого турбує біль у правій половині грудної клітки, посилюється при глибокому вдиху; шум тертя плеври відчувається долонею. Якого положення слід надати пацієнту?

A. На правому боці

- B. На лівому боці
- C. Напівсидяче
- D. На спині
- E. На животі

74. Старшій медичній сестрі травматологічного відділення, для підвищення якості медичної допомоги, постійно необхідно здійснювати процес контролю за діяльністю підлеглих. Назвіть правильний порядок етапів цього контролю:

A. Визначення стандарту, об'єкту контролю, порівняння стандарту з об'єктом

- B. Визначення об'єкта контролю, порівняння стандарту з об'єктом, аналіз і висновки
- C. Визначення об'єкта контролю, аналіз і висновки
- D. Виявлення недоліків та їх усунення
- E. Визначення стандарту, аналіз, вживання заходів щодо усунення недоліків

75. У хворого 25-ти років восени з'явився біль в епігастрії, що виникає через 1,5-2 год. після вживання їжі та вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Виразкова хвороба 12-палої кишки

- B. Хронічний панкреатит
- C. Діафрагмальна кила
- D. Хронічний холецистит
- E. Виразкова хвороба шлунка

76. Службові організаційні документи встановлюють конкретні функції, права й обов'язки на певний час. До них НЕ належать:

A. Накази

- B. Правила
- C. Положення
- D. Статути
- E. Інструкції

77. В статистичному відділі обласної клінічної лікарні медична сестра - статист здійснює обчислення захворюваності в хірургічному відділенні за другий квартал. Назвіть медичний документ, за яким медична сестра вивчає показник захворюваності у відділенні:

A. Статистична карта вибулого зі стаціонару Ф-066-о

- B. Листок лікарських призначень Ф-004-о
- C. Журнал реєстрації амбулаторних хворих Ф-074-о
- D. Медична карта стаціонарного хворого Ф-003-о
- E. Статистичний талон Ф-025-о

78. Пацієнт звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки під очима. В сечі - гематурія, протеїнурія. Хворіє десять днів після перенесеної ангіни. Яке лабораторне дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

A. Аналіз сечі за Нечипоренком

- B. Аналіз сечі на глюкозу
- C. Аналіз сечі на амілазу
- D. Біохімія крові
- E. Загальний аналіз крові

79. У пульмонологічне відділення надійшов пацієнт, якому поставили попередній діагноз бронхіальна астма. Яка тріада клінічних ознак може характеризувати дане захворювання?

A. Експіраторна задишка, сухі хрипи, скловидне харкотиння

- B. Задишка, сухий кашель, кровохаркання
- C. Інспіраторна задишка, клеочуче дихання, вологі хрипи
- D. Задишка, вологі хрипи, крепітація
- E. Змішана задишка, кашель, крепітація

80. В приймальне відділення поліклініки звернувся пацієнт 38-ми років з пораненням шкіри та м'яких тканин лівого стегна. З'ясовано, що пацієнт працює лісником, поранився під час проведення земляних робіт. Відомо, що протягом 4-х останніх років пацієнт не отримував жодних щеплень. Який препарат слід використати для екстреної профілактики правця у даного пацієнта?

A. Правцевий анатоксин

- B. Протиправцеву сироватку
- C. АКДС
- D. Протиправцевий імуноглобулін

Е. Правцевий анатоксин та протиправцеву сироватку

81. Під час обстеження пацієнта медсестра- бакалавр провела топографічну перкусію. Що визначають за допомогою даного обстеження?

А. Межі органів

В. Функціональні шуми

С. Патологічні рефлекси

Д. Флюктуацію

Е. Звуки в симетричних ділянках

82. Головний лікар міської лікарні провів медичну нараду в зв'язку з підвищенням післяопераційної смертності. Було прийнято рішення виявити та проаналізувати причини цього явища. Яку форму керування використав головний лікар?

А. Експертну форму

В. Корпоративну форму

С. Лінійну форму

Д. Функціональну форму

Е. Колективну форму

83. Старша медична сестра відділення обговорює принципи формування оплати праці медичних працівників. Пояснює молодим спеціалістам, що таке посадовий оклад:

А. Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці

В. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу

С. Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язаних з режимом або умовами праці

Д. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника

Е. Премія за швидкість виконаної роботи

84. Для забезпечення лікувального харчування хворих у відділенні старша медична сестра повинна оформити і відправити до харчоблока лікарні відповідний документ. Вкажіть цей документ:

А. Порційна вимога

В. Звіт про рух хворих за добу

С. Журнал обліку хворих

Д. Список хворих, яких госпіталізували у відділення протягом доби

Е. Листок лікарських призначень

85. У відділення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надійшли пахучі лікарські засоби. Які особливості їх зберігання необхідно знати?

А. Зберігати ізольовано, у герметично закритій тарі, роздільно за найменуваннями

В. У прохолодному місці, в щільно закупореній тарі з матеріалів, непроникних для водяної пари

С. В упаковці з полімерної плівки при кімнатній температурі

Д. В сухому приміщенні, у герметично закупореній тарі, залитій парафіном

Е. В промисловій упаковці в захищеному від світла місці

86. Медична сестра обстежує пацієнтку із забрудненою колото-різаною раною правої ступні, в зв'язку з чим була введена протиправцева сироватка. Раптово стан пацієнтки різко погіршився: з'явилися різка слабкість, часте серцебиття, задишка. Об'єктивно: блідість шкіри, холодний піт, частий пульс слабого наповнення 100/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. В зв'язку з чим відбулося різке погіршення стану пацієнтки?

A. Гострим анафілактичним шоком

- B. Відстроченим больовим шоком
- C. Гострим геморагічним шоком
- D. Сироватковою хворобою
- E. Гострим інфекційно-токсичним шоком

87. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

A. Визначення амілази крові

- B. Аналіз калу на приховану кров
- C. Оглядовий знімок черевної порожнини
- D. Зняття ЕКГ
- E. Загальний аналіз крові

88. Головній медсестрі як працівнику приватної медичної установи необхідно визначити економічний прибуток при наданні медичних послуг та медичної допомоги. В чому його відмінність від звичайного прибутку?

A. Це максимальний прибуток від реалізації послуг, достатній для розширення бізнесу

- B. Максимальний прибуток від реалізації послуг
- C. Достатній для продовження роботи в даній галузі
- D. Той, що задовольняє керівника медичної установи
- E. Достатній для продовження роботи в даній галузі, але замалий для її розширення

89. Як відомо, товари маркуються різними знаками. Які знаки призначені для інформування про способи поводження з товарами?

A. Маніпуляційні знаки

- B. Попереджувальні знаки
- C. Розмірні знаки
- D. Експлуатаційні знаки
- E. Компонентні знаки

90. За обов'язковістю виконання медичні стандарти бувають:

A. Законодавчі

- B. Міжнародні
- C. Локальні
- D. Національні
- E. Регіональні

91. У хворого 42-х років після апендектомії в ранньому післяопераційному періоді виникли нудота, блювання. Який препарат використовують для зняття цих симптомів?

A. Церукал

- B. Промедол
- C. Атропін
- D. Седуксен
- E. Фенобарбітал

92. До сімейної медичної сестри звернулася мати з дитиною 4-х років. Зі слів матері дитина хворіє другий день. Температура тіла - 38,5°C. При огляді медсестра виявила наступні

проблеми: гіперемована шкіра обличчя, блідість носо-губного трикутника, біль у горлі, яскрава гіперемія носогорла, мигдаликів, гній в лакунах, зниження апетиту, порушення сну. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках. Яке захворювання можна припустити?

A. Скарлатина

- B. Менінгококова інфекція
- C. Вітряна віспа
- D. Кір
- E. Краснуха

93. Старша медична сестра хірургічного відділення проводить інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарно-протиепідемічних заходів у відділенні. Як часто вона повинна стежити за його виконанням?

A. Кожен день

- B. Через день
- C. Один раз на місяць
- D. Один раз на тиждень
- E. Один раз на три дні

94. До медсестри звернувся чоловік, у якого після напруження раптово виник різкий біль в лівій пахвинній ділянці. При огляді медсестра виявила в пахвинній ділянці випинання розміром 2-3 см, різко болюче, щільної консистенції. Вправити випинання не вдалося. Яку першочергову допомогу надасть медсестра хворому?

A. Холод на нижню частину живота, викликати швидку допомогу

- B. Ввести спазмолітичні засоби, викликати швидку допомогу
- C. Ввести знеболювальні засоби, холод на нижню частину живота
- D. Холод на нижню частину живота, знеболити; термінова госпіталізація
- E. Ввести спазмолітичні засоби, грілка на нижню частину живота

95. Вкажіть, що з перерахованого є найбільш характерним симптомом здавлення головного мозку при внутрішньо-мозковій кровотечі:

A. "Світлий проміжок"

- B. Кровотеча з носа та вух
- C. Короткочасна втрата свідомості
- D. Диплопія (двоїння в очах)
- E. Розлад дихання

96. Силікоз є найрозповсюдженішою формою пневмоконіозів із важким перебігом. Виникає від вдихання пилу кремнезему, що містить БЮ-і у вільному стані. Які скарги може виявити медична сестра на I етапі медсестринського процесу?

A. Задишка, біль у грудній клітці, кашель

- B. Загальна слабкість, тремор кінцівок, біль у суглобах
- C. Біль в животі, нудота, блювання
- D. Задишка, біль у серці, шум у вухах
- E. Загальна слабкість, втрата апетиту, біль у грудній клітці

97. У приймальному відділенні ЦРЛ під час обстеження хворого з підозрою на гострий перитоніт лікар відзначає посилення болю під час повільного натискання кистю правої руки на передню черевну стінку протягом 2-3 секунд з наступним різким відведенням руки. Це є

позитивний симптом:

A. Щоткіна-Блюмберга

B. Грекова-Ортнера

C. Ровзінга

D. Мюссі-Георгієвського

E. Образцова

98. До медичної сестри звернулася жінка 30-ти років зі скаргами на появу щільного набряку на обличчі, шиї, верхній половині тулуба без свербежу, головний біль, загальну слабкість, слюзотечу, утруднене дихання. Характерні ознаки з'явилися протягом останніх 2-х годин після вживання полуниці. Об'єктивно: пульс - 72\хв., ритмічний, АТ- 120\80 мм рт.ст. Для якої патології характерні вказані симптоми?

A. Набряк Квінке

B. Анафілактичний шок

C. Сироваткова хвороба

D. Кропив'янка

E. Бронхіальна астма

99. Хворий 27-ми років був збитий автомобілем і отримав перелом правого стегна. Прибула швидка допомога. Виберіть, що слід використати потерпілому з метою надання невідкладної допомоги:

A. Шину Дітерікса

B. Шину Крамера

C. Шину Еланського

D. Шину Башмакова

E. Шину Белера

100. Медична сестра запідозрила в дитини 2-х місяців пілоростеноз. Які з перерахованих нижче симптомів навели її на цю думку?

A. Блювання "фонтаном"

B. Пронози

C. Повільне збільшення маси тіла

D. Блювання за об'ємом, меншим від кількості спожитої їжі

E. Блювання після народження

101. У працівника фарбового заводу неприємний смак в роті, переймоподібний біль в животі, закрепи, які не знімаються послаблюючими засобами. Об'єктивно: шкіра обличчя блідо-сіруватого кольору, по краю ясен біля передніх зубів - смужка сірувато-бузкового кольору. Лабораторно виявлено: в крові - анемію, ретикулоцитоз, базофільну зернистість еритроцитів, підвищений вміст білірубину; в сечі - підвищений вміст порфірину. Яке можливе отруєння?

A. Хронічне отруєння свинцем

B. Хронічне отруєння марганцем

C. Хронічне отруєння бензолом

D. Хронічне отруєння ртуттю

E. Хронічне отруєння чотирихлористим вуглецем

102. У хлопчика 10-ти місяців під час крику з'явилося шумне дихання, ціаноз шкіри, холодний піт, настала короткочасна зупинка дихання, тонічні судоми в руках і ногах. Через декілька

хвилин хлопчик знов став активним. При огляді виявлені ознаки рахіту, температура тіла - 36,6°C. Який препарат необхідно призначити в першу чергу після нападу?

A. Глюконат кальцію

B. Вітамін B

C. Вітамін C

D. Оксидутират натрію

E. Фінлепсин

103. Хлопчик 12 років. Хворіє 2-й день. За 3 тижні до даного захворювання перехворів на респіраторну інфекцію. Госпіталізований з вираженою геморагічною висипкою на шкірі розгинальних поверхонь верхніх і нижніх кінцівок, сідницях. Висипка симетрична, має тенденцію до злиття. Температура тіла - 37,8°C. Спостерігається набряк і болючість великих суглобів, летючий біль у суглобах. В аналізі крові помірний лейкоцитоз, анемія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A. Геморагічний васкуліт

B. Алергічний дерматит

C. Ревматизм

D. Гемофілія

E. Менінгококцемія

104. Пацієнт 27-ми років надійшов до приймального відділення. З анамнезу відомо, що 7 днів тому під час роботи на городі пошкодив сапою ногу. По допомогу не звертався. Об'єктивно: стан хворого важкий, визначається тризм, ригідність потиличних м'язів. В яке відділення повинна транспортувати пацієнта медична сестра для подальшого лікування?

A. Реанімаційне

B. Хірургічне

C. Інфекційне

D. Терапевтичне

E. Неврологічне

105. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

A. Постнеонатальна смертність

B. Неонатальна смертність

C. Перинатальна смертність

D. Загальний показник смертності

E. Рання неонатальна смертність

106. Якщо на органопрепаратах немає вказівок на етикетці або інструкції щодо зберігання, то їх слід зберігати при температурі:

A. 0-5 градусів

B. 18-22 градуси

C. 0 градусів

D. 10-14 градусів

E. 23-25 градусів

107. Медична сестра-бакалавр приймального відділення проводить пацієнту електрокардіографічне дослідження серця. Який активний електрод слід поставити у п'ятому міжребровому проміжку зліва по середній пахвовій лінії?

A. У5

B. У3

C. У2

D. У4

E. У6

108. Пацієнт 49-ти років доставлений в хірургічне відділення з різаною раною лівого стегна. Після зупинки кровотечі лікар призначив переливання крові. Вкажіть, що необхідно підготувати медсестрі для проведення проби на індивідуальну сумісність:

A. Сироватку пацієнта та еритроцити донора

B. Еритроцити пацієнта і розчин желатину

C. Сироватку пацієнта і сироватку донора

D. Сироватку пацієнта і розчин поліглюкіну

E. Еритроцити пацієнта і сироватку донора

109. Захворюваність харчовими токсикоінфекціями серед населення міста в 2019 році (по місяцях року): січень - 3, квітень - 3, липень -10, жовтень - 4, лютий - 2, травень - 4, серпень -12, листопад - 2, березень - 2, червень - 6, вересень -11, грудень -1. Лікар дав завдання медичній сестрі графічно зобразити сезонність харчової токсикоінфекції. Який вид графіка слід використати?

A. Радіальна діаграма

B. Стопчикова діаграма

C. Картограма

D. Лінійна діаграма

E. Картодіаграма

110. Медична сестра-бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Який з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

A. Симптом Труссо

B. Симптом Мебіуса

C. Симптом Ортнера

D. Симптом Галанта

E. Симптом Грефе

111. Пацієнт під час введення розчину анальгін раптово відчув жар, різку слабкість, запаморочення. Об'єктивно: стан тяжкий, шкіра бліда, ЧДР- 28\хв., ЧСС- 100\хв., АТ- 70\20 мм рт.ст. Який препарат слід ввести пацієнту в першу чергу?

A. Адреналін

B. Дофамін

C. Кордіамін

D. Димедрол

E. Супрастин

112. Пацієнт 75-ти років послизнувся на сходах і впав на лівий бік. Скаржиться на різкий біль у лівому надпліччі, набряк та деформацію в ділянці ключиці. Медсестра надає першу допомогу. Якою пов'язкою вона виконає іммобілізацію?

A. Хрестоподібною

B. Зворотньою

- C. Вельпо
- D. Колосовидною
- E. Черепашачою

113. Вкажіть, будь ласка, що є основним завданням ціноутворення:

- A. Покриття витрат виробництво продукції і одержання прибутку
- B. Визначення балансу попиту і пропозиції
- C. Визначення мінімальної ціни пропозиції
- D. Визначення максимальної ціни попиту
- E. Покриття витрат виробництва

114. Якими основними якостями повинна володіти медична сестра для забезпечення її діяльності в ролі успішного менеджера?

- A. Професійно-діловими, адміністративно-організаційними, соціально-психологічними, моральними
- B. Адміністративно-діловими, моральними, організаційними
- C. Професійно-стратегічними, прогностичними, моральними, соціально-психологічними
- D. Професійно-діловими, гуманістичними, духовними
- E. Професійно-діловими, духовними, управлінсько-лідерськими

115. Медсестру викликали до пацієнтки, яка знепритомніла. У неї дихання Куссмауля, різкий запах ацетону з рота, шкіра суха, тургор її знижений, очні яблука м'які. Печінка при пальпації болюча і щільна. Пульс - 120\хв., АТ- 80\50 мм рт.ст. Що трапилось з пацієнткою?

- A. Кетоацидотична кома
- B. Мозкова кома
- C. Гіпоглікемічна кома
- D. Гіперосмолярна кома
- E. Уремична кома

116. В приймальне відділення надійшла пацієнтка 42-х років зі скаргами на різкий біль в животі та поперековій ділянці зліва, часте сечовипускання, невеликими порціями. Біль з'явився раптово, раніше відзначались подібні напади. При огляді: шкіра блідого кольору, вкрита холодним потом. Живіт м'який при пальпації, здутий, позитивний симптом Пастернацького. В сечі виявлені свіжі еритроцити в значній кількості. Поставте попередній діагноз:

- A. Сечокам'яна хвороба
- B. Гострий панкреатит
- C. Травма нирок
- D. Пієлонефрит
- E. Гломерулонефрит

117. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирці мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

- A. Везикулопустульоз
- B. Герпес-інфекція
- C. Фурункульоз
- D. Псевдофурункульоз
- E. Пухирчатка новонароджених

118. В ендокринологічному відділенні лікується пацієнт із захворюванням щитоподібної залози. Які з перерахованих нижче ознак можуть характеризувати мікседему?

A. Загальмованість, мерзлякуватість

B. Дратівливість, відчуття жару, схуднення

C. Тахікардія, болючість при пальпації щитоподібної залози

D. Тремор кінцівок, екзофтальм

E. Збільшення щитоподібної залози, захриплість голосу

119. Медсестру викликали в приймальне відділення, щоб вона допомогла приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

A. 36%

B. 56%

C. 25%

D. 18%

E. 42%

120. Головний лікар ЦРЛ попередив головну медичну сестру про проведення перевірки усіх відділень лікарні щодо дотримання на робочих місцях наступних вимог: освітлення, температурного режиму, вологості та інших чинників середовища, що впливають на здоров'я та працездатність працівників. Зазначте дані вимоги до робочого місця працівників:

A. Гігієнічні вимоги

B. Інформаційні вимоги

C. Економічні вимоги

D. Естетичні вимоги

E. Організаційні вимоги

121. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

A. Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків

B. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я

C. Нова тема досліджень

D. Регламент

E. Комплекс договірної документації між замовником і підрядником

122. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту спостерігається повне порушення функції мови, слуху, втрата пам'яті та параліч нижніх кінцівок. Він був направлений до спеціалізованого лікувального закладу для отримання комплексної медико-соціальної та психологічної допомоги. Який вид допомоги необхідно обрати для даного пацієнта?

A. Паліативно-хоспісна допомога

B. Диспансерна допомога

C. Амбулаторно-поліклінічна допомога

D. Стаціонарна допомога

E. Медико-санітарна допомога

123. У приймальне відділення був доставлений чоловік 37-ми років з діагнозом гіпоглікемічна кома. Виберіть, з якого з наведених заходів необхідно починати невідкладну допомогу при

гіпоглікемічній комі:

A. Внутрішньовенне струминне введення 40% р-ну глюкози

B. Внутрішньовенне краплинне введення 10% р-ну глюкози

C. Внутрішньовенне струминне введення інсуліну

D. Внутрішньовенне струминне введення 5% р-ну глюкози

E. Внутрішньовенне краплинне введення 5% р-ну глюкози

124. В дитячу лікарню машиною швидкої допомоги доставлена п'ятирічна дитина. Зі слів матері, захворювання почалося раптово вночі зі значного погіршення загального стану. Дитина стала неспокійна, плаче, температура тіла підвищилась до $38,0^{\circ}\text{C}$, з'явився гавкаючий кашель, дихання стало глибоким і частим, його чути на відстані, голос хриплий, сиплий. Який невідкладний стан можна припустити?

A. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

B. Астматичний стан

C. Гострий бронхіт

D. Пневмонія

E. Ангіна

125. Головна медична сестра районної лікарні проводить лекцію на тему: «Маркетинг у системі охорони здоров'я». Які основні функції виконує маркетинг?

A. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська

B. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова

C. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна

D. Управлінська, наукова, виробнича, збутова

E. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

126. У приймальне відділення бригада швидкої медичної допомоги доставила хворого 37-ми років з діагнозом отруєння миш'яковмісними сполуками. Виберіть комплекс антидотної терапії у разі даної інтоксикації:

A. Унітіол, тетацин кальцію

B. Унітіол, хлорид кальцію

C. Тетацин кальцію, адреналін

D. Адреналін, дипіроксим

E. Баралгін, дипіроксим

127. Медична сестра працює в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) $\times 1000$ / середньорічна чисельність населення - визначається:

A. Поширеність захворювань

B. Інфекційна захворюваність

C. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

D. Госпітальна захворюваність

E. Первинна захворюваність

128. На третю добу післяопераційного періоду у пацієнта 72-х років раптово виник біль за грудиною, ціаноз верхньої половини тулуба, задишка, тахікардія. Шийні вени набрякли. Який стан можна припустити?

A. Тромбоемболію легеневої артерії

- В. набряк легень
- С. Кардіогенний шок
- Д. Інфаркт міокарда
- Е. Гіпертонічний криз

129. Мешканка Закарпатської області скаржиться на відчуття тиснення в ділянці шиї, загальну слабкість, зниження працездатності, утруднене ковтання, захриплість голосу, стовщення шиї. Для якого захворювання характерний цей симптомокомплекс?

- А. Ендемічного зобу**
- В. Аутоімунного тиреоїдиту
- С. Гіпотиреозу
- Д. Раку щитоподібної залози
- Е. Дифузного токсичного зобу

130. Вранці при огляді дітей в дитячому садочку медична сестра виявила у 5-річної дитини підвищену температуру тіла - 37,5°C, круглої форми та різної величини папульозно-везикулярний висип на волосистій частині голови та тілі. Яке захворювання можна припустити?

- А. Вітряну віспу**
- В. Трихофітію
- С. Кір
- Д. Скарлатину
- Е. Краснуху

131. Пацієнт 45-ти років перебуває на лікуванні з приводу варикозно розширених вен нижніх кінцівок. Під час обіду в їдальні жваво розмовляв. Раптом почав задихатись, схопився руками за шию. Які медсестринські втручання, відповідно до стандартизованого плану догляду за пацієнтом із стороннім тілом в дихальних шляхах, повинна здійснити медична сестра?

- А. Прийом Геймліха**
- В. Трахеостомію
- С. Прекардіальний удар
- Д. Потрійний прийом Сафара
- Е. ШВЛ "рот до рота"

132. В дитячий стаціонар надійшла дитина у віці 1 рік 2 місяців, з генералізованими судомою та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

- А. Спазмофілія. Судоми**
- В. Спазмофілія, ларингоспазм
- С. Рахіт залишкових явищ
- Д. Рахіт, гострий період. Судоми
- Е. Гіпервітаміноз В. Судоми

133. Дослідження спрямоване на вивчення здоров'я жінок-робітниць хімічних виробництв України. Який метод спостереження (за повнотою охоплення) доцільно використати в даному випадку?

- А. Вибірковий**
- В. Дробний
- С. Повний

- D. Одночасний
- E. Суцільний

134. Медична сестра працює в центрі медичної статистики. При вивченні захворюваності на грип використовує статистичні талони. Що це за метод вивчення захворюваності?

A. Звернення за лікарською допомогою

- B. Спеціальне вибіркове дослідження
- C. Опитування
- D. Медичний огляд окремих груп населення
- E. Амбулаторне дослідження

135. Медсестра-бакалавр працює в центрі медичної статистики. Показники, що відображають питому вагу, структуру, розподіл, склад явища, належать до:

A. Показників екстенсивності

- B. Загальних показників
- C. Показників наочності
- D. Показників інтенсивності
- E. Показників співвідношення

136. Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

A. Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених мийних засобів

- B. Кожного дня вологим способом без застосування мийних засобів
- C. Залежно від забруднення приміщення
- D. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених мийних засобів
- E. Кожного дня із застосуванням пилососу

137. У доношеного хлопчика на початку третьої доби життя з'явилась жовтушність шкіри і слизових. Загальний стан задовільний. Печінка і селезінка не збільшені. Сеча і випорожнення мають звичайний колір. У мами і дитини група крові перша, резус- позитивна. Вміст непрямого білірубину в сироватці крові -108 мкмоль/л. В сечі відсутні уробілін і жовчні пігменти. Якому стану відповідають наведені ознаки?

A. Фізіологічна жовтяниця

- B. Сепсис
- C. Гепатит А
- D. Гемолітична хвороба новонародженого
- E. Гепатит В

138. Медсестра протитуберкульозного диспансеру проводить профілактику туберкульозу. Що передбачає специфічна профілактика?

A. Вакцинація, ревакцинація, хіміопротифілактика

- B. Обстеження контактних осіб в осередках туберкульозної інфекції
- C. Флюорографічне обстеження населення
- D. Санітарно-просвітня робота
- E. Ветеринарний нагляд за домашніми тваринами

139. Виберіть, що з наведеного є основною відмінністю організації охорони здоров'я від інших типів організацій:

A. Складне визначення та вимірювання результатів і невідкладність роботи

- В. Робота в організації не потребує надзвичайно високої спеціалізації
- С. Специфічний споживач
- Д. Складність та одноманітність роботи
- Е. Низький рівень фінансування

140. Працівники лабораторії з виготовлення вимірювальних приладів (манометри, термометри тощо) скаржаться на металічний присмак у роті, кровоточивість ясен, підвищене слиновиділення, сильний біль у животі та інші диспепсичні явища, порушення сну, хитку ходьбу, різке зниження серцевої діяльності. Отруєння якою речовиною викликало зазначені прояви?

А. Ртуть

- В. Тетраетилсвинець
- С. Толуол
- Д. Марганець
- Е. Свинець

141. Жіноча консультація веде диспансерний нагляд за вагітними жінками, в тому числі і з нормальним перебігом вагітності. З якою періодичністю в першу половину вагітності такі жінки мають відвідувати акушера-гінеколога з профілактичною ціллю?

А. Один раз на місяць

- В. Три рази на місяць
- С. П'ять разів на місяць
- Д. Два рази на місяць
- Е. Чотири рази на місяць

142. Дитині 8 років. Протягом останнього тижня мали місце симптоми гострого циститу. Мати за медичною допомогою не зверталась, проводила дитині зігрівальні ванни. Вчора дитина поскаржилася на загальну слабкість, головний біль, нудоту, підвищення температури тіла до 38,9° С, біль попереку, сеча стала каламутна з пластівцями та осадом. Яке захворювання можна припустити?

А. Пієлонефрит

- В. Цистит
- С. Гломерулонефрит
- Д. Сечокислий інфаркт нирок
- Е. Сечокам'яна хвороба

143. Хворого 39-ти років госпіталізовано в хірургічне відділенні з масивною крововтратою внаслідок шлунково-кишкової кровотечі. Ризик виникнення якого шоку має цей пацієнт?

А. Геморагічного

- В. Цитратного
- С. Анафілактичного
- Д. Кардіогенного
- Е. Гемотрансфузійного

144. Головний лікар міської лікарні провів медичну нараду в зв'язку з підвищенням післяопераційної смертності. Було прийнято рішення виявити та проаналізувати причини цього явища. Яку форму керування використав головний лікар?

А. Експертну форму

- В. Корпоративну форму

- С. Лінійну форму
- D. Функціональну форму
- Е. Колективну форму

145. У хворого 42-х років після апендектомії в ранньому післяопераційному періоді виникли нудота, блювання. Який препарат використовують для зняття цих симптомів?

A. Церукал

- В. Промедол
- С. Атропін
- D. Седуксен
- Е. Фенобарбітал

146. До сімейної медичної сестри звернулася мати з дитиною 4-х років. Зі слів матері дитина хворіє другий день. Температура тіла - 38,5°C. При огляді медсестра виявила наступні проблеми: гіперемована шкіра обличчя, блідість носо-губного трикутника, біль у горлі, яскрава гіперемія носогорла, мигдаликів, гній в лакунах, зниження апетиту, порушення сну. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках. Яке захворювання можна припустити?

A. Скарлатина

- В. Менінгококова інфекція
- С. Вітряна віспа
- D. Кір
- Е. Краснуха

147. Старша медична сестра хірургічного відділення проводить інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарно-протиепідемічних заходів у відділенні. Як часто вона повинна стежити за його виконанням?

A. Кожен день

- В. Через день
- С. Один раз на місяць
- D. Один раз на тиждень
- Е. Один раз на три дні

148. Силікоз є найрозповсюдженішою формою пневмоконіозів із важким перебігом. Виникає від вдихання пилу кремнезему, що містить БЮ-I у вільному стані. Які скарги може виявити медична сестра на I етапі медсестринського процесу?

A. Задишка, біль у грудній клітці, кашель

- В. Загальна слабкість, тремор кінцівок, біль у суглобах
- С. Біль в животі, нудота, блювання
- D. Задишка, біль у серці, шум у вухах
- Е. Загальна слабкість, втрата апетиту, біль у грудній клітці

149. Хлопчик 12 років. Хворіє 2-й день. За 3 тижні до даного захворювання перехворів на респіраторну інфекцію. Госпіталізований з вираженою геморагічною висипкою на шкірі розгинальних поверхонь верхніх і нижніх кінцівок, сідницях. Висипка симетрична, має тенденцію до злиття. Температура тіла - 37,8°C. Спостерігається набряк і болючість великих суглобів, летючий біль у суглобах. В аналізі крові помірний лейкоцитоз, анемія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A. Геморагічний васкуліт

- В. Алергічний дерматит
- С. Ревматизм
- Д. Гемофілія
- Е. Менінгококцемія

150. Медична сестра-бакалавр приймального відділення проводить пацієнту електро-кардіографічне дослідження серця. Який активний електрод слід поставити у п'ятому міжребровому проміжку зліва по середній паховій лінії?

- А. У5**
- В. У3
- С. У2
- Д. У4
- Е. У6

151. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту спостерігається повне порушення функції мови, слуху, втрата пам'яті та параліч нижніх кінцівок. Він був направлений до спеціалізованого лікувального закладу для отримання комплексної медико-соціальної та психологічної допомоги. Який вид допомоги необхідно обрати для даного пацієнта?

- А. Паліативно-хоспісна допомога**
- В. Диспансерна допомога
- С. Амбулаторно-поліклінічна допомога
- Д. Стаціонарна допомога
- Е. Медико-санітарна допомога

152. Вранці при огляді дітей в дитячому садочку медична сестра виявила у 5- річної дитини підвищену температуру тіла - 37,5°C, круглої форми та різної величини папульозно-везикулярний висип на волосистій частині голови та тілі. Яке захворювання можна припустити?

- А. Вітряну віспу**
- В. Трихофітію
- С. Кір
- Д. Скарлатину
- Е. Краснуху

153. Забійник із профстажем 14 років (75% робочого часу працює відбійним молотком) має скарги на відчуття холоду, слабкість, біль і оніміння кистей, біль в ліктьових і променево-зап'ястних суглобах, в шийному відділі хребта, поганий сон, періодичний ниючий біль в ділянці серця. Розвиток якого захворювання можна припустити на підставі скарг хворого?

- А. Вібраційну хворобу**
- В. Остеохондроз хребта
- С. Остеоартроз ліктьових суглобів
- Д. Неврит ліктьового нерва
- Е. Реактивний поліартрит

154. Які вироби медичного призначення слід зберігати в сухих закритих приміщеннях на відстані не менш 1 м від опалювальних приладів?

- А. Вироби із пластичних мас**
- В. Вироби із кераміки

- C. Вироби із металу
- D. Вироби із кераміки і скла
- E. Вироби із скла

155. В дитячу поліклініку прийшла мати з 5- річною дитиною для проведення антропометрії. За якою формулою перевіряється маса тіла дитини?

- A. $10+(2 \times p)$
- B. $30+5(p-1)$
- C. $20+(p-10)$
- D. $20+(4 \times p)$
- E. $30+4(p-1)$

156. Медична сестра палати новонароджених пологового будинку обстежила здорову новонароджену дитину віком 1 день та підрахувала частоту серцевих скорочень. Якою вона має бути приблизно?

- A. 140 за хвилину
- B. 80 за хвилину
- C. 120 за хвилину
- D. 100 за хвилину
- E. 180 за хвилину

157. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темно-коричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Суха гангрена
- B. Термічний опік IV ст.
- C. Хімічний опік III ст.
- D. Волога гангрена
- E. Хімічний опік II ст.

158. У приймальне відділення звернулась хвора 38-ми років зі скаргами на біль у верхній половині живота, багаторазове блювання. Біль з'явився після прийому смаженого бекону. Об'єктивно: ЧСС- 102/хв., пальпаторно спостерігається напруження м'язів та біль в правому підребер'ї, який віддає в праву лопатку. Живіт здутий, тяжкість під правим ребром, гіркий присмак у роті. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- A. Гострий холецистит
- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий перитоніт
- D. Гострий апендицит
- E. Мезентеріальний тромбоз

159. До приймального відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібний інтенсивний біль у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- A. УЗД органів черевної порожнини
- B. Кров на визначення рівня холестерину
- C. Кров на діастазу

D. Загальний аналіз крові

E. Загальний аналіз сечі

160. Хворий 33-х років, який працює на лікєро-горілчаному заводі у лабораторії, надійшов у приймальне відділення з такими симптомами: порушення мови, ходи, пам'яті. При огляді: шкіра бліда, із синюшним відтінком, на дотик холодна, липка, волога. Що розвинулося у хворого?

A. Отруєння етиловим спиртом

B. Отруєння парами ртуті

C. Бензолова інтоксикація

D. Астено-невротичний синдром

E. Отруєння свинцем

161. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми «Ринок медичних послуг». Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

A. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька

B. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

C. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча

D. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька

E. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська

162. При проведенні пальпації перикардіальної ділянки медична сестра виявила наявність «серцевого горба» та зміщення верхівкового поштовху вліво. Такі ознаки можуть вказувати на:

A. Гіпертрофію лівих відділів серця

B. Перикардит

C. Аортальний стеноз

D. Гострий міокардит

E. Недостатність мітрального клапану

163. Пацієнт 45-ти років перебуває на Лікуванні з приводу варикозно розширених вен нижніх кінцівок. Під час обіду в їдальні жваво розмовляв. Раптом почав задихатись, схопився руками за шию. Які медсестринські втручання, відповідно до стандартизованого плану догляду за пацієнтом із стороннім тілом в дихальних шляхах, повинна здійснити медична сестра?

A. Прийом Геймліха

B. Трахеостомію

C. Прекардіальний удар

D. Потрійний прийом Сафара

E. ШВЛ "рот до рота"

164. В дитячий стаціонар надійшла дитина у віці 1 рік 2 місяців, з генералізованими судомою та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

A. Спазмофілія. Судоми

B. Спазмофілія, ларингоспазм

C. Рахіт залишкових явищ

D. Рахіт, гострий період. Судоми

E. Гіпервітаміноз B. Судоми

165. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для

цього необхідні?

A. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

B. Собівартість медичних послуг і загальні доходи

C. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

D. Ціна та собівартість медичних послуг

E. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

166. Першим етапом надання медичної допомоги сільському населенню є сільська лікарська дільниця. Які медичні установи забезпечують надання медичної допомоги на даному організаційному етапі?

A. Фельдшерсько-акушерський пункт, дільнична лікарня, лікарська амбулаторія

B. Центральна районна лікарня, районна санітарно-епідеміологічна станція, пологовий будинок

C. Районна поліклініка, районний диспансер, пологовий будинок

D. Дитяча лікарня, центральна районна лікарня, фельдшерсько-акушерський пункт

E. Диспансер, обласна лікарня, діагностичний центр

167. Медсестра в праві розкрити конфіденційну інформацію про пацієнта тільки:

A. За згодою пацієнта та у випадках передбачених законом

B. За своїми переконаннями

C. На прохання родичів

D. Будь-коли, бо на медсестер правило лікарської таємниці не поширюється

E. З дозволу лікуючого лікаря

168. При виявленні нестачі, зіпсованості, бою медичних товарів, приймальний акт необхідно скласти:

A. В 3-х примірниках

B. В 2-х примірниках

C. В 4-х примірниках

D. В 5-х примірниках

E. В 6-х примірниках

169. При вивченні захворюваності на грип використовувались статистичні талони. Що це за метод вивчення захворюваності?

A. Звернення за лікарською допомогою

B. Опитування

C. Спеціальне вибіркове дослідження

D. Медичний огляд окремих груп населення

E. Амбулаторне дослідження

170. Від чого залежить якість надання медичної допомоги?

A. Стандартизація медичної допомоги

B. Медичного обладнання

C. Фінансування медичного закладу

D. Відповідальності медичних працівників

E. Наявність типових укомплектованих медичних закладів

171. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

A. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька

- В. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- С. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- Д. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- Е. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

172. Ви старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

А. Тарифна система та нормування праці

- В. Посадовий оклад, тарифна ставка
- С. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд
- Д. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт

173. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему: "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

А. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська

- В. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- С. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- Д. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- Е. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

174. Головна медична сестра пояснює пацієнту про те, що медичне страхування поділяється за формами. На які форми?

А. Обов'язкове та добровільне

- В. Індивідуальне та групове
- С. Безкоштовне та платне
- Д. Примусове та добровільне
- Е. Сімейне та виробниче

175. Наукове дослідження проводиться в певній послідовності, починаючи з аналізу стану об'єкта дослідження та закінчуючи формуванням висновків і оцінкою впровадження результатів досліджень в практику. Випробування впроваджених результатів проводиться на основі:

А. Результатів практичної виробничої перевірки дослідних зразків

- В. Регламенту
- С. Розпорядження Міністерства охорони здоров'я
- Д. Нової теми досліджень
- Е. Комплексу договірної документації між замовником і підрядником

176. Які основні функції виконує управління організаціями охорони здоров'я?

А. Стратегічне планування, організацію, мотивацію, контроль

- В. Збір інформації, розробку стратегії, аналіз, контроль
- С. Аналіз, планування, організацію, контроль
- Д. Аналіз, прийняття рішення, організацію виховання, контроль
- Е. Планування, облік, контроль

177. При проведенні оцінки конкурентоспроможності медичних послуг медичний заклад враховував:

А. Вартість медичних послуг

- В. Співвідношення збуту й цін

- C. Загальні та відносні витрати
- D. Імовірні стратегії конкурентів
- E. Показники повторних купівель

178. Вкажіть, яким органом проводиться акредитація ЛПЗ:

A. Спеціальними акредитаційними комісіями

- B. Облздороввідділом
- C. Виконкомом ради народних депутатів
- D. Міністерством охорони здоров'я
- E. Органами виконавчої влади на місцях

179. З метою раннього виявлення захворювання на туберкульоз усім студентам та працівникам медичного коледжу було проведено флюорографічне обстеження. Який метод вивчення захворюваності був використаний?

A. Спеціальне вибіркове дослідження

- B. Медичний огляд окремих груп
- C. Профілактичний
- D. Загальний
- E. Поточний

180. Ви працюєте в медико-санітарній частині. Одним з найважливіших розділів роботи є організація та проведення профілактичних медичних оглядів з розробкою подальших оздоровчих заходів. Протягом року на обстеження викликали по 5-15 чоловік на день. Яка це форма проведення періодичних медичних оглядів?

A. Поточна

- B. Попередня
- C. Облікова
- D. Одномоментна
- E. Цільова

181. У відділення, де Ви працюєте старшою медичною сестрою, разом з виробами медичного призначення надійшли пахучі лікарські засоби. Які особливості їх зберігання необхідно знати?

A. Зберігати ізольовано, у герметично закритій тарі, роздільно за найменуваннями

- B. У прохолодному місці, в щільно закупореній тарі з матеріалів, непроникних для водяної пари
- C. В сухому приміщенні, у герметично закупореній тарі, залитій парафіном
- D. В упаковці з полімерної плівки при кімнатній температурі
- E. В промисловій упаковці в захищеному від світла місці

182. Ви головна медична сестра. Для досягнення цілей лікувальної установи Ви здійснюєте функції управління. Основні функції управління, це:

A. Планування, організація, мотивація, контроль

- B. Планування, контроль
- C. Організація, мотивація
- D. Планування, організація
- E. Організація, контроль

183. На обліку в жіночій консультації знаходяться жінки, яких поставлено на облік у різні терміни вагітності - до 3-х місяців 45%, до 5 місяців - 40%, а 15% - до 8 місяців вагітності. Який відсоток жінок поставлено на облік своєчасно?

A. 45%

B. 15%

C. 40%

D. 55%

E. 85%

184. Згідно результатів бактеріологічного обстеження поліклініки, старша медсестра поліклініки прийняла певні рішення щодо посилення протиепідемічного режиму. Якому рівню управління відповідають ці рішення?

A. Оперативному

B. Тактичному

C. Стратегічному

D. Перспективному

E. Координаційному

185. Ви працюєте старшою медичною сестрою терапевтичного відділення міської лікарні №3. Назвіть основний документ, що юридично і фактично підтверджує медикаментозне лікування хворих:

A. Листок лікарських призначень

B. Зошит обліку виконань маніпуляцій

C. Журнал реєстрації хворих відділення

D. Листок призначень лікарями наркотичних лікувальних засобів

E. Вимога накладна

186. В дитячій поліклініці №2 за звітний період було щеплено 2337 дітей, прочитано 1000 лекцій в навчальних закладах з питань зниження захворюваності, створення сприятливих умов для нормального розвитку та навчання дітей. Який характер носять проведені заходи?

A. Первинно-профілактичні

B. Медичні

C. Лікувально-діагностичні

D. Змішані

E. Амбулаторно-поліклінічні

187. Ви працюєте медичною сестрою в медико-санітарній частині заводу. Які заходи Вам необхідно здійснити для проведення профілактичних медичних оглядів працюючих?

A. Скласти список працюючих, які підлягають медичному огляду та забезпечити їх явку

B. Розробити заходи по оздоровленню працюючих

C. Виявити ранні ознаки впливу виробничих умов і шкідливих факторів на здоров'я

D. Попередити виникнення нещасних випадків

E. Розробити заходи для попередження нещасних випадків

188. Аналіз фінансового положення медичних установ дозволяє відслідкувати тенденції її розвитку і дати оцінку комерційній діяльності. Зовнішній фінансовий аналіз діяльності установи базується на:

A. Офіційній фінансовій звітності установи

B. Рівня рахунку грошових коштів в банках

C. Величині інвестицій

D. Даних податкової інспекції

E. Показниках дебіторської заборгованості

189. При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: $(\text{число мертвонароджених} + \text{число дітей, які померли в постнатальний період}) \times 1000$ число дітей, які народилися живими і мертвими). Як називається розрахований показник?

A. Перинатальна смертність

B. Малюкова смертність

C. Акушерська смертність

D. Питома вага дітей, які померли в постнатальний період

E. Мертвонароджуваність

190. Медико-гігієнічне навчання населення має бути спрямоване на:

A. Формування здорового способу життя

B. Надання медичної допомоги на засадах ПМСД

C. Оптимізація управління охорони здоров'я

D. Збір статистичних даних про стан здоров'я населення

E. Розробка заходів з охорони довкілля

191. По обов'язковості виконання медичні стандарти бувають:

A. Законодавчі

B. Міжнародні

C. Регіональні

D. Локальні

E. Національні

192. Грошові суми, які відображають рівень повернення затрат медичних закладів за виконання територіальних програм обов'язкового медичного страхування називаються:

A. Тарифи на медичні послуги

B. Державні ціни

C. Договірні ціни

D. Вільні ціни

E. Ринкові ціни

193. З позиції функціонального призначення управлінські рішення можуть бути:

A. Організаційними

B. Директивними

C. Рекомендаційними

D. Внутрішніми

E. Колективними

194. Старша медична сестра терапевтичного відділення провела санітарнопросвітницьку роботу серед пацієнтів. Для цього вона зібрала хворих у холі, де розповідала про необхідність дотримання особистої гігієни, про зберігання продуктів від родичів, про режим у відділенні. Яку форму та метод санітарно-просвітньої роботи вона використала?

A. Форму групову, усний метод

B. Форму індивідуальну, наочний метод

C. Форму масову, друкований метод

D. Форму комбіновану, наочний метод

E. Форму наочну, комбінований метод

195. Ви головна медична сестра ЦРЛ. Проводите заняття на тему "Правець". З якого віку починають проводити планову імунізацію усьому населенню проти правця?

A. З 3 місяців

B. З 4 місяців

C. З 2 місяців

D. З 5 місяців

E. З 6 місяців

196. За рік в місті народилося 1257 дітей, померло 1863 мешканців міста. Чому дорівнює природний приріст?

A. 606

B. 606

C. 1863

D. 1257

E. 3120

197. Серед впливу на формування смертності немовлят виділяють декілька факторів, серед яких є якість надання медичної допомоги. Яка допомога впливає на цей показник?

A. Акушерсько-гінекологічна та педіатрична

B. Швидка

C. Педіатрична

D. Акушерсько-гінекологічна

E. Невідкладна

198. До Вас звернувся працівник аптеки з питанням: "Як правильно зберігати гумові грілки в умовах аптеки?"

A. У захищеному від світла і перепадів температури місця, відносній вологості 65%

B. При температурі 23°C та при вологості повітря не менше 50%

C. При відносній вологості 45%, у сухому приміщенні

D. В сухому прохолодному приміщенні

E. В темному прохолодному приміщенні

199. Ви старша медична сестра хірургічного відділення, проводите інструктаж середнього та молодшого медичного персоналу стосовно комплексу санітарнопротиепідемічних заходів у відділенні. Як часто Ви повинні стежити, за його виконанням?

A. Щоденно

B. Щотижня

C. Щомісячно

D. Щоквартально

E. Щорічно

200. З приводу гострого трахеїту хворий звертався у поліклініку 10.03. і 14.05. Який документ при цьому належить заповнити?

A. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

B. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+"

C. Один статистичний талон для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "+" та один талон з позначкою "-"

D. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-"

E. Два статистичних талони для реєстрації уточненого діагнозу з позначкою "-" та один талон з

позначкою "6+"

201. Ви працюєте в центрі медичної статистики. Облік всіх захворювань (гострих і хронічних), які зареєстровані у населення певної території за певний період, визначає:

A. Загальна захворюваність

B. Госпітальна захворюваність

C. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

D. Інфекційна захворюваність

E. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання

202. Ви працюєте в центрі медичної статистики. За формулою: кількість усіх зареєстрованих протягом даного року захворювань (гострі + всі хронічні, виявлені як у поточному, так і в попередніх роках) $\times 1000$ / середньорічна чисельність населення - визначається:

A. Поширеність захворювань

B. Первинна захворюваність

C. Госпітальна захворюваність

D. Інфекційна захворюваність

E. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності

203. Ви працюєте в кабінеті медичної статистики ЛПЗ. Що є одиницею спостереження при вивченні госпітальної захворюваності?

A. Кожний випадок госпіталізації хворого з приводу будь-якого захворювання

B. Кожний випадок госпіталізації хворого з приводу захворювання з хірургічним втручанням

C. Кожний випадок звертання хворого до лікаря з приводу будь-якого захворювання

D. Кожний випадок гострого захворювання

E. Кожний випадок захворювання хворого

204. Як називається вид медичної допомоги, що надається хворим, які потребують постійного медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в амбулаторних умовах?

A. Стаціонарна медична допомога

B. Амбулаторно-поліклінічна медична допомога

C. Екстрена медична допомога

D. Санаторно-курортна медична допомога

E. Реабілітаційна медична допомога

205. Комунальні заклади охорони здоров'я є формальними організаціями. Назвіть головні риси формальної організації:

A. Свідома координація дій двох або більше осіб для досягнення певних результатів

B. Постійний твердий тиск на її членів з метою поліпшення якості роботи

C. Наявність посадових інструкцій і приписів

D. Відсутність єдності в діях її членів

E. Постійна згода всіх членів організації з будь-якими рішеннями керівника

206. Відповідно до існуючих норм у приміщенні, де зберігаються лікарські засоби, слід дотримуватися певних санітарних умов. Як часто необхідно прибирати такі приміщення?

A. Не рідше одного разу на день вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

B. 1 раз на тиждень вологим способом із застосуванням дозволених миючих засобів

- С. С. Кожного дня вологим способом без застосування миючих засобів
- Д. Кожного дня із застосуванням пилососу
- Е. По мірі забруднення приміщення

207. Головні лікарі лікарень ставляться до своїх підлеглих по-різному. Основними типами поведінки керівників за ознакою відносин із підлеглими є:

- А. Авторитарний, демократичний, ліберальний**
- В. Демократичний, ліберальний, анархічний
- С. С. Демократичний, партотаричний, монархічний
- Д. Охлократичний, демократичний, ліберальний
- Е. Анархічний, авторитарний, партотаричний

208. Ви головна медична сестра лікарні. Назвіть фінансовий документ медичного закладу, в якому відображено прибутки і витрати на майбутній фінансовий рік, вказані джерела дохідної частини і статті витрат:

- А. Кошторис закладу**
- В. Пояснювальна записка
- С. Фінансовий звіт
- Д. План зростання виробництва
- Е. Фінансовий запит

209. Медична сестра хірургічного відділення за власним бажанням переводиться до оперблоку. Назвіть вид інструктажу, який проведе з нею старша медична сестра оперблока:

- А. Первинний**
- В. Вступний
- С. Позаплановий
- Д. Цільовий
- Е. Повторний

210. В населеному пункті при вивченні смертності серед населення було встановлено, що причиною смерті в 34% випадків були серцево-судинні захворювання, в 22% новоутворення. Визначте статистичний характер наведених показників:

- А. Екстенсивні**
- В. Інтенсивні
- С. Співвідношення
- Д. Наочності
- Е. Наочності та співвідношення

211. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцево-судинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- А. Кожен випадок хвороби серцевосудинної системи, виявлений на медичному огляді**
- В. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
- С. Кожен випадок захворювання серцевосудинної системи за даними звертань за медичною допомогою
- Д. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи
- Е. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням

212. Ви медична сестра статистичного відділу лікарні. При складанні статистичного звіту

необхідно виділити одиницю обліку тимчасової непрацездатності. Виберіть її:

A. Листок непрацездатності

B. Довідка лікаря

C. Акт обстеження

D. Журнал обліку випадків непрацездатності

E. Талон амбулаторного пацієнта

213. Ви старша медична сестра відділення обговорюєте принципи формування оплати праці медичних працівників. Поясніть молодим спеціалістам що таке посадовий оклад:

A. Розмір місячної заробітної плати працівників при погодинній оплаті праці

B. Показник складності роботи та ступеня кваліфікації працівника

C. С. Оплата за весь обсяг роботи, а не за окрему медичну послугу

D. Премія за швидкість виконаної роботи
Компенсація додаткових трудових витрат, пов'язані з режимом або умовами праці

214. Старша медична сестра читає у відділенні лекцію на тему: "Саморозвиток та самовдосконалення". Що передбачає саморозвиток?

A. Самоосвіту, самооцінку, самоконтроль

B. Досягнення запланованих показників

C. Щоденні вправи за певною програмою

D. Усунення особистих недоліків

E. Вказівка вищого начальства

215. На чолі організації стоїть керівник. При якому типі управління він здійснює всі функції управління?

A. Лінійний тип управління

B. Функціональний тип управління

C. Лінійно-штабний тип управління

D. Матричний тип управління

E. Розгалужений тип управління

216. Потрібно розрахувати рентабельність лікувально-профілактичного закладу. Які дані для цього необхідні?

A. Економічний прибуток по закладу та собівартість виробничих фондів

B. Собівартість медичних послуг і загальні доходи

C. Собівартість виробничих фондів і загальні витрати

D. Ціна та собівартість медичних послуг

E. Собівартість медичних послуг і сума витрат за видатковими статтями кошторису

217. При обстеженні хворого з нефротичним синдромом виявлені зміни в клінічному аналізі сечі. Яка з перерахованих змін в клінічному аналізі сечі найхарактерніша для даного синдрому?

A. Протеїнурія

B. Еритроцитурія

C. Зрушення pH сечі в лужну сторону

D. Лейкоцитурія

E. Поява "активних лейкоцитів"

218. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидку втомлюваність. Понад

10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабаних паличок", кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість?

A. Палестезіометрія

B. Капіляроскопія

C. Проба на реактивну гіперемію

D. Холодова проба

E. Алгезиметрія

219. Дитині 12 місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сильного сухого кашлю, підвищення $t_{\text{о}}$ тіла до $38,7^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота - ціаноз. Під час дихання спостерігається втягнення міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56/хв., ЧСС- 150/хв. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

A. Рентгенологічне

B. УЗД

C. ЕКГ

D. Загальний аналіз калу

E. Аналіз сечі по Зимницькому

220. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ170/100 мм рт.ст., Ps- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

A. Аналіз сечі за Нечипоренком

B. Аналіз сечі на глюкозу

C. Аналіз сечі на діастазу

D. Загальний аналіз крові

E. Загальний аналіз сечі

221. Для встановлення остаточного діагнозу при кишкових інфекціях у дітей використовують дослідження:

A. Бактеріологічне дослідження прямої кишки

B. Загальний аналіз крові

C. Визначення вмісту білірубину в крові

D. Визначення жовчних пігментів в сечі

E. Кал на яйця глистів

222. Перша фаза процесу управління це розробка та прийняття управлінського рішення. Який з наведених видів контролю здійснюється під час цієї фази?

A. Попередній

B. Направляючий

C. Фільтруючий

D. Заключний

E. Поточний

223. При розробці та впровадженні товару чи медичної послуги використовують поняття життєвого циклу товару. Назвіть його правильну послідовність:

- A. Впровадження, зростання, зрілість, насичення, спад
- B. Впровадження, зрілість, зростання, насичення, спад
- C. Впровадження, спад, зрілість, зростання, насичення
- D. Впровадження, зростання, насичення, зрілість, спад
- E. Зростання, впровадження, зрілість, насичення, спад

224. У спекотний сонячний день чоловік 40ка років, який перебував на пляжі, відчув себе погано. Виникли головний біль, запаморочення, блювання, шум у вухах. Об'єктивно: пульс - 120\хв., дихання поверхневе. Ви підозрюєте, що у пацієнта сонячний удар. Що необхідно зробити першочергово для покращення його стану?

- A. Холодне пиття, холодний компрес на голову
- B. Здійснити ШВЛ
- C. Ввести антигістамінні засоби
- D. Зробити непрямий масаж серця
- E. Терміново транспортувати потерпілого до лікарні

225. У відділення надійшов пацієнт зі скаргами на нападоподібні інтенсивні болі у правому підребер'ї з іррадіацією в праве плече та руку, нудоту, блювання. Напад пов'язує з вживанням жирної їжі. При огляді: іктеричність склер. Яке обстеження необхідно провести в першу чергу?

- A. УЗД органів черевної порожнини
- B. Загальний аналіз крові
- C. Загальний аналіз сечі
- D. Кров на діастазу
- E. Кров на визначення рівня холестерину

226. У пацієнта, що хворіє на бронхіальну астму, напад ядухи триває 2 години. Інгаляції сальбутамолу неефективні. Об'єктивно: вимушене положення тіла, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, дистанційні сухі хрипи. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- A. Преднізолон
- B. Ефедрин
- C. Астмопент
- D. Морфін
- E. Анальгін

227. Операція з приводу апендектомії закінчилась на 10 хвилин раніше запланованого часу. Пацієнт перебуває під дією фентанілу. Що з перерахованого необхідно застосувати для його нейтралізації?

- A. Налоксон
- B. Атропін
- C. Мезатон
- D. Прозерин
- E. Адреналін

228. Дитині молодшого шкільного віку дільнична медсестра проводить вторинну профілактику ревматичної лихоманки. Яким з перерахованих нижче препаратів здійснюється вона?

- A. Біциліном - 5

- В. Бісептолом
- С. Цефтріаксоном
- Д. Ампіциліном
- Е. Ортофеном

229. Які завдання лікарсько-консультативної комісії [ЛКК]?

А. Вирішення складних питань експертизи непрацездатності

- В. Видача листків непрацездатності в перші 5 днів
- С. Переведення на іншу роботу
- Д. Видача медикаментів
- Е. Перевірка санітарно-епідемічного режиму

230. Яка є лікувально-профілактична допомога в залежності від ступеня складності?

А. Первинна, вторинна, третинна

- В. Профілактична, первинна, патронажна
- С. Змішана
- Д. Санітарно-епідеміологічна, змішана, патронажна

231. Один з побічних дихальних шумів виникає в альвеолах внаслідок наявності в їх просвіті невеликої кількості рідкого секрету. При цьому у фазі вдиху альвеолярні стінки злипаються, а у фазі видиху розлипаються. Який шум вислуховується в даному випадку?

А. Крепітація

- В. Дрібноміхурцеві хрипи
- С. Шум тертя плеври
- Д. Шум тертя перикарду
- Е. Плевроперикардіальний шум

232. Під час проведення об'єктивного обстеження пацієнта з діагнозом: гострий пієлонефрит, спостерігається біль в поперековій ділянці при постукуванні. Як називається такий симптом?

А. Пастернацького

- В. Ортнера
- С. Мерфі
- Д. Френікус-симптом
- Е. Керте

233. Після проведеного обстеження у пацієнтки 39-ти років виявлено скарги на різкий біль в поперековій ділянці, незначне підвищення температури. Встановлено попередній діагноз: сечокам'яна хвороба. Яке з досліджень має найбільше значення для діагностики даного захворювання?

А. Загальний аналіз сечі

- В. Дослідження сечі за Зимницьким
- С. Дослідження сечі за методом Нечипоренка
- Д. Визначення креатиніну
- Е. Визначення протеїнурії

234. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія", то- 38,9оПід час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребер'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

А. Після нормалізації температури тіла

- В. Після одужання від пневмонії
- С. Одразу
- Д. Немає обмежень в часі
- Е. Натщесерце

235. Медична допомога міському населенню надається за принципом:

А. Дільнично-територіальний

- В. Поетапний
- С. Переважає обслуговування окремих соціально-значущих груп
- Д. Надання медичної допомоги вдома
- Е. Цеховий

236. У дитини 4-х років діагностовано туберкульозний менінгіт. Для такого захворювання характерні клінічні ознаки:

А. Симптоми Керніга, Брудзінського

- В. Симптом Філатова
- С. Афонія
- Д. Біль у суглобах
- Е. Симптом Філатова-Копліка-Бельського

237. Дефіцит якого макроелементу може виникнути в організмі при безконтрольному вживанні фуросеміду?

А. Калію

- В. Натрію
- С. Кобальту
- Д. Магнію
- Е. Заліза

238. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому за призначенням лікаря?

А. Кордіамін

- В. Еуфілін
- С. Мезатон
- Д. Фенобарбітал
- Е. Адреналін

239. Хворий, 2 доба після великої операції. Проводиться знеболення наркотичними анальгетиками згідно призначення лікаря. Яка ускладнення вони можуть викликати у хворого?

А. Пригнічують дихання

- В. Спричинюють спазм периферійних судин
- С. Спричинюють брадикардію
- Д. Підвищують артеріальний тиск
- Е. Порушують мозковий кровообіг

240. У приймальне відділення доставили хворого з підозрою на гострий панкреатит. Які із нижче приведених лабораторних досліджень найбільш інформативно підтверджують діагноз?

А. Аналіз сечі на діастазу

- В. Загальний аналіз крові

- C. Аналіз крові на цукор
- D. Аналіз сечі на цукор
- E. Аналіз крові на білірубін

241. Поліклініка обслуговує 2000 жителів населеного пункту. В 2008 році в реєстратурі було заповнено 800 статистичних талонів для реєстрації діагнозів загальної захворюваності. Який показник використовується для отримання даних про захворюваність населення, яке мешкає в населеному пункті?

A. Показник загальної захворюваності

- B. Показник захворюваності з тимчасовою втратою працездатності
- C. Відомості про контингент дорослого населення, що підлягає диспансерному обстеженню
- D. Дані про профілактичний огляд
- E. Дані перепису населення

242. Дитина 5-ти років, хворіє 2-й день. Хвороба розпочалась гостро, то- 39оС, скаржиться на біль в горлі, зниження апетиту, порушення сну. Спостерігається лакунарна ангіна, язик з сіруватим нальотом. На гіперемійованому тлі шкіри - висипка яскраво-червона дрібно-крапкова крім носо-губного трикутника. Вкажіть захворювання, для якого найхарактерніші дані симптоми:

A. Скарлатина

- B. Краснуха
- C. Кір
- D. Вітряна віспа
- E. Паротитна інфекція

243. У пацієнта 55-ти років, через деякий час після введення йому вітаміну "B1" обличчя набрякло, повіки стали важкими, перешкоджають відкриванню очей, очні яблука "ін'єковані". Губи збільшились. Шкіра в місцях набряку бліда, із жовтуватим відтінком, не гаряча на дотик, не болюча, не свербить. Вкажіть, який стан розвинувся у пацієнта:

A. набряк Квінке

- B. Анафілактичний шок
- C. Сироваткова хвороба
- D. Кропив'янка
- E. Бронхоспазм

244. Хворому з діагнозом: пієлонефрит призначена проба Зимницького. Яке пояснення треба надати хворому для правильного збору сечі?

A. Збирати сечу цілодобово, кожні 3 години в окремий посуд

- B. Збирати сечу цілодобово в один посуд
- C. Збирати сечу вранці і ввечері
- D. Збирати сечу вранці одноразово
- E. Збирати середню порцію сечі вранці

245. Показник малюкової смертності - це смертність дітей:

A. До 1 року життя

- B. До 6 дня життя
- C. До 1 місяця життя
- D. До 3 років життя
- E. До 5 років життя

246. Виберіть вид шоку, що ускладнює інфаркт міокарда:

A. Кардіогенний

B. Гіповолемічний

C. Септичний

D. Неврогенний

E. Анафілактичний

247. Пацієнт 55-ти років в хірургічному відділенні готується до флебектомії лівої нижньої кінцівки. При підготовці операційного поля медична сестра помітила фурункул в нижній третині стегна. Лікар відмінив оперативне втручання. Виникнення якої потенційної проблеми було попереджено?

A. Нагноєння післяопераційної рани

B. Тромбофлебіт

C. Підшкірна гематома

D. Варикозне розширення вен

E. Тромбоз

248. Пацієнт перебуває в палаті інтенсивної терапії після операції на кишківнику. З якою метою медична сестра спонукає його до глибокого дихання в ранній післяопераційний період?

A. Профілактика розвитку ателектазів

B. Усунення бронхоспазмів

C. Зменшення хвилювання

D. Усунення виділень з дихальних шляхів

E. Профілактика дихальної недостатності

249. Дитина 4-х років відвідує дитячий садок. Захворіла на вітряну віспу. Який період ізоляції потребує дитина?

A. До 5-ти днів, від появи останніх висипань 21 день

B. 3 дні з моменту появи висипань

C. 14 днів з моменту захворювання

D. 22 дні

250. На кожного пацієнта, що звертається в поліклініку або отримує допомогу вдома, медична сестра заповнює:

A. Медичну карту амбулаторного хворого Ф-025\0

B. Контрольну карту диспансерного спостереження Ф-030\0

C. Карту профілактичних щеплень Ф-063\0

D. Довідку про тимчасову непрацездатність Ф-095\0

E. Санітарно-курортну карту Ф- 072\0

251. За змістом документи в охороні здоров'я поділяються на:

A. Організаційно-розпорядчі, фінансоворозрахункові, постачально-збутові, кадрові

B. Письмові, графічні, фотодокументи, акустичні

C. Службові, офіційно-особисті

D. Прості, складні

E. Типові, зразкові

252. Ви, головна медсестра лікарні, відпустили у відділення 2 ампули кордарону 5% 3,0 №5 з коробки. Залишилось ще 3 ампули, тобто Ви порушили упаковку виробника. Ваші дії правильні,

якщо:

A. На новоствореній упаковці Ви зазначили назву, серію, термін придатності, виробника ЛЗ та власний підпис старшої медсестри

B. На новоствореній упаковці в довільній формі Ви зазначили назву та лікарську форму відпущеного засобу

C. Порушувати упаковку виробника не дозволено ні за яких умов

D. На упаковці, що залишилась, Ви зробили напис "3 ампули"

E. Коробку, з якої взяли 2 ампули, не закрили, щоб було зрозуміло, що вона почата

253. Який препарат необхідно якомога швидше застосувати при гострому отруєнні миш'яковмісними сполуками?

A. Унітіол

B. Тіосульфат натрію

C. Тетацин кальцію

D. Розчин ізонітрозину

E. Розчин атропіну

254. У дитини 7-ми років порушено загальний стан, температура тіла сягає 40°C, біль в глотці під час ковтання. Діагноз катаральної ангіни встановлено на підставі огляду. Яке дослідження необхідно провести, щоб визначити збудника хвороби?

A. Мазок із слизової оболонки глотки та носа

B. Загальний аналіз крові

C. Біохімічне дослідження крові

D. Серологічне дослідження - РЗК, в динаміці

E. Загальний аналіз сечі

255. Згідно з класифікацією документів, за строками зберігання вони поділяються на:

A. Постійні, тимчасові, тривалі

B. Термінові, нетермінові

C. Сталі та змінні

D. Типові та трафаретні

E. Звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні

256. Медична сестра бакалавр під час клінічного обстеження 1,5-річного хлопчика встановила попередній діагноз латентної спазмофілії. Які з перерахованих нижче симптомів вона виявила?

A. Симптом Труссо

B. Симптом Ортнера

C. Симптом Грефе

D. Симптом Мебіуса

E. Симптом Галанта

257. Дитина 9-ти років перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з приводу менінгіту. Складаючи план обстеження, яке обстеження потрібно зробити в першу чергу?

A. Спинномозкову пункцію

B. Комп'ютерну томографію

C. Енцефалографію

D. Магнітно-ядерний резонанс

E. Ангіографію

258. До Вас поступила дитина, при огляді якої Ви спостерігаєте: стан важкий, шкірні покриви бліді, висипи на шкірі у вигляді петехій та екхімозів. Під час огляду у дитини почалась носова кровотеча. Яке втручання першочергово Ви повинні зробити з метою надання невідкладної допомоги?

A. Нахилити голову вперед

B. Надати дитині горизонтального положення

C. Закинути голову доверху

D. Провести гарячу ніжну ванну

E. Провести задню тампонаду носа

259. Хлопчик 8-ми років лікується в нефрологічному відділенні. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на гомілкях, АТ150/100 мм рт.ст. При проведенні медсестринського обстеження Ви виявили такі проблеми як: зменшення кількості сечі та переважання нічного діурезу над денним. Дайте визначення цим поняттям:

A. Олігурія, ніктурія

B. Поліурія, бактеріурія

C. Циліндрурія, гематурія

D. Анурія, бактеріурія

E. Лейкоцитурія, протеїнурія

260. Які принципи відносяться до основних принципів первинної лікувальнопрофілактичної допомоги?

A. Кваліфікованість; оперативність; доступність

B. Солідарність і субсидіарність

C. Надання медичної допомоги при нещасних випадках

D. Керованість надання медичних послуг

261. Пацієнт скаржиться на спрагу, поліурію, свербіж шкіри, нудоту, блювання, біль у животі. Хворий загальмований, дихання шумне, запах ацетону з рота, шкіра та слизові оболонки сухі, тони серця приглушені, ЧСС- 102\хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Живіт болючий. Під час обстеження хворий втратив свідомість. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Гіперглікемічна кома

B. Гіпоглікемічна кома

C. Ліподистрофія

D. Печінкова кома

E. Уремична кома

262. У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації спостерігаються набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми характерні?

A. Ревматична гарячка, поліартрит

B. Ревматична гарячка, ревмокардит

C. Ревматоїдний артрит

D. Деформуючий остеоартроз

E. Ревматична гарячка, мала хорея

263. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі з прозорим вмістом розміром з просяне зерно. На другий день пухирці мали вже серозно-гнійний вміст. Свербіння не спостерігається. Для якого захворювання це характерно?

A. Везикулопустульоз

- B. Пухирчатка новонароджених
- C. Псевдофурункульоз
- D. Фурункульоз
- E. Герпес-інфекція

264. У дитини 8-ми років визначаються ознаки інтоксикації. Під час огляду: мигдалики збільшені, вкриті сіруватими нашаруваннями, які важко знімаються, після зняття виступають крапельки крові. Нашарування не розтираються між шпателем, не розчиняються у воді. Для якого захворювання характерні такі ознаки?

A. Дифтерія горла

- B. Скарлатина
- C. Лакунарна ангіна
- D. Мононуклеоз
- E. Фолікулярна ангіна

265. У крові дітей, хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, виявляють специфічні антитіла до:

A. Helicobacter pylori

- B. Salmonella
- C. Bordetella pertussis
- D. Entamoeba histolytica
- E. Mycobacterium tuberculosis

266. При здійсненні медсестринського огляду у пацієнта виявлено гінгівіт, стоматит, а також ціанотична смуга вздовж країв ясен, постійний тремор рук, підвищена збудливість. Яка речовина при інтоксикації дає такі ознаки?

A. Ртуть

- B. Марганець
- C. Оксид вуглецю
- D. Арсен
- E. Свинець

267. Контроль - це процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають, він складається з:

A. Попереднього, поточного й заключного

- B. Поточного й заключного
- C. Попереднього й заключного
- D. Тільки з поточного контролю
- E. Тільки із заключного контролю

268. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 місяці, з генералізованими судомою та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,6 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

A. Спазмофілія. Судоми

- B. Спазмофілія, ларингоспазм
- C. Рахіт, гострий період. Судоми
- D. Гіпервітаміноз Судоми

269. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Який лікарський препарат і яку дозу лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

A. 0,5% сибазон 0,8 мл

B. 0,5% сибазон 0,5 мл

C. 0,5% седуксен 0,5 мл

D. 0,5% діазепам 2 мл

E. 0,5% діазепам 0,2 мл

270. У дитини діагностовано природжену ваду серця. На першому році життя наростала задишка, ціаноз проявлявся під час плачу і годування. Після року у дитини визначається задишка у стані спокою, характерними стали часті напади ціанозу зі втратою свідомості і судомами. Такий розвиток клінічних проявів вказує на:

A. Тетраду Фалло

B. Дефект міжшлуночкової перегородки

C. Відкрити аортальну протоку

D. Фіброеластоз міокарда

E. Коарктація аорти

271. У хворого порушення серцевого ритму, при якому на ЕКГ протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

A. Миготлива аритмія

B. Пароксизмальна тахікардія

C. Синусова тахікардія

D. Синусова аритмія

E. Атріовентрикулярна блокада

272. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виник гострий біль у животі, нудота, печія, гіркота у роті, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

A. Оглядова рентгенографія

B. Колоноскопія

C. Іригоскопія

D. Лапароцентез

E. Зняття ЕКГ

273. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається крепітація та патологічна рухливість. Рс- 130/хв., слабого наповнення, АТ- 80/45 мм рт.ст. Дихання поверхневе, прискорене. Стан пацієнта відповідає:

A. Шок II ступеня

B. Шок I ступеня

- C. Шок IV ступеня
- D. Шок III ступеня
- E. Передагонія

274. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на біль, який виник після фізичного навантаження. Біль іррадіює у пахвинну ділянку. Хвора збуджена, не знаходить собі місця від болю, кричить. Біль супроводжується нудотою, блюванням, затримкою газів та випорожнень. При обстеженні пацієнтки відмічається болючість у ділянці лівої нирки, позитивний симптом Пастернацького. Перша невідкладна допомога в даному випадку складається з:

- A. Призначення спазмолітиків, гарячої ванни
- B. Літотрипсія, грілка на поперек
- C. Призначення прийому рідини, гарячої ванни
- D. Призначення антибіотиків та спазмолітиків
- E. Заспокоїти хвору, холод на поперек

275. Соціальна медицина, як наука, володіє різноманітними методами дослідження. Як називається статистичне дослідження, яке охоплює облік усіх одиниць спостереження?

- A. Суцільне дослідження
- B. Монографічне дослідження
- C. Дослідження основного масиву
- D. Вибіркове дослідження
- E. Несуцільне дослідження

276. Вас викликали до дитини 10-ти років. На момент огляду у дитини безперервний кашель, ціаноз шкіри, задишка, дитина збуджена. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. Якої допомоги потребує дитина для звільнення дихальних шляхів від стороннього тіла?

- A. Прийом Геймліха
- B. Прийом Леопольда
- C. Відсмоктування слизу з рота та носа
- D. Термінова інтубація трахеї
- E. Прийом Селіка

277. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38оВідмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

- A. Гострий гематогенний остеомієліт
- B. Флегмона правої гомілки
- C. Вивих правого колінного суглоба
- D. Перелом правого колінного суглоба
- E. Гострий артрит колінного суглоба

278. У пацієнта 38-ми років після бійки виявлено крововилив і крепітацію в ділянці нижньої щелепи. Вкажіть вид пов'язки, яку необхідно застосувати для іммобілізації нижньої щелепи під час транспортування:

- A. "Вуздечка"
- B. "Чепець"
- C. Хрестоподібна

- D. Колова
- E. Поворотна

279. Населення міста А має вікову структуру: дітей у віці від 0 до 14 років - 30%, осіб у віці 15-49 років - 50%, осіб старше 50 років - 20%. Визначте тип вікової структури населення міста:

A. Прогресивний

- B. Стабільний
- C. Регресивний
- D. Динамічний
- E. Змішаний

280. Реєстрація випадку смерті відбувається у відділі РАЦСу на основі спеціального медичного обліково-статистичного документа. Назвіть цей документ:

A. Лікарське свідоцтво про смерть

- B. Історія хвороби
- C. Журнал обліку померлих
- D. Довідка дільничного лікаря про випадок смерті
- E. Протокол розтину

281. Наукове дослідження, присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу хворобами органів дихання. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

A. Кожен випадок захворювання органів дихання

- B. Кожен студент медичного коледжу
- C. Кожен хворий студент медичного коледжу (будь-яким захворюванням)
- D. Кожен студент медичного коледжу з хворобою органів дихання
- E. Кожен випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

282. Пацієнтка скаржиться на наростаючу задишку. При огляді пацієнтки визначають асиметрію грудної клітки, відставання в акті дихання правої половини. Перкуторно - справа тупий перкуторний звук. Під час аускультатії дихання справа не вислуховується. Який синдром розвинувся у пацієнта?

A. Накопичення рідини в плевральній порожнині

- B. Ущільнення легеневої тканини
- C. Деструкції легеневої тканини
- D. Бронхіальної обструкції
- E. Синдром порожнини

283. У хворої раптово після фізичного навантаження виник біль в правій здухвинній ділянці, часте сечовипускання малими порціями через короткий проміжок часу. При огляді: симптом Пастернацького позитивний справа. Який попередній діагноз?

A. Правобічна ниркова коліка

- B. Гострий панкреатит
- C. Гострий холецистит
- D. Гостра непрохідність кишечника
- E. Гострий аднексит

284. У клініку доставлено пацієнта з гострим панкреатитом, зі скаргами на оперізуючий біль у верхній половині живота. Яке дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

A. Визначення амілази крові

- B. Зняття ЕКГ
- C. Загальний аналіз крові
- D. Оглядовий знімок грудної клітки
- E. Оглядовий знімок черевної порожнини

285. У хворої, оперованої з приводу апендициту рік тому, виникли біль у животі, блювання, затримка газів. При рентгенографії органів черевної порожнини множинні "чаші Клойбера". Встановіть попередній діагноз:

A. Спайкова хвороба

- B. Пухлина товстої кишки
- C. Пухлина тонкої кишки
- D. Защемлена грижа
- E. Дивертикуліт товстої кишки

286. За рекомендацією ВООЗ базова тривалість життя (показник який застосовується для розрахувань економічних показників) складає:

A. 65 років

- B. 50 років
- C. 55 років
- D. 60 років
- E. 70 років

287. Медична сестра має вагітність 28 тижнів. Працює у денну зміну. Коли їй необхідно оформити відпустку по вагітності та пологам?

A. Через 2 тижні

- B. Через 1 тиждень
- C. Через 3 тижня
- D. Через 4 тижня
- E. Через 6 тижнів

288. Амбулаторія сімейної медицини має реєстратуру, кабінети сімейного лікаря, оглядовий, фізіотерапії, експресдіагностики, палати денного перебування хворих. Який кабінет ще обов'язково повинен бути в структурі амбулаторії?

A. Маніпуляційна

- B. Архів
- C. Харчоблок
- D. Рентген-кабінет
- E. Аптека

289. У пацієнтки, яка потрапила у відділення з приводу негоспітальної пневмонії, протягом 1 години температура тіла знизилась з 39,9°C до норми, але стан погіршився: з'явилась різка слабкість, пульс ниткоподібний, кінцівки холодні, АТ- 80/40 мм рт.ст. Чим зумовлене погіршення стану пацієнтки?

A. Колапсом

- B. Непритомністю
- C. Анафілактичним шоком
- D. Маренням
- E. Судомним синдромом

290. При підозрі на харчове отруєння грибами слід заповнити документ:

- A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре, професійне отруєння
- B. Медичну карту диспансерного спостереження
- C. Контрольну карту диспансерного спостереження
- D. Талон амбулаторного пацієнта
- E. Медичну карту стаціонарного хворого

291. До Вас звернувся працівник аптеки з питанням. "Як правильно зберігати гумові грілки в умовах аптеки?"

- A. Злегка наповнені повітрям, у захищеному від світла і перепадів температури місця
- B. При температурі 23°C та при вологості повітря не менше 50%
- C. При відносній вологості 45%, у сухому приміщенні
- D. В сухому прохолодному приміщенні
- E. В темному прохолодному приміщенні

292. Ви медсестра кардіологічного відділення. Скільки разів на день слід проводити провітрювання палат?

- A. Не менше 4 разів
- B. Не менше 1 разу
- C. Не менше 2 разів
- D. Не менше 3 разів
- E. Не менше 1-2 разів

293. Ви медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно Наказу № 234)?

- A. 1 раз в 3 місяці
- B. 1 раз в 6 місяці
- C. 1 раз в 9 місяці
- D. 1 раз на рік
- E. 1 раз на 2 роки

294. Лікар призначив дитині, хворій на пневмонію, цефтриаксон в/м в дозі 700 мг. У флаконі 1 г препарату. Медична сестра ввела у флакон 5 мл розчинника. Скільки мл розведеного цефтриаксону повинна ввести дитині медична сестра?

- A. 3,5 мл
- B. 2 мл
- C. 4 мл
- D. 2,5 мл
- E. 5 мл

295. Під час профілактичного огляду пацієнтки встановлено діагноз злоякісного новоутворення правої молочної залози. Які ознаки найбільш характерні для даної патології?

- A. Утягнутість соска справа
- B. Дратівливість
- C. Відсутність апетиту
- D. Порушення менструального циклу
- E. Гіркота в роті

296. На стаціонарному лікуванні у відділенні гнійної хірургії перебуває пацієнт у важкому стані.

Яке ускладнення можливе у пацієнта з постійним гумовим катетером у сечовому міхурі?

A. Інфікування сечового міхура

- B. Перфорація сечового міхура
- C. Аденома передміхурової залози
- D. Сечокам'яна хвороба
- E. Напад ниркової кольки

297. Пацієнтка після черепно-мозкової травми скаржиться на головний біль, нудоту, блювання. Відмічає короткочасну (протягом 2-3 хвилин) втрату свідомості. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?

A. Струсом головного мозку

- B. Забоєм головного мозку
- C. Стисненням головного мозку
- D. Колапсом
- E. Непритомністю

298. В травматологічний пункт звернувся пацієнт з укушеною раною правого передпліччя. Що Ви використаєте в першу чергу з метою неспецифічної профілактики сказу при укусах вуличним собакою?

A. Промити рану розчином господарського мила

- B. Промити рану 6% розчином перекису водню
- C. Промити рану 0,02% розчином фурациліну
- D. Промити рану 70% розчином спирту
- E. Промити рану 2% розчином натрію гідрокарбонату

299. Ви працюєте шкільною медичною сестрою. До Вас звернулася дівчинка 7-ми років зі скаргами на погане самопочуття, біль у горлі. Під час огляду виявлено підвищення температури тіла до 38,3°C, дрібноточковий висип на фоні гіперемійованої шкіри, блідий носогубний трикутник, фолікулярну ангіну. Які першочергові дії запланує медсестра?

A. Ізоляцію хворої дитини

- B. Обробка елементів висипу
- C. Повідомлення в СЕС
- D. Введення жарознижуючих препаратів
- E. Введення імуноглобуліну

300. Хвора звернулася зі скаргами на тривалий субфебрилітет, виражену загальну слабкість, в'ялість, наявність шкірного висипу на обличчі у вигляді "метелика". Для якого захворювання це характерно?

A. Системний червоний вовчак

- B. Хімічний опік
- C. Вульгарні вугрі
- D. набряк Квінке
- E. Демодекоз

301. На третю добу в післяопераційному періоді у пацієнта 72-х років раптово виник біль за грудиною, ціаноз верхньої половини тулуба, обличчя, шиї, тахікардія, задишка інспіраторного типу. Шийні вени набрякли. Про який стан можна подумати?

A. Тромбоемболія легеневої артерії

- B. Інфаркт міокарда

- С. Набряк легень
- D. Гіпертонічний криз
- Е. Кардіогенний шок

302. За допомогою звернувся чоловік 58ми років зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. При огляді живота виявлено вип'ячування в паховій ділянці справа, болюче при пальпації, щільноеластичної консистенції. Що можна запідозрити?

- A. Защемлення пахвинної кили**
- В. Защемлення пупкової кили
- С. Незащемлену пахвинну килу
- D. Защемлення стегнової кили
- Е. Защемлення калиткової кили

303. Материнська смертність - показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного належить до материнської смертності?

- A. Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами**
- В. Смертність протягом вагітності, якщо смерть жінки не пов'язана з гінекологічною патологією
- С. Смертність під час пологів, якщо смерть жінки пов'язана з внутрішньоутробною інфекцією
- D. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана з пологами
- Е. Смертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю

304. Накази видаються на основі й для виконання законів, постанов і розпоряджень Уряду, наказів і директивних вказівок вищих органів. Хто видає наказ?

- A. Керівник організації**
- В. Колегіальний орган
- С. Голова колегіального органу
- D. Вища посадова особа

305. Дитина 5-ти років захворіла гостро, підвищилася температури тіла до 37,5оС, з'явилася дрібноплямиста висипка спочатку на обличчі потім на внутрішній поверхні рук, на сідницях а потім і по всьому тілу. На момент огляду: потиличні та задньошийні лімфовузли збільшені, безболісні м'якої консистенції. Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Краснуха**
- В. Кір
- С. Скарлатина
- D. ГРВІ, алергічний висип
- Е. Менінгококцемія

306. Дитині 5 діб, після кожного сечовиділення на пелюшках з'являються плями червоно-бурого кольору. Зібрана сеча мутна, при зберіганні у ній з'явився цеглястий осад. У загальному аналізі сечі: еритроцити - 7-10 в полі зору, урати - в значній кількості. У чому причина даного стану у новонароджених?

- A. Сечокислий інфаркт нирок**
- В. Фізіологічна норма
- С. Макрогематурія
- D. Нефролітіаз
- Е. Інфекція сечових шляхів

307. Ви головна медична сестра. До якого рівня належить високоспеціалізована медична допомога, що забезпечується в обласних лікувально-профілактичних закладах?

- A. Третинного рівня надання медичної допомоги
- B. Вторинного рівня надання медичної допомоги
- C. Первинного рівня надання медичної допомоги
- D. Четвертинного рівня надання медичної допомоги

308. У чоловіка виявлено задишку з утрудненим видихом. Шкіра обличчя, губи ціанотичного кольору. Вдих глибокий, видих тривалий. Грудна клітка діжкоподібна, перкуторно - коробковий звук над легеньми. Аускультативно - ослаблене везикулярне дихання. Яке захворювання можна запідозрити?

A. Емфізема легенів

- B. Пневмосклероз
- C. Бронхіт
- D. Туберкульоз
- E. Рак легенів

309. Жінка скаржиться на біль голови, порушення менструального циклу, поганий сон. Об'єктивно: ожиріння верхньої половини тіла. Обличчя місяцеподібне, червоного кольору, на обличчі надмірний ріст волосся. На шкірі живота червоно-фіолетові стрії. Пульс - 90/хв., АТ- 170/110 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?

A. Хвороба Іценко-Кушінга

- B. Акромегалія
- C. Гіпертонічна хвороба
- D. Ревматична хвороба
- E. Гіпотиреоз

310. У пацієнта з гострим гломерулонефритом сеча кольору м'ясних помиїв. Чим зумовлений такий колір?

A. Гематурією

- B. Протеїнурією
- C. Альбумінурією
- D. Циліндрурією
- E. Лейкоцитурією

311. Медична сестра працює в медичному пункті по обслуговуванню робітників газонафтовидобувної компанії, де застосовується метанол. Який антидот вона повинна використовувати в випадку гострого отруєння метанолом?

A. Етанол (етиловий спирт)

- B. Амінокапронову кислоту
- C. Соду
- D. Унітіол
- E. Активоване вугілля

312. В ЛПЗ було успішно проведено акредитацію. Який документ видається в цьому випадку?

A. Сертифікат

- B. Диплом
- C. Державний акт
- D. Посвідчення

313. Охарактеризуйте стиль керівництва головної медсестри, яка часто влаштовує наради та вислуховує думки співробітників, винагороджує їх за гарну роботу та рідко вичитує або карає:

A. Демократичний

B. Директорський

C. Ліберальний

D. Авторитарний

E. Наставницький

314. Кожний амбулаторно-поліклінічний заклад має свою структуру. В якому структурному підрозділі поліклініки медична сестра проводить антропометричні вимірювання?

A. Кабінет долікарського прийому

B. Терапевтичний кабінет

C. Кабінет медоглядів

D. Кабінет функціональної діагностики

E. Денний стаціонар

315. Прийняття управлінських рішень проходить у декілька етапів. Назвіть перший етап прийняття управлінського рішення:

A. Визначення проблеми

B. Постановки мети

C. Формування системи

D. Формування стратегії

E. Визначення альтернатив

316. До загальних медичних протипоказань для допуску на роботу, пов'язану з небезпечними шкідливими речовинами і шкідливими виробничими факторами (виробництво ароматичних вуглеводнів), відноситься:

A. Цироз печінки

B. Гіпертонічна хвороба I стадії

C. Хронічний гастрит

D. Нирковокам'яна хвороба

E. Хронічний панкреатит

317. Після обробки приміщення дихлофосом у працівника виникли симптоми гострої інтоксикації фосфорорганічними сполуками. Який препарат застосовується в якості патогенетичної антидотної терапії?

A. Атропіну сульфат

B. Тіосульфат натрію

C. Унітіол

D. Тетацин кальцію

E. Сульфат магнію

318. Дівчинка 2-х років захворіла гостро, з підвищення температури тіла до 38,2°C, сухого кашлю, нежиті, кон'юнктивіту, блефароспазму. При огляді: на шкірі висип у вигляді червоних цяток, які злегка підняті над поверхнею шкіри. Висип спочатку з'явився за вухами, на обличчі, шиї на наступний день - на тулубі. На слизовій оболонці щік навпроти малих корінних зубів сірувато-білі висипання розміром з макове зерно, оточені червоною облямівкою, на піднебінні -

плямисто-папульозна енантема. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Кір

B. ГРВІ

C. Ентеровірусна інфекція

D. Аденовірусна інфекція

E. Афтозний стоматит

319. Дівчинка 5-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 37,9°C, розлад випорожнень. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт запалий, сигмовидна кишка спазмована, пальпується у вигляді тяжа, болюча. Випорожнення скудні зі слизом, зеленню, прожилками крові до 10-15 разів на добу, періодичні тенезми. Яке захворювання найбільш імовірне?

A. Шигельоз

B. Сальмонельоз

C. Іерсиніоз

D. Ешеріхіоз

E. Ротавірусна інфекція

320. Під час амбулаторного прийому здорової доношеної дитини місячного віку, яка народилася взимку, знаходиться на грудному вигодовуванні, не виявлено ніякої патології. Профілактику якого захворювання необхідно рекомендувати в першу чергу?

A. Рахіт

B. Анемія

C. Гіпотрофія

D. Спазмофілія

E. Паратрофія

321. В результаті ускладнених пологів народилась недоношена дитина, яка померла на 35-ту добу життя. В який показник ввійде цей випадок?

A. Постнеонатальна смертність

B. Перинатальна смертність

C. Неонатальна смертність

D. Рання неонатальна смертність

E. Загальний показник смертності

322. У пацієнта, який лікується з приводу інфаркта міокарда, раптово виникла задишка, дихання стало клопочучим, з рота та носа виділяється пінисте рожеве харкотиння. Яке ускладнення виникло?

A. набряк легенів

B. Тромбоз легеневої артерії

C. Астматичний статус

D. Легенева кровотеча

E. Носова кровотеча

323. Пацієнтка 50-ти років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку і триває більше 45 хвилин. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

A. Інфаркт міокарда

B. Остеохондроз

C. Перикардит

- D. Міокардит
- E. Стенокардія

324. Пацієнт скаржиться на біль голови, зміну зовнішнього вигляду. В анамнезі: травма черепа. Об'єктивно: вилиці, нижня щелепа, лобові горби, ніс та губи збільшені. Він звернувся до медсестри з питанням: "Порушення функції якої ендокринної залози зумовлює дане захворювання?"

A. Гіпофіз

- B. Підшлункова залоза
- C. Щитоподібна залоза
- D. Надниркові залози
- E. Статеві залози

325. Пацієнт знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом виразкова хвороба шлунка. Скаржиться на погіршення свого стану - за 3 місяці втратив 10 кг ваги, відмічає відразу до м'ясної їжі. Який метод обстеження буде найбільш інформативним?

A. Фіброгастроскопія

- B. Загальний аналіз крові
- C. Шлункове зондування
- D. Дуоденальне зондування
- E. Колоноскопія

326. Пацієнт 42 роки, поступив до приймального відділення ЦРЛ зі скаргами на наростаючий набряк правої кінцівки, біль у ділянці рани, підвищення температури тіла до 39°C, серцебиття. З рани виділяються пухирці газу з невеликою кількістю сукровичної рідини. Пальпація тканин в ділянці ураження кінцівки супроводжувалась крепітацією. Поставте діагноз:

A. Газова гангрена

- B. Бешиха
- C. Флегмона
- D. Ангіна
- E. Правець

327. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 27-ми років з термічним опіком лівої ступні. Шкіра в місці ушкодження стала щільною, набула темнокоричневого кольору, з'явилась чітка межа із непошкодженими тканинами. Рухи і чутливість пальців відсутні. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Суха гангрена

- B. Хімічний опік III ст.
- C. Хімічний опік II ст.
- D. Волога гангрена
- E. Термічний опік IV ст.

328. Пацієнтка 38-ми років, скаржиться на сильний біль у ділянці потилиці, загальну слабкість, нудоту, підвищення температури тіла до 38,5°C ділянці потилиці пальпується болючий інфільтрат розміром 1,5 см на 2 см, шкіра над ним багряно-синього кольору, через виниклі отвори виділяється густий зеленуватосірий гній та некротичні маси. Поставте діагноз:

A. Карбункул

- B. Бешиха
- C. Гідраденіт

- D. Флегмона
- E. Паранефрит

329. Хворий 50-ти років працював протягом 12-ти років на операції виготовлення "якісних" електродів. При черговому медичному огляді було виявлено симптоми паркінсонізму: монотонну невиразну мову, гіпомімію, нерухомий погляд з рідким кліпанням, нерівномірність співдружних рухів рук при ходьбі, підвищення м'язового тону, розлади ходи, сонливість, інертність. Яка хімічна речовина є причиною виникнення даного нейротоксикозу?

- A. Марганець
- B. Карбофос
- C. Тетраетилсвинець
- D. Бензол
- E. Дихлоретан

330. Медичний працівник на дільниці проводить диспансеризацію пацієнтів. Скільки етапів включає в себе диспансеризація?

- A. 3 етапи
- B. 2 етапи
- C. 1 етап
- D. 4 етапи
- E. 5 етапів

331. Пацієнта 39-ти років госпіталізовано до терапевтичного відділення з приводу негоспітальної пневмонії. Що використовують з метою проведення етіотропного лікування?

- A. Антибіотики
- B. Бронхолітики
- C. Антигістамінні
- D. Вітаміни
- E. Імуномодульну терапію

332. До медсестри сімейного лікаря звернулась пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Рс- 94\хв., АТ- 190\100 мм рт.ст. Який лікарський препарат лікар призначить для надання невідкладної допомоги?

- A. Дибазол
- B. Кофеїн
- C. Строфантин
- D. Анальгін
- E. Дицинон

333. Під час проведення проби на резуссумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію:

- A. Несумісна за Rh-фактором
- B. Резус-позитивна
- C. Сумісна за Rh-фактором
- D. Резус-негативна
- E. Пробу треба переробити

334. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- A. 36%
- B. 56%
- C. 42%
- D. 25%
- E. 18%

335. З яких першочергових заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги дитині з нападом пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії?

- A. З вагусних проб
- B. З в/в введення р-ну ізоптина
- C. З в/в введення р-ну строфантину
- D. З в/в введення лідокаїну
- E. З в/в введення новокаїнамідру

336. На оперативній нараді старша медична сестра оголосила наказ завідуючого, стосовно графіка роботи. Визначте, до якого виду відноситься даний документ:

- A. Розпорядчий
- B. Інформаційний
- C. Організаційний
- D. Фінансовий
- E. Рекомендований

337. Ви головна медична сестра. Проводите заняття. Який спосіб слід застосувати при стерилізації перев'язувальних засобів промислового виробництва?

- A. Радіаційне опромінення
- B. Кип'ятіння
- C. В автоклавах
- D. Дезінфекція
- E. В сухожаровій шафі

338. Після медичного огляду школярів медична сестра склала варіаційний ряд їх зросту. 149, 151, 151, 152, 153, 154, 154, 154, 156, 156, 156, 160, 162, 165. Який це варіаційний ряд?

- A. Ранговий
- B. Простий
- C. Згрупований
- D. Динамічний
- E. Складний

339. Здоров'я населення характеризується комплексом демографічних показників, показників захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку. Який з наведених показників належить до демографічних?

- A. Народжуваність
- B. Первинна захворюваність
- C. Летальність
- D. Інвалідність
- E. Травматизм

340. Концепція розвитку системи охорони здоров'я в умовах ринкової економіки чітко орієнтує суспільство на сприйняття медицини не тільки як моральної, юридичної, а насамперед як соціально-економічної категорії. Розкрийте зміст економіки охорони здоров'я:

A. Наука, що вивчає економічні відносини в охороні здоров'я

B. Бухгалтерський облік в ЛПЗ

C. Методи зниження собівартості лікування

D. Витрати держави на охорону здоров'я

E. Витрати держави на утримання ЛПЗ

341. У хворого відкритий перелом стегна ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги:

A. Джгут, знеболити, пов'язка, шина

B. Джгут, шина, знеболити, пов'язка

C. Знеболити, пов'язка, джгут, шина

D. Пов'язка, знеболити, джгут, шина

E. Шина, знеболити, джгут, пов'язка

342. Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу, виникло блювання. Під час пальпації різкий біль у правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A. Гострий апендицит

B. Гострий панкреатит

C. Гострий перитоніт

D. Гострий холецистит

E. Кишкова непрохідність

343. Дівчинка 11-років впродовж 2-х років спостерігається з приводу хронічного гастриту. За останні 4 місяці з'явилися нічні болі в животі. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра для підтвердження діагнозу підготує пацієнта до наступного обстеження:

A. Фіброезогастродуоденоскопія

B. Аналіз кала на приховану кров

C. УЗД травного тракту

D. Загальний аналіз сечі

E. Копрологічне дослідження

344. Дитині 8 років. Під час профілактичного огляду медична сестра-бакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та S-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

A. Сколіоз грудного відділу хребта

B. Кіфоз грудного відділу хребта

C. Лордоз грудного відділу хребта

D. Хондродистрофію

E. Залишкові явища перенесеного рахіту

345. Пацієнт 34-х років поступив у відділення з ознаками бронхіту. Упродовж 5ти років працює в шахті, де добувають залізну руду. Який різновид пневмоконіозу в нього може виникнути?

A. Сидероз

B. Азбестоз

- C. Антракоз
- D. Бісиноз
- E. Бериліоз

346. Пацієнт отримав хімічний опік правої гомілки концентрованою сірчаною кислотою. Яку речовину слід використати для нейтралізації сірчаної кислоти?

A. 2% розчин натрію гідрокарбонату

- B. 2% розчин борної кислоти
- C. 3% розчин перексиду водню
- D. 0,9% фізіологічний розчин
- E. 0,02% розчин фурациліну

347. Пацієнт скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника відсутня. Визначається позитивний симптом Валя. З чим пов'язані проблеми даного пацієнта?

A. З гострою кишковою непрохідністю

- B. З перфоративною виразкою шлунка
- C. З гострим апендицитом
- D. З гострим панкреатитом
- E. З гострим холециститом

348. У пацієнта з травмою грудної клітки діагностовано закритий пневмоторакс. Яке положення слід надати пацієнту на період транспортування його до лікарні?

A. Напівсидяче

- B. Горизонтальне на спині
- C. Горизонтальне на животі
- D. З опущеною головою
- E. З піднятими ногами

349. Жінка 35-ти років скаржиться на загальну слабкість, роздратованість, сухість шкіри, ламкість нігтів, випадіння волосся. Об'єктивно: шкіра та видимі слизові бліді. Р_с- 96\хв., АТ- 100\60 мм рт.ст. У крові: знижений вміст гемоглобіну, еритроцитів, кольорового показника та сироваткового заліза. Дефіцит якого із факторів зумовив виникнення захворювання?

A. Заліза

- B. Вітаміну B6
- C. Вітаміну B12
- D. Кобальту
- E. Фолієвої кислоти

350. Хворий 19-ти років з дитинства страждає на підвищену кровоточивість. Після незначних травм виникають масивні підшкірні та внутрішньом'язові гематоми. Мати та сестра - здорові. Тромбоцити крові - $190 \cdot 10^9/\text{л}$. Про яке захворювання можна думати у цьому випадку?

A. Гемофілія A

- B. Тромбоцитопенія
- C. Тромбоцитопатія
- D. ДВЗ-синдром
- E. Геморагічний васкуліт

351. У хворого 25-ти років восени з'явилися болі в епігастрії, що виникають через 1,5-2 год.

після вживання їжі, і вночі, печія, закрепи. Хворіє протягом року. При пальпації живота - болючість в епігастрії справа, в цій же ділянці - резистентність м'язів черевного пресу. Яке захворювання найбільш ймовірно?

A. Виразкова хвороба 12-палої кишки

- B. Хронічний холецистит
- C. Діафрагмальна кила
- D. Виразкова хвороба шлунка
- E. Хронічний панкреатит

352. Хвора 36-ти років скаржиться на серцебиття, пітливість, схуднення за останні 3 місяці на 5-6 кг. Апетит збережений. Об'єктивно: шкіра волога, тепла, пульс - 140/хв., ритмічний, АТ- 130/60 мм рт.ст. Щитоподібна залоза збільшена рівномірно. Яке лабораторне дослідження є найінформативнішим?

A. Визначення рівня тиреоїдних гормонів

- B. Загальний аналіз сечі
- C. Визначення рівня статевих гормонів
- D. Глюкоза крові
- E. Загальний аналіз крові

353. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, набряк повік, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 38,2°C, задишка, тахікардія, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

A. Тиреотоксикоз

- B. Гіпертонічна хвороба
- C. Інфаркт міокарда
- D. Гіпотиреоз
- E. Стенокардія

354. В аптеці необхідно придбати шовний матеріал, що не розсмоктується. Який із перелічених шовних матеріалів повинен відпустити фармацевт?

A. Лавсан

- B. Кетгут
- C. Вікріл
- D. Окцелон
- E. Дексон

355. Структура ринку - це розташування окремих його сегментів, їх співвідношення у загальному обсязі ринку. Кожен із них виступає водночас субринком щодо всього ринку. Назвіть критерії сегментації ринку за рівнем насиченості:

A. Рівноважний, дефіцитний, надмірний

- B. Оптовий, роздрібний, аукціони
- C. Вільний, монополістичний, олігополістичний
- D. Місцевий, регіональний, національний
- E. Офіційний, тіньовий

356. У хворого вібраційна хвороба від локального впливу вібрації I ст., периферичний ангіоспастичний синдром. Який з перелічених медикаментозних засобів доцільно використовувати для лікування?

A. Судинорозширювальні

B. Тромболітики

C. Гормональні препарати (кортикостероїди)

D. Антибіотики

E. Заспокійливі

357. Дитині 7 років. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, блювання, підвищення т.т. до 38,5^оЖивіт здутий, болючий при пальпації, в лівій здухвинній ділянці. Випорожнення до 10 раз на добу з домішками слизу та крові. Для якого захворювання це характерно?

A. Дизентерія

B. Сальмонельоз

C. Холера

D. Ешерихіоз

E. Харчова токсикоінфекція

358. Дитині 12-ть місяців, госпіталізована в педіатричне відділення з приводу сухого кашлю підвищення т.т. до 38,7^оОб'єктивно: стан дитини важкий, дитина млява, виражена блідість слизових оболонок, шкіри, навколо носа і рота ціаноз. Під час дихання спостерігається втягнення міжреберних проміжків, роздування крил носа. ЧД- 56\хв., ЧСС- 150\хв. Здійснюючи III етап медсестринського процесу, медична сестра запланує обстеження пацієнта:

A. Рентгенологічне

B. УЗД

C. ЕКГ

D. Біохімічне дослідження крові

E. Аналіз сечі по Зимницькому

359. Пацієнт 60-ти років з діагнозом "ІХС: гострий коронарний синдром". Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудниною, задишка, загальна слабкість АТ- 80\50 мм рт.ст., ЧСС- 110\хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів слід застосувати для корекції гемодинаміки?

A. Дофамін

B. Корглікон

C. Ефедрин

D. Строфантин

E. Атропін

360. "Сонячний удар" - форма перегрівання, зумовлена впливом сонячних променів на незахищену голову за відсутності загального перегрівання організму. До симптомів "сонячного удару" належать:

A. Загальна слабкість, запаморочення, блювання, епілептоформні напади

B. Сухість шкірних покривів, болі в животі, загальна слабкість

C. Гіперемія шкіри, ослаблення пульсації, запаморочення

D. Галюцинації, загальна слабкість, запаморочення

E. Носові кровотечі, блювання

361. Пацієнт 45-ти років знаходиться на лікуванні в психіатричному відділенні. Хворий сидить на ліжку, відмовляється встати, загальмований, відповідає тихим сумним голосом. При розмові

хворого з медичною сестрою стверджує, що "марно прожив життя", "нічого доброго не зробив", "немає більше для чого жити". Часто плаче, просить позбавити його життя. Який психічний розлад може виявити медична сестра у хворого?

A. Депресивний синдром

B. Маніакальний синдром

C. Параноїдне маячіння

D. Гебефренічне збудження

E. Кататонічне збудження

362. Медичну сестру аграрного господарства викликали до пацієнта - працівника складу отрутохімікатів, у якого вона виявила ознаки гострого отруєння ртутьорганічними пестицидами. Який препарат для знешкодження ртуті слід ввести насамперед?

A. Унітіол

B. Пірацетам

C. Преднізолон

D. Аскорбінова кислота

E. Атропіну сульфат

363. Ви медична сестра відділення інтенсивної терапії. У відділення поступив пацієнт з діагнозом "Свинцева коліка". Який лікарський засіб потрібно ввести в першу чергу при наданні невідкладної допомоги з метою зв'язування свинцю?

A. Тетацин кальцію

B. Аскорбінова кислота

C. Ацетилсаліцилова кислота

D. Анальгін

E. Ноотропіл

364. У пацієнта непропорційне збільшення носа, губ, підборіддя, кистей рук, ступнів. Скаржиться на головний біль, запаморочення, біль у суглобах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення розмірів "турецького сидла", витончення його стінок. Вказані ознаки характерні для:

A. Акромегалії

B. Хвороби Іценка-Кушінга

C. Гігантизму

D. Пухлини наднирника

E. Стовбурового енцефаліту

365. Хвора 24-х років скаржиться на біль у суглобах нижніх кінцівок, який посилюється при незначних рухах, неприємні відчуття і біль у ділянці серця, задишку, загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,8^oC. Захворіла через 2 тижні після перенесеної ангіни. Об'єктивно: тони серця приглушені, м'який систолічний шум на верхівці серця. Правий колінний суглоб припухлий, шкіра над ним червона, гаряча на дотик. У крові: лейкоц.- 9,9 · 10⁹/л, ШОЕ- 28 мм/год., Hb- 105 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Ревматична хвороба

B. Стенокардія

C. Ревматоїдний артрит

D. Кардіосклероз

E. Інфекційно-алергічний міокардит

366. Хвора скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї, який іррадіює у праве плече, лопатку, нудоту, блювання. Хворіє понад 5-ть років. Під час огляду: хвора збуджена, шкіра волога, язик обкладений білим нальотом. Живіт здутий, болючий в правому підребер'ї, позитивні симптоми Ортнера, Кера. Який діагноз у хворої?

A. Загострення хронічного холециститу

B. Виразкова хвороба

C. Гострий гастрит

D. Загострення панкреатиту

E. Синдром подразненого кишечника

367. Хворий скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий більше в епігастрії та лівому підребер'ї. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?

A. Аналіз сечі та крові на діастазу

B. Загальний аналіз сечі

C. Аналіз крові на глюкозу

D. Копрограма

E. Аналіз калу на приховану кров

368. У дитини 7-ми років після споживання чіпсів з'явилися нудота, блювота, біль у животі. Ацетон сечі (++) . Про який стан можна думати ?

A. Ацетонемічний синдром

B. Хронічний розлад живлення

C. Гастрит

D. Дуоденіт

E. Виразкова хвороба шлунку

369. Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігаються у разі кашлюку?

A. Лімфоцитоз

B. Анемія

C. Нейтрофіліоз

D. Еозинофілія

E. Тромбоцитопенія

370. Під час проведення проби на біологічну сумісність крові у пацієнта 29-ти років з'явилися стурбованість, утруднене дихання, свербіння шкіри. При огляді виявлені великоплямиста висипка, набряк обличчя. Який стан розвинувся?

A. Анафілактична реакція

B. Септичний шок

C. Пірогенна реакція

D. Гемолітична реакція

E. Цитратний шок

371. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72-х років. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його, і дізналась, що пацієнт перебільшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

A. Агравация

- В. Симуляція
- С. Дисимуляція
- Д. Апеляція
- Е. Атаксія

372. Машиною швидкої допомоги в клініку доставлено пацієнта з попереднім діагнозом: виразкова хвороба шлунка, перфорація виразки. Який характер болю у пацієнта при цій патології?

А. "Кинджальний"

- В. Тиснучий
- С. Пекучий
- Д. Колька
- Е. Оперізуючий

373. У пацієнта відмічаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

А. Виразкова хвороба шлунка

- В. Жовчнокам'яна хвороба
- С. Гастрит
- Д. Езофагіт
- Е. Дискінезія жовчовивідних шляхів

374. Під час обстеження пацієнта бригадою швидкої допомоги виявлено: він сидить, не змінюючи пози (зі слів родичів багато годин), на запитання відповідає повільно, після паузи окремими словами; самостійно не їсть. Який ступінь пригнічення психічної активності?

А. Ступор

- В. Сопор
- С. Кома
- Д. Обнубіляція
- Е. Сомнолентність

375. Ви - старша медична сестра відділення. До Вас з проханням звернулась медична сестра пояснити, з яких елементів складається заробітна плата. Поясніть:

А. Тарифна система та нормування праці

- В. Посадовий оклад, тарифна ставка
- С. Тарифний коефіцієнт, тарифний розряд
- Д. Тарифна ставка, тарифний коефіцієнт
- Е. Посадовий оклад, тарифна ставка

376. Ви - головна медична сестра районної лікарні. Ви проводите лекцію на тему:

А. "Маркетинг у системі охорони здоров'я". Які основні функції виконує маркетинг?

В. Аналітична, виробнича, збутова, управлінська

- С. Наукова, аналітична, управлінська, коригувальна
- Д. Управлінська, наукова, виробнича, збутова
- Е. Аналітична, коригувальна, управлінська, збутова
- Ф. Виробнича, управлінська, аналітична, наукова

377. Ви - головна медична сестра. Готуєте доповідь "Групи інвалідності". Для II групи

інвалідності характерно:

- A. Наявність функціональних порушень, але ця особа не потребує сторонньої допомоги
- B. Наявність вроджених фізичних вад, потребує стороннього догляду
- C. Постійна втрата працездатності, потребує стороннього догляду
- D. Наявність ознак ГРВІ чи грипу
- E. Захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД та венеричні хвороби

378. Через 10-ть днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулась до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, $t_{37,4^{\circ}\text{C}}$, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

- A. Нефрологічне
- B. Терапевтичне
- C. Урологічне
- D. Кардіологічне
- E. Інфекційне

379. Під час післяопераційного періоду у хворого почалося різке падіння артеріального тиску та пригнічення дихальної діяльності. Який препарат необхідно ввести хворому?

- A. Кордіамін
- B. Еуфілін
- C. Мезатон
- D. Фенобарбітал
- E. Адреналін

380. У водолаза, що працює на глибині біля 10 м, більше ніж 20 хвилин виникли загальна слабкість, біль у вухах, суглобах і м'язах, сонливість, дихання поверхневе, часте, втрата свідомості. Яка хвороба виникла у водолаза?

- A. Кесонна хвороба
- B. Висотна хвороба
- C. ІХС
- D. Гіпертензивний криз
- E. Нейроциркуляторна дистонія

381. Дитина 10-ти місяців неспокійна, перелякана. Шкіра бліда, ціанотичні кінцівки, дихання шумне, часте, з утрудненим вдихом. Кашель гавкаючий, нападоподібний, голос втратив гучність. Яке захворювання у дитини?

- A. Гострий стенозуючий ларингіт
- B. Гостра пневмонія
- C. Приступ бронхіальної астми
- D. Гострий бронхіт
- E. Гострий фарингіт

382. У перші місяці життя малюк, народжений ВІЛ-інфікованою матір'ю, буде мати позитивний аналіз крові на ВІЛ. До якого терміну життя встановлюється статус ВІЛ-інфікованості?

- A. До 18 місяців
- B. До 12 місяців
- C. До 6 місяців

- D. До 3 місяців
- E. До 24 місяців

383. При постачанні товарів аптечного асортименту основним юридичним документом, який визначає права і обов'язки, як фармацевтичної фірми так і лікувальної установи, є:

A. Договір (контракт)

- B. Сертифікат якості
- C. Акти на списання
- D. Протокол розбіжностей
- E. Специфікація

384. Медична сестра по дорозі на роботу впала. Наприкінці робочого дня їй стало погано і за порадою лікарів вона прийняла відповідні ліки. Вночі стан її погіршився і була викликана швидка допомога. Другий день вона працювала. На третій день після падіння на дім був викликаний сімейний лікар. З якого дня вона отримає лікарняний?

A. На 3-й день після падіння, в день виклику сімейного лікаря

- B. В день падіння
- C. З моменту виклику швидкої допомоги
- D. В перші три дні вона отримає довідку, а потім лікарняний листок
- E. В перший день, коли звернулася до лікарів на роботі

385. Після автомобільної катастрофи хворий 1 місяць у стаціонарі та 2 місяці амбулаторно лікувався. Через 1,5 місяця стан його погіршився і в тяжкому стані він поступив в стаціонар, де лікувався 2 місяці. Яка подальша тактика ведення пацієнта?

A. Переведення на загальну інвалідність

- B. Продовжити лікування в амбулаторних умовах
- C. Переведення на інвалідність по трудовому каліцтву
- D. Вихід на роботу
- E. Організація стаціонара на дому

386. Пацієнту 3 роки. Відвідує ДДЗ. Скарги на кашель, нежить, світлобоязнь, слинотечу, підвищення температури тіла до 38°C, кволість. Хворіє третю добу. Об'єктивно: на слизовій щік проти малих кутніх зубів дрібні плями розміром з макове зерно, оточені червоним вінчиком. Дитині був встановлений діагноз: "Кір". Визначте, в якому періоді хвороби перебуває дитина на підставі перерахованих проблем?

A. Катаральний період

- B. Інкубаційний період
- C. Період висипу
- D. Період пігментації
- E. Період видужування

387. Новонароджена дівчинка народилася від других пологів при терміні гестації 22 тижні, з масою тіла 1000 г, довжиною тіла - 40 см. Згідно листка лікарських призначень з метою профілактики рахіту планується введення наступного препарату:

A. Відехол

- B. Супрастин
- C. Феррокаль
- D. Афлубін
- E. Софрадекс

388. Ви досліджували захворюваність медичних сестер на гострі респіраторні вірусні інфекції. З висновками необхідно ознайомити медичний персонал відділення. Що необхідно написати?

A. Резюме

B. Тези

C. Анотація

D. Конспект

E. Виписки

389. У хворой на дифузно-токсичний зоб збільшена щитоподібна залоза не лише пальпується, а й помітна при ковтанні. Вкажіть ступінь збільшення щитоподібної залози:

A. II ступінь

B. III ступінь

C. I ступінь

D. V ступінь

E. IV ступінь

390. У новонародженої доношеної дитини виражена інтоксикація, на шкірі з'явилися великі пухирі (2-3 см у діаметрі), які швидко збільшуються. Пухирі з каламутним вмістом, деякі лопаються, залишаючи ерозивну поверхню. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

A. Пухирчатка новонароджених

B. Везикулопустульоз

C. Псевдофурункульоз

D. Фурункульоз

E. Герпес-інфекція

391. В дитячий стаціонар поступила дитина 1 рік 2 міс., з генералізованими судомами та ознаками рахіту. Після надання допомоги було проведено дослідження на вміст кальцію у крові. Показник кальцію - 1,7 ммоль/л. Додаткове обстеження вказує на діагноз:

A. Спазмофілія. Судоми

B. Спазмофілія, ларингоспазм

C. Рахіт, гострий період. Судоми

D. Гіпервітаміноз

E. Судоми

F. Рахіт залишкових явищ

392. У дитини 10-ти місяців з масою тіла 8 кг, декілька разів повторювався карпопедальний спазм, раптово відбувся напад загальних судом. Необхідно ввести протисудомний препарат у дозі:

A. 0,5% сибазон 0,8 мл

B. 0,5% сибазон 0,5 мл

C. 0,5% седуксен 0,5 мл

D. 0,5% діазепам 2 мл

E. 0,5% діазепам 0,2 мл

393. Оральна регідратація проводиться дитині з кишковим токсикозом та вододєфіцитним ексикозом. Рідину у вигляді 5% розчину глюкози, регідрону, ораліту дають дитині пити:

A. По 10 мл кожні 10-15 хвилин

B. По 20 мл кожну годину

C. По 10 мл через 30 хвилин

- D. По 50 мл кожну годину
- E. По 50 мл через 2 години

394. Дівчинка 6-ти років скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль та біль у животі. На нижніх кінцівках над поверхнею м'язів-розгиначів симетрично з'явилися елементи геморагічного висипу. У дитини стан тяжкий, що передбачає введення антикоагулянтів прямої дії, а саме:

A. Гепарин

- B. Контрикал
- C. Дипіридамол
- D. Аскорутин
- E. Вольтарен

395. Новонародженій дитині, яка перебуває у відділенні патології новонароджених з діагнозом вродженої пневмонії, внутрішньовенно 2 рази на добу вводиться антибіотик пеніцилінового ряду, захищений клавулановою кислотою, а саме:

A. Амоксиклав

- B. Амоксицилін
- C. Ампіцилін
- D. Ампіокс
- E. Амікацин

396. Виконуючи медсестринське обстеження пацієнта, медична сестра повинна пам'ятати, що загальний огляд хворого починають з визначення:

A. Загального стану

- B. Свідомості
- C. Положення в ліжку
- D. Конституції
- E. Кольору шкіри

397. Пацієнта турбує біль, який супроводжується шумом тертя перикарда, виникає одночасно з підвищенням температури тіла, без іррадіації і зменшується при положенні тіла з нахилом вперед. Такий біль характерний для:

A. Гострого сухого перикардиту

- B. Тромбоемболії легеневої артерії
- C. Кардіосклерозу
- D. Спонтанного пневмотораксу
- E. Міозиту

398. У хворого порушення серцевого ритму, при якому протягом усього серцевого циклу визначають хаотичне збудження та скорочення м'язових волокон передсердь. Для якого стану це характерно?

A. Миготлива аритмія

- B. Пароксизмальна тахікардія
- C. Синусова тахікардія
- D. Синусова аритмія
- E. Атріовентрикулярна блокада

399. До медичної сестри приймального відділення звернувся пацієнт, який протягом 5-ти років

страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. 6 годин тому виникли гострий біль у животі, нудота, різка слабкість. Об'єктивно: блідий, АТ100/60 мм рт.ст., Рс- 96/хв. Язик сухий, живіт дошкоподібний. Симптоми подразнення очеревини на всьому протязі позитивні. Назвіть допоміжний метод обстеження органів черевної порожнини, який необхідно провести для діагностики захворювання:

A. Оглядова рентгенографія

В. УЗД

С. Іригоскопія

Д. Лапароцентез

Е. Колоноскопія

400. Ви обстежуєте пацієнта 42-х років, якого доставлено до травматологічного відділення після ДТП. Пацієнт загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. Частота дихання - 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле. У верхній третині стегна відчувається крепітація та патологічна рухливість. Рс- 112/хв., АТ80/45 мм рт.ст. Стан пацієнта відповідає:

A. Шок II ступеня

В. Шок I ступеня

С. Шок IV ступеня

Д. Шок III ступеня

Е. Передагонія

401. Сімейна медсестра викликана до 4річного хлопчика, який при купанні протягом 4-х хвилин знаходився під водою. Відсутній пульс на сонній артерії та дихання, виражений ціаноз шкірних покривів. З чого слід почати дії?

A. Видалити воду з верхніх дихальних шляхів

В. Викликати швидку допомогу

С. Провести масаж серця

Д. Дати вдихнути нашатирний спирт

Е. Заспокоїти матір

402. В амбулаторію сімейного лікаря звернулася жінка зі скаргами на біль у животі, нудоту, блювання. При обстеженні позитивний симптом Воскресенського, Ровзінга, Щоткіна. Яку патологію слід запідозрити?

A. Гострий апендицит

В. Гострий панкреатит

С. Гострий холецистит

Д. Жовчнокам'яна хвороба

Е. Хронічний панкреатит

403. Хворий 65-ти років, який страждає протягом 10-ти років на хронічний ларингіт, скаржиться на зміну голосу, охриплість, біль. За останні два місяці схуд на 10 кг. Це патологія характерна для такого стану пацієнта:

A. Рак гортані

В. Рак стравоходу

С. Рак щитоподібної залози

Д. Зоб ендемічний

Е. Рак шлунка

404. У пацієнта 45-ти років побутова рана на лівій гомілці, отримана 2 дні тому. В ділянці рани

виявляється набряк, почервоніння, підвищення температури тканини, посилення болю, порушення функції пошкодженої кінцівки. Рана знаходиться за класифікацією M.I. Кузіна і Б.М. Костюченко в фазі:

- A. Фаза запалення, період судинних змін
- B. Фаза запалення, період очищення рани
- C. Фаза регенерації і формування грануляцій
- D. Фаза дегідратації
- E. Фаза запалення, період нагноєння рани

405. Ви - медична сестра дитячого пульмонологічного відділення. На лікуванні знаходиться дитина 10-ти років з бронхіальною астмою. Приступів ядухи не спостерігається. Здійснюючи медсестринський процес в період між приступами ядухи необхідно проводити терапію протизапальними та протиалергічними препаратами. Виберіть необхідний препарат:

- A. Інтал
- B. Серетид
- C. Сальбутамол
- D. Димедрол
- E. Беротек

406. Дитині 7 років. Скарги на біль під час ковтання, високу температуру тіла. Загальний стан порушений. У зіві - на почервонілій слизовій оболонці інфільтрованих мигдаликів у ділянці лакун жовтобілого кольору обмежені нашарування. Перераховані симптоми вказують на:

- A. Лакунарна ангіна
- B. Фолікулярна ангіна
- C. Катаральна ангіна
- D. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- E. Дифтерія зівя

407. Впродовж двох тижнів дитину 3-х років турбував сухий кашель, незначні виділення з носа. Стан дитини погіршився, кашель набув спазматичного характеру. Напади кашлю закінчуються блюванням. Запідозрено кашлюк. Критеріями легкої форми захворювання є:

- A. Частота нападів кашлю - до 15 на добу, репризів до 5
- B. Частота нападів кашлю - до 25 на добу, репризів до 10
- C. Частота нападів кашлю - більше 25 на добу, репризів більше 10
- D. Напади закінчуються блюванням, крововиливом в слизові, носові кровотечі
- E. Частота нападів кашлю - 1-2 на добу, репризів немає

408. Диспансерні контингенти населення підлягають періодичним профілактичним оглядам, програми яких передбачають такі дослідження: аналіз крові, аналіз сечі на глюкозу, аналіз сечі на білок, флюорографію. Назвіть віковий термін проведення даної програми?

- A. З 12 років 1 раз на 2 роки
- B. З 7 років 1 раз на 2 роки
- C. З 12 років 1 раз на 1 рік
- D. З 14 років 1 раз на 2 роки
- E. З 14 років 2 рази на 1 рік

409. Документ, який засвідчує право на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного періоду за умови виконання вказаних умов - це:

- A. Ліцензія

- В. Сертифікат
- С. Патент
- Д. Дозвіл
- Е. Довідка

410. На який максимальний термін при безперервному захворюванні надається лікарняний лист хворому, що лікується в медичному закладі до визначення йому інвалідності?

А. 4 місяці

- В. 1 місяць
- С. 2 місяці
- Д. 3 місяці
- Е. 5 місяців

411. Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла 52 см. Вагітність і пологи фізіологічні. В перший і другий день сечовипускання було 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Сечокислий інфаркт нирок

- В. Статевий криз
- С. Пієлонефрит
- Д. Гломерулонефрит
- Е. Вульвовагініт

412. До хірургічного кабінету поліклініки звернувся пацієнт 39-ти років зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну, підвищення температури тіла до 39,5°С. На задній поверхні шиї в ділянці потилиці - інфільтрат червоного кольору, в центрі якого кілька гнійних стрижнів. Який найбільш імовірний діагноз?

А. Карбункул

- В. Фурункул
- С. Флегмона
- Д. Абсцес
- Е. Лімфангіт

413. В хірургічному відділенні знаходиться хворий 36-ти років у важкому стані. Скарги на загальну слабкість, безсоння, надсадний кашель. Об'єктивно температура тіла - 39,7°С, тахіпное. На 9 добу у хворого на фоні частого кашлю виділилось близько 600 мл гнійного харкотиння. Стан пацієнта дещо покращився. Про яке захворювання йдеться?

А. Абсцес легень

- В. Пневмонія
- С. Плеврит
- Д. Емпієма плеври
- Е. Туберкульоз легень

414. Після закінчення медичного коледжу Ви влаштувались на роботу в хірургічне відділення на посаду операційної медсестри. Вкажіть антисептичний розчин для передопераційної обробки рук за методом Спасокукоцького-Кочергіна:

А. 0,5% розчин аміаку

- В. 3% розчин перекису водню
- С. 85% розчин мурашиної кислоти

D. 1% розчин хлоргексидину біглюконату

E. 5% розчин діюциду

415. Пацієнтка 48-ми років прооперована з приводу перфоративної виразки шлунка. З метою профілактики кровотечі на ділянку післяопераційної рани медична сестра поклала міхур з льодом. Вкажіть максимальний час, протягом якого можна тримати накладений міхур із льодом не знімаючи:

A. 2-3 години

B. 1-2 години

C. 3-4 години

D. 4-5 годин

E. 5-6 годин

416. На місце маніпуляційної медичної сестри опікового відділення прийнято нову співробітницю. Старша медична сестра зазначеного відділення ознайомила нову працівницю з коротким письмовим викладом її основних прав та обов'язків на робочому місці. Визначте вид даного документу:

A. Посадова інструкція

B. Розпорядження

C. Наказ

D. Пояснювальна записка

E. Доповідна записка

417. Причинами смертності населення є: 1) хвороби системи кровообігу, 2) травми та отруєння, 3) новоутворення, 4) СНІД, 5) хвороби органів дихання. Яка з перерахованих причин займає перше рангове місце в структурі причин смерті населення розвинених країн?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

418. За результатами акредитації обласній клінічній лікарні присвоєно вищу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?

A. 92-100

B. 81-91

C. 75-80

D. 74-70

E. 69-50

419. На сільській лікарській дільниці проводяться флюорографічні обстеження населення. До якого виду медичного огляду належать ці обстеження?

A. Цільовий

B. Попередній

C. Періодичний

D. Комплексний

E. Миттєвий

420. Ви - медсестра кардіологічного відділення. Скільки разів на день слід проводити

провітрювання палат?

A. Не менше 4 разів

B. Не менше 1 разу

C. Не менше 2 разів

D. Не менше 3 разів

E. Не менше 1-2 разів

421. Ви - медична сестра відділення реанімації. Як часто слід змінювати халати, шапочки і маски?

A. Щоденно

B. 2 рази на день

C. Щотижня

D. 2 рази на тиждень

E. 2 рази на місяць

422. Ви - старша медична сестра приймального відділення. Як часто обстежується медичний персонал відділення на носійство патогенного стафілокока?

A. 1 раз в квартал

B. 1 раз в тиждень

C. 1 раз в місяць

D. 2 рази в квартал

E. 1 раз на рік

423. Ви - старша медична сестра пологового будинку. Згідно якого Наказу здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?

A. 234

B. 620

C. 503

D. 408

E. 167

424. При обстеженні пацієнта на хронічний гепатит виявлено ендокринні порушення - гінекомастія, атрофія яєчок, випадіння волосся в пахвових ямках, на лобку. Для якого синдрому це характерно?

A. Печінково-клітинної недостатності

B. Біліарної дискінезії

C. Імунного запалення

D. Демпінг-синдрому

E. Астеновегетативного

425. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця проживання батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до РАЦСу для реєстрації народження дитини?

A. Медичне свідоцтво про народження дитини

B. Довідка пологового будинку про народження дитини

C. Журнал запису пологів в стаціонарі

D. Свідоцтво про народження дитини

E. Карта розвитку новонародженого

426. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. За допомогою якого показника можна охарактеризувати дану ситуацію?

A. Перинатальна смертність

B. Загальна смертність

C. Народжуваність

D. Смертність при народженні

E. Шлюбна плідність

427. Для аналізу діяльності стаціонару головний лікар запросив статистичні дані про частоту госпіталізованої захворюваності населення району. На основі якого статистичного документу розраховані ці дані?

A. Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару

B. Листок руху хворих по стаціонару

C. Історія хвороби

D. Щоденник роботи лікаря

E. Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

428. У дитини після обстеження було встановлено діагноз: епідемічний паротит. Який документ слід заповнити для обліку даного захворювання?

A. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання

B. Медична карта амбулаторного хворого

C. Контрольна карта диспансерного спостереження

D. Талон амбулаторного пацієнта

E. Медична карта стаціонарного хворого

429. До якого рівня належить медична допомога, що передбачає консультацію лікаря загальної практики, діагностику та лікування основних найбільш поширених захворювань, направлення пацієнта для надання спеціалізованої допомоги, проведення профілактичних заходів?

A. Первинний рівень надання медичної допомоги

B. Вторинний рівень надання медичної допомоги

C. Третинний рівень надання медичної допомоги

D. Четвертинний рівень надання медичної допомоги

430. Ви - медична сестра амбулаторії загальної практики сімейної медицини. До Вас звернулися за довідкою про тимчасову непрацездатність. В яких випадках і кому видається довідка встановленої форми?

A. Учні всіх категорій, студентам вузів і технікумів

B. В зв'язку з вагітністю та пологами

C. В зв'язку з протезуванням в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства

D. При направленні на санаторно-курортне лікування

E. В зв'язку з захворюванням працівника

431. При обробці поля в шлунок тракториста потрапили фосфорорганічні сполуки. Які речовини необхідно використати медичній сестрі при наданні першої допомоги постраждалому під час промивання шлунку для інактивації отрути в шлунку?

A. 2% розчин двовуглекислої соди, активоване вугілля

B. Переварена вода

C. Розчин фурациліну

D. Рослинна олія

E. Молоко

432. Для покращення надання медичної допомоги дітям у загальноосвітніх школах передбачена посада медичної сестри. Яка кількість учнів школи припадає на одну посаду медсестри?

A. 700 учнів

B. 500 учнів

C. 600 учнів

D. 800 учнів

E. 900 учнів

433. Старша медична сестра провела інструктаж з медсестрами про терміни придатності лікарських засобів з обмеженим строком. Такі засоби можуть зберігатися:

A. До 3-х років

B. Понад 3-х років

C. До 1 року

D. До 3-х місяців

E. До 1 місяця

434. Хворий лікується в умовах домашнього стаціонару з приводу позагоспітальної пневмонії. На 7-му добу стан погіршився: з'явився біль у грудній клітці, який посилюється при сухому кашлі та русі. Яке найбільш ймовірне ускладнення?

A. Плеврит

B. Туберкульоз легенів

C. Гострий бронхіт

D. Абсцес легенів

E. Бронхоектатична хвороба

435. Рідкі лікарські засоби на своїй тарі мають етикетки. Як називається різновид етикеток, які мають особливу форму і наклеюються на шийку пляшки з різними рідинами?

A. Кольєретки

B. Бірки

C. Вкладиші

D. Контрольні стрічки

E. Ярлики

436. Ткаля із тривалим стажем роботи скаржиться на кашель, задишку, періодичні болі в грудній клітині. Назвіть професійне захворювання, яке виникає при тривалому вдиханні пилу бавовни:

A. Бісиноз

B. Сидероз

C. Антракоз

D. Азбестоз

E. Силікоз

437. Медична сестра-бакалавр аналізує план лікування для хворого з забоєм головного мозку. За призначенням лікаря вона повинна приготувати 40% розчин глюкози, 25% розчин сульфату магнію, діуретичні засоби. З якою метою призначаються ці лікарські засоби?

A. Дегідратація мозку

B. Підвищення імунітету

C. Поповнення ОЦК

D. Дезінтоксикація організму

E. Зупинка кровотечі

438. У хлопчика 2-х років захворювання почалося з незначних катаральний явищ з боку верхніх дихальних шляхів, підвищення температури тіла до 37,8^оС. На 10-й день хвороби кашель набув нападоподібного характеру, іноді супроводжується блюванням. Температура тіла - нормальна. У загальному аналізі крові відмічається лейкоцитоз, лімфоцитоз, нормальна швидкість осідання еритроцитів. Про яке захворювання слід подумати?

A. Кашлюк

B. Пневмонія

C. Бронхіальна астма

D. Плеврит

E. ГРВІ

439. При проведенні профілактичного огляду дитини 11-ти місяців у сімейній амбулаторії медсестра звернула увагу на блідість шкіри та слизових оболонок. З анамнезу стало відомо, що дитина виключно на грудному вигодовуванні, прикормів не отримує. До якого лабораторного дослідження треба підготувати дитину для встановлення діагнозу?

A. Загальний аналіз крові

B. Загальний аналіз сечі

C. Копрограма

D. Печінкові проби

E. Кров на ревмокомплекс

440. Ви - дитяча медсестра перинатального центру. Якою вакциною Ви будете проводити щеплення недоношеній новонародженій дитині з масою 2100 г на 3-й день життя?

A. БЦЖ-М

B. БЦЖ

C. "Інжерікс"

D. АКДП

E. АаКДП

441. На 2-й день життя у новонародженої дитини шкіра пожовтіла. Рівень загального білірубіну складає 300 мкмоль/л за рахунок непрямой фракції. Група крові дитини - B (III) Rh(+), у матері - кров групи O(I) Rh(+). Який стан найбільш імовірний у даному випадку?

A. Гемолітична хвороба новонароджених за системою АВ0

B. Гемолітична хвороба новонароджених за резус-фактором

C. Вроджений гепатит

D. Атрезія жовчовивідних протоків

E. Кон'югаційна жовтяниця

442. У дитячій поліклініці було проведено статистичне дослідження захворюваності дітей, які звернулися до дитячої поліклініки протягом року. Розподіл досліджуваної групи проводили за віком та статтю. Який вид таблиць доцільно використати для зведення отриманих даних?

A. Комбінаційна

B. Проста

- С. Складна
- D. Групова
- Е. Комбінована

443. Пацієнтка 50-ти років звернулась в лікувальний заклад зі скаргами на підвищення температури тіла, втрату апетиту, артралгію, біль в серці, еритематозну висипку на обличчі у вигляді "метелика". Які лабораторні показники є найбільш діагностично інформативні?

A. LE-клітини

- В. ШОЕ
- С. Гемоглобін
- D. С-реактивний білок
- Е. Ревматоїдний фактор

444. У пацієнта проктологічного відділення 34-х років виявлено скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з калом протягом одного тижня. Виберіть метод дослідження, інформативний для встановлення діагнозу:

A. Ректороманоскопія

- В. Рентгеноскопія
- С. Ультразвукове обстеження
- D. Гастроскопія
- Е. Фіброгастроезофагоскопія

445. Під час клінічного обстеження пацієнта 63-х років виявлено: стан важкий, шкіра бліда, Ps-125Vхв., АТ- 80V55 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений. При пальпації живіт м'який, болючий в навколупупковій ділянці. Позитивний симптом Валя, шум плеску. Який попередній діагноз?

A. Кишкова непрохідність

- В. Гострий холецистит
- С. Гострий панкреатит
- D. Ниркова колька
- Е. Гострий апендицит

446. В приймальне відділення поступив пацієнт 76-ти років зі скаргами на утруднене сечовиділення. Він відмітив, що сеча стала виділятися тонким струменем, іноді краплями. Почало турбувати часте сечовипускання вночі. Який попередній діагноз?

A. Аденома передміхурової залози

- В. Гострий простатит
- С. Хронічний простатит
- D. Туберкульоз сечового міхура
- Е. Сечокам'яна хвороба

447. Ви проводите клінічне обстеження пацієнта 46-ти років, який поступив у торакальне відділення з ножовим пораненням грудної клітки, ускладненим ушкодженням легенів. Здійснена операція - пульмонектомія, призначено дренирування плевральної порожнини. Виберіть, який із дренажів плевральної порожнини є пасивним:

A. Дренаж за методом Бюлау

- В. Дренаж за допомогою 3-х ампульної системи
- С. Дренаж за допомогою електровідсмоктувача
- D. Дренаж за допомогою водоструминного пристрою
- Е. Дренаж за допомогою гумового балончика

448. В травматологічне відділення лікарні доставлено пацієнта 20-ти років з проникаючим пораненням грудної клітки. Під час клінічного обстеження в VI міжребер'ї виявлено різану рану розміром 2,5x1 см, з якої витікає піниста кров, а під час дихання чути свист повітря. Який попередній діагноз?

A. Відкритий пневмоторакс

- B. Клапанний пневмоторакс
- C. Закритий пневмоторакс
- D. Підшкірна емфізема
- E. Легенева кровотеча

449. В приймальне відділення звернувся хворий зі скаргами на головний біль, втрату апетиту, підвищення температури тіла до 39°C, біль в ділянці лівого стегна. Хворіє протягом 10 днів. Об'єктивно: в середній третині правого стегна - набряк м'яких тканин, гіперемія, місцеве підвищення температури. При рентгенологічному дослідженні виявлено відшарування окістя. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Остеомієліт

- B. Флегмона
- C. Панарицій
- D. Бешиха
- E. Забій м'яких тканин

450. Медична сестра-статист проводить розрахунки для проведення статистичного дослідження в лікувальному закладі. Скільки етапів передбачає проведення статистичного дослідження?

A. 4 етапи

- B. 5 етапів
- C. 3 етапи
- D. 2 етапи
- E. 1 етап

451. У дитини 5-ти місяців наявні тотальний ціаноз шкіри та слизових оболонок, поліцитемія (кількість еритроцитів - 5,7 Т/л), конфігурація серця при рентгенологічному дослідженні у вигляді "дерев'яного черевичка". Для якої вади серця найбільш характерні ці ознаки?

A. Тетради Фалло

- B. Дефект міжпередсердної перегородки
- C. Дефект міжшлуночкової перегородки
- D. Відкрита артеріальна протока
- E. Коарктація аорти

452. Дівчинка, яка хворіє на епідемічний паротит, скаржиться на головний біль, шум та біль у вухах, при відкриванні рота, припухлість привушної залози. Який симптом виявиться у ротовій порожнині?

A. Симптом Мурсона

- B. Плями Філатова-Коплика-Бельського
- C. Енантема на твердому піднебінні
- D. "Географічний язик"
- E. "Малиновий язик"

453. У медичному закладі складений документ, у якому зроблено розпис грошових прибутків і

витрат закладу на майбутній фінансовий рік. При цьому були вказані джерела дохідної частини й статті витрат грошових засобів із розрахунками. Який фінансовий документ складено у даному медичному закладі?

A. Кошторис закладу

B. Бюджет закладу

C. Фінансовий звіт

D. План зростання виробництва

E. Фінансовий запит

454. Охорона здоров'я фінансується з різних джерел. Яке основне джерело фінансування галузі охорони здоров'я при страховій формі фінансування?

A. За рахунок внесків робітників, підприємців і субсидій держави

B. За рахунок державного бюджету

C. За рахунок оплати медичних послуг за власні кошти пацієнтів

D. За рахунок міжбюджетних трансферів

E. За рахунок гуманітарної допомоги

455. До медсестри сімейного лікаря звернулася пацієнтка із скаргами на сильний біль у потилиці, мерехтіння мушок перед очима, запаморочення, нудоту, що виникли після стресової ситуації. Пацієнтка збуджена, обличчя гіперемоване, Рс- 94\хв., АТ- 190\100 мм рт.ст. Який лікарський препарат потрібний для надання невідкладної допомоги?

A. Дибазол

B. Кофеїн

C. Строфантин

D. Анальгін

E. Дицинон

456. До приймального відділення госпіталізовано пацієнта із скаргами на загальну слабкість, запаморочення, шум у вухах, блювання "кавовою гущею", випорожнення дьогтеподібного характеру. В анамнезі - виразкова хвороба шлунка. Яке ускладнення запідозрить медсестра у пацієнта?

A. Шлункова кровотеча

B. Перфорація виразки

C. Пенетрація виразки

D. Легенева кровотеча

E. Стравохідна кровотеча

457. У приймальне відділення доставлено пацієнта зі скаргами на набряк губ, обличчя, повік, носа, які виникли після укусу бджоли. Об'єктивно: набрякле обличчя, АТ- 110\70 мм рт.ст. Рс- 74\хв. Який стан виник у пацієнта?

A. Набряк Квінке

B. Кропив'янка

C. Анафілактичний шок

D. Гіпотиреоз

458. Медсестра працює в перев'язувальному кабінеті хірургічного відділення. Лікар призначив пацієнту з гнійною ранною застосувати протеолітичні ферменти під час наступної перев'язки. Назвіть мету їх застосування:

A. Лізис некротичних тканин

- В. Знеболювання
- С. Поліпшення кровообігу тканин
- Д. Утворення лінійного рубця
- Е. Зменшення температури тіла

459. Під час бійки постраждалий 33-х років отримав відкрите проникаюче поранення передньої черевної стінки з випадінням петель кишок на зовні. Що з пацієнтом?

- А. Евентрація**
- В. Перфорація
- С. Пенетрація
- Д. Малігнізація
- Е. Ексудація

460. Вас викликають в приймальне відділення з метою допомогти приймати поранених після пожежі. Потерпілий 28-ми років, отримав опік полум'ям передньої поверхні обох ніг, грудей і живота. Визначте площу опікової поверхні:

- А. 36%**
- В. 56%
- С. 42%
- Д. 25%
- Е. 18%

461. Існує декілька моделей медичного страхування. Як називається модель, яка базується на принципах універсальності доступу та безкоштовності медичної допомоги на основних етапах курсу лікування?

- А. Модель Беверіджа**
- В. Модель Семашка
- С. Модель Бісмарка
- Д. Приватна модель
- Е. Фінансова модель

462. Ви - старша медична сестра терапевтичного відділення. У вашому розпорядженні є гумові вироби. При якій вологості їх слід зберігати?

- А. Вологість не менше 65%**
- В. Вологість не менше 30%
- С. Вологість не менше 45%
- Д. У прохолодному місці, вологість 25%
- Е. Вологість не менше 50%

463. Медична сестра-бакалавр після закінчення медичного коледжу отримала направлення на роботу. Протягом якого терміну вона повинна приступити до роботи?

- А. У термін, визначений у направленні**
- В. 20 календарних днів 12 календарних днів
- С. 7 календарних днів
- Д. 25 календарних днів

464. Медична сестра потребує відпустки за сімейними обставинами. Який термін відпустки без збереження заробітної плати вона може вказати в заяві?

- А. 15 календарних днів**

- В. 5 календарних днів
- С. 3 календарних дня
- Д. Два тижні
- Е. 10 календарних днів

465. У місті проведено наукове дослідження щодо вивчення патологічної ураженості школярів хворобами серцевосудинної системи. Що буде одиницею спостереження в такому дослідженні?

- А. Кожен випадок хвороби серцевосудинної системи, виявлений на медичному огляді**
- В. Кожен школяр міста, що хворів протягом року
- С. Кожен випадок захворювання серцевосудинної системи за даними звертань за медичною допомогою
- Д. Кожен школяр міста з хворобою серцево-судинної системи
- Е. Кожен школяр міста з будь-яким захворюванням

466. Ціна має багато функцій. Яка із функцій ціни мотивує підвищення ефективності господарювання, забезпечення необхідної прибутковості?

- А. Стимулююча**
- В. Обліково-вимірвальна
- С. Розподільча
- Д. Регулююча
- Е. Порівняльна

467. В приймальне відділення привезли хворого після автоаварії. Хворий без свідомості, АТ-90/60 мм рт.ст., Рс- 97/хв., із носа і вух витікають кров та ліквор. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- А. Перелом основи черепа**
- В. Перелом склепіння черепа
- С. Перелом лицевої частини черепа
- Д. Струс мозку
- Е. Субдуральна гематома

468. Хворий 27-ми років упав на витягнуту праву верхню кінцівку. Скаржиться на біль, неможливість активних і різке обмеження пасивних рухів у плечовому суглобі. Під час огляду: правий плечовий суглоб деформований, його контури згладжені. Кінцівка фіксована у вимушеному положенні (відведена вбік). Ушкоджене плече довше. На місці головки правого плеча - западина. Поставте діагноз:

- А. Вивих плеча**
- В. Перелом плечової кістки
- С. Розрив зв'язок плечового суглоба
- Д. Розрив двоголового м'яза
- Е. Забій плеча

469. У приймальному відділенні інфекційної лікарні дитина віком 2-х років, якій не були проведені профілактичні щеплення. З анамнезу відомо, що захворювання почалося з підвищення температури до 39°C, головного болю, нудоти, блювання, болю у ногах та спині. На ранок не змогла стати на ніжки. Про яке захворювання можна думати?

- А. Поліомієліт**
- В. Вірусний гепатит В
- С. Краснуха

D. Кір
E. Скарлатина

470. У здорової новонародженої дитини виявлені наступні показники периферичної крові: еритроцити - $6,0 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - $150 \text{ г}/\text{л}$, лейкоцити - $15 \cdot 10^9/\text{л}$, нейтрофіли - 45%, лімфоцити - 43%. Для якого віку характерні такі показники периферичної крові?

A. П'ятий день життя

B. Перший день життя
C. Десятий день життя
D. Двадцятий день життя
E. Тридцятий день життя

471. Дівчинка 7-ми років хворіє 3 дні, скаржиться на періодичний ниючий біль в поперековій ділянці, часте болюче сечовипускання. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 16 в полі зору. Яку патологію сечовивідної системи можна запідозрити в даному випадку?

A. Інфекція сечовивідних шляхів

B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Хронічний пієлонефрит
E. Хронічна ниркова недостатність

472. Дитині 8-м років. Під час профілактичного огляду медична сестрабакалавр виявила асиметрію кутів лопаток, рівня плечей, трикутників талії та S-подібне викривлення грудного відділу хребта. Клінічні симптоми дозволяють запідозрити:

A. Сколіоз грудного відділу хребта

B. Кіфоз грудного відділу хребта
C. Лордоз грудного відділу хребта
D. Хондродистрофію
E. Залишкові явища перенесеного рахіту

473. При огляді у приймальному відділенні непритомна дівчинка 11-ти років. Зіниці звужені. Наявні ознаки зневоднення, дихання типу Куссмауля, різкий запах ацетону з рота. Тахікардія - $98/\text{хв.}$, артеріальний тиск знижений. Глюкоза крові - $29 \text{ ммоль}/\text{л}$. Який стан найбільш імовірний у дитини?

A. Гіперглікемічна кома

B. Гіпоглікемічна кома
C. Гіпоксична кома
D. Інфекційно-токсичний шок
E. Гіповолемічний шок

474. Хворий 45-ти років на виробництві отримав пошкодження м'яких тканин лівого стегна. На передній поверхні стегна рана, краї якої зазубрені, нерівні, зі згустками крові. З рани продовжує витікати кров. Який оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі може застосувати медична сестра?

A. Стискаюча пов'язка на рану

B. Пальцеве притиснення артерії
C. Максимальне згинання кінцівки
D. Джгут вище місця поранення
E. Джгут нижче місця поранення

475. Хворий 64-х років скаржиться на кашель з відходженням харкотиння, іноді кровохаркання. Палить 30-ть років. Схуд на 8 кг за останні 3 місяці. Рентгенологічно в середній частці правої легені порожнинне утворення, справа збільшені прикореневі лімфовузли. Яке дослідження є найбільш інформативним?

A. Бронхоскопія з біопсією

B. Загальний аналіз крові

C. Спірографія

D. Бронхографія

E. Біохімічний аналіз крові

476. У чоловіка 23-х років через три тижні після ангіни з'явились набряки обличчя, гомілок, відчуття дискомфорту у попереку, підвищення АТ до 180/100 мм рт.ст. В сечі протеїнурия - 0,99 г/л, вилужені еритроцити 60-80 в полі зору, циліндри. Це дозволяє запідозрити захворювання:

A. Гострий гломерулонефрит

B. Гіпертонічна хвороба

C. Гострий пієлонефрит

D. Сечокам'яна хвороба

E. Рак нирки

477. До приймального відділення доставили хвору зі скаргами на слабкість, головний біль, біль у ділянці серця. При обстеженні: екзофтальм, гіперемія шкіри, тремтіння кінцівок, температура тіла - 38,2°C, пульс - 150/хв., АТ- 165/90 мм рт.ст. Яке захворювання слід запідозрити?

A. Тиреотоксикоз

B. Гіпертонічна хвороба

C. Інфаркт міокарда

D. Гіпотиреоз

478. Хто має право видати документ працюючій особі, що засвідчує тимчасову непрацездатність, на період лікування в стаціонарі?

A. Лікуючий лікар разом із завідуючим відділенням

B. Лікуючий лікар

C. Завідувач відділенням

D. Головний лікар або його заступник (начмед)

E. Лікарська консультативна комісія

479. Хворий 24-х років внаслідок автодорожньої аварії отримав черепно-мозкову травму і втратив свідомість. При обстеженні хворого на місці аварії шкіра бліда, з ціанотичним відтінком, пульс 140/хв., дихальні рухи грудної клітки відсутні, реакція зіниць на світло збережена. Визначити обсяг первинної допомоги:

A. Усунення западання язика, надання лежачого положення на правому боці, при необхідності - штучна вентиляція легень

B. Термінова госпіталізація до стаціонару

C. Штучна вентиляція легень потерпілому

D. Масаж грудної клітки

E. Надання хворому напівсидячого положення

480. Хлопчик 9-ти років скаржиться на часте сечовипускання, болі в животі, нудоту, одноразове блювання, підвищення температури тіла до 37,7°C. Хворіє 3 дні. При огляді шкірні покриви бліді, АТ- 105/60 мм рт.ст. Тони серця звучні, діяльність ритмічна, Рс- 100/хв., ЧД-

26\хв. Симптом Пастернацького позитивний зліва. У сечі: питома вага - 1012, білок 0,16 г\л, лейкоц.- 30-50 в п\з, ер.- 3-4 в п\з, бактерії - велика кількість. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Пієлонефрит

B. Цистит

C. Сечокам'яна хвороба

D. Гломерулонефрит

E. Сечокислий інфаркт нирок

481. При оцінці діяльності міського пологового будинку був розрахований статистичний показник за наступною формулою: $((\text{число мертвонароджених} + \text{число дітей, які померли в постнатальний період}) * 1000) / (\text{число дітей, які народилися живими і мертвими})$. Як називається розрахований показник?

A. Перинатальна смертність

B. Малюкова смертність

C. Акушерська смертність

D. Питома вага дітей, які померли в постнатальний період

E. Мертвонароджуваність

482. Жінка 36-ти років народила 1 годину тому. Крововтрата у пологах склала 1 літр. З'явилися шум у голові, потемніння в очах, короткочасна втрата свідомості. Діагностовано гостру судинну недостатність. Що з нижчеперерахованого є характерним для колапсу?

A. Блідість шкіри

B. Глибоке, шумне дихання

C. Високий систолічний тиск

D. Уповільнення пульсу

E. Дифузний ціаноз

483. Хворий скаржиться на стискаючі болі за грудниною з іррадіацією в ліву руку, лопатку, які виникають при фізичному навантаженні, купіруються нітроглицерином протягом 1 хвилини. Об'єктивно: наявних набряків немає. Рс- 72\хв., ритмічний. АТ- 135\90 мм рт.ст. Про яку патологію йдеться?

A. Стенокардія напруження

B. Міжреберна невралгія

C. Дрібновогнищевий (не Q) інфаркт міокарда

D. Крупновогнищевий (Q) інфаркт міокарда

E. Стенокардія спокою

484. Чисельність дитячого населення на педіатричних дільницях дитячої поліклініки становить: дільниця №1 - 800 дітей; дільниця №2 - 590 дітей; дільниця №3 650 дітей; дільниця №4 - 700 дітей; дільниця №5 - 950 дітей. На якій із зазначених педіатричних дільниць кількість дитячого населення відповідає встановленому нормативу?

A. №1

B. №2

C. №3

D. №4

E. №5

485. Робітник ливарного цеху заводу 46-ти років скаржиться на задишку, яка з'являється при незначному фізичному навантаженні, біль в грудній клітці, кашель з невеликою кількістю

слизового харкотиння. Об'єктивно: шкіра бліда, ціаноз губ. Перкуторно - "мозаїчність" звуку. Аускультативно дихання жорстке, над ділянками емфіземи - послаблене. Тони серця приглушені. Яка рентгенологічна картина характерна для цієї стадії захворювання:

A. "Снігова хуртовина"

- B. Вузликові тіні діаметром до 1 мм
- C. Злиття вузликових тіней в конгломерати
- D. Бронхоектази
- E. Підвищення прозорості легень

486. До інституту профзахворювань звернувся пацієнт 63-х років, зі скаргами на інтенсивний біль у кистях рук, який віддає до плечового поясу, головний біль, швидку втомлюваність. Понад 10 років працює бурильником в шахті. Об'єктивно: хворий дратівливий, фаланги пальців рук мають вигляд "барабаних паличок", кисті рук набряклі, ціанотичного кольору, розлади больової чутливості за типом "куртки". Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань, щоб дослідити вібраційну чутливість:

A. Палестезіометрія

- B. Капіляроскопія
- C. Проба на реактивну гіперемію
- D. Холодова проба
- E. Алгезиметрія

487. Робітник 42-х років, що працює на коксохімічному комбінаті, порушив техніку безпеки, увійшов до замкненого приміщення для зберігання бензолу. Після виходу з приміщення відчув себе погано: з'явилося почуття оп'яніння, сонливість, головний біль, нудота, блювання, слабкість у м'язах, порушення ходи. В медпункті знепритомнів. При проведенні обстеження пацієнта медсестра повинна звернути увагу на шкіру, яка набуває кольору:

A. Сіро-синього

- B. Землисто-блілого
- C. Алебастрового
- D. Жовтяничного
- E. Червоного

488. Хворий 45-ти років, працівник по виготовленню електричного кабелю, потрапив у приймальне відділення зі скаргами на солодкий присмак у роті, блювання, пронос, раптове виникнення коліки, пітливість. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 38,9°C, виражена брадикардія, підвищене потовиділення, АТ- 180/90 мм рт.ст. В крові - гіпохромна анемія. Наявність якого основного діагностичного симптому повинна виявити медсестра при проведенні обстеження пацієнта:

A. "Свинцевий колорит"

- B. "Брудних ліктів"
- C. "Шкіра леопарда"
- D. "Свинцевий поліневрит"
- E. "Снігова хуртовина"

489. Пацієнт 60-ти років з діагнозом "ІХС: гострий коронарний синдром". Після порушення ліжкового режиму стан пацієнта погіршився. Посилились болі за грудиною, задишка, загальна слабкість АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., в легенях вислуховуються вологі різнокаліберні хрипи, пацієнт вкритий холодним липким потом. Який з препаратів застосує для корекції

гемодинаміки?

A. Дофамін

B. Корглюкон

C. Ефедрин

D. Строфантин

E. Атропін

490. При обстеженні дитини 4-х років, виявлені наступні проблеми: біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Хворіє другий день. Захворювання почалась гостро з підвищення температури тіла до 38,0. Об'єктивно: гіперемія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібнокрапкова яскраво-червона висипка, яка згущується в природних складках, носогубний трикутник блідий. Яке захворювання можна запідозрити?

A. Скарлатина

B. Вітряна віспа

C. Краснуха

D. Кір

E. Менінгококова інфекція

491. До дитячого відділення поступила дитина 20-ти днів. При проведенні медсестринської оцінки стану пацієнта виявлені проблеми: повторне блювання, частий рідкий стілець, підвищення температури тіла до 39,3. Стан дитини важкий, вона млява, шкірні покриви бліді з сіруватим відтінком, еластичність шкіри знижена, слизові оболонки сухі, велике тім'ячко запале. З очей та правого слухового ходу відмічаються гнійні виділення, з пупкової ранки - серозно-геморагічні виділення. Про що можна подумати?

A. Сепсис новонародженого

B. Омфаліт

C. Ентероколіт

D. Отит

E. Кон'юнктивіт

492. В інфекційному відділенні лікарні старша медична сестра має освітній рівень молодшого спеціаліста, а чергова медсестра - бакалавра. Чергова медсестра прямолінійно заявляє, що на посаді старшої медсестри повинна бути вона, бо має кращі знання та вміння організувати роботу у відділенні. Назрів конфлікт. Який спосіб його розв'язання є у цьому випадку оптимальним?

A. Співпраця

B. Компроміс

C. Пристосування

D. Уникнення

E. Поступка

493. Медсестри кардіологічного відділення А. та М., сестра-господиня С. мають спільне захоплення - вишивання. Старша медична сестра відділення разом з головною медичною сестрою лікарні організували виставку робіт майстринь у холі відділення в день народження Т.Г. Шевченка. Це елемент культури організації. Про який рівень культури йдеться?

A. Рівень світоприйнятних цінностей

B. Смысловий рівень "цінність"

- C. Рівень поверхневої культури
- D. Філософія організації
- E. Дух організації

494. За результатами акредитації районній лікарні присвоєно першу категорію. Який відсоток від максимально можливої кількості балів могла набрати лікарня?

A. 81-91

- B. 92-100
- C. 75-80
- D. 74-70
- E. 69-50

495. З метою покращення обслуговування пацієнтів, вчасного виявлення незадоволених потреб у хірургічному відділенні провели опитування хворих у вигляді анкетування. Що це означає в процесі маркетингового дослідження ринку медичних послуг?

A. Збір первинної інформації

- B. Кабінетні дослідження
- C. Аналіз отриманої інформації
- D. Постановка мети
- E. Висновки

496. До медичного коледжу надійшла гуманітарна допомога з американського госпіталю. Частину обладнання, придатного для практичного використання, коледж передав районній лікарні, певним чином оцінивши. Як називається цей вид ціни?

A. Бюджетна оцінка

- B. Вільна ціна
- C. Договірна ціна
- D. Тарифи з медичного страхування
- E. Прейскурантна ціна

497. В хірургічне відділення поступив хворий 51-го року із скаргами на біль у правій гомілці, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Флебїт

- B. Флеботромбоз
- C. Артеріїт
- D. Тромбофлебїт
- E. Ліфмангоїт

498. Пацієнт госпіталізований з приводу пневмонії. Лікар призначив антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилося відчуття жару, утруднення дихання, став блідим, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

A. Анафілактичний шок

- B. Набряк Квінке
- C. Кропив'янка
- D. Набряк легень
- E. Серцева астма

499. Пацієнтка 26-ти років скаржиться на біль у колінних та ліктьових суглобах "летючого характеру", який підсилюється при рухах, підвищення температури тіла до 37,5°C ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При огляді суглобів відзначається їх припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A. Ревматичний артрит

- B. Туберкульозний артрит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Гонорейний артрит
- E. Деформуючий остеоартроз

500. Хворий скаржиться на напад ядухи з утрудненим видихом, незначну кількість харкотиння, відчуття стиснення в грудях, сухі свистячі хрипи, які чути на відстані. Захворів раптово після вдихання запаху фарби у приміщенні. Об'єктивно: шкіра бліда з ціанотичним відтінком. Грудна клітка у стані глибокоговдиху. В легенях при аускультції на тлі жорсткого дихання сухі свистячі хрипи, ЧД- 29\хв. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Бронхіальна астма

- B. Бронхоектатична хвороба
- C. Пневмонія
- D. Сухий плеврит
- E. Гострий трахеобронхіт

501. Хлопчик 14-ти років страдає на цукровий діабет. Після ін'єкції інсуліну в нього різко погіршився стан. Шкіра бліда, пітливість, мідріаз, підвищення м'язового тону, підвищення сухожильних рефлексів, загальний тремор, судоми, зниження артеріального тиску, тахікардія, розлад психіки, рівень глюкози в крові 1,4 ммоль/л. Визначте захворювання:

A. Гіпоглікемічна кома

- B. Гіперглікемічна кома
- C. Печінкова кома
- D. Уремична кома
- E. Колапс

502. Вкажіть термін першого прикладання новонародженої здорової дитини до грудей матері в пологовому будинку:

A. В перші 30 хвилин після народження

- B. Через 2 години після народження
- C. Через 3 години після народження
- D. Через 6 годин після народження
- E. Через 1 добу після народження

503. Хвора 62-х років скаржиться на пітливість, серцебиття, тремор, почуття голоду. Хворіє на цукровий діабет впродовж 4-х років, приймає 20 ОД інсуліну. Яке додаткове обстеження треба провести першочергово?

A. Аналіз крові на глюкозу

- B. Аналіз сечі на діастазу
- C. Загальний аналіз крові
- D. Аналіз крові на амілазу
- E. Аналіз крові на білірубін

504. Медсестра оглядового кабінету поліклініки разом з лікарем-онкологом бере участь в

огляді пацієнтки 49-ти років. При пальпації лівої молочної залози у верхньозовнішньому квадранті виявили щільне, горбисте утворення, спаяне зі шкірою. Про яке захворювання можна подумати?

A. Рак молочної залози

B. Фіброаденома

C. Ліпома

D. Аденома

E. Кіста молочної залози

505. Яка система охорони здоров'я повинна бути в сучасній Україні, згідно з концепцією МОЗ України?

A. Змішана

B. Державне управління охороною здоров'я

C. Приватна медицина

D. Медичне страхування

E. Централізоване планування

506. Для інтубації трахеї пацієнта використали міорелаксant короткої дії - дитилін. Чим можна усунути залишкову дію цього препарату?

A. Прозерин

B. Налоксон

C. Мезатон

D. Адреналін

E. Атропін

507. В центральній районній лікарні підраховували показники загальної та первинної захворюваності, а також питому вагу кожного класу захворювань. Які графіки можна застосувати для даних показників?

A. Секторні, лінійні

B. Стовпчикові, лінійні

C. Об'ємні, картограма

D. Радіальні, фігурні

E. Картограма, радіальні

508. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія". to- 38,5oПід час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

A. Після нормалізації температури тіла

B. Після одужання від пневмонії

C. Одразу

D. Немає обмежень в часі

E. Натщесерце

509. Через 10-ти днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулась до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, to37,4oC, ЧСС- 98\хв., АТ- 165\98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

A. Нефрологічне

- В. Терапевтичне
- С. Урологічне
- Д. Кардіологічне
- Е. Інфекційне

510. Медична сестра хірургічного відділення спостерігає у хворого 48-ми років післяопераційне тремтіння. Чим зняти даний стан у пацієнта?

А. Інгаляція кисню

- В. Зігрівання хворого
- С. Протисудомні засоби
- Д. Заспокійливі засоби
- Е. Протиаритмічні засоби

511. При розробці тарифів цін нового приватного медичного закладу підприємці стараються забезпечити високий рівень медичної допомоги населенню і перспективність діяльності. Керуючись загальними принципами економіки при розробці ціни послуги економіст закладу враховує:

А. Собівартість, якість і прибуток послуги та податок держави

- В. Незалежну вільну ціну
- С. Податок держави
- Д. Ціни на медичні послуги передових країн
- Е. Ціни споживчого ринку

512. У хлопчика 4-х років погане самопочуття: виражена слабкість, знижена рухова активність, блідість шкірних покривів. На шкірі та слизових оболонках наявні петехії та екхімози, поодинокі крововиливи, безболісні, розташовані асиметрично. АТ- 80/40 мм рт.ст., тахікардія. Вкажіть основну причину наявних проблем дитини:

А. Зниження рівня тромбоцитів

- В. Зниження рівня гемоглобіну
- С. Запалення дрібних судин
- Д. Дефіцит ІХ фактора
- Е. Підвищена швидкість осідання еритроцитів

513. При активному патронажі медична сестра проводить обстеження пацієнтки 32-х років з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

А. Постійна крововтрата

- В. Аутоімунні захворювання крові
- С. Хронічний гепатит
- Д. Вплив іонізуючого опромінення
- Е. Резекція тонкої кишки

514. На другу добу після лапаротомії, яка проводилася у пацієнта 31-го року під ендотрахеальним наркозом, лікар призначив йому перевертатися з боку на бік, проводити дихальну гімнастику, лужні інгаляції. Для запобігання якого ускладнення це потрібно виконувати?

А. Бронхіт

- В. Парез кишечника
- С. Тромбоз

D. Емболія

E. Утруднення виділення з дренажу

515. Які моделі системи охорони здоров'я виділяються на основі класифікації за маркетинговими відносинами суб'єктів даної системи?

A. Ринкова, неринкова, натуральна, модель змішаного типу

B. Класична, плюралістична, страхова, національна, соціалістична

C. Утилітарна, комунотарна, ліберальна

D. Приватна, державна

E. Класична ринкова, страхова утилітарна, національно-ліберальна

516. Медсестра проводить клінічне обстеження пацієнта з синдромом тривалого стиснення. Який з симптомів буде характерним для II періоду даного захворювання?

A. Гостра ниркова недостатність

B. Нормалізація функції нирок

C. Локальні зміни в ушкоджених тканинах

D. Бактеріальні ускладнення

E. Ендогенна інтоксикація

517. Дев'ятимісячній дитині лікар-педіатр проводить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

A. 2000 - 5000 МО

B. 500 - 1000 МО

C. 250 - 500 МО

D. 1000 - 2000 МО

E. 5000 - 10000 МО

518. Медсестра інфекційної лікарні приготувала все необхідне для взяття мазку із ротоглотки на паличку Борде-Жангу. Для підтвердження якого захворювання проводиться дана процедура?

A. Кашлюк

B. Дифтерія

C. Скарлатина

D. Кір

E. Червона висипка

519. Якщо планування - це адміністративний інструмент, що забезпечує раціональну основу для прийняття управлінських рішень, то першим його етапом є:

A. Визначення та аналіз проблеми

B. Визначення цілей програми та головних дій щодо її реалізації

C. Вибір правильного рішення

D. Визначення технічних методів виконання

E. Визначення альтернативних варіантів

520. До Вас звернувся пацієнт з проблемами: біль у ділянці серця після фізичного навантаження з іррадіацією у ліву руку, тривалістю 3 хвилини, серцебиття. Який препарат доцільно використати?

A. Нітрогліцерин

B. Вольтарен

- C. Анальгін
- D. Корвалол
- E. Кетанов

521. Пацієнт хворіє на пневмонію, лікується антибіотиками. На 4-ту добу лікування з'явилися шкірний свербіж, пухирцевий висип на шкірі, слабкість, головний біль, температура - 37,2оС, зниження апетиту. Яка проблема пацієнта буде пріоритетною?

A. Свербіж шкіри

- B. Слабкість
- C. Головний біль
- D. Субфебрильна температура тіла
- E. Зниження апетиту

522. У дівчинки 4-х років t_{0-} 37,4оС, утруднене носове дихання, слизово-серозні виділення з носа, осиплість голосу, грубий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці зміни?

A. Гострий ларингіт

- B. Гострий фарингіт
- C. Гострий трахеїт
- D. Гострий бронхіт
- E. Обструктивний бронхіт

523. Медсестра здійснює догляд за дитиною 10-ти років з гострим гломерулонефритом. Які зміни у сечі є характерними?

A. Еритроцитурія, циліндрурія

- B. Лейкоцитурія, бактеріурія
- C. Підвищення цукру, циліндрурія
- D. Лейкоцитурія, еритроцитурія
- E. Еритроцитурія, бактеріурія

524. Ви досліджували захворюваність медичних сестер на гострі респіраторні вірусні інфекції. З висновками необхідно ознайомити медичний персонал відділення. Що необхідно написати?

A. Резюме

- B. Тези
- C. Анотація
- D. Конспект
- E. Виписки

525. За класифікацією предметів навколишнього середовища щодо ризику поширення внутрішньолікарняної інфекції, предмети, що проникають в органи і порожнини тіла, мають:

A. Високий ризик

- B. Середній ризик
- C. Низький ризик
- D. Помірний ризик
- E. Нульовий ризик

526. У дитини 5-ти років через 3 тижні після ангіни з'явилися ознаки симетричного ураження колінних та ліктьових суглобів. Під час пальпації виявляється набряк та болючість суглобів, шкіра червона, гаряча на дотик. Для якого захворювання ці симптоми

характерні?

A. Ревматична гарячка, поліартрит

B. Ревматична гарячка, ревмокардит

C. Ревматоїдний артрит

D. Деформуючий остеоартроз

E. Ревматична гарячка, мала хорея

527. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природніх складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

A. Везикулопустульоз

B. Пухирчатка новонароджених

C. Псевдофурункульоз

D. Фурункульоз

E. Герпес-інфекція

528. Хвора 30-ти років, оператор машинного доїння, кілька місяців скаржиться на болі у м'язах, суглобах. При огляді виявлено ознаки ураження плечового, ліктьового і кульшового суглобів, фіброзит. Про яке професійне захворювання йдеться?

A. Бруцельоз

B. Токсоплазмоз

C. Туляремія

D. Сап

E. Лімфогранулематоз

529. В лікувальному закладі розроблено бізнес-план, який включає оцінку очікуваних витрат і доходів. В якому із розділів бізнес-плану приводиться прогноз майбутніх доходів та витрат при наданні медичних послуг:

A. Фінансовий план

B. Характеристика галузі охорони здоров'я

C. Маркетинг-план

D. Виробничий план

E. Організаційний план

530. Зовнішнє кодування здійснюється за товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). При практичному використанні ТН ЗЕД кодування товарів варто здійснювати тільки:

A. Дев'ятизначним кодом

B. П'ятизначним кодом

C. Шестизначним кодом

D. Семизначним кодом

E. Восьмизначним кодом

531. У дитини 4-х місяців спостерігаються зригування, часте рідке випорожнення зі слизом. Живіт здутий, гази відходять погано. Температура тіла - 35,8°C, АТ знижений. Втрата маси 500 г. Про що свідчить важкий стан дитини?

A. Кишковий токсикоз з ексикозом

B. Сепсис, септицемія

C. Сепсис, септикопемія

Д. Аденогенітальний синдром, сільвтрачаюча форма

Е. Білково-енергетична недостатність

532. У дитини 8-ми місяців з гострою вірусною інфекцією стан погіршився: акроціаноз, задишка змішаного типу, роздування крил носа. В нижніх сегментах легенів симетричне притуплення перкуторного звуку. Діагноз буде підтверджувати аускультативна картина:

А. Дрібнопухирчасті вологі хрипи з обох сторін, дихання послаблене

В. Свистячі хрипи на видосі

С. Крупнопухирчасті вологі хрипи, дихання жорстке

Д. Дихання в легенях жорстке, сухі хрипи

Е. Крепітація та послаблене дихання з однієї сторони

533. Перелік досліджень та заходів щодо виявлення хворих з артеріальною гіпертензією та принципи їх ведення визначені наказом МОЗ України:

А. №247

В. №186

С. №205

Д. №207

Е. №236

534. Пацієнт 56-ти років скаржиться на переймоподібний біль в животі, закрепи, рідкі випорожнення з кров'ю протягом року. Схуд на 15 кг. Об'єктивно: шкіра бліда, живіт м'який, у лівому підребер'ї пальпується помірно болюче, щільне утворення. У крові: ер.- 3,0·10¹²/л, Нb98 г/л. Назвіть найбільш інформативний метод діагностики:

А. Колоноскопія (з біопсією)

В. УЗД

С. Комп'ютерна томографія

Д. Іригоскопія

Е. Магніто-резонансна терапія

535. У пацієнтки 28-ти років, яка хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки серед повного благополуччя раптово виник сильний "кинжалоподібний" біль в пілородуоденальній ділянці. Прийом 2-х таблеток но-шпи біль не зняв. Об'єктивно: Рс- 90/хв., АТ- 125/70 мм рт.ст. Пальпація живота різко болюча в пілородуоденальній ділянці, симптоми подразнення очеревини позитивні. У крові: Нb- 124 г/л, лейкоцити - 16,8 · 10⁹/л, ШОЕ- 12 мм/год. Ці скарги вказують на:

А. Перфорацію виразки

В. Гострий холецистит

С. Гостру кишкову непрохідність

Д. Гострий панкреатит

Е. Пенетрацію виразки 12-палої кишки

536. Під час медсестринського обстеження пацієнта, який тривалий час страждає на цироз печінки, виникло блювання свіжою кров'ю. Стан пацієнта тяжкий, шкірні покрови бліді, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв., слабкого наповнення. Вкажіть імовірну причину кровотечі:

А. Варикозно розширені вени стравоходу

В. Виразкова хвороба шлунка

С. Перфоративна виразка шлунка

Д. Пухлина шлунка

Е. Виразка 12-палої кишки

537. В одному із фермерських господарств травмувалася молода людина. Лікар запідозрив перелом стегна. Яку шину повинна підготувати і застосувати медична сестра сімейного лікаря?

A. Шина Дітеріхса

В. Шина Беллера

С. Шина Фільберга

Д. Шина Крамера

Е. Шина Дельбе

538. До лікаря звернулася пацієнтка 44х років, масажистка за фахом. Скаржиться на біль і відчуття поколювання в руках під час роботи і після її припинення. Особливо біль непокоїть вночі. Об'єктивно: пасивні рухи в кінцівках вільні, безболісні. При активних рухах виникає різкий біль в руках. Пальпаторно м'язи рук ущільнені, пальпуються болючі вузлики діаметром до 1 см. Це характерно для:

A. Міозиту

В. Міалгії

С. Артрозу

Д. Дискінезії

Е. Бурситу

539. На прийомі мати 5-ти місячної дитини скаржиться на те, що маля неспокійне, погано спить, пітніє, з'явилося облісіння потилиці. При обстеженні: краї переднього тім'ячка розм'якшені, краніотабес. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Рахіт

В. Кефалогематома

С. Астено-невротичний синдром

Д. Алергічний діатез

Е. Нервово-артритичний діатез

540. Вас викликали до дитини 10-ти років, мати якої скаржиться на появу ціанозу, задишку. Напередодні під час їжі, дитина голосно сміялась. На момент огляду дихання утруднене, кашель, ціаноз шкіри. Якої допомоги потребує дитина?

A. Прийом Геймліха

В. Прийом Леопольда

С. Відсмоктування слизу з рота та носа

Д. Термінова інтубація трахеї

Е. Протишочкові заходи

541. При складанні звіту за рік за формою №24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту", було зареєстровано 102 проведених бесіди з населенням. На основі якої облікової медичної документації заповнюється ця частина звіту?

A. Журнал обліку з гігієнічного виховання населення

В. Журнал реєстрації листків непрацездатності

С. Журнал реєстрації амбулаторних хворих

Д. Журнал обліку інфекційних захворювань

Е. Журнал обліку процедур

542. Дівчинка народилася з масою тіла 3400 г, довжиною тіла 52 см. Вагітність і пологи

фізіологічні. В перший і другий день сечопуск був 5-6 разів на добу. На 3-й день після сечопуску на пелюшці помітна жовто-червона пляма, місцями червоно-жовті кристалики. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Сечокислий інфаркт нирок

B. Статевий криз

C. Пієлонефрит

D. Гломерулонефрит

E. Вульвовагініт

543. У дитини 4-х років із сім'ї хворих на туберкульоз декілька днів тому з'явилися головний біль, блювання, підвищення температури тіла, погіршення апетиту. Об'єктивно: дитина млява, апатична, температура тіла - 38,6°C, ЧСС- 100/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст., мова тиха, невиразна, виражена ригідність м'язів потилиці, позитивні симптоми Керніга, Брудзінського. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

A. Туберкульозний менінгіт

B. Менінгококовий менінгіт

C. Гостра респіраторна вірусна інфекція

D. Вірусний енцефаліт

E. Епідемічний паротит

544. Хлопчик 9-ти років добу тому впав та вдарив праву нижню кінцівку. Об'єктивно: температура тіла - 38°C. Відмічаються загальмованість, млявість. У верхній третині правої гомілки розлитий набряк, болісний при пальпації. Рухи у правому колінному суглобі різко обмежені через біль. З анамнезу: тиждень тому переніс фолікулярну ангіну. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий гематогенний остеомієліт

B. Флегмона правої гомілки

C. Вивих правого колінного суглоба

D. Перелом правого колінного суглоба

E. Гострий артрит колінного суглоба

545. На шляху до роботи чоловіка збила автомашина. Об'єктивно: свідомість відсутня, зіниці на світло не реагують, шкіра бліда, дихання рідке і поверхневе. Пульс слабкий, частий, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Із рота, носа і вух кров'яні виділення. Який імовірний діагноз?

A. Перелом основи черепа

B. Струс мозку

C. Перелом склепіння черепа

D. Крововилив у мозок

E. Перелом кісток черепа обличчя

546. У приймальне відділення доставлено хворого 56-ти років. Стан пацієнта важкий, шкіра бліда, Рс- 132/хв., АТ- 80/60 мм рт.ст. Язик сухий. Живіт м'який, болючий. Позитивні симптоми Валя, шум плеску. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини - наявність чаш Клойбера. Про яке захворювання свідчать вище вказані ознаки?

A. Кишкова непрохідність

B. Гострий апендицит

C. Асцит

- D. Перитоніт
- E. Гострий панкреатит

547. Хворий 43-х років звернувся зі скаргами на сильний біль, почервоніння та набряк шкіри на лівій гомілці. Хворіє 2 дні. Температура тіла - 39,5°C. Об'єктивно: в ділянці середньої третини лівої гомілки відмічаються набряк, почервоніння шкіри з чіткими фестончастими краями, місцями пухирі різних розмірів, заповнені серозно-геморагічним ексудатом. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

A. Бешиха

- B. Фурункульоз
- C. Гострий тромбофлебіт
- D. Флегмона
- E. Лімфангоїт

548. В хірургічне відділення госпіталізований хворий, який скаржиться на біль і випинання в правій пахвинній ділянці, нудоту, блювання. При обстеженні в правій паховій ділянці невідправиме напружене болісне випинання. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

A. Защемлена пахвинна грижа

- B. Абсцес правої пахвинної ділянки
- C. Ліпома правої пахвинної ділянки
- D. Туберкульоз лімфатичних вузлів
- E. Гострий лімфаденіт

549. В приймальне відділення доставлений хворий, який після травми відмічає біль і неможливість рухів у правому плечовому суглобі. При огляді правий плечовий суглоб деформований, рухи в суглобі різко обмежені, пружні. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

A. Вивих плеча

- B. Розрив м'язів плеча
- C. Перелом передпліччя
- D. Перелом ключиці
- E. Перелом плечової кістки

550. Медична сестра стала свідком травми чоловіка, який пірнав у воду з висоти 2 м. Об'єктивно: при пальпації визначається болісність у ділянці 5-го шийного хребця, крепітація остистого відростка. Вкажіть вид іммобілізації, який необхідно застосувати при транспортуванні пацієнта в лікарню:

A. Комірець Шанца

- B. Шина Ентіна
- C. Шина Єланського
- D. Шина Башмакова
- E. Ватно-марлеве кільце

551. У пацієнта раптовий гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, іррадіює в стегно. Позитивний симптом Пастернацького. Для якої патології характерні дані ознаки?

A. Ниркова колька

- B. Гострий холецистит
- C. Печінкова колька
- D. Гострий панкреатит
- E. Гострий апендицит

552. У пацієнта 63-х років, який протягом десяти років хворіє на хронічний лімфолейкоз, на фоні вираженого погіршення самопочуття в периферичній крові виявлено 15% лімфобластних клітин. Як називається такий стан?

A. Бластна криза

B. Зсув лейкоцитарної формули вліво

C. Зсув лейкоцитарної формули вправо

D. Лімфоцитоз

E. Лейкемічний провал

553. У ревматологічному відділенні на лікуванні знаходиться хвора зі скаргами на субфебрилітет, загальну слабкість, болі в суглобах, стискаючі болі в серці. Лікар діагностував ревматичну лихоманку. Вкажіть збудника, що викликає дане захворювання:

A. Бета-гемолітичний стрептокок групи A

B. Бета-гемолітичний стрептокок групи C

C. Стафілокок

D. Пневмокок

E. Вірус Епштейн-Барра

554. Ви провізор аптеки. Як називається офіційний документ, що містить найменування та коди класифікаційних груп і/або об'єктів класифікації?

A. Класифікатор

B. Реєстр

C. Каталог

D. Кодифікатор

E. Список

555. Бромкамфору, йод, ментол, тимол, спиртові настойки, рідкі спиртові концентрати, густі екстракти зберігають у прохолодному місці, у герметично закупореній тарі з непроникних матеріалів (скла, металу, товстостінної пластмаси) при відносній вологості повітря 50-60%. До якої групи належать вказані лікарські засоби?

A. Легколеткі (потребують захисту від випаровування)

B. Пахучі і забарвлюючі

C. Що потребують захисту від зниженої температури

D. Вибухонебезпечні

E. Що потребують захисту від світла

556. Жінка скаржиться на тупий біль у навколупупковій ділянці, здуття живота, кашкоподібні випорожнення до 4-5 разів на добу, неbolючі. Відразу після акту дефекації з'являється нудота, холодний піт, тремтіння кінцівок. Хворіє 5 років. Під час пальпації - болючість у навколупупковій ділянці. Для якого захворювання це характерно?

A. Хронічний ентерит

B. Хронічний панкреатит

C. Хронічний пієлонефрит

D. Хронічний гастрит

E. Хронічний холецистит

557. Який вид медичної допомоги є найбільш затратний в умовах ринкової економіки?

A. Стаціонарна

B. Амбулаторно-поліклінічна

- C. Швидка медична допомога
- D. Санаторно-курортна
- E. Реабілітація

558. За даними річного звіту стаціонару міської лікарні були отримані дані про кількість проведених хворими ліжкоднів і кількість хворих, що вибули із стаціонару протягом року. Який з показників роботи стаціонару можна розрахувати на підставі цих даних?

- A. Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі
- B. Середньорічна зайнятість
- C. Обіг ліжка
- D. Загальна летальність
- E. Ефективність використання ліжкового фонду

559. Для наочності у медичній статистиці використовуються графічні зображення. Які з перелічених діаграм використовуються для характеристики зміни явища за часом?

- A. Лінійні
- B. Картодіаграма
- C. Секторні
- D. Внутрішньостовпчикові
- E. Картограма

560. В основу поділу теорії розвитку менеджменту на етапи покладено періоди створення певних наукових шкіл управління. Хто ввів термін "наукове управління"?

- A. Ф. Тейлор
- B. Я. Гілберт
- C. Г. Форд
- D. Г. Гантт
- E. Е. Мейо

561. При організації свого робочого місця слід врахувати економічні, інформаційні, ергономічні та гігієнічні вимоги. Якому освітленню надається перевага при організації робочого місця?

- A. Природне
- B. Штучне
- C. Змішане
- D. Не має значення
- E. Люмінісцентне

562. Керівнику лікувально-профілактичного закладу під час виконання службових обов'язків доводиться мати справу з різними документами. За термінами зберігання всі документи поділяються на:

- A. Постійні, тимчасові, тривалі
- B. Термінові, нетермінові
- C. Сталі, змінні
- D. Типові, трафаретні
- E. Звичайні, для службового користування, секретні, цілком секретні

563. Головний лікар ЦРЛ за важливих обставин не зміг бути присутнім на обласній конференції, але передав повноваження своєму заступнику, який взяв на себе відповідальність за виконання даної вказівки. Вкажіть законні підстави для виконання вказаної дії:

A. Делегування

B. Керування

C. Мотивація

D. Лідерство

E. Повноваження

564. Пацієнт скаржиться на появу сечі кольору "м'ясних ополосків", головний біль, набряки на обличчі. Три тижні тому хворів на ангіну. Об'єктивно: обличчя бліде, одутле, АТ- 145/90 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Гострий гломерулонефрит

B. Гіпертонічна хвороба

C. Гострий пієлонефрит

D. Хронічний пієлонефрит

E. Амілоїдоз нирок

565. Пацієнт поступив в пульмонологічне відділення зі скаргами на біль в правій половині грудної клітки, який посилюється під час кашлю і дихання, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, підвищення температури до 39,5оС, задишку. Вкажіть препарат, який застосовується з метою етіотропного лікування:

A. Цефтріаксон

B. Лазолван

C. Аспірин

D. Сульфокамфокаїн

E. Лібексин

566. В маніпуляційному кабінеті після підшкірного введення ціанокобаламіну пацієнтка відчула себе зле: з'явилися шум у вухах, відчуття ядухи, запаморочення. Які дії медичної сестри стосовно місця ін'єкції будуть доцільними?

A. Застосувати міхур з льодом

B. Накласти стискаючу пов'язку

C. Обробити спиртом

D. Накласти компрес

E. Накласти грілку

567. Пацієнта турбує ранкова скутість у дрібних суглобах кистей, постійний біль у них, який посилюється при будь-яких рухах, неможливість одягатися. Для якого захворювання це характерно?

A. Ревматоїдний артрит

B. Ревматичний поліартрит

C. Деформуючий остеоартроз

D. Системний червоний вовчак

E. Склеродермія

568. Під час клінічного обстеження пацієнта 33-х років виявлені скарги на біль, набряк і почервоніння шкіри. Об'єктивно: на внутрішній поверхні стегна визначається округлий інфільтрат, який дещо виступає над її поверхнею. В центрі інфільтрату є білуватий стрижень. Який діагноз можна поставити?

A. Фурункул

B. Абсцес

- С. Флегмона
- D. Гідраденіт
- Е. Бешиха

569. У працівника зерносховища після прибирання зерна, що гниє, виникли наступні симптоми: нездужання, гарячка, сухий кашель. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A. "Фермерська легеня"

- B. Силікатоз
- С. Антракоз
- D. Сидероз
- Е. Азбестоз

570. Працівник, що брав участь у ліквідації пожежі в приміщенні, де зберігалось 2 кг металевої ртуті, доставлений у клініку із скаргами на емоційну нестриманість, серцебиття, пітливість, тремтіння тіла, плаксивість, біль в ділянці серця. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, у хворого стан депресії, стійкий червоний дермографізм, еретизм, нестійкий рівень АТ. Який з препаратів є антидотом у цьому випадку?

A. Унітіол

- B. Тетацин кальцію
- С. Атропіну сульфат
- D. Амілнітрит
- Е. Дипіроксим

571. Пацієнту, який знаходиться на амбулаторному лікуванні, з приводу тимчасової непрацездатності видається документ. Як називається документ, що дає право на одержання виплат з державного соціального страхування?

A. Листок непрацездатності

- B. Студентська довідка
- С. Статистичний талон
- D. Довідка про непрацездатність
- Е. Консультаційне заключення

572. Під час проведення проби на резуссумісність крові донора та реципієнта в пробірці відбулась реакція аглютинації. Вкажіть, який висновок зробить медична сестра з записом в медичну документацію?

A. Несумісна по Rh-фактору

- B. Резус-позитивна
- С. Сумісна по Rh-фактору
- D. Резус-негативна
- Е. Пробу треба переробити

573. До медсестри звернулася сусідка, яка тиждень тому наколола ногу на городі. До лікаря не зверталась, лікувалась вдома. Скарги на сіпаючий біль у рані, напруження жувальних м'язів. Обличчя має страждальний вираз. Що з хворою?

A. Правець

- B. Гнійна рана
- С. Остеомієліт
- D. Неврит лицьового нерва
- Е. Бешиха

574. Ви працюєте медсестрою в онкологічному диспансері. Вкажіть, яке із захворювань прямої кишки належить до передракових станів і потребує обов'язкового диспансерного спостереження?

A. Поліп прямої кишки

B. Тріщини прямої кишки

C. Запалення слизової прямої кишки

D. Геморой

E. Нориці прямої кишки

575. Хірург планує провести пацієнту з пневмотораксом плевральну пункцію. Вкажіть місце оброблення операційного поля для майбутньої пункції:

A. II міжребер'я по середньо-ключичній лінії

B. VII міжребер'я по задньо-пахвовій лінії

C. VI міжребер'я по парагрудинній лінії

D. VII міжребер'я по лопатковій лінії

E. IV міжребер'я по середньо-пахвовій лінії

576. Метою охорони здоров'я є зміцнення та збереження здоров'я кожної людини. Назвіть основне завдання медикогігієнічного навчання та виховання населення:

A. Формування здорового способу життя

B. Збір статистичних даних про стан здоров'я населення

C. Розробку заходів по охороні навколишнього середовища

D. Надання медичної допомоги на засадах

E. ПМСД

F. Оптимізацію управління охороною здоров'я

577. Існують різні форми та джерела фінансування охорони здоров'я. Назвіть основні джерела фінансування державних закладів охорони здоров'я:

A. Кошти державного та місцевих бюджетів

B. Внутрішні ресурси, які надходять у результаті господарсько-фінансової діяльності закладів охорони здоров'я

C. Гуманітарна допомога

D. Акції, облігації, кредити

E. Бюджетні надходження, кошти від ОМС і ДМС, власні кошти громадян

578. Медичне страхування виконує три основні функції. Який документ є гарантом соціального захисту громадян в галузі охорони здоров'я, та є носієм цих функцій?

A. Медичний поліс

B. Паспорт

C. Диплом про медичну освіту

D. Посвідчення почесного донора

E. Бізнес-план

579. Оплата медичних послуг - це процес фінансових розрахунків за надану допомогу. Як поділяється система оплати медичних послуг залежно від часу?

A. Ретроспективна та проспективна

B. Стратегічна та оперативна

C. Оперативна та проспективна

D. Проспективна та короткотривала

Е. Довготривала, середньотривала та короткотривала

580. Пацієнт поскаржився на часті запаморочення та втрату свідомості при фізичних навантаженнях. В анамнезі - ревматична хвороба впродовж 23-х років. При об'єктивному обстеженні виявлено блідість шкірних покривів, пульсацію сонних артерій та похитування голови в такт пульсу. Для якої вади серця характерні дані симптоми?

A. Недостатність клапанів аорти

В. Тетрада Фало

С. Стеноз мітрального отвору

Д. Недостатність мітрального клапану

Е. Недостатність трьохстулкового клапану

581. Пацієнтка тривалий час скаржиться на нудоту, блювання, гіркоту у роті, тяжкість в правому підребер'ї, особливо після вживання жирної їжі. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий у точці жовчного міхура. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?

A. Хронічний холецистит

В. Жовчнокам'яна хвороба

С. Виразкова хвороба

Д. Хронічний гепатит

Е. Хронічний панкреатит

582. У пацієнта два тижні тому з'явилися кашель з виділенням харкотиння з неприємним запахом, підвищення температури тіла до 38,0. Об'єктивно: стан пацієнта тяжкий, ЧД- 24/хв. Рентгенологічно: в лівій легені виявлено порожнину до 3 см в діаметрі з горизонтальним рівнем рідини. Який найімовірніший діагноз?

A. Абсцес легені

В. Пневмонія

С. Ексудативний плеврит

Д. Інфільтративний туберкульоз

583. Проводячи "п'ятихвилинку", старша медична сестра хірургічного відділення, прагне підкорити весь колектив своїй волі, не сприймає заперечень і не прислухається до думки інших, вимагає пунктуального виконання своїх вказівок. Який тип поведінки характерний даному керівникові?

A. Авторитарний тип

В. Демократичний тип

С. Песимістичний тип

Д. Ліберальний тип

Е. Соціалістичний тип

584. Ви - головна медична сестра. Поясніть старшій медичній сестрі, як називається документ, який складається за вказівкою голови чи керівника колегіального органу або самостійно в межах його повноважень з оперативних питань, не потребує колегіального рішення:

A. Розпорядження

В. Рішення

С. Наказ

Д. Протокол

Е. Довідка

585. Існує інформація призначена для автоматизованих ідентифікацій та обліку даних про товар, закодована у вигляді цифр і штрихів. Як вона називається?

A. Штрихова

- B. Символічна
- C. Образотворча
- D. Словесна
- E. Кодова

586. Дитина 5-ти років хворіє близько двох тижнів, скаржиться на гнійнокров'янисті виділення з носа, мацерації крил носа та верхньої губи. При риноскопії на носовій перетинці білісуватосірі острівці. Слизова ротоглотки не змінена. Клінічна картина дозволяє запідозрити:

A. Дифтерію носа

- B. Алергічний риніт
- C. Риновірусну інфекцію
- D. Аденовірусну інфекцію
- E. Фарингіт

587. Дитині 6 місяців, знаходиться на штучному вигодовуванні коров'ячим молоком. Під час огляду медична сестра-бакалавр виявила у дитини гіпотрофію I ступеня. Який перший прикорм найбільш бажаний для цієї дитини?

A. Молочні каші

- B. Овочеві пюре
- C. Фруктові пюре
- D. М'ясне пюре
- E. Кисло-молочний сир

588. Медична сестра-бакалавр прийшла на патронаж до дитини першого року життя. Об'єктивно: дитина добре утримує голівку у вертикальному положенні, доторкається до предметів, посміхається, спостерігається позитивна емоційна реакція на матір. Якому віку відповідає психомоторний розвиток дитини?

A. 3 місяці

- B. 1 місяць
- C. 2 місяці
- D. 2 тижні
- E. 3 тижні

589. Пацієнт 34-х років поступив у відділення з ознаками бронхіту. Упродовж 5-ти років працює в шахті, де добувають залізну руду. Який різновид пневмоконіозу в нього може виникнути?

A. Сидероз

- B. Азбестоз
- C. Антракоз
- D. Бісиноз
- E. Бериліоз

590. До жіночої консультації звернулася і була поставлена на облік здорова вагітна жінка зі строком вагітності 26 тижнів. Назвіть рекомендовану кратність відвідування нею жіночої консультації:

A. 2 рази на місяць

- B. 1 раз на місяць

- C. 1 раз на 3 місяці
- D. 1 раз на 2 місяці
- E. 1 раз на тиждень

591. Хворий К., 42 роки, страждає впродовж 8-ми років на гіпертонічну хворобу. Після емоційного стресу на роботі став дратівливим, відчуває сухість у роті. Об'єктивно: у свідомості, тремор рук, обличчя гіперемовано, шкіра зволожена, поліурія. АТ- 210/100 мм рт.ст., ЧСС110/хв. Рухових і сенсорних порушень немає. Глюкоза крові - 4,5 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

- A. Гіпертонічний криз
- B. Гіпоглікемія
- C. Ішемічний інсульт
- D. Геморагічний інсульт
- E. Гіперглікемічна кома

592. Серед населення міста зареєстровано 280 випадків смерті від новоутворень на 10000 населення. За допомогою якого статистичного показника відображена смертність населення від новоутворень?

- A. Інтенсивний
- B. Екстенсивний
- C. Наочності
- D. Співвідношення
- E. Середнє арифметичне

593. Наукове дослідження присвячене вивченню захворюваності студентів медичного коледжу на хвороби органів дихання. Одиницею спостереження в такому дослідженні буде кожен:

- A. Випадок захворювання органів дихання
- B. Студент медичного коледжу
- C. Хворий студент медичного коледжу (на будь-яке захворювання)
- D. Студент медичного коледжу з хворобою органів дихання
- E. Випадок захворювання (незалежно від нозологічної форми)

594. Медична сестра обстежує пацієнта з хронічною серцевою недостатністю. Що є найбільш інформативним у діагностиці даного стану?

- A. Набряки на ногах та задишка
- B. Слабкість, поганий апетит
- C. Кашель та підвищена температура тіла
- D. Біль у серці ниючого характеру та біль у великих суглобах
- E. Пульсація сонних артерій, жовтяниця

595. Дитина 10-ти років скаржиться на слабкість, біль у горлі при ковтанні, підвищення то тіла до 39оПри огляді: шкіра звичайного кольору; в зіві: гіперемія, набряк мигдаликів, гнійні плівки. При реалізації плану медсестринських втручань необхідним є таке обстеження:

- A. Мазок із зіву та носа на BL
- B. Забір слизу із носоглотки на віруси
- C. Забір крові на біохімічне дослідження
- D. Рентгенологічне
- E. Серологічне

596. Яким законодавчим актом визначаються організація та управління охороною здоров'я України?

A. "Основами законодавства України про охорону здоров'я", Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"

B. "Основами законодавства України про охорону здоров'я", законом "Про місцеве самоврядування", законом "Про санепідблагополуччя"

C. Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"

D. Законом "Про державну службу", Конституцією України, законом "Про місцеве самоврядування"

597. Чоловік 59-ти років скаржиться на поганий апетит, відразу до м'ясних і молочних страв. За останні 3 місяці схуд на 18 кг. Про що може свідчити вказаний симптомокомплекс?

A. Рак шлунку

B. Рак товстого кишківника

C. Синдром хронічної втоми

D. Астенічний синдром

E. Виразкова хвороба шлунку

598. У пацієнта 49-ти років на 4-й день після резекції шлунка виник постійний інтенсивний біль в животі. Загальний стан важкий. Температура тіла- 37,8оС, АТ- 100/60 мм рт.ст., Рс- 104Vхв. Язик сухий. Живіт здутий, ліва половина відстає під час дихання. Симптоми Воскресенського, Щоткіна-Блумберга позитивні. Назвіть імовірне післяопераційне ускладнення:

A. Перитоніт

B. Кишкова непрохідність

C. Кровотеча

D. Панкреатит

E. Абсцес

599. Пацієнтка скаржиться на біль в правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку. Було блювання без полегшення. Температура тіла - 37,6оЖивіт помірно здутий, напружений та болючий в правому підребер'ї. Спостерігається помірне напруження м'язів черевної стінки в правому підребер'ї. Симптом Ортнера позитивний. Вкажіть попередній діагноз:

A. Гострий холецистит

B. Гострий апендицит

C. Гострий панкреатит

D. Гостра кишкова непрохідність

E. Перфоративна виразка шлунку

600. Медсестра проводить обстеження пацієнта з відмороженням правої ступні. Оберіть, який з симптомів є характерним лише для дореактивного періоду відмороження?

A. Втрата чутливості

B. Поява болю

C. Гіперемія шкіри

D. набряк тканин

E. Підвищення температури

601. Дитині 5,5 місяців. Перебуває на нераціональному штучному вигодовуванні (коров'ячим молоком). При введенні жовтка у дитини з'явилася плямистопапульозна висипка по всьому тілу, на щоках яскрава гіперемія, злущення шкіри, мокнучі ділянки, ексориація. Про який стан

слід думати в даній ситуації?

A. Алергічний діатез

B. Нервово-артритичний діатез

C. Лімфатико-гіпопластичний діатез

D. Кропив'янка

E. Геморагічний діатез

602. Антидоти - лікарські засоби, які використовуються як протиотрута при інтоксикації хімічними речовинами. Які антидоти використовують при отруєнні сірковуглецем?

A. Оксигенотерапія

B. Метиленовий синій

C. Унітіол

D. Тетацин кальцію

E. Активоване вугілля

603. При інтоксикації свинцем уражається система крові. Які зміни характерні для картини крові при інтоксикації свинцем?

A. Гіпохромія еритроцитів, підвищений вміст заліза

B. Тромбоцитопенія, ретикулоцитоз

C. Поява в еритроцитах тілець Гейнца, збільшення базофілів

D. Гіпохромна анемія, тромбоцитопенія, поява в еритроцитах тілець Гейнца

E. Лейкоцитоз

604. При проведенні патронажу медична сестра виявила у дитини 5-ти місяців наступні проблеми: кволість, $t_{\text{о}} = 38,5^{\circ}\text{C}$, часте блювання, випорожнення понад 15 разів на добу, знижений діурез, шкіра суха, тім'ячко запале. Для якого стану характерні дані симптоми?

A. Синдром токсикозу з ексикозом

B. Функціональний розлад травлення

C. Пілоростеноз

D. Ентеробіоз

E. Гіперглікемічна кома

605. Частину потреб районної лікарні у минулому році профінансовано за рахунок коштів програми боротьби з серцево-судинними захворюваннями. З якого джерела надійшли ці кошти?

A. Державний бюджет

B. Місцевий бюджет

C. Благодійні внески

D. Добровільне медичне страхування

E. Обов'язкове медичне страхування

606. У потерпілого К. 39-ти років термічний опік лівої кисті. Вкажіть препарат, який застосовують зовнішньо під час надання допомоги:

A. Пантенол

B. Фукорцин

C. Первомур

D. Бактосин

E. Йодонат

607. У пацієнта постійні скарги на нудоту, відчуття дискомфорту після прийому густої їжі, періодичне блювання, що приносить полегшення. Яке імовірне ускладнення виразкової хвороби шлунку розвинулося у пацієнта?

A. Стеноз

- B. Малігнізація
- C. Перфорація
- D. Кровотеча
- E. Пенетрація

608. До хірургічного відділення надійшов хворий віком 51 рік зі скаргами на біль у правій гомілці, набряк. Об'єктивно: почервоніння шкіри над венами, вени м'які, різко болючі. Який найбільш імовірний діагноз?

A. Флебіт

- B. Флеботромбоз
- C. Артеріїт
- D. Тромбофлебіт
- E. Лімфангоїт

609. Пацієнтка 50-ти років скаржиться на біль за грудиною стискаючого характеру, який віддає в ліве плече, лопатку. Біль виникає після фізичного та психічного перенавантаження. Застосування якого препарату буде першочерговим?

A. Нітрогліцерин

- B. Ніфедипін
- C. Атенолол
- D. Аспірин
- E. Папаверин

610. Пацієнт 45-ти років звернувся зі скаргами на слабкість, помірне підвищення температури тіла, набряки на обличчі, зміну кольору та кількості сечі. Хворіє тиждень після перенесеної ангіни. Об'єктивно: шкіра бліда, набряк повік, АТ- 170/100 мм рт.ст., Рс- 90/хв., тони серця приглушені, симптом Пастернацького позитивний. Яке дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

A. Аналіз сечі за Нечипоренком

- B. Аналіз сечі на глюкозу
- C. Аналіз сечі за Зимницьким
- D. Загальний аналіз крові
- E. Аналіз сечі на діастазу

611. Пацієнтка 26-ти років скаржиться на біль "летючого характеру" у колінних та ліктьових суглобах, який підсилюється при рухах, підвищення температури тіла до 37,5°C ввечері. З анамнезу відомо, що пацієнтка часто хворіє на ангіни. При огляді суглобів відзначається їх припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

A. Ревматичний артрит

- B. Туберкульозний артрит
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Гонорейний артрит
- E. Деформуючий остеоартроз

612. Хворий скаржиться на гострий "кинджальний" біль у животі, різку слабкість. Захворів

раптово після фізичного навантаження. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

A. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

B. Шлункова кровотеча

C. Гострий гастрит

D. Синдром подразненого кишківника

E. Гострий панкреатит

613. Пацієнт скаржиться на виникнення раптової ядухи з утрудненим видихом, наприкінці нападу кашель з виділенням незначної кількості склоподібного харкотиння. При аналізі харкотиння виявлені еозинофіли, кристали Шарко-Лейдена, спіралі Куршмана. Яке захворювання у пацієнта?

A. Бронхіальна астма

B. Серцева астма

C. Гострий бронхіт

D. Рак легень

E. Туберкульоз легень

614. Особливістю функцій медичних сестер спеціалізованих кабінетів поліклініки є:

A. Проведення спеціальних лікувальних та діагностичних процедур

B. Санітарно-освітня робота

C. Виконання ін'єкцій

D. Підготовка кабінету лікаря до прийому хворого

E. Передача інформації про пацієнта родичам

615. Дитина 4-х років захворіла гостро через 7 днів після ГРВІ. На шкірі нижніх кінцівок з'явилася поліморфна, симетрично розташована геморагічнопапульозна висипка, скупчена навколо гомілковостопних суглобів. Визначте ймовірне захворювання:

A. Геморагічний васкуліт, шкірна форма

B. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма

C. Гемофілія

D. Тромбоцитопенічна пурпура

E. Хвороба Верльгофа

616. Результати попереднього (періодичного) медичного огляду працівників і висновки комісії про їх стан здоров'я заносяться до:

A. Картки працівника

B. Амбулаторної карти хворого

C. Екстреного повідомлення про інфекційне захворювання

D. Стаціонарної карти хворого

E. Статистичного талону

617. Хворому К. лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Медична сестра пояснює пацієнтові, що слід зібрати таку порцію сечі:

A. Середню

B. Кінцеву

C. Всю сечу

D. Початкову

618. Хворій на токсичний дифузний зоб призначено консервативне лікування. Які препарати є обов'язковими для лікування даного захворювання?

A. Мерказоліл, метімазол

B. Тиреоїдин, тироксин

C. Тиреокмб, тироксин

D. Метотрексат, метилурацил

E. Гідрокортизон, преднізолон

619. Дитина 7-ми років захворіла раптово (напередодні вживала тістечка), підвищилася температура тіла до 38°C, турбують болі в животі, часті рідкі випорожнення з домішками слизу та крові. Об'єктивно: при пальпації живота спостерігається болючість в лівій половині живота. Припущено дизентерію. Яке дослідження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

A. Бактеріологічне дослідження калу

B. Копрологічне дослідження

C. Загальний аналіз крові

D. Змив з носоглотки на віруси

E. Серологічні дослідження

620. Хворий К. 46-ти років скаржиться на задишку, кашель з виділенням незначної кількості харкотиння, біль у грудях. Умови праці пов'язані з вдиханням пилу заліза. Який вид металокоңіоза розвинувся у хворого?

A. Сидероз

B. Бериліоз

C. Алюміноз

D. Баритоз

E. Фіброз

621. У дитини 4-х років на шкірі обличчя, волосистій частині голови виявлено плями, дрібні папули та везикули (пухирці). Везикули мають овальну форму, різні за розміром, розташовані на незмінній шкірі. Вміст везикул прозорий. На яке захворювання вказують наведені симптоми?

A. Вітряна віспа

B. Скарлатина

C. Кір

D. Краснуха

E. Ексудативно-катаральний діатез

622. Медична сестра 30-ти років працює у фізіотерапевтичному кабінеті, обслуговуючи електроапаратуру, яка є джерелом випромінювання всіх ділянок електромагнітного спектра. Засобами захисту медична сестра не користується. Скаржиться на біль та відчуття піску в очах, неможливість дивитися на яскраве світло. Об'єктивно: спостерігається гіперемія та набряк кон'юнктиви очей. Яке професійне захворювання може розвинути внаслідок недостатнього контролю медичної сестри?

A. Кератокон'юктивіт

B. Блефароспазм

C. Прогресуюча міопія

D. Фотоалергія

E. Катаракта

623. Хвора 26-ти років занедужала через 2 години після вживання в їжу кремового торта. Виникли загальна слабкість, нудота, багаторазова блювота. Які заходи за призначенням лікаря треба провести щодо хворої в першу чергу?

- A. Промивання шлунку
- B. Введення антибіотиків
- C. Введення платифіліну
- D. Введення реополіглюкіну
- E. Введення преднізолону

624. Медичне страхування в умовах страхової медицини фінансується з основних і додаткових джерел. Яке з наведених положень належить до одного з додаткових джерел фінансування?

- A. Благодійні внески
- B. Державний бюджет
- C. Особисті кошти громадян
- D. Відрахування підприємств на медичне страхування
- E. Місцевий бюджет

625. У стаціонарі на 300 ліжок перебувало на лікуванні протягом року 6500 хворих, виписано без змін у стані здоров'я - 135, померло - 65. Який показник ефективності треба застосувати для оцінки роботи стаціонару?

- A. Медичної ефективності
- B. Соціальної ефективності
- C. Економічної ефективності
- D. Мішаної ефективності
- E. Всі види ефективності

626. У дитини 6-ти місяців через 2 тижні після вакцинації АКДС з'явилася геморагічна висипка у вигляді петехій та екхімозів на верхніх та нижніх кінцівках та обличчі. В крові: Hb- 115 г/л, лейкоц.- $6,5 \cdot 10^9$ /л, тромбоц.- $15 \cdot 10^9$ /л. Яке захворювання має місце у хворого?

- A. Тромбоцитопенічна пурпура
- B. Геморагічний васкуліт
- C. Гострий лейкоз
- D. Системний червоний вовчак
- E. Апластична анемія

627. Дитині 8 місяців. Хворіє 5 днів. Спостерігаються кволість, підвищення температури тіла $37,8-38,8^{\circ}\text{C}$, задишка 60 /хв., в легенях з обох сторін у нижніх ділянках вислуховуються крепітація, послаблене дихання, пригнічення перкуторного тону. Яке обстеження є найвагомішим для встановлення діагнозу?

- A. Рентгенографія органів грудної клітки
- B. Клінічний аналіз крові
- C. Імунограма
- D. Кисотно-лужний стан крові
- E. Спірометрія

628. У хворого кардіологічного відділення виникла зупинка дихання і зникла пульсація на сонній артерії. Який стан у хворого?

- A. Клінічна смерть
- B. Біологічна смерть

- C. Агонія
- D. Передагонія
- E. Соціальна смерть

629. Який дієтичний стіл рекомендують хворому на хронічний ентероколіт?

- A. Стіл № 4**
- B. Стіл № 1
- C. Стіл № 5
- D. Стіл № 7
- E. Стіл № 11

630. До післяопераційної палати доставили пацієнта, якому проводили оперативне втручання під епідуральною анестезією. Які тимчасові зміни можуть спостерігатися у пацієнта?

- A. Втрата чутливості**
- B. Порушення дихання
- C. Затримка сечовиділення
- D. Патологічні рефлекси
- E. Виникає біль

631. Перед апендектомією пацієнту К. 45-ти років проводять премедикацію. З якою метою при цьому використовують розчин атропіну сульфату?

- A. Зменшення секреції залоз**
- B. Прискорення серцевих скорочень
- C. Запобігання блюванню
- D. Посилення дії анальгетиків
- E. Звуження зіниць

632. Ви - медсестра дитячого інфекційного відділення. Які характерні гематологічні зміни спостерігають у разі кашлюку?

- A. Лімфоцитоз**
- B. Анемію
- C. Нейтрофіліоз
- D. Еозинофілію
- E. Тромбоцитопенію

633. Дитина народилася доношеною. Оцінка стану за шкалою Апгар 8-10 балів. Коли дитину прикласти до грудей?

- A. Протягом перших 30 хвилин**
- B. Через 2 години
- C. Через 6-8 годин
- D. Через 10-12 годин
- E. Через добу

634. Серед причин, які спричиняють розвиток повторних нападів професійної бронхіальної астми, є:

- A. Екзогенні алергени**
- B. Електромагнітне випромінювання
- C. Ультразвукове випромінювання
- D. Лазерне випромінювання

Е. Ендогенні алергени

635. У пацієнта діагностовано легкий ступінь гострої променевої хвороби. Під дією якої дози радіоактивного випромінювання він розвивається?

A. 100 - 200 рад

B. 200 - 300 рад

C. 300 - 500 рад

D. 500 - 600 рад

E. 600 - 800 рад

636. Старша медична сестра бере участь у складанні та оформленні статуту новоствореної медичної організації (кабінет стоматологічної допомоги). Цей документ належить до такої групи:

A. Організаційні

B. Інформаційні

C. Розпорядчі

D. Фінансово-розрахункові

E. Інформаційні та організаційні

637. Ви - медсестра пологового відділення. Згідно з яким наказом здійснюється профілактика ВІЛ в акушерських стаціонарах?

A. № 234

B. № 620

C. № 503

D. № 408

E. № 233

638. Ви - медична сестра гінекологічного відділення. Як часто медичний персонал підлягає бактеріологічному обстеженню (згідно з наказом № 234)?

A. 1 раз на 3 місяці

B. 1 раз на 6 місяців

C. 1 раз на 9 місяців

D. 1 раз на рік

E. 1 раз на 2 роки

639. У хворій 68-ми років інфаркт міокарду. Який з наведених лікарських засобів треба застосувати для зняття больового синдрому?

A. Промедол

B. Анаприлін

C. Клофелін

D. Еуфілін

E. Строфантин

640. Пацієнтці, яка лікувалася з приводу хронічного холециститу, лікар призначив дуоденальне зондування. В якій порції жовчі будуть виявлені патологічні компоненти жовчі, характерні для даного захворювання, та які саме компоненти?

A. Лейкоцити в порції B

B. Лейкоцити в порції A

C. Лейкоцити в порції C

D. Еритроцити в порції А

Е. Еритроцити в порції В

641. Дитині 2 роки. Скарги на підвищення $t_{\text{о}}$ до 38°C , кашель, нежить, кон'юнктивіт, гіперемію зівів. Який діагноз найбільш імовірний?

A. Аденовірусна інфекція

В. Кір

С. Коклюш

D. Пневмонія

Е. Трахеобронхіт

642. Медична сестра здійснює патронаж дівчинки 1 року. Мати цікавиться, які щеплення необхідно зробити її дитині в даному віці?

A. Проти кору, краснухи, паротиту

В. Проти туберкульозу

С. Проти поліомієліту

D. Проти дифтерії, коклюшу, правця

Е. Проти гепатиту В

643. Медична сестра здійснює догляд за дитиною з гіпотрофією. Що необхідно включити до плану незалежних медсестринських втручань при догляді за такою дитиною?

A. Постійний контроль маси тіла

В. Проведення очисної клізми

С. Вимірювання артеріального тиску

D. Введення еубіотиків

Е. Введення антибіотиків

644. Пацієнт К. 43-х років скаржиться на переймоподібний біль в животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень та відходження газів. Живіт здутий, перистальтика кишечника відсутня. З чим пов'язаний даний стан пацієнта?

A. Гостра кишкова непрохідність

В. Перфорація виразки шлунку

С. Гострий апендицит

D. Гострий панкреатит

Е. Гострий холецистит

645. Медична сестра сімейного лікаря проводить за його дорученням збір інформації про захворюваність на дільниці. Які показники будуть її цікавити?

A. Показники тимчасової стійкої втрати працездатності, причин смерті

В. Витрати на медико-гігієнічне навчання населення

С. Співвідношення народжуваності та смертності

D. Дані перепису населення

Е. Відсутність розбіжностей у захворюваності серед чоловіків і жінок

646. На яку суму здійснюється списання товарів відповідно до існуючої інструкції МОЗ України?

A. Не більше 0,1% від загального товарообігу

В. Не більше 1% від загального товарообігу

С. Не більше 2% від загального товарообігу

D. Не більше 5% від загального товарообігу

Е. Не більше 10% від загального товарообігу

647. Наркотичні лікарські засоби, термін придатності яких минув, для списання і знищення необхідно передати з аптек:

А. На аптечний склад

В. До комісії ЛПЗ

С. До спецкомісії УВС

Д. До комісії ЗОЗ

Е. На завод, де були виготовлені ліки

648. Для заміщення втраченої крові хірург призначив переливання 1л свіжоцитратної крові. Медична сестра на кожні 500 мл перелитої донорської крові вводить внутрішньовенно 10 мл 10% розчину кальцію хлориду. Яке ускладнення це допоможе попередити?

А. Цитратний шок

В. Геморагічний шок

С. Тромбоз судин

Д. Інфікування рани

Е. Алергічна реакція

649. Жінка отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Її турбує сильний пекучий біль. При огляді: гіперемія передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світло-жовтою рідиною. Визначте площу і ступінь опіку:

А. 9%, II ступінь

В. 18%, II ступінь

С. 9%, III А ступінь

Д. 18%, III Б ступінь

Е. 4%, IV ступінь

650. За допомогою звернувся пацієнт Д. 58-ми років зі скаргами на біль в животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: виявлено напружене та болюче вип'ячування в паховій ділянці справа. Що можна припустити?

А. Защемлення пахової киля

В. Защемлення пупкової киля

С. Незащемлену пахову килу

Д. Незащемлена стегова кила

Е. Невправима калиткова кила

651. За порадою звернувся чоловік 42-х років зі скаргами на біль в животі, загальну слабкість. Три години тому брав участь у бійці, отримав удар ногою в живіт. При огляді: живіт участі в акті дихання не бере, при пальпації м'який, справа спостерігається біль і напруження м'язів. Пульс в межах норми. Що необхідно зробити в першу чергу?

А. Холод на живіт

В. Грілку на живіт

С. Ввести знеболювальні

Д. Ввести спазмолітики

Е. Заборонити пити

652. Пацієнтові, який перебуває на лікуванні в онкологічному диспансері з приводу раку шлунка, призначено хіміотерапію. Яка побічна дія цитостатичних препаратів?

A. Блювання

- B. Дисфагія
- C. Анізокорія
- D. Закрепи
- E. Гіпотермія

653. В онкологічному диспансері на лікуванні з приводу пухлини легень перебуває пацієнт Н. 50-ти років. Яке з досліджень є найінформативнішим?

A. Гістологічне

- B. Бактеріологічне
- C. Імунологічне
- D. Цитогенетичне
- E. Біохімічне

654. У жінки О. 63-х років під час проведення профілактичного огляду грудних залоз виявлено: почервоніння та потовщення соска лівої молочної залози, наявні кірочки, струпи. Після їх зняття з'явилася волога та зерниста поверхня шкіри. Як називається таке захворювання?

A. Рак Педжета

- B. Рак медулярний
- C. Аденокарцинома
- D. Аденома
- E. Кіста

655. Вихідною базою для визначення витрат кошторису лікарні на наступний рік є затверджені кошторисні асигнування та їх виконання. За який період мають бути ці дані?

A. За поточний рік

- B. За минулий рік
- C. За 2 минулих роки
- D. За 3 минулих роки
- E. За останні 5 років

656. При обстеженні пацієнта з ревматоїдним артритом виявлено проблему: біль у суглобах. З ураження яких суглобів починається дане захворювання?

A. Дрібні суглоби кистей рук і стоп

- B. Великі суглоби верхніх кінцівок
- C. Кульшові суглоби
- D. Плечові суглоби
- E. Великі суглоби нижніх кінцівок

657. Рецензент статті науково-медичного журналу приступає до написання рецензії. Що насамперед йому необхідно зробити?

A. Визначити актуальність статті

- B. Написати анотацію
- C. Прочитати та проаналізувати зміст журналу в цілому
- D. Переказати зміст статті
- E. Написати резюме

658. Робота, в якій критично оцінюються основні положення та результати дослідження, звертається увага на актуальність теоретичних положень, оригінальність підручників,

достовірність отриманих результатів, - це:

A. Рецензія

B. Стаття

C. Анотація

D. Навчальний посібник

E. Монографія

659. Пацієнтові Ф. 59-ти років проводиться резекція шлунку під загальним знеболюванням. Об'єктивно: обличчя бліде, зіниці розширені, тонус м'язів різко знижений. АТ- 90/60 мм рт.ст. Якій стадії наркозу відповідають такі ознаки?

A. III

B. I

C. II

D. IV

E. V

660. У дитини 6-ти місяців раптово виникла зупинка дихання, шкіра вкрита холодним липким потом, чути гучний вдих - "півнячий крик". З яких незалежних медсестринських втручань необхідно почати невідкладну допомогу?

A. Натискання на корінь язика

B. Ввести 50% розчин анальгін

C. Ввести 0,5% седуксен

D. Ввести 1% розчин нікотинової кислоти

E. Проведення штучної вентиляції легень

661. У дитини 5-ти років після вживання в їжу полуниць розвинулася кропив'янка. Який з ентеросорбентів потрібно застосувати в даному випадку?

A. Ентеросгель

B. Кларитин

C. Фенкарол

D. Тавегіл

E. Цетрин

662. Дитина 4-х років стала дратівливою, погано спить, скаржиться на біль в животі, сильний свербіж у ділянці перианальних складок. Яке захворювання можна припустити?

A. Ентеробіоз

B. Трихоцефальоз

C. Коліт

D. Аскаридоз

E. Ентерит

663. При огляді хворої дитини 3-х років медична сестра виявила: "зірчастий"геморагічний висип на тілі, блювання, ригідність м'язів потилиці, підвищення температури до 38оЯке захворювання можна припустити?

A. Менінгококцемія

B. Мала хорея

C. Туберкульозний менінгіт

D. Геморагічний васкуліт

E. Екламсія

664. Медичній сестрі потрібно нагодувати недоношену новонароджену дитину. Відсутні смоктальний і ковтальний рефлекси. Вкажіть найдоцільніший метод годування дитини:

A. Через зонд

B. Парентеральний

C. З ложечки

D. З пляшечки

E. Прикладання до грудей

665. Захворювання є результатом довготривалого перенапруження м'язів плечового поясу. Зустрічається у робітників різних професій: ковалів, малярів, кочегарів, вантажників тощо. Об'єктивно: визначається невелика припухлість і помірна болючість при пальпації плечового суглобу. Яке це захворювання?

A. Періартрит плечового суглобу

B. Стенозуючий лігаментит

C. Крепітуючий тендовагініт передпліччя

D. Асептичний остеонекроз

E. Координаційний невроз

666. У пацієнта Н. проведено пробу за Зимницьким: 6:00-90 мл; 9:00-110 мл; 12:00-100 мл; 15:00-150 мл; 18:00-120 мл; 21:00-80 мл; 24:00-160 мл; 3:00-50 мл. Який це ряд?

A. Динамічний, інтервальний

B. Варіаційний, інтервальний

C. Динамічний, дискретний

D. Динамічний, моментний

E. Ранговий, згрупований

667. У місті К. від вроджених вад померло троє дітей до 28-ми днів. Який це показник?

A. Неонатальна смертність

B. Загальна смертність

C. Рання неонатальна смертність

D. Постнеонатальна смертність

E. Спеціальна смертність

668. У дитячій поліклініці було щеплено 2117 дітей до 14-ти років та прочитано 1117 лекцій в дитячих дошкільних та шкільних закладах. Які заходи були проведені?

A. Первинні профілактичні

B. Амбулаторні

C. Вторинні профілактичні

D. Лікувально-діагностичні

E. Медичні

669. Якому освітленню надається перевага при організації робочого місця маніпуляційної медсестри?

A. Природне

B. Штучне

C. Мішане

D. Люмінесцентними лампами

E. Не має значення

670. Який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, якщо зацікавленість у результатах є високою, як з боку керівництва лікарні, так і з боку працівників середньої медичної ланки:

A. Співпраця

B. Тиск

C. Уникнення

D. Примирення

E. Переговори

671. Медсестрою-бакалавром приймального покою проведено опитування пацієнта 72-х років. Після цього вона поговорила з родичами пацієнта, які супроводжували його, і дізналася, що пацієнт перебільшує симптоми свого захворювання. Як називається така поведінка пацієнта?

A. Агравация

B. Симуляція

C. Дисимуляція

D. Апеляція

E. Атаксія

672. Під час профілактичного обстеження в жіночій консультації у пацієнтки Л. 65-ти років під час пальпації молочних залоз виявили ущільнення розміром 0,5 см в діаметрі у верхньому квадранті правої молочної залози. Яке з перерахованих нижче обстежень слід провести першочергово?

A. Мамографія

B. Загальноклінічні аналізи

C. Рентгенографія

D. Біопсія

E. Сцинтиграфія

673. У клініку звернувся пацієнт 29-ти років зі скаргами на біль в животі, який виникає через 15-20 хв. після прийому їжі, відрижку кислим. Як характеризується цей біль?

A. Ранній

B. Пізній

C. Голодний

D. Оперізуючий

E. Періодичний

674. У пацієнта спостерігаються болі в епігастральній ділянці, періодичні, сезонні, тісно пов'язані з прийомом їжі (через 15-45 хвилин після приймання їжі), зменшуються після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання характерна дана картина?

A. Виразкова хвороба шлунку

B. Жовчнокам'яна хвороба

C. Гастрит

D. Езофагіт

E. Дискінезія жовчовивідних шляхів

675. До приймального відділення доставлено пацієнта з виразковою хворобою шлунку. Раптово у хворого розпочалося блювання кольору кавової гущі. Суб'єктивно пацієнт почуває себе задовільно, може рухатися самостійно. Як хворого необхідно транспортувати?

A. На каталці-ношах

B. В кріслі-каталці

- С. Самостійною ходою
- Д. Пішки при підтримці медсестри
- Е. Ліфтом у супроводі медсестри

676. В хірургічному відділенні готується до планової операції пацієнт К. 55-ти років, в анамнезі якого порушення периферичного кровообігу нижніх кінцівок. Яке ускладнення може виникнути в післяопераційний період?

- А. Тромбоз вен**
- В. Розвиток пневмонії
- С. Динамічна кишкова непрохідність
- Д. Запалення країв рани
- Е. Реактивний психоз

677. Надається допомога постраждалому 35-ти років, в якого була стиснута нижня кінцівка більше 4-х годин. Яка першочергова дія під час надання допомоги?

- А. Накласти джгут вище стиснення**
- В. Ввести дихальні та серцеві аналептики
- С. Виконати інфузію реополіглюкіну
- Д. Звільнити стиснуту кінцівку
- Е. Виконати блокаду кінцівки

678. У соматичному відділенні лікується дитина 8-ми місяців з пневмонією. Яка інформація стосовно догляду за дитиною буде найбільш корисною для матері?

- А. Частіше брати на руки, змінювати положення в ліжку**
- В. Вимірювати температуру тіла через 2 години
- С. Поїти через кожні 30 хвилин
- Д. Стежити за кольором шкіри
- Е. Підраховувати через кожні 10 хвилин кількість дихань за 1 хвилину

679. Старша медична сестра відділення читає лекцію з теми "Ринок медичних послуг". Які функції притаманні ринку охорони здоров'я?

- А. Інформаційна, ціноутворювальна, регулююча, посередницька**
- В. Ціноутворювальна, інтеграційна, посередницька, управлінська
- С. Інформаційна, коригувальна, посередницька, контролююча
- Д. Контролююча, інформаційна, регулююча, благодійницька
- Е. Ціноутворювальна, коригувальна, регулююча, посередницька

680. Старша медична сестра відділення готується до лекції на тему: "Інформаційне забезпечення управління". До яких документів належить Статут?

- А. Організаційні**
- В. Інформаційні
- С. Розпорядчі
- Д. Фінансово-розрахункові
- Е. Інші

681. Головна медична сестра лікарні готується до лекції з теми "Управління конфліктами та стресами". Вкажіть основні компоненти переговорів:

- А. Обмін інформацією**
- В. Ведення бесіди

- C. Наявність спільної мети
- D. Наявність протилежних поглядів та думок
- E. Наявність інтриг

682. Поділ тексту наукової роботи на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків та їх нумерації має назву:

- A. Рубрикація тексту
- B. Робота над остаточним варіантом рукопису
- C. Вибірковий виклад матеріалів
- D. Групування матеріалу в бібліографічних описах
- E. Впорядкування внутрішньотекстових посилань

683. Дитині 6 місяців. Надійшла до стаціонару з діагнозом "пневмонія". $t_{38,5}$ Під час огляду: ознаки двобічної пневмонії, в III міжребір'ї зліва від грудини вислуховується грубий систолічний шум. Імовірно вроджена вада серця. Коли можна провести ЕхоКГ?

- A. Після нормалізації температури тіла
- B. Після одужання від пневмонії
- C. Одразу
- D. Немає обмежень в часі
- E. Натщесерце

684. Через 10 днів після перенесеної ангіни дівчина 19-ти років звернулася до дільничного лікаря у зв'язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабкості. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, $t_{37,4}$ C, ЧСС- 98/хв., АТ- 165/98 мм рт.ст. Серцеві тони приглушені, акцент II тону над аортою. Сеча темно-червоного кольору, 400 мл на добу. До якого відділення слід госпіталізувати хвору?

- A. Нефрологічне
- B. Терапевтичне
- C. Урологічне
- D. Кардіологічне
- E. Інфекційне

685. В ході складання річного звіту головна медична сестра повинна графічно відобразити динаміку загального рівня захворюваності серед населення за останні 5 років. Який вид діаграми вона використає?

- A. Стовпчикова
- B. Секторна
- C. Картограма
- D. Внутрішньостовпчикова
- E. Радіальна

686. У пацієнта 19-ти років після укусу невідомої комахи раптово з'явилися інтенсивний свербіж шкіри, почервоніння, висипання, які виступають над поверхнею шкіри. Пізніше виникли різні за розміром пухирці, заповнені прозорою рідиною, температура тіла підвищилася до $38,0$ Який діагноз найбільш імовірний?

- A. Кропив'янка
- B. Сироваткова хвороба
- C. Геморагічний діатез
- D. Набряк Квінке

Е. Анафілактичний шок

687. Під час проведення плевроцентезу пацієнт 65-ти років став блідим, млявим, шкіра вкрилася холодним потом. Дихання прискорене, поверхнєве, пульс швидкий, слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений. Який препарат необхідно терміново ввести парентерально, за стандартом надання невідкладної допомоги?

А. Кофеїн

В. Атропін сульфат

С. Корглікон

Д. Глюкозу

Е. Реополіглюкін

688. Хворий перебуває в хірургічному відділенні після апендектомії. Вкажіть фактор високого ризику, який затримує відновлення дихальної системи у даного пацієнта:

А. Застосування морфіну

В. Спинномозкова анестезія

С. Тривалі блювання

Д. Діабет

Е. Зупинка дихання під час операції

689. Медична сестра хірургічного відділення спостерігає у хворого 48-ми років післяопераційне тремтіння. Чим можна зняти даний стан у пацієнта?

А. Інгаляція кисню

В. Зігрівання хворого

С. Протисудомні засоби

Д. Заспокійливі засоби

Е. Протиаритмічні засоби

690. Пацієнта Ю. 21-го року готують до планового оперативного втручання, він попередньо погодився з планом лікування. Коли востаннє підтверджується згода цього пацієнта на операцію?

А. Безпосередньо перед премедикацією

В. Напередодні операції

С. У день операції зранку

Д. Перед письмовою згодою

Е. Під час написання письмової згоди

691. Як часто медична сестра повинна контролювати пульс, артеріальний тиск та загальний стан хворого в перший день після операції?

А. Через кожні 2 години

В. Через кожну годину

С. Через кожні 30 хвилин

Д. Через кожні 4 години

Е. Через кожні 6 годин

692. Головний лікар міської лікарні у методах свого керівництва виключає хаотичність, діє відповідно до заздалегідь спланованих схем. Така поведінка забезпечує досягнення поставленої мети. Вкажіть тип діяльності керівника:

А. Діловий

- В. Ліберальний
- С. Компромісний
- Д. Авторитарний
- Е. Колегіальний

693. Існує багато методик оцінки ефективності досліджень, але всі вони зводяться до того, що основною оцінкою реального вкладу за рік виступає:

А. Коефіцієнт економічної ефективності

- В. Сума коштів, вкладених в наукову тематику
- С. Тривалість розробки
- Д. Ступінь відповідності вирішення завдань поставленим вимогам
- Е. Глибина опрацювання тематики

694. В ході активного патронажу медична сестра проводить обстеження пацієнтки 32-х років з ознаками залізодефіцитної анемії. Вкажіть основну можливу причину, визначену медичною сестрою, яка спровокувала дану патологію:

А. Постійна крововтрата

- В. Аутоімунні захворювання крові
- С. Хронічний гепатит
- Д. Вплив іонізуючого опромінення
- Е. Резекція тонкої кишки

695. Патронажна медична сестра дитячої поліклініки підраховує відсоток дітей, які перебували на грудному вигодовуванні до 4-х місяців життя. Вкажіть показник за яким Ви це визначите:

А. Екстенсивний

- В. Інтенсивний
- С. Показник наочності
- Д. Показник співвідношення
- Е. Показник укомплектованості

696. До системи добровільного фінансування охорони здоров'я належить:

А. Приватне страхування

- В. Загальне оподаткування
- С. Соціальне медичне страхування
- Д. Обов'язкове медичне страхування

697. До групи зовнішніх факторів, що впливають на ціноутворення на медичні послуги, належать:

А. Рівень попиту

- В. Цілі ціноутворення
- С. Витрати
- Д. Державне регулювання
- Е. Змінні витрати

698. Завданням медичних працівників на першому етапі диспансеризації є групування так званого диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать хворі з хронічними захворюваннями в стадії субкомпенсації?

А. 4

В. 2

- C. 5
- D. 1
- E. 3

699. Що можна обрати за одиницю спостереження при вивченні загальної захворюваності дітей на гострі респіраторні хвороби (ГРЗ) у поліклініці?

- A. Випадок захворювання ГРЗ у дитини
- B. Випадок захворювання на хвороби органів дихання
- C. Випадок госпіталізації при ГРЗ
- D. Випадок догляду за дитиною, хворою на ГРЗ
- E. Дитина хвора на грип

700. Дитині 3 місяці. Об'єктивно: виражена блідість слизових оболонок, шкірних покривів, підвищена пітливість, особливо голови, неспокій, "облисіння" потилиці. Вигодовування штучне. Про яке захворювання свідчить даний стан дитини?

- A. Рахіт, початковий період
- B. Рахіт, період розпалу
- C. Анемія
- D. Рахіт, період реконвалесценції
- E. Рахіт, період залишкових явищ

701. Охарактеризуйте, який із способів розв'язання конфлікту слід обрати, коли людину мало турбує, що вона отримає в результаті, як для себе, так і для іншої сторони:

- A. Уникнення
- B. Тиск
- C. Примирення
- D. Співпраця
- E. Компроміс

702. При аналізі народжуваності найвищий показник в області спостерігався серед жінок 22-х років. Який це показник?

- A. Віковий
- B. Загальний
- C. Показник народжуваності
- D. Середній
- E. Тотальний

703. В поліклініці проводили диспансерне спостереження людей за соціальними показниками. Які групи людей було охоплено в ході спостереження?

- A. Працівники навчальних та харчових закладів
- B. Хворі на окремі хронічні захворювання
- C. Часто та тривало хворіючі
- D. Особи, які мають донозологічні стани
- E. Студенти навчальних закладів

704. Дев'ятимісячна дитина під наглядом лікаря-педіатра проходить лікування рахіту. Яка з перерахованих нижче доз вітаміну D є лікувальною?

- A. 2000 - 5000 МО
- B. 500 - 1000 МО

- C. 250 - 500 МО
- D. 1000 - 2000 МО
- E. 5000 - 10000 МО

705. До стаціонару доставлено дитину 2-х років, у якої 3 години тому під час гри з мозаїкою почався напад непродуктивного кашлю. Об'єктивно: дитина збуджена, температура тіла нормальна. Що може бути причиною такого стану?

A. Стороннє тіло у дихальних шляхах

- B. Бронхіальна астма
- C. Бронхіт
- D. ГРВІ
- E. Пневмонія

706. У пацієнта 42-х років туберкульоз легень. Вкажіть найбільш оптимальний препарат для терапії даного пацієнта:

A. Рифампіцин

- B. Канаміцин
- C. Ампіокс
- D. Цефтріаксон
- E. Еритроміцин

707. Основні джерела інформації, які характеризують захворюваність за даними медичних оглядів (цільових, попередніх, періодичних), - це:

A. Список осіб, що підлягають медичним оглядам

- B. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів
- C. Талон амбулаторного пацієнта
- D. Листок непрацездатності
- E. Статистична карта пацієнта, що вибув зі стаціонару

708. У пацієнта з хронічним гломерулонефритом спостерігаються нудота, блювання, свербіння шкіри. Об'єктивно: стан важкий, психічна загальмованість, шкіра суха, запах аміаку з рота, АТ-190/110 мм рт.ст., тони серця приглушені, аритмічні, ЧСС- 76/хв. Який стан виник у пацієнта?

A. Уремія

- B. Гіпоглікемія
- C. Гіперглікемія
- D. Ниркова колька
- E. набряк легенів

709. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на болі в суглобах, субфебрильну температуру. При огляді: на спинці носа і щоках висип, що нагадує крила метелика. Погіршення стану пов'язує з перебуванням на сонці. Розвиток якого захворювання можна припустити?

A. Системний червоний вовчак

- B. Ревматичний артрит
- C. Гострий лейкоз
- D. Ревматоїдний артрит
- E. Кропив'янка

710. У дівчинки 4-х років $t_{\text{о}} = 37,4^{\circ}\text{C}$, утруднене носове дихання, слизовосерозні виділення з носу, захриплість голосу, грубий кашель. Для якого захворювання на тлі ГРВІ характерні ці

зміни?

A. Гострий ларингіт

B. Гострий фарингіт

C. Гострий трахеїт

D. Гострий бронхіт

E. Обструктивний бронхіт

711. У хлопчика 9-ти місяців життя надмірний вологий кашель, задишка з утрудненим видихом, дистанційні хрипи, ЧДР- 52\хв., ЧСС- 110\хв., температура тіла - 36,9оНа що треба звернути увагу в першу чергу при плануванні сестринського обстеження?

A. Частота дихальних рухів

B. Частота серцевих скорочень

C. Температура тіла

D. Аускультация легень

E. Характер харкотиння

712. Жінка 30-ти років, яка перебуває в психіатричному диспансері з діагнозом маніакально-депресивний психоз у стані депресії, вже 3-й день поспіль відмовляється від приймання їжі. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?

A. Вдатися до годування через зонд

B. Продовжувати переконувати у необхідності поїсти

C. Дочекатися власної ініціативи пацієнтки поїсти

D. Попросити допомоги у сусідів по палаті

E. Ввести хворій снодійне

713. У новонародженої дитини на шкірі тулуба, голови, у природних складках шкіри з'явилися пухирі розміром з просяне зерно з серозно-гнійним вмістом. Для якого захворювання це характерно?

A. Везикулопустульоз

B. Пухирчатка новонароджених

C. Псевдофурункульоз

D. Фурункульоз

E. Герпес-інфекція

714. Вкажіть вік, з якого недоношеним дітям починають проводити профілактику рахіту:

A. 10-20-й день життя

B. 2-й місяць життя

C. 5-й день життя

D. 3-й місяць життя

E. Одразу після народження

715. Чоловік працює акумуляторщиком протягом 12-ти років. Доставлений в хірургічне відділення зі скаргами на різкий переймоподібний біль у животі, нудоту, блювання, відсутність випорожнень впродовж 2-х діб. В анамнезі - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. При огляді: живіт втягнутий; при пальпації: розлитий біль, переважно навколо пупка. Симптоми подразнення очеревини негативні. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

A. Свинцева колька

B. Гострий апендицит

C. Гострий панкреатит

D. Гострий холецистит

E. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки