

1. Під час профілактичного огляду пацієнту проводили оцінку гігієнічного стану ротової порожнини за допомогою фарбування жувальними таблетками. Окрім зубних відкладень на вестибулярній поверхні 42, 43 зубів виявлено плями, що зафарбувалися барвником. Про який патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

**a. Гострий початковий карієс**

b. Хронічний поверхневий карієс

c. Гострий поверхневий карієс

d. Гіпоплазія емалі

e. Ерозія емалі

2. Потерпілий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав черепно-мозкову травму та перелом щелепи. Як провести тимчасову зупинку сильної кровотечі у щелепно-лицьовій ділянці?

a. Накласти холодний компрес

b. Накласти міхур з льодом

c. Надати пацієнту положення з опущеною головою

**d. Притиснути загальну сонну артерію**

e. Накласти джгут

3. Які лампи використовують для знезараження повітря та поверхонь у стоматологічному кабінеті?

a. Фотополімерні

b. Світлодіодні

c. Розжарювання

d. Люмінесцентні

**e. Бактерицидні**

4. Для дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у стоматологічній клініці передбачено проведення генерального прибирання у комплексі заходів, спрямованих на попередження поширення інфекції. Вкажіть, з якою кратністю проводиться цей вид прибирання.

**a. 1 раз на тиждень**

b. Щодня

c. У кінці робочої зміни

d. 1 раз на місяць

e. На початку робочої зміни

5. Який інструмент використовують для механічного розширення кореневих каналів?

a. Каналонаповнювач

b. Спредер

c. Коренева голка

d. Плагер

**e. Дрильбор**

6. Чоловік віком 67 років звернувся до лікаря-стоматолога для видалення коренів 37 та 36 зубів. Пацієнту планується проведення аплікаційної анестезії перед проведенням провідникової анестезії. Яка концентрація розчину лідокаїну використовується для аплікаційної анестезії?

a. 25%

b. 30%

c. 20%

**d. 10%**

e. 15%

7. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування 37 зуба. Який метод дослідження треба виконати для контролю якості проведеного лікування?

**a. Рентгенологічне дослідження**

b. Термопробу

c. Глибоке зондування

d. ЕОД

e. Бактеріологічне дослідження

8. Пацієнтка віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття оскоми на зубах верхньої щелепи протягом 2-х тижнів. Під час огляду в пришийковій ділянці 11 та 21

зубів виявлено білі плями з матовим відтінком і нечіткими контурами, що інтенсивно сприймають барвники. Що треба підготувати для проведення лікування?

- a. Композитний матеріал
- b. Ремінералізуючі розчини**

- c. Антисептичні розчини
- d. Муміфікуючу пасту
- e. Нітрат срібла для імпрегнації

9. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект. Під час огляду виявлено, що 11 зуб змінений у кольорі (рожево-фіолетового відтінку). З анамнезу відомо: зуб був раніше ендодонтично лікований. Яка помилка під час ендодонтичного лікування може спричинити ці наслідки?

- a. Недостатня механічна обробка кореневого каналу
- b. Травма периапікальних тканин
- c. Перфорація стінки кореневого каналу
- d. Виведення пломбувального матеріалу за верхівку кореневого каналу

**e. Неправильний вибір пломбувального матеріалу**

10. У пацієнтки віком 26 років під час лікування гострого глибокого карієсу 36 зуба випадково була відкрита пульпова камера зуба. Який лікарський засіб треба підготувати в цьому разі?

- a. Пасту на основі миш'яку
- b. Склоіономірний цемент
- c. Ізолюючу прокладку

**d. Одонтотропну пасту**

e. Пасту на основі параформальдегіду

11. Для хірургічної дезінфекції рук рекомендовано застосовувати засоби на основі спирту. Яка частка спирту має бути в дезінфікуючих розчинах?

- a. 100%
- b. 55%
- c. 30%
- d. 65%**
- e. 40%

12. Пацієнту із гострим періодонтитом 47 зуба проведено інфільтраційну анестезію в ділянці набряклих тканин навколо зуба. Після введення анестетика пацієнт не відчув змін. Чому ефект знеболювання не настав?

- a. -
- b. Алергічна реакція на анестетик
- c. Лікування не потребує знеболювання

**d. Неправильно вибраний вид анестезії**

e. Недостатня кількість введенного препарату

13. До комплексної програми профілактики основних стоматологічних захворювань входить обстеження стану тканин пародонту. Який діагностичний індекс треба застосувати, щоб оцінити потребу у лікуванні захворювань тканин пародонту у дітей віком 15 років?

a. OHI-S (Гріна-Вермільйона)

**b. CPITN (BOO3)**

- c. Індекс Рамф'єрда
- d. РМА (Парма)
- e. PI (Рассела)

14. Назвіть відбитковий матеріал, який належить до силіконової групи і застосовується під час виготовлення металокерамічного мостоподібного протеза.

- a. Репін
- b. Уреен
- c. Ортокор
- d. Редонт

**e. Speedex**

15. Під час лікування карієсу 16 зуба у підлітка віком 15 років для пломбування застосовано композитний матеріал, що має розмір частинок наповнювача 8-45 мкм. Який композитний

матеріал застосовано для пломбування?

- a. Мікрогібридний
- b. Нанонаповнений
- c. Гібридний
- d. Мікрофільний

e. Макрофільний

16. Як називається методика ендодонтичного лікування зубів під час якої кореневу частину пульпи насичують речовинами, що глибоко дифундують, муміфікують і перетворюють її на септичний тяж або склоподібну масу?

- a. Ампутація
- b. Девіталізація

c. Імпрегнація

- d. Екстирпація
- e. Ремінералізація

17. Під час обробки каріозної порожнини лікар-стоматолог видаляє всі патологічно змінені тканини зуба. Що спричиняє зміну кольору коронки зуба після неякісного препарування каріозної порожнини?

- a. Значне стоншення шару емалі
- b. Опік твердих тканин зуба
- c. Перегрів та запалення пульпи зуба
- d. Запалення та пошкодження ясенного сосочка

e. Розм'якшений дентин насичується пігментами

18. Яке положення треба надати пацієнту в разі стану непритомності?

- a. Сімса
- b. На животі
- c. На боці
- d. Фаулера

e. Тренделенбурга

19. Пацієнт скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи, кровотечу з носа. Об'єктивно спостерігається: рухомість верхньої щелепи, подовження середньої третини обличчя, кровотеча з носа, нудота, блювання, крововилив у кон'юнктиву. Яке травматичне ушкодження виникло?

- a. Перелом зуба
- b. Вивих нижньої щелепи
- c. Вивих верхньої щелепи
- d. Перелом верхньої щелепи

e. Перелом нижньої щелепи

20. Уявіть, що ви стали свідком надзвичайної ситуації та помітили постраждалого. Виберіть крок, згідно алгоритму MARCH, який є найбільш пріоритетним до виконання?

- a. Відновлення дихання
- b. Особиста безпека
- c. Запобігання гіпотермії

d. Зупинка кровотечі

e. Накладання шини

21. Для яких маніпуляцій використовують спредер під час ендодонтичного лікування?

a. Латеральної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

- b. Внесення пломбувального матеріалу в кореневий канал
- c. Розпломбування кореневих каналів під час повторного ендодонтичного лікування
- d. Горизонтальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі
- e. Вертикальної конденсації гутаперчевих штифтів у кореновому каналі

22. Яку назву має хейліт, спричинений підвищеною чутливістю червоної облямівки губ до інсоляції?

a. Актинічний

- b. Атопічний
- c. Екзематозний

- d. Метеорологічний
- e. Ексфолюативний

23. Під час огляду семирічної дівчинки лікар-стоматолог виявив на присінкових поверхнях 11, 21, 31, 41 зубів і на горбиках 16, 26, 36, 46 зубів темні плями. З анамнезу відомо, що зуби прорізалися ураженими. Лікар встановив діагноз: флюороз. Надлишок якого хімічного елемента в питній воді буде причиною виникнення цього захворювання?

- a. Кальцію
- b. Йоду

**c. Фтору**

- d. Фосфору
- e. Заліза

24. Батьки шестимісячної дівчинки скаржаться на наявність сироподібного нальоту на слизовій оболонці щік та язика в дитини. Після огляду лікар-стоматолог встановив діагноз: гострий кандидозний стоматит. Який збудник викликає це захворювання?

- a. Спірохета Венсана
- b. Паличка Леффлера

**c. Дріжджоподібні гриби**

- d. Веретеноподібна паличка
- e. Вірус герпесу

25. П'ятнадцятирічному хлопцю планується видалення 14 зуба за ортодонтичними показаннями. Коронка зуба збережена. Які щипці треба підготувати для видалення зуба?

- a. Байонетні

**b. S-подібні**

- c. Прямі
- d. Дзьобоподібні зі щічками, що сходяться
- e. Дзьобоподібні зі щічками, що не сходяться

26. Яку пробу треба виконати для контролю якості передстерилізаційного очищення стоматологічного інструментарію від залишків крові?

- a. З Суданом III
- b. -

**c. Амідопіринову**

- d. Тетрациклінову
- e. Фенолфталеїнову

27. Після використання стоматологічного інструментарію була проведена його дезінфекція та передстерилізаційне очищення. Яка мета передстерилізаційного очищення?

- a. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- b. Знищення вірусів
- c. Знищення патогенних видів мікроорганізмів
- d. Знищення всіх видів мікроорганізмів

**e. Видалення білкових, жирових і механічних забруднень**

28. Під час ортопедичного прийому планується зняття відбитків щелеп. Вкажіть, який інструментарій необхідний лікарю-стоматологу-ортопеду для отримання відбитка альгінатною масою.

- a. Каталізатор та інгібітор
- b. Блокнот для замішування та стоматологічне скельце

**c. Гумова колба та шпатель для замішування**

- d. Гумові рукавички та каталізатор для затвердіння
- e. Шпатель для замішування та стоматологічне скельце

29. Асистент лікаря-стоматолога проводить рентгенологічне дослідження 24, 25 та 26 зубів. Які з обстежуваних зубів мають найчастіше три корені?

- a. Нижні премоляри
- b. Нижні моляри

**c. Верхні моляри**

- d. Верхні премоляри
- e. Верхні ікла

30. Лікар-стоматолог проводить визначення індексу гігієни Федорова-Володкіної у дітей молодшого шкільного віку. Який розчин треба підготувати для проведення цієї процедури?

- a. Йодисто-калієвий
- b. Фуксину
- c. Фурациліну
- d. Еритрозину
- e. Метиленового синього

31. Стоматологічне дзеркало застосовують для огляду порожнини рота. Яке зображення дає поверхня дзеркала?

- a. Обернене, збільшене, дійсне
- b. Пряме, зменшене, уявне
- c. Пряме, збільшене, уявне
- d. Пряме, зменшене, дійсне
- e. Обернене, збільшене, уявне

32. Виберіть метод лікування хронічного середнього карієсу тимчасового моляра у шестирічної дитини.

- a. Ремінералізація
- b. Пломбування
- c. Видалення
- d. Протезування
- e. Герметизація

33. Під час профілактичного огляду дітей віком 8-12 років лікар-стоматолог іноді виявляє білі плями на вестибулярних поверхнях фронтальної групи зубів верхньої щелепи, що прорізалися з цими дефектами. Під час фарбування метиленовим синім плями не зафарбовуються. Про який імовірний діагноз свідчать ці ознаки?

- a. Ерозія емалі
- b. Гострий поверхневий карієс
- c. Некроз емалі
- d. Гострий початковий карієс
- e. Гіоплазія емалі

34. Для дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у стоматологічній клініці передбачено проведення генерального прибирання, у комплексі заходів спрямованих на попередження поширення інфекції. Вкажіть з якою кратністю проводиться цей вид прибирання.

- a. 1 раз на місяць
- b. 1 раз на тиждень
- c. У кінці робочої зміни
- d. Щодня
- e. На початку робочої зміни

35. Уявіть, що ви стали свідком надзвичайної ситуації та помітили постраждалого. Виберіть крок, згідно з алгоритмом MARCH, який є найпріоритетнішим до виконання?

- a. Зупинка кровотечі
- b. Накладання шини
- c. Запобігання гіпотермії
- d. Особиста безпека
- e. Відновлення дихання

36. Після стоматологічного прийому необхідно провести стерилізацію медичних виробів, у конструкції яких використовуються термолабільні матеріали. Який метод стерилізації доцільно застосувати?

- a. -
- b. Повітряний
- c. Паровий
- d. Хімічний
- e. Кип'ятіння

37. Лікар-стоматолог проводить ендодонтичне лікування першого премоляра верхньої щелепи.

Який варіант рентгенологічного дослідження треба провести асистенту лікаря-стоматолога?

- a. Панорамний рентген
- b. Тривимірний рентген
- c. Контрастний рентген
- d. Прикусний рентген

**e. Прицільний рентген**

38. Дівчина віком 17 років скаржиться на печіння та сухість слизової оболонки порожнини рота. Із анамнезу відомо, що пацієнтка хворіє на цукровий діабет протягом трьох років. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка щік суха, вкрита білим нальотом, що легко знімається. Встановлено діагноз: кандидозний стоматит. Яку мазь доцільно рекомендувати для лікування в цьому разі?

a. Еритроміцинову

**b. Клотримазолову**

c. Ланолінову

d. Преднізолонову

e. Інтерферонову

39. Що треба підготувати для лікаря-стоматолога з метою видалення надлишків композитного матеріалу та для попереднього полірування приясенних ділянок реставрацій у ділянці переходу пломбувального матеріалу на емаль на контактних поверхнях зубів?

a. Полірувальні диски

b. Полірувальні щітки

c. Гумові головки

**d. Полірувальні штрипси**

e. Фінішні алмазні бори

40. Який час перебування (експозиції) стоматологічного інструментарію в дезінфекційному розчині 3%-го хлораміну?

a. 45 хв

b. 90 хв

**c. 60 хв**

d. 50 хв

e. 30 хв

41. Лікар-стоматолог проводить лікування гострого глибокого карієсу 27 зуба. Який метод дослідження можна застосувати для визначення рівня некретомії?

a. Метод трансліюмінації

b. Термопробу

**c. Фарбування карієс-маркером**

d. ЕОД

e. Люмінесцентну діагностику

42. Лікар-стоматолог готується до останнього етапу пломбування зуба. Які інструменти йому знадобляться?

**a. Фініри, поліри, оклюзійний папір, штрипси**

b. Фініри, поліри, оклюзійний папір, матриці

c. Фініри, гладилка, оклюзійний папір, штопфер

d. Фреза, поліри, екскаватор, штрипси

e. Штопфер, поліри, оклюзійний папір, штрипси

43. Яке з передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота та червоної облямівки губ належить до факультативних передраків із високою потенціальною злоякісністю?

a. Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ

b. Бородавчастий передрак червоної облямівки губ

**c. Папіломатоз піднебінний**

d. Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті

e. Еритроплакія Кейра

44. Пацієнту показано видалення 21, 22 зубів через загострення хронічного періодонтиту. Коронкові частини 21, 22 зубів зруйновані на 1/2. Який інструмент треба вибрати для видалення?

а. Дзьобоподібні щипці

**б. Прямі щипці**

с. S-подібні щипці

д. Байонетні щипці

е. Кутовий елеватор

45. Який препарат треба підготувати в разі виникнення гіпоглікемічної коми в пацієнта?

**а. 40%-ий розчин глюкози**

б. 2,4%-ий розчин еуфіліну

с. 0,05%-ий строфантину

д. 20 ОД інсуліну

е. 0,5%-ий розчин дибазолу

46. Яку пробу треба провести для контролю якості передстерилізаційного очищення стоматологічного інструментарію від залишків крові?

а. -

б. Тетрациклінову

с. З суданом III

д. Фенолфталеїнову

**е. Амідопіринову**

47. Яка кислота і в якій концентрації використовується для протравлювання дентину та емалі у разі застосування адгезивної техніки пломбування каріозних порожнин?

**а. 37%-ий розчин ортофосфорної кислоти**

б. 5%-ий розчин полікарбонових кислот

с. 10%-ий розчин ортофосфорної кислоти

д. 3%-ий розчин ортофосфорної кислоти

е. 15%-ий розчин полікарбонових кислот

48. Ротова порожнина є початком травної системи і складається з присінка та власне порожнини рота. Вкажіть межі власне порожнини рота.

а. Зверху - тверде піднебіння, знизу - м'язи дна порожнини рота, спереду - альвеолярний відросток, з боків - щоки

б. Зверху та знизу - присінок ротової порожнини, спереду - язик та зуби, з боків - ясна та зуби

с. Зверху - вуздечка верхньої губи, знизу - вуздечка нижньої губи, спереду - зуби, знизу - язик

**д. Зверху - тверде та м'яке піднебіння, знизу - язик та дно порожнини рота, спереду та з боків - ясна та зуби**

е. Зверху та знизу - альвеолярний відросток, вкритий слизовою оболонкою, спереду - присінок, з боків - слизова оболонка щік

49. Який інструментарій на ортопедичному прийомі використовує лікар-стоматолог для вигинання кламерів?

а. Байонетні щипці

б. Елеватор

**с. Крампонні щипці**

д. Зонд

е. Пінцет

50. Пацієнту проводиться ендодонтичне лікування 43 зуба. Для антисептичної обробки та видалення ошурків з кореневого каналу використовується розчин гіпохлориту натрію. Яка концентрація цього антисептика використовується для іригації кореневого каналу?

а. 9%

б. 12%

с. 6%

д. 0,03%

**е. 3%**

51. Під час стоматологічного прийому лікар надів нову медичну маску. Як часто треба змінювати маску?

**а. Кожні 2 год**

б. Кожні 4 год

с. Кожні 6 год

- d. Кожні 3 год
- e. Кожні 5 год

52. На ортопантограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня 35 зуба. Скарг немає, перкусія і термопроба негативні, раніше 35 зуб був лікований з приводу глибокого карієсу. Для якого захворювання характерна ця рентгенологічна картина?

- a. Хронічний фіброзний періодонтит
- b. Хронічний фіброзний пульпіт
- c. Гострий дифузний пульпіт
- d. Хронічний гранулюючий періодонтит
- e. Гострий серозний періодонтит

53. Дев'ятирічна дівчинка отримала опік шкіри обличчя оцтовою кислотою. Який розчин можна застосувати для нейтралізації травмуючої речовини в цьому разі після тривалого промивання ураженої ділянки водою?

- a. Нашатирного спирту
- b. 5%-ий спиртовий розчин таніну
- c. 96%-ий етиловий спирт
- d. 0,05%-ий хлоргексидину біглюконат

e. 2-5%-ий натрію гідрокарбонат

54. Яка помилка, що виникла під час препарування каріозної порожнини, може викликати виникнення вторинного карієсу?

- a. Обламування стінки каріозної порожнини
- b. Перфорація стінки каріозної порожнини
- c. Ушкодження бором прилеглих зубів

d. Недостатнє препарування

- e. Перфорація дна каріозної порожнини

55. У пацієнта діагностовано передпухлинний процес слизової оболонки порожнини рота. Лікар пояснив, що без належного лікування з часом він обов'язково призведе до розвитку раку. Який діагноз встановлено пацієнту?

- a. Кератоакантома
- b. Лейкоплакія
- c. Папіломатоз
- d. Шкірний ріг

e. Обмежений гіперкератоз

56. У пацієнта виявлено каріозну порожнину, розташовану на різальному краї різця, що утворилася через стирання емалі і оголення дентину. До якого класу за класифікацією Г. Блека належить ця каріозна порожнина?

- a. III
- b. I

c. VI

- d. II

e. IV

57. Назвіть відбитковий матеріал, який належить до альгінатної групи і використовується для виготовлення часткового знімного пластинкового протеза.

- a. Ортокор

b. Ypeen

- c. Speedex

d. Репін

- e. Протакрил

58. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт, якому три тижні тому було видалено зуб, зі скаргами на наявність незакритого дефекту слизової оболонки в ділянці видаленого зуба. Об'єктивно спостерігається: порушення закриття лунки в місці видаленого зуба, розростання грануляцій, слизова оболонка в ділянці лунки синюшна. Про яке захворювання можуть свідчити ці ознаки?

- a. Гострий остеомієліт



b. Хронічний періостит

**c. Хронічний альвеоліт**

d. Хронічний остеомієліт

e. Абсцес

59. Під час препарування каріозної порожнини лікар повинен працювати з перервами за відповідної кількості обертів бора та його охолодження. Яке ускладнення виникає у разі недотримання цієї рекомендації?

a. Швидке зношування наконечника

**b. Запалення або загибель пульпи**

c. Збільшення пилу у повітрі

d. Ушкодження прилеглих зубів

e. Швидке затуплення борів

60. Пацієнтка звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в зубах нижньої щелепи від термічних та хімічних подразників. Об'єктивно спостерігається: у пришийковій ділянці 35, 34, 44, 45 зубів дефекти в межах дентину з гладкими, блискучими стінками, що сходяться під кутом. Який найімовірніший діагноз?

a. Некроз твердих тканин

b. Ерозія емалі

c. Системна гіоплазія емалі

d. Гострий середній карієс

**e. Клиноподібний дефект**

61. Назвіть блок стоматологічної установки, до складу якого входять скейлер та наконечники.

a. Освітлювальний блок

b. -

c. Стоматологічне крісло

**d. Блок інструментів**

e. Блок управління

62. Лікар-стоматолог-хірург планує видалення зуба через загострення хронічного періодонтиту. Лікар просить подати йому багнетоподібні щипці. Який зуб планується видаляти?

a. 36 зі зруйнованою коронковою частиною

b. 26 зі збереженою коронковою частиною

**c. 16 зі зруйнованою коронковою частиною**

d. 46 зі збереженою коронковою частиною

e. 33 зуб зі збереженою коронковою частиною

63. Укажіть, яке ускладнення може виникнути під час проведення операції видалення зубів нижньої щелепи.

a. Альвеоліт лунки зуба

b. Неврит нижньоальвеолярного нерва

c. Відламування горба щелепи

d. Проштовхування зуба в гайморову пазуху

**e. Перелом коронки або кореня зуба**

64. Чим треба закапати очі після їх промивання проточною водою у разі потрапляння стороннього тіла на слизову оболонку очей?

a. 0,0002%-м розчином кетаміну

b. 1%-м розчином фурациліну

c. 0,12%-м розчином хлоргексидину

d. 0,1%-м розчином перманганату калію

**e. 30%-м розчином альбуциду**

65. Жінка віком 46 років звернулася до лікаря-стоматолога-хірурга для видалення 16 зуба. Які щипці треба підготувати у цьому разі?

a. Прямі

b. Багнетоподібні коронкові

c. Багнетоподібні кореневі

d. S-подібні ліві

**е. S-подібні праві**

66. Після використання ендодонтичного інструментарію помічник лікаря-стоматолога провів його дезінфекцію та передстерилізаційне очищення. Яка мета дезінфекції?

- a. Механічне знищення забруднень
- b. Знищення умовно-патогенних видів мікроорганізмів
- c. Знищення залишків лікарських препаратів

**d. Знищення патогенних та умовно-патогенних видів мікроорганізмів**

е. Знищення білкових, жирових забруднень

67. Під час обстеження порожнини рота пацієнта було виявлено, що внаслідок звуження верхньої зубної дуги щічні горбки нижніх бічних жувальних зубів розташовані назовні від однойменних верхніх, фронтальні зуби змикаються правильно. Який прикус має пацієнт?

- a. Глибокий
- b. Відкритий
- c. Прогнатичний

**d. Перехресний**

е. Прогенічний

68. Під час препарування каріозних порожнин використовуються алмазні бори різного ступеню зернистості. Який колір має маркувальне кільце алмазного бору, що призначене для кінцевого полірування композиційних пломб?

**a. Білий**

- b. Синій
- c. Зелений
- d. Чорний
- e. Червоний

69. Укажіть, яке ускладнення може виникнути в пацієнта після операції з видалення зуба.

a. Потрапляння зуба в дихальні шляхи

**b. Альвеоліт лунки зуба**

- c. Ушкодження зуба-антагоніста
- d. Проштовхування зуба в м'які тканини
- e. Вивих нижньої щелепи

70. Одним із етапів проведення ендодонтичного лікування в постійних зубах є розширення кореневих каналів. Яким ендодонтичним інструментом проводиться розширення кореневих каналів?

- a. Пульпоекстрактором
- b. Каналонаповнювачем

**c. К-файлом**

- d. Плагером
- e. Спредером

71. Для постійного пломбування каріозної порожнини I класу за Блекум був використаний пломбувальний матеріал світлового затвердіння. Які компоненти входять до складу композитів світлового затвердіння?

- a. Порошок-рідина
- b. Паста-паста

**c. Тільки паста**

- d. Паста-рідина
- e. Тільки порошок

72. Які антисептики належать до групи окисників?

- a. Фурацилін, фуразолідон
- b. Мурашина кислота, борна кислота
- c. Хлорамін Б, хлоргексидина біглюконат
- d. Карболова кислота, соляна кислота

**e. Перекис водню, калію перманганат**

73. Під час огляду порожнини рота дванадцятирічної дівчинки виявлено, що верхні фронтальні зуби повністю перекривають нижні. Бічні зуби у сагітальній і трансверзальній площинах змикаються в межах норми. Встановлено діагноз: глибокий прикус. Порушенням яких функцій

супроводжується ця аномалія?

- a. Дихання, ковтання
- b. Відкушування їжі, вимова звуків**
- c. Дихання, порушення дикції
- d. Відкушування їжі, дихання
- e. Жування, ковтання

74. Який з елементів будови скронево-нижньощелепного суглоба має еліпсоподібну форму, у 2-3 рази більший за суглобову головку, вкритий хрящем, знаходиться на скроневій кістці?

- a. Суглобова ямка**
- b. Суглобова капсула
- c. Суглобова головка
- d. Внутрішньосуглобовий диск
- e. Суглобовий горбок

75. Одним із етапів препарування каріозної порожнини є некректомія розм'якшеного дентину. Який інструмент треба підготувати для проведення цього етапу препарування?

- a. Твердосплавний бор**
- b. Алмазний бор
- c. Карборундова головка
- d. Фінір
- e. Полір

76. Пораненому надається допомога згідно з алгоритмом MARCH. Якою літерою позначено етап виявлення черепно-мозкових травм?

- a. M
- b. R
- c. C
- d. A
- e. H**

77. Перед початком прийому пацієнта лікар-стоматолог провів обробку рук із метою видалення та знищення транзиторної патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Яку назву має обробка, що попереджає розповсюдженню інфекції через руки?

- a. Стерилізація рук
- b. Хірургічна обробка рук
- c. Миття рук
- d. -

**e. Гігієнічна обробка рук**

78. Чоловік віком 40 років звернувся до лікаря-стоматолога для санації порожнини рота. Під час огляду виявлено каріозну порожнину в 45 зубі в межах плащового дентину світлого кольору, що легко знімається за допомогою екскаватора. З анамнезу відомо, що пацієнт відзначає больові відчуття під час вживання солодкого у ділянці цього зуба. Про який патологічний стан можуть свідчити ці результати обстеження?

- a. Гострий поверхневий карієс
- b. Гострий середній карієс**
- c. Хронічний середній карієс
- d. Гострий глибокий карієс
- e. Хронічний глибокий карієс

79. Для проведення розширення кореневих каналів 27 зуба лікарю-стоматологу треба подати К-ример. Яким графічним символом позначено цей вид ендодонтичних інструментів?

- a. П'ятикінцева зірочка
- b. Коло
- c. Трикутник**

- d. Восьмикінцева зірочка
- e. Квадрат

80. На якому тижні вагітності починається мінералізація зачатків перших молочних зубів?

- a. 23-му
- b. 30-му**

с. 6-му

d. 17-му

е. 9-му

81. Підліток віком 14 років звернувся до лікаря-стоматолога для планової санації. Під час стоматологічного огляду лікар виявив порушення крайового прилягання пломби в 16 зубі. Яким інструментом проводять визначення крайового прилягання пломби?

a. Екскаватором

b. Шпателем

c. Зондом

d. Гладилкою

е. Штопфером

82. Як називається патологічний процес, що розвивається після прорізування зубів і характеризується демінералізацією та руйнуванням твердих тканин зуба із подальшим утворенням дефекту у вигляді порожнини.

a. Періодонтит

b. Пульпіт

c. Остеомієліт

d. Карієс

е. Пародонтит

83. Пацієнт скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці видаленого 46 зуба, неприємний запах із рота. З анамнезу відомо, що п'ять днів тому проведено видалення 46 зуба. Об'єктивно спостерігається: комірка видаленого зуба виповнена залишками згустка сірого кольору, слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

a. Гострий альвеоліт

b. Гострий періостит

c. Невропатія трійчастого нерва

d. Гострий остеомієліт

е. Хронічний остеомієліт

84. Потерпілий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав черепно-мозкову травму та перелом щелепи. Як здійснити тимчасову зупинку сильної кровотечі у щелепно-лицьовій ділянці?

a. Накласти міхур з льодом

b. Накласти холодний компрес

c. Накласти джгут

d. Надати пацієнту положення з опущеною головою

е. Притиснути загальну сонну артерію

85. Укажіть назву частини порожнини рота, що обмежена губами і щоками зовні та зубами і яснами зсередини.

a. Власне порожнина рота

b. Присінок порожнини рота

c. Слизова оболонка рота

d. Ретромолярна ділянка

е. Перехідна складка рота

86. У клініку хірургічної стоматології звернувся пацієнт для видалення 13 зуба. Які щипці треба приготувати лікарю-стоматологу-хірургу для проведення цієї операції?

a. Зігнуті по ребру, із щічками, що змикаються

b. S-подібні

c. Багнетоподібні

d. Зігнуті по ребру, із щічками, що не змикаються

е. Прямі

87. Яка кістка належить до кісток лицьового черепа?

a. Решітчаста

b. Лобова

c. Вилична (парна)

d. Тім'яна (парна)

е. Клиноподібна

88. Які інструменти необхідно підготувати для проведення обстеження стоматологічного пацієнта?

- а. Зонд зубний зігнутий, шпатель, пінцет
- б. Дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний, екскаватор
- с. Штопфер, дзеркало стоматологічне, пінцет
- д. Екскаватор, гладилка, дзеркало стоматологічне

е. Зонд зубний зігнутий, дзеркало стоматологічне, пінцет стоматологічний

89. Для лікування карієсу I класу за Блемом у постійних зубах використовують амальгаму. Який складник амальгами підвищує пластичність матеріалу та забезпечує щільне крайове прилягання пломби?

- а. Олово
- б. Срібло

с. Мідь

д. Цинк

е. Ртуть

90. Під час препарування каріозної порожнини в межах емалі використовують турбінні наконечники. Яку швидкість обертання бора може забезпечити цей наконечник?

- а. 100000-200000 об/хв
- б. 20000-70000 об/хв

с. 300000-400000 об/хв

д. 15000-20000 об/хв

е. 50000-100000 об/хв

91. Який найімовірніший шлях передачі вірусних гепатитів В, С та ВІЛ-інфекції у лікувально-профілактичних закладах у разі порушення правил асептики і санітарно-протиепідемічного режиму?

- а. Аліментарний
- б. Повітряно-краплинний
- с. Водний
- д. Контактний

е. Парентеральний

92. Укажіть, за допомогою якої групи матеріалів лікарю найдоцільніше зняти відбиток для виготовлення металокерамічної коронки.

а. Термопластичних мас

б. Силіконових відбиткових матеріалів

с. Гіпсу медичного

д. Альгінатних відбиткових матеріалів

е. Композитних матеріалів

93. У пацієнтки під час огляду виявлено глибоку каріозну порожнину на жувальній поверхні 35 зуба зі світлим розм'якшеним дентином. Зондування дна каріозної порожнини зуба дещо болюче. Який інструмент треба вибрати для некректомії?

а. Зонд

б. Екскаватор

с. Гладилку

д. Штопфер

е. Алмазний бор

94. Для індивідуального догляду за порожниною рота лікар-стоматолог порекомендував семирічній дівчинці зубну пасту з мікроелементами та призначив курс ремінералізаційної терапії. Який із нижченаведених методів належить до екзогенної профілактики карієсу?

а. Вживання продуктів, багатих на кальцій та фтор

б. Накладання фторвмісних лаків на поверхню зубів

с. Вживання морепродуктів

д. Додавання в їжу фторованої солі

е. Вживання таблеток фториду натрію

95. Під час стоматологічного обстеження підлітку віком 16 років встановлено діагноз:

хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба та проведено ендодонтичне лікування. Яким ендодонтичним інструментом проводять пломбування кореневих каналів?

- a. Каналонаповнювачем
- b. К-римером
- c. U-файлом
- d. Пульпоекстрактором
- e. К-файлом

96. Після використання стоматологічного інструментарію асистенту лікаря-стоматолога необхідно провести його дезінфекцію, передстерелізаційне очищення та стерилізацію. Який режим стерилізації стоматологічних інструментів у сухожаровій шафі?

- a. При температурі 120°C - 90 хв
- b. При температурі 140°C - 45 хв
- c. При температурі 160°C - 120 хв
- d. При температурі 180°C - 60 хв
- e. При температурі 200°C - 30 хв

97. Вагітна жінка віком 25 років скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, що з'явилися на 5-му місяці вагітності. Для диференційної діагностики захворювання лікар вирішив провести кольоровий тест. Який барвник треба підготувати для проведення тесту?

- a. Йодинол
- b. 2% розчин метиленового синього
- c. 0,2% розчин хлоргексидину
- d. Йодовмісний розчин Шіллера-Писарева
- e. 2% розчин фтористого натрію

98. До лікаря-стоматолога звернувся пацієнт віком 40 років зі скаргами на виникнення післяопераційної чутливості в ділянці 21 зуба після проведення значної реставрації. Який препарат треба приготувати асистенту для усунення чутливості твердих тканин зубів?

- a. Компомер
- b. Кондиціонер
- c. Ормокер
- d. Десенситайзер
- e. Пасту з тимолом

99. До лікаря-стоматолога звернулася пацієнтка віком 17 років зі скаргами на наявність глибокої каріозної порожнини в 26 зубі. Після проведеного обстеження встановлено діагноз: гострий глибокий карієс 26 зуба. Для проведення лікування асистент лікаря-стоматолога підготувала пасту на основі кальцію гідроксиду. Яка дія препарату?

- a. Протизапальна, одонтотропна
- b. Знеболювальна, седативна
- c. Адгезивна, протизапальна
- d. Антисептична, знеболювальна
- e. Седативна, адгезивна

100. До лікаря-стоматолога звернувся хлопець віком 18 років зі скаргами на випадіння 11 зуба після отриманої травми годину тому. Було вирішено зуб помістити у власну комірку альвеолярного відростка та провести шинування. Як називається ця операція?

- a. Трансплантація
- b. Реплантація
- c. Ампутація
- d. Гемісекція
- e. Імплантація

101. Під час стоматологічного прийому пацієнт знепритомнів, почалися клонічні та тонічні судоми, спостерігається посилене пінисте слиновиділення, мимовільне сечовипускання та дефекація. Який стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

- a. Анафілактичний шок
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Колапс

d. Епілептичний напад

е. Гіпоглікемічна кома

102. Під час обстеження лікарем-стоматологом тринадцятирічного хлопчика виявлено прогнатичний прикус. До патології в якій площині належить цей прикус?

a. Мезіальний

b. Вертикальний

c. Орбітальний

d. Трансверзальний

е. Сагітальний

103. Під час роботи виїзної стоматологічної станції проводилося лікування карієсу зубів у дітей молодших класів. Який пломбувальний матеріал використовується під час застосування ART-методики лікування карієсу в дітей?

a. Текучий композит

b. Силікатний цемент

c. Компомер

d. Композит хімічної полімеризації

е. Склоіономерний цемент

104. Дівчина віком 15 років скаржиться на біль і кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх і верхніх фронтальних зубів набрякла, гіперемована, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки кровоточать від дотику, збільшені в розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 їх висоти. На зубах верхньої і нижньої щелеп встановлена незнімна ортодонтична конструкція (брекет-система). Установіть попередній діагноз.

a. Гіпертрофічний гінгівіт

b. Катаральний гінгівіт

c. Генералізований пародонтит

d. Виразковий гінгівіт

е. Фіброматоз ясен

105. Скільки зубів має повний сформований тимчасовий прикус?

a. 20

b. 32

c. 12

d. 18

е. 24

106. Вагітна жінка віком 26 років звернулася до лікаря-стоматолога для професійної гігієни порожнини рота. Які насадки треба підготувати для проведення завершального етапу видалення зубних відкладень?

a. Міжзубні йоржики

b. Гумові ковпачки

c. Флосети

d. Мануальні скелери

е. Міжзубні стимулятори

107. Пацієнтці віком 35 років встановлено діагноз: ерозія твердих тканин 11, 21, 34, 35, 44, 45 зубів. Який матеріал треба підготувати для пломбування в цьому разі?

a. Амальгаму

b. Композитний матеріал хімічної полімеризації

c. Композитний матеріал світлової полімеризації

d. Склоіономерний цемент

е. Силікатний цемент

108. Які інструменти використовують для обробки твердих тканин зуба?

a. Кулясті бори, екскаватор

b. Кулясті бори, матриці

c. Карборундові головки, плагери

d. Карборундові головки, фініри

е. Кулясті бори, плагери

109. Пацієнтка скаржиться на самовільний наростаючий біль у ділянці нижньої щелепи праворуч, що посилюється під час накушування. З анамнезу відомо: тиждень тому було проведено лікування глибокого карієсу 44 зуба. Об'єктивно спостерігається: вертикальна перкусія 44 зуба різкоболюча, ЕОД - 100 мкА, рентгенологічно виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини в ділянці верхівки кореня 44 зуба. Яка тактика надання допомоги?

- a. Замінити пломбу
- b. Видалити пломбу
- c. Розкрити порожнину зуба та кореневий канал**
- d. Видалити зуб
- e. Провести корекцію пломби

110. Після проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення медичний інструментарій є підготовленим до етапу стерилізації. Хто має право проводити стерилізацію медичних інструментів?

- a. Санітарки
- b. Середній медичний персонал, який має відповідну підготовку**
- c. Медичний персонал, який пройшов інструктаж із техніки безпеки
- d. Працівники, які пройшли навчання
- e. Будь-які працівники відділення

111. Лікар-стоматолог проводить лікування хронічного середнього карієсу 11 зуба. Пломбування каріозної порожнини буде здійснюватися композитним матеріалом світлового твердіння. Яка лампа необхідна для роботи з композитними матеріалами світлового твердіння?

- a. Кварцева
- b. Фотополімерна**
- c. Солюксова
- d. Люмінесцентна
- e. Світлодіодна

112. Який термін зберігання простерилізованих медичних виробів у стерилізаційних коробках з фільтром?

- a. 28 діб
- b. 3 доби
- c. 16 діб
- d. 10 діб
- e. 20 діб**

113. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на неприємні відчуття в 46 зубі під час вживання гарячого. Після огляду встановлено попередній діагноз: хронічний гангренозний пульпіт. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Який діапазон показників ЕОД характерний для хронічного гангренозного пульпіту?

- a. 50-90 мкА**
- b. 80-100 мкА
- c. 15-30 мкА
- d. Більше 100 мкА
- e. 30-40мкА

114. Під час виконання азопірамової проби протягом 1 хв на одному інструменті з усієї партії з'явилося фіолетово-бузкове забарвлення. Що потрібно зробити в цій ситуації?

- a. Промити всю партію інструментів під проточною водою
- b. Простерилізувати всі інструменти, за винятком того, на якому виявилася позитивна азопірамова проба
- c. Промити інструмент під проточною водою
- d. Здійснити повторне передстерилізаційне очищення всієї партії інструментів**
- e. Ополоснути інструмент дистильованою водою та висушити

115. У пацієнта діагностовано дефект коронкової частини 34 зуба, що відповідає II класу каріозних порожнин за Блеком. Визначте топографічне розміщення каріозної порожнини на поверхні зуба в цьому разі.

- a. Контактна поверхня**



- b. Пришийкова ділянка
- c. Жувальна поверхня
- d. Контактна поверхня з ураженням різального краю
- e. Різальний край

116. Пацієнту віком 25 років проводять пломбування 44, 45 та 46 зубів. Для ізоляції відпрепарованих порожнин від ротової рідини використовують тонкий квадрат з латексу. За допомогою якого інструмента зроблено отвори для ізоляції зубів?

**a. Щипці-пробійник**

- b. Щипці-затискачі
- c. Байонетні щипці
- d. Крампонні щипці
- e. Щипці для накладання кламерів

117. Чим обумовлена поява трем і діастем між молочними зубами у період підготовки заміни їх на постійні?

- a. Подовженими комірковими відростками щелеп
- b. Широкою коронковою частиною молочного зуба
- c. Ростом щелеп, більшим розміром зачатків постійних зубів**
- d. Короткими комірковими відростками щелеп
- e. Надмірним жувальним навантаженням

118. Лікар-стоматолог під час препарування каріозної порожнини II класу за Блеком вибрав техніку тунельного методу. Який пломбувальний матеріал раціонально застосовувати у разі вибору цієї методики?

- a. Гібридний композит
- b. Текучий композит**
- c. Макрофільний композит
- d. Мікрофільний композит
- e. Склоіономерний цемент

119. Укажіть, яку першу допомогу необхідно надати потерпілому при переломі нижньої щелепи у ментальному відділі без зміщення.

- a. Накласти тиснучу пов'язку в ділянці поранення та направити потерпілого до щелепно-лицевого відділення
- b. Накласти пращоподібну пов'язку і направити потерпілого до щелепно-лицевого відділення**
- c. Накласти тиснучу пов'язку в ділянці поранення та направити потерпілого до отоларингологічного відділення
- d. Накласти пращоподібну пов'язку і направити потерпілого до отоларингологічного відділення
- e. Накласти головну та тиснучу пов'язки й направити потерпілого до отоларингологічного відділення

120. Лікар-стоматолог проводить пломбування каріозної порожнини II класу за Блеком. У каріозну порожнину після нанесення адгезивної системи потрапила кров. Яка тактика в цьому разі?

**a. Повторне кислотне протравлювання емалі та дентину та нанесення адгезиву**

- b. Обробити каріозну порожнину 3%-м перекисом водню, нанести адгезив
- c. Провести повторне протравлювання дентину, нанести адгезив
- d. Промити та висушити каріозну порожнину, нанести адгезив
- e. Обробити каріозну порожнину спиртом, нанести адгезив

121. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на біль у ділянці зуба верхньої щелепи праворуч. Після огляду встановлено попередній діагноз: гострий обмежений пульпіт 14 зуба. Після проведеної ЕОД діагноз підтвердився. Які показники ЕОД характерні для гострого обмеженого пульпіту?

- a. 60-70 мкА
- b. 100 мкА
- c. 30-40 мкА
- d. 80-90 мкА
- e. 15-30 мкА**

122. Укажіть, чи можна накладати стискальну пов'язку або джгут при пораненні у шию та

кровотечі з сонної артерії.

а. Так, можна. Але з боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка

б. Ні, не можна. Інакше буде механічна асфіксія, бо пов'язка накладається на усю шию

с. Ні, не можна. Інакше буде гіпоксія мозку, що не сумісна з життям

д. Так, можна. Але проводиться трахеотомія

е. Так, можна. Але з протилежного боку кровотечі піднімається рука вгору, охоплюючи голову, та накладається пов'язка

123. Під час лікування карієсу пацієнту було встановлено пломбу з амальгами без ізоляційної прокладки. Яке ускладнення може розвинути у цьому разі?

а. Вторинний карієс

б. Випадіння пломби

с. Верхівковий періодонтит

д. Запалення пульпи

е. Папіліт

124. На якому етапі пломбування каріозної порожнини композитним матеріалом світлової полімеризації треба проводити "фінішне" засвічування матеріалу?

а. Після внесення останньої порції матеріалу

б. Після остаточної обробки пломби

с. Після шліфування пломби

д. Після внесення кожної порції пломбувального матеріалу

е. Після формування пломби

125. Яка кількість коренів і кореневих каналів найчастіше спостерігається у нижньому першому і другому премолярах?

а. Три корені, три канали

б. Два корені, один канал

с. Два корені, два канали

д. Один корінь, один канал

е. Один корінь, два канали

126. Розуміння будови та функцій різних частин ясен допомагає лікарям-стоматологам в ефективному веденні лікування пацієнтів та догляду за здоров'ям порожнини рота. Вкажіть, на які частини поділяють ясна.

а. -

б. Внутрішні та зовнішні

с. Тверді та м'які

д. Прикріплені та вільні

е. Епітеліальні та базальні

127. Пацієнтка віком 18 років звернулася до лікаря-стоматолога зі скаргами на відчуття оскоми на зубах верхньої щелепи протягом двох тижнів. Під час огляду в пришийковій ділянці 11 та 21 зубів виявлено білі плями з матовим відтінком і нечіткими контурами, що інтенсивно сприймають барвники. Що треба підготувати для проведення лікування?

а. Ремінералізаційні розчини

б. Композитний матеріал

с. Антисептичні розчини

д. Нітрат срібла для імпрегнації

е. Муміфікуючу пасту

128. До устаткування стоматологічного кабінету належить електричний мікромотор. Який діапазон регулювання швидкості обертання бора має електричний мікромотор?

а. -

б. Від 100 до 1000 об/хв

с. Від 1000 до 40000 об/хв

д. Від 100000 до 300000 об/хв

е. Від 50000 до 1000000 об/хв

129. Яку температуру застосовують під час стерилізації паровим методом?

а. 110-134°C

- b. 155-170°C
- c. 170-200°C
- d. 135-155°C
- e. 200-220°C

130. У стоматологічній клініці провели стерилізацію використаних інструментів паровим методом без індивідуального пакування. Ці інструменти склали на стерильних столах та накрили стерильними простирадлами. Скільки часу інструменти можуть зберігати свою стерильність у цьому разі?

- a. 12 год
- b. 9 год
- c. 24 год
- d. 6 год
- e. 48 год

131. Що насамперед треба зробити у випадку потрапляння хімічної речовини в око під час надання першої допомоги?

- a. -
- b. Промити уражене око чистою водою
- c. Накласти антисептичну мазь
- d. Закапати в уражене око очні краплі
- e. Накласти пов'язку на уражене око

132. Лікар-стоматолог під час профілактичного огляду запропонував пацієнту розжувати таблетку синього кольору, а потім сполоснути ротову порожнину. Для чого лікар проводить цю процедуру?

- a. Виявлення запального процесу на слизовій оболонці ротової порожнини
- b. Контролю крайового прилягання пломб на зубах
- c. Виявлення запального процесу в яснах
- d. Виявлення каріозних порожнин

e. Контролю гігієнічних навичок пацієнта

133. Після використання стоматологічного інструментарію асистенту лікаря-стоматолога необхідно провести його дезінфекцію, передстерилізаційне очищення та стерилізацію. Який режим стерилізації стоматологічних інструментів у сухожаровій шафі?

- a. При температурі 140°C - 45 хв
- b. При температурі 160°C - 120 хв
- c. При температурі 120°C - 90 хв
- d. При температурі 200°C - 30 хв
- e. При температурі 180°C - 60 хв

134. Пацієнт звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на естетичний дефект переднього зуба. Після огляду встановлено діагноз: гострий середній карієс 23 зуба із локалізацією каріозної порожнини в пришийковій ділянці. Для якого класу каріозних порожнин за Блемом характерна ця локалізація дефекту?

- a. II
- b. IV
- c. I
- d. III
- e. V

135. Вагітна жінка віком 25 років скаржиться на появу білих плям на передніх зубах верхньої щелепи, що з'явилися на п'ятому місяці вагітності. Для диференційної діагностики захворювання лікар вирішив провести кольоровий тест. Який барвник треба підготувати для проведення тесту?

- a. 2%-ий розчин фтористого натрію
- b. 0,2%-ий розчин хлоргексидину
- c. Йодовмісний розчин Шіллера-Писарева
- d. 2%-ий розчин метиленового синього
- e. Йодинол

136. Яка помилка під час пломбування каріозних порожнини може призвести до виникнення

папіліту, гінгівіту, пародонтиту?

**a. Відсутність контактного пункту**

- b. Завищення висоти оклюзії на пломбі
- c. Неправильний вибір пломбувального матеріалу
- d. -
- e. Неправильне накладання ізоляційної прокладки

137. Пацієнт скаржиться на постійний ниючий біль у ділянці видаленого 46 зуба, неприємний запах із рота. Із анамнезу відомо, що п'ять днів тому проведено видалення 46 зуба. Об'єктивно спостерігається: комірка видаленого зуба виповнена залишками згустка сірого кольору, слизова оболонка набрякла, гіперемована. Який найімовірніший діагноз?

a. Гострий періостит

**b. Гострий альвеоліт**

- c. Гострий остеомієліт
- d. Невропатія трійчастого нерва
- e. Хронічний остеомієліт

138. Назвіть, з яких частин складається перший постійний моляр на верхній щелепі справа.

a. Ясна, корінь, пародонт

**b. Коронка, шийка, корінь**

- c. Коронка, корінь, альвеолярний відросток
- d. Коронка, шийка, ясна
- e. Корінь, пародонт, альвеолярний відросток

139. На ортопантограмі пацієнта, що звернувся для профілактичного огляду, виявлений осередок просвітлення округлої форми розміром до 5 мм у ділянці верхівки кореня 34 зуба. З анамнезу відомо: скарг немає, раніше 35 зуб був ендодонтично лікований. Для якого захворювання характерна ця рентгенологічна картина?

- a. Гострий дифузний пульпіт
- b. Гострий серозний періодонтит
- c. Хронічний гранулюючий періодонтит

**d. Хронічний гранулематозний періодонтит**

e. Хронічний фіброзний пульпіт

140. Для індивідуального догляду за порожниною рота лікар-стоматолог порекомендував семирічній дівчинці зубну пасту з мікроелементами та призначив курс ремінералізувальної терапії. Який із нижченаведених методів відноситься до екзогенної профілактики карієсу?

**a. Накладання фторвмісних лаків на поверхню зубів**

- b. Вживання продуктів, багатих кальцієм та фтором
- c. Додавання в їжу фторованої солі
- d. Вживання морепродуктів
- e. Вживання таблеток фториду натрію

141. У пацієнта виявлено каріозну порожнину, розташовану на різальному краї різця, що утворилася через стирання емалі і оголення дентину. До якого класу за класифікацією Г. Блека відноситься ця каріозна порожнина?

**a. VI**

- b. II
- c. I
- d. III
- e. IV

142. На прийомі у лікаря-стоматолога через емоційне напруження та страх перед маніпуляцією пацієнт відчув дискомфорт, відчуття нудоти, запаморочення, шум у вухах, неясність зору, нестачу повітря, появу холодного поту, оніміння язика, губ, кінчика носа. Який невідкладний стан, найімовірніше, виник у пацієнта?

- a. Асфіксія
- b. Анафілактичний шок
- c. Колапс
- d. Алергічна реакція
- e. Непритомність**

143. Лікар-стоматолог планує провести обстеження первинного пацієнта. Для цього він просить асистента подати градуйований зонд. З якою метою лікар-стоматолог використовує цей інструмент?

- a. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах верхньої щелепи
- b. Провести замірювання довжини вуздечки язика
- c. Провести дослідження міжзубних сосочків
- d. Дослідити глибину зубо-ясенного прикріплення**

e. Дослідити наявність каріозних порожнин на зубах нижньої щелепи

144. Пацієнту віком 50 років на прийомі у лікаря-стоматолога потрапило стороннє тіло у верхні дихальні шляхи, що спричинило обтураційну асфіксію. Вкажіть подальші дії лікаря, якщо дістати стороннє тіло неможливо.

- a. Проводимо поштовхи за Геймліхом**
- b. Проводимо інтубацію
- c. Проводимо трахеотомію
- d. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо непрямий масаж серця
- e. Просимо пацієнта лягти на спину та проводимо штучну вентиляцію легень

145. У підлітка віком 17 років для пломбування карієсу 16 зуба лікар-стоматолог застосував амальгаму. Яким інструментом амальгамову масу вносять у підготовлену порожнину?

- a. Амальгамтрегером**
- b. Штопфером
- c. Екскаватором
- d. Кюретою
- e. Гладилкою

146. У чотирирічної дівчинки під час огляду лікарем-стоматологом виявлено каріозну порожнину на жувальній поверхні 55 зуба в межах плащового дентину з широким вхідним отвором. Дно та стінки каріозної порожнини щільні, пігментовані, під час зондування не болячі. Який матеріал найдоцільніше застосувати для пломбування?

- a. Полікарбоксилатний цемент
- b. Силікофосфатний цемент
- c. Амальгаму
- d. Цинк-фосфатний цемент
- e. Склоіономерний цемент**

147. Укажіть, чи можна накладати давлячу пов'язку чи джгут під час поранення у шию та кровотечі з сонної артерії.

- a. Так, можна. Але з боку кровотечі піднімається рука вгору охоплюючи голову та накладається пов'язка
- b. Так, можна. Але з протилежного боку кровотечі піднімається рука вгору охоплюючи голову та накладається пов'язка**
- c. Так, можна. Але проводиться трахеотомія
- d. Ні, не можна. Інакше буде механічна асфіксія, бо пов'язка накладається на усю шию
- e. Ні, не можна. Інакше буде гіпоксія мозку, що не сумісна з життям

148. Після стоматологічного прийому необхідно виконати повну обробку інструментів. Яка послідовність обробки використаного стоматологічного інструментарію?

- a. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація**
- b. Передстерилізаційне очищення, стерилізація
- c. Передстерилізаційне очищення, дезінфекція, стерилізація
- d. -
- e. Передстерилізаційне очищення, стерилізація, дезінфекція

149. У пацієнта віком 45 років лікар-стоматолог діагностував гострий обмежений пульпіт 44 зуба. Об'єктивно спостерігається: порожнина рота санована, гігієна в задовільному стані. З анамнезу відомо: пацієнт соматично здоровий. Що є протипоказанням до лікування пульпіту біологічним методом у цьому разі?

- a. Соматичні захворювання
- b. Інтенсивність каріозного процесу
- c. Вік понад 30-35 років**

- d. Стан гігієни порожнини рота
- e. Вік понад 18-20 років

150. Як, за перебігом, називається карієс, що супроводжується множинним ураженням практично всіх зубів, часто в одному зубі виникають 2-3 каріозні порожнини?

- a. Квітучим
- b. Хронічним
- c. Ускладненим
- d. Гострим
- e. Рецидивним

151. Що належить до допоміжного обладнання стоматологічного кабінету?

- a. Стоматологічне крісло
- b. Стоматологічний пересувний стілець
- c. Стоматологічний рентген апарат

- d. Рукомийник для миття рук
- e. Стоматологічна установка

152. Пацієнт скаржиться на біль та рухомість верхньої щелепи, кровотечу з носа. Об'єктивно спостерігається: рухомість верхньої щелепи, подовження середньої третини обличчя, кровотеча з носа, нудота, блювота, крововилив у кон'юнктиву. Яке травматичне ушкодження виникло?

- a. Перелом нижньої щелепи
- b. Перелом зуба
- c. Вивих верхньої щелепи
- d. Перелом верхньої щелепи
- e. Вивих нижньої щелепи

153. На терапевтичному прийомі лікар-стоматолог використовує алмазні бори, що відрізняються за розміром робочої частини, властивостями алмазу, щільністю посадки алмазного зерна. Який середній розмір зерна в алмазного бора з червоним маркуванням?

- a. 180 мкм
- b. 50 мкм
- c. 30 мкм
- d. 135 мкм
- e. 100 мкм

154. Пацієнт віком 27 років звернувся до лікаря-стоматолога зі скаргами на випадіння пломби та наявність великої каріозної порожнини в 37 зубі. З анамнезу відомо, що раніше в зубі було проведено ендодонтичне лікування. Для відновлення анатомічної форми зуба лікар вирішив застосувати методику "сендвіч-техніки". Які матеріали потрібно підготувати асистенту лікаря-стоматолога для пломбування каріозної порожнини?

- a. Компомер та силікатний цемент
- b. Композит та силікофосфатний цемент
- c. Текучий композит та компомер
- d. Текучий композит та силікатний цемент
- e. Композит та склоіономерний цемент

155. Що із нижченаведеного належить до загальної профілактики карієсу?

- a. Покриття поверхні зубів фторлаком
- b. Вживання таблеток фториду натрію
- c. Герметизація фісур
- d. Полоскання ремінералізаційними розчинами
- e. Раціональна гігієна порожнини рота

156. Одним із найрозповсюдженіших і доступних засобів місцевої профілактики карієсу зубів у наш час треба вважати використання фторвмісних зубних паст. Яка найнижча межа норми фтору в питній воді?

- a. 0,5 мг/л
- b. 2 мг/л
- c. 0,3 мг/л
- d. 1 мг/л

е. 1,2 мг/л

157. Після стоматологічного обстеження підлітка віком 16 років лікар-стоматолог встановив діагноз: хронічний фіброзний пульпіт 36 зуба. Пацієнту проведено ендодонтичне лікування. Яким інструментом проводять видалення судинно-нервового пучка?

а. Спредером

**б. Пульпоекстрактором**

с. Плагером

д. Римером

е. Каналонаповнювачем

158. Назвіть поверхню зуба, на якій найчастіше для профілактики карієсу проводять герметизацію?

**а. Жувальна**

б. Контактна

с. Вестибулярна

д. -

е. Оральна

159. Під час стоматологічного прийому пацієнт знепритомнів, почалися клонічні та тонічні судоми, спостерігається посилене пінисте слиновиділення, мимовільне сечовипускання та дефекація. Який стан найімовірніше виник у пацієнта?

а. Гіпоглікемічна кома

б. Анафілактичний шок

**с. Епілептичний напад**

д. Гіперглікемічна кома

е. Колапс

160. Під час профілактичного огляду пацієнта на ортопантограмі виявлено в ділянці верхівки кореня 12 зуба осередок просвітлення кісткової тканини з нечіткими межами у вигляді язиків полум'я. Об'єктивно спостерігається: зуб змінений у кольорі, на яснах у ділянці верхівки кореня наявний рубець. Для якого захворювання характерна ця рентгенологічна картина?

**а. Хронічний гранулюючий періодонтит**

б. Хронічний фіброзний періодонтит

с. Хронічний гангренозний пульпіт

д. Хронічний гранулематозний періодонтит

е. Хронічний гіпертрофічний пульпіт

161. Укажіть відбитковий матеріал, що належить до групи на основі окису цинку й евгенолу та використовується для отримання відбитків індивідуальною ложкою при повній відсутності зубів на щелепі.

а. Уреен

**б. Репін**

с. Speedex

д. Ортокор

е. Фторакс

162. Дівчина віком 16 років під час тренування на спортивній секції отримала травму. Скаржиться на біль у ділянці нижньої щелепи праворуч. Під час огляду порушення цілісності шкірних покривів не виявлено, спостерігається незначний набряк у ділянці тіла нижньої щелепи праворуч, відкривання рота не обмежене. Яку невідкладну допомогу треба надати в цьому разі?

**а. Холод на травмовану ділянку в перші 30 хв**

б. Застосувати слабодезінфікуючу мазь

с. Призначити протинабрякову терапію

д. Компрес 2-5%-им розчином натрію гідрокарбонату

е. Обробити ділянку шкіри антисептиком

163. Під час препарування каріозних порожнин використовуються алмазні бори різного ступеня зернистості. Який колір має маркувальне кільце алмазного бору, призначеного для кінцевого полірування композиційних пломб?

**а. Синій**

**b. Білий**

c. Зелений

d. Чорний

e. Червоний

164. Одним із найрозповсюдженішим і доступним засобом місцевої профілактики карієсу зубів у наш час треба вважати використання фторвмісних зубних паст. Яка найнижча межа норми фтору в питній воді?

a. 1 мг/л

b. 2 мг/л

**c. 0,5 мг/л**

d. 1,2 мг/л

e. 0,3 мг/л

165. Який комплекс заходів буде здійснювати асистент лікаря-стоматолога для знищення мікроорганізмів у рані та в патологічному осередку?

**a. Антисептику**

b. Передстерилізаційне очищення

c. Дезінфекцію

d. Асептику

e. Стерилізацію

166. Дівчина віком 15 років скаржиться на біль і кровоточивість ясен під час вживання їжі та чищення зубів. Об'єктивно спостерігається: слизова оболонка ясен у ділянці нижніх і верхніх фронтальних зубів набрякла, гіперемована, має ціанотичний відтінок. Ясенні сосочки кровоточать від дотику, збільшені в розмірах і перекривають коронкові частини зубів на 1/3 їхньої висоти. На зубах верхньої і нижньої щелеп встановлена незнімна ортодонтчна конструкція (брекет-система). Установіть попередній діагноз.

a. Фіброматоз ясен

b. Катаральний гінгівіт

**c. Гіпертрофічний гінгівіт**

d. Виразковий гінгівіт

e. Генералізований пародонтит