

1. Батьки восьмирічного хлопчика звернулися до лікаря зі скаргами на відставання дитини у зрості. І
  - a. Визначення рівня гонадотропного гормону
  - b. Визначення рівня тиреотропного гормону
  - c. Визначення рівня лютеїнізуючого гормону
  - d. Визначення рівня соматотропного гормону
  - e. Визначення рівня адренокортикотропного гормону
2. Батьки п'ятирічного хлопчика скаржаться на постійний кашель із виділенням гнійного мокротиння в
  - a. Лаваж бронхіального дерева
  - b. Генно-інженерна терапія
  - c. Тривала антибіотикотерапія
  - d. Кінезотерапія
  - e. Видалення уражених сегментів легень
3. Батьки тримісячної дитини скаржаться на мляве смоктання та появу задишки в дитини, яка посилює
  - a. Пропранолол
  - b. Аденозин
  - c. Лідокаїн
  - d. Дигоксин
  - e. Верапаміл
4. Батьки трирічного хлопчика скаржаться на появу в дитини пухлиноподібного утворення в животі. Об
  - a. Крижово-куприкова тератома
  - b. Пухлина Вільямса
  - c. Гострий пієлонефрит
  - d. Вроджений гідронефроз
  - e. Карбункул нирки
5. Батьки хлопчика (вік 6 місяців) стурбовані тим, що її дитина не отримувала жодних щеплень. Об'єкт
  - a. Ввести вакцину БЦЖ
  - b. Ввести вакцину БЦЖ, КПК та АКДС
  - c. Провести пробу Манту та записати на прийом через 2-3 дні
  - d. Відкласти вакцинацію та записати на прийом через тиждень
  - e. -
6. В однорічного хлопчика спостерігається зниження апетиту, млявість. Об'єктивно виявлено: стан сере
  - a. Гемолітична анемія
  - b. Гострий лейкоз
  - c. Гіпопластична анемія
  - d. Таласемія
  - e. Залізодефіцитна анемія
7. В однорічної дівчинки з першого місяця життя спостерігається постійний кашель, мокротиння відділя
  - a. Бронхіоліт
  - b. Ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт
  - c. Синдром Картагенера
  - d. Муковісцидоз
  - e. Гострий обструктивний бронхіт
8. Вагітна віком 23 роки перебуває в пологовій залі протягом 10-ти годин з регулярною пологовою діял
  - a. Клінічно вузький таз
  - b. Фізіологічний перебіг II періоду пологів
  - c. Передчасне відшарування плаценти
  - d. Загроза розриву матки
  - e. Дискоординація пологової діяльності
9. Вагітна віком 25 років направлена до стаціонарного відділення для лікування. В анамнезі: 2 мимові
  - a. Не чекати виникнення самовільного абортів, увести утеротонічні препарати
  - b. Ліжковий режим із призначенням седативних препаратів
  - c. Провести амніоцентез та перервати вагітність
  - d. Накласти циркулярний шов на шийку матки
  - e. Провести гормональне лікування
10. Вагітну жінку віком 22 роки шпиталізовано зі скаргами на різко болючі перейми по 25-30 секунд, ч

а. Дискоординована пологова діяльність

**б. Загроза розриву матки**

с. Надмірно бурхлива пологова діяльність

д. Розрив матки, що відбувся

е. Тетанія матки

11. Вагітну жінку віком 25 років шпиталізовано з переймами впродовж 12-ти годин. Перейми тривають

а. Дистоція шийки матки

б. Вторинна слабкість пологової діяльності

с. Фізіологічний перебіг пологів

д. Первинна слабкість пологової діяльності

**е. Дискоординована пологова діяльність**

12. Восьмиденну дитину шпиталізовано до лікарні зі скаргами батьків на неспокій, зригання, підвищені

**а. Флегмона новонароджених**

б. Вроджена пухлина м'яких тканин

с. Бешиха

д. Адипонекроз

е. Гемангіома

13. Восьмирічна дитина скаржиться на болісне сечовипускання і часті випускання сечі малими порціями

а. Низхідний

б. Гематогенний

с. Лімфогенний

д. Контактний

**е. Висхідний**

14. Восьмирічна дитина скаржиться на слабкість, головний біль, озноб та підвищення температури тіла

а. Риновірусна інфекція

б. Респіраторно-синцитіальна інфекція

с. Грип

д. Парагрип

**е. Аденовірусна інфекція**

15. Восьмирічна дівчинка скаржиться на біль у ділянці серця, відчуття серцебиття. Із анамнезу відомо

а. Ендокардит

б. Функціональні зміни в серці

с. Вроджена вада серця

**д. Міокардит**

е. Вегетативна дисфункція

16. Восьмирічна дівчинка скаржиться на виражені набряки обличчя, попереку, передньої черевної стінки

**а. Преднізолон**

б. Фуросемід

с. Ізоніазид

д. Ванкоміцин

е. Метамізол натрію

17. Восьмирічний пацієнт спостерігається через затримку зросту. Народився в асфіксії з масою тіла 28

а. Хондродистрофія

б. Синдром Дауна

**с. Гіпофізарний нанізм**

д. Синдром Фанконі

е. Краніофарінгіома

18. Восьмирічний хлопчик скаржиться на підвищену втомлюваність, порушення сну, погіршення апетиту

а. Залишкові явища перенесеного гепатиту В

**б. Розвиток хронічного гепатиту**

с. Дискінезія жовчних ходів

д. Розвиток цирозу печінки

е. Рецидив вірусного гепатиту В

19. Дванадцятирічна пацієнтка скаржиться на високу температуру тіла, біль у м'язах, утруднене ковтан

а. Вузликовий періартеріїт

- b. Склеродермія
- c. Ювенільний ревматоїдний артрит
- d. Системний червоний вовчак

e. Дерматоміозит

20. Дванадцятирічний хлопчик скаржиться на відчуття серцебиття, перебої та біль у серці, задишку. Ці

- a. -
- b. Верапаміл

c. Дигоксин

d. Еналаприл

e. Бісопролол

21. Дванадцятирічній дитині встановлено діагноз: двобічна пневмонія мікоплазмової етіології, легкий

- a. Аміноглікозиди
- b. Цефалоспорины I покоління

c. Макроліди II покоління

d. Протигрибкові

e. Амінопеніциліни

22. Дворічна дитина була в контакті з хворим на оперізуючий герпес. На 15-й день контакту в неї підв

- a. Простий герпес
- b. Оперізуючий герпес

c. Вітряна віспа

d. Натуральна віспа

e. Ентеровірусна екзантема

23. Дворічна дитина захворіла гостро з появи таких симптомів: підвищення температури тіла до 37,8^oC

- a. Гострий простий бронхіт
- b. Гострий обструктивний ларинготрахеїт

c. Гострий обструктивний бронхіт

d. Спазмофілія

e. Бронхіальна астма

24. Дворічного хлопчика шпиталізовано з приводу зменшення маси тіла, нестійких випорожнень, аноре

- a. Розробка індивідуального плану харчування з великим вмістом клітковини
- b. Рентгенографія органів черевної порожнини
- c. Призначення антибіотиків широкого спектру дії
- d. Негайне оперативне втручання

e. Визначення IgA до тканинної трансглютамінази

25. Дворічну дівчинку шпиталізовано до лікарні зі скаргами матері на підвищення температури тіла до

- a. Стороннє тіло нижніх дихальних шляхів
- b. Гострий бронхіт

c. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

d. Ангіоневротичний набряк Квінке

e. Напад бронхіальної астми

26. Дев'ятирічна дитина скаржиться на біль у верхній третині правої гомілки, підвищення температура

- a. Гостра ревматична гарячка
- b. Злоякісна пухлина кістки
- c. Перелом кісток правої гомілки
- d. Туберкульозний артрит

e. Гострий гематогенний остеомієліт

27. Дев'ятирічна дівчинка скаржиться на гарячку, профузне потовиділення, біль у суглобах і серці. Об

a. Вузликовий періартеріїт

b. Системна склеродермія

c. Дерматоміозит

d. Гранулематоз Вегенера

e. Системний червоний вовчак

28. Дев'ятирічний хлопчик скаржиться на підвищення температури тіла до 38-39^oC, носові кровотечі,

a. Мієлограму

b. Загальний аналіз крові

- c. Імунологічний комплекс
- d. Рентгенографію ОГК
- e. УЗД черевної порожнини

29. Десятирічна дитина скаржиться на млявість та зниження апетиту. Під час об'єктивного обстеження

- a. Гемолітична анемія
- b. В<sub>12</sub> -фолієводефіцитна анемія**
- c. Залізодефіцитна анемія
- d. Апластична анемія
- e. Постгеморагічна анемія

30. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль в епігастральній ділянці натщесерце, часто вночі, біль п

- a. Гострий гастрит
- b. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки**
- c. Функціональна диспепсія
- d. Виразкова хвороба шлунка
- e. Гострий панкреатит

31. Десятирічний хлопчик лікувався в кардіологічному відділенні з діагнозом: ревматизм, I атака, акт

- a. Біцилін-5**
- b. Біцилін-1
- c. Оксацилін
- d. Еритроміцин
- e. Ампіцилін

32. Десятирічний хлопчик скаржиться на експіраторну задишку. Погіршення стану пов'язує з зміною ме

- a. beta<sub>2</sub>-агоністи короткої дії**
- b. Лоратадин
- c. Адреналін (епінефрин)
- d. Теофілін
- e. Дексаметазон

33. Десятирічний хлопчик скаржиться на закладеність носу. Відомо, що подібні симптоми виникають пе

- a. Алергічний риніт**
- b. Гострий аденоїдит
- c. Гострий риніт
- d. Рекурентне респіраторне захворювання
- e. Гострий гайморит

34. Десятирічного хлопчика шпиталізовано з симптомами артриту та міокардиту. Встановлено поперед

- a. Зональна гіперемія суглоба
- b. Ураження великих суглобів
- c. Ранкова скутість рухів в суглобах**
- d. Збільшення розмірів серця
- e. Збільшення частоти серцевих скорочень

35. Десятирічну дівчинку шпиталізовано з проявами кардиту. В анамнезі: два тижні тому було загостре

- a. Стрептокок**
- b. Стафілокок
- c. Клебсієла
- d. Протей
- e. Пневмокок

36. Дитина народилася від 1-ї вагітності, яку супроводжував гестоз 1-ї та 2-ї половини. Пологи відбу

- a. Хвороба Гіршпрунга
- b. Пілоростеноз**
- c. Адреногенітальний синдром
- d. Пілороспазм
- e. Кишкова непрохідність

37. Дитина народилася з масою тіла 3250 г та довжиною тіла 52 см. У віці 1,5 місяців фактична маса д

- a. Аерофагія**
- b. Пілороспазм
- c. Пілоростеноз

- d. Атрезія стравоходу
- e. Гострий гастроентерит

38. Доношена дівчинка народилася від II вагітності, яка перебігала з загрозою переривання на 25-27 т

a. 0 балів

**b. 1 бал**

c. 4 бали

d. 3 бали

e. 2 бали

39. Дівчина віком 16 років скаржиться на напади задишки до 4-5 разів на тиждень, нічні напади 1-2 рази

a. Системних кортикостероїдів

b. Омалізумабу

c. Дезлоратадину

d. Теофілінів уповільненого виділення

**e. Монтелукасту**

40. Дівчина віком 17 років скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів, переймоподі

a. Загроза аборту

b. Аборт, що почався

c. Завмерла вагітність

**d. Неповний аборт**

e. Повний аборт

41. Дівчинка віком 12 років скаржиться на незначні набряки. Із анамнезу відомо, що набряки з'явилися

a. Золотистий стафілокок

b. Кишкова паличка

c. Ентеровірус А

**d. beta-гемолітичний стрептокок групи А**

e. Токсоплазма

42. Дівчинка з масою тіла 3100 г народилася від третьої вагітності в домашніх умовах. На 3-й день ма

a. Уведення імуноглобуліну антирезус Rh0 (D) людини

**b. Уведення вітаміну К**

c. Переливання еритроцитарної маси

d. Призначити пероральний прийом препаратів заліза

e. Перехід на штучне вигодовування залізовмісними сумішами

43. Дівчинка народилася від I вагітності, I вагінальних пологів у терміні гестації 39 тижнів (маса -

a. Після проби Манту

b. На 3-тю добу

c. На 1-шу добу

**d. Після уточнення ВІЛ-статусу дитини**

e. Не щепити в жодному разі

44. Жінка віком 19 років перебуває у відділенні патології вагітності з приводу вагітності в терміні

a. Розродження через природні пологові шляхи

**b. Терміновий кесарів розтин**

c. Родостимуляція

d. Продовження вагітності

e. Виведення плода за тазовий кінець

45. Жінка віком 26 років з зтерміном вагітності 36 тижнів скаржиться на інтенсивний головний біль у

a. Ламотриджин

b. Діазепам

c. Тіопентал натрію

d. Натрію вальпроат

**e. Магнію сульфат**

46. Жінка віком 27 років на 10 добу після пологів скаржиться на періодичний переймоподібний біль вни

a. Субінволюція матки

**b. Фізіологічний перебіг післяпологового періоду**

c. Післяпологовий метроендометрит

d. Післяпологовий ендометрит

е. Лактостаз

47. Жінка віком 28 років із терміном вагітності 36 тижнів скаржиться на головний біль, нудоту, блюва

а. Еклампсія

б. Емболія навколоплідними водами

с. Розрив печінки

д. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

е. HELLP-синдром

48. Жінка віком 33 роки з терміном вагітності 35 тижнів скаржиться на набряки на нижніх кінцівках і

а. Продовження інтенсивної терапії

б. Консервативне розродження

с. Підготовка шийки матки для дострокового розродження

д. Негайне розродження шляхом кесаревого розтину

е. Проведення родозбудження

49. Жінка віком 33 роки, з терміном вагітності 35 тижнів, скаржиться на головний біль, порушення зор

а. Епілепсія

б. Еклампсія

с. Черепно-мозкова травма

д. Гіпертонічний криз

е. Тяжка прееклампсія

50. Жінка віком 35 років з терміном вагітності 33 тижні скаржиться на набряки та головний біль. В ан

а. Гіпертензивний криз

б. Помірна прееклампсія

с. Ниркова недостатність

д. Тяжка прееклампсія

е. Еклампсія

51. Жінку віком 20 років шпиталізовано до пологового будинку з регулярною пологовою діяльністю. Під

а. Загроза розриву матки

б. Надмірна пологова діяльність

с. Відшарування нормально розташованої плаценти

д. Слабкість пологової діяльності

е. Дистрес плода

52. Жінку віком 27 років з терміном вагітності 11-12 тижнів шпиталізовано з матковою кровотечею та п

а. Проведення токолітичної терапії

б. Проведення гемотрасфузії

с. Консервативне спостереження

д. Вишкрібання порожнини матки

е. Призначення прогестерону

53. Жінку віком 27 років у терміні вагітності 38-39 тижнів шпиталізовано до пологового відділення з

а. Розрив варикозно розширених вен піхви

б. Бокове передлежання плаценти

с. Неповне передлежання плаценти

д. Повне передлежання плаценти

е. Відшарування нормально розташованої плаценти

54. Жінку віком 32 роки шпиталізовано до пологового будинку. Зі слів родичів дома у вагітної були су

а. Інтенсивна терапія, родорозрішення в терміні 36 тижнів

б. Інтенсивна терапія, родорозрішення впродовж тижня

с. Інтенсивна терапія, родорозрішення впродовж доби

д. Інтенсивна терапія, родорозрішення в терміні 37-40 тижнів

е. Негайне родорозрішення

55. Жінку віком 37 років з терміном вагітності 34 тижні шпиталізовано через кровотечу зі статевих шл

а. Рак шийки матки

б. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

с. Розрив судин пуповини

д. Передлежання плаценти

е. Кровоточива ерозія

56. Жінці віком 20 років з терміном вагітності лікар жіночої консультації призначив повноцінне харчу а. Дистресу плода

b. Вад розвитку нервової системи

c. Затримки розвитку плода

d. Переношування вагітності

e. Прееклампсії

57. Жінці з терміном вагітності 34 тижні проведена доплерометрія пуповинного кровообігу - встановлен

a. Повторна доплерометрія наступної доби

b. Негайний кесарів розтин

c. Ультразвукова фотометрія плода

d. Біофізичний профіль плода

e. Родозбудження окситоцином

58. Мати чотиримісячної дівчинки скаржиться, що у дитини спостерігається зниження апетиту, закрепи

a. Хвороба Гіршпрунга

b. Вроджений гіпотиреоз

c. Трисомія по 21-ій хромосомі

d. Атрезія позапечінкових жовчних протоків

e. Муковісцидоз

59. Матір восьмимісячного хлопчика скаржиться на здуття живота у дитини, рясні, пінисті випорожненн

a. Хвороба Крона

b. Целіакія

c. Лактозна недостатність

d. Кишкова форма муковісцидозу

e. Виразковий ентерит

60. Місячна дитина зригує коли її після годування грудьми вкладають у ліжечко. Під час огляду відхил

a. Дати соску одразу після годування грудьми

b. Масаж живота

c. Вертикальне положення дитини одразу після годування

d. Укладання дитини на живіт після годування

e. Теплові процедури на живіт

61. На 2-й день у новонародженого з'явився еритематозний висип, у подальшому - пухирі розміром бли

a. Псевдофурункульоз

b. Дерматит Ріттера

c. Везикулопустульоз

d. Пухирчатка новонародженого

e. Сепсис

62. На 8-му добу життя у новонародженого хлопчика з масою тіла 3500 г підвищилася температура тіла

a. Токсичний епідермальний некроліз

b. Стафілококовий синдром "обпеченої шкіри"

c. Вроджена вітряна віспа

d. Синдром Стівенса-Джонсона

e. Кропив'янка

63. Недоношена дитина від першої вагітності в терміні 37 тижнів народилась з масою тіла 2400 г та зр

a. Пухирчатка новонароджених

b. Везикулопустульоз

c. Токсоплазмоз

d. Краснуха

e. Вроджена герпетична інфекція

64. Недоношена дитина народилась з масою тіла 1900 г. Переведена до відділення патології новонарод

a. Коли маса тіла збільшиться до 2500 г

b. Коли їй виповниться 1 рік

c. Після усунення ознак неврологічної патології

d. У віці 6 місяців

e. Не щеплювати дитину взагалі

65. Новонародженому з підозрою на внутрішньочерепну пологову травму проведено люмбальну пункцію

- a. Кефалогематома
- b. Епідуральний
- c. Субтенторіальний

d. Субарахноїдальний

- e. Супратенторіальний

66. Одинадцятирічна дівчинка скаржиться на біль у суглобах, підвищення температури тіла до  $38^{\circ}\text{C}$ ,

- a. Вузликовий періартеріт
- b. Геморагічний васкуліт

c. Системний червоний вовчак

- d. Гостра ревматична гарячка
- e. Дерматоміозит

67. Одинадцятирічна дівчинка скаржиться на появу висипу та інтенсивний свербіж шкіри. Із анамнезу

- a. Псоріаз
- b. Кропив'янка

c. Атопічний дерматит

- d. Червоний плоский лишай
- e. Системний червоний вовчак

68. П'ятирічна дитина захворіла гостро з різкого підвищення температури тіла до  $39,5^{\circ}\text{C}$ , вираженого

- a. Синдром Рея
- b. Кір
- c. Тромбоцитопенічна пурпура

d. Менінгококцемія

- e. Геморагічний васкуліт

69. П'ятирічна дитина захворіла гостро, спостерігаються: підвищення температури тіла до  $39,2^{\circ}\text{C}$ , одні

- a. Сальмонельоз
- b. Холера
- c. Гострий апендицит

d. Шигельоз

- e. Ротавірусна інфекція

70. П'ятирічну дівчинку шпиталізовано після електротравми. Об'єктивно спостерігається: стан дитини т

- a. Трансфузія кристалоїдів 10 мг/кг в/в
- b. Інтубація трахеї
- c. Уведення розчину лідокаїну 20 мг в/м

d. Електрична дефібриляція

- e. Прямий масаж серця

71. Пацієнт віком 14 років скаржиться на втомлюваність, наявність набряків на обличчі, головний біль

- a. Хронічний гломерулонефрит
- b. Туберкульоз нирок
- c. Хронічна недостатність кровообігу

d. Хронічна ниркова недостатність

- e. Гостра ниркова недостатність

72. Пацієнт віком 14 років скаржиться на обмеженість рухів у нижніх кінцівках. Захворювання розпочал

- a. Герпетичний менінгоенцефаліт
- b. Травма поперекового відділу хребта
- c. Субарахноїдальний крововилив

d. Поліомієліт

- e. Ботулізм

73. Пацієнт віком 15 років скаржиться на біль у правій клубовій ділянці, втрату маси тіла, випорожне

a. Хвороба Крона

- b. Хронічний невиразковий коліт
- c. Рак товстого кишечника
- d. Хронічний ентероколіт
- e. Виразковий коліт

74. Пацієнт віком 15 років скаржиться на нападоподібний біль у животі під час дефекації, діарею до 6

- a. ФГДС



b. Ректороманоскопію

c. Колоноскопію

d. УЗД органів черевної порожнини

e. Копроцитограму

75. Пацієнт віком 15 років скаржиться на періодичне пожовтіння шкіри. Під час огляду виявлено: відст

a. Портокавальний анастомоз

b. Оментогепатопексія

c. Оментоспленопексія

d. Спленектомія

e. Пересадження селезінки

76. Пацієнт віком 15 років скаржиться на періодичний головний біль, стомлюваність. Об'єктивно спосте

a. Рівень глюкози в крові

b. Наявність ожиріння у членів родини

c. Маса тіла

d. Індекс маси тіла

e. Товщина підшкірної жирової складки

77. Пацієнт віком 16 років скаржиться на головний біль, набряки на нижніх кінцівках, загальну слабкі

a. Сечокам'яна хвороба

b. Гострий гломерулонефрит

c. Туберкульоз нирок

d. Амілоїдоз нирок

e. Гострий пієлонефрит

78. Пацієнт віком 17 років на уроці фізичного виховання раптово втратив свідомість. На місці проведе

a. Дилатаційна кардіоміопатія

b. Неревматичний кардит

c. Гіпертрофічна кардіоміопатія

d. Вегетативна дисфункція

e. Гостра ревматична гарячка

79. Пацієнт віком 17 років скаржиться на біль у горлі ліворуч, біль у лівому вусі, підвищення темпер

a. Заглотковий абсцес

b. Лівобічний паратонзиллярний абсцес

c. Флегмона шиї

d. Парафарингеальна флегмона

e. Паратонзиліт

80. Пацієнт віком 17 років скаржиться на кровоточивість ясен. В анамнезі: носові кровотечі. Об'єктив

a. Перніціозна анемія

b. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

c. Залізодефіцитна анемія

d. Хронічний лімфоцитарний лейкоз

e. Істинна поліцитемія

81. Пацієнт віком 17 років скаржиться на наявність рубаної рани правої стопи. Із анамнезу відомо, що

a. Динамічне спостереження

b. Ввести правцевий анатоксин з дифтерійним анатоксином

c. Ввести правцевий анатоксин та протиправцевий імуноглобулін

d. Ввести правцевий анатоксин

e. Ввести протиправцеву сироватку

82. Пацієнт віком 17 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39,4^{\circ}\text{C}$ , головний біль, блю

a. Туберкульозний менінгіт

b. Менінгококовий менінгіт

c. Герпетичний менінгіт

d. Ентеровірусний енцефаліт

e. Субарахноїдальний крововилив

83. Пацієнт віком 18 років скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до  $37,5^{\circ}\text{C}$ ,

a. Вірусний гепатит В

b. Вірусний гепатит А

- c. Лептоспіроз
- d. Малярія
- e. Черевний тиф

84. Пацієнт віком 20 років скаржиться на появу висипу на шкірі. Об'єктивно спостерігається: на шкірі

- a. Мікробна екзема
- b. Рожевий лишай
- c. Різнокольоровий лишай
- d. Парапсоріаз
- e. Вторинний сифіліс

85. Пацієнт віком 27 років скаржиться на слабкість, двоїння предметів, сухість у роті. Із анамнезу в

- a. Отруєння алкоголем
- b. Ішемічний інсульт мозку
- c. Черевний тиф
- d. Енцефаліт
- e. Ботулізм

86. Пацієнт віком 8 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , мерзлякуватість, проф

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Нирковокам'яна хвороба
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Туберкульоз нирок
- e. Гострий цистит

87. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , озноб, головний біль, поганий сон і

- a. Бешиха
- b. Карбункул
- c. Абсцес
- d. Гідраденіт
- e. Фурункул

88. Пацієнт скаржиться на різкий біль у горлі праворуч, що іррадіює в праве вухо, неможливість відкр

- a. Сіалоаденіт
- b. Паратонзиллярний абсцес
- c. Пухлина піднебінного мигдалика
- d. Парафарингеальний абсцес
- e. Підщелепний лімфаденіт

89. Пацієнта віком 16 років шпиталізовано з укусами бездомної собаки. Об'єктивно спостерігається: в

- a. Призначити антирабічну вакцину та імуноглобулін людини
- b. Призначити антирабічний імуноглобулін та рибавірин
- c. Призначити антирабічний імуноглобулін та антирабічну вакцину
- d. Призначити антирабічну вакцину та рибавірин
- e. Призначити імуноглобулін людини та рибавірин

90. Пацієнта віком 18 рік шпиталізовано на 2-й день хвороби. Об'єктивно спостерігається: загальний с

- a. Гостра серцева недостатність
- b. Церебральна кома
- c. Гостра надниркова недостатність
- d. Гостра печінкова недостатність
- e. Гостра кровотеча

91. Пацієнтка віком 12 років захворіла гостро з підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$  та появи висипу

- a. Скарлатина
- b. Інфекційний мононуклеоз
- c. Псевдотуберкульоз
- d. Кір
- e. Вітряна віспа

92. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на біль у ділянці серця, серцебиття, відчуття жару, запаморо

- a. Вегето-судинна дисфункція
- b. Дифузний токсичний зоб
- c. Неревматичний кардит

- d. Ендемічний зоб
- e. Ревматична хорея

93. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на спрагу, часте сечовиділення, схуднення, свербіж шкіри, мл

a. Хвороба Крона

b. Цукровий діабет

c. Нецукровий діабет

d. Гострий гломерулонефрит

e. Хвороба Іценко-Кушинга

94. Пацієнтка віком 14 років скаржиться на часті, болючі сечовипускання, підвищення температури тіла

a. Цистит

b. Уретрит

c. Тубулоінтерстиціальний нефрит

d. Нейрогенна слабкість сечового міхура

e. Пієлонефрит

95. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на біль у колінних суглобах, серцебиття, задишку, слабкість.

a. Реактивний артрит

b. Вторинна кардіоміопатія

c. Ревматоїдний артрит

d. Гостра ревматична гарячка

e. Інфекційний міокардит

96. Пацієнтка віком 16 роки скаржиться на біль в очі, сльозотечу, світлочутливість і зниження гостро

a. Катаракта

b. Блефарит

c. Кератит

d. Кон'юнктивіт

e. Іридоцикліт

97. Пацієнтка віком 16 років скаржиться на помірний свербіж та випадіння волосся на голові. Об'єктив

a. Псоріаз

b. Мікроспорія

c. Трихофітія

d. Короста

e. Себорея

98. Пацієнтка віком 17 років при зрості 172 см і масі тіла 40 кг вважає себе дуже повною. Останні 2

a. Реакція на стрес

b. Булімія

c. Депресія

d. Розлад особистості

e. Анорексія

99. Пацієнтка віком 17 років скаржиться на біль та набряк II пальця правої кисті. З анамнезу відомо

a. Піднігтьовий панарицій

b. Підшкірний панарицій

c. Шкірний панарицій

d. Еризипелоїд

e. Пароніхія

100. Пацієнтка віком 17 років скаржиться на біль у колінних та гомілковостопних суглобах, підвищенн

a. Реактивний артрит

b. Гостра ревматична гарячка

c. Вузлувата еритема

d. Ревматоїдний артрит

e. Системна склеродермія

101. Пацієнтка віком 18 років із терміном вагітності 36 тижнів скаржиться на головний біль, миготінн

a. Тяжка прееклампсія

b. Еклампсія

c. Епілепсія

d. Гіпертонічна хвороба

е. Помірна прееклампися

102. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на напади чхання, переважно вранці, 15-20 разів поспіль, св

а. Внутрішньошкірна проба

б. Визначення загального IgE

с. Прик-тест

д. Крапельна проба

е. Провокаційна проба

103. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до  $38,5^{\circ}\text{C}$ , каше

а. Туберкульоз

б. Негоспітальна пневмонія

с. Гострий бронхіт

д. Госпітальна пневмонія

е. Бронхіальна астма

104. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на слабкість, помірний головний біль та біль у горлі під ча

а. Дослідження крові на сумарні антитіла до ВІЛ

б. Дослідження крові на IgM anti-HHV-6

с. Дослідження крові на IgM anti-VCA EBV

д. Дослідження крові на IgM anti-HHV-7

е. Дослідження крові на IgM anti-CMV

105. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на затримку менструації протягом 8-ми тижнів. Змінилися сма

а. Рак шийки матки

б. Вагітність

с. Хоріонепітеліома

д. Міома матки

е. Пухирний занос

106. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на нудоту, слабкість, зниження працездатності. Із анамнезу

а. Пухирний занос

б. Вагітність I, 9-10 тижнів

с. Лейоміома матки

д. Позаматкова вагітність

е. Рак тіла матки

107. Пацієнтка віком 40 років з 15 років хворіє на епілепсію з генералізованими епілептичними напада

а. Збільшення кількості великих епінападів

б. Абсанс

с. Епілептичний статус

д. Епілептичний психоз

е. Істеричний напад

108. Пацієнтка скаржиться на сильний біль у горлі з лівого боку, утруднене ковтання та відкривання р

а. Пухлина мигдалика

б. Інфекційний мононуклеоз

с. Паратонзиллярний абсцес

д. Скарлатина

е. Дифтерія

109. Пацієнтку віком 20 років шпиталізовано зі скаргами на перейми нерегулярного характеру та кров'я

а. Повне передлежання плаценти

б. Розрив матки

с. Розрив шийки матки

д. Передчасне відшарування плаценти

е. Крайове передлежання плаценти

110. Пацієнтку віком 27 років із терміном вагітності 15 тижнів шпиталізовано до стаціонару для лікув

а. Зробити амніоцентез

б. Токолітична терапія

с. Провести гормональне лікування

д. Накласти шов на шийку матки

е. Переривання вагітності

111. Пацієнту в стані клінічної смерті проводиться штучна вентиляція легень методом "з рота до рота"

- a. Маленький рот у пацієнта
- b. Проведення непрямого масажу серця
- c. Відсутність зонду в шлунку

d. Западіння язика

- e. Малий об'єм повітря, що вдихається

112. Пацієнтці у терміні вагітності 32 тижні з загрозою передчасних пологів проводиться профілактика

- a. Мізопростол
- b. Гініпрал
- c. Окситоцин
- d. Прогестерон

e. Дексаметазон

113. Першовагітна з'явилася в жіночу консультацію в 37 тижнів вагітності. Скарг немає. Протягом оста

- a. Пролонгування вагітності

b. Шпиталізація до стаціонару

- c. Термінове розродження
- d. Амбулаторне лікування
- e. Кесарський розтин

114. Повторнонароджуючу віком 25 років шпиталізовано в першому періоді пологів з переймами середн

a. Розрив матки

- b. Синдром нижньої порожнистої вени
- c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- d. Емболія навколоплідними водами
- e. Передлежання плаценти

115. При відходженні у жінки навколоплідних вод виявлено, що вони значно забруднені меконієм. Після

- a. ШВЛ маскою та мішком Амбу
- b. Тактильну стимуляцію новонародженого

c. Пряму ларингоскопію, інтубацію, санацію трахеї

- d. Санацію ВДШ гумовим балоном
- e. Внутрішньовенне введення адреналіну

116. Протягом 30 хвилин після народження плода стан породіллі стабільний, матка щільна, куляста, дн

- a. Застосувати спосіб Креде-Лазаревича
- b. Внутрішньовенно ввести окситоцин
- c. Провести кюретаж порожнини матки

d. Провести ручне відокремлення плаценти

- e. Застосувати спосіб Абуладзе

117. Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної висоту стояння дна матки визначено на р

a. 24 тижні

- b. 8 тижнів
- c. 32 тижні
- d. 40 тижнів
- e. 16 тижнів

118. Під час обстеження місячної дитини виявлено: мікрофтальмію, мікроцефалію, гіпотелоризм, двобіч

- a. Синдром Робертса
- b. Синдром Арнольда-Кіарі

c. Синдром Патау

- d. Синдром Лежена
- e. Синдром Дауна

119. Під час огляду дев'ятимісячної дитини ВІЛ-інфікованої жінки виявлено: гіпотрофія 2-го ступеня,

- a. -
- b. Безсимптомне носійство ВІЛ

c. СНІД. Опортуністичні інфекції

- d. Персистуюча генералізована лімфаденопатія
- e. ВІЛ-серопозитивна дитина

120. Під час огляду дитини (вік 4,5 років) виявлено: ознаки зневоднення, свідомість на рівні сопору,

- a. 100 мл/кг
- b. 80 мл/кг
- c. 30 мл/кг
- d. 50 мл/кг
- e. 60 мл/кг

121. Під час огляду дитини на 4-ту добу життя в ділянці шиї, потилиці та сідниць з'явилися пухирці і

- a. Везикулопустульоз
- b. Пухирчатка новонароджених
- c. Пітниця
- d. Флегмона
- e. Бульозний епідермоліз

122. Під час огляду жінки на 3-й день після фізіологічних пологів виявлено: загальний стан задовільн

- a. Гематометра
- b. Субінволюція
- c. Лохіометра
- d. Фізіологічна інволюція
- e. Патологічна інволюція

123. Під час огляду новонародженої дівчинки виявлено крововилив на голові, який не виходить за межі

- a. Кефалогематома
- b. Пухирчатка новонародженого
- c. Пологова пухлина
- d. Водянка мозку
- e. Внутрішньочерепнапологова травма

124. Під час огляду триденної дитини виявлено: криваве блювання, петехіально-плямистий висип, част

- a. Низький рівень VIII і IX факторів згортання крові
- b. Коагулопатія споживання
- c. Низький рівень вітамін К-залежних факторів
- d. Наявність материнських антитіл до тромбоцитів дитини
- e. Інфекційний вплив на кістковомозкове кровотворення

125. Під час огляду у дванадцятирічної дівчинки виявлено ущільнення і незначну припухлість у ділянці

- a. УВЧ на грудну залозу
- b. Антибіотикотерапія
- c. Параареоларний розріз із дренажуванням
- d. Динамічне спостереження без лікування
- e. Радіарний розріз над припухлістю з наступним дренажуванням

126. Під час оцінювання неврологічного статусу новонародженого виявлено: зниження м'язового тону

- a. Параліч Клюбке
- b. Пологова травма: парез Дюшена-Ерба праворуч
- c. Внутрішньочерепнапологова травма
- d. Перелом ключиці
- e. Параліч діафрагмального нерва

127. Під час профілактичного огляду дворічного хлопчика виявлено: збільшення лівої нирки, під час па

- a. Гіпоплазія правої нирки
- b. Дистопія правої нирки
- c. Агенезія правого сечоводу
- d. Ектопія гирла правого сечоводу
- e. Агенезія правої нирки

128. Під час скринінг-дослідження у двотижневого новонародженого виявлено фенілкетонурію. Яке лік

- a. Гормональну терапію
- b. Вітамінотерапію
- c. Антибіотикотерапію
- d. Спеціальну дієту
- e. Сонячні ванни

129. Семимісячну дитину шпиталізовано до хірургічного відділення через 8 годин після початку захворю

- a. Ентерокістома

**b. Інвагінація кишечника**

- c. Подвоєння кишечника
- d. Глистна інвазія
- e. Пухлина черевної порожнини

130. Семирічна дитина скаржиться на біль у животі нападоподібного характеру, який виникає після психічного навантаження.

- a. Антиоксиданти
- b. Седативні та холекінетики
- c. Антибіотики

**d. Спазмолітики та холеретики**

- e. Холеретики та холекінетики

131. Семирічна дитина скаржиться на кашель, нежить, головний біль, підвищення температури тіла до 38,5°C.

- a. Інфекційний моноклеоз
- b. Краснуха

**c. Кір**

- d. Ентеровірусна інфекція
- e. Скарлатина

132. Семирічний хлопчик перебуває на стаціонарному лікуванні протягом 1,5 місяців. Надійшов зі скарг на часті сечовипускання.

- a. Гематуричний
- b. Нефритичний
- c. Ізольований сечовий

**d. Нефротичний**

- e. Змішаний

133. Семирічний хлопчик скаржиться на гнійно-кров'янисті виділення з носа, мацерації крил носа та виразки на верхній губі.

- a. Риновірусна інфекція
- b. Алергічний риніт
- c. Гайморит
- d. Аденовірусна інфекція

**e. Дифтерія носа**

134. Семирічний хлопчик скаржиться на повторювані епізоди нудоти та блювання протягом останніх 3-4 тижнів.

- a. Виразкова хвороба шлунка
- b. Гострий гастрит

**c. Синдром циклічного блювання**

- d. Гострий панкреатит
- e. Хронічний гастрит

135. Стан доношеної новонародженої дитини погіршився у 1-шу добу життя. З анамнезу відомо, що дитина народилася з вагінальними пологів.

- a. АВО-несумісність
- b. Фізіологічна жовтяниця
- c. Атрезія жовчовивідних шляхів
- d. Фетальний гепатит

**e. Rh-несумісність**

136. Тринадцятирічна дитина скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття пульсації в голові, нудоту та блювання.

- a. Стеноз устя легеневої артерії
- b. Дефект міжшлуночкової перетинки

**c. Коарктація аорти**

- d. Відкрита артеріальна протока
- e. Стеноз устя аорти

137. У вагітної віком 30 років триває I період пологів. Передлежання плода - головне. Під час аускулування живота не чути шлуночкових тонованих шумів.

- a. Дистрес плода. Вакуум екстракція плода
- b. Нормальний стан плода. Подальше ведення пологів через природні статеві шляхи
- c. Дистрес плода. Операція накладання порожнинних акушерських щипців
- d. Дистрес плода. Проведення родостимуляції

**e. Дистрес плода. Термінове розродження шляхом кесарева розтину**

138. У вагітної жінки віком 23 роки три години тому відійшли світлі навколоплідні води. Пологова дія не починається.

- a. Прелімінальний період

**b. I період пологів**

- с. II період пологів
- д. III період пологів
- е. Передвісники пологів

139. У вагітної жінки віком 32 роки пологи тривають 10 годин. Пологова діяльність слабка, перейми тривають.

- а. Продовжити консервативне ведення пологів із постійним моніторингом стану плода
- б. Термінове розродження шляхом операції кесаревого розтину**
- с. Спостереження, лікування дистресу плода
- д. Накласти акушерські щипці
- е. Призначити родостимуляцію із застосуванням розчину окситоцину

140. У вагітної жінки з масою тіла 70 кг за 40 хвилин після пологів великим плодом (4500 г) з'явилися ознаки дистресу плода.

- а. Продовжити введення утеротоніків
- б. Компресія черевного відділу аорти
- с. Локальна гіпотермія
- д. Кюретаж стінок порожнини матки
- е. Лапаротомія. Екстирпація матки без додатків**

141. У вагітної з регулярною пологовою діяльністю відійшли навколоплідні води зеленого кольору. Серцебиття плода частіше 160 уд/хв.

- а. Визначення рН навколоплідних вод
- б. Біофізичний профіль плода
- с. Доплерометрія пуповинного кровотоку
- д. Амніоскопія
- е. Кардіотокографія**

142. У восьмимісячної дитини з проявами рахіту II ступеня, підгострого перебігу, періоду розпалу, на грудях з'явилися кісткові виступи.

- а. Менінгіт
- б. ГРВІ
- с. Черепно-мозкова травма
- д. Спазмофілія**

е. Епілепсія

143. У восьмимісячної дитини протягом тижня спостерігається погіршення дихання через ніс та слизові оболонки.

- а. Фронтит
- б. Сфеноїдит
- с. Гайморит
- д. Етмоїдит**

е. Гемісинусит

144. У восьмимісячної дитини під час огляду спостерігається: гучний інтенсивний систолічний шум над серцем.

- а. Дефект міжшлуночкової перетинки**
- б. Коарктація аорти
- с. Дефект міжпередсердної перетинки
- д. Стеноз гирла легеневої артерії
- е. Відкрита артеріальна протока

145. У восьмимісячної дитини спостерігаються такі симптоми: млявість, зниження апетиту, немотивована втрата ваги.

- а. Дисметаболічна нефропатія
- б. Гострий гломерулонефрит
- с. Дефекти догляду
- д. Фосфат-діабет
- е. Гострий пієлонефрит**

146. У восьмимісячної дитини спостерігається тонічне напруження м'язів, карпопедальний спазм.

- а. Задухо-ціанотичний напад
- б. Гіпокальціємічні (тетанічні) судоми**
- с. Фебрильні судоми
- д. Афективно-респіраторні судоми
- е. Епілептичний напад

147. У восьмирічної дівчинки з цукровим діабетом під час огляду виявлено: припухлість на передній поверхні живота.

- а. Алергічна реакція
- б. Атрофічної ліподистрофія
- с. Постін'єкційний абсцес



d. Гіпертрофічна ліподистрофія

e. Постін'єкційний інфільтрат

148. У дванадцятирічній дівчинки із хронічним панкреатитом необхідно оцінити екзокринну функцію під

a. Визначення рівня трипсину в сироватці крові

b. Визначення рівня амілази в сироватці крові та діастази в сечі

c. Рівень стеатореї під час копрологічного дослідження

d. Визначення еластази-2 у сироватці крові

e. Визначення еластази-1 у калі

149. У двомісячній дитини протягом останнього місяця спостерігаються пароксизми дратівливості, несп

a. Функціональна диспепсія

b. Дитяча дишезія

c. Малюкові кольки

d. Функціональний закреп

e. Лактазна недостатність

150. У двомісячній дитини спостерігається жовтяниця, хриплий крик, пупкова грижа, відставання у фізи

a. Вроджений гіпотиреоз

b. Кон'югаційна жовтяниця

c. Цитомегаловірусна інфекція

d. Вроджений гепатит

e. Гемолітична анемія

151. У дворічного хлопчика спостерігається рецидивуюче бронхо-легеневе захворювання. Встановлено

a. Рівень кальцію в крові

b. Кількість хлоридів у поті

c. Наявність білку в сечі

d. Вміст 2-фракції гамма-глобулінів

e. Рівень лужної фосфатази в сироватці

152. У дворічної дитини з ГРВІ гостро з'явилися охриплість голосу та шумний вдих. Під час плачу спос

a. Гострий обструктивний бронхіт

b. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

c. Стороннє тіло респіраторного тракту

d. Гострий плеврит

e. Пневмонія

153. У дворічної дитини на тлі відносного соматичного здоров'я після гри з "мозаїкою" раптово вини

a. Кашлюк

b. Гострий обструктивний бронхіт

c. Гострий ларинготрахеїт

d. Аспірація стороннього тіла

e. Пневмонія

154. У дворічної дитини спостерігаються часті й тривалі респіраторні захворювання та панкреатогенна

a. Каріотипування

b. Бронхоскопію

c. Вміст хлоридів в потовій рідині

d. Імунограму

e. Рентгенограму органів грудної клітки

155. У дев'ятирічного хлопчика спостерігалася короткочасна втрата свідомості після падіння з дерева.

a. Оперативне втручання

b. Гемостатична терапія

c. Комплексне консервативне лікування

d. Протизапальна терапія

e. Розвантажувальні люмбальні пункції

156. У десятимісячної дитини на тлі легкого перебігу ГРВІ з'явилися повторні клонічні судоми. Під ча

a. Енцефалітична реакція

b. Спазмофілія

c. Нейротоксикоз

d. Менінгіт

е. Енцефаліт

157. У десятирічного хлопчика діагностовано: геморагічний васкуліт, шкіряна форма. Одним з основних

а. Як замісна терапія

б. Підвищення синтезу простагландинів

с. Підвищення синтезу антитіл

д. Зменшення синтезу патологічних імунних комплексів

е. Зменшення синтезу простагландинів

158. У десятирічного хлопчика, який хворіє на бронхіальну астму, напади задишки почали спостерігатися

а. Спазм гладеньких м'язів бронхів

б. набряк слизової оболонки бронхів

с. Запалення слизової оболонки бронхів

д. Посилена секреція тучними клітинами біологічно активних речовин

е. Повна рефрактерність (блокада) beta\_2-адренорецепторів

159. У десятирічної дитини під час обстеження виявлено: вогнища облісіння на голові, волосся обламані

а. Дискоїдний червоний вовчак

б. Гніздова алопеція

с. Себорейне облісіння

д. Вторинний сифіліс

е. Мікроспорія волосистої частини голови

160. У десятирічної дитини, що знаходиться в олігоануричній стадії гострого пошкодження нирок, з'явилася

а. Гіперазотемія

б. Ацидоз

с. Гіперкаліємія

д. Алкалоз

е. Гіпонатріємія

161. У доношеного новонародженого хлопчика з масою тіла 3900 г за результатами УЗД виявлено: вроджену

а. Пластику дефекту міжшлуночкової перегородки та резекція коарктації аорти

б. Пластику дуги аорти

с. Резекція коарктації аорти

д. Пластику дефекту міжшлуночкової перегородки

е. Ушивання дефекту міжшлуночкової перегородки

162. У доношеного хлопчика, який народився від II вагітності, через 18 годин після народження з'явилася

а. Атрезія жовчних шляхів

б. Геморагічна хвороба новонародженого

с. Анемія Мінковського-Шоффара

д. Гемофілія А

е. Гемолітична хвороба новонародженого

163. У дівчинки віком 14 років під час огляду виявлено: низький зріст, широкі плечі, крилоподібні шкіряні

а. Патау

б. Клайнфельтера

с. Шерешевського-Тернера

д. Едвардса

е. Дауна

164. У жінки вагою 70 кг відразу ж після народження посліду розпочалась маткова кровотеча. Під час

а. Уведення 800 мкг мізопростолу ректально

б. Уведення 10 ОД окситоцину внутрішньовенно

с. Термінове УЗД матки

д. Ручна ревізія порожнини матки

е. Інструментальна ревізія порожнини матки

165. У жінки віком 30 років з терміном вагітності 37 тижнів навколоплідні води вилились 8 годин тому

а. Розрив шийки матки

б. Розрив судин пуповини

с. Неповне передлежання плаценти

д. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

е. Розрив матки

166. У жінки віком 30 років з терміном вагітності 38 тижнів тривають пологи протягом 3-х годин. Із а

- a. Амніотомія
- b. Кесарів розтин
- c. Стимуляція пологової діяльності
- d. Пологи вести через природні пологові шляхи**
- e. Токолітична терапія

167. У жінки віком 30 років пологи тривають 8 годин. Перейми через кожну хвилину по 50 секунд, активн

- a. Другий період нормальних пологів**
- b. Латентна фаза першого періоду нормальних пологів
- c. Прелімінарний період
- d. Стрімкі пологи
- e. Активна фаза першого періоду нормальних пологів

168. У жінки віком 30 років із терміном вагітності 40 тижнів відсутня пологова діяльність. Об'єктивн

- a. Розпочати інфузійну терапію
- b. Кесарський розтин**
- c. Провести стимуляцію пологової діяльності
- d. Розпочати седативну терапію
- e. Нагляд в умовах відділення реанімації

169. У жінки віком 38 років через 5 хвилин після народження дитини розпочалася кровотеча з статевих

- a. Защемлення плаценти, що відділилася
- b. Прирощення плаценти
- c. Гіпотонічна кровотеча
- d. Часткове щільне прикріплення плаценти**
- e. Тотальне щільне прикріплення плаценти

170. У жінки віком 40 років на 40-му тижні 6-ї патологічної вагітності (загроза зриву, гестоз I типу

- a. Сепсис
- b. Вроджена вада серця
- c. Вроджений гепатит
- d. Гемолітична хвороба новонародженого
- e. Вроджений токсоплазмоз**

171. У жінки з терміном вагітності 12 тижнів, без видимої причини, з'явився біль внизу живота та нез

- a. Аборт, що почався
- b. Загрозливий аборт**
- c. Аборт у ході
- d. Вагітність, що не розвивається
- e. Неповний аборт

172. У лікаря-стоматолога віком 26 років під час обстеження виявлено: помірна гіперферментемія, пози

- a. Призначення специфічного імуноглобуліну дружині та дитині
- b. Негайна вакцинація дружини при негативному тесті на HBsAg**
- c. Призначення дружині специфічної хіміопрофілактики нуклеозидними аналогами
- d. Призначення специфічного імуноглобуліну дитині
- e. Призначення дружині та дитині специфічної хіміопрофілактики нуклеозидними аналогами

173. У недоношеної дитини, народженої в терміні гестації 34 тижні, через 4 години після народження с

- a. Пневмонія новонароджених
- b. Ателектази легенів
- c. Хвороба гіалінових мембран**
- d. Пологова травма
- e. Синдром масивної меконіальної аспірації

174. У новонародженого в надлобковій ділянці спостерігається утворення червоного кольору, округлої с

- a. Міхурово-пупкова нориця
- b. Агенезія сечового міхура
- c. Екстрофія сечового міхура**
- d. Кіста урахуса
- e. Дивертикул сечового міхура

175. У новонародженого на п'ятий день життя спостерігається надмірне здуття живота з контурування

- a. Синдром Ледда
- b. Стеноз клубової кишки
- c. Портальна гіпертензія
- d. Інвагінація кишечника

**e. Хвороба Гіршпрунга**

176. У новонародженого терміном гестації 31 тиждень наростає млявість, м'язова гіпотонія та пригніче

**a. Внутрішньочерепний крововилив**

- b. Анемія
- c. Внутрішньоутробна інфекції
- d. Менінгіт
- e. Сепсис

177. У новонародженого хлопчика вагою 2200 г, 38 тижнів гестації виявлено: дефект міжшлуночкової п

- a. Токсоплазмоз
- b. Цитомегаловірусна інфекція
- c. Синдром вродженої краснухи**
- d. Вроджена вітряна віспа
- e. Вроджений лістеріоз

178. У новонародженого, який народився на 29 тижні гестації, внаслідок крайового передлежання плац

**a. Внутрішньочерепний крововилив в намет мозочка**

**b. Респіраторний дистрес-синдром**

- c. Пізня вроджена пневмонія
- d. Гострий обструктивний бронхіт
- e. Тяжка асфіксія новонароджених

179. У одинадцятирічного хлопчика на тлі ГРВІ з'явилася задишка, сухий кашель, свистяче дихання. В а

- a. Седативні препарати
- b. Магnezії сульфату
- c. Метилксантини короткої дії

**d. Системні глюкокортикостероїди**

e. Муколітичні препарати

180. У одинадцятирічної дитини з цукровим діабетом 1-го типу на тлі ГРВІ посилилася спрага, з'явилас

**a. Абсолютна інсулінова недостатність**

- b. Недостатність функції кори наднирників
- c. Надлишкова продукція інсуліну
- d. Активація симпато-адrenalової системи
- e. Гіперактивність центральної нервової системи

181. У однорічної дитини із тетрадою Фалло, що хворіє на ГРВІ, раптово посилився ціаноз, з'явилася з

**a. Фебрильні судоми**

**b. Задучо-ціанотичний напад**

- c. Гостра серцева недостатність
- d. Напад пароксизмальної тахікардії
- e. Еклампсія

182. У однорічної дитини, яка хворіє на ГРВІ, у нічний час раптово з'явилися шумне дихання з утрудне

- a. Бронхіальна астма
- b. Гострий бронхіт

**c. Стенозуючий ларинготрахеобронхіт**

- d. Гострий бронхіоліт
- e. Пневмонія

183. У п'ятирічної дитини діагностовано саркому Юїнга з ураженням лівої стегнової кістки та множинни

- a. Комбіноване (променеве та хірургічне) лікування
- b. Дистанційна гаматерапія

**c. Поліхіміотерапія**

- d. Антибіотикотерапія
- e. Ампутація ураженої кінцівки

184. У п'ятирічної дитини раптово виникли такі симптоми: припинення дихання, ціаноз шкірних покриві

**a. Оксигенотерапія**

- b. Внутрішньосерцеве введення адреналіну (епінефрину)
- c. Внутрішньовенне введення теофіліну
- d. Промивання шлунка

**e. ШВЛ, закритий масаж серця**

185. У п'ятирічної дитини спостерігаються напади кашлю, потім - репризи. Із анамнезу відомо, що дитина

- a. Стороннє тіло
- b. Аденовірусна інфекція
- c. Пневмонія

**d. Кашлюк**

e. Обструктивний бронхіт

186. У п'ятирічної дівчинки з тетрадою Фалло, після психоемоційного збудження виник задухо-ціанотич

a. Папаверин

**b. Пропранолол**

c. Калію хлорид

d. Алопуринол

e. Дигоксин

187. У пацієнта віком 14 років діагностовано: бронхіальна астма середньої тяжкості, період загострен

- a. Кромолін Na
- b. Дексаметазон
- c. Строфантин

**d. Сальбутамол**

e. Амброксол

188. У пацієнта віком 14 років на тлі ГРВІ підсилилися задишка та загальна слабкість, з'явилося відч

a. Гостра правошлуночкова серцева недостатність

**b. Гостра лівошлуночкова серцева недостатність**

c. Хронічна лівошлуночкова серцева недостатність

d. Гостра тотальна серцева недостатність

e. Гостра судинна недостатність

189. У пацієнта віком 14 років, на 8-й день захворювання на вітряну віспу спостерігається погіршення

- a. Ванкоміцин
- b. Озельтамівір

**c. Ацикловір**

d. Колхіцин

e. Цефтріаксон

190. У пацієнта віком 17 років спостерігається: ріст волосся на обличчі відсутній, гінекомастія, від

a. Синдром Шерешевського-Тернера

**b. Синдром Клайнфельтера**

c. Синдром Патау

d. Синдром Дауна

e. Синдром Едвардса

191. У пацієнта віком 18 років раптово виник сильний головний біль, блювання, підвищення температур

- a. Субарахноїдальний крововилив
- b. Субдуральна гематома
- c. Абсцес головного мозку

**d. Менінгіт**

e. Енцефаліт

192. У пацієнта віком 19 років після лікування двобічної пневмонії з'явилися та наростали спрага, пі

- a. Метформін
- b. Бігуаніди

**c. Інсулін**

d. Розчин глюкози

e. Фізіологічний розчин

193. У пацієнта на тлі гострого трансмурального переднього інфаркту міокарда спостерігається знижен

- a. Гломерулонефрит, що швидко прогресує
- b. Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит

- c. "Застійна" нирка
- d. Гостре ренальне пошкодження нирок
- e. Гостре преренальне пошкодження нирок

194. У пацієнта під час огляду виявлено: наявність рваної рани в ділянці правої гомілки, з якої пост

- a. Імобілізувати кінцівку
- b. Накласти джгут вище рани
- c. Накласти джгут нижче рани
- d. Прикласти холод до рани

e. Накласти тиснучу пов'язку

195. У пацієнта після ДТП спостерігається рясна кровотеча, яскраво-червоного кольору в ділянці шиї.

- a. Накласти шину на шию
- b. Накласти гіпсову пов'язку
- c. Пальцеве притиснення, метод Мікуліча
- d. Максимальне перерозгинання шиї
- e. Перевести в стабільне положення

196. У пацієнта, що хворіє на епілепсію, після самостійного припинення вживання протиепілептичних м

- a. Левопромазин, клозапін, кветіапін
- b. Топірамат, окскарбазепін, карбамазепін

c. Діазепам, лоразепам, мідазолам

- d. Габапентин, прегабалін, етосуксимід
- e. Доксепін, амітриптилін, міансерин

197. У пацієнтки виникла масивна кровотеча після народження двійні через природні пологові шляхи. С

- a. Затримка частки плаценти
- b. Пошкодження шийки матки
- c. Розрив матки

d. Атонія матки

e. Гіпотонія матки

198. У пацієнтки віком 32 роки, що народжує вперше, почалися інтенсивні потуги з інтервалом 1-2 хв,

- a. Вакуум-екстракція плода
- b. Очікувальна тактика
- c. Накладання акушерських щипців
- d. Кесарський розтин

e. Епізіотомія

199. У першовагітної віком 37 років пологова діяльність триває протягом 10 годин. Перейми по 20-25 с

- a. Вторинна слабкість пологової діяльності
- b. Первинна слабкість пологової діяльності
- c. Патологічний преліментарний період
- d. Дискоординація пологової діяльності
- e. Нормальна пологова діяльність

200. У повторнонароджуючої з початком термінових пологів з'явилися кров'яністі виділення з піхви, за

- a. Стимуляція пологової діяльності
- b. Кесарський розтин
- c. Гемостатична терапія

d. Амніотомія

e. Зняття активної пологової діяльності

201. У породіллі віком 24 роки під час огляду пологових шляхів у ранньому післяпологовому періоді ви

- a. Розрив промежини III ступеня
- b. Розрив промежини II ступеня
- c. Розрив піхви
- d. Розрив промежини I ступеня
- e. Тріщина задньої спайки

202. У приймальне відділення звернулися батьки з двомісячним хлопчиком, який напередодні ввечері в

- a. Оглядову рентгенографію голови
- b. Електроенцефалографію
- c. Комп'ютерну томографію голови

- d. Люмбальну пункцію
- e. Іонограму сироватки крові

203. У семиденного немовляти спостерігаються: виражена млявість, повторне блювання, іноді фонтаном

- a. Синдром Шерешевського-Тернера
- b. Адреногенітальний синдром, проста вірильна форма
- c. Адреногенітальний синдром, солевтратна форма
- d. Гермафродитизм
- e. Адреногенітальний синдром, гіпертонічна форма

204. У семирічної дитини після контакту з котом раптово з'явилося утруднення дихання. Об'єктивно сп

- a. Оцінка участі допоміжної мускулатури у диханні
- b. Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки
- c. Спірометричне дослідження
- d. Пневмотахометрія
- e. Пульсоксиметрія

205. У семирічної дитини спостерігається субфебрильна температура тіла, везикульозний висип на шкір

- a. Ентеровірусна інфекція, ускладнена менінгітом
- b. Вітряна віспа, ускладнена менінгоенцефалітом
- c. Краснуха, ускладнена енцефалічною реакцією
- d. Грип, важка форма, нейротоксикоз
- e. Менінгококова інфекція

206. У триденного новонародженого спостерігається виражені явища інтоксикації та підвищена темпер

- a. Артрит лівого колінного суглоба
- b. Перелом стегнової кістки
- c. Флегмона стегна
- d. Гематогенний остеомієліт стегнової кістки
- e. Сепсис

207. У триденної доношеної дитини у аналізі крові спостерігається: рівень непрямого білірубину - 345

- a. Замінне переливання крові
- b. Прийом фенobarбіталу
- c. Фототерапія
- d. Гемосорбція
- e. Кортикостероїдна терапія

208. У тримісячної дитини з'явилися блювання, пронизливий безпричинний крик, стійкі поприлості, висип

- a. Фенілкетонурія
- b. Цукровий діабет
- c. Целіакія
- d. Хвороба Тея-Сакса
- e. Муковісцидоз

209. У тримісячної дитини на тлі субфебрильної температури тіла та риніту спостерігається малопродук

- a. Аспірація стороннього тіла
- b. Гострий бронхіт
- c. Гострий обструктивний бронхіт
- d. Гострий бронхіоліт
- e. Двобічна пневмонія

210. У трирічного хлопчика під час ходьби та бігу збільшується права половина мошонки, яка в положен

- a. Цистоцеле
- b. Орхіепідидиміт
- c. Сполучна водянка оболонок правого яєчка
- d. Парафімоз
- e. Фімоз

211. У трирічного хлопчика спостерігається задишка, ціаноз шкіри губ, вушних раковин, нігтьових фала

- a. Тетрада Фалло
- b. Дефект міжшлуночкової перетинки
- c. Стеноз легеневої артерії
- d. Відкрита артеріальна протока

е. Коарктація аорти

212. У трирічній дитини з ознаками рахіту спостерігаються симптоми Хвостека, Труссо, Маслоу. Добу т

а. Підвищення рівня кальцію крові

б. Зниження рівня фосфору крові

с. Підвищення рівня фосфору крові

д. Зниження рівня кальцію крові

е. Метаболічний ацидоз

213. У трирічній дитини на тлі гнійного отиту різко погіршився загальний стан. Об'єктивно спостеріга

а. Ревматоїдний артрит

б. Перелом лівого стегна

с. Лівобічний епіфізарний остеомієліт

д. Гідрома підколінної ямки

е. Остеогенна саркома

214. У трирічній дитини під час обстеження виявлено: висока температура тіла, інтоксикація, блідість

а. В<sub>12</sub>-дефіцитна анемія

б. Залізодефіцитна анемія

с. Апластична анемія

д. Білково-дефіцитна анемія

е. Гемоглобінопатія

215. У трирічній дитини спостерігаються напади, що супроводжуються ціанозом, різким занепокоєнням

а. Тетрада Фалло

б. Дилатаційна кардіоміопатія

с. Дефект міжпередсердної перетинки

д. Первинний бактеріальний ендокардит

е. Дефект міжшлуночкової перетинки

216. У трирічній дитини спостерігається кашель та нежить. Із анамнезу відомо, що двоє інших членів с

а. Гострий бронхіоліт

б. Гострий обструктивний бронхіт

с. Бронхіальна астма

д. Стенозуючий ларинготрахеїт

е. Двобічна бронхопневмонія

217. У трирічній дівчинки через 1 годину після вживання в їжу шоколадно-горіхового крему на шкірі з'

а. Аутоімунні

б. Негайного типу

с. Імунокомплексні

д. Уповільненого типу

е. Цитотоксичні

218. У чотириденного хлопчика з'явилися прояви геморагічної хвороби новонароджених у вигляді мелени

а. Амінокапронову кислоту

б. Етамзилат

с. Вітамін К

д. Вітамін С

е. Глюконат кальцію

219. У чотиримісячної дитини виявлено такі симптоми: діарея до 5-6 разів на добу, випорожнення пініс

а. Дисбактеріоз кишечника

б. Лактазна недостатність

с. Функціональна діарея

д. Пілороспазм

е. Хронічний ентероколіт

220. У шестирічної дитини захворювання розпочалося з таких симптомів: підвищилася температура тіла

а. Поліомієліт, паралітична форма

б. Грип, енцефалічна реакція

с. Ботулізм

д. Полірадикулоневрит

е. Дифтерійний поліневрит



221. У шестирічної дівчинки на тлі нежитю з'явилася велика кількість гнійної висипки. Об'єктивно спо

- a. Атопічний дерматит
- b. Токсико-алергічний дерматит

**c. Стрептококове імпетиго**

- d. Дитяча екзема
- e. Фотодерматит

222. У шестирічної дівчинки спостерігається: відставання у фізичному розвитку, напади непритомності,

- a. Терада Фалло
- b. Відкрите овальне вікно
- c. Стеноз отвору легеневої артерії

**d. Відкрита артеріальна протока**

- e. Транспозиція магістральних судин

223. У щойно народженої доношеної дитини, якій надають реанімаційну допомогу, після початкового пе

- a. Продовжити штучну вентиляцію легень
- b. Катетеризувати вену пуповини і ввести адреналін (епінефрин)
- c. Призначити кисневу терапію

**d. Розпочати непрямий масаж серця та відновити штучну вентиляцію легень**

- e. Інтубувати трахею, ввести ендотрахеально адреналін (епінефрин) і відновити штучну вентиляцію лег

224. У юнака віком 16 років виникло запаморочення. Об'єктивно спостерігається: ЧСС - 35/хв, АТ - 85

**a. Атріовентрикулярна блокада III ступеня**

- b. Синусова брадикардія
- c. Атріовентрикулярна блокада II ступеня
- d. Фібриляція передсердь
- e. Екстрасистолія

225. Хлопець віком 15 років скаржиться на гарячку, яка з субфебрильної у перші дні підвищилася до 39

- a. Інфекційний мононуклеоз
- b. Скарлатина, тяжка форма
- c. Лептоспіроз, тяжка форма

**d. Псевдотуберкульоз, тяжка форма**

- e. Хвороба Кавасакі

226. Хлопчик віком 15 років напередодні був у контакті із хворим на кір. Під час огляду виявлено: зд

- a. Вакцинація проти кору через 4 доби після контакту з хворим
- b. -
- c. Спостереження протягом 5 діб, при появі проявів захворювання - вакцинація проти кору
- d. Антибіотики широкого спектру дії

**e. Вакцинація проти кору протягом перших 72 годин після контакту з хворим**

227. Чотирирічна дівчинка захворіла гостро після перенесеної 3 тижні тому стрептококової інфекції на

- a. Сечокам'яна хвороба
- b. Гостре ураження нирок

**c. Гломерулонефрит, нефритичний синдром**

- d. Пієлонефрит
- e. Гломерулонефрит, нефротичний синдром

228. Чотирирічну дитину шпиталізовано зі скаргами на осиплий голос, грубий гавкаючий кашель і утруд

- a. Епштейна-Барр
- b. Цитомегаловірус

**c. Парагрипу**

- d. Грипу
- e. Риновірус

229. Шестирічна дитина захворіла гостро: підвищилася температура тіла, з'явилися головний біль і біл

- a. Дифтерія

**b. Скарлатина**

- c. Краснуха
- d. Кір
- e. Інфекційний мононуклеоз

230. Шестирічна дитина скаржиться на головний біль, слабкість, біль під час жування. Об'єктивно вияв

- a. Слинокам'яна хвороба
- b. Інфекційний монопонуклеоз
- c. Епідемічний паротит
- d. Дифтерія
- e. Пухлини слинних залоз

231. Шестирічна дитина скаржиться на хиткість ходи, тремор кінцівок і підвищення температури тіла. І

- a. Епілепсія
- b. Абсцес мозку
- c. Полінейропатія

d. Енцефаліт

- e. Менінгіт

232. Шестирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до  $37,2^{\circ}\text{C}$ , часті та болісні сеч

a. *Escherichia coli*

- b. *Candida albicans*
- c. *Staphylococcus aureus*
- d. *Proteus mirabilis*
- e. *Klebsiella pneumoniae*

233. Шестирічна дівчинка скаржиться на підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ , нежить, сухий кашель

a. Гострий бронхіоліт

b. Правобічна пневмонія, негоспітальна

- c. Гострий бронхіт простий
- d. Стенозуючий ларинготрахеїт
- e. Гострий обструктивний бронхіт

234. Шестирічний хлопчик скаржиться на набряки обличчя та нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігаєт

a. Нефротичний синдром

- b. Нефротичний синдром з гематурією і гіпертензією
- c. Нефритичний синдром
- d. Сечовий синдром
- e. Нефротичний синдром з гематурією

235. Що є достовірним лабораторним показником гострого венозного тромбозу?

- a. Підвищений час зсідання крові
- b. Знижений протромбіновий індекс
- c. Знижений рівень фібриногену
- d. Підвищений рівень фібрину
- e. Підвищений рівень D-димеру