

1. Якої тактики необхідно дотримуватися для запобігання некрозу тканин під час внутрішньовенного введення гіпертонічного розчину?

- a. Ретельно мити руки перед процедурою
- b. Перевірити кут і глибину введення голки
- c. Перед застосуванням розчин потрібно підігріти
- d. Змінювати місце введення лікарського засобу
- e. Не допускати потрапляння розчину в паравенозний простір**

2. Пацієнтці віком 35 років діагностовано недостатність мітрального клапана. Яке захворювання в анамнезі є однією з основних причин розвитку набутих вад серця?

- a. Грип
- b. Поліомієліт
- c. Інфекційний моновірусоз
- d. Туберкульоз
- e. Гостра ревматична гарячка**

3. Пацієнт звернувся до лікаря-офтальмолога зі скаргами на сльозотечу, почервоніння очей та відчуття стороннього тіла ("піску") в очах. Лікар встановив діагноз: кон'юнктивіт - та призначив закрапувати в очі два лікарські засоби. Який оптимальний інтервал потрібно витримувати між застосуванням препаратів для ефективного лікування?

- a. 30 хв
- b. 10-15 хв**
- c. 3-5 хв
- d. 1-2 хв
- e. 60 хв

4. Пацієнт віком 56 років скаржиться на появу висипань на відкритих ділянках тіла (долонях, обличчі). Ці прояви турбують його протягом останніх 3-х років. Під час опитування з'ясувалося, що пацієнт працює на хімічному заводі, також він зазначає, що в неробочі дні шкірні симптоми зменшуються. Пацієнту встановлено діагноз: контактний дерматит - та рекомендовано оптимізувати умови праці. Який основний шкідливий виробничий фактор потрібно усунути для покращення стану пацієнта?

- a. Контакт із фарбами та лаками**
- b. Вплив холоду та низьких температур
- c. Роботу на автоматизованій виробничій лінії
- d. Контакт із паперовими матеріалами
- e. Вплив ароматизаторів у повітрі робочої зони

5. Пацієнту неврологічного відділення з припущенням на субарахноїдальний крововилив проведено спинномозкову пункцію. Який колір ліквору характерний для цього патологічного стану?

- a. Прозорий
- b. Червоний**
- c. Безбарвний
- d. Каламутний
- e. Жовтувато-зеленуватий

6. Пацієнт скаржиться на часті рідкі випорожнення, метеоризм, бурчання та відчуття переливання рідини в животі. Для якого виду диспепсії характерні ці клінічні прояви?

- a. Панкреатогенної
- b. -
- c. Шлункової
- d. Кишкової (ентерогенної)**
- e. Печінкової (гепатобіліарної)

7. У дівчини віком 19 років на шкірі грудної клітки, шиї, бічних поверхонь тулуба, міжлопаткової ділянки та плечей візуалізуються численні незапальні плями жовтувато-коричневого та блідо-рожевого кольору. Позитивні "симптом стружки" (лущення плям у разі пошкрябування)

та йодна проба Бальцера. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Екземи
- b. Мікроспорії
- c. Висівкоподібного лишаю**
- d. Токсикодермії
- e. Дерматиту

8. Пацієнту встановлено діагноз: гострий лейкоз та призначено медикаментозну терапію. Препарати якої групи порушують процеси росту, розвитку та механізми поділу всіх клітин організму, включаючи злоякісні?

- a. Кардіопротектори
- b. Антибіотики
- c. Протівірусні
- d. Гепатопротектори
- e. Цитостатики**

9. У пацієнта раптово підвищилася температура тіла, з'явилася болючість шкіри. З анамнезу відомо, що він приймає антибіотики. Під час об'єктивного обстеження на шкірі тулуба виявлено множинні бульозні елементи та яскраво-червоні ерозії. Також спостерігається позитивний симптом Нікольського. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Алергійного контактного дерматиту
- b. Простого контактного дерматиту
- c. Фіксованої медикаментозної еритеми
- d. Герпетичного дерматиту Дюрінга
- e. Токсичного епідермального некролізу**

10. Сестра медична проводить запис електрокардіограми пацієнту кардіологічного відділення. Якому грудному відведенню відповідає електрод, встановлений у п'ятому міжребер'ї по лівій середньоключичній лінії?

- a. V4**
- b. V3
- c. V2
- d. V1
- e. V5

11. У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу шлунка, раптово розвинулася шлунково-кишкова кровотеча. Які гемодинамічні зміни спостерігатимуться у разі виникнення цього невідкладного стану?

- a. Аритмія, АТ не змінюється
- b. Брадикардія, підвищення АТ
- c. Брадикардія, зниження АТ
- d. Тахікардія, зниження АТ**
- e. Тахікардія, підвищення АТ

12. Пацієнт скаржиться на інтенсивний біль і відчуття поколювання у руках, судоми в м'язах кистей. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом 10-ти років працює забійником у шахті. Об'єктивно спостерігається: кисті ціанотичні, холодні на дотик, зниження больової чутливості за типом "рукавичок". Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Ревматоїдного артрити
- b. Пневмоконіозу
- c. Цукрового діабету
- d. Вібраційної хвороби**
- e. Системної склеродермії

13. Для механічного видалення (вимивання) сірчаної пробки з вуха пацієнта необхідно підготувати оснащення, що включає: шприц Жане, лоток, стерильні марлеві серветки та 0,02 р-н фурациліну. Який із нижченаведених станів є протипоказанням до проведення процедури механічного вимивання сірчаної пробки?

- a. Відмороження вушної раковини
- b. Звуження слухових проходів
- c. Опік вушної раковини
- d. Зовнішній отит

e. Перфорація барабанної перетинки

14. Для якого захворювання характерний такий симптомокомплекс: "маскоподібне обличчя", кисетоподібні складки навколо рота, синдром Рейно?

a. Системної склеродермії

- b. Вузликового періартеріїту
- c. Ревматоїдного артрити
- d. Червоного системного вовчака
- e. Гострої ревматичної гарячки

15. Укажіть основний метод пренатальної інвазивної діагностики для виявлення генетичної патології у плода, ДНК-діагностики, каріотипування на ранніх термінах гестації шляхом біопсії плаценти.

a. -

b. Дослідження ворсин хоріона

- c. Ультразвукове дослідження
- d. Амніоцентез
- e. Кордоцентез

16. Пацієнту після гастректомії в післяопераційному періоді призначено парентеральне харчування. Який спосіб введення білкових розчинів потрібно обрати в цьому разі?

a. Внутрішньовенний

- b. Внутрішньом'язовий
- c. Інгаляційний
- d. Ректальний
- e. Пероральний

17. У породіллі на 4-ту добу після пологів з'явилися ознаки гіпогалакції, грудне молоко виділяється в незначній кількості. Дитина неспокійна, погано спить. Яка тактика є найдоцільнішою для стимуляції лактації?

a. Обмежити кількість прикладань до грудей до 3 разів на добу

b. Збільшити частоту прикладань дитини до грудей

- c. Порекомендувати фітозасоби для підвищення лактації
- d. Запропонувати лише нічні годування
- e. Призначити дитині адаптовану молочну суміш

18. У чоловіка віком 35 років після контакту із хлорофосом під час польових робіт з'явилися такі симптоми: слюзотеча, посилене слиновиділення, нудота та блювання, біль у животі, діарея, зниження гостроти зору. Об'єктивно спостерігається: пацієнт перебуває у стані психомоторного збудження, мовлення ускладнене, зіниці звужені, пульс - 48/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні вказані симптоми? Отруєння якою речовиною, найімовірніше, спричинило появу вказаних симптомів?

a. Метанолом

b. Нітратами

c. Фосфорорганічними сполуками

- d. Хлорорганічними сполуками
- e. Ртуттю

19. У пацієнта, який хворіє на рак легень, розвинулася легенева кровотеча. Медична сестра надає йому долікарську допомогу. Яке положення тіла потрібно забезпечити пацієнту, надаючи долікарську допомогу?

a. Сімса

b. Високе Фаулера

c. Низьке Фаулера

- d. Лежачи на животі
- e. Тренделенбурга

20. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: сухий плеврит. Які клінічні прояви характерні для цього захворювання?

- a. Кашель із виділенням слизово-гнійного мокротиння, задишка, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр
- b. Стискальний біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку, що триває близько 5 хв
- c. Біль у грудній клітці, що посилюється під час глибокого вдиху та нахилах тулуба в протилежний бік
- d. Експіраторна задишка, кашель із виділенням склоподібного в'язкого мокротиння
- e. Кашель із виділенням гнійного мокротиння, переважно вранці, "повним ротом"

21. У пацієнта на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився загальний стан, посилився біль у серці, виникла різка слабкість. Об'єктивно спостерігається: свідомість сплутана, акроціаноз, холодний липкий піт, АТ - 70/30 мм рт. ст., пульс - 110/хв, слабкого наповнення. Яке ускладнення розвинулося в пацієнта?

- a. Нестабільна стенокардія
- b. набряк легень
- c. Кардіогенний шок
- d. Серцева астма
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

22. Чоловік віком 35 років після падіння з висоти скаржиться на виражений біль у ділянці правого плеча. Під час об'єктивного обстеження медичний працівник виявив абсолютні об'єктивні ознаки (симптоми) перелому кістки. Укажіть одну з них.

- a. Кісткова крепітація
- b. Блідість шкіри
- c. Гіперемія шкіри
- d. Локальний біль
- e. набряк шкіри

23. Пацієнта віком 65 років шпиталізовано до лікарні з попереднім діагнозом: неспецифічний виразковий коліт. Яка діагностична процедура найдоцільніша для підтвердження діагнозу?

- a. Холецистографія
- b. Фіброгастроскопія
- c. Цистоскопія
- d. Колоноскопія
- e. Лапароскопія

24. У пацієнтки віком 52 роки після фізичного навантаження виник напад стенокардії. Який основний клінічний прояв цього захворювання?

- a. Стискальний біль за грудниною
- b. набряки на нижніх кінцівках
- c. Інспіраторна задишка
- d. Кашель із виділенням пінистого рожевого мокротиння
- e. Експіраторна задишка

25. У пацієнтки на тлі перебігу гострого інфаркту міокарда раптово погіршився стан: з'явилися задишка, кашель із виділенням рожевого пінистого мокротиння, клекітливое дихання. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда, пульс - 86/хв, слабкого наповнення, АТ - 100/60 мм рт. ст. Укажіть першочерговий захід невідкладної допомоги в цьому разі.

- a. Інгаляційне введення гормональних препаратів
- b. Інгаляція сальбутамолу
- c. Киснева терапія
- d. Антибіотикотерапія
- e. Фізіотерапевтичні процедури

26. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, швидкість клубочкової фільтрації становить 14 мл/хв. До якої лікувальної процедури необхідно підготувати пацієнта в цьому разі?

- a. Лапароцентезу
- b. Гемодіалізу**
- c. Літотрипсії
- d. Шунтування
- e. Фонофорезу

27. До гастроентеролога звернулася пацієнтка віком 65 років, яка довгий час хворіє на виразкову хворобу шлунка. Пацієнтка скаржиться на відчуття розпирання і тяжкості в ділянці шлунка, відрижку, що виникає після вживання м'ясної їжі, загальну слабкість і швидку втомлюваність, значне зниження маси тіла (за два місяці - на 10 кг). У периферичній крові виявлено ознаки анемії. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Раку нирки
- b. Гострого гастроентероколіту
- c. Хронічного холециститу
- d. Раку шлунка**
- e. Гострого панкреатиту

28. Сестра медична інструктує пацієнта, який хворіє на бронхіальну астму, щодо користування індивідуальним аерозольним інгалятором. Яку дію має виконати пацієнт перед тим, як натиснути на дно інгалятора і вдихнути лікарський засіб, щоб забезпечити його кращу ефективність?

- a. Очистити носову порожнину
- b. Затримати дихання
- c. Глибокий видих (поза інгалятор)**
- d. Зайняти горизонтальне положення
- e. Глибокий вдих

29. Як називається метод неінвазивного дослідження функції зовнішнього дихання, що проводиться для оцінки стану легень та бронхів, діагностики захворювань дихальної системи та контролю їх лікування?

- a. Бронхоскопія
- b. Оглядова рентгенографія органів грудної клітки
- c. Шкірні алергологічні тести
- d. Спірографія**
- e. УЗД легенів

30. Пацієнтці, яка хворіє на хронічну недостатність кровообігу, для зменшення набряків призначено сечогінні лікарські засоби. Який із нижченаведених методів є найбільш інформативним для оцінки ефективності дії призначених сечогінних препаратів?

- a. Вимірювання артеріального тиску
- b. Визначення водного балансу**
- c. Вимірювання нічного діурезу
- d. Підрахунок кількості сечовипускань за добу
- e. -

31. Пацієнту віком 50 років, у якого триває затяжне і тяжке загострення бронхіальної астми, призначено інгаляційне введення лікарських засобів. Який із нижченаведених пристроїв використовується для забезпечення ефективного введення ліків, спрямовуючи їх безпосередньо у верхні та нижні дихальні шляхи?

- a. Небулайзер**
- b. Спірометр
- c. Пікфлоуметр
- d. Пульсоксиметр
- e. Пневмотахометр

32. Жінка віком 19 років, яка перебуває на 37-му тижні вагітності, цікавиться методом епідуральної аналгезії для полегшення болю під час фізіологічних пологів. Проінформуйте жінку щодо можливих наслідків, які можуть виникнути у разі застосування цього методу знеболювання.

- a. Збільшення ризику розвитку прееклампсії
- b. Гіперстимуляція яєчників
- c. Збільшення ризику розвитку еклампсії
- d. Негативний вплив на серцебиття плода
- e. Подовження другого періоду пологів**

33. У жінки віком 55 років раптово виник напад стенокардії. Для зняття нападу вона застосувала препарат, після приймання якого у неї виникли головний біль, почервоніння обличчя та тахікардія. Для якого препарату характерні такі побічні ефекти?

- a. Метапрололу
- b. Нітрогліцерину**
- c. Верапамілу
- d. Розувастатину
- e. Торасеміду

34. У пацієнта, який хворіє на цироз печінки, розвинувся асцит. Яку пункцію йому доцільно провести для видалення патологічного вмісту (зайвої рідини) з черевної порожнини?

- a. -
- b. Плевральну
- c. Абдомінальну**
- d. Люмбальну
- e. Стернальну

35. У породіллі через дві доби після пологів розпочалася кровотеча зі статевих шляхів, крововтрата досягла 500 мл і продовжується. Пацієнтка скаржиться на слабкість, пітливість. Об'єктивно спостерігається: слизові оболонки бліді, пульс - 95/хв, слабого наповнення, АТ - 100/60 мм рт. ст. Під час пальпації матки через передню черевну стінку визначається, що вона щільна, дно розташоване на рівні пупка. Укажіть причину вторинної (пізньої) післяпологової кровотечі.

- a. Розрив шийки матки
- b. Порушення згортальної системи крові
- c. Розрив матки
- d. Затримка частин плаценти в порожнині матки**
- e. Розрив промежини

36. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на появу в лівій пахвовій ділянці щільного болючого утворення багряно-червоного кольору, озноб, головний біль, підвищення температури тіла. Під час пальпації утворення спостерігається симптом флюктуації. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Остеомієліту
- b. Сикозу
- c. Фурункулу
- d. Карбункулу
- e. Гідраденіту**

37. Пацієнт віком 65 років хворіє на хронічний гепатит. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток у пацієнта синдрому холестазу?

- a. Біль у кістках
- b. Свербіж шкіри**
- c. Екзофтальм
- d. Тризм жувальних м'язів
- e. Шум у вухах

38. Вагітна жінка віком 25 років перебуває на обліку в жіночій консультації. Вагітність перша,

протікає без ускладнень. На 38-му тижні вагітності, вона помітила, що зі статевих шляхів відійшов згусток в'язкого тягучого слизу, і негайно звернулася до жіночої консультації. Укажіть подальшу тактику ведення цієї пацієнтки.

а. Порекомендувати продовжити планові візити до жіночої консультації до настання регулярних переривів

- b. Виписати направлення для шпиталізації до хірургічного відділення
- c. Забезпечити лікування в денному стаціонарі
- d. Негайно шпиталізувати до пологового відділення
- e. Спостерігати за станом вагітної жінки в оглядовому кабінеті жіночої консультації впродовж години

39. Який із нижченаведених факторів має найбільший вплив на стан дихальних шляхів і може значно зменшити ризик загострень хронічного бронхіту у пацієнта та покращити його загальне самопочуття?

а. Відмова від тютюнопаління

- b. Використання засобів для чищення повітря
- c. Зволоження повітря в приміщенні
- d. Нормалізація маси тіла
- e. Підвищення фізичної активності

40. У жінки на 35-му тижні вагітності з'явилися різкий біль у животі та незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри, пульс - 100/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст. Матка напружена, болюча. Положення плода поздовжнє, голівка передлежить над площиною входу в малий таз, серцебиття плода ритмічне, 160/хв. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

а. Загроза розриву матки

b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

- c. Аборт у ході
- d. Неповне передлежання плаценти
- e. Розрив матки, що відбувся

41. Пацієнтка віком 56 років після вживання гострої їжі відчула різкий біль у правому підребер'ї, що супроводжувався нудотою, блюванням і здуттям живота. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс - 100/хв, АТ - 110/70 мм рт. ст., язик сухий, вкритий білим нальотом, живіт помірно здутий, болючий у правому підребер'ї, позитивні симптоми Орнотера Кера. Яка група препаратів використовується для полегшення стану пацієнтки?

- a. Антибіотики
- b. Гепатопротектори
- c. Снотійні
- d. Антиагреганти
- e. Спазмолітики**

42. Пацієнт скаржиться на часткову втрату чутливості в правій нижній кінцівці після внутрішньом'язового введення лікарського засобу у правий сідничний м'яз. Яка анатомічна структура, найімовірніше, зазнала ушкодження внаслідок порушення техніки виконання ін'єкції?

а. Сідничний нерв

- b. Зовнішня клубова артерія
- c. Стегнова артерія
- d. Клубова кістка
- e. Стегновий нерв

43. У пацієнта з діагнозом: цироз печінки - виникла кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Який із нижченаведених медичних приладів використовується для досягнення гемостазу у разі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу та кардіального відділу шлунка?

- a. Катетер Фолея
- b. Шлунковий зонд**

с. Зонд Блекмора

d. Гудзиковий зонд

e. Діатермокоагулятор

44. Жінці віком 48 років після комплексного обстеження встановлено діагноз: ендемічний зоб. Укажіть найпоширеніший фактор розвитку цього захворювання.

a. Недостатнє надходження заліза до організму

b. Надлишкове споживання харчових продуктів, що містять йод

с. Недостатнє споживання йоду з їжею та водою

d. Надлишкове споживання кухонної солі

e. Дефіцит кальцію в продуктах харчування

45. Укажіть групу лікарських засобів, що використовується у лікуванні пацієнтів, які хворіють на атеросклероз, з метою зниження рівня холестерину в крові та нормалізації ліпідного профілю.

a. β -адреноблокатори

b. Антикоагулянти

c. Антиагреганти

d. Статини

e. Інгібітори АПФ

46. Для якого захворювання характерні такі результати аналізу сечі пацієнта: сеча каламутна, з осадом і пластівцями, лейкоцитурія, бактеріурія, протеїнурія (концентрація білка менше 1 г/л)?

a. Сечокам'яної хвороби

b. Гострого пієлонефриту

c. Хронічного гломерулонефриту

d. Гострого гломерулонефриту

e. Гострої ниркової недостатності

47. У вагітної жінки віком 28 років раптово розпочався судомний напад. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, АТ - 170/110 мм рт. ст., сатурація - 90. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено: висота стояння дна матки визначається на рівні, що відповідає 37-му тижню вагітності. Яке положення тіла треба надати пацієнтці після стабілізації стану під час транспортування до лікувального закладу?

a. На спині

b. На правому боці

с. На лівому боці

d. На животі

e. Сидячи

48. У жіночій консультації вагітній жінці проведено пельвіометрію. Який розмір жіночого таза враховується у діагностиці (визначенні ступеня звуження) анатомічно вузького таза?

a. Міжостьова відстань

b. Міжвертлюгова відстань

c. Міжребенева відстань

d. Зовнішня кон'югата

e. Справжня кон'югата

49. Пацієнт віком 38 років скаржиться на сильний різкий нападopodobний біль у ділянці правого підребер'я, що іррадіює в праву ключицю та плече, гіркоту в роті, нудоту, блювання жовчу. В анамнезі: жовчнокам'яна хвороба. Об'єктивно спостерігається: пацієнт неспокійний, язик обкладений жовтим нальотом, іктеричність склер та шкірних покривів, пульс - 82/хв, ритмічний, АТ - 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

a. Ниркова коліка

b. Печінкова коліка

c. Кишкова коліка

d. Гострий панкреатит

е. Гострий гастрит

50. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий, дуже інтенсивний ("кинджальний") біль в епігастрії, що швидко поширився по всьому животу. Загальний стан важкий, шкіра бліда, вкрита холодним потом. Живіт напружений, дошкоподібний, різко болючий при пальпації, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. В анамнезі: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Яке ускладнення виразкової хвороби, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

а. Перфорація виразки

б. Стеноз пілоричної частини шлунка

с. Пенетрація виразки

д. Шлунково-кишкова кровотеча

е. Малігнізація виразки

51. Який метод дослідження дає можливість провести трансервікальний огляд нижнього полюса плодового міхура, визначати характер навколоплідних вод, особливостей плодових оболонок і стану плода?

а. Кольпоскопія

б. Лапароскопія

с. Гістероскопія

д. Амніоскопія

е. Цервікоскопія

52. Чоловіка вкусив пес, який, імовірно, був хворий на сказ. Який із нижченаведених симптомів може спостерігатися у пацієнта вже в продромальному періоді захворювання?

а. Фотофобія

б. Гіперсалівація

с. Аерофобія

д. Паралічі

е. Гіперестезії

53. У роділлі триває перший період фізіологічних пологів, латентна фаза. Термін вагітності - 39 тижнів, вагітність II, пологи II. Як часто потрібно вислуховувати серцебиття для оцінки стану плода?

а. 3 інтервалом 10 хв

б. Раз на 1 год

с. Кожні 30 хв

д. 3 інтервалом 20 хв

е. Кожні 15 хв

54. У пацієнта віком 35 років спостерігаються симптоми туберкульозу: тривалий кашель, субфебрильна температура тіла, зниження маси тіла, нічна пітливість. Укажіть інноваційний молекулярно-генетичний тест, що забезпечує швидкий автоматизований результат у виявленні генів збудника туберкульозу.

а. GeneXpert

б. Sanger sequencing

с. Western blot

д. ELISA

е. FISH

55. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на задишку, колючий біль та відчуття скутості в грудній клітці, кашель із виділенням гнійного мокротиння, загальну слабкість. З анамнезу відомо, що пацієнт довгий час працює у гірничорудній промисловості з видобутку корисних копалин, що залягають у породі, яка містить кварц. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,2^oC, ЧД - 26/хв, пульс - 90/хв, АТ - 130/80 мм рт. ст. Перкуторно у легенях визначаються ділянки коробкового та притупленого звуку. Аускультативно вислуховується ослаблене везикулярне дихання та дрібнопухирчасті вологі хрипи. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Пневмонії
- b. Антракозу
- c. Гострого бронхіту
- d. Сухого плевриту
- e. Силікозу**

56. У пацієнта, який перебуває в реанімаційному відділенні, спостерігається хвилеподібна зміна амплітуди дихання з паузами між хвилями 40-50 с. Укажіть патологічний тип дихання.

- a. Гаспінг
- b. Чейна-Стокса**
- c. Біота
- d. Тахіпноє
- e. Куссмауля

57. У пацієнта одразу після введення вакцини з'явилися різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття, утруднення дихання, відчуття страху смерті, шум у вухах. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, вкрита холодним потом, дихання часте, поверхнєве, пульс - 120/хв, слабкого наповнення, АТ - 70/30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. Гіповолемічний шок
- b. Анафілактичний шок**
- c. Набряк Квінке
- d. Кардіогенний шок
- e. Напад бронхіальної астми

58. Який метод лікування доцільно запропонувати пацієнтці з неускладненою формою жовчнокам'яної хвороби, у якої під час обстеження виявлено одиничні невеликі холестеринові камені в жовчному міхурі, придатні для руйнування без ризику обструкції?

- a. Ударно-хвильову літотрипсію**
- b. Гепатопротекторну терапію
- c. Жовчогінну терапію
- d. Електрофорез жовчного міхура з магнію сульфатом
- e. Холецистектомію

59. У роділлі, яка народжує вдруге, триває другий період фізіологічних пологів. Під час прорізування голівки після потуги зареєстровано, що частота серцевих скорочень плода становить 80/хв. Укажіть подальшу тактику ведення пологів у цьому разі.

- a. Увести епінефрин 0,01 мг/кг
- b. Провести епізіотомію під місцевою анестезією**
- c. Накласти акушерські щипці
- d. Продовжити очікувальну тактику
- e. негайно провести кесарів розтин

60. Як називається процедура, що полягає у введенні розчинів лікарських засобів через порожнину матки в маткові труби для визначення їх прохідності або з лікувальною метою?

- a. Пертубація
- b. Лапароскопія
- c. Гістероскопія
- d. Кольпоскопія
- e. Гідротубація**

61. Пацієнтка скаржиться на зміну гостроти зору, двоїння в очах, погіршення сну, пітливість, дратівливість, зменшення маси тіла за збереженого апетиту. Об'єктивно спостерігається: тремор рук і тіла, пульс - 110/хв, екзофтальм, збільшення розмірів щитоподібної залози. Попередній діагноз: дифузний токсичний зоб. Який із нижченаведених факторів посідає перше місце серед можливих причин розвитку цього захворювання?

- a. Психотравма**
- b. Порушення дієти

- с. Шкідливі звички
- d. Куріння
- е. Переохолодження

62. Лікар-педіатр ЦПМСД встановив восьмирічній дитині діагноз: скарлатина. Який документ необхідно заповнити для обліку цього захворювання?

- a. Медичну карту стаціонарного хворого
- b. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання**
- с. Контрольну карту диспансерного нагляду
- d. Медичну карту амбулаторного хворого
- е. Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів

63. Пацієнт віком 60 років скаржиться на пекучий біль за грудниною з іррадіацією в ліву руку та ліву лопатку, що виник годину тому. Двічі приймав нітрогліцерин, проте біль не минув. Об'єктивно спостерігається: пацієнт перебуває у стані психомоторного збудження, наляканий, шкіра бліда, пульс - 88/хв, ритмічний, АТ - 130/70 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- a. Кардіогенного шоку
- b. Нападу стенокардії
- с. Інфаркту міокарда**
- d. Гіпертензивного кризу
- е. Колапсу

64. Для якого ендокринного захворювання характерна поява у пацієнта таких очних симптомів: екзофтальм, рідке моргання (симптом Штельвага), відставання верхньої повіки від райдужки під час переведення погляду вгору (симптом Грефе), блиск очей (симптом Крауса)?

- a. Дифузного токсичного зоба**
- b. Гіпотиреозу
- с. Аутоімунного тиреоїдиту
- d. Цукрового діабету
- е. Нецукрового діабету

65. В якому терміні вагітності доцільно шпиталізувати жінку до акушерського закладу охорони здоров'я для попередження переношування вагітності, за умови неускладненого її перебігу?

- a. 42 тижні
- b. 41 тиждень**
- с. 35 тижнів
- d. 37 тижнів
- е. 39 тижнів

66. Пацієнту віком 32 роки встановлено діагноз: хронічний пієлонефрит. Яка з нижченаведених лікарських рослин має сечогінні властивості та може використовуватися як фітотерапевтичний засіб для лікування інфекцій сечовивідних шляхів?

- a. Мати-й-мачуха
- b. Меліса лікарська
- с. Подорожник великий
- d. Ехінацея пурпурова
- е. Хвощ польовий**

67. У пацієнтки напад бронхіальної астми минув після застосування інгаляційного глюкокортикоїдного препарату та завершився виділенням в'язкого мокротиння. Укажіть характер мокротиння в цьому разі.

- a. Склоподібне**
- b. Із прожилками крові
- с. Гнійне
- d. "Іржаве"
- е. У вигляді "малинового желе"

68. Під час внутрішньовенного введення розчину антибіотика у пацієнта раптово виникли такі

симптоми: відчуття жару та стиснення в грудях, задишка. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, рясна пітливість, АТ - 80/60 мм рт. ст., пульс ниткоподібний. Який лікарський засіб потрібно застосувати насамперед для надання невідкладної допомоги пацієнту?

a. Епінефрин

b. Хлоропірамін

c. Цетиризин

d. Лоратадин

e. Парацетамол

69. У пацієнта після вживання лісових горіхів раптово виникли захриплість голосу, "гавкаючий кашель", утруднене дихання. Об'єктивно спостерігається: пацієнт стривожений, шкіра обличчя ціанотична, повіки та губи набряклі, щільні на дотик, свербіжу немає, пульс - 84/хв, ритмічний, АТ - 110/70 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

a. Аспірація стороннього тіла

b. Кропив'янка

c. Дифтерійний круп

d. Набряк Квінке

e. Анафілактичний шок

70. Операційна сестра медична комплектує стерилізаційний бікс та укладає все необхідне (операційну білизну, халати, перев'язувальний матеріал та ін.) для роботи перев'язувального кабінету або малої операційної протягом одного робочого дня. Як називається такий вид укладки?

a. -

b. Спеціалізована

c. Цілеспрямована

d. Універсальна

e. Видова

71. Пацієнту, який лікується в урологічному відділенні, призначено дослідження сечі за методом Зимницького. Яке співвідношення денного діурезу до нічного в нормі?

a. 1:1

b. 1:4

c. -

d. 3:1

e. 1:3

72. Чоловік віком 49 років скаржиться на біль у грудній клітці та утруднене дихання. Після первинного обстеження встановлено попередній діагноз: ексудативний плеврит. Яка діагностична процедура найдоцільніша для підтвердження діагнозу та подальшого планування лікування?

a. Бронхоскопія

b. Абдомінальна пункція

c. Спірометрія

d. Торакоцентез

e. Стернальна пункція

73. Пацієнтка скаржиться на ранкову скутість, деформацію і постійний біль у дрібних суглобах, зниження фізичної активності. Об'єктивно спостерігається: симетричні згинальні контрактури дрібних суглобів. На рентгенограмі кисті й зап'ястка - ерозії та виражений остеопороз безпосередньо прилеглих до суглоба кісток, анкілоз. Для якого захворювання це характерно?

a. Ревматичного поліартриту

b. Системного васкуліту

c. Ревматоїдного артрити

d. Системного червоного вовчака

e. Деформуючого остеоартрозу

74. Пацієнтка, яка хворіє на хронічну серцеву недостатність, скаржиться на наростаючу

задишку під час звичайних фізичних навантажень, часте серцебиття, підвищену втомлюваність та знижену працездатність. Добовий діурез становить 400 мл. На якій частині тіла насамперед виникатимуть набряки у пацієнтки?

- a. Поперековій ділянці
- b. Кистях рук
- c. Нижніх кінцівок**
- d. Обличчі
- e. Животі

75. До лікаря-дерматолога звернулася пацієнтка зі скаргами на появу висипань на кистях рук. Після обстеження їй встановлено діагноз: справжня екзема в стадії мокнуття. Яка лікарська форма (форма випуску) препаратів рекомендована для місцевого лікування цього захворювання?

- a. Мазь
- b. Паста
- c. Гель
- d. Крем
- e. Розчин**

76. Для якого клінічного варіанта інфаркту міокарда характерні відсутність больового синдрому та наявність сухого кашлю і прогресуючої задишки?

- a. Церебрального
- b. Ангінозного
- c. Гастралгічного
- d. Аритмічного
- e. Астматичного**

77. Пацієнту віком 65 років встановлено діагноз: артеріальна гіпертензія. Підвищення рівня якого біохімічного показника в крові може свідчити про ураження одного з органів-мішеней у разі цього захворювання?

- a. Креатиніну**
- b. Лужної фосфатази
- c. Загальних ліпідів
- d. Загального білірубіну
- e. Глюкози

78. Пацієнту, який страждає на цукровий діабет 1-го типу, сестра медична пояснює методи та способи інсулінотерапії. Який медичний пристрій забезпечує безперервне підшкірне введення інсуліну в автоматичному режимі?

- a. Інсулінова помпа**
- b. Шприц-дозатор
- c. Інсулінова ручка
- d. Інфузомат
- e. Внутрішньокісткова канюляція

79. У жінки віком 42 роки, яка впродовж 10-ти років хворіє на артеріальну гіпертензію, після емоційного перенавантаження виникли головний біль, почуття тривоги, сухість у роті. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, тремор рук, гіперемія обличчя, підвищена вологість шкіри, рухових розладів не виявлено, АТ - 220/120 мм рт. ст., пульс - 110/хв. Глюкоза крові - 4,7 ммоль/л. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- a. Ішемічний інсульт
- b. Гіпертензивний криз**
- c. Гіперглікемічна кома
- d. Геморагічний інсульт
- e. Гіпоглікемічна кома

80. Пацієнт відчув раптовий біль за грудниною та стиснення у грудях. Сестра медична, надаючи невідкладну допомогу, звільнила його від тиснучого одягу, порекомендувала

прийняти під язик таблетку нітрогліцерину, викликала лікаря. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Кардіогенний шок
- c. Гіпертензивний криз
- d. Колапс

e. Напад стенокардії

81. Сестра медична готує доповідь щодо профілактики внутрішньолікарняної інфекції (ВЛІ). Який найпоширеніший шлях передачі ВЛІ?

- a. Контактний
- b. Внутрішньоутробний
- c. Трансплацентарний
- d. Статевий
- e. Трансмісивний

82. Укажіть період пологів, який починається з моменту повного розкриття шийки матки і закінчується народженням плоду через природні пологові шляхи.

- a. Перший
- b. Третій
- c. -
- d. Четвертий

e. Другий

83. Пацієнту віком 30 років встановлено діагноз: псоріаз. Який специфічний клінічний прояв вказуватиме на стадію (фазу) захворювання?

- a. Симптом Кебнера
- b. Кільцеподібна еритема
- c. Висип у вигляді "метелика"
- d. Симптом Нікольського
- e. Плями Бельського-Філатова-Копліка

84. Чоловіку віком 34 роки встановлено попередній діагноз: менінгококовий менінгіт та з діагностичною метою призначено спинномозкову пункцію. Який медичний інструмент треба підготувати сестрі медичній для проведення цієї процедури?

- a. Троакар
- b. Голку Касирського

c. Голку Біра

- d. Голку Дюфо
- e. Біопсійну голку

85. У чоловіка віком 40 років унаслідок падіння з висоти стався перелом кісток передпліччя. Укажіть одне з ранніх ускладнень, що може виникнути у разі закритих переломів довгих трубчастих кісток.

- a. Анкілоз
- b. Некроз кістки
- c. Жирова емболія

- d. Контрактури
- e. Укорочення кінцівки

86. Під час виконання внутрішньом'язової ін'єкції сестра медична ввела голку шприца в м'яз на всю довжину, внаслідок чого вона зламалася так, що навіть не видно її кінчика. Оберіть найоптимальніший метод видалення голки з м'яза в цьому разі.

- a. Спробувати витягнути голку пальцями
- b. Спробувати витягнути голку, скориставшись магнітом
- c. Провести хірургічне втручання для видалення голки
- d. Прикласти мазь Вишневського до місця уколу
- e. Видалити голку за допомогою хірургічного пінцета

87. Укажіть частий побічний ефект, що може розвинути у пацієнта під час внутрішньовенного введення 1-го розчину нікотинової кислоти.

- a. Порушення зору
- b. Закреп
- c. Сонливість
- d. Брадикардія
- e. Відчуття жару в тілі**

88. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано до лікарні на 5-ту добу захворювання зі скаргами на сильний біль у м'язах, підвищення температури тіла до 39°C , головний біль, пожовтіння шкіри. Об'єктивно спостерігається: язик сухий, обкладений білим нальотом, пульс - 120/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст., тони серця приглушені, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3,5 см. Результати загального аналізу крові: лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Спостерігається зменшення добового об'єму сечі. З анамнезу з'ясувалося, що 2 тижні тому купався в озері. Для якого захворювання характерні вказані клініко-лабораторні показники?

- a. Гепатиту
- b. ВІЛ-інфекції
- c. Бешихи
- d. Лептоспірозу**
- e. Малярії

89. Пацієнту терапевтичного відділення з діагностичною метою проводять дуоденальне зондування. На етапі отримання жовчі порції В йому прикладають медичну грілку під праве підребер'я. Яка основна мета її застосування в цьому разі?

- a. Зменшення чутливості в ділянці правого підребер'я
- b. Зігрівання пацієнта для покращення загального стану
- c. Розширення жовчних протоків для покращення відтоку жовчі**
- d. Зменшення продукції шлункового соку для зниження кислотності
- e. Звуження кровоносних судин для запобігання кровотечі

90. У пацієнтки, якій призначено накладання гірчичників, на момент проведення процедури спостерігається підвищення температура тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$. Як потрібно вчинити сестрі медичній у цьому разі?

- a. До місця накладання гірчичників попередньо прикласти холодний компрес
- b. Накладати гірчичники не можна**
- c. Обмежити час накладання гірчичників до 5 хв
- d. Накласти гірчичники і запропонувати прийняти жарознижувальний засіб
- e. Накласти гірчичники, не зважаючи на обставини

91. Жінка віком 20 років скаржиться на сильний переймоподібний біль унизу живота та попереку, кров'яністі виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після падіння. Із анамнезу відомо, що остання менструація була 4 місяці тому. Порушення менструального циклу та гінекологічні захворювання в минулому заперечує, статеве життя регулярне, без контрацепції. Об'єктивно спостерігається: дно матки визначається посередині між лобковим симфізом та пупком, матка в гіпертонусі. Виділення зі статевих шляхів кров'яністі, значні, зі згустками. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся у жінки?

- a. Загроза переривання вагітності
- b. Апоплексія яєчника
- c. Аборт у ході**
- d. Альгодисменорея
- e. Передчасні пологи

92. Укажіть місце накладання електроду із зеленим маркуванням під час проведення електрокардіографії.

- a. Ліва рука
- b. Права нога
- c. Права рука
- d. -

е. Ліва нога

93. У пацієнта віком 45 років під час огляду та об'єктивного обстеження виявлено збільшення розмірів щитоподібної залози. Укажіть основний метод дослідження, що проводиться для визначення її функції.

- a. Загальноклінічний аналіз сечі
- b. Загальноклінічний аналіз крові
- c. Аналіз крові на глюкозу
- d. Аналіз крові на тиреоїдні гормони**
- e. УЗД щитоподібної залози

94. Медичний працівник проводить запис електрокардіограми пацієнту, в якого виник напад стенокардії, та виконує послідовний аналіз отриманих параметрів. Які зубці на ЕКГ в нормі є завжди негативними (від'ємними)?

- a. -
- b. R та P
- c. Q та S**
- d. R та T
- e. P та T

95. Пацієнтка віком 18 років звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на часте і болісне сечовипускання, біль у надлобковій ділянці, підвищення температури тіла до $37,4^{\circ}\text{C}$. Симптоми з'явилися після переохолодження. У сечі: лейкоцитурія, еритроцити - 20-30 в полі зору мікроскопа. Для якого захворювання найхарактерніші вказані клініко-лабораторні показники?

- a. Гострого пієлонефриту
- b. Гострого циститу**
- c. Гострого аднекситу
- d. Полікістозу нирок
- e. Сечокам'яної хвороби

96. П'ятирічна дитина каталася на самокаті і впала. На місці забою виникла гематома без пошкодження шкірних покривів. Які дії зменшать зону крововиливу?

- a. Накладання зігрівального компресу
- b. Застосування міхура з льодом**
- c. Прикладання медичної грілки
- d. -
- e. Застосування гірчичників

97. Пацієнт віком 18 років скаржиться на підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$, набряк і почервоніння правої щоки. Об'єктивно спостерігається: у ділянці правої щоки визначається інфільтрат, болючий під час пальпації, шкіра над ним напружена, гіперемована, у центрі інфільтрату візуалізується стрижень у вигляді сіро-зелених мас. Який запальний процес розвинувся в пацієнта?

- a. Гідраденіт
- b. Абсцес
- c. Фурункул**
- d. Флегмона
- e. Карбункул

98. Який метод контролю якості дезінфекції передбачає посів матеріалу на поживне середовище для виявлення мікрофлори?

- a. Візуальний
- b. Фізичний
- c. Інструментальний
- d. Бактеріологічний**
- e. Хімічний

99. У породіллі після пологів виявлено розрив задньої спайки та стінки піхви, а також шкіри

промежини довжиною 1 см, м'язи промежини неушкоджені. Укажіть ступінь розриву промежини.

- a. I
- b. -
- c. II
- d. IV
- e. III

100. Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість та біль у правій половині тулуба. Під час огляду на шкірі грудної клітки виявлено множинні везикули, розташовані групами вздовж VII ребра в міжреберному проміжку. Для якого з нижченаведених захворювань характерні вказані симптоми?

- a. Справжньої екземи
- b. Імпетиго
- c. Токсикодермії
- d. Простого герпесу
- e. Оперізувального герпесу

101. У пацієнта, який хворіє на хронічну ниркову недостатність, розвинулася уремія. Який із нижченаведених симптомів свідчить про розвиток цієї патології?

- a. Збільшення лімфатичних вузлів
- b. Запах аміаку з рота
- c. Гіперемія шкірних покривів
- d. Підвищення апетиту
- e. Підвищення температури тіла

102. На машинобудівному заводі проводиться позапланова перевірка у зв'язку з зафіксованим збільшенням захворюваності на пневмоконіоз серед працівників. Під час обстеження виявлено підвищену концентрацію кварцового пилу в повітрі робочої зони. Який із нижченаведених заходів є найефективнішим для зменшення ризику захворюваності співробітників на пневмоконіоз?

- a. Скорочення тривалості робочої зміни
- b. Оптимізація температурних умов робочої зони
- c. Надання додаткових днів відпустки
- d. Зменшення запиленості в повітрі робочої зони
- e. Проведення позапланового інструктажу для працівників

103. У дитячому дошкільному закладі зареєстровано спалах кору. Укажіть характер елементів висипу у разі типового перебігу періоду висипань кору.

- a. Везикульозний
- b. Плямисто-папульозний
- c. Петехіальний
- d. Геморагічно-зірчастий
- e. Уртикарний

104. У пацієнта після проведення скарифікаційної шкірної проби через 15 хв у місці нанесення алергену утворилася папула діаметром 5 мм, оточена ділянкою гіперемії. Проаналізуйте результат проби.

- a. Гіперергічна
- b. Позитивна
- c. Сумнівна
- d. Негативна
- e. -

105. У жінки віком 28 років після вживання шоколаду на шкірі тулуба та кінцівок з'явилися висипання, що супроводжуються свербіжем, схожі на опіки кропивою. Об'єктивно спостерігається: на шкірі візуалізуються пухирі червоного кольору різних розмірів, температура тіла - 37,5^oC, пульс - 78/хв, АТ - 120/80 мм рт. ст. Яка група лікарських засобів

використовується для лікування цього патологічного стану?

- a. Антидепресанти
- b. Антациди
- c. Антигістамінні**
- d. Антиагреганти
- e. Антибіотики

106. Укажіть особливість приймання ферментних препаратів.

- a. Через 2 год після вживання їжі
- b. Під час вживання їжі**
- c. Через 1 год після вживання їжі
- d. Натщесерце
- e. За 2 год до вживання їжі

107. Відповідно до призначення лікаря дитині потрібно парентерально ввести 350000 ОД антибіотика з групи цефалоспоринов III покоління. У флаконі міститься 1000 мг діючої речовини. Скільки мілілітрів розчину антибіотика потрібно ввести дитині, якщо застосувати стандартне розведення?

- a. 35 мл
- b. 5 мл
- c. 1,5 мл
- d. 3,5 мл**
- e. 10 мл

108. Для якого захворювання травної системи типові такі особливості больового синдрому: біль в епігастрії з'являється натщесерце, вночі або через 3-4 год після останнього вживання їжі та зникає навіть після незначного вживання будь-яких продуктів харчування?

- a. Виразкової хвороби дванадцятипалої кишки**
- b. Виразкової хвороби шлунка
- c. Хронічного холециститу
- d. Хронічного атрофічного гастриту
- e. Хронічного панкреатиту

109. Пацієнту віком 42 роки встановлено попередній діагноз: гостра ниркова недостатність. Рівень яких біохімічних показників потрібно визначити в крові для дослідження функції нирок?

- a. С-реактивного білка, сілових кислот
- b. α -амілази, трипсину
- c. Загального білка та його фракцій
- d. Креатиніну, сечовини**
- e. Білірубіну, трансаміназ

110. Дитина народилася в терміні гестації 39 тижнів із масою тіла 3800 г. У неонатальному періоді спостерігалися тривала жовтяниця, пізні відпадання пупкового канатика та повільне загоєння пупкової ранки, зниження фізіологічних рефлексів, гіпотрофія м'язів, щільні набряки на тильних поверхнях кистей та стоп, непропорційно велика голова, збільшення губ і язика. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Дифузного токсичного зоба
- b. Вродженої вади серця
- c. Акромегалії
- d. Рахіту
- e. Вродженого гіпотиреозу**

111. У пацієнта терапевтичного відділення під час об'єктивного обстеження виявлено випинання надключичних ямок. Перкуторно над легеньми визначається коробковий звук. Аускультативно вислуховується жорстке дихання та сухі свистячі хрипи на видиху. Для якого захворювання характерні ці результати об'єктивного обстеження?

- a. Ексудативного плевриту
- b. Гострого бронхіту

- c. Пневмонії
- d. Раку легень

e. Бронхіальної астми

112. Пацієнтка перебуває у відділенні інтенсивної терапії після операції. Лікар призначив введення постійного катетера Фолея для моніторингу та забезпечення дренивання сечі. Для його правильної фіксації необхідно заповнити балон катетера ізотонічним розчином натрію хлориду. Яку кількість ізотонічного розчину натрію хлориду потрібно ввести в балон катетера Фолея?

- a. 10 мл
- b. 6 мл
- c. 8 мл
- d. 2 мл
- e. 1 мл

113. Який ендоскопічний метод дослідження сечового міхура використовується для діагностики захворювань, виконання біопсії, забору біологічного матеріалу та проведення лікувальних маніпуляцій?

- a. Цистоскопія
- b. Холецистографія
- c. Колоноскопія
- d. Цистографія
- e. Ультразвукове дослідження

114. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла, пітливість, задишку та кашель із виділенням гнійного з неприємним запахом мокротиння у великій кількості (до 1 л на добу). Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- a. Раку легень
- b. Пневмосклерозу
- c. Гострого бронхіту
- d. Абсцесу легень
- e. Вогнищевої пневмонії

115. Сестра медична, виконуючи призначення лікаря, вводить лікарський засіб пацієнту внутрішньом'язово. Укажіть рекомендовану швидкість введення ін'єкційного розчину в м'яз для оптимального розподілу препарату в тканинах та мінімізації ризику ускладнень.

- a. 1 мл за 1 с
- b. 1 мл за 5 с
- c. 1 мл за 10 с
- d. 0,5 мл за 5 с
- e. 0,5 мл за 10 с

116. Який найпростіший фізіотерапевтичний засіб місцевого впливу застосовується в II періоді гарячки для полегшення стану пацієнта?

- a. Зігрівальний компрес
- b. Медична грілка
- c. Медичні банки
- d. Міхур із льодом
- e. Гірчичники

117. Реабілітаційна програма для збереження функції уражених суглобів у пацієнтів із ревматоїдним артритом зазвичай включає різні методи лікування. Укажіть метод, спрямований на поліпшення рухливості та функції суглобів.

- a. Міостимуляція
- b. Вакуумний масаж
- c. Вісцеральна терапія
- d. Механотерапія
- e. Пневмопресинг

118. Яка дія електричного струму виявляється у подразненні збудливих тканин організму людини, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів?

- a. Біологічна
- b. Електролітична
- c. Термічна
- d. -
- e. Магнітна

119. У пацієнта виразкова хвороба шлунка ускладнилася шлунково-кишковою кровотечею. Який вигляд матимуть калові маси в цьому разі?

- a. Коричневого кольору, нормальної консистенції
- b. Мутнувато-білого кольору, водянисті
- c. Знебарвлені, пастоподібні
- d. Чорного кольору, дьогтеподібні
- e. Зеленого кольору, водянисті

120. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на раптовий інтенсивний біль у поперековій ділянці, що іррадіює в промежину і статеві органи, супроводжується нудотою та частими позивами до сечовипускання. Біль з'явився після тривалої тряскої їзди. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка перебуває у стані психоomotorного збудження, шкіра бліда, надмірно волога, пульс частий і слабкий. У загальному аналізі сечі: свіжі еритроцити та кристали солей. Для якого патологічного стану характерні вказані клінічні прояви?

- a. Жовчної (печінкової) коліки
- b. Перитоніту
- c. Гострого апендициту
- d. Ниркової коліки
- e. Гострого аднекситу

121. У пацієнта, який хворіє на пневмонію, на тлі швидкого (упродовж декількох годин) зниження температури тіла із 39,5[°]C до 37[°]C, раптово виникли загальна слабкість, запаморочення, відчуття холоду, серцебиття. Об'єктивно спостерігається: пацієнт млявий, апатичний, із зусиллям відповідає на запитання. Шкірні покриви та слизові оболонки бліді, холодний липкий піт, кінцівки холодні, дихання поверхневе, пульс - 98/хв, слабого наповнення, АТ - 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в пацієнта?

- a. Кардіогенний шок
- b. Анафілактичний шок
- c. Астматичний статус
- d. Набряк легень
- e. Колапс

122. Як називається форма медичної документації, призначена для реєстрації режиму перебування пацієнта в стаціонарі закладу охорони здоров'я та фіксації відомостей про медикаментозне лікування, методів обстеження, фізіотерапевтичних процедур тощо?

- a. Консультативний висновок спеціаліста
- b. Температурний листок
- c. Листок лікарських призначень
- d. Журнал обліку процедур
- e. Реєстраційна генетична карта

123. Пацієнтку шпиталізовано до лікарні зі скаргами на біль у правому підребер'ї, що іррадіює в епігастральну ділянку та під праву лопатку, підвищення температури тіла. Під час опитування з'ясувалося, що жінка хворіє впродовж 3-х років, останнє загострення спровоковане вживанням жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: біль у ділянці проєкції жовчного міхура під час пальпації, позитивний френікус-симптом. За результатами дуоденального зондування в порції В виявлено значну кількість лейкоцитів та епітеліальних клітин. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви та результати додаткового методу дослідження?

- a. Геморагічного коліту
- b. Вірусного гепатиту

с. Жовчнокам'яної хвороби

- d. Виразкової хвороби шлунка
- e. Гострого пієлонефриту

124. Старша сестра медична навчає медичний персонал її підрозділу правилам гігієни рук. Який тип нагадування на робочому місці є найліпшим для активізації уваги?

- a. Аудіоповідомлення

b. Інформаційні плакати

- c. Санбюлетні
- d. Накази
- e. Конференції

125. Яку процедуру потрібно провести медичному працівнику після контакту з потенційно інфікованим матеріалом та зняття медичних рукавичок?

- a. Миття рук із милом
- b. Одягання нових рукавичок
- c. Висушування рук
- d. Хірургічну обробку рук

e. Гігієнічну обробку рук

126. Пацієнту віком 37 років встановлено попередній діагноз: жовчнокам'яна хвороба. Який рентгенологічний метод дослідження застосовується для оцінки стану жовчного міхура та виявлення патологічних змін у ньому з використанням контрастної речовини?

- a. Іригоскопія
- b. Гастрографія

c. Холецистографія

- d. Урографія
- e. Цистографія

127. Для зменшення інтенсивності спастичного болю, що супроводжує перебіг хронічного холециститу, пацієнту рекомендовано використання медичної грілки. Якою має бути температура води для заповнення грілки в цьому разі?

a. 60[°]С

- b. 90[°]С
- c. 50[°]С
- d. 80[°]С
- e. 40[°]С

128. Для профілактики якого ускладнення під час підшкірної ін'єкції олійного розчину потрібно відтягнути поршень шприца назад після проколу шкіри перед введенням препарату?

a. Медикаментозної емболії

- b. Гематоми
- c. Некрозу
- d. Повітряної емболії
- e. Інфільтрату

129. Під час вимірювання артеріального тиску пацієнтці сестра медична звернула увагу на те, що різниця між систолічним та діастолічним тиском становить 30 мм рт. ст. Як називається цей показник?

- a. Систолічний об'єм крові
- b. Центральний тиск

c. Пульсовий тиск

- d. Хвилинний об'єм крові
- e. Капілярний пульс

130. Пацієнту віком 35 років встановлено діагноз: ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа). Які зміни в загальному аналізі крові є найхарактернішими для цього захворювання?

- a. Лейкопенія

- b. Еритроцитоз
- c. Тромбоцитопенія**
- d. Ретикулоцитопенія
- e. Еозинофілія

131. У жінки, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після введення інсуліну з'явилися загальна слабкість, головний біль, відчуття голоду, тривожність, пітливість, тремтіння рук. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, пульс - 92/хв, ритмічний, АТ - 100/60 мм рт. ст. Укажіть заходи домедичної допомоги в цьому разі.

- a. Увести інсулін
- b. Увести кордіамін
- c. Надати пацієнтці горизонтальне положення та підняти ноги вище рівня голови
- d. Дати вжити глюкозовмісні харчові продукти (воду з цукром, грудочку цукру, сік)**
- e. Провести інгаляцію киснем

132. Пацієнт перебуває на лікуванні в хірургічному відділенні після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 2 дні тому. У ділянці стегна, в місці забою, утворилася гематома. Укажіть оптимальну лікувальну тактику, що сприятиме розсмоктуванню гематоми.

- a. Накладання зігрівального компресу**
- b. Імобілізація кінцівки
- c. Прикладання міхура з льодом
- d. Накладання охолоджувального компресу
- e. Застосування гірчичників

133. Яка з нижченаведених груп лікарських засобів використовується для етіотропного лікування хронічного пієлонефриту?

- a. Антибактеріальні**
- b. Діуретики
- c. Нестероїдні протизапальні
- d. Антитромботичні
- e. Антигістамінні

134. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, задишку під час фізичних навантажень, відчуття "повзання мурашок" по шкірі та утруднення під час ходьби. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри з лимонним відтінком, іктеричність склер, яскраво-червоний глянцеви́й язик з атрофією сосочків. У крові: гемоглобін - 70 г/л, колірний показник - 1,4, макроцитоз еритроцитів. В анамнезі: атрофічний гастрит. Для якого виду анемії характерні ці клінічні прояви та показники гемограми?

- a. Залізодефіцитної
- b. Гіпопластичної
- c. Апластичної
- d. Постгеморагічної
- e. Вітамін В₁₂-дефіцитної**

135. Пацієнт, у якого триває І стадія гарячки, скаржиться на головний біль, м'язове тремтіння, мерзлякуватість, біль у м'язах, загальне нездужання. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, холодна на дотик, набула вигляду "гусячої". Який найпростіший метод фізіотерапії доцільно застосовувати в І стадії гарячки для полегшення стану пацієнта?

- a. Прикладання мішечків із сухим льодом на ділянку великих судин шиї
- b. Застосування гірчичників
- c. Накладання охолоджувального компресу
- d. Застосування медичної грілки**
- e. Прикладання міхура з льодом

136. Породіллі після народження плода введено 10 ОД окситоцину, процес народження посліду проведено шляхом контрольованої тракції за пуповину з контртракцією на матку. Укажіть ще один стандартний компонент повноцінного активного ведення третього періоду фізіологічних пологів.

- a. Інструментальна ревзія порожнини матки
- b. Пункція заднього склепіння піхви
- c. -

d. Масаж матки через передню черевну стінку

- e. Балонна тампонада матки

137. Під час дослідження пульсу пацієнтки сестра медична з'ясувала, що після притискання променевої артерії до променевої кістки пульсація не припинилася. Проаналізуйте цей параметр пульсу.

- a. Нормального наповнення
- b. Ниткоподібний
- c. М'який

d. Напружений (твердий)

- e. Слабкого наповнення

138. Пацієнт віком 37 років скаржиться на кашель із виділенням великої кількості мокротиння з неприємним запахом, інколи "повним ротом", задишку, періодичне підвищення температури тіла та зниження працездатності. Мокротиння розшароване, гнійно-слизового характеру. Для якого захворювання характерні вказані клінічні прояви?

- a. Сухого плевриту
- b. Ексудативного плевриту
- c. Бронхоектатичної хвороби

d. Гострого бронхіту

- e. Негоспітальної пневмонії

139. Для лікування подагричного артрити в стадії загострення препаратами першої лінії є швидкодіючі НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) у високих дозах. Укажіть особливість приймання лікарських засобів цієї групи, що дозволяє запобігти розвитку побічних ефектів на шлунково-кишковий тракт.

a. Після вживання їжі

- b. За 2 год до вживання їжі
- c. Натщесерце
- d. Запивати невеликою кількістю води
- e. Незалежно від вживання їжі

140. Який із нижченаведених продуктів рекомендовано виключити з раціону харчування пацієнтки, яка хворіє на хронічну форму кропив'янки, для запобігання загострень хвороби?

- a. Вівсянку
- b. Броколі
- c. Картопля

d. Шоколад

- e. Кабачки

141. У п'ятирічної дитини упродовж 2-х діб спостерігаються підвищення температури тіла до 38^oC, рідкі випорожнення зеленуватого кольору з прожилками крові, часті болючі позиви на випорожнення (тенезми). Живіт під час пальпації болючий, переважно в лівій здухвинній ділянці за ходом сигмоподібної кишки. Для якого інфекційного захворювання характерні ці клінічні прояви?

- a. Холери
- b. Ротавірусної інфекції
- c. Сальмонельозу
- d. Лептоспірозу

e. Шигельозу

142. Під час догляду за пацієнтом, який хворіє на інфекційне захворювання, медичний працівник поєднує декілька засобів індивідуального захисту. Який предмет індивідуального захисту потрібно одягати останнім?

- a. Маску

- b. Хірургічний костюм
- c. Захисні окуляри
- d. Респіратор
- e. Рукавички

143. Які з нижченаведених лікарських засобів найчастіше викликають медикаментозну алергію?

- a. Сечогінні
- b. Ентеросорбенти
- c. Проносні
- d. Гіпотензивні
- e. Антибіотики

144. У пацієнта, який хворіє на хронічний ентерит, упродовж 5-ти днів спостерігаються часті рідкі випорожнення (до 15 разів на добу) світло-жовтого кольору зі шматочками неперетравленої їжі. Пацієнт скаржиться на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, апатію, спрагу, значну втрату маси тіла. Який патологічний процес розвивається в організмі пацієнта?

- a. Дефіцит вітаміну D
- b. Дефіцит заліза
- c. Гіпокальціємія
- d. Гіпергідратація (затримка води)
- e. Зневоднення (дегідратація)

145. Яке дослідження проводиться для виявлення прихованої коронарної недостатності та ранньої діагностики стенокардії?

- a. Велоергометрія
- b. Аудіометрія
- c. Спірографія
- d. Нейроміографія
- e. Енцефалографія

146. Укажіть засіб, яким потрібно промити неушкоджену шкіру, у разі потрапляння на неї крові або інших потенційно небезпечних біологічних рідин.

- a. Фізіологічним розчином
- b. Водю з милом
- c. Антисептиком
- d. Дезінфікуючим розчином
- e. Етиловим спиртом

147. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на біль у поперековій ділянці, часте сечовипускання, озноб, підвищення температури до $38,5^{\circ}\text{C}$. Під час об'єктивного обстеження виявлено позитивний симптом Пастернацького. З боку інших органів патології не виявлено. Які зміни в загальному аналізі сечі, найімовірніше, спостерігатимуться в цьому разі?

- a. Міоглобінурія
- b. Глюкозурія
- c. Гематурія (сеча кольору "м'ясних помиїв")
- d. Парапротеїнурія
- e. Лейкоцитурія (піурія)

148. Який об'єм антисептика необхідно використати для проведення однієї процедури гігієнічної обробки рук перед виконанням внутрішньовенної ін'єкції?

- a. 5 мл
- b. 6 мл
- c. 3 мл
- d. 1 мл
- e. 9 мл

149. Маніпуляційна сестра медична контролює термін стерильності матеріалу в біксі, який не

був розкритий. Протягом якого часу зберігається його стерильність?

- a. 8-ми год
- b. 6-ти днів
- c. 1-го тижня
- d. 1-го дня
- e. 3-х діб

150. Для якого захворювання сечостатевої системи характерний такий симптомокомплекс: підвищення артеріального тиску, набряки, олігурія та гематурія (сеча кольору "м'ясних помиїв")?

- a. Гострого уретриту
- b. Хронічного пієлонефриту
- c. Сечокам'яної хвороби
- d. Гострого гломерулонефриту
- e. Гострого циститу