

1. Під час внутрішньом'язового повторного введення 5% розчину глюконату кальцію жінка поскаржилася на різкий, пекучий, нестерпний біль. Що в першу чергу повинна зробити акушерка?

a. Припинити введення та перевірити етикетку ампули з-під ліків

b. УФ-опромінення

c. Накласти зігріваючий компрес

d. Ввести ліки до кінця та прикласти грілку

e. Зробити йодну сітку

2. До лікаря звернулася жінка зі скаргами на затримку менструацій до семи місяців. Тест на вагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?

a. Дисменорея

b. Олігоменорея

c. Аменорея

d. Альгоменорея

e. Оксменорея

3. У дитини 3-х місяців асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5х5,0 см. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

a. Рахіт

b. Гіпервітаміноз D

c. Спазмофілія

d. Нервово-артритичний діатез

e. Ексудативно-катаральний діатез

4. До акушерки ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х тижнів зі скаргами на утруднене носове дихання та серозні виділення з носа у дитини. В сім'ї старша дитина хворіє на ГРВІ. Вкажіть, який препарат найбільш доцільно застосувати для профілактики ГРВІ у новонародженого?

a. Димедрол

b. Анальгін

c. Ампіцилін

d. Інтерферон

e. Фарингосепт

5. До інфекційного відділення доставили хворого у тяжкому стані зі скаргами на тривалу гарячку, нічну пітливість, періодично виникаючий пронос, значне схуднення. З анамнезу: інекційний наркоман. Яке захворювання можна запідозрити?

a. Сепсис

b. Лихоманка неясного генезу

c. Черевний тиф

d. Герпетична хвороба

e. СНІД

6. До акушерки ФАПу звернулася мати з дівчинкою 3-х місяців зі скаргами на зниження апетиту, млявість. З анамнезу: дитина народилася недоношеною з масою 1900 г, зростом 40 см. Переведена на штучне вигодовування з 1-го місяця. Об'єктивно: блідість шкіри. У крові: ер.- 3,5х10¹²/л, НЬ-106 г/л. Які препарати потрібно призначити дитині?

a. Кровоспинні препарати

b. Препарати заліза

c. Спазмолітики

d. Анальгетики

e. Жарознижувальні препарати

7. У центр планування сім'ї звернулася подружня пара з приводу відсутності вагітності при регулярному статевому житті впродовж року без застосування контрацептивів. Після обстеження з'ясовано, що у чоловіка патології немає. У жінки в анамнезі медичний аборт в терміні 5-6 тижнів, без ускладнень. З метою уточнення діагнозу жінці призначено метросальпінгографію. Виберіть необхідний інструмент для проведення даної маніпуляції:

- a. Конхотом
- b. Шприц з пункційною голкою
- c. Матковий зонд
- d. Шприц Брауна**
- e. Шприц Жане

8. До ФАПу звернулася вагітна жінка 38-ми років зі скаргами на розширення вен лівої нижньої кінцівки, набряк її під кінець дня та судоми литкових м'язів. Для уточнення діагнозу необхідно провести таку функціональну пробу:

- a. Оппеля
- b. Троянова-Тренделенбурга**
- c. Дельбе-Пертеса
- d. Панченко
- e. Самюельса

9. Недоношену новонароджену дитину потрібно зігріти за допомогою грілок. Водю якої температури необхідно наповнити грілки ?

- a. 90°C
- b. 40°C
- c. 50°C**
- d. 35°C
- e. 70°C

10. Першовагітна 20 років з інтенсивною родовою діяльністю. Скарги на головний біль, порушення зору, загальмованість. АТ. 180/110 мм ртст. набряки ніг, передньої черевної стінки. Голова плода в порожнині малого таза. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 189/хв. Відкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологів?

- a. Стимуляція пологової діяльності
- b. Плороруйнівна операція
- c. Кесарів розтин
- d. Накладання акушерських щипців**
- e. Консервативне ведення пологів з епізіотомією

11. Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Мама дитини поцікавилась, які ще щеплення і у які терміни будуть проведені у пологовому будинку?

- a. Проти кору, краснухи на 3-й день
- b. Проти поліомієліту на 3-й день
- c. Проти епідемічного паротиту в 1-й день
- d. БЦЖ на 3-5-й день**
- e. Проти дифтерії на 2-й день

12. До ФАПу звернулася жінка зі скаргами на часті позиви на сечовипускання, біль та різі при ньому. Скарги з'явилися після купання в річці в прохолодній воді. Температура тіла в межах норми. Про яке захворювання слід подумати?

- a. Гострий апендицит
- b. Гострий холецистит
- c. Гострий цистит**
- d. Гострий панкреатит
- e. Перитоніт

13. В післяпологовому відділенні огляну то породіллю: дно матки розміщено на рівні пупка, лохії кров'яністі. Для якої доби післяпологового періоду характерні такі дані?

- a. Третя
- b. Друга
- c. Четверта
- d. Перша**
- e. Пята

14. Повторнонароджуюча, перший період пологів триває 6 годин. Через 15 хвилин після піхвового дослідження вилились прозорі навколоплідні води у помірній кількості. Які першочергові дії необхідно провести?

- a. Пальпація живота роділлі 1 та 2 прийомами
- b. Профілактика внутрішньоутробної гіпоксії плода
- c. Пальпація живота роділлі 3 та 4 прийомами
- d. Аускультация серцебиття плода**
- e. Піхове дослідження

15. Внаслідок перших фізіологічних пологів у матері, яка не перебувала на обліку в ЖК, народився хлопчик з висипкою на долонях і підшвах, що являє собою окремі пухирі до 1,5 см в діаметрі, наповнені серозною рідиною. При бактеріоскопічному обстеженні вмісту висипки виявлено бліду трепонеми. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Звичайна пухирчатка
- b. Іхтіоз
- c. Стафілококове імпетиго
- d. Вроджена герпетична інфекція
- e. Сифілітична пухирчатка**

16. У повторнонароджуючої при внутрішньому акушерському обстеженні виявили, що стрілоподібний шов стоїть у поперечному розмірі над входом в малий таз і відхилений до лона, пальпується більша частина задньої тім'яної кістки. Пологи вирішили вести шляхом кесарського розтину. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Задній асинклітизм Літцмана**
- b. Передній асинклітизм Негеле
- c. Передньоголовне передлежання
- d. Лицеве передлежання
- e. Лобне передлежання

17. Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, підвищення температури тіла до 37,8°C. Захворіла раптово, після переохолодження. Живіт м'який. Симптом Пастернацького позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий пієлонефрит**
- b. Гострий коліт
- c. Сечокам'яна хвороба
- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Гострий панкреатит

18. У хворої на гострий інфаркт міокарда, на фоні посилення больового синдрому та аритмії, з'явилась різка блідість шкіри, акроціаноз, артеріальний тиск знизився до 0/40 мм рт.ст. Про розвиток якого ускладнення можна думати?

- a. Серцева астма
- b. Непритомність
- c. Кардіогенний шок**
- d. набряк легень
- e. Синдром Дресслера

19. У пацієнтки 23-х років після пологів шляхом кесаревого розтину з'явився висип на обличчі та тулубі. Об'єктивно: еритематозні вогнища ураження на спинці носа і вилицях у формі метелика, на спині; підвищення температури тіла. В післяопераційний період пацієнтка отримувала цефалоспорины. ШОЕ- 36 мм/год. Наведена клінічна картина характерна для такого захворювання:

- a. Системна склеродермія
- b. Токсикодермія
- c. Системний червоний вовчак**
- d. Геморагічний васкуліт
- e. Кропив'янка

20. В ЖК звернулась вагітна з доношеною вагітністю: положення плода по здовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ-100 см, ВСДМ- 35 см. Визначте передбачувану масу плода за формулою Лебедева:

- a. 2800 г
- b. 4000 г
- c. 4500 г
- d. 2500 г

e. 3500 г

21. Акушерку ФАПу викликали до потерпілого чоловіка, який щойноотримав проникаюче поранення грудної клітки. При огляді: із рани виділяється піниста кров. Назвіть першочергову дію при наданні невідкладної допомоги:

- a. Транспортування до лікарні
- b. Накласти герметичну пов'язку
- c. Провести знеболювання
- d. Ввести протишокові препарати
- e. Надати положення напівсидячи

22. Акушерка під час пальпації визначила у дні матки велику, щільну, округлу,балотуючу частину плода. Над входом в малий таз - рухлива об'ємна, неправильної форми, небалотуюча частина плода. Вкажіть передлежання плода:

a. Тазове

- b. Головне
- c. Ніжне
- d. Змішане
- e. Розгинальне

23. На прийом звернулася пацієнтка зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів, переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: вагітність 10-11 тижнів, загроза самовільного викидня. До якого лікарського втручання слід підготувати пацієнтку?

- a. Ушивання цервікального каналу шийки матки
- b. Зондування порожнини матки
- c. Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу
- d. Видалення плідного яйця з порожнини матки
- e. Лапароскопія

24. Акушерка пологового будинку проводить реанімацію при асфіксії новонародженого. Які показання для закритого масажу серця?

- a. Брадикардія менш 0/хв
- b. Брадикардія менш 120/хв
- c. Відсутність рефлексів
- d. Відсутність самостійного дихання
- e. Акроціаноз

25. Яку максимальну кількість розчину можна вводити внутрішньом'язово за 1 раз?

- a. 100 мл
- b. 2мл
- c. 10 мл
- d. 5 мл
- e. 20 мл

26. При проведенні патронажу новонародженої дитини на 2-й день після виписки з пологового будинку, акушерка відмітила серозні виділення з пупкової ранки. Шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пупкова грижа
- b. Сепсис
- c. Флегмонозний омфаліт
- d. Попрілості

е. Катаральний омфаліт

27. Породіллі призначено промивання сечового міхура. Скільки дезінфікуючого розчину повинна ввести акушерка у сечовий міхур при проведенні процедури?

а. 200-300 мл

- b. 400-500 мл
- c. 500-600 мл
- d. 900-1000 мл
- e. 50-100 мл

28. У роділлі при веденні послідового періоду акушерка визначила, що затискач, який був накладений на пуповину біля статевої щілини опустився приблизно на 10 см. Якій ознаці відокремлення плаценти це відповідає?

а. Альфреда

- b. Довженко
- c. Шредера
- d. Клейна
- e. Мікуліча

29. Пацієнтка 45-ти років знаходиться на лікуванні у гінекологічному відділенні з діагнозом ендометрит. У хворої з'явився біль у епігастрії, що виникає через 3-4 години після прийому їжі, голодний нічний біль, нудота. Біль усувається прийомом їжі. Страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки. Кожний рік проходить лікування в зв'язку з загостренням хвороби. Які заходи профілактики загострень хвороби можна порекомендувати хворій?

- a. Санація вогнищ інфекції
- b. Прийом антибіотиків
- c. Прийом гострих страв

d. Дотримання режиму харчування

e. Вимірювання артеріального тиску

30. При взятті вагітної на облік провели вимірювання таза. Встановлено розміри: 25-27-29-18 см. Назвіть форму таза вагітної:

- a. Косозміщений таз
- b. Нормальний таз

c. Загальнорівномірно звужений таз

- d. Звужений таз
- e. Плоский таз

31. Вагітність 40 тижнів, I пологі, II період. Народився хлопчик масою 2400 г зріст 48 см. При пальпації матки виявлено ще один живий плід. Положення 2-го плода поперечне, голівка зліва. Відкриття шийки матки повне, плодовий міхур цілий. Вкажіть тактику послідуєчого ведення пологів:

- a. Амніотомія, стимуляція пологової діяльності
- b. Кесарів розтин
- c. Амніотомія, консервативний метод ведення пологів

d. Амніотомія, класичний поворот плода на ніжку

e. Вичікувальна тактика

32. В лікарню швидкої допомоги госпіталізована вагітна з абортom, що почався. Термін вагітності 10 тижнів. Лікування ефекту не дало. Чергова акушерка викликана через кровотечу та біль внизу живота. Її подальші дії?

а. Викликати лікаря, підготувати інструменти для вишкрібання

- b. Ввести кровозамінники
- c. Ввести кровоспинні препарати
- d. Ввести спазмолітики
- e. Ввести розчин магнію сульфату

33. На ФАПі проводилася обробка колотої рани стопи. Рану промили, краї обробили йодонатом,

наклали асептичну пов'язку. Через тиждень після травми з'явилося посмикування жувальних і м'яких м'язів обличчя. Яка помилка була допущена?

- a. Не наклали пов'язку з маззю Вишневського
- b. Не провели профілактику правця**
- c. Не провели знеболення
- d. Не наклали герметичну пов'язку
- e. Не наклали пов'язку з гіпертонічним розчином

34. В ЖК звернулася жінка 60-ти років зі скаргами на свербіж та виділення зі статевих органів. Який спеціальний гінекологічний метод обстеження акушерка використає для встановлення діагнозу?

- a. Огляд і пальпацію живота
- b. Анамнез
- c. Огляд за допомогою дзеркал**
- d. Взяття мазків на ступінь чистоти піхви
- e. Огляд грудних залоз

35. Дитина народилася від II вагітності, II нормальних пологів, з масою 3100 г, зростом 50 см. Цій дитині необхідно зробити в перший день життя щеплення проти:

- a. Епідемічного паротиту
- b. Дифтерії
- c. Кору
- d. Туберкульозу
- e. Вірусного гепатиту В**

36. Вагітна 23-х років, вагітність 20 тижнів, висловлює скарги на сильний біль у поперековій ділянці, почастішання сечовипускання, нудоту, блювання, здуття живота. З анамнезу: мати пацієнтки страждає на сечокам'яну хворобу. Які додаткові методи можна використати у даному випадку?

- a. Комп'ютерна томографія
- b. Оглядова рентгенографія нирок
- c. Контрастна рентгенографія нирок
- d. Хромоцистоскопія
- e. Ультразвукове дослідження**

37. Породілля 28-ми років на 2-гу добу після I термінових пологів скаржиться на біль у ділянці симфізу, що посилюється при рухах. При огляді пологових шляхів у дзеркалах: шийка матки ціла, слизова оболонка піхви без пошкоджень, промежина ціла. При пальпації лонного зчленування виявляється щілина між лонними кістками завширшки 0,8 см. Визначається біль при пальпації. Показники крові та сечі без патологічних змін. Вкажіть основні напрямки у лікуванні породіллі:

- a. Металоостеосинтез
- b. Імобілізація у гамаку на 3-4 тижні**
- c. Корсет (6 місяців)
- d. Гіпсова пов'язка на ділянку таза
- e. Знеболювальні засоби з подальшою антибактеріальною терапією

38. Зробіть оцінку стану новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо серцебиття в неї 120/хв., дихання глибоке, рефлекси живі, м'язовий тонус добрий, шкіра рожева:

- a. 1-2 бали
- b. 12 балів
- c. 8-9 балів
- d. 6 балів
- e. 10 балів**

39. Акушерка-практикантка разом з лікарем веде II період пологів. Як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плода з метою контролю його стану?

- a. Під час кожної потуги

- b. Кожні 15 хвилин
- c. Під час прорізування голівки

d. В паузах після кожної потуги

- e. Кожні 5 хвилин

40. До гінекологічного відділення надійшла хвора 14-ти років зі скаргами на кров'яні виділення із статевих шляхів, не регулярні, які почалися в термін менструації і тривають 10 днів. Менархе з 13-ти років, нерегулярні. Який попередній діагноз?

- a. Перервана позаматкова вагітність
- b. Перервана маткова вагітність
- c. Народження фібриматозного вузла
- d. Травма статевих органів

e. Ювенільна кровотеча

41. До акушерки ЖК звернулася жінка 45-ти років, яка скаржиться на сильний біль у ділянці промежини, який посилюється під час рухів та акту дефекації. Хворіє 5 діб. Під час огляду в пері анальної ділянки пухлина 2х3 см, різко болісна під час пальпації, в центрі інфільтрату розмякшення. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий проктит
- b. Хронічний геморой

c. Гострий підшкірний парапроктит

- d. Рак прямої кишки
- e. Гострий геморой

42. До акушерки ЖК звернулася пацієнтка 39-ти років, яка знаходиться на амбулаторному лікуванні з приводу патологічного клімаксу. Скарги на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння "мушок" перед очима, нудоту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ-200/110 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся?

- a. Непритомність
- b. Гіперглікемія
- c. Колапс
- d. Напад бронхіальної астми

e. Гіпертонічний криз

43. При тимчасовій зупинці артеріальної кровотечі було використано джгут. Про що свідчить мармурово-білий колір кінцівки нижче накладеного джгута?

a. Джгут накладено вірно

- b. Зупинилася тільки венозна кровотеча
- c. Зупинилася тільки капілярна кровотеча
- d. Джгут накладено невірно
- e. Джгут накладено слабо

44. Акушерка жіночої консультації пояснює першовагітній, як часто необхідно являтися на прийом. Кількість відвідувань ЖК при фізіологічному перебігу вагітності складає:

a. 18-20 відвідувань

b. 10-12 відвідувань

- c. 13-14 відвідувань
- d. 28-30 відвідувань
- e. 15 відвідувань

45. Першороділля 28-ми років з прееклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу 25-28-31-21 см. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плода невислуховується. Напад еклампсії. Вагінально: відкриття малого вічка повне, голівка у вузькій частині малого тазу. Тактика ведення пологів:

a. Плодорушніва операція

- b. Кесарів розтин
- c. Провести пологи звичайним шляхом
- d. Стимуляція пологової діяльності

е. Вакуум-екстракція плода

46. Акушерка при обстеженні дитини після народження виявила крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Визначте діагноз:

а. Кефалогематома

б. Пухирчатка новонародженого

с. Водянка мозку

д. Пологова пухлина

е. Внутрішньочерепна пологова травма

47. До дільничного лікаря на прийом з'явилась жінка середніх років зі скаргами на різку слабкість, утруднений видих, напади ядухи, які закінчуються виділенням великої кількості густого, вязкого, слизового харкотиння. Для якого захворювання характерна дана симптоматика?

а. Хронічний бронхіт

б. Бронхоектатична хвороба

с. Трахеїт

д. Грипозна пневмонія

е. Бронхіальна астма

48. У вагітної жінки (20 тижнів) з'явився різкий біль у попереку з іррадіацією у пах, дизуричні прояви. При сечовипусканні ознаки гематурії. Для якого захворювання характерна дана симптоматика?

а. Сечокам'яна хвороба

б. Загроза викидня

с. Апоплексія яєчника

д. Гострий апендицит

е. Позаматкова вагітність

49. У пацієнта 28-ми років скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника впродовж тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з'ясування діагнозу?

а. Фіброгастроезофагоскопія

б. Ультразвукове обстеження

с. Гастроскопія

д. Ректороманоскопія

е. Рентгеноскопія

50. Машина швидкої допомоги доставила пацієнта до приймального відділення лікарні з вулиці. Анамнез невідомий. Об'єктивно: шкірні покриви багряного кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі, дихання шумне. АТ- 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запідозрити?

а. Істеричний напад

б. Геморагічний інсульт

с. Ішемічний інсульт

д. Епілептичний напад

е. Менінгіт

51. Жінка скаржиться на гострий біль внизу живота, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому, своєчасна. Тест на вагітність негативний. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?

а. Апоплексія яєчника

б. Хронічний аднексит

с. Апендицит

д. Позаматкова вагітність

е. Рак яєчника

52. Акушерка виконала породіллі за призначенням лікаря пробу на індивідуальну чутливість до

антибіотика. Відповідний запис про позитивний або негативний результат вона має зафіксувати:

- a. На титульному листку історії пологів
- b. У листку лікарських призначень**
- c. На окремому листку
- d. На 2-й сторінці амбулаторної картки
- e. У листку спостережень

53. Назвіть гормональні контрацептиви, які доцільно рекомендувати жінкам під час лактації, якщо після пологів пройшло більше, ніж півроку:

- a. Комбіновані двофазні контрацептиви
- b. Комбіновані трифазні контрацептиви
- c. Комбіновані однофазні контрацептиви
- d. Посткоїтальні контрацептиви
- e. Міні-пілі**

54. Хвора скаржиться на швидку втому, біль і тяжкість у правому підребер'ї, жовтушність шкіри та склер, потемніння сечі, знебарвлення калу. 3 місяці тому мала гемотрансфузію. Про яке захворювання можна думати?

- a. Холецистит
- b. Малярія
- c. Лептоспіроз
- d. Вірусний гепатит В**
- e. Черевний тиф

55. Із яких ділянок статевих органів акушерка повинна взяти матеріал для до слідження, якщо лікар призначив хворій гормональну кольпоцитодіагностику?

- a. Шийка матки
- b. Цервікальний канал
- c. Задньо-бокове склепіння піхви
- d. Передньо-бокове склепіння піхви**
- e. Порожнина матки

56. Повторнонароджуюча 26-ти років, перейми почалися 10 годин тому. Через 2 години відійшли навколоплідні води. Положення плода поздовжнє, головне пере сек., шийка матки згладжена, відкриття вічка 4 см. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло?

- a. Дискоординована пологова діяльність
- b. Передчасне відходження навколоплідних вод
- c. Клінічно вузький таз
- d. Первинна слабкість пологової діяльності**
- e. Вторинна слабкість пологової діяльності

57. В якому випадку розвиток гемолітичної хвороби у новонародженого є найбільш імовірним?

- a. Мати Rh-, чоловік Rh-
- b. Мати Rh+, плід Rh-
- c. Мати Rh+, плід Rh+
- d. Мати Rh+, чоловік Rh+
- e. Мати Rh-, плід Rh++**

58. У жінки 22-х років під час штучного абортів відбулася перфорація матки кюреткою. Якою повинна бути тактика в цій ситуації?

- a. Лапароскопія для визначення внутрішньочеревної кровотечі
- b. Видалення тіла матки
- c. Ушивання перфоративного отвору**
- d. Антибактеріальна терапія, спостереження, скорочуючі засоби
- e. Холод на низ живота, спостереження

59. Хворий 25-ти років доставлений в операційну для виконання операції з при воду варикозного розширення вен нижніх кінцівок. Коли можна починати хірургічне втручання?

a. На II стадії наркозу

b. На 3-му рівні III стадії наркозу

c. На 4-му рівні III стадії наркозу

d. На 2-му рівні III стадії наркозу

e. На I стадії наркозу

60. До ЖК звернулась пацієнтка 13-ти років зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота. З анамнезу: менструації відсутні. Вважає себе хворою впродовж 3-х місяців, коли з'явилися болі внизу живота, що тривали 2-3 дні і повторювалися щомісячно. При огляді в ділянці присінку піхви визначається яскраво-багряне випинання. Симптоми подра знення очеревини відсутні. Який попередній діагноз?

a. Кишкова колька

b. Гострий вульвіт

c. Атрезія дівочої перетинки

d. Гострий апендицит

e. Гострий кольпіт

61. До гінекологічного відділення надійшла хвора зі скаргами на болі унизу живота, t° - 38°C , кровянисто-гнійні виділення. Три дні тому зроблено штучний аборт. Матка збільшена, болісна, м'якої консистенції. Шийка, придатки без змін. Про яке захворювання йде мова?

a. Аднексит

b. Хламідіоз

c. Гонорея

d. Неспецифічний ендометрит

e. Параметрит

62. У вагітної нефропатія другої половини вагітності. Яка дієта доцільна при даній патології?

a. Стіл №11

b. Стіл №

c. Стіл № 10

d. Стіл № 7

e. Стіл № 9

63. Хвора 40-ка років знаходиться в ЖК на прийомі у лікаря-гінеколога. Зненацька в неї виник напад ядухи. В анамнезі - бронхіальна астма. Що потрібно використати в першу чергу для поліпшення стану пацієнтки?

a. Масаж грудної клітки

b. Киснева терапія

c. Дихальна гімнастика

d. Аерозоль з беротеком

e. Содові інгаляції

64. Акушерка при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода:

a. Повздожнє положення, друга позиція, тазове передлежання

b. Повздожнє положення, перша позиція, головне передлежання

c. Повздожнє положення, друга позиція, головне передлежання

d. Поперечне положення, друга позиція

e. Повздожнє положення, перша позиція, тазове передлежання

65. Дитина народилася здоровою з масою тіла 3300 г, довжиною тіла 50 см. Не хворіє. На якому місяці життя треба починати профілактику рахіту?

a. На 3-му

b. На 2-му

c. На 7-му

- d. На-му
- e. На 4-му

66. Яке ускладнення у пологах має такі клінічні прояви: "кинджальний" біль у животі, припинення пологової діяльності, шок, частини плода пальпуються підчеревною стінкою?

- a. Розрив лобкового симфізу
- b. Розрив шийки матки
- c. Передчасне відшарування плаценти
- d. Розрив матки**
- e. Передлежання плаценти

67. При надходженні вагітної до пологового будинку було встановлено головне передлежання плода, стрілоподібний шов у правому косому розрізі, мале тім ячко - зліва і до переду. Визначте позицію і вид плода:

- a. Поперечне положення плода
- b. Перша позиція, передній вид**
- c. Друга позиція, передній вид
- d. Друга позиція, задній вид
- e. Перша позиція, задній вид

68. Акушерка разом з лікарем обстежують вагітну в терміні 30 тижнів. Виявлено поперечне положення плода. Що необхідно запропонувати вагітній з метою самоповороту плода?

- a. Носити бандаж
- b. Дотримуватись ліжкового режиму
- c. Корегуючу гімнастику за методикою В.І. Грищенко**
- d. Посилити фізичну активність за рахунок прогулянок
- e. Самостійно робити масаж живота

69. Пацієнтці лікар призначив лікувальну клізму з 50 мл обліпихової олії. Яка процедура передуює даній маніпуляції?

- a. Гіпертонічна клізма
- b. Очисна клізма**
- c. Краплинна клізма
- d. Сифонна клізма
- e. Олійна клізма

70. У дитини 2-х років температура 38°C, млявість, розлади сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Об'єктивно: шкіра бліда, періоральний ціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гостра пневмонія**
- b. Назофарингіт
- c. Гострий ларингіт
- d. Бронхіальна астма
- e. Гострий бронхіт

71. Через 6 місяців після пологів у жінки 22-х років з'явились скарги на імперативні поклики до сечовипускання, затерпання та важкість в ногах. 2 роки тому у неї виникла раптова втрата зору на праве око, яка після лікування в очному відділенні повністю пройшла. Для якого захворювання є типовими зазначені скарги?

- a. Поліомієліт
- b. Ішемічний інсульт
- c. Розсіяний склероз**
- d. Пухлина головного мозку
- e. Летаргічний енцефаліт

72. Пацієнтка 42-х років, що перебуває на диспансерному обліку з приводу гіпертонічної хвороби впродовж 10-ти років, звернулась на ФАП зі скаргами на нові симптоми, які розвинулись поступово: задишка при незначному фізичному навантаженні, серцебиття,

набряки на ногах. Яке ускладнення розвинулось у хворої?

- a. Хронічна серцева недостатність
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Вада серця
- d. Гостра судинна недостатність
- e. Гіпертонічний криз

73. Вагітна звернулась у жіночу консультацію для взяття на облік з приводу вагітності. Вагітність перша, 2 тижні як відчула ворухіння плоду. Скаржиться на спрагу, млявість, зниження апетиту. В анамнезі у батьків цукровий діабет. При обстеженні в сечі знайдено цукор. Яку патологію можна запідозрити у вагітної?

- a. Цукровий діабет
- b. Пієлонефрит
- c. Анемія вагітних
- d. Панкреатит
- e. Холецистит

74. До ФАПу звернулась жінка 69-ти років зі скаргами на рясні кров'янисті виділення з піхви. Знаходиться на диспансерному обліку з приводу раку шийки матки. Яка тактика акушерки?

- a. Госпіталізація в онкодиспансер
- b. Кровоспинні засоби
- c. Тампонада піхви
- d. Загальнозміцнююче лікування
- e. Скорочуючі засоби

75. У хворі 38-ми років підозра на рак матки. В які терміни менструального циклу необхідно провести діагностичне вишкрібання матки для одержання найбільш інформативних даних гістологічного дослідження?

- a. За 5-6 днів до менструації
- b. В 1-й день менструації
- c. За 10-12 днів до менструації
- d. За 1-2 дні до менструації
- e. Зразу після закінчення менструації

76. Дитина 6-ти років захворіла гостро через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок з'явилися поліморфні, симетрично розташовані геморагічно папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Геморагічний васкуліт, шкірна форма
- b. Геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- c. Кір
- d. Хвороба Верльгофа
- e. Гемофілія

77. Першовагітна 34-х років у терміні вагітності 36-37 тижнів. Скаржиться на головний біль у потилиці стискаючого характеру, відчуття закладеності носа та утруднення носового дихання. Зранку з'явилися болісні відчуття в ділянці шлунка, нудота. АТ-170/100 та 180/110 мм рт.ст, набряки гомілок. В чому буде полягати невідкладна допомога?

- a. Введення димедролу 1% -1 мл
- b. Введення но-шпи 2% - 2 мл
- c. Введення анальгину 50% - 2 мл
- d. Введення лазіксу 40 мг
- e. Введення розчину сульфату магнію 25%-16мл

78. Оглядаючи пацієнта з пораненням стегна, фельдшер помітив різкий наростаючий набряк навколо рани і крепітацію м'яких тканин навколо неї за типом звуку міхурців, що лопаються. Який попередній діагноз?

- a. Бешихове запалення
- b. Газова гангрена

- c. Тромбофлебіт
- d. Інфікування рани
- e. Лімфангіт

79. У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із перерахованого першочерговим при наданні медичної допомоги?

- a. Дати масковий наркоз
- b. Зігріти хвору
- c. Забезпечити прохідність дихальних шляхів**
- d. Виміряти артеріальний тиск
- e. Подати кисень

80. Пацієнтка 20-ти років з проявами харчової алергії в анамнезі, надійшла на стаціонарне лікування з пневмонією. При введенні антибіотика цефамізину розвинулись ознаки алергічної реакції: загальна слабкість, блідість шкіри, запаморочення, утруднене дихання, зниження артеріального тиску. Яке ускладнення розвинулось?

- a. Больовий шок
- b. Колапс
- c. Анафілактичний шок**
- d. Гемотрансфузійний шок
- e. Кардіогенний шок

81. Акушерка проводить спеціальні методи обстеження плода. Назвіть метод, яким вона визначить діагональну конюгату:

- a. Цитологічне обстеження
- b. Кольпоскопічне обстеження
- c. Зовнішнє обстеження
- d. Вагінальний огляд**
- e. Огляд в дзеркалах

82. Вагітна 27-ми років, термін вагітності 33 тижні. Звернулась до ЖК зі скаргами на спрагу і швидку втомлюваність. Вага жінки за тиждень збільшилась на 600 г. При проведенні проби Мак-Клюра-Олдріча папула розсмокталась за 30 хвилин. Про що свідчать виявлені зміни в організмі вагітної?

- a. Підвищена гідрофільність тканин**
- b. Збільшення осмолярності плазми
- c. Знижена гідрофільність тканин
- d. Гіповолемія
- e. Гіперволемія

83. Хвора на прийомі у лікаря знепритомніла. З'явились тонічні судоми, котрі через декілька секунд змінились клонічними. Дихання стало хриплим, з рота виділяється піна, спостерігається самовільне сечовиділення. Напад тривав 3 хвилини, впродовж цього часу хвора не приходила до свідомості. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Малий епілептичний напад
- b. Присмерковий стан
- c. Транс
- d. Істеричний напад
- e. Великий епілептичний напад**

84. Вагітна в терміні 36-37 тижнів, яка знаходиться на диспансерному обліку в ЖК з приводу преєклампсії, скаржиться на запаморочення, біль у животі, загальну слабкість. Об'єктивно: загальний стан середнього ступеня важкості, Рс- 100/хв., АТ-130/90 мм рт.ст. Матка дуже болюча, напружена, асиметрична при пальпації. Серцебиття плода 180/хв., приглушене. Який імовірний діагноз?

- a. Передчасне відшарування плаценти**
- b. Передлежання плаценти
- c. Загроза розриву матки

- d. Передчасні пологи
- e. Провісники пологів

85. Вагітній жінці 32-х років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був призначений аналіз сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка?

- a. За 12 годин
- b. За 10 годин
- c. За добу**
- d. За годин
- e. За 6 годин

86. Загальний стан дитини 5-ти років дуже важкий, температура 39,5°C, повторні блювання, на шкірі тулуба з'являються елементи геморагічного висипу, які мають зірчасту форму. Встановіть діагноз:

- a. Скарлатина
- b. Вітряна віспа
- c. Менінгококцемія**
- d. Кір
- e. Дифтерія

87. В фельдшерсько-акушерський пункт звернулась жінка 25-ти років зі скаргами на біль, ущільнення в ділянці сідниць після курсу аутогемотерапії. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

- a. Некроз тканини
- b. Тромбофлебіт
- c. Інфільтрат**
- d. Абсцес
- e. Алергічна реакція

88. Які речовини за величиною граничнодопустимої концентрації в повітрі робочої зони відносяться до 1 класу небезпеки?

- a. Спирт етиловий
- b. -
- c. Свинець, ртуть**
- d. Водяна пара
- e. Бензин, ацетон

89. У породіллі супутнє захворювання - цукровий діабет. їй призначено введення 20 ОД інсуліну. У флаконі міститься по 100 ОД інсуліну в 1 мл. Скільки інсуліну необхідно набрати в шприц?

- a. 0,4 мл
- b. 1 мл
- c. 2мл
- d. 0,5 мл
- e. 0,2 мл**

90. До акушерки ФАПу звернулася першовагітна. Термін вагітності 29-30 тижнів. Діагностовано сідничне передлежання плода. Екстрагенітальних захворювань, пов'язаних з вагітністю не встановлено. У якому терміні вагітності доцільно призначити коригувальну гімнастику?

- a. З 20-24 тижнів
- b. З 24-25 тижнів
- c. З 28-30 тижнів**
- d. З 34-36 тижнів
- e. С 12-20 тижнів

91. В жіночу консультацію звернулася першовагітна, дату останньої менструації не пам'ятає, перше ворухіння плода відчула 2 місяці тому. Який метод обстеження повинна застосувати акушерка для визначення терміну вагітності?

- a. Бімануальне обстеження
- b. Вимірювання обводу живота

c. Прийоми Леопольда-Левицького

- d. Огляд шийки матки у дзеркалах
- e. Дослідження сечі на наявність ХГ

92. До акушерки ФАПу звернулася жінка 28-ми років зі скаргами на висипку, печіння в ділянці висипки, які з'явилися після необережної роботи з кислотами. Об'єктивно: шкіра обох кистей рук червона, набрякла, у вогнищі ураження наявні папули, везикули. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пухирчатка
- b. Екзема
- c. Червоний плоский лишай
- d. Короста

e. Простий контактний дерматит

93. Пацієнтці з діагнозом ендocerвіциту лікар призначив піхвові ванночки з фурациліном. На який термін необхідно залишати в піхві розчин фурациліну при проведенні ванночки?

- a. 20-25 хвилин
- b. 30-35 хвилин
- c. 10-15 хвилин**
- d. 25-30 хвилин
- e. 5-10 хвилин

94. Хвора 47-ми років скаржиться на рясну кровотечу зі статевих шляхів, затримання менструації впродовж 4-х місяців. При гінекологічному обстеженні тіло матки нормальних розмірів, безболісне. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Клімактерична дисфункціональна кровотеча

- b. Перервана вагітність
- c. Внутрішній ендометріоз
- d. Міома матки
- e. Рак шийки матки

95. Під час профілактичного огляду в ЖК жінка 61-го року поскаржилася аку шерці на раптове утруднення дихання, біль, відчуття стискання у за грудинній ділянці з іррадіацією під ліву лопатку. Який стан виник у хворої?

a. Напад стенокардії

- b. Напад бронхіальної астми
- c. Геморагічний синдром
- d. Гострий панкреатит
- e. Напад жовчнокам'яної хвороби

96. В пологовому будинку при пологах у жінки виникла масивна маткова кровотеча внаслідок відшарування плаценти. Здійснюється гемотрансфузія, під час якої у жінки виникли різкий біль у попереку, блідість, холодний піт. Про розвиток якого шоку свідчать ці симптоми?

a. Больовий

b. Гемотрансфузійний

- c. Геморагічний
- d. Анафілактичний
- e. Кардіогенний

97. До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння і печіння у статевих органах, печіння та болючість під час сечовипускання. Вона була обстежена. Який з методів обстеження є додатковим?

a. Бактеріоскопічне дослідження

- b. Огляд зовнішніх статевих органів
- c. Пальпація молочних залоз
- d. Огляд за допомогою дзеркал

е. Дворучне дослідження

98. У дівчинки 13-ти років з'явилися ознаки статевого дозрівання. Що є основною ознакою статевого дозрівання дівчинки?

- а. Зміна фігури
- б. Зміна голосу

с. Менархе

- д. Збільшення молочних залоз
- е. Білі

99. До ФАПУ звернулась дівчина 15-ти років, яка хворіє на вегето-судинну дистонію, для проходження диспансеризації. Під час забору крові на загальний аналіз вона знепритомніла. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги?

- а. Холодний компрес на чоло
- б. Розтерти тіло

с. Покласти горизонтально, підняти ноги

- д. Ввести кофеїн підшкірно
- е. Оббризкати холодною водою

100. Жінка звернулася на прийом до ЖК для обстеження з приводу безпліддя. При обстеженні пацієнтки акушерка виявила такі симптоми: схуднення, пітливість, безсоння, метушливість, емоційна лабільність, витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тахікардія. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?

- а. Гіпертонічна хвороба

б. Тиреотоксикоз

- с. Ревматизм
- д. Гшемічна хвороба серця
- е. Гіпотиреоз

101. У дитини 5-ти місяців після ведення в раціон 100 г овочевого пюре з'явились рідкі випорожнення 5-6 разів на добу, жовтого кольору з білими грудочками та слизом, одноразове блювання. Лікар призначив водно-чайну паузу. Яким розчином акушерка буде її проводити?

- а. Овочевий відвар
- б. Фурацилін

с. Регідрон

- д. Фруктовий відвар
- е. Глюкоза

102. Акушерка пологового відділення проводить внутрішньовенне крапельне введення розчинів. Які розчини відносяться до групи сольових кристалоїдів?

- а. Реополіглюкін
- б. Поліглюкін
- с. Гемодез
- д. Желатиноль

е. Розчин Рінгера

103. У разі центрального передлежання плаценти розродження проводять методом:

- а. Витягання за тазовий кінець
- б. Витягання за голівку
- с. Накладання щипців

д. Кесарського розтину

- е. Консервативно

104. Виберіть вроджену ваду, що може призвести до асфіксії чи смерті немовляти:

- а. Серединна кіста носа

б. Двобічна повна атрезія хоан

- с. Дермоїдна кіста з норицею
- д. Часткова атрезія хоан

е. Роздвоєння кінчика носа

105. Для обстеження зіву на мікрофлору у вагітної жінки акушерка має приготувати:

а. Стерильну банку

б. Чисту банку

с. Стерильну пробірку зі стрижнем тампоном

д. Стерильну пробірку з петлею

е. Стерильну пробірку

106. Вагітна 30-ти років скаржиться на інтенсивний нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праве плече та лопатку, нудоту, повторне блювання. З анамнезу відомо, що впродовж 2-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Яке ускладнення виникло у вагітної?

а. Хронічна ниркова недостатність

б. Печінкова колька

с. Ниркова колька

д. Гостра ниркова недостатність

е. Печінкова недостатність

107. Пацієнтка доставлена бригадою "швидкої допомоги" у лікарню зі скаргами на блювання темно-коричневого кольору, дьогтеподібні випорожнення, біль у животі, загальну слабкість. Хворіє на виразкову хворобу шлунка. Яке ускладнення виникло?

а. Стравохідна кровотеча

б. Легенева кровотеча

с. Шлункова кровотеча

д. Маткова кровотеча

е. Геморойдальна кровотеча

108. До акушерки ФАПу звернулася жінка зі скаргами на нездужання, нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку місячних до 2 місяців. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до тижнів, м'яка, особливо в ділянці перешика, під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення слизові. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Позаматкова вагітність

б. Гастрит

с. Вагітність тижнів

д. Фіброміома матки

е. Дисфункція яєчників

109. До обов'язків санітарки входить генеральне прибирання післяпологового відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?

а. 1 раз в місяць

б. 1 раз в день

с. 2 рази на місяць

д. 1 раз в 7 днів

е. 2 рази в день

110. Пацієнтці з ендокервіцитом призначено тепле спринцювання піхви розчином хлоргексидину біглюконату. Акушерка підготувала кувалду Есмарха з лікувальним розчином. Якої температури повинен бути розчин?

а. 20 - 25°C

б. 40 - 45°C

с. 25 - 30°C

д. 30 - 35°C

е. 37 - 38°C

111. На ФАП звернувся хворий 60-ти років зі скаргами на різку втрату ваги впродовж 1,5 місяців. В анамнезі: нерегулярне харчування, слизово-гнійні виділення з прямої кишки, закрепи, нападоподібний біль у животі, біль під час акту дефекації, несправжні позиви. Які

рекомендації треба дати хворому?

- a. Звернутися до терапевта
- b. Призначити дієту
- c. Звернутися до гастроентеролога
- d. Призначити анальгін
- e. Звернутися до онколога**

112. В хірургічному відділенні за призначенням лікаря готують пацієнтку до оперативного втручання з приводу гострого апендициту. Вкажіть термін підготовки до ургентної операції:

- a. 1 година
- b. 2 години**
- c. 6 годин
- d. 12 годин
- e. негайно транспортувати до операційного залу

113. При аускультції плода акушерка прослухала серцебиття справа нижче пупка - 130/хв. і зліва на рівні пупка - 146/хв. Який попередній діагноз?

- a. Головне передлежання
- b. Багатопліддя**
- c. Поперечне положення
- d. Багатоводдя
- e. Тазове передлежання

114. Вагітна 25-ти років, вагітність друга, 39 тижнів, надійшла в пологовий будинок зі скаргами на задишку та серцебиття. З 14 років страждає на ревматизм, мітральний стеноз II ступеня, недостатність кровообігу II А ступеня. Визначте тактику ведення пологів:

- a. Накладання акушерських щипців
- b. Кесарів розтин
- c. Плродоруйнівна операція
- d. Пологи ведуться без особливостей
- e. Пологи проводять під знеболенням**

115. В ЖК звернулася пацієнтка 32-х років, яка страждає впродовж 7-ми років хронічним сальпінгоофоритом. Вкажіть найбільш поширене ускладнення перенесених запальних процесів жіночих статевих органів:

- a. Безпліддя**
- b. Рак маткових труб
- c. Ерозія шийки матки
- d. Ендометріоз
- e. Поліпоз ендометрію

116. Породілля 22-х років народила доношену дитину. Послід народився самостійно. При огляді плаценти акушерка помітила відсутність її частки. Крововтрата 250 мл і триває. Яку допомогу повинна надати акушерка?

- a. Налагодити інфузію 0,9% розчину натрію хлориду
- b. Ручна ревізія порожнини матки і масаж на кулаці**
- c. Зовнішній масаж матки
- d. Ввести окситоцин
- e. Ввести дицинон

117. Для профілактики розвитку цитратного шоку при переливанні крові на кожні 500 мл влитої крові необхідно ввести внутрішньовенно:

- a. 10 мл 10% розчину хлориду кальцію**
- b. 10 мл 40% розчину глюкози
- c. 40 мл 0,9% розчину хлориду кальцію
- d. 10 мл 4% розчину натрію гідрокарбонату
- e. 1 мл 1 % розчину димедролу

118. Вагітна постраждала від наслідків аварії на АЕС, знаходиться на диспансерному обліку в ЖК. Який термін видачі декретної допологової відпустки?

- a. 26 тижнів
- b. 20 тижнів
- c. 30 тижнів
- d. 32 тижні
- e. 28 тижнів**

119. У дівчинки 4-х років, що відвідує дитячий садок, з'явилися дратівливість, нічне нетримання сечі, свербіж у періанальній ділянці. Ці проблеми найбільш імовірні для такого гельмінтозу:

- a. Ентеробіоз**
- b. Трихінельоз
- c. Гіменоліпедоз
- d. Аскаридоз
- e. Трихоцефальоз

120. Мама дівчинки 4-х років скаржиться на зниження апетиту, слабкість, млявість дитини. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ- 130/80 мм рт.ст. Сеча кольору "м'ясних помиїв". Який метод лабораторної діагностики необхідно призначити для визначення видільної та концентраційної функції нирок?

- a. Загальний аналіз сечі
- b. Аналіз сечі за Аддіс-Каковським
- c. Аналіз сечі за Нечипоренком
- d. Аналіз сечі за Зимницьким**
- e. Аналіз сечі за Амбурже

121. Який медикаментозний засіб потрібно ввести для профілактики кровотечі наприкінці другого періоду пологів (при прорізуванні голівки плода)?

- a. Но-шпа
- b. Фолікулін
- c. Сигетин
- d. Метилергометрин**
- e. Промедол

122. У новонародженої дитини акушерка помітила ціаноз, який посилюється при крику, прийманні їжі. З анамнезу відомо, що мати дитини перехворіла на грип на 10-му тижні вагітності. Для якої патології притаманні ці симптоми?

- a. Вроджена вада серця**
- b. Вогнищева пневмонія
- c. Пологова травма
- d. Асфіксія новонародженого
- e. Анемія

123. Жінка народила дитину масою 4200 г. Перінеотомія ускладнилась розривом промежини II ступеня. Що при цьому залишилось неушкодженим?

- a. Сфінктер прямої кишки**
- b. Слизова оболонка піхви
- c. Шкіра промежини
- d. М'язи тазового дна
- e. Задня спайка

124. Акушерка ЖК проводить лабораторне обстеження вагітної з метою виявлення цукрового діабету. У яких випадках необхідне таке обстеження вагітної?

- a. Хронічний кольпіт
- b. Пізній гестоз
- c. Великий плід**
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Анемія вагітних

125. Роділля 33-х років, зріст 150 см. Розміри таза: 26-26-31-17 см. ОЖ- 96 см, ВДМ- 36 см. Голівка плода малим сегментом у вході в малий таз. Пологи тривають 36 годин. Води відійшли 20 годин тому. Від кесаревого розтину жінка відмовилась. Схватки почалися 3 години тому. Ознака Вастена - врівень. Серцебиття, рухи плода відсутні. Яку операцію слід провести?

a. Декапітація

b. Краніотомія

c. Клейдотомія

d. Зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжку

e. Кесарів розтин

126. До приймального відділення лікарні прибула вагітна для планової госпіталізації. Пацієнтка потребує санітарної обробки. Який спосіб обробки необхідно обрати?

a. Повна (душ)

b. Часткова (обтирання)

c. Повна (гігієнічна ванна)

d. Від санітарної обробки доцільно відмовитися

e. Спеціальна

127. Вагітна жінка скаржиться на зміну смаку (потреба їсти крейду), появу болючих тріщин у куточках роту, ламкість нігтів та випадіння волосся. Діагноз: залізодефіцитна анемія. Які продукти треба порадити збільшити у раціоні вагітної?

a. Горіхи

b. Сир

c. М'ясо

d. Мед

e. Гарбуз

128. У післяопераційного хворого виник біль за грудниною, значний ціаноз, ядуха, тахікардія, шийні вени набухлі. З чим пов'язані дані проблеми?

a. Інфаркт міокарда

b. Напад стенокардії

c. Тромбоемболія легеневої артерії

d. Інфаркт легень

e. Розрив аневризми аорти

129. На ФАП виписується новонароджена дитина, яка народилась від I перед стрімких пологів, при терміні вагітності 32 тижні, з масою тіла 1600 г довжиною тіла 40 см. З трьох тижнів їй потрібно призначити 0,01% розчин міді сульфату і кобальту сульфату протягом 6-10 тижнів. Вкажіть, профілактику якого захворювання будуть проводити у дитини?

a. Рахіт

b. Анемія

c. Спазмофілія

d. Гіпотрофія

e. Паратрофія

130. При визначенні групової належності крові за допомогою стандартних сироваток аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали сироватка 0(I) та A(II) груп, сироватка B(III) групи аглютинацію не викликала. Яка група досліджуваної крові?

a. Помилка при визначенні

b. A(IV)

c. AB(IV)

d. 0(I)

e. B(III)

131. Породілля виписана з пологового будинку на 3-ю добу. Стан жінки та дитини задовільний. Акушерка повинна відвідати породіллю після виписки впродовж та кого часу:

a. 10 діб

b. 3 доби

с. Місяць

d. 7 діб

е. 14 діб

132. В ЖК звернулась вагітна в терміні 12 тижнів. З якою періодичністю жінка повинна відвідувати консультацію в 1-й половині вагітності?

а. 2 рази на місяць

б. 1 раз на 10 днів

с. 1 раз на квартал

d. 1 раз на місяць

е. 1 раз на тиждень

133. Перед набиранням олійних розчинів у шприц ампули з ліками акушерка підігріває на водяній бані до температури:

а. 18 - 20°C

б. 34 - 35°C

с. 25 - 30°C

д. 20 - 25°C

е. 37 - 38°C

134. На 9-ту добу після пологів у породіллі підвищилась температура тіла до 38°C, з'явилися скарги на біль у правій молочній залозі. При огляді встановлено: в правій молочній залозі пальпується інфільтрат, різко болісний, шкіра над ним гіперемована, субареолярна частина і сосок набряклі, болісні. Визначити, яке ускладнення післяпологового періоду у породіллі?

а. Лактаційний мастит

б. Мастопатія

с. Лактостаз

д. Лакторея

е. Тріщини сосків

135. На ФАП звернулась дівчинка 12-ти років зі скаргами на біль по всьому животу, який з'явився декілька годин тому в епігастральній ділянці. Пізніше біль локалізувався в правій здухвинній ділянці. Температура тіла 38°C, живіт болісний під час пальпації, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що з переліченого повинна зробити акушерка?

а. Викликати батьків

б. Терміново госпіталізувати

с. Промити шлунок

д. Спостерігати

е. Відпустити додому

136. Після операції з приводу апендектомії пацієнт перебуває під дією ардуану. Який із перерахованих препаратів необхідно застосувати для нейтралізації дії міорелаксantu?

а. Налоксон

б. Атропін

с. Прозерин

д. Адреналін

е. Мезатон

137. Пацієнт хворий на ревматизм і знаходиться на диспансерному обліку. Який лікарський засіб буде використовувати лікар для профілактики загострень ревматизму?

а. Біцилін-5

б. Аспірин

с. Цефазолін

д. Бензилпеніцилін

е. Ампіокс

138. Жінка 32-х років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на кров'янисті виділення, нудоту, блювання. Остання менструація - 3 місяці тому. Вагінально: матка збільшена

до 16-тижневої вагітності, м'яка, вічко закрите, шийка матки без особливостей. Передбачуваний діагноз - міхуровий занесок. Яке дослідження найбільш інформативне для підтвердження діагнозу?

- a. Кольпоцитологічне
- b. Рентгенологічне дослідження органів малого таза
- c. Ультразвукове**
- d. Аналіз крові на прогестерон
- e. Аналіз сечі на хоріонічний гонадотропін

139. Пацієнт з'явився на прийом до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, нічний піт, сухий кашель, біль у грудях, періодичне кровохаркання. Ці симптоми характерні для такого захворювання:

- a. Рак легень
- b. Плеврит
- c. Пневмонія
- d. Туберкульоз легень**
- e. Гангрена легень

140. У пацієнтки 45-ти років з неповним видаленням матки заплановане оперативне втручання - кольпоперінеографія. У чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції?

- a. Промивання шлунка
- b. Санація піхви**
- c. Інстиляція сечового міхура
- d. Профілактика тромбоемболії
- e. Санація ротової порожнини

141. Пацієнтка 39-ти років надійшла до гематологічного відділення з приводу апластичної анемії. З діагностичною метою призначена стерильна пункція. Що необхідно приготувати для виконання цієї процедури?

- a. Скарифікатор, фільтрувальний папір
- b. Голка Касирського, шприці, перев'язувальний матеріал**
- c. Троакар, шприці, серветки
- d. Ін'єкційна голка, шприці, серветки
- e. Пункційна голка, шприці, серветки

142. У пацієнта клінічна смерть. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Яким повинно бути співвідношення вдихувань та натискань на груднину при проведенні серцево-легеневої реанімації двома реаніматорами?

- a. 3:5
- b. 4:5
- c. 2:15
- d. 2:5
- e. 1:5**

143. Студент 21-го року госпіталізований на 2-й день хвороби з гострим початком. Скаржиться на сильний біль у ділянці чола з переходом на ділянку орбіт, ниючий біль у м'язах і великих суглобах, відчуття жару. Температура тіла - 39°C. Адинамічний, слизова оболонка ротоглотки гіперемована. Визначте попередній діагноз:

- a. Парагрип
- b. Грип**
- c. Хронічний бронхіт
- d. Менінгококова інфекція
- e. Пневмонія

144. У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації на одній з акушерок загорівся одяг. Яким способом та як найшвидше можна припинити горіння одягу на людині?

a. Загорнути в ковдру

- b. Засипати піском
- c. Облити водою
- d. Збивати полум'я ковдрою
- e. Направити струмінь вогнегасника

145. Яку пов'язку слід накласти хворому з розтягненням зв'язок гомілковостопного суглоба?

a. Туга хрестоподібна

- b. Туга колова
- c. Хрестоподібна
- d. Туга спіральна
- e. Черепашкова

146. Жінка 38-ми років надійшла до гінекологічного відділення зі скаргами на кров'янисті виділення зі статевих шляхів протягом 10-ти днів, які почалися після 2-місячної затримки. З анамнезу: протягом 2-х років знаходиться на диспансерному обліку з приводу гіперплазії ендометрію. Рv: тіло матки нормальних розмірів, придатки не визначаються. Який додатковий метод дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- a. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви
- b. Зондування матки

c. Роздільне діагностичне вишкрібання

- d. Гідротубація
- e. Гістеросальпінгографія

147. До акушерки ФАПу звернулася жінка зі скаргами на затримку менструації, ниючий біль внизу живота та крижах. Об'єктивно: матка збільшена до тижнів, шийка матки вкорочена, вічко трохи відкрите, виділення мізерні, сукровичні. Визначте діагноз:

- a. Аборт в ході
- b. Міхуровий занесок

c. Загроза самовільного викидня

- d. Фіброміома матки
- e. Дисфункція яєчників

148. У пацієнта поранення черепа з вибуханням головного мозку. Шкіру навколо рани обробили йодонатом, на вибухання наклали стерильну серветку з ізотонічним розчином. Що ще необхідно накласти, щоб не відбулося стиснення головного мозку?

a. Шина Єланського

b. Стерильний ватно-марлевий бублик

- c. Шина Крамера
- d. Шина Бакшеева
- e. Стерильний ватно-марлевий тампон

149. У пологовий будинок надійшла вагітна в терміні 40 тижнів. Схватки впродовж 6-ти годин. При зовнішньому обстеженні над входом в малий таз визначається голівка. При вагінальному обстеженні встановлено, що промацується лобний шов і передній кут великого тім'ячка, надбрівні дуги, перенісся. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Повздожнє передлежання
- b. Потиличне передлежання

c. Лобне передлежання голівки

- d. Косе положення плода
- e. Сідничне передлежання

150. У пацієнтки 23-х років після пологів шляхом кесаревого розтину з'явився висип на обличчі та тулубі. Об'єктивно: еритематозні вогнища ураження на спинці носа і вилицях у формі метелика, на спині; підвищення температури тіла. В післяопераційний період пацієнтка отримувала цефалоспорины. ШОЕ- 36 мм/год. Наведена клінічна картина характерна для такого захворювання:

a. Геморагічний васкуліт

- b. Кропив'янка
- c. Токсикодермія
- d. Системна склеродермія

e. Системний червоний вовчак

151. На ФАП звернулася мати пацієнтки зі скаргами на те, що на 15-ту добу після пологів у її дочки впав настрій, виникли плаксивість, байдужість до оточуючого, не цікавиться собою та новонародженою дитиною, зник апетит, виникли закрепи. Зі слів матері раніше таких станів не було. Акушерка класифікувала наведений стан, як:

- a. Ажітована депресія
- b. Дисфоричний синдром
- c. Астенічний синдром

d. Післяпологова депресія

e. Анорексія

152. Дитині 3 місяці, на грудному вигодовуванні. Під час активного патронажу медична сестра виявила у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, симптом "облисіння потилиці", підвищену дратівливість, неспокій, податливість країв великого тім'ячка. Про яке захворювання можна подумати?

a. Рахіт

- b. Паратрофія
- c. Гідроцефалія
- d. Гіпотрофія
- e. Пневмонія

153. Дитина у віці 3 місяці. Матір турбують поганий апетит, мерзлякуватість, сонливість дитини. Об'єктивно: дитина млява, голос грубий, захриплий. Спостерігаються набряк обличчя, великий язик, що не вміщається в роті, дитина не утримує голівки, не усміхається. Шкірні покриви сухі, гіпотонія м'язів. ЧСС-100/хв., ЧД-44/хв. Межі серця розширені, тони приглушені. Який препарат призначають при даній патології позитивно?

- a. Мерказоліл
- b. Дигоксин
- c. Пентоксил

d. L-тироксин

e. Діакарб

154. Після виконання ін'єкції акушерці необхідно провести дезінфекцію використаного інструментарію. Який розчин вона повинна застосувати для цього?

a. 0.2% дезактин

- b. 0.5% дезактин
- c. 0.5% розчин хлорного вапна
- d. АХД 2000
- e. Стериліум

155. Послідовий період триває 30 хвилин. Ознаки відокремлення плаценти відсутні, кровотечі немає. Що повинна зробити акушерка з метою надання невідкладної допомоги?

- a. Виміряти артеріальний тиск
- b. Покласти холод на низ живота
- c. Ввести спазмолітики
- d. Ввести утеротоніки

e. Провести ручне відділення та видалення плаценти

156. На ФАП звернулася хвора з гнійною раною в фазі дегідратації. Яке місцеве лікування найбільш ефективне?

- a. Дренування рани
- b. Накладання гігроскопічної пов'язки
- c. Накладання швів на рану

d. Мазева пов'язка

е. ПХО рани

157. Як часто потрібно проводити генеральне прибирання у палатах новонароджених пологового будинку?

- а. 2 рази на тиждень
- б. Через кожні 3 дні**
- с. Кожен день
- д. Через кожні 5 днів
- е. 1 раз на тиждень

158. Вагітна 28-ми років звернулася до акушерки зі скаргами на слабкість, головний біль, серцебиття під час фізичного навантаження. В анамнезі: рясні та тривалі менструації, з дитинства їсть крейду. Об'єктивно: шкіра бліда, нігті ламкі. У крові: гемоглобін –60 г/л, кольоровий показник –0,6, мікроцитоз, ШЗЕ-18 мм/год. Про яке захворювання можна думати?

- а. Залізодефіцитна анемія**
- б. Гемолітична анемія
- с. В12-дефіцитна анемія
- д. Гостра постгеморагічна анемія
- е. Гіпопластична анемія

159. При огляді шийки матки у дзеркалах акушерка побачила, що шийка конічної форми, рожевого кольору, зовнішнє вічко має круглу форму. Це свідчить про те, що жінка:

- а. Літнього віку
- б. Має захворювання шийки матки
- с. Народжувала
- д. Не народжувала**
- е. Вагітна

160. Хворий скаржиться на появу висипки на ліктях у вигляді яскраво-червоних вузликів, які покриті сріблястими лусочками з чіткими краями по периферії. Вузлики з'явилися після фізичної травми. Загальний стан не порушений, суб'єктивних симптомів немає. Про яку хворобу слід думати?

- а. Червоний вовчак
- б. Псоріаз**
- с. Атопічний дерматит
- д. Рожевий лишай Жиберга
- е. Червоний плоский лишай

161. В гінекологічне відділення поступила жінка 20-ти років із ознаками гострого живота. Остання менструація 2 тижні тому. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Матковий аборт
- б. Апоплексія яєчника**
- с. Трубний аборт
- д. Апендицит
- е. Порушена позаматкова вагітність

162. У відділення патології вагітних поступила жінка з терміном вагітності 42-43 тижня. Скарг немає. Строк пологів –3 тижні тому. Який метод обстеження повинна запланувати акушерка?

- а. Абдоменоскопія
- б. Кардоцентез
- с. Амніоскопія
- д. УЗД**
- е. Кардіотокографія

163. У вагітної з пізнім гестозом у терміні 36 тижнів розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є першочерговим у наданні долікарської допомоги?

- а. Ввести утеротоніки
- б. Ввести гіпотензивні засоби**

с. Звільнити дихальні шляхи, зафіксувати язик

d. Ввести еуфілін

e. Ввести знеболюючі засоби

164. В пологовий будинок поступила вагітна в терміні вагітності 40 тижнів зі скаргами на тягнучий біль у попереку і регулярні болючі перейми. Які методи знеболювання пологів може застосувати акушерка?

a. Гіпотензивні засоби

b. Дія на рефлексогенні зони

c. Анальгетики

d. Інгаляція закису азоту

e. Спазмолітики

165. Акушерка відкрила бікс з перев'язувальним матеріалом та виявила, що індикатор стерильності не розплавився. Які подальші дії акушерки?

a. Отримати підтвердження запису в "Журналі обліку стерилізації" в ЦСВ

b. Надіслати матеріали на бактеріологічне дослідження

c. Використати перев'язувальний матеріал для роботи

d. Написати доповідну записку на ім'я головного лікаря

e. Надіслати бікс на повторну стерилізацію

166. Хвора 58-ми років прийшла на прийом до акушерки зі скаргами на біль та наявність пухлиноподібного утворення в ділянці заднього проходу, підвищення температури тіла до 38°C. Під час огляду: на 7 годинах за умовним циферблатом біля ануса наявний інфільтрат грушоподібної форми розмірами 3x5 см, верхівкою в бік задньої крипти. Періанальні шкірні складки згладжені, пальпація інфільтрату викликає посилення болю; в центрі інфільтрату пальпується ділянка розм'якшення. Який попередній діагноз?

a. Геморой

b. Поліп прямої кишки

c. Гострий парапроктит

d. Рак прямої кишки

e. Анальна тріщина

167. Вагітна 32-х років поступила в пологове відділення в зв'язку з загрозою передчасних пологів у терміні 32 тижні. Який із перелічених засобів необхідно ввести з метою профілактики респіраторного дистрес-синдрому новонародженого?

a. Препарати заліза

b. Дексаметазон, бетаметазон

c. Антибіотики

d. Преднізолон

e. Спазмолітики

168. До пологового будинку доставлено жінку з вагітністю 38 тижнів, у зв'язку з пізнім гестозом. У приймальному відділенні, під час огляду вагітної на кушетці в неї виникли судоми. Які дії акушерки?

a. Викликати лікаря, стежити, щоб вагітна не впала з кушетки

b. Дати наркоз, викликати лікаря

c. Ввести гіпотензивні препарати, викликати лікаря

d. Викликати лікаря, ввести протисудомні препарати

e. Розпочати інфузійну терапію

169. До акушерки ФАПу звернулась вагітна у терміні 37 тижнів з приводу кров'янистих виділень з піхви, постійного сильного болю у верхньому відділі матки, які виникли після тупої травми живота. Загальний стан жінки задовільний: АТ-115/70 мм рт.ст., Ps-80/хв. Живіт правильної овоїдної форми болючий, напружений у верхньо-правому відділі. Серцебиття плода приглушене, до 170/хв. Який попередній діагноз?

a. Передчасне відшарування нормально розміщеної плаценти

b. Передчасне відходження навколоплідних вод

- c. Передлежання плаценти
- d. Передчасні пологи
- e. Природження плаценти

170. У пацієнтки, яка лікується у відділенні патології вагітності, виник гіпертензивний криз. Який медикаментозний засіб застосує акушерка за призначенням лікаря?

- a. Дицинон
- b. Вікасол
- c. Анальгін

d. Дибазол

- e. Аспірин

171. У хворої годину тому раптово виник сильний пекучий біль за грудниною, який віддає в ліву руку та триває 35 хвилин, не знімається нітроглицерином. Об'єктивно: тони серця ослаблені, аритмічні, ЧСС-110/хв. Який патологічний стан виник у хворої?

- a. Міокардит
- b. Мітральний стеноз
- c. -

d. Гострий інфаркт міокарда

- e. Ревматична хвороба

172. Хвора скаржиться на свербіж у піхві, піністі білі. При огляді: почервоніння і набряк слизової оболонки піхви, піністі білі. Який метод дослідження необхідно провести?

- a. Мазок на атипові клітини
- b. Гістеросальпінгографія
- c. Визначення каріопікнотичного індексу

d. Мазок на ступінь чистоти піхви

- e. Кольпоскопія

173. Жінка 40-ка років скаржиться на часте і болюче сечовипускання, часті позиви на сечопуск, біль внизу живота, підвищення температури тіла. Захворіла раптово після переохолодження. Об'єктивно: при пальпації живота біль у надлобковій ділянці. Сеча візуально мутна, містить кров. Ps-88/хв., температура тіла 38,6°C. Який попередній діагноз?

- a. Загострення хронічного пієлонефриту
- b. Гострий уретрит
- c. Напад ниркової кольки

d. Гострий цистит

- e. Гострий коліт

174. Позначаючи в температурному листку показники температури пацієнтки в післяопераційному періоді, акушерка помітила, що коливання ранкової і ве-чірньої температури дорівнює в межах 1-2°C. Вкажіть вид гарячки:

- a. Переміжна
- b. Постійна
- c. Атипова

d. Послаблювальна

- e. Хвилеподібна

175. Дитині 10 днів. Під час огляду виявлено почервоніння шкіри і ерозії поверхне-вого шару в пахвинних складках. Мати купає дитину через день, температурний режим не витримує. Для якого захворювання це характерно?

- a. Попрілості I ступеня
- b. Везикулопустульоз
- c. Пітниця
- d. Пухирчатка новонародженого

e. Попрілості II ступеня

176. На ФАП до акушерки звернулася вагітна зі скаргами на висипку із свербіжем, яка

з'явилася після вживання апельсину. При огляді на шкірі верхніх кінцівок та живота виявлено дисеміновану уртикар-ну висипку червоного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Анафілактичний шок
- b. Ревматична лихоманка
- c. -
- d. набряк Квінке
- e. Кропив'янка

177. У дитини віком 5 місяців на тім'яній ділянці голови з'явилися себорейні лусочки, під пахвами і у паху –попрілості. На що вказують ці симптоми?

- a. Лімфатико-гіпопластичний діатез
- b. Рахіт
- c. Гіпокальціємічний синдром
- d. Нервово-артритичний діатез
- e. Ексудативно-катаральний діатез

178. На прийом до ЖК прийшла пацієнтка зі скаргами на безпліддя протягом 3-х років регулярного статевого життя без використання засобів контрацепції. З якого методу дослідження найдоцільніше розпочати обстеження?

- a. Рентгенологічний
- b. УЗД
- c. Бактеріоскопічний
- d. Аналіз сперми статевого партнера
- e. Дослідження функції яєчників

179. У вагітної жінки в терміні 40 тижнів при огляді зліва від пупка пальпується го-лівка плоду, прослуховується серцебиття до 150/хв. Вкажіть положення плоду:

- a. Поперечне положення, II позиція
- b. Косе положення, I позиція
- c. Колінне положення
- d. Тазове положення
- e. Поперечне положення, I позиція

180. У пацієнта під час їжі раптово виник сильний кашель, ядуха; наростає ціаноз. Був виконаний прийом Геймліха, але через 3 хвилини чоловік знепритомнів, розвинулись судоми. Які наступні заходи потрібно провести?

- a. Трахеостомія
- b. Конікотомія
- c. Масаж грудної клітки
- d. Інтубація трахеї
- e. Доступ свіжого повітря

181. В хірургічне відділення доставлена хвора, яка скаржиться на біль і випинання в правій пахвинній ділянці, нудоту блювання. При обстеженні в правій пахвинній ділянці болісне щільне випинання, яке не піддається вправленню. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?

- a. Защемлена пахвинна кила
- b. Туберкульоз лімфатичних вузлів
- c. Гострий лімфаденіт
- d. Ниркова колька
- e. Абсцес правої пахвинної ділянки

182. У роділлі 30-ти років термінові пологи почалися 12 годин тому. Хворіла на скарлатину. Передбачувана маса плоду 2880 г. Останні 2 години перейми болючі, але сильні, регулярні, по 40 секунд, через 34 хвилини. Шийка матки згладжена, краї її товсті, щільні, не податливі, відкриття на 2 п/пальці. Голівка плоду великим сегментом у вході в малий таз. Яка головна причина можливого затяжного I періоду пологів?

- a. Ригідність шийки матки
- b. Перенесені інфекційні захворювання

- c. Вік 30 років
- d. Стояння голівки плоду
- e. Маса плоду

183. Пацієнтка 19-ти років звернулася зі скаргами на біль у поперековій ділянці справа, часте сечовиділення, підвищення температури тіла до 39.5°C. Захворіла гостро після купання в річці. Яке захворювання можна запідозрити у хворої?

- a. Хронічний пієлонефрит
- b. Ниркова колька
- c. Гострий пієлонефрит**
- d. Сечокам'яна хвороба
- e. Гострий цистит

184. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 50-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, іноді біль і виділення крові під час акту дефекації. Який попередній діагноз?

- a. Геморой**
- b. Тріщина заднього проходу
- c. Ігстрий парапроктит
- d. Рак прямої кишки
- e. Поліпи прямої кишки

185. -річний хлопчик був неуважний у класі. Вчитель звернув увагу на періодично відсутній погляд дитини і прицмокування губами. Падіння і судом не відмічалось. Під час короткої "відсутності" не відкликався на своє ім'я. Визначте тип нападу:

- a. Джексонівський
- b. Парціальний
- c. Епістатус
- d. Малий епілептичний**
- e. Генералізований тоніко-клонічний

186. Під час проведення активного патронажу на дому вагітної у терміні 34 тижні, виявлено підвищення артеріального тиску до 180/100 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Якою повинна бути тактика акушерки?

- a. Викликати швидку допомогу та госпіталізувати вагітну**
- b. Рекомендувати відвідати лікаря жіночої консультації у найближчий час
- c. Призначити гіпотензивні препарати
- d. Рекомендувати дотримуватися дієти
- e. Повідомити лікаря жіночої консультації

187. У вагітної жінки у терміні 20 тижнів виникли різкий біль у попереку з іррадіацією у пах, дизуричні явища. Під час сечовипускання ознаки гематурії. Для якого захворювання характерна зазначена симптоматика?

- a. Апоплексія яєчника
- b. Гострий апендицит
- c. Загроза викидня
- d. Сечокам'яна хвороба**
- e. Позаматкова вагітність

188. У терапевтичному відділенні знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У хворого відділяється харкотиння у великій кількості. Яке положення йому необхідно надати для поліпшення виділення харкотиння?

- a. Дренажне**
- b. Горизонтальне
- c. Вимушене
- d. -
- e. Пасивне

189. Чоловік отримав удар ножом у живіт. При обстеженні: на передній черевній стінці рана

довжиною 5 см, яка помірно кровоточить, в її отвір випала петля кишківника. Турбують біль у животі і спрага. Що необхідно виконати на місці в першу чергу?

a. Накласти вологу серветку на петлі, зафіксувати їх, знеболити

- b. Вправити петлі кишківника в черевну порожнину
- c. Обробити петлі кишківника дезрозчином, вправити
- d. Ввести кровоупинні, знеболюючі, госпіталізувати
- e. Запропонувати холодне питво, знеболити

190. У пологове відділення поступила роділья із регулярною пологовою діяльністю. Пологи II, термін вагітності 39-40 тижнів. При обстеженні виявлено врізування сідничок. До якої маніпуляції слід підготувати роділью?

a. Ручна допомога при чисто сідничному передлежанні

- b. Кесарів розтин
- c. Зовнішній поворот плоду на голівку
- d. Класична ручна допомога
- e. Ручна допомога при змішаному сідничному передлежанні

191. Акушерка гінекологічного відділення обслуговує пацієнтку 32-х років. Під час огляду встановлено: в ділянці великої залози пригінку піхви гіперемія, симптом флюктуації, різка болючість. Який метод лікування буде обраний?

- a. Контрацептиви
- b. Піхвові ванночки
- c. Спринцювання піхви

d. Хірургічний розтин та дренування абсцесу

- e. Введення порошкоподібних ліків у піхву

192. Акушерка госпіталізує вагітну до відділення патології. Яку облікову документацію (форму) вона має оформити?

- a. №025у
- b. №097у
- c. №113у

d. №096у

- e. №111у

193. Минуло 30 хвилин після народження плоду. Ознаки відділення плаценти позитивні. Плацента не виділяється. Почалася кровотеча. Назвіть причину кровотечі:

a. Затримка посліду в матці

- b. Розрив матки
- c. ДВЗ-синдром
- d. Затримка часточки посліду в матці
- e. Травми пологових шляхів

194. В жіночій консультації при огляді вагітної акушерка помітила висип на шкірі. Об'єктивно: на шкірі правого передпліччя дві плями круглої форми з обідком по периферії із вузликів, пухирців, кірочок у вигляді кілець, у центрі – лущення. Розміри вогнищ 1-2 см в діаметрі. Назвіть метод лабораторного дослідження для встановлення діагнозу:

- a. Аналіз крові на цукор
- b. Бактеріологічне дослідження крові

c. Мікологічне дослідження елементів висипки

- d. Аналіз калу на яйця гельмінтів
- e. Аналіз крові на реакцію Васермана (RW)

195. Першороділья 28-ми років з прееклампсією тяжкого ступеня, розміри тазу 25-28-31-21 см. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Серцебиття плоду не вислуховується. Напад еклампсії. Вагінально: відкриття шийки матки повне, голівка у вузькій частині малого тазу. Тактика ведення пологів:

a. Протисудомна терапія, плодоруйнівна операція

- b. Кесарів розтин

- с. Вакуум-екстракція плоду
- д. Стимуляція пологової діяльності
- е. Пологи через природні пологі шляхи

196. Біль має такі характеристики: періодичність, сезонність, локалізація болю у верхній частині епігастральної ділянки, тісний зв'язок з прийомом їжі (15-60 хвилин після їжі), зменшення болісного відчуття після блювання та застосування тепла. Для якого захворювання це характерно?

- а. Ентерит
- б. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- с. Рак шлунка
- д. Виразкова хвороба шлунка**
- е. Неспецифічний виразковий коліт

197. У роділлі 30-ти років II період пологів. Термін вагітності 38-39 тижнів, діагностовано чисто сідничне передлежання. Яку допомогу необхідно надати?

- а. Зовнішньо-внутрішній поворот плоду на ніжку
- б. Ручна допомога за методом Цов'янова**
- с. Ручна допомога за методом Цов'янова II
- д. Класична ручна допомога
- е. Очікувальна тактика

198. Під час ведення пологів при чисто сідничному передлежанні за методом Цов'янова відбулося передчасне випадіння ніжок. Що необхідно вжити для швидкого народження плоду?

- а. Виконати операцію кесарського розтину
- б. Вилучити плід за пахвинний згин
- с. Зовнішній поворот за Архангельським
- д. Вилучення плоду за ніжки**
- е. Застосувати класичну ручну допомогу

199. Дитина народилася від II вагітності II нормальних пологів з масою 3100 г, зростом 50 см. Яке щеплення необхідно зробити в перший день життя?

- а. Проти дифтерії
- б. Проти епідемічного паротиту
- с. Проти туберкульозу
- д. Проти кору
- е. Проти вірусного гепатиту В**

200. Дитина 7-ми місяців хвора на рахіт. Раптово відбулася зупинка дихання, поси-ніла, вкрилася липким потом; пролунав звучний вдих ("півнячий крик"). Яку невідкладну долікарську допомогу необхідно провести?

- а. Ввести між зубами шпатель, обгорнутий марлею
- б. Ввести антигістамінний препарат
- с. Провести лужну інгаляцію
- д. Натиснути на корінь язика**
- е. Дати тепле лужне пиття

201. Породілля скаржиться на біль у правій грудній залозі. В ділянці болю інфільтрат 3х4 см з розм'якшенням у центрі. Температура тіла 38,5°C. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Гнійний мастит**
- б. Плеврит
- с. Пневмонія
- д. Мастопатія
- е. Гострий лактостаз

202. Потерпілому 32 роки. Кілька хвилин тому, працюючи в коморі, розбив пляшку з азотною кислотою. Об'єктивно: в ділянці гомілки жовтий струп, болючість. Який нейтралізуючий засіб слід застосувати?

- a. 5% розчин міді сульфату
- b. 2% розчин гідрокарбонату натрію**
- c. Гліцерин
- d. 5% розчин натрію тіосульфату
- e. Вапняне молоко

203. Яке ускладнення зустрічається найчастіше у випадку поперечного положення плоду?

- a. Кровотеча з піхви
- b. Випадіння дрібних частин плоду**
- c. Сечостатеві нориці
- d. Слабкість пологової діяльності
- e. Розрив матки

204. У хворій 60-ти років два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилась виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільніш, безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли злі-ва збільшені. Який попередній діагноз?

- a. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- b. Первинний сифіліс
- c. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- d. Злоякісне новоутворення молочної залози**
- e. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

205. В жіночу консультацію звернулась вагітна з доношеною вагітністю, положення плоду поздовжнє, головне передлежання, голівка притиснута до входу в малий таз. ОЖ-100 см, ВСДМ-35 см. Визначте передбачувану масу плоду за формулою Лебедева:

- a. 2500 г
- b. 4000г
- c. 4500 г
- d. 2800 г
- e. 3500г**

206. На ФАП звернулася жінка для профілактичного огляду. За допомогою якого метода акушерка визначає тип конституції жінки?

- a. Огляд за допомогою дзеркал
- b. Анамнез
- c. Загальне об'єктивне обстеження**
- d. УЗД
- e. Піхвове обстеження

207. До акушерки ФАПу звернулась мати с дівчинкою п'яти років. Дитина висуває скарги на відчуття жару та нестачу повітря, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно: виражена блідість шкіри, холодний липкий піт на тілі. Дівчинку вжалила бджола. Який стан розвинувся у дитини?

- a. Набряк Квінке
- b. Гіпоглікемічна кома
- c. Гіперглікемічна кома
- d. Анафілактичний шок**
- e. Ацетонемічний синдром

208. У травмованого чоловіка 35-ти років різка болючість у ділянці кісток тазу внаслідок падіння з висоти. В якому положенні необхідно транспортувати хворого?

- a. Накласти 3 шини Крамера
- b. На дерев'яному щиті в положенні "жаби"**
- c. Підкласти під таз валик
- d. На дерев'яних ношах
- e. Накласти шину Дітеріхса

209. В стаціонарне відділення доставлено пацієнта 32-х років, у якого після вживання цитрусових розвинувся набряк обличчя, збільшились губи та повіки, з'явився кашель.

Об'єктивно: температура тіла 37,3 °C, Ps-82/хв., АТ-120/75 мм рт.ст. Яку допомогу слід надати при загрозі ядухи?

- a. Ввести антигістамінні препарати
- b. Ввести преднізолон
- c. Провести гемосорбцію
- d. Провести інтубацію трахеї**
- e. Припинити контакт з алергеном

210. У хворої 68-ми років, яка страждає на ІХС, раптово виник напад ядухи. Під час огляду: хвора сидить, дихання клекочуче, утруднене, кашель з пінистим рожевим харкотинням, ЧД-34/хв., Ps-100/хв., АТ-110/70 мм рт.ст. Розвиток якого патологічного стану є найбільш імовірним у даному випадку?

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Легенева кровотеча
- c. набряк легень**
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Гіпертензивна криза

211. У кабінеті профілактичних щеплень у 4-х місячної дитини після введення II АКДП раптово виникли симптоми анафілактичного шоку. З введення якого пре-парату слід почати надавати невідкладну допомогу?

- a. Розчин сибазону 0,5% 0,3 мл
- b. Розчин кальцію глюконату 10% 1,0 мл
- c. Розчин адреналіну гідрохлориду 0,1% 0,1 мл**
- d. Розчин аміназину 2,5% 0,2 мл
- e. Розчин анальгіну 50% 0,1 мл

212. Жінка 23-х років доставлена у клініку із гострим болем унизу живота, що іррадіює у пряму кишку, температура 40°C. Остання менструація 6 днів тому. РВ: матка не змінена, дещо болісна при зміщенні, зліва придатки без особливо-стей, справа визначається ретортоподібне утворення, болісне при зміщенні, розміром 9x4 см, що флюктує. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Гострий апендицит
- b. Перекрут ніжки пухлини
- c. Піосальпінкс**
- d. Апоплексія яєчника
- e. Трубна вагітність

213. Чоловік 69-ти років готується до планової операції: трансуретральна резекція простати. В анамнезі цукровий діабет. Оберіть вид анестезії, найбільш доцільний в даній ситуації:

- a. Атаралгієзія
- b. Спинномозкова анестезія**
- c. Ендотрахеальний наркоз
- d. Нейролептаналгієзія
- e. Внутрішньовенний наркоз

214. Після лижної прогулянки до акушерки звернулася жінка 25-ти років, яка скаржиться на біль у ділянках носа, щік та чола. При огляді шкіра набрякла, холодна на дотик. Що з переліченого характеризує стан хворої?

- a. Реактивний період відмороження
- b. Початкова стадія загального відмороження
- c. Загальне переохолодження
- d. Дореактивний період відмороження**
- e. Відмороження II ступеня

215. Після скількох років життя більшість передчасно народжених дітей з масою тіла від 1000 до 2000 г не відрізняються за своїм психомоторним розвитком від доношених немовлят?

- a. 5,5 -6

b. 2 –3

- c. 1 –2,5
- d. 3,5 –4
- e. 4,5 –5

216. До гінекологічного відділення ЦРЛ поступила жінка у терміні вагітності 8 тижнів з приводу блювання тяжкого ступеня. При дослідженні крові виявлено багато токсичних продуктів обміну; виник ацидоз. Для усунення ацидозу жінці необхідно ввести:

- a. Вітаміни групи В
- b. 200 мл фізіологічного розчину
- c. 20 мл 40% р-ну глюкози
- d. 100-150 мл 5% розчину натрію гідрокарбонату**
- e. 400 мл реополіглюкіну

217. Вагітна жінка 32-х років знаходиться в гастроентерологічному відділенні зі скаргами на гіркоту в роті, ниючий біль у правому підребер'ї, нудоту, здуття живота. В анамнезі –хронічний холецистит. Яка дієта необхідна хворій?

- a. №7
- b. №15
- c. №5**
- d. №1а
- e. №10

218. До ЖК звернулась жінка після оперативного втручання в онкодиспансері з приводу раку тіла матки. Яка подальша тактика акушерки?

- a. Направити до завідуючого ЖК
- b. Направити до завідуючого службою
- c. Провести огляд
- d. Взяти на диспансерний облік**
- e. Направити до онколога поліклініки

219. Неповнолітній працівник звернувся із заявою надати йому щорічну відпустку в літній час на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?

- a. 20 календарних днів
- b. 15 календарних днів
- c. 26 календарних днів
- d. 24 календарні дні
- e. Один календарний місяць**

220. На ФАП звернулася жінка із скаргами на постійний біль у правій здухвинній ділянці, підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, одноразове блювання. Під час обстеження пацієнтки акушерка виявила наступні позитивні симптоми: Воскресенського, Ровзінга, Роздольського. Для якого захворювання характерна дана симптоматика?

- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Перфоративна виразка
- c. Гострий апендицит**
- d. Ниркова колька
- e. Перитоніт

221. У вагітної, хворої на епілепсію, після самостійного припинення прийому протисудомних препаратів виник великий судомний напад. Які дії найбільш доцільні в цьому випадку?

- a. Дати заспокійливі препарати
- b. -
- c. Викликати лікаря
- d. Надати допомогу при нападі і викликати лікаря**
- e. Ввести протисудомний препарат

222. У роділлі з вузьким тазом виникла загроза розриву матки. Оберіть правильну тактику

ведення пологів:

- a. Стимуляція пологової діяльності
- b. Епізіотомія

c. Зняти пологову діяльність

- d. Кесарів розтин
- e. Акушерські щипці

223. У першому періоді пологів роділля скаржиться на сильний біль у животі, попереку, тенезми. Перейми сильні, виникають через короткі проміжки, із частотою 6 за 10 хвилин. Що повинна акушерка запропонувати роділлі до прибуття лікаря?

- a. Прийняти вертикальне положення тіла
- b. Лягти на спину

c. Лягти на бік, протилежний позиції плоду

- d. Лягти на бік, що відповідає позиції плоду
- e. Вільне ходіння

224. До акушерки ФАПу звернулась мати хлопчика 12-ти років. Хлопчик скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. У крові: бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?

- a. Ревматоїдний артрит

b. Гострий лейкоз

- c. Туберкульоз
- d. Геморагічний васкуліт
- e. Системний червоний вівчак

225. Під час проведення перев'язки множинних інфікованих ран і подряпин, на-несених собакою, які локалізовані на верхніх і нижніх кінцівках, пацієнтка по-скаржилася, що три дні її турбують утруднене відкривання рота, болі в горлі, посіпування м'язів, неспокій, безсоння, почуття страху. Температура тіла 37,5°C. Який попередній діагноз?

- a. Ангіна
- b. Сепсис
- c. Глосит

d. Правець

- e. Стоматит

226. Пацієнтці призначено взяття мазка на "гормональне дзеркало". Вкажіть місце взяття матеріалу для дослідження:

- a. Із переднього склепіння піхви
- b. Із заднього склепіння піхви
- c. На межі заднього і бокового склепіння

d. На межі переднього і бокового склепіння

- e. Із цервікального каналу

227. На ФАП поступив пацієнт із скаргами на біль у животі знизу зліва, часті випорожнення (7-8 разів на добу) з домішками слизу та крові. Об'єктивно: сигмоподібна кишка пальпується у вигляді болісного тяжа, напружена. Яке захворювання можна запідозрити в даному випадку?

- a. Ботулізм
- b. Вірусний гепатит

c. Шигельоз

- d. Сальмонельоз
- e. Холера

228. До акушерки ФАПу звернулась хвора зі скаргами на слабкість, підвищення температури тіла, біль у колінному суглобі. З анамнезу відомо, що 2 тижні тому хворіла на ангіну. Встановлено діагноз –ревматизм. Які заходи належать до первинної профілактики ревматизму?

- a. Додержання дієти № 10

b. Санація хронічних вогнищ інфекції

- c. Введення біциліну-5

- d. Прийом аспірину протягом 1 місяця
- e. Обмеження фізичної активності

229. Дитині 4 тижні. Акушерка помітила, що через годину після ранкового годування з'явилося блювання "фонтаном". Для якого стану характерні дані ознаки?

- a. Кишковий токсикоз
- b. Пілороспазм
- c. Проста диспепсія
- d. Пілоростеноз**
- e. Парентеральна диспепсія

230. На ФАП звернулась пацієнтка зі скаргами на біль при відкриванні рота, жуванні та ковтанні, загальну слабкість, підвищену пітливість, короточасні скорочення м'язів спини. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- a. Радикуліт
- b. Сказ
- c. Правець**
- d. Менінгоенцефаліт
- e. Істерія

231. Пацієнтка прооперована з приводу субсерозної лейоміоми матки. Протягом якого терміну жінка повинна знаходитись під диспансерним наглядом після оперативного лікування?

- a. 6 місяців**
- b. 2 місяці
- c. 10 місяців
- d. 12 місяців
- e. 2 роки

232. Акушерка проводить профогляд жінки 30-ти років. Жінка скарж не висловлює. Виявлено, що розміри матки збільшені до 10 тижнів вагітності, вона щільна, безболісна, рухома. Шийка та придатки не змінені. Молочні залози та лімфатичні вузли не змінені. До якого додаткового обстеження треба підготувати жінку?

- a. Кольпоскопія
- b. Зондування матки
- c. Біопсія
- d. Пункція через заднє склепіння піхви
- e. Роздільне діагностичне вишкрібання матки**

233. Який об'єм крововтрати в третьому періоді пологів є фізіологічним?

- a. Не більше 0,5% від маси тіла**
- b. Не більше 2% від маси тіла
- c. Не більше 1 % від маси тіла
- d. Не більше 5% від маси тіла
- e. Не більше 3% від маси тіла

234. -ми річна жінка визначає відсутність вагітності протягом 3-х років після самовільного викидня, ускладненого запаленням придатків матки. Який най-більш імовірний чинник безпліддя?

- a. Матковий
- b. Цервікальний
- c. Яєчниковий**
- d. Коітальний
- e. Чоловічий

235. Акушерка післяпологового відділення виявила у породіллі на 3-тю добу почервоніння в ділянці швів на промежині та гнійні виділення. Яка найбільш доцільна тактика в цьому випадку?

- a. Провести обробку швів

b. Провести туалет породіллі

c. Зняти шви

d. Призначити антибіотики

e. Покласти холод на ділянку швів

236. Вагітній жінці 32-х років, хворій на цукровий діабет, лікарем-гінекологом був призначений аналіз сечі на глюкозу. За який проміжок часу повинна зібрати сечу жінка?

a. 10 годин

b. 7 годин

c. 8 годин

d. 12 годин

e. 24 години

237. До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на безплідність. В анамнезі гонорейний сальпінгіт. Під час обстеження виявлено непрохідність маткових труб. За допомогою якого методу діагностики можна з'ясувати збереження функції яєчників?

a. Кольпоскопія

b. Тести функціональної діагностики

c. Гідротубація

d. Гістеросальпінгографія

e. Пертубація

238. Хвора 31-ти років поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на постійний тупий біль унизу живота, що з'явився три дні тому, підвищення температура тіла до 38°C. При піхвовому дослідженні визначаються збільшені, болючі під час пальпації придатки, симптом Щоткіна-Блюмберга відсутній. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Пельвіоперитоніт

b. Гострий сальпінгоофорит

c. Гострий кольпіт

d. Гострий ендометрит

e. Параметрит

239. Після народження дитини стан новонародженого оцінюють за шкалою Апгар. Якою кількістю балів оцінюється задовільний стан новонародженого?

a. 2-4

b. 6-7

c. 8-10

d. 4-5

e. 1-3

240. До акушерки ФАПУ звернулася пацієнтка 33-х років зі скаргами на незначні кров'яні виділення з піхви, переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: остання менструація 2 місяці тому. Тест на вагітність позитивний. РС-80/хв., АТ-110/80 мм рт.ст. Живіт болючий над лоном. Якими мають бути дії акушерки?

a. Призначити седативні засоби

b. Призначити токолітики

c. Направити жінку до стаціонару

d. Ввести утеротоніки

e. Ввести кровоспинні засоби

241. При визначенні групи крові аглютинація еритроцитів відбулась із цоліклонами анти-А та анти-В. Якої групи досліджувана кров?

a. АВ (IV)

b. Групу визначити неможливо

c. 0 (I)

d. В (II)

e. А (I)

242. На ФАП звернулася жінка 30-ти років зі скаргами на біль пульсуючого характеру в ділянці правої великої статевої губи. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Метрит
- b. Кольпіт
- c. Бартолініт**
- d. Цервіцит
- e. Аднексит

243. Хвора скаржиться на біль у правому підребер'ї, що віддає у лопатку, гіркоту та сухість у роті. Ці ознаки з'являються протягом двох років після вживання жирної, смаженої, гострої їжі. Об'єктивно: стан задовільний, шкіра звичайного забарвлення, живіт м'який, помірно болючий в ділянці проекції жовчного міхура. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Хронічний панкреатит
- b. Хронічний гепатит в стадії загострення
- c. Хронічний коліт
- d. Цироз печінки
- e. Хронічний холецистит в стадії загострення**

244. Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні матки розміщена крупна, щільна, балотуюча частина плоду. Третім прийомом над входом в малий таз визначається частина плоду м'якуватої консистенції, не здатна до балотування. Яке положення плоду діагностовано?

- a. Головне
- b. Поперечне
- c. Тазове
- d. Косе

e. Поздовжнє

245. Жінка в терміні вагітності 8-9 тижнів скаржиться на нудоту, блювання більше 20 разів на добу, слабкість, зниження маси тіла. Об'єктивно: шкіра бліда, суха, температура субфебрильна, артеріальний тиск знижений. Олігурія, живіт втягнутий. Відмічається затримка випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Блювання важкого ступеня**
- b. Блювання вагітної середнього ступеня
- c. Блювання вагітної легкого ступеня
- d. Гострий апендицит
- e. Харчова токсикоінфекція

246. Акушерку терміново покликали до сусідського будинку, в якому сусід провадив ремонт електропроводки і отримав електротравму. На місці пригоди акушерка виявила чоловіка без ознак життя і одна приступила до СІР. Вкажіть правильне співвідношення вдихів та натискань на грудну клітку:

- a. 2:15
- b. 1:5
- c. 2:30**
- d. 1:15
- e. 2:10

247. Пацієнт 35-ти років звернувся до акушерки ФАПу зі скаргами на зниження зору, "туман" перед очима, двоїння предметів, які виникли напередодні. Голос гугнявий. При об'єктивному обстеженні виявлено мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. За 3 дні до захворювання вживав консервовану свинину. Яке захворювання може запідозрити акушерка?

- a. Отруєння молоком
- b. Ботулізм**
- c. Стовбуровий енцефаліт
- d. Розлади мозкового кровообігу
- e. Отруєння метиловим спиртом

248. Після пологів у жінки впродовж 3-х діб відсутні випорожнення. За призначенням лікаря акушерка повинна поставити пацієнтці очисну клізму. Який об'єм води слід налити у кружку Есмарха?

- a. 1-1,5 л
- b. 2-3 л
- c. 0,1-0,2 л
- d. 0,5-0,7 л
- e. 3-4 л

249. Жінка скаржиться на свербіж, печіння, болючість в ділянці зовнішніх статевих органів, значні сироподібні виділення із піхви. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гонорея
- b. Герпес
- c. Кандидозний кольпіт
- d. Трихомоніаз
- e. Хламідійна інфекція

250. Дитині необхідно провести першу ревакцинацію АКДП. Назвіть строки її проведення:

- a. 8 місяців
- b. 12 місяців
- c. 18 місяців
- d. 6 місяців
- e. 10 місяців

251. У пологовий будинок поступила вагітна в терміні 38 тижнів зі скаргами на переймоподібний біль унизу живота. При обстеженні –розкриття шийки матки на 6 см. У якому періоді пологів знаходиться жінка?

- a. Прелімінарний
- b. Ранній післяпологовий
- c. Другий
- d. Третій
- e. Перший

252. Хворому 32-х років з ознаками шлунково-дуоденальної кровотечі почали переливання однокрупної крові. Під час проведення біологічної проби з'явилися скарги на біль у попереку, загальну слабкість, неспокій. Об'єктивно: обличчя червоне, тремтіння, прискорення пульсу і дихання, задишка. Який стан виник?

- a. Гемолітичний шок
- b. Дихальна недостатність
- c. Післятрансфузійна реакція
- d. Гемотрансфузійний шок
- e. Цитратний шок

253. Роділля 38-ми років поступила в пологовий будинок в I періоді термінових пологів. Роділля неспокійна, збуджена, скарги на відчуття страху, сильний біль у животі й попереку, що не припиняється, матка у вигляді "піщаного годинника", сечовипускання болюче, частини плоду не пальпуються. Вкажіть тактику акушерки за відсутності лікаря:

- a. Зробити амніотомію
- b. Ввести окситоцин
- c. Накласти акушерські щипці
- d. Зробити епізіотомію
- e. негайно припинити пологову діяльність

254. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на зниження пам'яті та працездатності, сонливість, випадіння волосся. Об'єктивно: сповільнена мова, голос низький, хриплий. Температура тіла –35,1 °С. Набряки локалізовані на обличчі, шиї. Риси обличчя грубі, набряклі повіки, звужені очні щілини, товсті ніс та губи. Ps–60/хв., АТ–100/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені. Яке захворювання виникло у пацієнтки?

- a. Тиреотоксикоз
- b. Гломерулонефрит
- c. Ендемічний зоб

d. Гіпотиреоз

- e. Набряк Квінке

255. При взятті вагітної на облік, при вимірюванні тазу встановлено розміри: 23-25-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:

- a. Косозміщений
- b. Нормальний
- c. Плоскорохитичний
- d. Простий плоский

e. Загальнорівномірнорозвужений

256. Вагітна жінка у терміні 35 тижнів, стан тяжкий. Скарги на головний біль, порушення зору, миготіння "мушок" перед очима. Об'єктивно: генералізований набряк, АТ-180/120 мм рт.ст. Зненацька з'явилися фібрилярні посмикування м'язів обличчя. Тонічні судоми. Дихання зупинилось. Через хвилину дихання відновилось, з рота – значна кількість піни. Амнезія. У сечі: білок 7 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Епілепсія
- b. Прееклампсія тяжкого ступеня
- c. Черепно-мозкова травма

d. Еклампсія

- e. Гіпертонічний криз

257. До приймального відділення доставлено пацієнта з блюванням у вигляді "ка-вової гущі". Хворого необхідно транспортувати до відділення:

- a. Пішки у супроводі медсестри
- b. Пішки самостійно

c. Лежачи на каталці-ношах

- d. Сидячи на стільці, ліфтом
- e. Сидячи на кріслі-каталці

258. При перевірці стану охорони праці лікарні інспектором управління охорони здоров'я були виявлені недоліки. Хто несе відповідальність за стан охорони праці в лікарні?

- a. Головна медсестра
- b. Інженер з охорони праці
- c. Керівник структурного підрозділу

d. Головний лікар

- e. Заступник головного лікаря з адміністративно-господарської роботи

259. Жінка скаржиться на відсутність вагітності протягом 2-х років. Засобами контрацепції не користується. Після вимірювання базальної температури отримали однофазну криву. Оцініть результати даного обстеження:

- a. Надлишок прогестерону

b. Відсутність овуляції

- c. Нормальна температурна крива
- d. Передчасна овуляція
- e. Наявність овуляції

260. До акушерки ФАПу звернулися батьки дитини 5-ти місяців із запитанням: які зуби прорізаються першими?

- a. Два верхні центральні різці

b. Два нижні центральні різці

- c. Два нижні латеральні різці
- d. Перші молочні моляри
- e. Два верхні латеральні різці

261. В пологове відділення доставлена роділля 30-ти років у терміні 40 тижнів з переймами, які почалися 15 годин тому. Пологи другі. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через кожні 10-15 хвилин. Серцебиття плода ритмічне, 140/хв. Про яке ускладнення пологів іде мова?

a. Первинна слабкість пологової діяльності

b. Надмірно сильна пологова діяльність

c. Провісники пологів

d. Слабкість потуг

e. Вторинна слабкість пологової діяльності

262. При прийомі на роботу акушерки у відділення патології вагітності проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Хто проводить даний інструктаж?

a. Завідувач відділенням

b. Головний лікар

c. Головна акушерка

d. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

e. Інженер з охорони праці

263. Пацієнтка 63-х років перебуває на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. Під час профілактичного огляду висуває скарги на швидку втомлюваність, виражену загальну слабкість, втрату апетиту, відразу до м'ясної їжі. Об'єктивно: зниженого живлення, шкірні покриви та видимі слизові бліді. Яке ускладнення найбільш імовірно виникло у хворої?

a. Пенетрація

b. Рак шлунка

c. Стеноз ворота

d. Шлункова кровотеча

e. Перфорація

264. У пологовий будинок поступила вагітна 38-ми років, вагітність I, 39 тижнів. Впродовж 1,5 тижнів скаржиться на головний біль, порушення зору. Під час обстеження жінки виникли судоми. Які дії акушерки в санпропускнику?

a. Ввести гіпотензивні препарати

b. Виміряти артеріальний тиск, покликати лікаря

c. Ввести іпротисудомні засоби

d. Підключити крапельницю

e. Покликати лікаря, запобігти падінню з кушетки

265. Після пологів пацієнтці з гострою затримкою сечі лікар призначив катете-ризацію сечового міхура. Чим повинна акушерка обробити катетер перед введенням його в сечівник?

a. Розчин фурациліну

b. Рідкий вазелін

c. Антисептичний розчин

d. Розчин натрію хлориду

e. Стерильний гліцерин

266. У відділення раннього дитинства дитячої лікарні поступила 8-ми місячна дитина з діагнозом: гостра пневмонія. Медсестра, виконуючи призначення лікаря, підготувала дитину до наступного обстеження:

a. Взяття калу на яйця глистів

b. Загальний аналіз сечі

c. Цистоскопія

d. Ректороманоскопія

e. Рентгенографія

267. Пацієнтку 25-ти років турбують біль у ділянці серця, серцебиття, підвищення температури тіла, біль у колінних суглобах. В анамнезі часті ангіни. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці серця, колінні суглоби болісні, припухлі, гарячі на дотик, функція їх порушена. За допомогою яких препаратів здійснюється етіотропна терапія даної пацієнтки?

a. Антибіотики

- b. Нестероїдні протизапальні препарати
- c. Серцеві глікозиди
- d. Глюкокортикостероїдні препарати
- e. Препарати, що покращують метаболічні процеси в міокарді

268. Першовагітна 30 років, термін вагітності 34 тижні. Скаржиться на посилення рухів плоду, особливо у другій половині дня. В крові НЬ-64 г/л. Яке ускладнення виникло в даному випадку?

- a. Синдром нижньої порожнистої вени
- b. Загроза передчасних пологів
- c. Анемія вагітних**
- d. Передлежання плаценти
- e. Передчасне відшарування плаценти

269. У дитини важкий стан, є дефіцит маси тіла 30%, шкіра із сіруватим відтінком, зморшувата, виникають диспепсичні розлади. Поставте діагноз:

- a. Гіпотрофія II ступеня
- b. Гіпотрофія III ступеня**
- c. Анемія
- d. Вроджена вада серця
- e. Кишковий токсикоз із ексикозом

270. Під час огляду вагітної жінки 25-ти років у жіночій консультації увагу лікаря привернули скупчені вогнища міхурців на внутрішній поверхні стегна. Міхурці болючі, різного розміру з каламутним вмістом. Виникають неодноразово на одному і тому ж місці. Якому діагнозу відповідає зазначена клінічна картина?

- a. Трихомоніаз
- b. Гонококова інфекція
- c. Хламідіоз
- d. Сифіліс

e. Оперізувальний герпес

271. На прийом звернулася пацієнтка зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів, переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: вагітність 10-11 тижнів, загроза самовільного викидня. До якого лікарського втручання слід підготувати пацієнтку?

- a. Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу
- b. Видалення плідного яйця з порожнини матки**
- c. Зондування порожнини матки
- d. Ушивання цервікального каналу шийки матки
- e. Лапароскопія

272. Акушерка-практикантка разом з лікарем веде II період пологів. Як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плоду з метою контролю стану плоду?

- a. Під час прорізування голівки
- b. Через кожних 5 хвилин
- c. Через кожних 15 хвилин

d. В паузах після кожної потуги

e. Під час кожної потуги

273. У жінки 46-ти років спостерігаються ациклічні маткові кровотечі, не пов'язані з менструальним циклом. Визначте вид порушення менструальної функції:

- a. Поліменорея
- b. Опсоменорея
- c. Менорагія
- d. Альгоменорея

e. Метрорагія

274. Вагітна 22-х років, термін 24-25 тижнів. Виник біль у попереку, озноб, підвищення температури тіла до 39°C. У крові: лейкоцити -15,5-109/л. У сечі: білок -0,06 г/л, лейкоцити 2-4

в полі зору, бактеріурія. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Прееклампсія
- b. Бактеріурія
- c. Цукровий діабет
- d. Цистит

e. Гострий пієлонефрит

275. Машиною ШМД доставлено породіллю і новонародженого. Пологи вдома, плід народився масою 3400 г, доношений, роділля в задовільному стані. У яке відділення потрібно госпіталізувати жінку?

- a. Гінекологічне відділення
- b. Патології вагітних
- c. Пологове відділення

d. Обсерваційне

e. Фізіологічне післяпологове відділення

276. Після проведення зовнішнього акушерського обстеження встановлено, що передлеглою частиною є велика, м'яка не балотуюча частина плоду, а спина його звернена вправо. Це:

- a. Тазове передлежання, задній вид
- b. Тазове передлежання, перша позиція
- c. Іоловне передлежання, передній вид

d. Тазове передлежання, друга позиція

e. Головне передлежання, друга позиція

277. Вагітна жінка скаржиться на зміну смаку, бажання їсти крейду, появу болючих тріщин у куточках рота, ламкість нігтів та випадіння волосся. Встановлено ді-агноз: залізодефіцитна анемія. Які продукти треба поради́ти збільшити в раціоні вагітної?

- a. Сир
- b. Мед
- c. Гарбуз
- d. Горіхи

e. М'ясо

278. Роділля 25-ти років. Вагітність перша, 40 тижнів. Жінка перебуває у пологовому залі. Яким чином акушерка повинна спостерігати за розвитком переймів у ро-діллі?

- a. Підрахувати частоту дихання у роділлі
- b. Виміряти артеріальний тиск у роділлі
- c. Проводити аускультацию серцебиття плоду

d. Покласти руку на дно матки

e. Виміряти пульс у роділлі

279. На плановий огляд в жіночу консультацію звернулась вагітна 29-ти років. Вагітність II, 30 тижнів. Після зважування встановили надмірну прибавку маси тіла. АТ-150/90 мм рт.ст. Яке дослідження слід обов'язково призначити вагітній?

- a. УЗД
- b. Загальний аналіз крові

c. Аналіз сечі на білок

- d. Загальний аналіз сечі
- e. Біохімічний аналіз крові

280. У роділлі пологи з активною пологовою діяльністю. Положення плоду по-здовжнє, I позиція, задній вид, головне передлежання. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 150/хв. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, передлежить голівка, визначається корінь носа, надбрівні дуги ближче до лона, позадупередній кут великого тім'ячка. Вкажіть передлежання плоду:

- a. Передньоголовне передлежання
- b. Тазове передлежання
- c. Лицьове передлежання

d. Лобне передлежання

e. Колінне передлежання

281. Акушерка пологового відділення у 3-му періоді пологів визначила позитивні ознаки відокремлення плаценти. Послід не виділився, почалася кровотеча. Яка тактика акушерки?

a. Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича

b. Ввести утеротонічні засоби

c. Провести ручне дослідження матки

d. Холод на низ живота

e. Провести зовнішній масаж матки

282. Акушерка оглянула доношену дитину 12-ти днів. Її фізичний розвиток вона оцінила як відповідний до віку. Яка маса тіла дитини стала підставою для цього висновку?

a. Дорівнює масі при народженні

b. Збільшення маси на 200 г

c. Збільшення маси на 150 г

d. Втрата 200 г маси

e. Втрата 150 г маси

283. До гінекологічного відділення надійшла жінка з діагнозом: позаматкова ва-гітність, розрив труби. При підготовці до операції необхідно ВИКЛЮЧИТИ:

a. Премедикацію

b. Туалет статевих органів

c. Промивання шлунка

d. Очисну клізму

e. Катетеризацію сечового міхура

284. У жіночій консультації проводять бесіду з жінками про профілактику раку шийки матки. Головна причина –вірус папіломи людини. Що рекомендують для профілактики раку шийки матки?

a. Бактеріологічне дослідження

b. Профогляди

c. Вимірювання базальної температури

d. Бактеріоскопічне дослідження

e. Мазок на гормональне дзеркало

285. До ЖК звернулась вагітна в терміні 12 тижнів вагітності. З якою періодичністю вагітна повинна відвідувати жіночу консультацію в 1 половині вагітності?

a. 2 рази на місяць

b. 1 раз на 10 днів

c. 1 раз на тиждень

d. Щотижня

e. 1 раз на місяць

286. Жінка 30-ти років поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на значні кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Вагітність заперечує. До якого допоміжного методу дослідження акушерка повинна підготувати інструменти?

a. Біопсія шийки матки

b. Пункція черевної порожнини

c. Зондування порожнини матки

d. Роздільне діагностичне вишкрібання

e. Аспіраційна біопсія

287. У породіллі 23-х років внаслідок лікування антибіотиками, що вводилися акушеркою внутрішньом'язово 4 рази на добу, утворився інфільтрат. Що, найімовірніше, спричинило виникнення цього ускладнення?

a. Введення ліків голкою №0860

b. Занадто повільне введення ліків

- c. Введення ліків у положенні стоячи
- d. Введення непадігрітого розчину
- e. Введення ліків у одне й те саме місце

288. До акушерки ФАПу звернулася мати з дитиною 3-х тижнів зі скаргами на утруднене носове дихання та серозні виділення з носа. В сім'ї старша дитина 3-років хворіє на ГРВІ. Який препарат найбільш доцільно застосувати для профілактики даної хвороби?

- a. Ампіцилін
- b. Фарингосепт
- c. Анальгін
- d. Димедрол
- e. Інтерферон

289. Хворий скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту, невпинне блювання. Об'єктивно: стан важкий, Рс-100/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. Язик сухий, живіт роздутий. Під час пальпації живіт напружений, болючий у верхніх відділах. На шкірі обличчя жовто-синюшно-багряні плями. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Тромбоз мезентеріальних судин
- b. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки
- c. Гострий холецистит
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Гострий панкреатит

290. В гінекологічному відділенні знаходиться жінка після операції з приводу позаматкової вагітності. Що необхідно застосувати з метою профілактики кровотечі?

- a. Грілка
- b. Холодна примочка
- c. Сухе тепло
- d. Холодний компрес
- e. Міхур з льодом

291. У роділлі 32-х років пологи ускладнились нефропатією. За призначенням лікаря акушерка ввела роділлі внутрішньом'язово у верхньо-зовнішній квадрат сідниці 25% розчин магнію сульфату 5 мл. Ін'єкційну голку потрібно ввести під кутом:

- a. 90°
- b. 45°
- c. 60°
- d. 70°
- e. 30°

292. У пологах відбувся розрив промежини з пошкодженням m. sphincter ani, стінка прямої кишки ціла. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Розрив промежини III ступеня, неповний
- b. Розрив промежини III ступеня, повний
- c. Розрив промежини I ступеня
- d. Розрив промежини II ступеня
- e. Розрив промежини, самовільний

293. Жінка поступила у відділення патології вагітності з приводу кров'янистих виділень зі статевих шляхів. Під час піхвового дослідження: канал шийки матки розкритий, плідне яйце нижнім полюсом виступає у піхву. Якій стадії абортів це відповідає?

- a. Інфікований аборт
- b. Загрозливий аборт
- c. Аборт у розпалі
- d. Неповний аборт
- e. Повний аборт

294. Пацієнт 33-х років скаржиться на напади ядухи з утрудненим видихом. На-прикінці нападу

тяжко відходить невелика кількість склоподібного мокротиння. Для якого захворювання це характерно?

- a. Туберкульоз легенів
- b. Серцева астма
- c. Бронхіальна астма**
- d. Пневмонія
- e. Гострий бронхіт

295. У першороділлі 20-ти років народився живий доношений хлопчик масою 3200 г довжиною тіла 50 см. Через 10 хвилин при натисканні ребром долоні над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака відокремлення плаценти була використана?

- a. Шредера
- b. Довженка
- c. Кюстнера-Чукалова**
- d. Альфельда
- e. Клейна

296. На ФАП звернулась жінка з терміном вагітності 8 тижнів. Скарги на загальну слабкість, втомлюваність, підвищення температури тіла до 39,2°C, пітливість, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння. Вкажіть імовірний діагноз:

- a. Вогнищева пневмонія
- b. Абсцес легень
- c. Крупозна пневмонія**
- d. Рак легень
- e. Туберкульоз легень

297. У потерпілого 19-ти років констатовано клінічну смерть. Проводиться серцево-легенева реанімація. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?

- a. Пульсація на сонній артерії**
- b. Відсутність свідомості
- c. Розширені зіниці
- d. Пасивні рухи грудної клітки
- e. Зниження температури тіла

298. Які дезінфікуючі розчини використовують для вологого прибирання у по-логових будинках?

- a. 0,15% розчин хлораміну
- b. 6% розчин перекису водню з 0,5% розчином мийного засобу**
- c. 0,5% розчин хлорного вапна
- d. 1 % розчин хлораміну
- e. 10% розчин хлорного вапна

299. Через 10 хвилин після народження посліду почалась значна кровотеча із ста-тевих шляхів зі згустками крові. Послід і пологові шляхи цілі. Матка при пальпації м'яка, дрябла, погано скорочується. Дно матки на 2 поперечні пальці вище пупка. Після введення утеротоніків кровотеча припинилась. Потім знову повторилась. Вкажіть причину кровотечі:

- a. Розрив матки
- b. Гіпотонія матки**
- c. Коагулопатична кровотеча
- d. ДВЗ-синдром
- e. Емболія навколоплідними водами

300. До пологового будинку поступає роділля 28-ми років на другі термінові пологи з доношеною вагітністю. При огляді виявлено поперечне положення плоду. Який принцип ведення пологів доцільний у даному випадку?

- a. Стимулювання пологів
- b. Звичайне ведення пологів
- c. Кесарський розтин**

- d. Плордоруїнівна операція
- e. Накладання акушерських щипців

301. ?1. У новонародженої дівчинки на 2гу добу життя з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри і слизових оболонок. Загальний стан дитини задовільний, сеча і кал мають звичайне забарвлення. Печінка і селезінка не збільшені. Для якого стану характерні дані симптоми?

a. Аномалія розвитку гепатобіліарної системи

b. Фізіологічна жовтяниця новонароджених

c. Обтураційна жовтяниця

d. Гемолітична хвороба новонароджених

e. Вірусний гепатит

302. Хворий 72-х років звернувся до поліклініки з приводу наявності крові в сечі. Під час опитування з'ясувалось, що у нього ніколи не було нападів ниркової коліки. Під час пальпації нирок визначається утворення в поперековій ділянці. Який метод дослідження першочерговий для з'ясування діагнозу?

a. Рентгенологічне дослідження

b. Ультразвукове дослідження

c. Комп'ютерна томографія

d. Загальний аналіз сечі

e. Ректальне дослідження

303. У медпункт заводу звернулася жінка 43-х років зі скаргами на різкий біль, свербіння, відчуття жару в лівій гомілці. Температура тіла- 38,3°C, хворіє два дні. Об'єктивно: в ділянці гомілки виражений набряк, розлите почервоніння з чіткими фестончастими краями, є окремі пухирі, наповнені жовтуватим вмістом. Який попередній діагноз?

a. Газова гангрена

b. Правець

c. Сибірка

d. Опік

e. Бешиха

304. До вас звернулася жінка 38-ми років зі скаргами на біль у лівій гомілці. Страждає на варикозне розширення вен нижніх кінцівок протягом 3-х років після пологів. Об'єктивно: температура тіла 38°C. У ділянці лівої гомілки по ходу варикозно розширених вен пальпуються болючі тяжі, шкіра над ними гіперемована, набрякла. Який попередній діагноз?

a. Атеросклероз

b. Ендартеріїт

c. Тромбофлебіт

d. Варикоз

e. Недостатність кровообігу

305. Роділля 24-х років поступила в пологове відділення в кінці першого періоду пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

a. Народження посліду

b. Відкриття шийки матки на 2 см

c. Періодичний ниючий біль

d. Повне відкриття шийки матки

e. Народження плоду

306. До пологового будинку поступила роділля на другі пологи з терміном вагітності 38 тижнів. Скаржиться на дуже болісні перейми, поведінка збуджена. Об'єктивно: нижній сегмент матки перерозтягнений, контракційне кільце на рівні пупка. Положення плоду поперечне, голівка збоку матки, зліва. Серцебиття плоду глухе, 120/хв. Яке ускладнення виникло у породіллі?

a. Надмірна пологова діяльність

b. Передлежання плаценти

c. Передчасне відшарування, нормально розташованої плаценти

d. Загрожуючий розрив матки

е. Дискоординована пологова діяльність

307. При обстеженні вагітної акушерка встановила, що спинка плоду розташована з лівого боку матки, над входом до малого тазу пальпується м'яка, без чітких контурів, небалотуюча частина плода. Визначте положення, позиціюта передлежання плода:

- a. Поздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання
- b. Поздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання
- c. Поперечне положення плода, друга позиція
- d. Поздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання
- e. Поздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання

308. Жінка 27-ми років, скарги на відсутність менструацій 7 місяців. До цього менструації були нерегулярні. Тест на вагітність негативний. 6 місяців тому перенесла гепатит у тяжкій формі. Встановлено, що матка та придатки без особливостей. Про яке порушення циклу йдеться?

- a. Аменорея
- b. Дісменорея
- c. Альгодісменорея
- d. Олігоменорея
- e. Поліменорея

309. Жінка 27-ми років звернулась до жіночої консультації. Скарги на безпліддя протягом останніх 4 років. У 16 років штучний аборт. Цикл нерегулярний. Контрацептиви не використовує. Спермограма чоловіка без змін. До якого обстеження необхідно підготувати жінку?

- a. Цитологічний скринінг
- b. Зондування матки
- c. Кольпоскопія
- d. Біопсія
- e. Гістеросальпінографія

310. Акушерка проводить профогляд жінки 30-ти років. Жінка скарг не висловлює. Виявлено, що матка збільшена до 10 тижнів вагітності, щільна, безболісна, рухома. Шийка та придатки не змінені. Молочні залози та лімфатичні вузли не змінені. До якого додаткового обстеження треба підготувати жінку?

- a. Зондування матки
- b. Пункція через заднє склепіння піхви
- c. Біопсія
- d. Кольпоскопія
- e. Роздільне діагностичне вишкрібання матки

311. Пацієнтка 45-ти років скаржиться на загальну слабкість, нездужання, неприємне відчуття в ділянці зовнішніх статевих органів. Об'єктивно: температура 37,8°C, набряк, гіперемія, болючість правої великої статевої губи. Для якого захворювання характерна ця картина?

- a. Крауроз вульви
- b. Рак вульви
- c. Вульвіт
- d. Кольпіт
- e. Бартолініт

312. У дитини 2-х років погіршення апетиту. При огляді шкіра та слизові оболонки бліді. В загальному аналізі крові еритроцитів- $2,7 \times 10^{12}$, гемоглобін- 85 г/л. Яке захворювання найбільш імовірно?

- a. Тромбоцитопенічна пурпура
- b. Анемія
- c. Геморагічний васкуліт
- d. Гострий лейкоз
- e. Гемофілія

313. У дівчинки 5-ти років скарги на зниження апетиту, слабкість, млявість. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки на обличчі, АТ- 130/80 мм рт.ст., сеча кольору "м'ясних помий". Який метод лабораторної діагностики повинна провести акушерка для визначення видільної та концентраційної функції нирок?

- a. Загальний аналіз сечі
- b. Аналіз сечі за Амбурже
- c. Аналіз сечі за Аддіс-Каковським
- d. Аналіз сечі за Зимницьким**
- e. Аналіз сечі за Нечипоренком

314. У 12- річної дитини через 2 тижні після перенесеної ангіни з'явився біль у серці, блідість шкіри, слабкість, втомлюваність, тахікардія, тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці. Яку патологію може запідозрити акушерка ФАПУ?

- a. Вегето-судинна дистонія
- b. Вогнищева пневмонія
- c. Вроджена вада серця
- d. Анемія
- e. Ревмокардит**

315. У дитини 5-ти місяців після ведення в раціон 100 г овочевого пюре з'явились рідкі випорожнення жовтого кольору з білими грудочками та слизом в кількості 5-6 разів на добу, одноразове блювання. Лікар призначив водно-чайнупаузу. Яким розчином акушерка буде її проводити?

- a. Відвар кропиви
- b. Регідрон**
- c. Фруктовий сік
- d. Фурацилін
- e. 40% розчин глюкози

316. Мати дитини 5-ти місяців поскаржилась, що останнім часом дитина стала неспокійною, погано спить. Акушерка з'ясувала, що за останній місяць вона набрала 500 г маси тіла. Яке обстеження необхідно провести?

- a. Контрольне зважування**
- b. Вимірювання зросту
- c. Вимірювання температури тіла
- d. Вимірювання обводу голови
- e. Вимірювання обводу грудної клітини

317. В гінекологічному відділенні у вагітної 24 тижнів скарги на підвищення температури до 39°C, біль у грудній клітці, вологий кашель з іржавим харкотинням. Об'єктивно: слабкість, гіперемія щік, ЧДР- 28/хв. Перкуторно: в нижніх відділах лівої легені притуплення звуку. Аускультативно: дрібнопухирчасті вологі хрипи. Після початку лікування впродовж 3-х годин температура тіла впала з 39°C до 36°C. Хвора зблідла, вкрилася холодним потом. Яке ускладнення виникло?

- a. Хронічна серцева недостатність
- b. Гостра дихальна недостатність
- c. Хронічна судинна недостатність
- d. Гостра серцева недостатність
- e. Гостра судинна недостатність**

318. Пацієнтка 23-х років лікується у гінекологічному відділенні. Після введення антибіотику у хворої раптово виникли запаморочення, біль в грудній клітці, задишка, зниження АТ, ниткоподібний пульс. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- a. Інфаркт міокарда
- b. Серцева астма
- c. Колапс
- d. Анафілактичний шок**

е. Набряк легень

319. Пацієнтка 30-ти років скаржиться на інтенсивний нападopodobний біль у правому підребер'ї з іррадіацією праве плече та лопатку, нудоту, повторне блювання. З анамнезу відомо, що протягом 2-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Яке ускладнення виникло?

а. Хронічна ниркова недостатність

б. Печінкова коліка

с. Печінкова недостатність

д. Ниркова коліка

е. Гостра ниркова недостатність

320. До акушерки звернулася пацієнтка 30-ти років, яка скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, спотворення смаку (їсть крейду), пекучий біль у язиці після їжі, появу "заїдів" у куточках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Яке дослідження треба провести для встановлення діагнозу?

а. Аналіз крові на глюкозу

б. Стерильна пункція

с. Загальний аналіз крові

д. Аналіз крові на реакцію Васермана

е. Аналіз крові на ВІЛ-інфекцію

321. Акушерка жіночої консультації роз'яснює жінці правила вимірювання базальної температури. На яку довжину треба ввести термометр в пряму кишку?

а. 4-5 см

б. 3-4 см

с. 7-8 см

д. 5-6 см

е. 1-2 см

322. При огляді пацієнта з наявністю ознак клінічної смерті ви починаєте серцево-легеневу реанімацію. Яке співвідношення вдихів та натискань на грудину при проведенні серцево-легеневої реанімації?

а. 2:15

б. 10:15

с. 2:5

д. 3:5

е. 2:30

323. При обстеженні пацієнтки акушерка виявила симптоми: схуднення, пітливість, безсоння, метушливість, емоційну лабільність. Звернула увагу на витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тахікардія. Про яке захворювання можна думати у даному випадку?

а. Гіпертонічна хвороба

б. Тиреотоксикоз

с. Ішемічна хвороба серця

д. Гіпотиреоз

е. Ревматизм

324. Жінка 61-го років поскаржилася на раптове утруднення дихання, біль, відчуття стискання у за грудинній ділянці з іррадіацією під ліву лопатку. Виникнення якого невідкладного стану можна запідозрити?

а. Напад бронхіальної астми

б. Колапс

с. Гіпертермічний синдром

д. Напад стенокардії

е. Геморагічний синдром

325. У пацієнта 28-ми років скарги на біль під час дефекації, виділення слизу та крові з відхідника протягом тижня. Який метод дослідження буде інформативним для з'ясування

діагнозу?

- a. Рентгеноскопія
- b. Ректороманоскопія**
- c. Фіброгастроезофагоскопія
- d. Гастроскопія
- e. Ультразвукове обстеження

326. У породіллі на 3-тюдобу післяпологового періоду з'явилися скарги на підвищення температури до 38,2°C, біль у низу живота, гнійні виділення з піхви, слабкість. Об'єктивно: Рс-98/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., шкіра бліда, живіт м'який, неболючий. Дно матки на 1 поперечний палець нижче пупка. Матка м'якувата при пальпації, болюча. При піхвовому дослідженні - відкриття шийки матки до 3 см, виділення гнійні, в помірній кількості. Матка збільшена до 17 тижнів вагітності. Який попередній діагноз?

- a. Післяпологовий сальпінгофорит
- b. Післяпологовий параметрит
- c. Післяпологовий пельвіоперитоніт
- d. Післяпологовий гострий ендометрит**
- e. Післяпологовий тромбофлебіт

327. У вагітної раптово почалась кровотеча із статевих шляхів до 200 мл. Вагітність 37 тижнів, положення плода поздовжнє, головне передлежання, голівка над входом в малий таз. При піхвовому дослідженні: канал шийки матки пропускає поперечний палець, у внутрішньому вічку і навколо нього через склепіння пальпується губчата тканина. Назвіть причину кровотечі:

- a. Ерозія шийки матки
- b. Низьке прикріплення плаценти
- c. Загроза передчасних пологів
- d. Передчасне відшарування плаценти
- e. Передлежання плаценти**

328. Вагітна 40 тижнів. Об'єктивно: АТ180/120 мм рт.ст., пологова діяльність відсутня. Набряки нижніх кінцівок, стінки живота та обличчя. Головний біль, порушення зору. Під час госпіталізації - напад судом. Назвіть тактику введення вагітної:

- a. Нагляд в умовах інтенсивної терапії
- b. Протисудомна терапія, кесарів розтин**
- c. Кесарів розтин
- d. Розпочати седативну терапію
- e. Провести стимуляцію пологової діяльності

329. Роділля 40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри тазу - 25-28-30-18. Індекс Соловйова 14. Діагональна кон'югата 10,5. Яка форма кісткового тазу?

- a. Загальнорівномірнорозвужений
- b. Простий плоский**
- c. Плоскорухітичний
- d. Поперечнозвужений
- e. Таз нормальних розмірів

330. Першонароджуюча скаржиться на постійну локальну біль в ділянці дна матки, що виникла з початком пологової діяльності, кров'яністі виділення зі статевим шляхів. Серцебиття плода приглушене, 140/хв. За даними УЗД плацента розміщена в передній стінці з переходом на дно. Яке ускладнення виникло у жінки?

- a. Загроза розриву матки
- b. Дискоординована пологова діяльність
- c. Емболія навколоплодовими водами
- d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти**
- e. Розрив матки, що розпочався

331. У повторновагітної жінки 25-ти років з тяжкою формою інсулінозалежного діабету настало

передчасне повне відшарування плаценти. При кесаревому розтині визначається наявність по лівому ребру матки, передній і задній стінки зліва масивні крововиливи. Матка має мармуровий вид синюшно-багряного кольору. В черевній порожнині до 200 мл геморагічної рідини. Назвіть ускладнення, що виникло:

- a. Геморагічний шок
- b. Гіпотонія матки

c. Матка Кувелера

- d. Емболія навколоплідними водами
- e. ДВЗ-синдром

332. Повторнонароджуюча 26-ти років, перейми почалися 10 годин тому. Через 2 години відійшли навколоплідні води. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, обвід живота- 96 см, ВСДМ 38 см. Перейми через кожні 4-5 хв., по 15 сек., шийка матки згладжена, відкриття вічка 4 см. Плодовий міхур відсутній. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло?

- a. Дискоординована пологова діяльність
- b. Передчасне відходження навколоплідних вод
- c. Вторинна слабкість пологової діяльності
- d. Клінічно вузький таз

e. Первинна слабкість пологової діяльності

333. У роділлі 40-ка років з доношеною вагітністю відійшли навколоплідні води 8 годин тому. При вагінальному дослідженні: виявлено фіброматозний вузол, який виходить з передньої стінки нижнього сегменту матки, що заповнює порожнину малого тазу. Голівка плода знаходиться високо. В анамнезі: I нормальні пологи та I штучний аборт, що ускладнився субінволюцією матки. Проведено родорозрішення методом кесаревого розтину з послідууючою екстирпацією матки без додатків. Назвіть причину вибору тактики ведення:

- a. Ускладнений акушерський анамнез
- b. Вік роділлі

c. Локалізація пухлини та її величина

- d. Тривалий безводний період
- e. Високе стояння голівки

334. Породіллі одразу після пологів акушерка приклала на низ живота міхур з льодом. Через який час вона повинна його зняти?

- a. Через 20 хвилин

b. Через 30 хвилин

- c. Через 10 хвилин
- d. Коли розтане лід
- e. Через годину

335. Першовагітна звернулась в жіночу консультацію з приводу вагітності 10 тижнів зі скаргами на задишку, серцебиття, незначний акроціаноз, швидку втомлюваність. На диспансерному обліку у кардіолога з діагнозом: "Ревматизм, активна фаза, ревмокардит. Комбінована мітральна вада серця з переважанням стенозу. Порушення кровообігу III ст." Який план ведення пацієнтки?

- a. Амбулаторне лікування
- b. Госпіталізація в терміні до 12 тижнів, 26-28, 36-37 тижнів
- c. Переривання вагітності в пізньому терміні

d. Переривання вагітності за медичними показаннями

- e. Штучне переривання вагітності

336. Пацієнтка 51-го року, яка знаходиться на диспансерному обліку з приводу цукрового діабету, відчула раптове сильне відчуття голоду, неспокій, тремтіння тіла. Втратила свідомість. Об'єктивно: АТ- 75/35 мм рт.ст., тони серця приглушені, тахікардія. Шкіра бліда, волога на дотик. Глюкоза крові 2,2 ммоль/л. Виберіть препарат для надання невідкладної допомоги:

- a. 2,4% розчин еуфіліну

b. 40% розчин глюкози

- c. 0,1% розчин адреналіну
- d. Інсулін короткої дії
- e. 60 мг преднізолону

337. У дитини 5-ти років температура 39,5°C, головний біль, катаральні явища в носоглотці, з'явилися судоми. Які першочергові дії?

a. Ввести розчин глюкози внутрішньовенно

b. Введення літичної суміші

- c. Ввести серцеві засоби
- d. Ввести розчин адреналіну
- e. Ввести гормони

338. Пацієнтка 20-ти років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем встановлено вагітність 7-8 тижнів. Який документ оформляється при взятті на облік по вагітності?

- a. Обмінна карта
- b. Історія пологів
- c. Контрольна карта диспансерного спостереження

d. Індивідуальна карта вагітної і породіллі

e. Амбулаторна карта

339. Акушерка жіночої консультації пояснює першовагітній як часто необхідно з'являтися на прийом. Кількість відвідувань жіночої консультації при фізіологічному перебігу вагітності складає:

- a. 18-20 відвідувань
- b. 28-30 відвідувань

c. 10-12 відвідувань

- d. 15 відвідувань
- e. 13-14 відвідувань

340. У першонароджуючої 20-ти років народився хлопчик вагою 3200 г. Через 10 хвилин при натисканні ребром долоні над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака відокремлення плаценти була використана?

a. Кюстнера-Чукалова

- b. Довженко
- c. Клейна
- d. Шредера
- e. Альфельда

341. Породілля 21-го року народила живого доношеного хлопчика вагою 3500 г. Стан породіллі задовільний, температура- 36,7°C, лохії кров'яністі в помірній кількості, матка скорочується. Дитина здорова. Жінка цікавиться, коли її выпишуть з пологового будинку?

a. На 7-му добу

b. На 3-тюдобу

- c. Через тиждень
- d. Через 2 тижні
- e. На 10-ту добу

342. На прийомі у жіночій консультації жінка повідомила, що остання менструація у неї була 03.07.2015 р. Вирахуйте передбачуваний термін пологів:

a. 03.07.2016 р.

b. 03.04.2016 р.

c. 10.04.2016 р.

- d. 15.12.2016 р.
- e. 25.10.2016 р.

343. Дільнична акушерка жіночої консультації проводить бесіду з вагітною з приводу

особливостей її харчування. Чому повинен дорівнювати приріст маси тіла вагітної за тиждень у другій половині вагітності?

- a. 600-700 г
- b. 700-800 г
- c. 300-350 г**
- d. 500-600 г
- e. 400-450 г

344. У вагітної 35 тижнів набряки ніг, рук, передньої черевної стінки. АТ- 160/100 та 170/105 мм рт.ст., головний біль. В сечі білок 3 г/л. Якою повинна бути тактика акушерки ФАПу після огляду вагітної?

- a. Обмежити вживання рідини та солі
- b. Призначити сечогінні препарати
- c. Призначити гіпотензивні препарати
- d. Рекомендувати відвідати лікаря
- e. Терміново госпіталізувати до пологового будинку**

345. Породілля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента відділилась самостійно, з усіма оболонками і часточками. Розривів м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслабляється, із статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

- a. Введення кровозамінників
- b. Зовнішній масаж матки**
- c. Міхур з льодом на низ живота
- d. Ручна ревізія порожнини матки
- e. Введення кровоспинних препаратів

346. На ФАП звернулась першороділля 20ти років зі скаргами на болючі перейми, які тривають протягом 3-х годин. При пальпації живота: нижній сегмент матки перерозтягнутий, болючий, голівка плода високо над входом в таз. Контракційне кільце розміщене косо. Розміри таза: 22-25-27-16. Яку невідкладну допомогу повинна надати акушерка?

- a. Визначити групу крові, викликати донорів
- b. Розпочати інфузію кровозамінників
- c. Викликати акушерську бригаду
- d. Транспортувати роділля до найближчої лікарні
- e. Припинити пологову діяльність (токолітики, анальгетики)**

347. Роділля 25-ти років щойно народила живого доношеного хлопчика вагою 3600 г. Який лікарський засіб введе акушерка роділлі у III періоді пологів для профілактики гіпотонічної кровотечі?

- a. Кальціюхлорид
- b. Окситоцин**
- c. Дицинон
- d. Вікасол
- e. Но-шпа

348. Акушерка ФАПу проводить періодичне профілактичне обстеження жінок. Яким наказом вона користується щодо кількості проходження жінками профілактичних оглядів на рік?

- a. 508
- b. 120
- c. 960
- d. 264
- e. 417**

349. До ФАПу звернулася хвора зі скаргами на появу виділень зі статевих шляхів, відчуття свербіння в ділянці статевих органів. Об'єктивно: слизова оболонка піхви гіперемована, виділення пінистого характеру. Діагностовано трихомоніаз. Оберіть препарат для лікування цієї хвороби:

a. Метронідазол

- b. Ністатин
- c. Етазол
- d. Анальгін
- e. Вагілак

350. Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Народився живий доношений хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см, без дихання. ЧСС- 40/хв. Ціаноз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м'язів. Яка невідкладна допомога?

- a. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно - глюкозу
- b. Закритий масаж серця, внутрішньовенно - адреналін, глюкоза
- c. Закритий масаж серця, внутрішньовенно гідрокарбонат натрію
- d. ШВЛ, внутрішньовенно глюкозу, адреналін, гідрокарбонат натрію

e. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно адреналін

351. Пологи завершилися народженням живого хлопчика масою 4500 г, зріст 52 см. Через 10 хвилин почалась маткова кровотеча. Плацента відокремлена рукою, проведений масаж матки на кулаці, внутрішньовенно введено розчин окситоцину. Через 10 хвилин кровотеча повторилась. Консервативні методи підвищення скоротливої діяльності матки не дали ефекту. Крововтрата за 40 хвилин боротьби з кровотечею складає понад 1200 мл. Яка тактика подальшого ведення пологів?

- a. Вишкрібання матки
- b. Повторне введення розчину окситоцину

c. Хірургічна зупинка кровотечі

- d. Зовнішній масаж матки
- e. Накладання швів на шийку матки

352. До акушерки жіночої консультації звернулася жінка, 12 тижнів вагітності, зі скаргами на болючий конусоподібної форми інфільтрат з некротичним стрижнем у ділянці підборіддя. Шкіра над ним червона, напружена. Назвіть найбільш імовірний діагноз?

- a. Карбункул
- b. Туберкульоз

c. Фурункул

- d. Третичний сифіліс
- e. Глибока трихофітія

353. До акушерки жіночої консультації звернулася жінка 45-ти років, яка скаржиться на сильний біль у ділянці промежини, який посилюється під час рухів та дефекації. Хворіє 5 діб. Під час огляду в періанальній ділянці інфільтрат до 2х3 см різко болючий при пальпації, в центрі розм'якшення. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний геморой
- b. Гострий проктит
- c. Рак прямої кишки
- d. Гострий геморой

e. Гострий парапроктит

354. На 9-ту добу після пологів у породіллі підвищилась температура тіла до 38°C, скаржиться на біль у правій молочній залозі. При огляді встановлено: в правій молочній залозі пальпується інфільтрат, різко болючий, шкіра над ним гіперемована, субареолярна частина і сосок набряклі, болючі. Визначити, яке ускладнення післяпологового періоду у породіллі?

- a. Лакторрея
- b. Лактостаз

c. Лактаційний мастит

- d. Мастопатія
- e. Тріщини сосків

355. Після прийому нормальних пологів, при оформленні історії пологів, акушеркою була зафіксована фізіологічна крововтрата. Який відсоток крововтрати відносно маси тіла породіллі

враховувався?

- a. 0,1%
- b. 1,5%
- c. 2,0%
- d. 0,5%**
- e. 1,0%

356. Першовагітна 20-ти років з інтенсивною родовою діяльністю. Скарги на головний біль, порушення зору, загальмованість. АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки ніг, передньої черевної стінки. Голова плода в порожнині малого тазу. Серцебиття плода ясне, ритмічне 180/хв. Відкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологів?

- a. Накладання акушерських щипців**
- b. Плродоруйнівна операція
- c. Консервативне ведення пологів з епізіотомією
- d. Стимуляція пологової діяльності
- e. Кесарів розтин

357. Жінка 29-ти років звернулась до жіночої консультації з приводу взяття на облік по вагітності. Під час піхвового дослідження проведено вимірювання діагональної кон'югати, яка дорівнює 12,5 см. Яке вимірювання необхідне для більш точного визначення акушерської кон'югати?

- a. Кон'югати Цангемейстера
- b. Кон'югати Кернера
- c. Кон'югати Белодока
- d. Індексу Соловйова**
- e. Ромбу Міхаеліса

358. Роділля з активною пологовою діяльністю. Відійшли прозорі навколоплідні води. Серцебиття плода стало приглушеним, 100/хв., аритмічне. Розкриття шийки матки на 4 см, плідного міхура немає. Передлежить голівка над входом в малий таз, попереду голівки визначається пульсуюча петля пуповини. Яка подальша тактика пологів?

- a. Пологостимуляція
- b. Плродоруйнівна операція
- c. Акушерські щипці
- d. Шкірно-головні щипці Уїлл-Іванова
- e. Кесарів розтин**

359. Після огляду посліду акушерка визначила, що у часточках плаценти багато петрифікатів і некротизованих ділянок. Маса посліду на 200 г більше ніж нормальна. Про що це свідчить?

- a. Екстрагенітальна патологія
- b. Недоношена вагітність
- c. Переношена вагітність**
- d. Нормальна вагітність
- e. Багатоплідна вагітність

360. Породілля 35-ти років на 12-ту добу після пологів. Пологи ускладнились безводним проміжком у 17 годин. Скаржиться на біль внизу живота, здуття живота, підвищення температури тіла до 39,5°C. При бімануальному дослідженні матку та придатки пальпувати не вдається через болючість. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний, зниження перистальтики. В крові - лейкоцитоз із різким зсувом формули вліво та збільшення ШОЕ. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Сальпінгоофорит
- b. Параметрит
- c. Метротромбофлебіт
- d. Перитоніт**
- e. Метроендометрит

361. Вагітній в терміні 39 тижнів проведено зовнішнє акушерське дослідження: в дні матки

промацується щільна округла частина з виразними контурами, легко балотує. Ліворуч, на боковій поверхні матки, промацується частина плода у вигляді рівномірної площини, праворуч невеликі виступи. Над входом у таз визначається велика, м'яка, округлої форми передлегла частина, не балотує. Визначити розташування плода:

- a. Положення косе, II позиція, передлежання головне
- b. Положення поздовжнє, I позиція, передлежання тазове**
- c. Положення поздовжнє, I позиція, передлежання головне
- d. Положення поздовжнє, II позиція, передлежання головне
- e. Положення поздовжнє, II позиція, передлежання тазове

362. Хвора скаржиться на біль у поперековій ділянці зліва, часте болісне сечовипускання, підвищення температури до 39°C. Захворіла раптово, після переохолодження. Живіт м'який, болючий в лівій половині. Симптом Пастернацького позитивний зліва. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий пієлонефрит**
- b. Сечокам'яна хвороба
- c. Гострий коліт
- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Гострий панкреатит

363. У хворого, який страждає на виразкову хворобу шлунка, з'явилися kindжальний біль у верхній половині живота, різка слабкість. Стан хворого середньої тяжкості, ноги притягнуті до живота. Шкіра і видимі слизові бліді, вологі. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт напружений, не бере участі у диханні, різко болючий у верхній половині. Яке ускладнення виникло?

- a. Шлункова кровотеча
- b. Кровотеча з вен стравоходу
- c. Кровотеча з гемороїдальних вен
- d. Перфорація шлунка**
- e. Пенетрація шлунка

364. Хвора скаржиться на високу температуру, біль в грудній клітці праворуч, кашель із "іржавим" харкотинням. При вислуховуванні легень на бокових поверхнях праворуч визначається бронхіальне дихання, при перкусії – різко притулений звук. На рентгенограмі легенів - ознаки плевропневмонії. Її турбує наявність болю у грудній клітці. Чим зумовлений біль у грудній клітці?

- a. Обструкцією бронхіального дерева
- b. Підвищенням тиску в малому колі кровообігу під час кашлю
- c. -
- d. Ураженням плеври**
- e. Ураженням альвеол

365. Народилля, 35 років, народила хлопчика масою 4300 г. Послід відокремився і виділився самостійно, при огляді - його дефектів не знайдено. Крововтрата 330 мл, продовжується. При зовнішньому масажі матки, вона дещо скорочується і знову розслабляється. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Розрив матки
- b. Розрив промежини
- c. Тетанія матки
- d. Гіпотонія матки**
- e. Атонія матки

366. Роділля 32-х років через 10 годин від початку пологової діяльності народила доношену дівчинку масою 3400 г. Через 7 хвилин після народження дитини крововтрата становить 150 мл і продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера, Чукалова та Шредера позитивні. В чому полягає подальша акушерська тактика?

- a. Зовнішній масаж матки

b. Контрольована тракція за пуповину

- c. Ручне відокремлення і видалення посліду
- d. Спостереження за роділлем
- e. Огляд пологових шляхів у дзеркалах

367. У хворой 30-ти років зі скаргами на гнійні виділення із статевих шляхів, при гінекологічному дослідженні виявлена гіперемія та набряк слизової оболонки піхви з великою кількістю гнійного нальоту на стінках. Який додатковий метод дослідження допоможе уточнити діагноз?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. Гістологічне дослідження
- c. Онкоцитологічне дослідження

d. Бактеріологічне дослідження

- e. Кольпоцитологічне дослідження

368. Жінка 23-х років доставлена у клініку із гострим болем внизу живота, що іррадіює у пряму кишку, температура 40°C. Остання менструація 6 днів тому. Р.В.: матка не змінена, дещо болісна при змищенні, зліва придатки без особливостей, справа визначається ретортоподібне утворення, болісне при змищенні, розміром 9х4 см, що флюктує. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Піосальпінкс

- b. Гострий апендицит
- c. Перекрут ніжки пухлини
- d. Трубна вагітність
- e. Апоплексія яєчника

369. В гінекологічне відділення поступила вагітна, 10 тижнів вагітності, скарги на переймоподібні болі внизу живота, з іррадіацією в крижі, поперек, значну кровотечу. При вагінальному дослідженні в ділянці зовнішнього вічка визначається нижній полюс плодового яйця. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Неповний аборт
- b. Шийкова вагітність
- c. Аборт, що розпочався
- d. Загрозливий аборт

e. Аборт у ходу

370. У вагітної жінки протягом доби виникають багаторазові судомні напади один за одним. Свідомість пацієнтки між нападами не відновлюється. Про який діагноз можна думати?

- a. Епілептичний напад
- b. Малий епілептичний напад
- c. Епілепсія Джексона

d. Епілептичний стан

- e. Істеричний напад

371. У пацієнта 54-х років після отримання неприємного повідомлення, з'явився стискаючий біль за грудиною, з іррадіацією в ліве плече, лопатку. Біль триває 5 хвилин. Вкажіть препарат, з якого в першу чергу надають невідкладну допомогу?

- a. Фуросемід
- b. Но-шпа

c. Нітрогліцерин

- d. Аспірин
- e. Гепарин

372. Хворий 47-ми років звернувся зі скаргами на збільшення живота в розмірах, загальну слабкість, нудоту, нестійкі випорожнення. Хворіє протягом 2-х років. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові жовтяничні, на шкірі обличчя та спини "судинні зірочки", живіт значно збільшений в розмірах, навколо пупка венозна сітка у вигляді "медузи". Прояве захворювання можна подумати?

- a. Хронічний холецистит
- b. Жовчнокам'яна хвороба
- c. Хронічний гепатит
- d. Хронічний панкреатит

e. Цироз печінки

373. У пацієнта з'явилися розлади випорожнень, кал рідкий, слизово-кров'янистий, що супроводжується болем по ходу прямої кишки під час дефекації. Для якого захворювання це характерно?

a. Харчова токсикоінфекція

b. Шигельоз

- c. Ботулізм
- d. Сальмонельоз
- e. Черевний тиф

374. Машина швидкої допомоги доставила пацієнта в приймальне відділення лікарні з вулиці. Анамнез невідомий. Об'єктивно: шкірні покриви багрового кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ- 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запідозрити?

a. Істеричний напад

b. Геморагічний інсульт

- c. Ішемічний інсульт
- d. Менінгіт
- e. Епілептичний напад

375. У пацієнта скарги на біль в суглобах, м'язах. Два дні тому з'явилися жовтяниця, відчуття тяжкості у правому підребер'ї. Об'єктивно: суглоби без зовнішніх змін, збільшена печінка, іктеричність склер і жовтяниця шкіри, темно-бурого кольору сеча. З епіданамнезу відомо, що 2 місяці тому перенесла операцію. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Лептоспіроз

b. Вірусний гепатит В

- c. Вірусний гепатит А
- d. ВІЛ-інфекція
- e. Бруцельоз

376. Пацієнтці з підозрою на туберкульоз, лікар призначив дослідження харкотиння на мікобактерії. Вкажіть, протягом якого часу необхідно збирати харкотиння:

- a. 10 діб
- b. За 3 години
- c. Одноразово вранці

d. 1-3 доби

e. Будь-який час

377. До приймального відділення доставлено пацієнта з блюванням у вигляді "кавової гущі". Хворого необхідно транспортувати у відділення:

- a. Пішки самостійно
- b. Пішки у супроводі медсестри
- c. Сидячи на кріслі-каталці
- d. Сидячи на стільці, ліфтом

e. Лежачи на каталці-ношах

378. Які дезінфікуючі розчини використовують для вологого прибирання у пологових будинках?

- a. 0,5% розчин хлорного вапна
- b. 1% розчин хлораміну
- c. 0,15% розчин хлораміну
- d. 6% розчин перекису водню з 0,5% розчином мийного засобу**
- e. 10% розчин хлорного вапна

379. Вагітна 25-ти років, 35 тижнів вагітності, госпіталізована в пологовий будинок. Об'єктивно: непритомний стан, АТ190/120 мм рт.ст. Генералізовані набряки. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Печінкова кома
- b. Діабетична кома
- c. Еклампсія**
- d. Гостра ниркова недостатність
- e. Епілепсія

380. Діагноз асфіксії новонароджених середнього ступеня може бути встановленим, якщо оцінка новонародженого за шкалою Апгар становить:

- a. 5-6 балів**
- b. 0 балів
- c. 2-3 бали
- d. 1-2 бали
- e. 9-10 балів

381. Пацієнтка через дві доби після проведеної операції скаржиться на біль в животі, здуття, невідходження газів. Яке втручання необхідно здійснити на даному етапі?

- a. Ввести спазмолітики
- b. Ввести знеболюючі
- c. Прикласти грілку
- d. Ввести газовідвідну трубку**
- e. Покласти міхур з льодом на живіт

382. Акушерка при огляді вагітної виявила набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці. АТ- 170/100 мм рт.ст. Протеїнурія 1 г/добу. Для якого ускладнення вагітності характерні дані ознаки?

- a. Прееклампсія середньої тяжкості**
- b. Легка прееклампсія
- c. Еклампсія
- d. Тяжка прееклампсія
- e. Набряки вагітних

383. У пацієнтки 19-ти років при проведенні огляду виявлено правому кутику рота на гіперемованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Простий лишай
- b. Кандидозний стоматит
- c. Мікробна екзема
- d. Простий герпес
- e. Стрептококова заїда**

384. У роділлі з вузьким тазом виникла загроза розриву матки. Оберіть правильну тактику ведення пологів:

- a. Стимуляція пологової діяльності
- b. Епізіотомія
- c. Акушерські щипці
- d. Кесарів розтин
- e. Зняти пологову діяльність**

385. Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні матки розміщена крупна, щільна, балотуюча частина плоду. Третім прийомом над входом в малий таз визначається частина плоду м'якуватої консистенції, не здатна до балотування. Яке положення плоду діагностовано?

- a. Головне
- b. Косе
- c. Тазове
- d. Поперечне

е. Поздовжнє

386. Повторновагітна у терміні 36 тижнів скаржиться на неприємні відчуття у животі та попереку задишку, серцебиття. Ці симптоми з'явилися 3-4 дні тому і поступово посилюються. При об'єктивному обстеженні дно матки під мечоподібним відростком, ОЖ- 120 см, матка під час пальпації напружена, тугоеластичної консистенції, визначається флюктуація. Положення плода нестійке, серцебиття прослухати важко, приглушене. Який попередній діагноз?

- a. Хронічне багатоводдя
- b. Хоріонепітеліома
- c. Багатоплідна вагітність

d. Гостре багатоводдя

- e. Міхурцевий занесок

387. Першовагітна 34-х років у терміні вагітності 36-37 тижнів. Скаржиться на головний біль у потилиці стискаючого характеру, відчуття закладеності носу та утруднення носового дихання. Зранку з'явилися болісні відчуття в ділянці шлунку, нудота. АТ- 170/100, 180/110 мм рт.ст., набряки гомілок. Яку першу невідкладну допомогу слід надати вагітній?

- a. Введення розчину но-шпи 2% - 2 мл
- b. Введення розчину лазіксу 40 мг
- c. Введення розчину сульфату магнію 25% - 16 мл**
- d. Введення розчину димедролу 1% - 1 мл
- e. Введення розчину анальгіну 50% - 2 мл

388. Якою повинна бути температура повітря у палатах пологового відділення для породіль?

- a. 30 ? 32°C
- b. 21 ? 22°C**
- c. 16 ? 18°C
- d. 14 ? 16°C
- e. 27 ? 29°C

389. До акушерки ФАПу звернулася жінка 28-ми років із скаргами на висипку і печіння в ділянці кистей рук, які з'явилися після необережної роботи з кислотами. Об'єктивно: шкіра обох кистей рук червона, набрякла, в осередку ураження наявні папули, везикули. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пухирчатка
- b. Простий контактний дерматит**
- c. Екзема
- d. Червоний плоский лишай
- e. Короста

390. У роділлі, яка поступила в стаціонар із нормальною пологовою діяльністю, в кінці першого періоду пологів перейми уповільнились, тривають по 25-30 сек через кожні 4-5 хвилин. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Дискоординована пологова діяльність
- b. Бурхлива пологова діяльність
- c. Дистоція шийки матки
- d. Вторинна слабкість пологової діяльності**
- e. Первинна слабкість пологової діяльності

391. Дитина 5-ти днів виписана з пологового будинку у задовільному стані. Оглянутий дільничим лікарем. Коли акушерка ФАПу повинна здійснити патронаж до цієї дитини?

- a. Через три дні після виписки з пологового будинку
- b. В день відвідування лікарем
- c. Через день після відвідування лікарем**
- d. На другому тижні життя
- e. У кінці першого місяця

392. Акушерка госпіталізує вагітну до відділення патології. Яку облікову документацію(форму)

вона має оформити?

- a. №025о
- b. №096о**
- c. №111о
- d. №097о
- e. №113о

393. Акушерка пологового відділення у 3му періоді пологів визначила позитивні ознаки відокремлення плаценти. Послід не виділився, почалася кровотеча. Яка тактика акушерки?

- a. Застосувати метод Абуладзе або Креде-Лазаревича**
- b. Провести зовнішній масаж матки
- c. Холод на низ живота
- d. Провести ручне дослідження матки
- e. Ввести утеротонічні засоби

394. На прийом звернулася пацієнтка зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів, переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: вагітність 10-11 тижнів, загроза самовільного викидня. До якого лікарського втручання слід підготувати пацієнтку?

- a. Лапароскопія
- b. Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і цервікального каналу
- c. Ушивання цервікального каналу шийки матки
- d. Зондування порожнини матки
- e. Видалення плідного яйця з порожнини матки**

395. Акушерка до проведення огляду вагітної жінки проводить обробку рук. З метоюпрофілактики передачі інфекції необхідно мити руки не менше:

- a. 4хв
- b. 2хв
- c. 1хв
- d. 30 сек**
- e. 3хв

396. До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на безплідність. В анамнезі гонорейний сальпінгіт. Під час обстеження виявлено непрохідність маткових труб. За допомогою якого методу діагностики можна з'ясувати збереження функції яєчників?

- a. Гідротубація
- b. Гістеросальпінгографія
- c. Тести функціональної діагностики**
- d. Пертубація
- e. Кольпоскопія

397. Пацієнт скаржиться на періодичний сезонний біль у епігастральній ділянці, який виникає через 15-60 хвилин після вживання їжі. При якому захворюванні біль має такий характер?

- a. Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки
- b. Жовчнокам'яна хвороба
- c. Хронічний гепатит
- d. Виразкова хвороба шлунка**
- e. Дискінезія жовчовивідних шляхів

398. На ФАП поступив пацієнт із скаргами на біль у животі знизу зліва, часті випорожнення (7-8 разів на добу) з домішками слизу та крові. Об'єктивно: сигмоподібна кишка пальпується у вигляді болісного тяжа, напружена. Яке захворювання можна запідозрити в даному випадку?

- a. Вірусний гепатит
- b. Холера
- c. Ботулізм
- d. Сальмонельоз
- e. Шигельоз**

399. Акушерка оглянула доношену дитину 12-ти днів. Її фізичний розвиток вона оцінила як відповідний до віку. Яка маса тіла дитини стала підставою для цього висновку?

a. Дорівнює масі при народженні

- b. Збільшення маси на 150,0 г
- c. Втрата 150,0 г маси
- d. Збільшення маси на 200,0 г
- e. Втрата 200,0 г маси

400. Дитині 3 місяці. Маса тіла 5400 г. Яку добову кількість молока вона має отримувати?

a. 800 г

b. 900 г

- c. 500 г
- d. 400 г
- e. 600 г

401. В ранньому післяпологовому періоді акушерка проводить огляд новонародженого.

Вкажіть основні ознаки зрілості дитини:

- a. Термін вагітності не менше 37 тижнів
- b. Вага не менше 3500 г, зріст не менше 52 см
- c. Яскраво-червона шкіра

d. Вага не менше 2500 г, зріст не менше 47 см

e. Довгі нігті, волосся

402. 7-річний хлопчик був неуважний у класі. Вчитель звернув увагу на періодично відсутній погляд дитини і прицмокування губами. Падіння і судом не відмічалось. Під час короткої "відсутності" не відкликався на своє ім'я. Визначте тип нападу:

- a. Генералізований тоніко-клонічний
- b. Епістатус
- c. Джексонівський

d. Малий епілептичний

e. Парціальний

403. Пацієнтка 40-ка років скаржиться на зниження пам'яті та працездатності, сонливість, випадіння волосся. Об'єктивно: сповільнена мова, голос низький, хриплий. Температура тіла- 35,1°C. Набряки локалізовані на обличчі, шиї. Риси обличчя грубі, набряклі повіки, звужені очні щілини, товсті ніс та губи. Рс- 60/хв., АТ100/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені. Яке захворювання виникло у пацієнтки?

- a. Ендемічний зоб
- b. Тиреотоксикоз

c. Гіпотиреоз

- d. Гломерулонефрит
- e. Набряк Квінке

404. Пацієнтка 56-ти років скаржиться на відчуття важкості в нижніх кінцівках, м'язову слабкість, втому наприкінці дня в нижніх кінцівках, судом в литкових м'язах, які виникають після тривалого фізичного навантаження та косметичний дефект шкіри в ділянці литок. Для якого захворювання характерні вищезазначені скарги?

- a. Хвороба Рейно
- b. Облітеруючий атеросклероз
- c. Флеботромбоз вен нижніх кінцівок
- d. Облітеруючий ендартеріт нижніх кінцівок

e. Варикозна хвороба нижніх кінцівок

405. У хворої 60-ти років два місяці тому в ділянці лівої молочної залози з'явилась виразка з сірим дном. Шкіра навколо неї набрякла, дещо гіперемована. Навколо пальпується щільний, безболісний інфільтрат. Пахвові лімфовузли зліва збільшені. Який попередній діагноз?

- a. Трофічна виразка молочної залози і пахвовий лімфаденіт
- b. Туберкульоз шкіри молочної залози і пахвовий лімфаденіт

с. Карбункул молочної залози і пахвовий лімфаденіт

d. Злоякісне новоутворення молочної залози

е. Первинний сифіліс

406. Акушерка пологового відділення надає допомогу при пологах. У роділлі через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

a. Застосувати зовнішній прийом за Креде-Лазаревичем

b. Провести ручне відокремлення посліду

с. Ввести в/в 1 мл окситоцину

d. Запропонувати роділлі потужитись

е. Застосувати зовнішній прийом за Гентером

407. У дитини віком 7 місяців підвищилась температура тіла до 39°C, двічі було блювання та тричі рідкі випорожнення зеленувато-сірого кольору з великою кількістю слизу. Об'єктивно: стан дитини тяжкий. Шкіра суха бліда. Велике тім'ячко запале. Живіт здутий, болючий при пальпації. Для якої кишкової інфекції характерні дані симптоми?

a. Ешерихіоз

b. Шигельоз

с. Сальмонельоз

d. Поліомієліт

е. Черевний тиф

408. У породіллі фізіологічний перебіг післяпологового періоду, друга доба. Виберіть характеристику лохій, що спостерігатимуться в даній ситуації:

a. Серозні, каламутні, незначні

b. Кров'янисті, в помірній кількості

с. Серозно-кров'янисті, незначні

d. Кров'янисто-серозні, незначні

е. Серозні, світлі, помірні

409. Акушерці доручено терміново доставити кров з пологового будинку до лабораторії, яка розташована за межами установи. У якій упаковці необхідно транспортувати даний біологічний матеріал?

a. У контейнері

b. У дерев'яному ящику

с. У паперовій обгортці

d. У поліетиленовому пакеті

е. У картонній коробці

410. На плановий огляд в жіночу консультацію звернулась вагітна 29-ти років. Вагітність II, 30 тижнів. Після зважування встановили надмірну прибавку маси тіла. АТ- 150/90 мм рт.ст. Яке дослідження слід обов'язково призначити вагітній?

a. Аналіз сечі на білок

b. Загальний аналіз крові

с. УЗД

d. Біохімічний аналіз крові

е. Загальний аналіз сечі

411. У новонародженої дитини діагностовано гемолітична хвороба за резусфактором. Група крові дитини В (III), матері А (II). Яку донорську кров необхідно приготувати для замінного переливання крові?

a. В (III) Rh?

b. О (I) Rh?

с. В (III) Rh+

d. А (II) Rh+

е. А (II) Rh?

412. Під час гемотрансфузії у породіллі виник гемотрансфузійний шок. Яку процедуру треба виконати акушерці пологового відділення для проведення контролю за функціями?

a. Зробити загальний аналіз крові

b. Ввести сечовий катетер

c. Виміряти центральний венозний тиск

d. Виміряти артеріальний тиск

e. Зробити очисну клізму

413. Який препарат вибере акушерка для обробки залишку пуповини за умови відсутності контакту "шкіра до шкіри":

a. 30% р-н сульфацилу натрію

b. 3% р-н перекису водню

c. 1% р-н діамантового зеленого

d. 0,9% р-н натріюхлориду

e. 5% р-н глюкози

414. Акушерка виявила у новонародженої дитини синюшність шкіри невдовзі після народження, яка посилюється під час смоктання грудей. Який попередній діагноз?

a. Попрілості

b. Гіпотрофія

c. Рахіт

d. Набута вада серця

e. Вроджена вада серця

415. До акушерки ФАПу звернулась мати дитини 7-ми років, яка хворіє на скарлатину, з питанням: коли її дитина зможе відвідувати школу?

a. Через 30 днів від початку появи кашлю

b. Через 10 днів від початку появи висипань

c. Через 9 днів від початку захворювання

d. Через 5 днів з моменту появи останніх висипань

e. Через 22 дні від початку захворювання

416. У пацієнтки з пневмонією, на фоні лікування антибіотиками розвинулась криза: температура тіла знизилась протягом 2-х годин з 40,3°C до 36,2°C. При цьому самопочуття погіршилось; пацієнтка зблідла, вкрилась холодним потом, скаржить на слабкість, потемніння в очах, АТ- 70/40 мм рт.ст., Ps- 100/хв., ниткоподібний. Яке ускладнення найбільш імовірно в даному випадку?

a. -

b. Колапс

c. Кардіогенний шок

d. Непритомність

e. Гостра серцева недостатність

417. Випускниця медичного коледжу прийшла влаштовуватись на роботу в пологовий будинок. Який медичний огляд вона проходить відповідно до Положення про проведення медичних оглядів?

a. Позаплановий

b. Цільовий

c. Поточний

d. Періодичний

e. Попередній

418. Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки медичним працівникам за відпрацьований робочий рік становить таку кількість календарних днів:

a. 35

b. 42

c. 50

d. 24

419. У жінки, яка знаходиться на обліку в ЖК з приводу кисті яєчника після різкого руху з'явився кинжальний біль внизу живота, нудота. Жінка бліда, живіт здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Який попередній діагноз?

а. Збільшення кисті

б. Розрив кисті

с. Зменшення кисті

д. Малігнізація кисті

е. Зворотній розвиток кисті

420. Хворий 45-ти років поступив у реанімаційне відділення зі скаргами на біль у горлі, утруднене ковтання, сіпання м'язів у рані. Об'єктивно: підвищений тонус м'язів і сухожильних рефлексів. Через 6 годин з'явився тризм, сардонічна посмішка, опістотонус. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Гостра правошлуночкова недостатність

б. Повець

с. Бронхіальна астма

д. Стороннє тіло у трахеї

е. Дифтерія

421. Пацієнт 60-ти років звернувся зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, періодично - біль і домішки крові під час дефекації. При пальцевому дослідженні прямої кишки виявлено три варикозні вузли, які розміщені біля задньопрохідного отвору. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

а. Рак прямої кишки

б. Гострий парапроктит

с. Поліпи прямої кишки

д. Геморой

е. Тріщина заднього проходу

422. Вагітній, яка страждає на хронічний гломерулонефрит, призначено дієту №7. Які рекомендації повинна дати акушерка?

а. Калорійність дієти повинна становити 3600-4000 ккал

б. Збільшити споживання рідини до 2 л на добу

с. Виключити прості вуглеводи з раціону

д. Обмеження кухонної солі до 5-6 г на добу

е. Слизові супи на перші страви

423. До акушерки ФАПу звернулася жінка 35-ти років зі скаргами на болючі менструації та біль під час статевого акту. В анамнезі - хронічний аднексит. При бімануальному дослідженні: матка відхилена до крижів, спроба вивести матку в середнє положення - невдала, викликає біль. Назвіть патологію:

а. Фіксована антефлексія матки

б. Хронічний аднексит

с. Фіксована ретрофлексія матки

д. Антеверзію, антефлексію

е. Антеверзію, ретрофлексію

424. Акушерку пологового відділення викликала пацієнтка, в якій виникло блювання "кавовоюгущею". З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу. Який лікарський препарат за призначенням лікаря застосує акушерка для надання невідкладної допомоги?

а. Но-шпа

б. Кетанов

с. Етамзілат натрію

д. Мезатон

е. Фізіологічний розчин

425. Дитина 5-ти років лікується з приводу ГРВІ 5 днів, але інтенсивність кашлю наростає до нападоподібного, особливо вночі. Яке захворювання можна запідозрити?

a. Кашлюк, початковий період

- b. Кір, катаральний період
- c. Обструктивний бронхіт
- d. Плеврит
- e. Гострий ларинготрахеїт

426. У пацієнта під час їжі раптово виник сильний кашель, ядуха; наростає ціаноз. Був виконаний прийом Геймліха, але через 3 хвилини чоловік знепритомнів, розвинулись судоми. Які наступні заходи потрібно провести?

- a. Трахеостомія
- b. Доступ свіжого повітря
- c. Масаж грудної клітки

d. Конікотомія

- e. Інтубація трахеї

427. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 50-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, іноді біль і виділення крові під час акту дефекації. Який попередній діагноз?

- a. Тріщина заднього проходу
- b. Гострий парапроктит
- c. Поліпи прямої кишки

d. Геморой

- e. Рак прямої кишки

428. У жінки через 30 хвилин після вживання шоколаду на шкірі з'явилась висипка розміром, як просіяні зерна, свербіж, підвищення температури до 38°C, головний біль, нездужання. Для якої хвороби характерні такі ознаки?

- a. Дерматит
- b. Набряк Квінке

c. Кропив'янка

- d. Анафілактичний шок
- e. Піодермія

429. Важкохворій породіллі необхідно здійснювати профілактику пролежнів (для покращення кровообігу). Який лікарський засіб потрібно використати?

- a. Розчин фурациліну

b. Камфорний спирт

- c. 1% розчин каліюперманганату
- d. 5% розчин йоду
- e. 3% розчин перексиду водню

430. До акушерки ФАПу звернулася жінка зі скаргами на виділення із статевих шляхів сіруватого кольору з неприємним рибним запахом, що посилюється після статевого акту, локальний дискомфорт, свербіння та печіння в ділянці вульви. При огляді статевих органів ознаки запалення відсутні. Який додатковий метод дослідження доцільно провести для підтвердження діагнозу?

- a. Біопсія шийки матки

b. Тест на наявність "ключових" клітин

- c. Мазок з піхви на ступінь чистоти
- d. Бактеріальний посів піхвових виділень
- e. Тести функціональної діагностики

431. Під час огляду жінки 40-ка років акушерка ФАПу виявила, що тіло матки щільної консистенції, горbeste, збільшене в розмірах до 7-8 тижнів вагітності, рухоме при зміщенні, чутливе. Додатки без патологічних змін. Параметрії вільні. Жінка скаржиться на підвищену крововтрату під час менструацій, кровотечу, загальну слабкість. Шкірні покриви і видимі слизові бліді. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Кіста обох яєчників
- b. Дисфункціональна маткова кровотеча
- c. Гормонпродукуюча пухлина яєчника
- d. Симптомна міома матки**
- e. Рак ендометрію

432. Жінка звернулася до акушерки ФАПа зі скаргами на виділення з піхви кров'янистого характеру з маленькими міхурцями, нудоту, головний біль, порушення сну, апетиту. Вважає себе вагітною впродовж 12-ти тижнів. На обліку в жіночій консультації не стоїть. Який діагноз можна запідозрити?

- a. Рак ендометрію
- b. Загроза самовільного викидня
- c. Аборт в ході в 7-8 тижнів
- d. Дисфункціональна маткова кровотеча
- e. Міхуровий занесок**

433. На ФАП звернувся хворий зі скаргами на переймоподібний біль в животі, затримку відходження газів і калу, багаторазове блювання. Захворів раптово два дні тому. Об'єктивно: живіт здутий, асиметричний, болісний під час пальпації. Визначається позитивний симптом Валя і Ківуля. Який попередній діагноз?

- a. Непрохідність кишківника**
- b. Перфоративна виразка шлунка
- c. Пахвинна грижа
- d. Гострий апендицит
- e. Панкреатит

434. На прийом до акушерки ФАПу звернувся хворий зі скаргами на пухлиноподібне утворення в правій пахвинній ділянці, де при обстеженні виявлено еластичне випинання м'якої консистенції. При надуванні живота і кашлі випинання збільшується, а в горизонтальному положенні зникає. Який попередній діагноз?

- a. Пахвинна грижа**
- b. Гострий апендицит
- c. Гостра кишкова непрохідність
- d. Сечокам'яна хвороба
- e. Лімфаденіт пахвинних вузлів

435. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25-ти років, зі скаргами на висипи у ділянці шкіри тулуба, у вигляді невеликих плям неправильної форми діаметром від 0,5 до 2 см, блідо-рожевого кольору, які не підвищуються над рівнем шкіри, наявний супутній лімфаденіт. Позитивна RW. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Екзема
- b. Дерматит
- c. Первинний сифіліс
- d. Вторинний сифіліс**
- e. Пізній сифіліс

436. Хворий скаржиться на сильний оперізуючий біль у верхній половині живота, нудоту, невпинне блювання. Об'єктивно: стан важкий, Рс- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Язик сухий, живіт роздутий. Під час пальпації живіт напружений, болючий у верхніх відділах. На шкірі обличчя жовто-синюшно-багрянні плями. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий холецистит
- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки
- d. Гострий панкреатит**
- e. Гостра кишкова непрохідність

437. У 5-річної дитини важкий стан, шкіра бліда з крововиливами. Наявне системне ураження лімфатичних вузлів, збільшення печінки і селезінки. Скарги на біль у кістках і суглобах. У крові:

різна кількість незрілих клітин у лейкоцитарній формулі. Який попередній діагноз?

- a. Тромбоцитопенічна пурпура
- b. Колапс
- c. Анемія
- d. Гемофілія

e. Гострий лейкоз

438. У пацієнтки 46-ти років, яка страждає на артеріальну гіпертензію, виникла носова кровотеча. Яким розчином слід зволожити ватні кульки для її зупинки?

- a. 2% розчин натріюхлориду
- b. 3% розчин перекису водню**
- c. 0,2% розчин перманганату калію
- d. 0,2% розчин фурациліну
- e. 2% розчин натріюгідрокарбонату

439. Пацієнтка 65-ти років після вживання жирної та гострої їжі звернулась на ФАП зі скаргами на гострий біль в епігастральній та правій підреберній ділянках оперізуючого характеру, багаторазове блювання. Об'єктивно: Ps- 120/хв., АТ100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живіт під час пальпації болючий в епігастрії, відсутня пульсація черевної аорти. Який попередній діагноз?

- a. Загострення виразкової хвороби шлунка
- b. Гострий гастрит
- c. Гострий панкреатит**
- d. Гострий апендицит
- e. Гострий холецистит

440. Хвора 30-ти років скаржиться на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, підвищення температури тіла до 37,6°C. Об'єктивно: Ps- 96/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст. При пальпації живота визначається біль та напруження м'язів в правій здухвинній ділянці. Позитивні симптоми Воскресенського, Сітковського, Ровзінга. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Кишкова непрохідність
- b. Перфоративна виразка шлунка
- c. Гострий панкреатит
- d. Гострий холецистит

e. Гострий апендицит

441. Хвора 48-ми років скаржиться на загальну слабкість, різке схуднення, збільшення живота в об'ємі, болі внизу живота. Клініка виникла пізніше. Менструація не порушена, вагітностей не було. Живіт збільшений в розмірах. Вагінально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох боків від матки визначаються щільні, горбисті, нерухомі пухлини, які виповнюють порожнину малого таза. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Міома матки
- b. Рак тіла матки

c. Рак яєчників

- d. Кісти яєчників
- e. Кістоми яєчників

442. Хвора 15-ти років скаржиться на кров'янисті виділення зі статевих шляхів, які з'явилися після затримки чергової менструації на 3 місяці і тривають 12 днів. З анамнезу: хронічний тонзиліт. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, Ps82/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., Hb- 90 г/л, Ht28%. При гінекологічному дослідженні (per rectum): матка нормальних розмірів, щільна, безболісна, придатки не збільшені. Виділення кров'янисті, помірні. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Дисфункціональна маткова кровотеча ювенільного періоду

- b. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)
- c. Переривання вагітності
- d. Гранульозоклітинні пухлини яєчників
- e. Геморагічний васкуліт

443. Хвора 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на біль ниючого характеру, який виник гостро в здухвинній ділянці, з іррадіацією в пахову ділянку справа. Біль виник після переохолодження. Об'єктивно: під час пальпації біль в здухвинній ділянці справа. Підвищення температури тіла до 37,8°C. У крові: ШОЕ- 22 мм/год, лейкоцити- $9,3 \times 10^9$. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Правобічний деформуючий коксартроз
- b. Злоякісна пухлина товстої кишки
- c. Вегето-судинний криз
- d. Люмбаго

e. Загострення хронічного аднекситу

444. В ургентному порядку до стаціонару доставлена жінка 26-ти років зі скаргами на гострий біль у животі, непритомність. Із анамнезу: біль з'явився після статевого акту. Менструальний цикл не порушений, зараз 14-й день циклу. При огляді шкіра бліда, симптом Щоткіна позитивний, АТ90/60 мм рт.ст. При пункції черевної порожнини через заднє склепіння - яскрава кров. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Пельвіоперитоніт

b. Апоплексія яєчника

- c. Гострий сальпінгоофорит
- d. Гострий апендицит
- e. Тромбоз мезентеріальних судин

445. Хвора 34-х років надійшла до стаціонару в тяжкому стані зі скаргами на слабкість, затримку менструації на 3 тижні, серцебиття, холодний піт. На вулиці втрачала свідомість. Які методи діагностики можна використати для постановки діагнозу?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. Вишкрібання порожнини матки з гістологічним дослідженням зскрібку
- c. Лапароскопія

d. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

e. Клінічний аналіз крові, сечі, коагулограма

446. За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у вагітної кров на коагулограму. У градуйовану пробірку конусоподібної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Яку кількість крові необхідно набрати у пробірку?

- a. 2мл
- b. 5мл
- c. 7мл

d. 9мл

e. 3мл

447. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазку. З яких ділянок необхідно провести мазок?

a. Задня стінка глотки

b. Зів та ніс

- c. Носогорло
- d. З-під язика
- e. Зів

448. Хвора 37-ми років скаржиться на нездужання, зниження працездатності, підвищення температури тіла до 37,6°C, першіння в горлі, кашель з виділенням слизистого харкотиння, які з'явилися через 4 дні після перенесеної ГРВІ. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Перкуторно - легеневий звук, аускультативно - жорстке дихання, поодинокі сухі хрипи. Рентгенографія органів грудної клітки - без змін. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Гострий бронхіт

b. Негоспітальна пневмонія

- c. Бронхіальна астма
- d. Бронхоектатична хвороба
- e. Хронічний бронхіт

449. Хвора 38-ми років після переохолодження скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 39, 6°C, біль в грудній клітці зліва під час кашлю, кашель з виділенням іржавого харкотиння. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, герпетичний висип на губах, рум'янець на щоках, дихання поверхневе, 30/хв. Перкуторно - притуплення легеневого звуку нижче лівого кута лопатки, аускультативно - ослаблене везикулярне дихання, крепітація. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Негоспітальна пневмонія
- b. ГРВІ
- c. Бронхоектатична хвороба
- d. Хронічний бронхіт
- e. Гострий бронхіт

450. Під час огляду вагітної жінки 25-ти років у жіночій консультації увагу лікаря привернули скупчені вогнища міхурців на внутрішній поверхні стегна. Міхурці болючі, різного розміру з каламутним вмістом. Виникають неодноразово на одному і тому ж місці. Якому діагнозу відповідає зазначена клінічна картина?

- a. Оперізувальний герпес
- b. Трихомоніаз
- c. Хламідіоз
- d. Гонококова інфекція
- e. Сифіліс

451. Хворий 72-х років звернувся до поліклініки з приводу наявності крові в сечі. Під час опитування з'ясувалось, що у нього ніколи не було нападів ниркової коліки. Під час пальпації нирок визначається утворення в поперековій ділянці. Який метод дослідження першочерговий для з'ясування діагнозу?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. Загальний аналіз сечі
- c. Ректальне дослідження
- d. Комп'ютерна томографія
- e. Рентгенологічне дослідження

452. Хвору 38-ми років госпіталізовано в травматологічне відділення після дорожньо-транспортної пригоди з переломом та зміщенням шийних хребців. Який ви застосуєте метод витягнення?

- a. Петлею Гліссона
- b. Спіральною клемою
- c. Рамами Брауна
- d. Хребтове витягнення
- e. Лямками

453. У результаті падіння при аварії в мотоцикліста, поранення правої гомілки. Стогне від болю в нозі. Об'єктивно: стан середньої важкості. Виражена блідість шкірних покривів. Рс- 110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Свідомість не втрачав. У рані уламки, кровотеча незначна. Який ступінь шоку?

- a. I
- b. III
- c. IV
- d. II
- e. Ia

454. Вагітна звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік з приводу вагітності. Вагітність перша, 2 тижні як відчула ворухіння плоду. Скаржиться на спрагу, млявість, зниження апетиту. В анамнезі у батьків цукровий діабет. При обстеженні в аналізі сечі

знайдено цукор. Яку патологію можна запідозрити у вагітної?

- a. Анемія вагітних
- b. Панкреатит
- c. Пієлонефрит
- d. Цукровий діабет**
- e. Холецистит

455. В пологовий будинок доставлена вагітна 20-ти років в терміні 26 тижнів зі скаргами на різкий біль в правій поперековій ділянці, високу температуру тіла, періодичну лихоманку, часте сечовипускання. Симптом Пастернацького позитивний. У сечі: все поле зору вкрите лейкоцитами. Яку патологію слід запідозрити у вагітної?

- a. Гестоз
- b. Панкреатит
- c. Гострий правосторонній пієлонефрит**
- d. Апендицит
- e. Холецистит

456. Акушерка проводить заняття зі старшокласницями про репродуктивну функцію жінки. Що їй відповісти на запитання дівчинки про кількість фізіологічної крововтрати під час нормального менструального циклу?

- a. Крововтрата від 30 до 50 мл
- b. Крововтрата від 160 до 200 мл
- c. Крововтрата від 50 до 150 мл**
- d. Крововтрата від 150 до 200 мл
- e. Крововтрата від 180 до 200 мл

457. На прийом в жіночу консультацію прийшла дівчинка 10-ти років, вона цікавиться в якому віці у неї повинна з'явитися перша менструація?

- a. 8-10 років
- b. 18-20 років
- c. Після 20 років
- d. 12-15 років**
- e. 16-18 років

458. Вагітна скаржиться на задишку, різке збільшення живота. Строк вагітності 29 тижнів. Обвід живота 120 см. Висота стояння дна матки 38 см. Матка напружена, частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе, 140/хв. Про яке ускладнення йдеться?

- a. Аномалії розвитку плода
- b. Багатоводдя**
- c. Багатопліддя
- d. Гестоз вагітних
- e. Міхуровий занесок

459. До гінекологічного відділення поступила хвора зі скаргами на болі внизу живота, підвищення температури до 38°C, кров'янисто-гнійні виділення. Три дні тому зроблений штучний аборт. Об'єктивно: матка збільшена, болісна, м'якої консистенції. Шийка, придатки без змін. Про яке захворювання йдеться?

- a. Гонорея
- b. Параметрит
- c. Аднексит
- d. Неспецифічний ендометрит**
- e. Хламідіоз

460. До консультації звернулася жінка, 35ти років, зі скаргами на рясні та довгі менструації по 13-15 днів. Виявлено, що матка збільшена до 12-13 тижнів вагітності, щільна, безболісна, рухома, з вузлуватою поверхнею. Шийка та придатки не змінені. Про яке захворювання можна думати?

- a. Ендометрит

b. Кістома яєчника

c. Лейоміома (фіброміома) матки

d. Аднексит

e. Параметрит

461. У гінекологічному відділенні знаходиться хвора 50-ти років. Діагноз: рак шийки матки IV стадія. Почалася профузна кровотеча зі статевих шляхів. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 110/хв. Лікар на операції. Яку невідкладну допомогу слід надати?

a. Оксигенотерапія

b. Туга тампонада піхви

c. Ввести окситоцин

d. Ввести кровозамінники

e. Покласти міхур з льодом

462. До кабінету онкопрофогляду звернулась жінка 35-ти років. Скарг немає. Виявлено, що шийка матки, матка, придатки не змінені. Молочні залози та лімфатичні вузли без патології. Зроблено цитологічний скринінг. Які захворювання відносяться до передракових захворювань шийки матки?

a. Кольпіт

b. Ендометрит

c. Дисплазія

d. Аднексит

e. Бартолініт

463. У дівчинки 14-ти років при проведенні профогляду ФАПі при пальпації живота справа від матки виявлено рухоме, неболіuche утворення з чіткими контурами, діаметром близько 13 см. Скарг немає. Яку патологію слід запідозрити?

a. Апендицит

b. Кіста яєчника

c. Параметрит

d. Аднексит

e. Ендометрит

464. До гінекологічного відділення звернулася жінка зі скаргами на нерегулярні скудні менструації. Заміжня 3 роки. Вагітностей не було. Виявлено: гірсутизм, гіпоменорея, ановуляторний цикл. Яєчники з обох боків збільшені, щільні, горбисті, безболісні. У крові збільшений зміст андрогенів. Попередній діагноз: полікістоз яєчників. До якого додаткового дослідження ви повинні підготувати жінку?

a. Бактеріоскопічний метод

b. Зондування матки

c. УЗД

d. Бактеріологічний метод

e. Загальний аналіз крові

465. При проведенні патронажу до новонародженої дитини, акушерка відмітила серозні виділення з пупкової ранки. Шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Сепсис

b. Флегмонозний омфаліт

c. Катаральний омфаліт

d. Пупкова грижа

e. Попрілості

466. У дитини 2-х років на фоні ГРВІ, акушерка ФАПу відмітила неспокій, "гавкаючий" кашель, захриплість голосу, задишка, блідість шкіри. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

a. Гострий назофарингіт

b. Пневмонія

c. Тонзиліт

d. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

e. Обструктивний бронхіт

467. Пацієнтка 39-ти років знаходиться на лікуванні в гінекологічному відділенні з діагнозом: ендометрит. У неї з'явився біль в епігастрії, що виникає через 3-4 години після прийому їжі, турбують голодні нічні болі, нудота. Біль знімається прийомом їжі. Для встановлення діагнозу призначено проведення ФГДС. Яка підготовка пацієнтки до дослідження?

a. Дати проносне

b. Ввести газовідвідну трубку

c. Виконати очисну клізму ввечері та вранці

d. Виконати сифонну клізму

e. Попередити прийти натще, принести рушник

468. Акушерка відділення патології вагітності доглядає за жінкою 36-ти років, у якої виявили ознаки гострого панкреатиту. Яку необхідно провести лабораторну діагностичну процедуру для підтвердження діагнозу?

a. Аналіз крові загальний

b. Коагулограма

c. УЗД

d. Аналіз сечі загальний

e. Аналіз сечі на діастазу

469. Акушерку ФАПу вночі викликали до пацієнтки з бронхіальною астмою у якої виникли відчуття нестачі повітря, задишка. Об'єктивно: положення сидяче, опираючись руками на стілець. Вкажіть шлях введення 5 мл 2%розчину еуфіліну:

a. Підшкірно

b. Внутрішньошкірно

c. Внутрішньом'язово

d. Внутрішньоартеріально

e. Внутрішньовенно

470. У відділ кадрів жіночої консультації звернулася акушерка із заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів. Має двох дітей. До якого віку старшої дитини надається така відпустка?

a. 17 років

b. 16 років

c. 15 років

d. 18 років

e. 19 років

471. Роділля знаходиться у I періоді пологів. Передбачувана маса плода - 4500,0 г, перейми різко болючі, роділля занепокоєна, матка у вигляді "піщаного годинника". Яку патологію можна запідозрити?

a. Розрив матки, що відбувся

b. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

c. Передлежання плаценти

d. Загроза розриву матки

e. Розрив шийки матки

472. Роділля 40 тижнів, положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри таза: 27-28-31-17. Індекс Соловйова - 14 см. Діагональна кон'югата - 9,5 см. Яка форма кісткового таза?

a. Таз нормальних розмірів

b. Загальнорівномірнорозвужений

c. Поперечнозвужений

d. Простий плоский

e. Плоскорохітичний

473. Пацієнт 62-х років хворіє на хронічний бронхіт. Назвіть метод обстеження, що має особливе значення для визначення обструктивних порушень легеневої вентиляції:

- a. Рентгенологічне дослідження
- b. Аускультція легень
- c. Визначення бронхофонії
- d. Спірографічне дослідження**
- e. Бронхоскопія

474. Породілля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента відділилась самостійно, з усіма оболонками і часточками. Розрив м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслабляється, із статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

- a. Введення кровозамінників
- b. Зовнішній масаж матки**
- c. Міхур з льодом на низ живота
- d. Ручна ревізія порожнини матки
- e. Введення кровоспинних препаратів

475. На ФАПЗвернулась першороділля 20ти років зі скаргами на болючі перейми, які тривають протягом 3-х годин. При пальпації живота: нижній сегмент матки перерозтягнутий, болючий, голівка плода високо над входом в таз. Контракційне кільце розміщене косо. Розміри таза: 2225-27-16. Яку невідкладну допомогу повинна надати акушерка?

- a. Транспортувати роділля до найближчої лікарні
- b. Викликати акушерську бригаду
- c. Припинити пологову діяльність (токолітики, анальгетики)**
- d. Визначити групу крові, викликати донорів
- e. Розпочати інфузію кровозамінників

476. До пологового будинку поступила вагітна 27-ми років, вагітність 40 тижнів, головне передлежання, прееклампсія II ступеня. При проведенні зовнішнього акушерського обстеження акушерка запідозрила розгинальне (лобне) передлежання. Що вказує на лобне передлежання?

- a. Серцебиття плода вислуховується вище пупка
- b. Спинка плода обернена до лівого боку матки
- c. Голівка плода розташована на входом в малий таз
- d. Набряки нижніх кінцівок та передньої стінки живота
- e. Кут між спинкою та потиличною частиною голівки плода**

477. Першовагітна 20-ти років з інтенсивною пологовою діяльністю. Скарги на головний біль, порушення зору, загальмованість. АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки ніг, передньої черевної стінки. Голова плоду в порожнині малого таза. Серцебиття плоду ясне, ритмічне 180/хв. Відкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологів?

- a. Накладання акушерських щипців**
- b. Плродоруйнівна операція
- c. Консервативне ведення пологів з епізіотомією
- d. Стимуляція пологової діяльності
- e. Кесарів розтин

478. Породілля 35-ти років на 12-ту добу після пологів. Пологи ускладнились безводним проміжком у 17 годин. Скаржиться на біль внизу живота, здуття живота, підвищення температури тіла до 39,5°C. При бімануальному дослідженні матку та придатки пальпувати не вдається через болючість. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний, зниження перистальтики. В крові - лейкоцитоз із різким зсувом формули вліво та збільшення ШОЕ. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Перитоніт**
- b. Метроендометрит
- c. Метротромбофлебіт

- d. Параметрит
- e. Сальпінгоофорит

479. Пацієнтку 25-ти років турбують біль у ділянці серця, серцебиття, підвищення температури тіла, біль у колінних суглобах. В анамнезі часті ангіни. Тони серця приглушені, систолічний шум на верхівці серця, колінні суглоби болісні, припухлі, гарячі на дотик, функція їх порушена. За допомогою яких препаратів здійснюється етіотропна терапія даної пацієнтки?

- a. Глюкокортикостероїдні препарати
- b. Препарати, що покращують метаболічні процеси в міокарді

c. Антибіотики

- d. Нестероїдні протизапальні препарати
- e. Серцеві глікозиди

480. Жінка в терміні 16 тижнів вагітності захворіла 8 годин тому, коли відчула біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота. Було одноразове блювання. При пальпації різкий біль в правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:

- a. Кишкову непрохідність
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий холецистит
- d. Гострий гастрит

e. Гострий апендицит

481. Роділля 37-ми років доставлена в акушерський стаціонар із переймами, що почалися 10 годин тому. Перейми слабкі, нетривалі, кожні 15-17 хвилин. Серцебиття плода - 160/хв., ясне, ритмічне. Р.В.: шийка матки згладжена, розкриття 6 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яка аномалія пологової діяльності у роділлі?

- a. Надмірно сильна пологова діяльність
- b. Первинна слабкість пологової діяльності**
- c. Патологічний прелімінарний період
- d. Вторинна слабкість пологової діяльності
- e. Дискоординована пологова діяльність

482. Вагітна 27-ми років, у терміні вагітності 33 тижні, звернулась до жіночої консультації зі скаргами на спрагу і швидку втомлюваність. Вага жінки за тиждень збільшилась на 600 г. При проведенні проби Мак-Клюра-Олдріча папула розсмокталась за 30 хвилин. Про що свідчать виявлені зміни в організмі вагітної?

- a. Збільшення осмолярності плазми
- b. Гіповолемія

c. Підвищена гідрофільність тканин

- d. Гіперволемія
- e. Знижена гідрофільність тканин

483. Пацієнтка 31-го року звернулась до жіночої консультації зі скаргами на затримку менструації. Під час піхвового дослідження встановлено, що матка збільшена до розмірів голівки зрілого новонародженого, безболісна. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Вагітність 12 тижнів

- b. Вагітність 16 тижнів
- c. Вагітність 24 тижні
- d. Вагітність 20 тижнів
- e. Вагітність 8 тижнів

484. Вагітна 30-ти років має розміри таза: 26-28-30-20 см. Діагональна кон'югата дорівнює 12,5 см. Обвід променезап'ясткового суглоба 15 см. Визначте справжню (акушерську) кон'югату?

- a. 12 см
- b. 13 см
- c. 28 см
- d. 11 см**

е. 25 см

485. Роділля 32-х років через 10 годин від початку пологової діяльності народила доношену дівчинку масою 3400 г. Через 7 хвилин після народження дитини крововтрата становить 150 мл і продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера, Чукалова та Шредера позитивні. В чому полягає подальша акушерська тактика?

- а. Спостереження за роділлем
- б. Огляд пологових шляхів у дзеркалах
- в. Зовнішній масаж матки
- г. Контрольована тракція за пуповину**
- е. Ручне відокремлення і видалення посліду

486. Вагітна 25-ти років поступила у відділ Крок М Акушерська справа (україномовний варіант) 2017 рік 5 лення патології вагітних з вагітністю 30 тижнів зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, сонливість, втомлюваність. Хворіє хронічним гастритом і гепатохолециститом. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, Ps- 86/хв., ритмічний, слабого наповнення, АТ- 110/70 мм рт.ст., систолічний шум над верхівкою серця. У крові: Hb- 90 г/л. Що характеризує ступінь залізодефіцитної анемії?

- а. Загальна слабкість
- б. Гемоглобін крові**
- в. Колір шкіри і слизових оболонок
- г. Наявність захворювань шлунковокишкового тракту
- е. Запаморочення

487. Через 10 хвилин після народження плода народилася плацента з усіма часточками та оболонками. При огляді в дзеркалах виявлено глибокий розрив промежини до зовнішнього сфінктера заднього проходу, задньої стінки піхви. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Розрив промежини III ступеня
- б. Розрив промежини II ступеня**
- в. Розрив промежини I ступеня
- г. Розрив шийки матки
- е. Розрив стінки піхви

488. Термінові пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. В анамнезі у матері 3 аборти, останній із септичним ускладненням, тривалим лікуванням. Третій період пологів триває 30 хвилин. Ознаки відділення плаценти негативні. Кров'янисті виділення відсутні. Яка можлива патологія III періоду пологів?

- а. Справжнє прирощення плаценти**
- б. Кровотеча
- в. Повне прирощення плаценти
- г. Несправжнє прирощення плаценти
- е. Слабкість послідових перейм

489. У роділлі 30-ти років термінові пологи почалися 12 годин тому. Хворіла на скарлатину. Передбачувана маса плоду 2880 г. Останні 2 години перейми болючі, але сильні, регулярні, по 40 секунд, через 34 хвилини. Шийка матки згладжена, краї її товсті, щільні, не податливі, відкриття на 2 пальці. Голівка плоду великим сегментом у вході в малий таз. Яка головна причина можливого затяжного I періоду пологів?

- а. Вік 30 років
- б. Маса плоду
- в. Стояння голівки плоду
- г. Ригідність шийки матки**
- е. Перенесені інфекційні захворювання

490. Термінові пологи. Правильна тілобудова. Зріст 145 см, маса тіла 52 кг. ОЖ98 см, ВДМ- 80 см. Розміри таза: 22-25-27-17 см. Ознака Вастена негативна. Плідний міхур цілий. Шийка матки згладжена, розкрита на 3 поперечні пальці. Що найбільш імовірно свідчить про можливість пологів природнім шляхом?

a. Ознака Вастена негативна

- b. Розміри таза
- c. Передбачувана маса плода
- d. Цілий плідний міхур
- e. Першороділля, 22 років

491. При обстеженні на дому дитини 2,5 місяців акушерка звернула увагу на те, що дитина здригається при помірно сильних звуках, має підвищену пітливість, помірне облісіння волосної частини потилиці. Якому захворюванню відповідають ці ознаки?

a. Спазмофілія

b. Рахіт

- c. Обструктивний бронхіт
- d. Пневмонія
- e. Анемія

492. Пацієнтка 19-ти років звернулася зі скаргами на біль у поперековій ділянці справа, часте сечовиділення, підвищення температури тіла до 39,5°C. Захворіла гостро після купання в річці. Яке захворювання можна запідозрити у хворої?

a. Ниркова колька

b. Гострий пієлонефрит

- c. Гострий цистит
- d. Хронічний пієлонефрит
- e. Сечокам'яна хвороба

493. Машина швидкої допомоги доставила пацієнта в приймальне відділення лікарні з вулиці. Анамнез невідомий. Об'єктивно: шкірні покрови багрового кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ- 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Менінгіт
- b. Епілептичний напад
- c. Істеричний напад

d. Геморагічний інсульт

e. Ішемічний інсульт

494. Акушерка при огляді вагітної виявила набряки на нижніх кінцівках та передній черевній стінці. АТ- 170/100 мм рт.ст. Протеїнурія 1 г/добу. Для якого ускладнення вагітності характерні дані ознаки?

- a. Легка прееклампсія
- b. Набряки вагітних

c. Прееклампсія середньої тяжкості

- d. Тяжка прееклампсія
- e. Еклампсія

495. У пацієнтки 19-ти років при проведенні огляду виявлено в правому кутику рота на гіперемованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Простий герпес
- b. Мікробна екзема

c. Стрептококова заїда

- d. Простий лишай
- e. Кандидозний стоматит

496. Першим прийомом Леопольда визначено, що в дні матки розміщена крупна, щільна, балотуюча частина плоду. Третім прийомом над входом в малий таз визначається частина плоду м'якуватої консистенції, не здатна до балотування. Яке положення плоду діагностовано?

- a. Поперечне
- b. Тазове

c. Поздовжнє

- d. Головне
- e. Косе

497. У пологах відбувся розрив промежини з пошкодженням m. sphincter ani; стінка прямої кишки ціла. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Розрив промежини II ступеня
- b. Розрив промежини I ступеня
- c. Розрив промежини III ступеня, неповний**
- d. Розрив промежини III ступеня, повний
- e. Розрив промежини, самовільний

498. До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 7-ми років. Захворювання розпочалось 3 дні тому з болю в горлі, температура - 37,8-38,3°C, головний біль, з'явилась дрібноцяткова висипка, рясна, яскраво-червона, переважно в складках шкіри, блідий носогубний трикутник, язик обкладений білим нальотом. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Менінгококцемія
- b. Скарлатина**
- c. Кір
- d. Вітряна віспа
- e. Краснуха

499. До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 3-х років, яка захворіла 2 дні тому, температура - 37,8°C. На шкірі спини, сідниць плямисто-папульозна висипка, збільшені задньошийні та потиличні лімфатичні вузли. На яке захворювання вказують такі симптоми?

- a. Краснуха**
- b. Скарлатина
- c. Атопічний дерматит
- d. Вітряна віспа
- e. Кір

500. Дитина 13-ти років скаржиться на швидку стомлюваність, дратівливість, зміну почерку. Місяць тому перехворіла на ангіну. Об'єктивно: шкіра бліда, спостерігаються мимовільні скорочення м'язів обличчя, мигдалики гіпертрофовані. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Інфекційний ендокардит
- b. Мала хорєя**
- c. Ревматоїдний поліартрит
- d. Неревматичний кардит
- e. Системний червоний вовчак

501. У хворої після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворої важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії акушерки?

- a. Обколоти 0,1% адреналіном**
- b. Ввести 20% розчин кофеїну
- c. Ввести строфантин
- d. Покласти грілку
- e. Ввести еуфілін

502. До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на безплідність. В анамнезі гонорейний сальпінгіт. Під час обстеження виявлено непрохідність маткових труб. За допомогою якого методу діагностики можна з'ясувати збереження функції яєчників?

- a. Пертубація
- b. Кольпоскопія
- c. Гістеросальпінгографія
- d. Гідротубація
- e. Тести функціональної діагностики**

503. Чоловік 69-ти років готується до планової операції: трансуретральна резекція простати. В

анамнезі цукровий діабет. Оберіть вид анестезії, найбільш доцільний в даній ситуації:

- a. Нейролептаналгезія
- b. Атаралгезія
- c. Ендотрахеальний наркоз
- d. Спинномозкова анестезія**
- e. Внутрішньовенний наркоз

504. При прийомі на роботу акушерки у відділення патології вагітності проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Хто проводить даний інструктаж?

- a. Головна акушерка
- b. Завідувач відділенням**
- c. Головний лікар
- d. Інженер з охорони праці
- e. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи

505. Акушерку ФАПу викликали до пацієнтки 32-х років з цукровим діабетом I типу, в якій з'явилися нудота, блювання, біль в животі, сонливість. Об'єктивно: Рс125/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст., шкіра суха. Дихання Куссмауля. Язик сухий. Запах ацетону з рота. Який найімовірніший діагноз?

- a. Непритомність
- b. Гіперосмолярна кома
- c. Анафілактичний шок
- d. Гіпоглікемічна кома
- e. Кетоацидотична кома**

506. У роділлі 37-ми років з анасаркою та артеріальною гіпертензією під час перейм з'явилися тонічні судоми, виникло апное і втрата свідомості. Вкажіть головну мету надання невідкладної допомоги при нападі еклампсії:

- a. Провести штучну вентиляцію легень
- b. Забезпечити прохідність дихальних шляхів**
- c. Ліквідувати гіпертензію
- d. Ліквідувати набряки
- e. Здійснити корекцію метаболічних порушень

507. Роділля 21-го року поступила в пологове відділення у I періоді пологів. Вкажіть один із сучасних принципів ведення пологів відповідно до новітніх перинатальних технологій:

- a. Повна санітарна обробка роділлі
- b. Знеболювання пологів
- c. Контроль за станом роділлі
- d. Контроль за станом плода
- e. Партнерські пологи**

508. Роділля 19-ти років народила живу доношену дівчинку. Визначте інтервал часу, який необхідний для здійснення контакту "шкіра до шкіри" з метою колонізації новонародженої материнською мікрофлорою:

- a. 2 години**
- b. 30 хвилин
- c. 5 хвилин
- d. 15 хвилин
- e. 1 годину

509. Вагітна 28-ми років з приводу загрози переривання вагітності обстежується на TORCH-інфекцію. Виберіть шлях потрапляння патогенної мікрофлори при внутрішньоутробній інфекції плода:

- a. Трансплацентарний**
- b. Контактний
- c. Лімфогенний
- d. Аліментарний

е. Повітряно-крапельний

510. У роділлі при зовнішньому акушерському дослідженні над входом в малий таз визначається велика, м'яка, не здатна до балотування передлегла частина. Серцебиття плода краще вислуховується вище пупка. Назвіть передлежання плода:

а. Потиличне

б. Лобне

с. Лицьове

d. Тазове

е. Передньоголовне

511. Роділля 25-ти років народила живого доношеного хлопчика, масою 3600 г. Пройшло 15 хвилин послідового періоду. Ознак відокремлення посліду та кровотечі з пологових шляхів немає. Яка максимальна тривалість послідового періоду в цьому випадку?

а. 45 хвилин

б. 40 хвилин

с. 15 хвилин

д. 60 хвилин

е. 30 хвилин

512. Який документ, що одержує вагітна в жіночій консультації, забезпечує зв'язок жіночої консультації і пологового будинку?

а. Індивідуальна карта вагітної і породіллі

б. Журнал обліку вагітної

с. Контрольна карта диспансерного обстеження

d. Обмінна карта

е. Медична карта амбулаторного хворого

513. У акушерському відділенні знаходиться першороділля, 22-х років з нормальною пологовою діяльністю. Стан роділлі і плода задовільний. Положення плода поздовжнє. Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка розташована до лівого боку матки. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода:

а. Нижче пупка праворуч

б. На рівні пупка

с. Вище пупка ліворуч

д. Вище пупка праворуч

е. Нижче пупка ліворуч

514. У роділлі при внутрішньому акушерському дослідженні визначили повне розкриття шийки матки. Вкажіть, на скільки сантиметрів розкриття шийки матки вважається повним:

а. 8-9 см

б. 6-7 см

с. 10 см

д. 13-14 см

е. 15-16 см

515. В гінекологічне відділення госпіталізована вагітна в терміні 11-12 тижнів зі скаргами на тягнучий біль в нижніх відділах живота, кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Під час огляду у дзеркалах: частини плідного яйця у цервікальному каналі, кров'яністі виділення у великій кількості. До якої маніпуляції слід підготувати пацієнтку?

а. Взяття мазків на "гормональне дзеркало"

б. Кюретаж стінок порожнини матки

с. Зондування матки

д. Роздільне діагностичне вишкрібання матки

е. Накладання циркулярного шва на шийку матки

516. В пологове відділення госпіталізована вагітна в терміні 32-33 тижні. Скаржиться на біль внизу живота та попереку, який триває 2 години. Матка легко збудлива, тонус її підвищений.

Передлегла частина плода притиснута до входу в малий таз, шийка матки не змінена. Яка акушерська тактика?

a. Інтранатальна антибактеріальна терапія

b. Токолітична терапія

c. Призначення клізми та гоління лобка

d. Утеротоніки

e. Амніоскопія

517. Перейми слабкої сили, по 20-25 секунд, через кожні 5 хвилин. Діагностовано первинну слабкість пологової діяльності. Введення якого препарату слід розпочати з метою стимуляції пологової діяльності?

a. Гініпрал в/в крапельно

b. Гідралазин в/в повільно

c. Лабеталол в/в

d. Окситоцин в/в крапельно

e. Магнію сульфат в/в крапельно

518. Акушерка пологового відділення надає допомогу при пологах. У роділлі через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

a. Застосувати зовнішній прийом за Гентером

b. Застосувати зовнішній прийом за Креде-Лазаревичем

c. Запропонувати роділлі потужитись

d. Провести ручне відокремлення посліду

e. Ввести в/в 1 мл окситоцину

519. У дитини віком 7 місяців підвищилась температура тіла до 39°C, двічі було блювання та тричі рідкі випорожнення зеленувато-сірого кольору з великою кількістю слизу. Об'єктивно: стан дитини тяжкий. Шкіра суха бліда. Велике тім'ячко запале. Живіт здутий, болючий при пальпації. Для якої кишкової інфекції характерні дані симптоми?

a. Сальмонельоз

b. Ешерихіоз

c. Черевний тиф

d. Поліомієліт

e. Шигельоз

520. Після виконання ін'єкції акушерці необхідно провести дезінфекцію використаного інструментарію. Який розчин вона повинна застосувати для цього?

a. 0,2% дезактин

b. АХД 2000

c. Стериліум

d. 0,5% розчин хлорного вапна

e. 0,5% дезактин

521. У вагітної 22-х років спостерігається нездужання, температура - 39,6°C. Протягом 2-х годин виникло різке зниження температури до 35,8°C. Об'єктивно: пульс став ниткоподібним, відмічається загальна слабкість, значне потовиділення. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

a. Фебрильна температура

b. Критичне зниження температури

c. Збереження температури

d. Підвищення температури

e. Літичне зниження температури

522. У терапевтичному відділенні знаходиться хворий на бронхоектатичну хворобу. У хворого відділяється харкотиння у великій кількості. Яке положення йому необхідно надати для поліпшення виділення харкотиння?

a. Дренажне

b. Горизонтальне

- c. -
- d. Пасивне
- e. Вимушене

523. До акушерки ФАПу звернулася мати з дівчинкою п'яти років. Дитина висуває скарги на відчуття жару та нестачу повітря, запаморочення, шум у вухах. Об'єктивно: виражена блідість шкіри, холодний липкий піт на тілі. Дівчинку вжалила бджола. Який стан розвинувся у дитини?

- a. Набряк Квінке
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Анафілактичний шок**
- d. Гіпоглікемічна кома
- e. Ацетонемічний синдром

524. Під час гемотрансфузії у породіллі виник гемотрансфузійний шок. Яку процедуру треба виконати акушерці пологового відділення для проведення контролю за функцією нирок?

- a. Виміряти центральний венозний тиск
- b. Виміряти артеріальний тиск
- c. Ввести сечовий катетер**
- d. Зробити очисну клізму
- e. Зробити загальний аналіз крові

525. У пацієнтки під час складних пологів протягом 4 хвилин були відсутні дихання, пульс та АТ, зіниці не реагували на світло. Після проведення реанімаційних заходів вдалося відновити серцеву та дихальну діяльність, повернулася свідомість. Як називається цей стан?

- a. Кома
- b. Клінічна смерть**
- c. Передагональний стан
- d. Біологічна смерть
- e. Агонія

526. У відділенні перебуває вагітна, якій призначено щоденні внутрішньовенні вливання. Під час чергового підключення системи до підключичного катетера, виявилось, що рідина не надходить у катетер через його непрохідність. Вкажіть подальші дії акушерки:

- a. Промити катетер 1 мл 5% розчину гепарину
- b. Замінити катетер
- c. Промити катетер 1 мл 1% розчину гепарину**
- d. Промити катетер 1 мл 10% розчину NaCl
- e. Не підключати систему

527. Дитині 4 тижні. Акушерка помітила, що через годину після ранкового годування з'явилося блювання "фонтаном". Для якого стану характерні дані ознаки?

- a. Проста диспепсія
- b. Пілоростеноз**
- c. Парентеральна диспепсія
- d. Кишковий токсикоз
- e. Пілороспазм

528. Акушерку пологового відділення викликала пацієнтка, в якій виникло блювання "кавовою гущею". З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу. Який лікарський препарат за призначенням лікаря застосує акушерка для надання невідкладної допомоги?

- a. Фізіологічний розчин
- b. Етамзілат натрію**
- c. Но-шпа
- d. Кетанов
- e. Мезатон

529. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 50-ти років зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, іноді біль і виділення крові під час акту дефекації. Який попередній діагноз?

- a. Рак прямої кишки
- b. Тріщина заднього проходу

c. Геморой

- d. Гострий парапроктит
- e. Поліпи прямої кишки

530. До фельдшера ФАПу звернулася жінка 25-ти років, зі скаргами на висипи у ділянці шкіри тулуба, у вигляді невеликих плям неправильної форми діаметром від 0,5 до 2 см, блідо-рожевого кольору, які не підвищуються над рівнем шкіри, наявний супутній лімфаденіт. Позитивна RW. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Дерматит
- b. Первинний сифіліс
- c. Екзема
- d. Пізній сифіліс

e. Вторинний сифіліс

531. Пацієнтка 65-ти років після вживання жирної та гострої їжі звернулася на ФАП зі скаргами на гострий біль в епігастральній та правій підреберній ділянках оперізуючого характеру, багаторазове блювання. Об'єктивно: Рс- 120/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живіт під час пальпації болючий в епігастрії, відсутня пульсація черевної аорти. Який попередній діагноз?

- a. Загострення виразкової хвороби шлунка
- b. Гострий гастрит

c. Гострий панкреатит

- d. Гострий апендицит
- e. Гострий холецистит

532. Хвора 48-ми років скаржиться на загальну слабкість, різке схуднення, збільшення живота в об'ємі, болі внизу живота. Клініка виникла півроку тому. Менструація не порушена, вагітностей не було. Живіт збільшений в розмірах. Вагінально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох боків від матки визначаються щільні, горбисті, нерухомі пухлини, які виповнюють порожнину малого таза. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Кістоми яєчників

b. Рак яєчників

- c. Міома матки
- d. Рак тіла матки
- e. Кісти яєчників

533. Хвора 34-х років надійшла до стаціонару в тяжкому стані зі скаргами на слабкість, затримку менструації на 3 тижні, серцебиття, холодний піт. На вулиці втрачала свідомість. Які методи діагностики можна використати для постановки діагнозу?

- a. Клінічний аналіз крові, сечі, коагулограма
- b. Ультразвукове дослідження

c. Пункція черевної порожнини через заднє склепіння піхви

- d. Вишкрібання порожнини матки з гістологічним дослідженням зскрібку
- e. Лапароскопія

534. За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у вагітної кров на коагулограму. У градуйовану пробірку конусоподібної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Яку кількість крові необхідно набрати у пробірку?

- a. 2 мл
- b. 5 мл
- c. 7 мл

d. 9 мл

- e. 3 мл

535. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою

підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазку. З яких ділянок необхідно провести мазок?

a. Зів та ніс

- b. Носогорло
- c. Задня стінка глотки
- d. Зів
- e. З-під язика

536. Хвора 37-ми років скаржиться на нездужання, зниження працездатності, підвищення температури тіла до 37,6°C, першіння в горлі, кашель з виділенням слизистого харкотиння, які з'явилися через 4 дні після перенесеної ГРВІ. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Перкуторно - легеневиий звук, аускультативно - жорстке дихання, поодинокі сухі хрипи. Рентгенографія органів грудної клітки - без змін. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Гострий бронхіт

- b. Негоспітальна пневмонія
- c. Бронхіальна астма
- d. Бронхоектатична хвороба
- e. Хронічний бронхіт

537. До акушерки звернулась жінка, яка скаржиться на загальну слабкість, неприємні відчуття в ділянці серця, утруднене дихання, ковтання. Впродовж 40-ка років жила на Закарпатті. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, волога. Щитоподібна залоза збільшена. Рс- 72/хв., АТ120/70 мм рт.ст. Вміст Т3 і Т4 в крові в межах норми. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Гіпотиреоз
- b. Цукровий діабет
- c. -

d. Ендемічний зоб

- e. Дифузний токсичний зоб

538. До акушерки звернулась жінка 38-ми років, яка скаржиться на загальну слабкість, задишку, серцебиття, печіння в язичі. Об'єктивно: шкіра бліда з лимонножовтим відтінком. Обличчя пастозне. Язик яскраво-червоного кольору, смакові сосочки згладжені. Рс- 94/хв., АТ- 115/60 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, систолічний шум на верхівці. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Гемолітична анемія
- b. Гіпопластична анемія
- c. Залізодефіцитна анемія
- d. Хронічна постгеморагічна анемія

e. В12-дефіцитна анемія

539. До акушерки звернулась жінка 28-ми років, яка скаржиться на загальну слабкість, кровотечі з ясен, крововиливи на шкірі. Хворіє 8 років. Об'єктивно: шкіра бліда. На шкірі грудної клітки крововиливи різного розміру та кольору (темночервоного, синього, зеленого, жовтого). Лімфатичні вузли не збільшені. Печінка, селезінка не збільшені. Який найімовірніший попередній діагноз?

- a. Хронічний мієлолейкоз

b. Тромбоцитопенічна пурпура

- c. Геморагічний васкуліт
- d. Гемофілія
- e. Хронічний лімфолейкоз

540. До акушерки звернулась жінка зі скаргами на біль у правій половині грудної клітки, кашель з виділенням невеликої кількості "іржавого" харкотиння, підвищення температури до 39,6°C. Хворіє 3-й день після переохолодження. Перкуторно - тупий звук від кута правої лопатки донизу, аускультативно - вислуховуються вологі дрібноміхурцеві хрипи. Який найімовірніший попередній діагноз?

а. Рак легень

б. Негоспітальна пневмонія

с. Сухий плеврит

д. Гострий бронхіт

е. Ексудативний плеврит

541. У дитини 7-ми років через 10 днів після перенесеної ангіни сеча набула вигляду "м'ясних помиїв", з'явився головний біль, млявість, пастозність повік. АТ- 130/90 мм рт.ст. Виділено 500 мл сечі за добу. У сечі: еритроцити - на все поле зору, білок 0,98 г/л, циліндри. Про яке захворювання можна подумати?

а. Гострий цистит

б. Гострий пієлонефрит

с. Гострий гломерулонефрит

д. Хронічний нефрит

е. Хронічний пієлонефрит

542. Акушерка пологового відділення помітила зниження м'язового тонусу та знерушеність правої руки, зниження чутливості у ділянці тильної поверхні 4 і 5 пальців правої кисті, неможливість зігнути 4 і 5 пальці у вагітної жінки. Об'єктивно: м'язовий тонус та м'язова сила у правій руці знижені, обсяг рухів обмежений, згинально-ліктьовий рефлекс з правого боку знижений. В анамнезі - травма правого передпліччя. Встановіть попередній діагноз:

а. Дитячий церебральний параліч

б. Аміотрофія Шарко-Марі

с. Неврит серединного нерву

д. Неврит ліктьового нерву

е. Неврит променевого нерву

543. Мати дитини 3-х років скаржиться на кашель, який поступово підсилювався впродовж 2-х тижнів. Об'єктивно: стан здоров'я дитини середньої важкості, температура тіла - 37,6°C, шкіра бліда. Частий нападоподібний кашель, закінчується виділенням склоподібного харкотиння та глибоким свистячим вдихом. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

а. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних залоз

б. Пневмонія

с. Гостра респіраторна вірусна інфекція

д. Кір

е. Кашлюк

544. Виклик до дитини, яка перебуває на диспансерному обліку з приводу бронхіальної астми. Об'єктивно: стан дитини середньої тяжкості, вимушене положення - сидяче, експіраторна задишка, сухий кашель. Після інгаляції сальбутамолом стан не покращився. Виберіть препарат для надання невідкладної допомоги:

а. Супрастин

б. Піпольфен

с. Еуфілін

д. Димедрол

е. Лазолван

545. Дитині три роки. На шкірі обличчя, шиї численні щільні вузлики тілесного кольору з восковим відтінком. У центрі вузликів пупкоподібне заглиблення, при натисканні пінцетом виділяється сироподібна маса білого кольору. Який найбільш імовірний діагноз:

а. Контагіозний молюск

б. Звичайні бородавки

с. Ниткоподібні бородавки

д. Плоскі бородавки

е. Гострокінцеві бородавки

546. Хворий 28-ми років хворіє епілепсією з дитинства, після перенесеного ГРВІ, появились напади один за одним тонічно-клонічних судом. Між ними до тям не приходив. Об'єктивно:

хворий в комі, гіперемія обличчя, дихання ритмічне 32/хв., Ps- 104/хв., ритмічний, температура - 38,2°C, зіниці широкі, однакового розміру, не реагують на світло, м'язова гіпотонія, гіпорексія, несвідоме сечовипускання. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Малий епілептичний напад
- b. Істеричний напад
- c. Астматичний напад
- d. Епілептичний статус**
- e. Великий епілептичний напад

547. Хворий 39-ти років госпіталізований в інфекційне відділення на 3-й день захворювання зі скаргами на переймоподібний біль у лівій половині живота, несправжні позиви до дефекації, домішки слизу та крові в калі. Захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла до 38,2°C, болю в животі, водянистих випорожнень. З епіанамнезу: вживання сирого молока напередодні. Об'єктивно: температура тіла - 38,4°C, спазмована, болюча сигмоподібна кишка. Яку хворобу можна запідозрити?

- a. Холера
- b. Амебіаз
- c. Черевний тиф
- d. Дизентерія**
- e. Сальмонельоз

548. Пацієнтці гінекологічного відділення лікар призначив введення газовідвідної трубки. Через який час повинна забрати акушерка газовідвідну трубку у пацієнти?

- a. 5 годин
- b. 6 годин
- c. 3 години
- d. 4 години
- e. 2 години**

549. Роділля з мітральним стенозом у 2-му періоді пологів після потуги поскаржилась на задишку, з'явилося пінисте харкотиння з домішками крові. Яке найімовірніше ускладнення виникло у роділлі?

- a. Емболія навколоплідними водами
- b. Правошлуночкова недостатність
- c. Гіпертензивний криз
- d. Судинний колапс
- e. набряк легень**

550. Дитині 2 дні. Мати скаржиться на виражену задишку, відмову від грудей, ціаноз кінцівок. Об'єктивно: виражений ціаноз і акроціаноз. Межі серця розширені, вислуховується грубий систолічний шум. Який попередній діагноз?

- a. Вогнищева пневмонія
- b. Перикардит
- c. Природжена вада серця**
- d. Міокардит
- e. Ревмокардит

551. Хвора скаржиться на раптовий гострий біль у животі з втратою свідомості, затримка менструації на 4 тижні. Об'єктивно: шкіра бліда, холодний піт. Ps100/хв., АТ- 90/40 мм рт.ст. Симптом Щоткіна позитивний, біль у правій здухвинній області. Вагінально матка збільшена, рухлива, "плаваюча", заднє склепіння випнуте, болісне. При зміщенні шийки - різкий біль. Виділення з порожнини матки - кров темного кольору. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Перекрут ніжки кісти
- b. Порушена ектопічна вагітність**
- c. Гострий аднексит
- d. Апендицит
- e. Апоплексія яєчника

552. Ви акушерка пологового відділення. Роділля 20 років. Пологи I, термінові. I період пологів. Перейми по 35-40 секунд через 5-6 хвилин, відійшли навколоплідні води із домішками меконію. Серцебиття плода - 90/хв. При внутрішньому акушерському дослідженні встановлено: відкриття шийки матки 6 см, голівка притиснута до входу в малий таз. Оцініть стан плода:

- a. Фето-плацентарна недостатність
- b. Стан плода задовільний

c. Дистрес плода в пологах

- d. Синдром затримки розвитку плода
- e. Гемолітична хвороба плода

553. Хвора 31-го року звернулась до ФАПу зі скаргами на сильний біль в лівій половині попереку з іррадіацією в пахвинну ділянку, відмічає часті позиви до сечовипускання. Хвора збуджена, симптом Пастернацького зліва різко позитивний. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- a. Хронічний гломерулонефрит

b. Ниркова колька

- c. Гострий гломерулонефрит
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Хронічний пієлонефрит

554. Пацієнтка 55-ти років знаходиться на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. Під час профілактичного огляду висуває скарги на швидку втомлюваність, загальну слабкість, втрату апетиту, відразу до м'ясної їжі. Об'єктивно: зниженого харчування, шкірні покриви та слизові оболонки бліді. Яке ускладнення найбільш імовірне у пацієнтки?

- a. Шлункова кровотеча
- b. Перфорація
- c. Стеноз ворота

d. Малігнізація виразки

- e. Пенетрація

555. До акушерки ФАПу звернулась вагітна 29-ти років зі скаргами на болі в епігастрії, які з'являються через дві години після прийому їжі, "нічні болі". Об'єктивно: хвора помірного живлення, шкіра звичайного кольору. Пальпаторно: живіт м'який, болючий в пілородуоденальній зоні. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Жовчнокам'яна хвороба
- b. Цироз печінки
- c. Холецистит
- d. Гепатит

e. Виразкова хвороба 12-палої кишки

556. Жінка 68-ми років скаржиться на свербіж, печіння зовнішніх статевих органів. При огляді визначається сухість шкіри зовнішніх статевих органів, атрофія статевих губ. Який попередній діагноз?

- a. Кольпіт
- b. Вульвіт

c. Крауроз

- d. Лейкоплакія
- e. Рак зовнішніх статевих органів

557. Вас викликали до пацієнта 44-х років, у якого раптово виник біль в правій поперековій ділянці, що іррадіює вниз по сечоводу на внутрішню поверхню стегна. Об'єктивно: хворий неспокійний, стогне від болю, блідий, на обличчі краплини поту. Який лікарський засіб слід застосувати для невідкладної допомоги?

- a. Супрастин
- b. Димедрол

c. Баралгін

- d. Мезатон
- e. Кофеїн

558. Пацієнтка 18-ти років з діагнозом: вроджена псевдоерозія, знаходиться на диспансерному обліку. Який метод дослідження обов'язково проводять при даній патології під час диспансерного спостереження?

- a. Бактеріоскопічне дослідження
- b. Біопсія

c. Цитологічне дослідження

- d. Кольпоцитологічне дослідження
- e. Ультразвукове дослідження

559. Хвора доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота з іррадіацією в пряму кишку, кров'янисті виділення зі статевих шляхів, запаморочення. Скарги з'явилися раптово. Остання менструація 2 тижні тому. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, температура - 36,6°C, Ps102/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Живіт напружений, незначно болісний в нижніх відділах. Симптоми подразнення очеревини слабкопозитивні. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Фіброїд, який народжується
- b. Аборт, що розпочався

c. Апоплексія яєчника

- d. Кишкова непрохідність
- e. Позаматкова вагітність

560. У 26-річної породіллі на 4-ту добу після пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршується: температура тіла - 36,7°C, Ps94/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Матка болюча, дно її на рівні пупка. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком визначається м'яка тканина, згортки крові. При огляд кровотеча посилилась. Яка подальша тактика?

- a. Надпіхвова ампутація матки
- b. Введення препаратів, що скорочують матку

c. Інструментальна ревізія порожнини матки

- d. Ручне обстеження порожнини матки та видалення часток плаценти, що затрималась
- e. Зовнішній масаж матки після спорожнення сечового міхура

561. В жіночу консультацію звернулась жінка з ациклічними матковими кровотечами, стоїть на диспансерному обліку з приводу фіброміоми матки. В яку групу диспансерного спостереження повинна бути включена жінка і яка облікова документація повинна бути заведена?

- a. Історія хвороби стаціонарного хворого
- b. Історія пологів
- c. Амбулаторна карта, ф-30
- d. Індивідуальна карта, ф-30

e. Диспансерна група, ф-30

562. В гінекологічне відділення доставлена дівчинка 12-ти років зі скаргами на переймоподібні болі внизу живота. З анамнезу: вважає себе хворою впродовж 3х місяців, біль внизу живота триває 2-3 дні і повторюється щомісячно. При огляді в ділянці присінку піхви визначається яскраво-багрове випинання. Який метод лікування є найбільш доцільним?

a. Розсікання дівочої перетинки

- b. Спринцювання
- c. Електрофорез з анальгіном
- d. Примочки
- e. Сидячі ванночки

563. Породілля на 11-ту добу після пологів поскаржилась на різкі болі в лівій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39,0°C. Патології з боку внутрішніх та статевих органів не виявлено. Ліва молочна залоза гаряча на дотик, болюча. У верхньому квадранті шкіра гіперемована, дещо ціанотична, набрякла. При пальпації визначається інфільтрат 6-8 см з флуктуацією посередині. Яка тактика у даному випадку?

- a. Призначити антибіотики
- b. Спостерігати за станом породіллі

- с. Припинити лактацію
- д. Рекомендувати зцідження молока

е. Хірургічне лікування маститу

564. Хвора скаржиться на ниючий біль внизу живота, посилені болючі менструації. В анамнезі: 2 аборт, пологів не було. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, живіт м'який, не болючий, над лоном пальпується пухлиноподібний утвір. При бімануальному дослідженні: тіло матки збільшене до 14 тижнів вагітності, з нерівною поверхнею, щільне, рухоме. Придатки не пальпуються. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Вузлувата фіброміома матки

- б. Вагітність
- с. Пухлина нирки
- д. Ендометриоз
- е. Кістома яєчника

565. Хвора 58-ми років звернулась до жіночої консультації зі скаргами на кров'яністі виділення зі статевих шляхів. Менопауза 8 років. При гінекологічному дослідженні: матка дещо збільшена, щільна на дотик, обмежена в рухомості, придатки не визначаються, параметрії вільні. При фракційному вишкрібанні з порожнини матки одержано значний мозкоподібний зішкріб. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Аденоміоз
- б. Рак шийки матки

с. Рак тіла матки

- д. Хоріонепітеліома
- е. Гормонопродукуюча пухлина яєчників

566. Хвора скаржиться на затримку менструації протягом 20-ти днів, мажучі кров'яністі виділення зі статевих шляхів, болі внизу живота, більше праворуч, які віддають у задній прохід, загальну слабкість. Симптом Щоткіна позитивний. Реакція сечі на хоріальний гонадотропін - позитивна. При бімануальному дослідженні: заднє склепіння випнуте, напружене, різко болюче на дотик, матка збільшена до 5 тижнів вагітності, в області правих придатків - круглясте утворення, розміром до 4 см в діаметрі, болюче на дотик. Який найбільш імовірний діагноз?

- а. Маткова вагітність
- б. Гострий аднексит
- с. Рак яєчника

д. Позаматкова вагітність

- е. Гострий апендицит

567. Дівчина 14-ти років скаржиться на кров'яні виділення з піхви протягом 10 днів, які з'явилися після 3-місячної затримки менструації. Менархе у 13 років. Менструальний цикл - нерегулярний. Гемоглобін - 90 г/л. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Ювенільна маткова кровотеча

- б. Рак тіла матки
- с. Гормонопродукуюча пухлина матки
- д. Поліп шийки матки
- е. Злоякісне захворювання крові

568. У породіллі масивна кровотеча після народження двійні через природні пологові шляхи. Дитяче місце та пологові шляхи цілі. Дно матки вище пупка, матка при пальпації м'яка, не реагує на введення скорочуючих засобів. Яка найбільш імовірна причина кровотечі?

- а. Гіпотонія матки

б. Атонія матки

- с. Пошкодження шийки матки
- д. Розрив матки
- е. Затримка частки плаценти

569. У породіллі на 3-тю добу після пологів з'явилися скарги на слабкість, поганий сон, відсутність апетиту, біль внизу живота. Спостерігалось підвищення температури до 39°C,

почастішання пульсу. Під час огляду визначається болюча матка, дно якої на 1 поперечний палець нижче пупка. Лохії - мутно-кров'яністі, із неприємним запахом. Про яку патологію можна думати в даному випадку?

a. Післяпологовий ендометрит

- b. Тромбофлебіт вен матки
- c. Субінволюція матки
- d. Параметрит
- e. Перитоніт

570. У першовагітної 24-х років з початку регулярних перейм минуло 4 години. АТ120/80 мм рт.ст. Положення плода поздовжнє, головне передлежання, серцебиття плода - 130/хв. Піхове дослідження: шийка матки згладжена до 1,5 см, відкриття - 3 см. Плідний міхур цілий, напружений. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. У якому періоді пологів знаходиться пацієнтка?

- a. Передвісники пологів
- b. III період пологів

c. I період пологів

- d. Прелімінарний період
- e. Початок II періоду пологів

571. Перша вагітність. Остання менструація 29 травня, перше ворушіння плода 20 жовтня. При першому звертанні в жіночу консультацію 24 липня була виявлена вагітність 7 тижнів. Передбачається, що пологи можуть настати:

a. 5 березня

- b. 15 березня
- c. 17 лютого
- d. 29 березня
- e. 17 квітня

572. На висоті однієї з перейм породілля поблідніла, Ps- 150/хв., слабкого наповнення, АТ- 90/50 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі, різко болюча при пальпації, контури чіткі. Серцебиття плода глухе, аритмічне. При піхвовому дослідженні: відкриття маткового вічка на 5 см, плодовий міхур цілий, напружений, помірні кров'яністі виділення. Про яку патологію йде мова?

- a. Емболія навколоплідними водами
- b. Передлежання плаценти
- c. Загроза розриву матки

d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

- e. Розрив матки

573. На ФАП звернулась пацієнтка 43х років страждає на артеріальну гіпертензію. Приблизно годину тому в неї виник різкий пульсуючий біль в потиличній ділянці, нудота, відчуття жару, серцебиття, біль в ділянці серця. Об'єктивно: пацієнтка збуджена, тремтить, шкіра вкрита плямами червоного кольору. Ps100/хв., напружений, АТ- 180/90 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- a. Крововилив у головний мозок
- b. Інфаркт міокарда
- c. Серцева астма

d. Гіпертонічний криз

- e. Тиреотоксичний криз

574. Акушерку викликали до пацієнта 46ти років, який скаржиться на стискаючий біль за грудиною. Пацієнт наляканий, вкритий холодним потом. Такий стан триває 10 хвилин, виник після фізичного навантаження. Акушерка запропонувала таблетку нітрогліцерину під язик. Біль в ділянці серця припинився, але відмічається сильний головний біль. Що могло спричинити головний біль?

- a. Розвиток інфаркту міокарда

b. Розширення судин головного мозку

- c. Різке підвищення артеріального тиску
- d. Звуження судин головного мозку
- e. Алергічна реакція на нітрогліцерин

575. Ви працюєте акушеркою приймальнооглядового відділення пологового будинку. Під час огляду вагітної у приймальному відділенні було виявлено головний педикульоз. Вкажіть номер наказу, який регламентує обробку при педикульозі:

- a. № 288
- b. № 408
- c. № 120
- d. № 720
- e. № 38**

576. Пацієнтка гінекологічного відділення, під час приступу бронхіальної астми приймає вимушене положення, яке полегшує її стан: сидить, впираючись руками в край ліжка. Вкажіть положення, яке займає пацієнтка:

- a. Пасивне
- b. Ортопное**
- c. Сімса
- d. Фаулера
- e. Вимушене

577. 19-річного юнака при виході з автобусу штовхнули в спину, він упав на правий лікоть. Акушерка ФАПу прибула на виклик. Потерпілий скаржиться на сильний біль в правому плечі. При обстеженні: праве плече в середній третині деформоване; при пальпації визначається крепітація. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Закритий перелом плеча**
- b. Вивих правої ключиці
- c. Забій плеча
- d. Запалення плечового суглоба
- e. Перелом правої ключиці

578. На ФАП звернувся 68-річний пацієнт зі скаргами на біль в прямій кишці з іррадіацією в крижі, чергування закрепів і проносів, домішок крові в калі. Вважає себе хворим близько 1 року, за цей час сильно схуднув. Об'єктивно: зниженого харчування, шкірні покриви бліді, з сіруватим відтінком. При пальцевому ректальному обстеженні на рукавичці кров. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий парапроктит
- b. Хронічний парапроктит
- c. Геморой
- d. Поліп прямої кишки
- e. Рак прямої кишки**

579. Для запобігання помилкового наповнення балонів іншими газами передбачено розпізнавальне фарбування балонів. В який колір пофарбований балон для зберігання кисню?

- a. Червоний
- b. Блакитний**
- c. Жовтий
- d. Чорний
- e. Білий

580. До акушерки ФАПу звернулася мати з дитиною 6-ти років, у якої переважно вночі спостерігається нападopodobний спазматичний кашель, який виникає після відчуття лоскотання в горлі та тиснення за грудниною. Кашель завершується відходженням густого, в'язкого, склоподібного харкотиння, блюванням, мимовільним сечовиділенням. Вкажіть термін ізоляції дитини при даному захворюванні:

- a. 17 днів
- b. 21 день**

с. 20 днів

д. 16 днів

е. 25 днів

581. До акушерки ФАПу звернулася мати дівчинки 8-ми років зі скаргами на погіршення загального стану дитини, відмову від їжі, одноразове блювання, часті випорожнення. Об'єктивно: підвищення температури тіла до 38,5°C; біль у животі, зі слів матері, випорожнення рідинні, з домішками слизу, з прожилками крові. При пальпації живота: сигмоподібна кишка болюча і спазмована. Який лікарський засіб слід використати для лікування дитини?

а. Ніфуроксазид

б. Димедрол

с. Еуфілін

д. Пеніцилін

е. Лактобактерин

582. Пацієнтка 35-ти років отримала термічний опік правого передпліччя і кисті. Об'єктивно: у ділянці правого передпліччя і кисті визначається гіперемія шкіри та поодинокі пухирі з прозорою рідиною. Вкажіть ступінь і площу опіку:

а. III-Б ступінь - 9%

б. II ступінь - 4,5%

с. I ступінь - 4,5%

д. II ступінь - 9%

е. III-А ступінь - 4,5%

583. До акушерки звернулася пацієнтка 25-ти років зі скаргами на набряк і біль у II-III пальцях обох нижніх кінцівок, що посилюються під дією холоду. З анамнезу: захворювання з'явилося рік тому і проявлялося зблідненням шкіри пальців. Об'єктивно: пульсація артерій збережена. Шкіра на пальцях ціанотична, малочутлива. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Тромбофлебіт поверхневих вен

б. Тромбофлебіт глибоких вен

с. Хвороба Рейно

д. Облітеруючий ендартеріїт

е. Облітеруючий атеросклероз

584. Акушерку викликали до хворої 38ми років. Захворіла гостро: рясний водянистий стілець, блювання. До звернення блювання спостерігалось тричі, стілець 6 разів. Об'єктивно: стан важкий. Скаржиться на слабкість, спрагу. Шкіра бліда, ціаноз губ, риси обличчя загострилися. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Судоми литкових м'язів. Тургор шкіри знижений. Голос ослаблений, температура тіла - 36°C. Рс- 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. ЧД- 34/хв. Живіт під час пальпації безболісний. Який попередній діагноз?

а. Сальмонельоз

б. Харчова токсикоінфекція, гіповолемічний шок

с. Холерний гастроентерит

д. Гостра кишкова інфекція

е. Шигельоз

585. На ФАП привезли чоловіка 40-ка років в тяжкому стані: вкритий холодним потом, пульс слабкий, гіпотензія, ноги підтягує до живота. При перкусії печінкова тупість не визначається. Який вірогідний симптом характерний для проривної виразки шлунка при загальному обстеженні?

а. Пастернацького

б. Ортнера

с. Образцова

д. Сітковського

е. Спіжарного

586. Хворий скаржиться на пульсуючий біль в другому пальці правої кисті, після першої

безсонної ночі. Явища виникли після мікротравми. Місцево - нігтьова фаланга II пальця правої кисті набрякла. Локальна гіперемія, функція порушена. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Фурункул

b. Панарицій

c. Абсцес

d. Еризипелоїд

e. Бешиха

587. Пацієнтці з хронічним ентероколітом лікар призначив іригоскопію. Воду якої температури оптимально застосувати для постановки очисної клізми?

a. 38-39°C

b. 28-32°C

c. 35-37°C

d. 35-36°C

e. 37-38°C

588. Внаслідок перших фізіологічних пологів матір'ю, яка не перебувала на обліку в жіночій консультації, народився хлопчик з висипкою на долонях і підшвах, що являє собою окремі пухирі до 1,5 см в діаметрі, заповнених серозною рідиною. При бактеріоскопічному обстеженні вмісту висипань виявлено бліду трепонему. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Звичайна пухирчатка

b. Стафілококове імпетиго

c. Вроджена герпетична інфекція

d. Іхтіоз

e. Сифілітична пухирчатка

589. Акушерка бере участь у лікуванні пацієнтки з хронічним ентероколітом. Який дієтичний стіл слід рекомендувати пацієнтам із кишковими розладами?

a. Стіл №7

b. Стіл №11

c. Стіл №1

d. Стіл №5

e. Стіл №4

590. До акушерки звернулась мати з 1,5річною дитиною, зі скаргами на незвичайні зміни в кінцівках, неспокій дитини. Об'єктивно: дитина неспокійна, плаче. Нижні кінцівки зігнуті в колінних та кульшових суглобах, стопи в стані різкого плантарного згинання, пальці кистей рук тонічно напружені, рука нагадує "руку акушера". Про яке захворювання треба думати?

a. Рахіт, період розпалу

b. Спазмофілія, карпопедальний спазм

c. Спазмофілія, еклампсія

d. Спазмофілія, ларингоспазм

e. Латентна форма спазмофілії

591. На 39 тижні вагітності народилася дівчинка з масою тіла 3300 г, довжиною тіла 51 см. Одразу після народження дитина голосно закричала, шкірні покриви рожевого кольору, ЧСС-98/хв., при подразненні носовим катетером у неї виник кашель, кінцівки напівзігнуті. Проведіть оцінку стану дитини за шкалою Апгар:

a. 4 бали

b. 6 балів

c. 7 балів

d. 8 балів

e. 5 балів

592. До акушерки ФАПу звернулась пацієнтка 54-х років зі скаргами на загальну слабкість, лихоманку, головний біль. St. localis: права гомілка набрякла, почервоніння шкіри з чіткими межами, місцями пухирі різної величини, наповнені серозним ексудатом. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Некротична форма бешихи
- b. Еритематозна форма бешихи
- c. Бульозна форма бешихи**
- d. Еризипелоїд
- e. Флебїт

593. До акушерки ФАПУ звернулася вагітна 27-ми років зі скаргами на сильний біль у поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи та стегно. Також спостерігаються розлади сечовипускання та загальна слабкість. Біль виник після тряскої їзди. Який симптом перевірити акушерка для діагностики захворювання?

- a. Мейо-Робсона
- b. Івана-Покивана
- c. Роздольського
- d. Ортнера
- e. Пастернацького**

594. До акушерки ФАПУ звернувся чоловік 74-х років зі скаргами на постійний біль в дистальних відділах нижніх кінцівок, який посилюється вночі, оніміння пальців стоп. Шкіра бліда, холодна, суха, виражена гіпотрофія м'язів обох гомілок, відсутня пульсація на підколінних артеріях. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Хвороба Рейно
- b. Облітеруючий ендартеріїт
- c. Облітеруючий атеросклероз**
- d. Варикозна хвороба
- e. Посттромбофлебітичний синдром

595. Акушерку ФАПУ викликали до чоловіка 33-х років, котрий під час ремонтних робіт на даху зачепився і впав, ударився головою та втратив свідомість на 4-5 хвилин. Обставини травми не пам'ятає. Постраждалий блідий, скаржиться на помірний головний біль, було одноразове блювання. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Струс головного мозку**
- b. Здавлення головного мозку
- c. Перелом основи черепа
- d. Перелом склепіння черепа
- e. Забій головного мозку

596. У породіллі при критичному зниженні температури тіла з'явились наступні симптоми: різка блідість шкіри, холодний липкий піт, загострені риси обличчя, прискорене поверхневе дихання, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Вкажіть стан, який виник у пацієнтки:

- a. Кома
- b. Колапс**
- c. Емболія
- d. Непритомність
- e. Інсульт

597. В стаціонар поступила жінка з інтенсивним оперізуючим болем у надчеребній ділянці, нудотою, блюванням. Погіршення стану пов'язує з вживанням алкоголю та жирної, гострої їжі. В сечі підвищена діастаза. Який препарат слід підготувати за призначенням лікаря?

- a. Ціанокобаламін
- b. Контрикал**
- c. Альмагель
- d. Сульфат магнію
- e. Лазикс

598. Акушерка влаштовується на роботу в операційний блок. Яка тривалість робочого тижня для неї, так як ця робота пов'язана з шкідливими умовами праці?

- a. 42 години

- b. 38 годин
- c. 30 годин
- d. 36 годин**
- e. 40 годин

599. У хірургічний кабінет поліклініки звернулась жінка 45-ти років, яка хворіє на варикозне розширення вен 8 років. Об'єктивно: гігантська виразка, що охоплює всю нижню третину лівої гомілки, з в'ялими грануляціями. Шкіра навколо неї туга, має темні плями. Ваш попередній діагноз?

- a. Трофічна виразка**
- b. Променева виразка
- c. Сифілітична виразка
- d. Туберкульозна виразка
- e. Атеросклеротична виразка

600. У жіночій консультації взята на облік вагітна 25-ти років з анатомічно звуженим тазом II ступеня. Яке ускладнення в пологах найбільш загрозливе?

- a. Слабкість пологової діяльності
- b. Дистрес плода
- c. Раннє відходження навколоплідних вод
- d. Випадіння дрібних частин плода
- e. Розрив матки**

601. Упологовий будинок поступила вагітна в терміні 40 тижнів. Перейми протягом 4 годин. При зовнішньому обстеженні голівка плода притиснута до входу в малий таз. При вагінальному обстеженні пальпується лобний шов і передній кут великого тім'ячка, надбрівні дуги, перенісся. Поставте діагноз:

- a. Потиличне передлежання
- b. Лицеве передлежання
- c. Ніжне передлежання
- d. Сідничне передлежання
- e. Лобне передлежання голівки**

602. Породілля через 20 хвилин після народження живого доношеного хлопчика масою - 4500,0 г знаходиться у пологовій залі. Плацента відділилась самостійно, з усіма часточками і оболонками. Крововтрата у пологах - 350 мл. Розривів м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслаблюється, зі статевої щілини виділяється кров зі згортками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?

- a. Гіпотонічна маткова кровотеча**
- b. Розрив матки
- c. Кровотеча у зв'язку з порушення зсідання крові
- d. Розрив шийки матки
- e. Атонічна маткова кровотеча

603. Оцінити стан новонародженої дитини за шкалою Апгар, якщо серцебиття плода - 120/хв., дихання глибоке, рефлекс жваві, м'язовий тонус добрий, шкіра рожева:

- a. 8-9 балів
- b. 12 балів
- c. 6 балів
- d. 1-2 бали
- e. 10 балів**

604. До пологового будинку госпіталізовано жінку зі строком вагітності 38 тижнів. ВСДМ- 40 см. Над входом до малого тазу визначається велика частина плода, що балотує. Вислуховується серцебиття плода зліва нижче пупка - 136/хв., та справа вище пупка - 156/хв. Встановіть діагноз:

- a. Тазове передлежання
- b. Розгинальне передлежання плода

- c. Великий плід
- d. Гідроцефалія плоду

e. Багатоплідна вагітність

605. До гінекологічного відділення поступила хвора 60-ти років, з кровотечею зі статевих шляхів. Менопауза 10 років. Виявлено, що матка збільшена до 10 тижнів, щільна, нерухома, безболісна. Виділення кров'яністі. Шийка матки та придатки незмінні. До якого обстеження треба підготувати інструменти?

- a. Біопсія
- b. Кольпоскопія
- c. Гістеросальпінгографія

d. Роздільне діагностичне вишкрібання матки

- e. Пункція через заднє склепіння піхви

606. Хвора 35-ти років поступила до гінекологічного відділення з підозрою на прогресуючу позаматкову вагітність. Під час перебування у відділенні у хворої з'явився гострий біль у животі, знепритомніла, шкіра бліда, живіт при пальпації болючий, симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. АТ- 90/60 мм рт.ст., Ps- 110/хв. Що повинна зробити акушерка у першу чергу?

- a. Ввести знеболюючі
- b. Міхур з льодом на низ живота
- c. Ввести кровоспинні

d. негайно повідомити чергового лікаря

- e. Спостерігати

607. Жінка 30-ти років звернулася до консультації за рекомендацією природного метода контрацепції. Дана порада. При вимірюванні базальної температури впродовж 3-х місяців виявлено двофазний менструальний цикл. Уякі дні після першого збільшення температури жінка може завагітніти?

- a. 8-9 день

b. 1-3 день

- c. 5-6 день
- d. 4-5 день
- e. 6-7 день

608. Поступила до гінекологічного відділення хвора зі скаргами на невеликий періодичний біль внизу живота та спині. Біль посилюється після статевого акту. Гнійні виділення. Веде безладне статеве життя. Виявлено, що придатки з обох боків збільшені, щільні, безболісні. Для діагностики хламідіозу який метод дослідження потрібний?

- a. Мазок на гормональне дзеркало
- b. Мазок на ступінь чистоти піхви

c. Мазки з уретри та цервікального каналу

- d. Цитологічний метод
- e. Кольпоскопія

609. Лікар призначив дитині дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію сечі необхідно зібрати для дослідження?

- a. Нічну порцію сечі
- b. Всю ранкову сечу

c. Середню порцію ранкової сечі

- d. Добову сечу
- e. Будь-яку порцію сечі

610. Акушерка у новонародженої дівчинки виявила крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болючий. Що з дитиною?

- a. Пухирчатка новонародженого
- b. Водянка мозку
- c. Пологова пухлина
- d. Внутрішньочерепна пологова травма

е. Кефалогематома

611. За 5 днів життя недоношена дитина втратила 10% маси, патологічних змін немає. Вкажіть причини такого стану:

а. Фізіологічна втрата маси тіла

- b. Транзиторний катар кишок
- c. Фізіологічна еритема
- d. Статевий криз
- e. Фізіологічна жовтяниця

612. Які рекомендації повинна надати акушерка матері доношеної новонародженої дитини, щодо частоти прикладання до грудей?

- a. Годувати 7 разів на добу
- b. Годувати 10 разів на добу

с. Годувати за вимогою новонародженого

- d. Годувати 6 разів на добу
- e. Годувати 5 разів на добу

613. Вагітна жінка знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу гострого пієлонефриту. Після в/м'язового введення антибіотику погіршився стан: з'явилася слабкість, тремтіння тіла, свербіж шкіри, нудота. Через декілька хвилин вона знепритомніла. Шкіра бліда, пульс 102/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. Яка невідкладна долікарська допомога?

- a. Горизонтальне положення, дати нашатирний спирт
- b. Напівсидяче положення, гірчичники на грудну клітку
- c. Горизонтальне положення, грілку до ніг

d. Холод на місце ін'єкції, обколоти місце ін'єкції адреналіном

- e. Горизонтальне положення, дати зволожений кисень

614. До акушерки ФАПу звернувся чоловік зі скаргами на напади стискаючого болю за грудниною під час ходьби та психоемоційних стресів, з іррадіацією у ліву руку, під ліву лопатку. Біль минає в стані спокою через 5-7 хв. Яка найбільш доцільна невідкладна долікарська допомога у даному випадку?

- a. Анаприлін 20-40 мг перорально

b. Нітрогліцерин 0,0005 мг під язик

- c. Но-шпа 2% - 2 мл в/м
- d. Аспірин 80 мг розжувати
- e. Папаверин 2% - 2 мл в/м

615. Пацієнтка скаржиться на сухість у роті, спрагу, нудоту. В анамнезі: цукровий діабет. Об'єктивно: запах ацетону з рота, шкіра суха, рум'янець на обличчі. Дихання глибоке, шумне, тони серця приглушені. Рс- 120/хв., слабого наповнення, АТ80/45 мм рт.ст. Через деякий час жінка втратила свідомість. Який першочерговий препарат для надання невідкладної допомоги треба ввести?

- a. Дибазол

b. Інсулін

- c. Р-н бікарбонату натрію
- d. Р-н глюкози
- e. Мезатон

616. Ви акушерка приймально-діагностичного відділення оглядаєте жінку, 35-ти років, після кримінального аборт. Ви повинні провести специфічну профілактику проти якої хірургічної інфекції?

- a. Гангрена
- b. Сепсис
- c. Бешиха
- d. Сказ

е. Правець

617. Ви акушерка гінекологічного відділення доглядаєте за жінкою, 42-х років, з запаленням жіночих статевих органів, у якої виникло ускладнення - перитоніт. Ваші дії перед транспортуванням пацієнтки до операційної:

- a. Назогастральний зонд
- b. Система потрійного катетеру
- c. Премедикація**
- d. Катетеризація периферійної вени
- e. Катетеризація сечового міхура

618. Породіллі з цукровим діабетом призначено введення 20 ОД інсуліну. У вас флакони по 100 ОД інсуліну в 1 мл. Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц 2 мл?

- a. 0,2 мл**
- b. 0,4 мл
- c. 2мл
- d. 1мл
- e. 0,5 мл

619. Упороділлі, в післяопераційному періоді виник закр. Лікар призначив пацієнтці олійну клізму. Вкажіть кількість олійного розчину та температуру:

- a. 150-200 мл, 37-38°C**
- b. 100-150 мл, 30-35°C
- c. 500 мл, 20-30°C
- d. 150 мл, 34-35°C
- e. 50-100 мл, 40-42°C

620. Пацієнтка скаржиться на різкий головний біль, запаморочення, шум у вухах, миготіння "мушок" перед очима, нудоту. Хвора збуджена, пульс напружений, АТ- 200/110 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся?

- a. Внутрішня кровотеча
- b. Гіперглікемія
- c. Напад бронхіальної астми
- d. Непритомність
- e. Гіпертензивна криза**

621. До акушерки ФАПу звернулася жінка 20-ти років, яка 3 тижні тому народила дитину, вигодовує груддю. Скарги на різкий біль в правій молочній залозі, підвищення температури тіла до 39°C, нездужання. Права молочна залоза збільшена, шкіра в правому нижньому квадранті гіперемована, пальпується болючий інфільтрат до 8 см в діаметрі. Яка проблема у жінки?

- a. Мастопатія
- b. Ліпома
- c. Лактаційний мастит**
- d. Рак молочної залози
- e. Фібroadенома

622. У повторно народжуючої через 6 годин активної пологової діяльності відійшли навколоплідні води. При внутрішньому дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття вічка до 8 см, плодовий міхур відсутній, в піхві визначаються ніжки плода. Який характер передлежання?

- a. Колінне передлежання
- b. Повне ножне передлежання**
- c. Тазове передлежання
- d. Невповне ножне передлежання
- e. Неповне тазове передлежання

623. Роділля 40 тижнів, положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз, розміри таза: 27-28-31-17. Індекс Соловйова - 14 см. Діагональна кон'югата - 9,5 см. Яка форма кісткового таза?

- a. Поперечнозвужений
- b. Таз нормальних розмірів
- c. Загальнорівномірнозвужений
- d. Плоскоракітний**
- e. Простий плоский

624. До акушерки ФАПу звернулася жінка зі скаргами на нудоту, блювання 1 раз на добу, сонливість, затримку місячних до 2 місяців. При обстеженні: ціаноз слизової піхви та шийки матки. Матка збільшена в розмірі до 8 тижнів, м'яка, особливо в області перешийка, під час пальпації стала більш щільною, неболюча. Придатки не пальпуються, виділення слизові.

Вкажіть ймовірний діагноз:

- a. Дисфункція яєчників
- b. Вагітність 8 тижнів**
- c. Позаматкова вагітність
- d. Фіброміома матки
- e. Гастрит

625. Вагітна в терміні 8-9 тижнів скаржиться на блювання до 15-17 разів на добу, значну слинотечу. За 2 тижні зменшила вагу на 10 кг. АТ-100/60 мм рт.ст., пульс 110/хв., шкіра суха, бліда. Вагітна психічно лабільна. Діурез знижений. Вкажіть ймовірний діагноз:

- a. Хвороба Боткіна
- b. Блювання вагітної середньої тяжкості
- c. Тяжка форма блювання**
- d. Харчова токсикоінфекція
- e. Блювання вагітної легкого ступеню

626. До акушерки ФАПу звернулася жінка зі скаргами на затримку менструації, ниючий біль внизу живота та крижах. Об'єктивно: матка збільшена до 8 тижнів вагітності. Цервікальний канал закритий, виділення незначні, кров'яністі. Попередній діагноз:

- a. Загрозовий викидень**
- b. Фіброміома матки
- c. Міхуровий занесок
- d. Дисфункція яєчників
- e. Аборт в ході

627. Акушерка полового залу розпочала використовувати в своїй роботі стерильну білизну з бікса. Вкажіть, протягом якого часу зберігається стерильність матеріалу в даному біксі?

- a. 10 годин
- b. 24 години
- c. 48 годин
- d. 6 годин**
- e. 12 годин

628. Хворій гінекологічного відділення лікар призначив ректальне вимірювання температури вранці та ввечері. Вкажіть, протягом якого часу акушерка повинна міряти температуру ректально:

- a. 7 хв.
- b. 2 хв.
- c. 5 хв.**
- d. 10 хв.
- e. 15 хв.

629. Жінка 25-ти років страждає на вторинне безпліддя. Для перевірки прохідності маткових труб вирішено провести метросальпінгографію. Який шприц повинна покласти медсестра в набір інструментів для даного дослідження?

- a. Багаторазовий шприц "Рекорд"
- b. Інсуліновий шприц
- c. Одноразовий шприц 20 мл

d. Шприц Брауна

e. Шприц Жане

630. Дитині 3 роки. Скарги матері на підвищення температури тіла до 38°C, відсутність апетиту, нудоту, біль в животі, часті болісні сечовипускання, сеча каламутна. Лікарем призначена проба сечі за Нечипоренком. Сутність даної проби полягає в:

a. Визначення кількості лейкоцитів та еритроцитів в 1 мл сечі

b. Визначення кальцію сечі

c. Визначення кількості сечі за добу

d. Визначення цукру в сечі

e. Визначення ацетону в сечі

631. Вагітна 24 роки з'явилась на черговий прийом у жіночу консультацію. Акушерка виміряла ВСДМ, ОЖ, провела аускультацию. Серцебиття плода - 130/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода:

a. II позиція, передній вид, головне

b. I позиція, передній вид, тазове

c. I позиція, передній вид, головне

d. I позиція, задній вид, тазове

e. II позиція, задній вид, головне

632. Упершовагітної в терміні вагітності 38-ми тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30-35 секунд. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Навколоплідні води не виливались. Уякому періоді пологів перебуває роділля?

a. Перший період

b. Передвісники пологів

c. Загроза передчасних пологів

d. Третій період

e. Другий період

633. У породіллі 29-ти років, вагою 70 кг, ранній післяпологовий період. Акушерка стежить за об'ємом крововтрати. Який об'єм крововтрати під час пологів є фізіологічним у даному випадку?

a. 500 мл

b. 550 мл

c. 400 мл

d. 450 мл

e. 250 мл

634. Породілля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента відділилась самостійно, з усіма оболонками і часточками. Розривів м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслабляється, із статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

a. Міхур з льодом на низ живота

b. Ручна ревізія порожнини матки

c. Зовнішній масаж матки

d. Введення кровоспинних препаратів

e. Введення кровозамінників

635. Хвора 26-ти років, звернулась на прийом в жіночу консультацію для проведення біопсії шийки матки. Який інструмент повинна приготувати акушерка для цієї маніпуляції?

a. Корнцанг

b. Матковий зонд

c. Конхотом

d. Шприц Брауна

e. Кюретку

636. До кабінету планування сім'ї звернулася хвора 25-ти років, зі скаргами на безплідність протягом 4-х років. Із анамнезу: менструальна функція не порушена. Страждає протягом 5-ти років на хронічне запалення придатків матки. При піхвовому дослідженні патології не виявлено. Яке обстеження слід провести для встановлення прохідності маткових труб?

- a. Гістероскопія
- b. Цервікоскопія
- c. Гідротубація
- d. Пертубація

e. Гістеросальпінгографія

637. До акушерки жіночої консультації звернулася жінка 45-ти років, яка скаржиться на сильний біль у ділянці промежини, який посилюється під час рухів та дефекації. Хворіє 5 діб. Під час огляду в періанальній ділянці інфільтрат до 2х3 см різко болючий при пальпації, в центрі розм'якшення. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий проктит

b. Гострий парапроктит

- c. Гострий геморой
- d. Рак прямої кишки
- e. Хронічний геморой

638. Упершовагітної при дослідженні зовнішніх розмірів нормального тазу гудзики тазоміра були присутні між найвіддаленішими точками гребнів клубових кісток і визначена найбільша відстань. Чому в середньому дорівнює ця відстань?

a. 28-29 см

- b. 30-31 см
- c. 20-21 см
- d. 12,5-13 см
- e. 25-26 см

639. Уроділлі при веденні послідового періоду акушерка визначила, що затискач, який був накладений на пуповину біля статевої щілини, опустився приблизно на 10 см. Якій ознаці відокремлення плаценти це відповідає?

- a. Мікуліча
- b. Шредера
- c. Довженко
- d. Клейна

e. Альфреда

640. Упершороділлі у послідовому періоді через 15 хвилин ознаки відокремлення плаценти позитивні. При потужуванні послід не виділяється. Який із способів виділення посліду зовнішніми прийомами може бути найбільш фізіологічним і досить ефективним?

a. Абуладзе

- b. Креде-Лазаревича
- c. Епштейна
- d. Креде-Лазаревича під наркозом
- e. Гентера

641. Породілля 35-ти років на 12-ту добу після пологів. Пологи ускладнились безводним проміжком у 17 годин. Скаржиться на біль внизу живота, здуття живота, підвищення температури тіла до 39,5°C. При бімануальному дослідженні матку та придатки пальпувати не вдається через болючість. Симптом ЩоткінаБлюмберга позитивний, зниження перистальтики. В крові - лейкоцитоз із різким зсувом формули вліво та збільшення ШОЕ. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Метротромбофлебіт

b. Перитоніт

- c. Метроендометрит
- d. Сальпінгоофорит

е. Параметрит

642. Під час патронажу дитини, яка народилась 5 днів тому, Ви помітили легкий акроціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей. У матері дитини у перші місяці вагітності діагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба може бути у дитини?

а. Природжена вада серця

б. Спазмофілія

с. Асфіксія

д. Рахіт

е. Пневмонія

643. Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Які ще щеплення проводять новонародженим у пологовому будинку?

а. БЦЖ на 3-й день

б. Проти поліомієліту на 3-й день

с. Проти епідемічного паротиту в 1-й день

д. Проти дифтерії на 2-й день

е. Проти кору, краснухи на 3-й день

644. У дитини 10-ти років, що захворіла на гострий гломерулонефрит, наявні проблеми: зменшення кількості виділеної сечі за добу, підвищення артеріального тиску, набряки на обличчі. В гострий період дієта №7 повинна бути:

а. 1-2 г солі на добу

б. 1,5 г солі на добу

с. Безсольова

д. 3-5 г солі на добу

е. 5 г солі на добу

645. Ви працюєте акушеркою. З метою профілактики внутрішньолікарняної інфекції проводиться бактеріологічний посів з рук. Як часто його необхідно проводити?

а. Один раз в квартал

б. Один раз на рік

с. Після захворювання

д. Двараз на рік

е. Щомісяця

646. Пацієнтка через 7 годин після кесаревого розтину скаржиться на відсутність сечовиділення. Сечовий міхур переповнений, позиви до сечовипускання. Яка тактика акушерки?

а. Застосувати міхур з льодом на сечовий міхур

б. Підкласти судно

с. Виконати катетеризацію сечового міхура

д. Ввести спазмолітичні засоби

е. Ввести сечогінні препарати

647. Пацієнтка 31-го року звернулась до жіночої консультації зі скаргами на затримку менструації. Під час піхвового дослідження встановлено, що матка збільшена до розмірів голівки зрілого новонародженого, безболісна. Який діагноз найбільш імовірний?

а. Вагітність 24 тижні

б. Вагітність 12 тижнів

с. Вагітність 16 тижнів

д. Вагітність 8 тижнів

е. Вагітність 20 тижнів

648. Роділля 32-х років через 10 годин від початку пологової діяльності народила доношену дівчинку масою 3400 г. Через 7 хвилин після народження дитини крововтрата становить 150 мл і продовжується. Ознаки Альфельда, Кюстнера, Чукалова та Шредера позитивні. В чому

полягає подальша акушерська тактика?

- a. Ручне відокремлення і видалення посліду
- b. Спостереження за роділлем
- c. Контрольована тракція за пуповину**
- d. Огляд пологових шляхів у дзеркалах
- e. Зовнішній масаж матки

649. Хвора, 22 роки, звернулась до ж/к зі скаргами на затримку менструації на 5 місяців. Потягом останніх 3-х років менструації нерегулярні (1 раз в 3-4 місяці). Заміжня 2 роки. Вагітностей не було. Менархе з 16 років. Виражене ожиріння і ознаки гірсутизму. Р.V.: матка звичайних розмірів; яєчники з обох сторін збільшені, щільні, рухомі, безболісні. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Синдром Шихана
- b. Синдром Шерешевського-Тернера
- c. Синдром Кіарі-Фромеля
- d. Синдром Іценко-Кушинга
- e. Синдром Штейна-Левентала**

650. Хвора, 26-ти років, страждає на безпліддя протягом 3-х років, скаржиться на тривалі та надмірні менструації, що супроводжуються переймоподібним болем. Бімануальне дослідження: матка збільшена відповідно 9 тижнів вагітності, придатки не визначаються. Під час зондування і діагностичного вишкрібання порожнини матки визначається її деформація. Який діагноз найбільш імовірний?

a. Субмукозна міома

- b. Субсерозна міома
- c. Генітальний ендометріоз
- d. Хронічний ендометрит
- e. Маткова вагітність

651. Через 10 хвилин після народження плода народилася плацента з усіма часточками та оболонками. При огляді в дзеркалах виявлено глибокий розрив промежини до зовнішнього сфінктера заднього проходу, задньої стінки піхви. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Розрив промежини I ступеня
- b. Розрив шийки матки

c. Розрив промежини II ступеня

- d. Розрив стінки піхви
- e. Розрив промежини III ступеня

652. Термінові пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. В анамнезі у матері 3 аборти, останній із септичним ускладненням, тривалим лікуванням. Третій період пологів триває 30 хвилин. Ознаки відділення плаценти негативні. Кров'янисті виділення відсутні. Яка можлива патологія III періоду пологів?

- a. Кровотеча
- b. Слабкість послідових перейм

c. Справжнє прирощення плаценти

- d. Несправжнє прирощення плаценти
- e. Повне прирощення плаценти

653. Роділля, 36 років. Термінові пологи почалися 6 годин назад. Перейми по 2530 секунд через 4 хвилини. Живіт поперечно витягнутий, черевна стінка дрябла. ОЖ- 110 см, ВДМ- 28 см. Голівка плода справа, таз зліва. Серцебиття плода вислуховується на рівні пупка справа. Розміри таза 26-29-31-21 см. Шийка матки розкрита на 3 п/пальці. Води цілі. Яку операцію провести для розродження?

a. Кесарів розтин

- b. Амніотомія
- c. Плродоруйнівна операція
- d. Зовнішній поворот плода

е. Класичний зовнішньо-внутрішній поворот плода на ніжку

654. На ФАП звернулась вагітна в 11 тижнів вагітності. Є підозра на міхуровий занесок. Унеї з'явилися кров'яністі виділення з пухирцями, матка більша від строку вагітності, щільно-еластичної консистенції. Для постановки діагнозу "міхуровий занесок", яка ознака є вирішальною?

а. Кров'яністі виділення з біложовтуватими пухирцями

- b. Матка щільно еластичної констистенції
- c. Значне підвищення хоріогоніну в сечі
- d. "Снігові бурі" в матці при УЗО
- e. Розміри матки більші від терміну вагітності

655. Жінка скаржиться на гострий біль внизу живота, запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому, своєчасна. Тест на вагітність негативний. Клінічна картина характерна для:

а. Апоплексії яєчника

- b. Позаматкової вагітності
- c. Раку яєчника
- d. Апендициту
- e. Хронічного аднекситу

656. При тимчасовій зупинці артеріальної кровотечі було використано джгут. Про що свідчить мармурово-білий колір кінцівки нижче накладеного джгута?

а. Зупиниться тільки капілярна кровотеча

b. Джгут накладено вірно

- c. Джгут накладено слабо
- d. Джгут накладено не вірно
- e. Зупиниться тільки венозна кровотеча

657. Ви фельдшер здоров'я пункту. До вас привезли жінку із кров'янистими виділеннями із статевих шляхів. З анамнезу: періодичні кров'яністі виділення протягом року, різко схудла. В дзеркалах: шийка матки у вигляді "цвітної капусти". При доторканні відмічається розпад пухлини. Ваші дії:

- a. Провести біопсію шийки матки
- b. Провести онкоцитологію
- c. Внутрішньовенно розпочати вводити розчин окситоцину

d. Ввести кровоспинний тампон

e. Направити до онкогінеколога

658. Машина швидкої допомоги доставила пацієнта в приймальне відділення лікарні з вулиці. Анамнез невідомий. Об'єктивно: шкірні покриви багрового кольору з синюшним відтінком, свідомість відсутня, ліві кінцівки нерухомі. Дихання шумне, АТ- 195/110 мм рт.ст. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Епілептичний напад
- b. Істеричний напад
- c. Менінгіт
- d. Ішемічний інсульт

e. Геморагічний інсульт

659. Чоловіка 35-ти років уразило струмом. Об'єктивно: потерпілий блідий, дихання немає, пульс відсутній, АТ не визначається. Які першочергові дії?

а. Терміново транспортувати до лікарні

b. Серцево-легенева реанімація

- c. Ввести дихальні аналептики
- d. Ввести серцеві засоби
- e. Ввести глюкокортикоїди

660. Упацієнтки 37-ми років з порушенням менструального циклу акушеркою виявлені ознаки залізодефіцитної анемії. Вкажіть, які з перерахованих продуктів найбільш доцільно включити в

раціон:

a. Буряк, картопля, морква

b. Яблука, гранати, печінку

c. Ананаси, ківі, банани

d. Картоплю, огірки, цибулю

e. М'ясо, сало, вершки

661. Вагітна знаходиться в палаті патології. Вагітність II, 38 тижнів, положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, II позиція, передній вид. Назвіть місце, де найкраще буде вислуховуватись серцебиття плода?

a. Ліворуч нижче пупка

b. Ліворуч вище пупка

c. Праворуч нижче пупка

d. Праворуч на рівні пупка

e. Праворуч вище пупка

662. Упацієнтки 19-ти років при проведенні огляду виявлено в правому кутику рота на гіперемованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Мікробна екзема

b. Простий лишай

c. Кандидозний стоматит

d. Стрептококова заїда

e. Простий герпес

663. Уроділлі в I-му періоді пологів виник різкий головний біль, порушення зору, АТ- 170/100 мм рт.ст. На висоті однієї з потуг - короточасна втрата свідомості з почерговим скороченням м'язів обличчя і тулуба. Яке ускладнення виникло у роділлі?

a. Прееклампсія важкого ступеня

b. Відшарування плаценти

c. Прееклампсія легкого ступеня

d. Прееклампсія середнього ступеня

e. Еклампсія

664. При зовнішньому акушерському обстеженні першовагітної жінки встановлено: дно матки розміщено посередені між пупком і мечеподібним відростком, ВСДМ- 28 см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140/хв., справа нижче пупка. Ваш діагноз:

a. Вагітність I, 24 тижні

b. Вагітність II, 26 тижнів

c. Вагітність I, 28 тижнів

d. Вагітність I, 30 тижнів

e. Вагітність I, 32 тижні

665. До акушерки ФАПу звернулась мати з дитиною 3-х років, яка захворіла 2 дні тому, температура - 37,8°C. На шкірі спини, сідниць плямисто-папульозна висипка, збільшені задньошийні та потиличні лімфатичні вузли. На яке захворювання вказують такі симптоми?

a. Вітряна віспа

b. Атопічний дерматит

c. Кір

d. Скарлатина

e. Краснуха

666. Жінці 42-х років, хворій на гострий аднексит, лікарем-гінекологом було призначено в/м введення цефтріаксона по 1 г два рази на день. Перед введенням антибіотика акушеркою була проведена в/ш проба на чутливість до лікарського засобу. Через який час потрібно оцінити результат даної проби?

a. Через добу

b. Через 20 хвилин

- c. Через 1 годину
- d. Через 30 хвилин
- e. Через 3 години

667. При прийомі на роботу акушерки у відділення патології вагітності проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Хто проводить даний інструктаж?

- a. Головний лікар
- b. Інженер з охорони праці
- c. Завідувач відділенням**
- d. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
- e. Головна акушерка

668. Акушерка-практикантка разом з лікарем веде II період пологів. Як часто вона повинна вислуховувати серцебиття плоду з метою контролю стану плоду?

- a. Під час прорізування голівки
- b. Через кожних 5 хвилин
- c. В паузах після кожної потуги**
- d. Під час кожної потуги
- e. Через кожних 15 хвилин

669. Хворій лікар призначив дослідження сечі на діастазу. Як треба зібрати сечу для цього дослідження?

- a. Середню порцію сечі у будь-який час
- b. Сечу збирають за 3 години
- c. Сечу збирають за 24 години
- d. Ранком, 100-150 мл сечі
- e. 50 мл сечі свіжовипущеної і теплої**

670. Акушерка пологового відділення надає допомогу при пологах. Уроділлі через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

- a. Провести ручне відокремлення посліду
- b. Ввести в/в 1 мл окситоцину
- c. Застосувати зовнішній прийом за Креде-Лазаревичем
- d. Застосувати зовнішній прийом за Гентером
- e. Запропонувати роділлі потужитись**

671. Пацієнтка прооперована з приводу субсерозної лейоміоми матки. Протягом якого терміну жінка повинна знаходитись під диспансерним наглядом після оперативного лікування?

- a. 10 місяців
- b. 2 роки
- c. 2 місяці
- d. 6 місяців**
- e. 12 місяців

672. Акушерку пологового відділення викликала пацієнтка, в якій виникло блювання "кавовою гущею". З анамнезу відомо, що хворіє на виразкову хворобу. Який лікарський препарат за призначенням лікаря застосує акушерка для надання невідкладної допомоги?

- a. Фізіологічний розчин
- b. Етамзілат натрію**
- c. Но-шпа
- d. Кетанов
- e. Мезатон

673. Під час огляду жінки 40-ка років акушерка ФАПу виявила, що тіло матки щільної консистенції, горbeste, збільшене в розмірах до 7-8 тижнів вагітності, рухоме при зміщенні, чутливе. Додатки без патологічних змін. Параметрії вільні. Жінка скаржиться на підвищену крововтрату під час менструацій, кровотечу, загальну слабкість. Шкірні покриви і видимі слизові

бліді. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Гормонпродукуюча пухлина яєчника

б. Симптомна міома матки

с. Рак ендометрію

д. Кіста обох яєчників

е. Дисфункціональна маткова кровотеча

674. Пацієнтка 65-ти років після вживання жирної та гострої їжі звернулася на ФАП зі скаргами на гострий біль в епігастральній та правій підреберній ділянках оперізуючого характеру, багаторазове блювання. Об'єктивно: Рс- 120/хв., АТ100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живіт під час пальпації болючий в епігастрії, відсутня пульсація черевної аорти. Який попередній діагноз?

а. Гострий гастрит

б. Гострий апендицит

с. Гострий холецистит

д. Гострий панкреатит

е. Загострення виразкової хвороби шлунка

675. Хвора 48-ми років скаржиться на загальну слабкість, різке схуднення, збільшення живота в об'ємі, болі внизу живота. Клініка виникла пізніше. Менструація не порушена, вагітностей не було. Живіт збільшений в розмірах. Вагінально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох боків від матки визначаються щільні, горбисті, нерухомі пухлини, які заповнюють порожнину малого таза. Який найбільш імовірний діагноз?

а. Кістоми яєчників

б. Рак яєчників

с. Міома матки

д. Рак тіла матки

е. Кісти яєчників

676. За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у вагітної кров на коагулограму. Уградуйовану пробірку конусоподібної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Яку кількість крові необхідно набрати у пробірку?

а. 7мл

б. .9мл

с. 3мл

д. 2мл

е. 5мл

677. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазку. З яких ділянок необхідно взяти мазок?

а. Зів та ніс

б. Носогорло

с. Задня стінка глотки

д. Зів

е. З-під язика

678. До акушерки звернулася жінка 36ти років, яка скаржиться на серцебиття, дратівливість, поганий сон, пітливість. Об'єктивно: пацієнтка робить багато зайвих рухів, мова швидка, очі блищать, екзофтальм, руки тремтять. Щитоподібна залоза збільшена. Пульс - 120/хв. АТ150/70 мм рт.ст. Найімовірніший попередній діагноз?

а. Ендемічний зоб

б. Гіпертонічна хвороба

с. Гіпотиреоз

д. Дифузний токсичний зоб

е. Цукровий діабет

679. До акушерки звернулася жінка 57-ми років, яка скаржиться на спрагу, сухість в роті, часте сечовиділення, схуднення. Хворіє майже рік. Об'єктивно: зріст - 160 см, маса тіла - 88 кг. Шкіра суха. Пульс - 74/хв., АТ- 150/80 мм рт.ст. Глюкоза у крові - 9,6 ммоль/л. Найімовірніший попередній діагноз?

- a. Мікседема
- b. Тиреотоксикоз
- c. Ендемічний зоб
- d. Гіпертонічна хвороба

e. Цукровий діабет

680. До акушерки звернулася жінка 28-ми років, яка скаржиться на загальну слабкість, кровотечі з ясен, крововиливи на шкірі. Хворіє 8 років. Об'єктивно: шкіра бліда. На шкірі грудної клітки крововиливи різного розміру та кольору (темночервоного, синього, зеленого, жовтого). Лімфатичні вузли не збільшені. Печінка, селезінка не збільшені. Який найімовірніший попередній діагноз?

a. Тромбоцитопенічна пурпура

- b. Геморагічний васкуліт
- c. Хронічний мієлолейкоз
- d. Хронічний лімфолейкоз
- e. Гемофілія

681. До акушерки звернулася жінка зі скаргами на сухий кашель, відчуття першіння в горлі, загальну слабкість, температура тіла - 37,2°C. Хворіє 3-й день. Об'єктивно: загальний стан задовільний, перкуторно над легеньми - ясний легеневиий звук. Аускультативно вислуховуються сухі хрипи. ЧДР- 18/хв. Пульс - 80/хв., ритмічний. АТ- 120/70 мм рт.ст. Найімовірніший попередній діагноз?

a. Туберкульоз легень

b. Гострий бронхіт

- c. Негоспітальна пневмонія
- d. Хронічний бронхіт
- e. Госпітальна пневмонія

682. До акушерки звернулася жінка 28-ми років, у якої 3 дні тому виник головний біль, набряки на обличчі, сеча кольору м'ясних помиїв, тупий біль у поперековій ділянці, температура тіла - 37,6°C. Шкіра бліда. Набряки на обличчі. Пульс - 82/хв., ритмічний, напружений. АТ- 175/115 мм рт.ст., добова кількість сечі - 350 мл. Найімовірніший попередній діагноз:

a. Гіпертонічна хвороба

b. Гострий гломерулонефрит

- c. Хронічний пієлонефрит
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Хронічний гломерулонефрит

683. До акушерки звернулася жінка 32-х років зі скаргами на появу на шкірі тулуба та кінцівок висипки різного розміру червоного кольору, свербіж шкіри, що з'явився після вживання полуниці. Пульс - 80/хв. АТ- 120/70 мм рт.ст. Найімовірніший попередній діагноз?

a. -

b. Кропив'янка

- c. Анафілактичний шок
- d. Набряк Квінке
- e. Гостра судинна недостатність

684. У жінки 42-х років напад ядухи з утрудненим видихом, який триває 1 год. Об'єктивно: обличчя ціанотичне. ЧД- 20/хв. Пульс - 100/хв., ритмічний. При перкусії над легеньми коробковий звук. Дихання ослаблене, сухі свистячі хрипи. Найімовірніший попередній діагноз?

a. Рак легень

b. Бронхіальна астма

c. Негоспітальна пневмонія

- d. Серцева астма
- e. Абсцес легень

685. На ФАП до акушерки звернувся хворий зі скаргами на підвищення температури тіла до 39,5°C, гострий початок хвороби, біль в попереку, литкових м'язах, різке зниження кількості сечі, іктеричність склер та шкіри. Про яке захворювання можна подумати:

- a. Лептоспіроз**
- b. Вірусний гепатит
- c. Лейшманіоз
- d. Токсоплазмоз
- e. Бруцельоз

686. На ФАП звернувся хворий зі скаргами на тривалу лихоманку, діарею більше місяця, збільшення лімфатичних вузлів, втрату ваги. З анамнезу: хворий наркоман. Яке захворювання можна запідозрити?

- a. Черевний тиф
- b. Сепсис
- c. Геморагічна лихоманка

d. СНІД

- e. Герпетична хвороба

687. Ви працюєте акушеркою у гінекологічному відділенні. Хвора після операції з приводу фіброміоми матки, скаржиться на здуття живота, невідходження газів. Про що можна думати?

- a. Хвороба Крона
- b. Гострий коліт
- c. Механічна кишкова непрохідність

d. Парез кишківника

- e. Виразкова хвороба шлунка

688. На прийомі у жіночій консультації молода жінка стверджує, що вона вагітна. Зі слів пацієнтки остання менструація відбулась три місяці тому. Скаржиться на нудоту, блювання, зміну смаку. При вагінальному обстеженні та при УЗД ознак вагітності не виявлено. Відомо, що через неприємності на роботі жінка потрапляє під кримінальну відповідальність. Поставте попередній діагноз:

a. Істеричний невроз (несправжня вагітність)

- b. МДП
- c. Психопатія
- d. Шизофренія
- e. Вагітність 12 тижнів

689. Породілля, 35-ти років, на 12 добу після пологів. Пологи ускладнились безводним періодом тривалістю 17 годин. Скаржиться на біль внизу живота, здуття, підвищення температури тіла до 39,5°C. Бімануальне дослідження утруднене через болючість. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. В крові - лейкоцитоз із різким зсувом формули вліво та збільшення ШОЕ. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Метроендометрит
- b. Сальпінгоофорит

c. Пельвіоперитоніт

- d. Параметрит
- e. Метротромбофлебіт

690. Де береться мазок для бактеріологічного дослідження в гінекології?

a. З цервікального каналу шийки матки

- b. З уретри
- c. Бокового склепіння піхви
- d. З переднього склепіння піхви
- e. З заднього склепіння піхви

691. Вагітна скаржиться на ядуху, різке збільшення живота. Строк вагітності 29 тижнів. Обвід живота - 120 см. Висота стояння дна матки - 38 см. Матка напружена, частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе, 140/хв. Про яке ускладнення йде мова?

- a. Гестоз вагітних
- b. Міхуровий занесок
- c. Аномалії розвитку плода

d. Багатоводдя

- e. Багатопліддя

692. Удекількох дітей дитячого садка однієї групи виявлені на шкірі ніг та обличчі поверхневі везикули з еритемою навкруги, вміст яких швидко перетворюється у пустули. Пустули швидко руйнуються з утворенням ерозії, поверхня яких покрита медово-жовтими кірочками, кількість елементів збільшується. Температура тіла субфебрильна. Ваш ймовірний діагноз:

- a. Фурункул
- b. Екзема
- c. Кандидоз

d. Імпетиго

- e. Карбункул

693. Ви акушерка ФАПу. Потерпілий 40-ка років після дорожньо-транспортної пригоди в стані непритомності, не визначається пульс на сонних артеріях, дихання відсутнє, зіниці розширені, рефлексів відсутні, шкіра блідо-сірого кольору. Визначте важкість стану потерпілого:

a. Клінічна смерть

- b. Преагонія
- c. Середньої тяжкості
- d. Дуже тяжкий
- e. Агонія

694. Пацієнт 30-ти років хворіє більше 10ти років, захворювання загострюється в осінньо-зимовий період. Об'єктивно: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні негостро запальні вузлики, бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками; суб'єктивно: незначна сверблячка. Для якого захворювання характерні дані ознаки?

- a. Червоний плоский лишай
- b. Суха себорея
- c. Нейродерміт

d. Псоріаз

- e. Червоний вовчак

695. При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути, не менш ніж:

- a. 1,75 м

b. 1м

- c. 1,5 м
- d. 0,8 м
- e. 2м

696. Хвора 45-ти років скаржиться на контактні кровотечі протягом останніх 5-ти місяців. При обстеженні: шийка матки гіпертрофована, має вигляд цвітної капусти, кровоточить при доторканні, щільної консистенції. Тіло матки, придатки без патології, склепіння глибокі. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Рак тіла матки
- b. Шийкова вагітність
- c. Поліпоз шийки матки

d. Рак шийки матки

- e. Фіброматозний вузол, що народжується

697. Ви акушерка пологового відділення. Породілля 28-ми років, III період пологів. Активна

тактика. Ви проводите огляд посліду на цілість. Вами встановлено: розміри плаценти: 15х20 см, товщина зменшена, маса - 750,0 г, пуповина тонка, в наявності ділянки петрифікатів і жирового переродження, є вогнища некрозу. Це свідчить про:

- a. Дистрес плода під час пологів
- b. Переношену вагітність**
- c. Нормальну доношену вагітність
- d. Невиношування вагітності
- e. Дистрес плода під час вагітності

698. В терміні 39-40 тижнів народилася жива дівчинка, вагою - 3500 г, зріст - 52 см, за Апгар - 8-9 балів, загальна крововтрата - 250 мл. Тривалість пологів 7 годин 20 хв. Які пологи відбулися?

- a. Передчасні пологи
- b. Фізіологічні пологи**
- c. Швидкі пологи
- d. Стрімкі пологи
- e. Затяжні пологи

699. В пологову палату поступила впершенароджуюча 26-ти років. Вкажіть нормальну тривалість латентної фази першого періоду пологів:

- a. 30 хвилин
- b. До 2 годин
- c. 1-2 години
- d. 5-6 годин
- e. Не більше 8 годин**

700. В пологовій палаті перебуває впершенароджуюча 26-ти років. Після вилиття навколоплідних вод акушерка провела внутрішнє акушерське обстеження і встановила передньоголове передлежання. Вкажіть провідну точку при цьому передлежанні:

- a. Середина лобного шва
- b. Мале тім'ячко
- c. Велике тім'ячко**
- d. Підборіддя
- e. Ніс

701. Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що у дна матки пальпується округла, щільна, балотуюча частина плода, спинка розташована з лівого боку матки. Визначте передлежання та позицію плода:

- a. Тазове передлежання, перша позиція**
- b. Тазове передлежання, друга позиція
- c. Поперечне положення, перша позиція
- d. Головне передлежання, друга позиція
- e. Головне передлежання, перша позиція

702. У впершенароджуючої народився живий доношений хлопчик масою - 3200 г. Наступна дія акушерки з метою профілактики кровотечі, при активному веденні III-го періоду пологів:

- a. Провести зовнішній масаж матки
- b. Накласти зажим на пуповину біля входу в піхву та очікувати ознак відокремлення посліду
- c. Ввести 1,0 мл 1% вікасолу в/м
- d. Ввести в/м 10 ОД окситоцину**
- e. Застосувати зовнішні прийоми виділення посліду (Абуладзе)

703. Породілля звернулася до акушерки ФАПу зі скаргами на підвищення t° до 39-40 $^{\circ}$ C, біль внизу живота, головний біль, спрагу, слабкість. Пологи відбулися тиждень тому, розриви на шийці матки. При піхвовому дослідженні визначається інфільтрат зліва від матки. Попередній діагноз:

- a. Метроендометрит
- b. Параметрит**

- c. Сальпінгоофорит
- d. Ендо метрит
- e. Пельвіоперитоніт

704. Жінка 68-ми років скаржиться на свербіж, печіння зовнішніх статевих органів. При огляді визначається сухість шкіри зовнішніх статевих органів, атрофія статевих губ. Який попередній діагноз?

- a. Рак зовнішніх статевих органів
- b. Крауроз**
- c. Кольпіт
- d. Вульвіт
- e. Лейкоплакія

705. Вагітна - I вагітність 36 тижнів поступає в пологовий будинок у відділення патології вагітних з ознаками пізнього гестозу. Який документ повинна мати собі вагітна?

- a. Обмінну карту**
- b. Карту диспансерного спостереження
- c. Контрольну карту спостереження
- d. Історію пологів
- e. Індивідуальну карту вагітної та породіллі

706. В гінекологічне відділення звернулась хвора 48-ми років зі скаргами на рясну кровотечу зі статевих шляхів після затримки місячних протягом 2-х місяців, слабкість, запаморочення. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, тахікардія. При гінекологічному обстеженні: тіло матки нормальних розмірів, безболісне, рухоме; придатки з обох боків не визначаються. Який імовірний діагноз у хворої?

- a. Міома матки
- b. Аденокарцинома ендометрію
- c. Внутрішній ендометріоз
- d. Клімактерична дисфункціональна кровотеча**
- e. Перервана вагітність

707. Жінка 26-ти років, 6 місяців тому відбулись пологи. Звернулась в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність місячних. Дитина на грудному вигодовуванні. При вагінальному обстеженні: матка звичайних розмірів, щільної консистенції. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Синдром Шихана
- b. Фізіологічна аменорея**
- c. Псевдоаменорея
- d. Вагітність
- e. Синдром Ашермана

708. Хвору 30-ти років госпіталізовано в гінекологічне відділення зі скаргами на біль ниючого характеру внизу живота, який іррадіює в поперек, підвищення температури до 37,3°C. Об'єктивно: шийка матки циліндричної форми, зів закритий. Тіло матки нормальних розмірів, не боліє, рухоме. Придатки дещо збільшені, обмежені в рухливості, болічі з обох боків. Склепіння вільні. Виділення білі. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний сальпінгоофорит**
- b. Пельвіоперитоніт
- c. Кіста яєчника
- d. Синдром полікістозних яєчників
- e. Ендо метрит

709. Хвора 29-ти років доставлена бригадою швидкої допомоги в стаціонар зі скаргами на гострі болі внизу живота, блювання, часте сечовипускання. При огляді: живіт помірно здутий, симптом Щоткіна-Блумберга - позитивний. Пульс - 88/хв., температура - 37°C. При бімануальному дослідженні: тіло матки щільне, не збільшене, рухоме, не боліє, справа та спереду від матки пальпується утворення 6х6 см, тугоеластичної консистенції, різко боліє при зміщенні, зліва додатки не визначаються, виділення слизові. Який найімовірніший діагноз?

а. Перекрут ніжки пухлини яєчника

- b. Кишкова непрохідність
- c. Гостре запалення придатків матки
- d. Ниркова колька
- e. Апоплексія яєчника

710. У26-річної породіллі на 4-ту добу після пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршується: температура тіла - 36,7°C, Ps94/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Матка болюча, дно її на рівні пупка. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком визначається м'яка тканина, згортки крові. При огляді кровотеча посилилась. Яка подальша тактика?

а. Інструментальна ревізія порожнини матки

- b. Надпіхвова ампутація матки
- c. Зовнішній масаж матки після спорожнення сечового міхура
- d. Ручне обстеження порожнини матки та видалення часток плаценти, що затрималась
- e. Введення препаратів, що скорочують матку

711. Жінка 26-ти років, звернулась на ФАП зі скаргами на затримку менструації на 2 місяці. Унеї резус-негативний фактор крові. Які потрібно провести додаткові обстеження?

а. Групу крові та резус-належність чоловіка

- b. Групу крові жінки
- c. Кількість тромбоцитів
- d. Гемоглобін
- e. Щомісяця титр резус-антитіл

712. Впершенароджуюча в терміні 3940 тижнів. І період пологів. Положення плоду повздовжнє. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття вічка до 5 см. Плодовий міхур цілий. Визначаються сідниці і ступні плоду. Яке передлежання плоду?

- a. Неповне ніжне передлежання
- b. Колінне передлежання
- c. Чисте сідничне передлежання
- d. Повне ніжне передлежання

е. Змішане сідничне передлежання

713. При огляді плаценти, яка щойно народилась, встановлено наявність дефекту розміром 2х3 см. Кровотечі немає. Яка тактика найбільш виправдана?

а. Інструментальна ревізія порожнини матки

б. Ручна ревізія матки

- c. Зовнішній масаж матки
- d. Призначення утеротонічних препаратів
- e. Нагляд за породіллею

714. Повторнонароджуюча 26-ти років у терміні 40 тижнів. Перейми почались 8 годин тому. 2 години тому відійшли навколоплідні води. Положення плоду повздовжнє, головне передлежання. ОЖ100 см, ВДМ- 42 см. Перейми через 45 хвилин, по 10-15 секунд. Шийка матки згладжена, відкриття 4 см. Плодового міхура немає. Голівка плоду притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло у пологах?

а. Первинна слабкість пологової діяльності

- b. Вторинна слабкість пологової діяльності
- c. Клінічно вузький таз
- d. Дискоординована пологова діяльність
- e. Передчасне відходження навколоплідних вод

715. Доношена вагітність. Маса тіла вагітної - 62 кг. Поздовжнє положення плода, голівка плоду притиснута до входу в малий таз. Окружність живота - 100 см. Висота дна матки - 35 см. Яка орієнтовна маса плода?

а. 4кг500г

б. 3кг500г

- c. 2кг500г
- d. 4кг
- e. 3кг

716. Вагітній жінці введено периферійний катетер для проведення інфузійної терапії. За призначенням лікаря, акушерці необхідно здійснити забір венозної крові для біохімічного дослідження. Вкажіть розчин, яким необхідно попередньо промити катетер:

- a. 1% розчином гепарину**
- b. 3% розчином перексиду водню
- c. Розчином фурациліну 1:5000
- d. 2% розчином натрію гідрокарбонату
- e. 0,9% розчином натрію хлориду

717. До ФАПу звернулася мати дитини віком 6 років зі скаргами на нездужання, підвищену температуру тіла до 39°C, блювання, часті зеленого кольору випорожнення, надмірні та пінисті, смердючі, з домішками слизу, крові. При пальпації живота: біль у надчеревній ділянці. Вкажіть захворювання, для якого найбільш характерні дані симптоми:

- a. Проста диспепсія
- b. Токсична диспепсія
- c. Дизентерія
- d. Холера

e. Сальмонельоз

718. Уновонародженої дитини t° тіла 39°C, повторне блювання, ригідність м'язів потилиці, позитивні симптоми Брудзінського та Керніга, геморагічний висип з елементами зіркоподібної форми на тілі. Визначте діагноз:

- a. Лейкоз
- b. Менінгококцемія**
- c. Туберкульозний менінгіт
- d. Гемофілія
- e. Геморагічний васкуліт

719. Акушерці пологового відділення необхідно пояснити молодшій медичній сестрі умови генерального прибирання в маніпуляційному кабінеті даного відділення. Вкажіть періодичність генерального прибирання в маніпуляційному кабінеті:

- a. Один раз на тиждень**
- b. Щоденно
- c. На початку і в кінці зміни
- d. Кожну зміну
- e. Один раз на місяць

720. Акушерку викликали до хворої 38ми років. Захворіла гостро: рясні водянисті випорожнення, блювання. До звернення блювання спостерігалось тричі, випорожнення - 6 разів. Об'єктивно: стан важкий. Скаржиться на слабкість, спрагу. Шкіра бліда, ціаноз губ, риси обличчя загострилися. Язик сухий, обкладений білим нальотом. Судоми литкових м'язів. Тургор шкіри знижений. Голос ослаблений, температура тіла - 36°C. Ps- 126/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., ЧД- 34/хв. Живіт під час пальпації безболісний. Який попередній діагноз?

- a. Холерний гастроентерит**
- b. Сальмонельоз
- c. Шигельоз
- d. Гостра кишкова інфекція
- e. Харчова токсикоінфекція, гіповолемічний шок

721. Употерпілого діагностовано клінічну смерть. Яке співвідношення натискань на грудну клітку та вдихів при проведенні серцево-легеневої реанімації у дорослого?

- a. 2:15
- b. 2:30
- c. 30:2**

d. 1:5

e. 5:1

722. Дитині 3 роки. Хворіє 3-й день. Стан середньої тяжкості. Температура тіла 38,2°C. На шкірі обличчя та верхній половині тулуба дрібноцяткова розеольозна висипка, світлобоязнь, кон'юнктивіт. Що з дитиною?

a. Скарлатина

b. Ексудативно-катаральний діатез

c. Вітряна віспа

d. Краснуха

e. Кір

723. Увагітної жінки після переохолодження з'явилися слабкість, вологий кашель, біль в нижніх відділах грудної клітки справа. Об'єктивно: шкіра бліда, t°38,1°C, в нижніх відділах правої легені аускультативно - крепітація, перкуторно там же притуплення перкуторного тону. Ці симптоми свідчать про наявність у хворої:

a. Ексудативного плевриту

b. Негоспітальної пневмонії

c. Бронхіальної астми

d. Гострого бронхіту

e. Сухого плевриту

724. До ФАПу звернулась жінка 30-ти років зі скаргами на біль в ділянці соска лівої молочної залози. При огляді: на шкірі соска й ареоли сухі, щільні кірочки, тріщини з яскраво-червоною поверхнею, що мокнуть. Упахвовій ділянці зліва пальпуються безболісні лімфатичні вузли. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Екзема соска зліва

b. Алергічний дерматит

c. Хронічний мастит

d. Рак Педжета

e. Мастопатія

725. Пацієнтці з хронічним ентероколітом лікар призначив іригоскопію. Воду якої температури оптимально застосувати для постановки очисної клізми?

a. 35-37°C

b. 35-36°C

c. 28-32°C

d. 37-38°C

e. 38-39°C

726. Пацієнт 35-ти років, звернувся зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, слинотеча, головний біль, підвищена температура тіла, пронос. Об'єктивно: шкіра бліда, язик обкладений білим нальотом. Живіт болісний в епігастральній ділянці. З анамнезу відомо, що 5 годин тому обідав у їдальні. Які ваші першочергові дії?

a. Промити шлунок

b. Призначити ліжковий режим

c. Ввести антикоагулянти

d. Ввести анальгетики

e. Призначити дієту №1

727. До вас звернулась пацієнтка зі скаргами на напад болю у попереку, який іррадіює в стегно, промежину. В анамнезі сечокам'яна хвороба. Яка долікарська допомога першочергова?

a. Сечогінні засоби

b. Міхур з льодом на епігастральну ділянку

c. Міхур з льодом на попереки

d. Знеболюючі засоби

e. Грілка на попереки

728. Акушерка бере участь у переливанні крові. Після швидкого переливання 900 мл свіжої консервованої еритроцитарної маси пацієнтка відчуває утруднене дихання, біль в ділянці серця. АТ знижений, t° - $36,8^{\circ}\text{C}$, пульс аритмічний, підвищений ЦВТ. Яке ускладнення розвинулось у хворої?

a. Гемотрансфузійний шок

b. Цитратний шок

c. Гостре розширення серця

d. Післятрансфузійна гарячка

e. Геморагічний шок

729. Пацієнтка 50-ти років, впродовж 10ти років хворіє на гіпертонічну хворобу, гіпотензивні препарати приймає нерегулярно. Після фізичного і психічного навантаження раптово з'явилися сильний головний біль, нудота, блювання, стала збуджена. При обстеженні: стан свідомості коматозний, гіперемія обличчя, АТ200/100 мм рт.ст., пульс - 54/хв., напружений. Позитивні симптоми Керніга, Брудзінського, ригідність потиличних м'язів. Температура тіла нормальна. Назвіть ускладнення гіпертонічної хвороби:

a. Минуще порушення мозкового кровообігу

b. Субарахноїдальний крововилив

c. Арахноїдит

d. Інфаркт міокарду

e. Гіпертонічний криз

730. На ФАП звернувся пацієнт 40ка років, із скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання, підвищення температури тіла до $37,3^{\circ}\text{C}$. При обстеженні живота виявляють позитивні симптоми Ровзінга, Воскресенського і Сітковського. Про яке захворювання потрібно подумати?

a. Ниркова коліка

b. Перфоративна виразка

c. Защемлена грижа

d. Гострий холецистит

e. Гострий апендицит

731. Пацієнту 39-ти років, потрапив в лікарню з гострим болем, температура тіла - 40°C , ознобом. Під час огляду виявили набряк і гіперемію шкіри калитки. Яке захворювання у пацієнта?

a. Рак сечового міхура

b. Парафімоз

c. Фімоз

d. Орхіт

e. Водянка яєчка

732. Учоловіка після фізичного навантаження раптово виник біль в ділянці випинання, збільшення об'єму грижі, неможливість вправлення грижового вмісту в черевну порожнину. Імовірний діагноз:

a. Кишкова непрохідність

b. Гострий холецистит

c. Защемлена грижа

d. Гострий апендицит

e. Проривна виразка шлунка

733. До акушерки звернулась мати з 1,5річною дитиною, зі скаргами на незвичайні зміни в кінцівках, неспокій дитини. Об'єктивно: дитина неспокійна, плаче. Нижні кінцівки зігнуті в колінних та кульшових суглобах, стопи в стані різкого плантарного згинання, пальці кистей рук тонічно напружені, рука нагадує "руку акушера". Про яке захворювання треба думати?

a. Латентна форма спазмофілії

b. Рахіт, період розпаду

c. Спазмофілія, ларингоспазм

d. Спазмофілія, еклампсія

e. Спазмофілія, карпопедальний спазм

734. Акушерка проводить плановий огляд дівчинки 6-ти місяців. Удитини майже зникла підшкірна жирова клітковина на животі, кінцівках, маса тіла знизилась на 24%. На що вказують ці симптоми?

a. Гіпотрофія III ступеня

b. Гіпотрофія II ступеня

c. Гіпотрофія I ступеня

d. Хронічний гастрит

e. Простий гастроентерит

735. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 74-х років зі скаргами на постійний біль в дистальних відділах нижніх кінцівок, який посилюється вночі, оніміння пальців стоп. Шкіра бліда, холодна, суха, виражена гіпотрофія м'язів обох гомілок, відсутня пульсація на підколінних артеріях. Яке захворювання слід запідозрити?

a. Посттромбофлебітичний синдром

b. Облітеруючий атеросклероз

c. Хвороба Рейно

d. Облітеруючий ендартеріїт

e. Варикозна хвороба

736. При народженні дитини на 40 тижні вагітності проводиться комплекс заходів I туалет новонародженого. Оцінка за шкалою Апгар 1 хв. - 9 балів, 5 хв. - 10 балів. Визначте черговість проведення зважування новонародженої дитини:

a. Через 5 хвилин після народження

b. Відразу після народження

c. Після контакту "шкіра-до-шкіри"

d. Через 2 години після народження

e. Перед контактом "шкіра-до-шкіри"

737. Після народження дитини на першій хвилині життя серцебиття менше 100, дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлексії слабкі, тонус м'язів знижений. Визначте, для якого стану характерні такі проблеми?

a. Внутрішньочерепна пологова травма

b. Кефалогематома

c. Асфіксія новонародженого

d. Колапс

e. Гемолітична хвороба новонародженого

738. В стаціонар поступила жінка з інтенсивним оперізуючим болем у надчеребній ділянці, нудотою, блюванням. Погіршення стану пов'язує з вживанням алкоголю та жирної, гострої їжі. В сечі підвищена діастаза. Який препарат слід підготувати за призначенням лікаря?

a. Альмагель

b. Сульфат магнію

c. Контрикал

d. Лазикс

e. Ціанокобаламін

739. На ФАП звернулась жінка, у якої на 5 добу після введення сироватки підвищилась температура тіла до 39°C, з'явився біль в суглобах, висип на шкірі еритематозного характеру, біль в серці, при пальпації визначаються збільшені лімфовузли, АТ- 90/60 мм рт.ст. Про яке захворювання можна думати?

a. Дерматит

b. Сироваткова хвороба

c. Набряк Квінке

d. Кропив'янка

e. Анафілактичний шок

740. У дитини 5-ти років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате на-шарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазку. З яких ділянок необхідно провести мазок?

- a. Зів
- b. Носогорло
- c. З-під язика
- d. Задня стінка глотки

e. Зів та ніс

741. Роділля 40 тижнів, положення плода поздовжнє, голівка притиснута до входу в малий таз. розміри таза: 27-28-31-17. Індекс Соловйова - 14 см. Діагональна кон'югата - 9,5 см. Яка форма кісткового таза?

- a. Загальнорівномірно звужений
- b. Простий плоский

c. Плоскоракітичний

- d. Поперечнозвужений
- e. Таз нормальних розмірів

742. В пологовій залі народжує повторновагітна 38-39 тижнів вагітності. Акушерка надає ручну допомогу за Цов'яновим І. При якому виді тазового передлежання найбільш доцільно надавати таку допомогу?

- a. Колінне передлежання
- b. Ножне передлежання

c. Чисто сідничне передлежання

- d. Змішане сідничне передлежання
- e. Головне передлежання

743. Яким розміром голівка проходить плоскоракітичний таз?

- a. Середнім косим
- b. Вертикальним розміром
- c. Малим косим

d. Прямим розміром

- e. Великим косим

744. Ви акушерка пологового відділення. Першороділля, термін вагітності 42-43 ти-жні. Перейми по 20 секунд через 5-6 хвилин протягом 4 годин. При внутрішньому акушерському дослідженні: відкриття шийки матки 3 см, плоский плідний міхур, перед лежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Встановіть діагноз:

- a. Вагітність І, 42-43 тижні, переношена, І період пологів, раннє відходження вод
- b. Вагітність І, 42-43 тижні, переношена, передчасне відходження вод
- c. Вагітність І, 42-43 тижні, переношена, І період пологів, активна фаза
- d. Вагітність І, 42-43 тижні, переношена, ІІ період пологів

e. Вагітність І, 42-43 тижні, переношена, І період пологів, латентна фаза

745. Першовагітна 20-ти років з інтенсивною пологовою діяльністю. Скарги на го-ловний біль, порушення зору, загальмованість. АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки ніг, передньої черевної стінки. Голова плода в порожнині малого таза. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 180/хв. Відкриття шийки матки повне. Яка тактика ведення пологів?

- a. Кесарів розтин
- b. Стимуляція пологової діяльності
- c. Консервативне ведення пологів з епізіотомією

d. Накладання акушерських щипців

- e. Плродоруйнівна операція

746. Жінка звернулася зі скаргами на посилення болю в епігастрії, слабкість, запа-морочення, задишку, серцебиття, відмічає відходження калу чорного кольору. На-звіть найбільш ймовірне ускладнення захворювання:

а. Шлункова кровотеча

- b. Перфорація виразки
- c. Гострий гастрит
- d. Стеноз ворота
- e. Печінкова коліка

747. Хвора, 22 роки, звернулась до ж/к зі скаргами на затримку менструації на 5 місяців. Протягом останніх 3-х років менструації нерегулярні (1 раз в 3-4 місяці). Заміжня 2 роки. Вагітностей не було. Менархе з 16 років. Виражене ожиріння і ознаки гірсутизму. Р.У: матка звичайних розмірів; яєчники з обох сторін збільшені, щільні, рухомі, безболісні. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Синдром Іценко-Кушинга
- b. Синдром Шерешевського-Тернера

с. Синдром Штейна-Левентала

- d. Синдром Шихана
- e. Синдром Кіарі-Фромеля

748. Вагітна 20-ти років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що у дні матки пальпується округла, щільна, балотуюча частина плода, спинка розташована з лівого боку матки. Визначте передлежання та позицію плода:

- a. Головне передлежання, перша позиція
- b. Тазове передлежання, друга позиція
- c. Поперечне положення, перша позиція
- d. Головне передлежання, друга позиція
- e. Тазове передлежання, перша позиція**

749. Повторнонароджуюча 26-ти років у терміні 40 тижнів. Перейми почались 8 годин тому. 2 години тому відійшли навколоплідні води. Положення плода пов-здовжнє, головне передлежання. ОЖ- 100 см, ВДМ- 42 см. Перейми через 4-5 хвилин, по 10-15 секунд. Шийка матки згладжена, відкриття 4 см. Плодового міхура немає. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Яке ускладнення виникло у пологах?

- a. Вторинна слабкість пологової діяльності
- b. Клінічно вузький таз
- c. Первинна слабкість пологової діяльності**
- d. Дискоординована пологова діяльність
- e. Передчасне відходження навколоплідних вод

750. До ФАПу звернулась жінка 30-ти років зі скаргами на біль в ділянці соска лівої молочної залози. При огляді: на шкірі соска й ареоли сухі, щільні кірочки, тріщини з яскраво-червоною поверхнею, що мокнуть. У паховій ділянці зліва пальпуються безболісні лімфатичні вузли. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний мастит
- b. Алергічний дерматит
- c. Екзема соска зліва

d. Рак Педжета

- e. Мастопатія

751. Ви акушерка пологового будинку. У породіллі супутнє захворювання цукровий діабет. їй призначено ввести 20 ОД інсуліну (флакони по 100 ОД інсуліну в 1 мл). Скільки мл інсуліну необхідно набрати в шприц об'ємом 2 мл?

- a. 0,5 мл
- b. 0,2 мл**
- c. 1 мл
- d. 0,4 мл
- e. 2 мл

752. У пацієнтки з пневмонією, на фоні лікування антибіотиками розвинулась криза: температура тіла знизилась протягом 2-х годин з 40,3°C до 36,2°C. При цьому самопочуття

погіршилось; пацієнтка зблідла, вкрилась холодним потом, скаржи-ться на слабкість, потемніння в очах, АТ-70/40 мм рт.ст., Рз-100/хв., ниткоподібний. Яке ускладнення найбільш імовірне в даному випадку?

- a. Анафілактичний шок
- b. Колапс**
- c. Кардіогенний шок
- d. Непритомність
- e. Гостра серцева недостатність

753. Чоловік 66-ти років після сну відчув слабкість у руці та нозі з лівої сторони, оніміння половини обличчя зліва, порушення ковтання, мови. При огляді відмічались парез зліва, тахікардія. Поставте діагноз:

- a. Геморагічний інсульт
- b. Ішемічний інсульт**
- c. Минуще порушення мозкового кровообігу
- d. Синдром Гійєна-Барре
- e. Розсіяний склероз

754. Потерпілий 22-х років отримав електротравму. Виникло судомне скорочення м'язів, втратив свідомість. З чого слід почати надання допомоги?

- a. Оцінити загальний стан пацієнта
- b. Викликати бригаду швидкої допомоги
- c. Розстебнути комір, дати понюхати нашатирний спирт
- d. Звільнити потерпілого від джерела струму**
- e. негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

755. Хвора 45-ти років звернулася на ФАП, захворіла 8 годин тому, коли вперше від-чула біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу, було одноразове блювання. При пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м'язів, позитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:

- a. Кишкову непрохідність
- b. Гострий панкреатит
- c. Гострий апендицит**
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Гострий холецистит

756. Мати дитини 3-х років скаржиться на кашель, який поступово підсилювався впродовж 2-х тижнів. Об'єктивно: стан здоров'я дитини середньої важкості, тем-пература тіла - 37,6°C, шкіра бліда. Частий нападоподібний кашель, закінчується виділенням склоподібного харкотиння та глибоким свистячим вдихом. Вкажіть най-більш імовірний діагноз:

- a. Кашлюк**
- b. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- c. Пневмонія
- d. Кір
- e. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних залоз

757. До акушерки діагностичного відділення звернулася жінка, яка хворіла на виразкову хворобу шлунка. Після вечері різко виникла слабкість, запаморочення, при акушерці було блювання "кавовою гущею". Шкірні покрови бліді, вологий, холодний піт на чолі, пульс - 110/хв., слабкий, АТ- 100/60 мм рт.ст. Живіт м'який, помірно болючий в епігастрії. Про яке ускладнення слід подумати?

- a. Кровотеча з товстого кишківника
- b. Гострий панкреатит
- c. Гостра шлункова кровотеча**
- d. Пенетрація виразки шлунка
- e. Перфоративна виразка

758. Хвора 25-ти років звернулася до акушерки ФАПу зі скаргами на значні пінисті виділення із вагіни протягом тижня, печіння та свербіж в області геніталій. При огляді слизова вагіни гіперемійована. В області уретри визначаються білі, піни-стого характеру виділення. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хламідіоз
- b. Кандидомікоз вагіни
- c. Трихомонадний кольпіт**
- d. Бактеріальний вагіноз
- e. Гонорея

759. Пацієнтка 50-ти років, впродовж 10-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу, гіпотензивні препарати приймає нерегулярно. Після фізичного і психічного навантаження раптово з'явилися сильний головний біль, нудота, блювання, стала збуджена. При обстеженні: стан свідомості коматозний, гіперемія обличчя, АТ- 200/100 мм рт.ст., пульс - 54/хв., напружений. Позитивні симптоми Керніга, Брудзинського, ригідність потиличних м'язів. Температура тіла нормальна. Назвіть ускладнення гіпертонічної хвороби:

- a. Минуще порушення мозкового кровообігу
- b. Інфаркт міокарда
- c. Арахноїдит
- d. Субарахноїдальний крововилив**
- e. Гіпертонічний криз

760. Жінка 37-ми років, після перенесеної ГРВІ, відчула головний біль постійного характеру без певної локалізації, який супроводжувався блюванням і підвищенням чутливості до світла і шуму. Об'єктивно: $t_{\text{о}} - 38,8^{\circ}\text{C}$, гіпергідроз; хвора збуджена, не орієнтується у місці і часі, не може нахилити голову вперед; під час розгинання ноги, зігнутої під прямим кутом в колінах та кульшовому суглобах, виявляється опір м'язів. Поставте діагноз:

- a. Грипозний енцефаліт
- b. Арахноїдит
- c. Туберкульозний менінгіт
- d. Менінгококовий менінгіт
- e. Гострий серозний менінгіт**

761. Хвора 37-ми років скаржиться на нездужання, зниження працездатності, підвищення температури тіла до $37,6^{\circ}\text{C}$, першіння в горлі, кашель з виділенням сли-зистого харкотиння, які з'явилися через 4 дні після перенесеної ГРВІ. Об'єктивно: загальний стан задовільний. Перкуторно: легеневий звук; аускультативно: жорстке дихання, поодинокі сухі хрипи. Рентгенографія органів грудної клітки - без змін. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Хронічний бронхіт
- b. Бронхіальна астма
- c. Негоспітальна пневмонія
- d. Гострий бронхіт**
- e. Бронхоектатична хвороба

762. Хвора 35-ти років скаржиться на болі в горлі при ковтанні, зниження апетиту, підвищена температури тіла - 38°C . При огляді: зів гіперемійований, на мигдаликах фібринні плівки сіруваті з перламутровим відтінком. Збільшені болючі регіональні лімфатичні вузли. Ваш попередній діагноз:

- a. Дифтерія**
- b. Грип
- c. Аденовірусна інфекція
- d. Парагрип
- e. Бешиха

763. Акушерка проводить зовнішнє акушерське обстеження у вагітної в терміні 32 тижні. Визначено: в ділянці дна матки пальпуються 2 великі частини плода, над входом у таз - балотуюча щільна, кругла частина плода. Обвід живота - 110 см, висота дна матки - 38 см. Ваш

діагноз:

- a. Аномалія розвитку плода
- b. Багатоводдя

c. Багатопліддя

- d. Великий плід
- e. Помилка в діагностиці терміну вагітності

764. Роділля 28-ми років доставлена до пологового будинку з бурхливою пологовою діяльністю. Пологи перші. Розміри таза: 23-25-28-18 см. Ознака Генкеля-Вастена позитивна. Роділля збуджена, живіт напружений, болісний в нижніх відділах. Контракційне кільце на рівні пупка, розташоване косо. Голівка плода притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плода - 140/хв. Яке ускладнення виникло у роділ-лі?

a. Загроза розриву матки

- b. Дискоординація пологової діяльності
- c. Розпочатий розрив матки
- d. Завершений розрив матки
- e. Надмірна пологова діяльність

765. У хворої на гострий інфаркт міокарда на фоні посилення больового синдрому та аритмії з'явилися різка блідість шкіри, акроціаноз, АТ- 80/40 мм рт.ст. Про яке ускладнення можна подумати?

- a. Перикардит
- b. Непритомність
- c. набряк легень
- d. Серцева астма

e. Кардіогенний шок

766. Термінові пологи. Народився хлопчик масою 4200 г. В анамнезі у матері 3 аборт-ти, останній із септичним ускладненням, тривалим лікуванням. Третій період пологів триває 30 хвилин. Ознаки відділення плаценти негативні. Кров'яністі виділення відсутні. Яка можлива патологія III періоду пологів?

- a. Слабкість послідових перейм
- b. Дефект посліду

c. Справжнє прирощення плаценти

- d. Кровотеча
- e. Травма м'яких пологових шляхів

767. У вагітної плід розташований у повздовжньому положенні сідничного пере-длежання другої позиції. Де краще вислухати серцеві тони плода?

- a. Праворуч нижче пупка
- b. Праворуч на рівні пупка
- c. Ліворуч вище пупка

d. Праворуч вище пупка

- e. Ліворуч нижче пупка

768. Дитину вкусила комаха у підборіддя. На місці укусу шкіра почервоніла, швидко почав поширюватись набряк обличчя, шиї. Якій патології відповідає такий стан?

a. набряк Квінке

- b. Алергічний діатез
- c. Кропив'янка
- d. Больовий шок
- e. Спазмофілія

769. Жінка 32-х років скаржиться на різкий біль у правому підребер'ї, який з'явився після вживання смаженого м'яса. При обстеженні відмічається напруження м'язів і болючість у правому підребер'ї. Вкажіть патогномонічні симптоми, характерні для даного захворювання:

- a. Симптоми Кохера, Бортон'є-Міхельсона
- b. Симптоми Ровзінга, Воскресенського

с. Симптоми Роздольського, Мейо-Робсона

д. Симптоми Ситковського, Керте

е. Симптоми Ортнера, Кера

770. У породіллі через 5 годин після перших нормальних пологів зі статевих шляхів виділилось до 150 мл крові зі згустками. Матка тістуватої консистенції. Під час зовнішнього масажу матки виділилось ще 200 мл крові. Яке ускладнення виявила акушерка післяпологового відділення:

а. Пізня післяпологова кровотеча

б. Рання післяпологова кровотеча

с. Розрив шийки матки

д. Нормальне скорочення матки

е. Дефект посліду

771. Який симптом є діагностично значущим при клінічно вузькому тазі?

а. Кюстнера-Чукалова

б. Шредера

с. Генкеля-Вастена

д. Абуладзе

е. Гентера

772. В пологовій палаті перебуває впершенароджуюча 22-х років. Після вилиття навколоплідних вод акушерка пропальпувала у неї над лоном поперечну борозну. Що це?

а. Міжостьова лінія

б. Нижній сегмент

с. Контракційне кільце

д. Цервікальний канал

е. Верхній сегмент

773. Ви працюєте акушеркою ФАПу. Пацієнтці призначено введення антибіотика. Вкажіть першочергові дії в профілактиці алергічних реакцій:

а. Зробити першу ін'єкцію в кількості 1/3 призначеної дози

б. Зробити першу ін'єкцію в кількості 1/2 призначеної дози

с. Виконати пробу на індивідуальну чутливість до препарату

д. Спостерігати за пацієнткою протягом 24 годин після ін'єкції

е. Спостерігати за пацієнткою протягом 20 хвилин після ін'єкції

774. При огляді новонародженої дитини віком 1 доба, акушерка пологового будинку виявила рухливе утворення на голівці, що не виходить за межі однієї кістки, при пальпації флюктує. Який патологічний стан запідозрить акушерка?

а. Пологова пухлина

б. Гемангіома

с. Кефалогематома

д. Внутрішньочерепна травма

е. Перелом кістки черепа

775. Пацієнтці гінекологічного відділення, призначено дослідження харкотиння на виявлення мікобактерій туберкульозу. Акушерка пояснює, впродовж якого часу вона повинна збирати харкотиння:

а. 4 доби

б. 3-5 діб

с. 4-5 діб

д. 1-3 доби

е. 3-4 доби

776. Малий косий розмір голівки доношеного плода становить:

а. 12

б. 9,5

с. 13,5

d. 11

e. 14

777. Ви акушерка пологового відділення. Роділля 25-ти років. Пологи I, термінові. II період пологів. II момент біомеханізму пологів. Положення плода повздожнє, I позиція, передній вид, потиличне передлежання. Як називається II момент біомеханізму пологів?

a. Внутрішній поворот голівки

b. Внутрішній поворот тулуба, зовнішній поворот голівки

c. Згинання голівки

d. Додаткове згинання голівки

e. Розгинання голівки

778. До акушерки ФАПу звернулася жінка 38-ми років зі скаргами на біль в правому підребер'ї, який іррадіює в праве плече, лопатку. Було блювання з домішками жовчі. Захворіла після надмірного вживання смаженої їжі. При огляді: склери жовтуваті, язик обкладений. При пальпації живіт м'який, різко болючий в правому підребер'ї, позитивний симптом Ортнера. Що слід запідозрити?

a. Перфоративна виразка шлунка

b. Гострий панкреатит

c. Гострий апендицит

d. Гострий холецистит

e. Правобічна ниркова коліка

779. Ви акушерка жіночої консультації. Проводите вимірювання зовнішніх розмірів таза. При пельвіометрії Вами встановлено: *distanti spinarum* - 26 см, *distancia cristarum* - 29 см, *distancia thochanterica* - 32 см. *Conjugata externa* - 20 см. Індекс Соловйова - 16 см. Визначте величину справжньої кон'югати:

a. 9 см

b. 12 см

c. 10 см

d. 13 см

e. 11 см

780. При огляді пацієнта 75-ти років. Свідомість та всі рефлекси відсутні. Ознаки діяльності серцево-судинної та дихальної системи не визначаються. Виявлено залякання м'язів, трупні плями. Розм'якшення очного яблука, сухість та помутніння рогівки. Який ймовірний діагноз?

a. Агонія

b. Біологічна смерть

c. Клінічна смерть

d. Термінальна пауза

e. Передагонія

781. У пологовий будинок поступила вагітна зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота в терміні 37 тижнів. При вагінальному обстеженні: розкриття шийки матки на 5 см. У якому періоді пологів знаходиться роділля?

a. У прелімінарному періоді

b. У першому періоді пологів

c. У третьому періоді пологів

d. -

e. У другому періоді пологів

782. Акушерка при огляді пацієнтки 70-ти років, яка знаходиться на ліжковому режимі і не спроможна змінити своє положення в ділянці сідниць, помітила стійку гіперемію, що не зникає після припинення тиску. Вкажіть ступінь важкості пролежнів:

a. Пролежні VI ступеня

b. Пролежні II ступеня

c. Пролежні I ступеня

d. Пролежні V ступеня

е. Ризик виникнення пролежнів

783. Вкажіть обов'язкову умову для проведення знеболювання при наявності регулярної пологової діяльності:

- а. Розкриття ш/м на 2-3 см
- б. Розкриття ш/м на 6-8 см
- с. Відходження навколоплідних вод
- д. Розкриття ш/м на 3-4 см**
- е. Розкриття ш/м на 4-6 см

784. Яка ознака свідчить про незрілість шийки матки?

- а. М'яка консистенція шийки матки
- б. Канал шийки прохідний для одного пальця
- с. Шийка матки відхилена до крижа**
- д. Шийка матки розташована по провідній вісі таза
- е. Довжина шийки менша, ніж 1 см

785. У породіллі при піхвовому дослідженні на передлежачій голівці, розташованій в порожнині малого таза, пальпується ніс, рот і підборіддя плода, звернене до лона. Про яке передлежання плода можна думати?

- а. Задній вид потиличного передлежання
- б. Передньоголовне передлежання
- с. Лицеве передлежання**
- д. Передній вид потиличного передлежання
- е. Лобове передлежання

786. У I періоді пологів у роділлі при піхвовому дослідженні встановлено лобне передлежання плода. Яка тактика ведення пологів?

- а. Накладання акушерських щипців
- б. Вакуумна екстракція плода
- с. Витягання плода за тазовий кінець
- д. Кесарів розтин**
- е. Плродоруйнівна операція

787. Акушерку ФАПу викликали до жінки 25-ти років. Мати хворої розповіла, що після фізичного навантаження у неї раптово з'явилося відчуття голоду, тремор, пітливість, судоми і вона втратила свідомість. В анамнезі: цукровий діабет, тип I. Найімовірніший попередній діагноз:

- а. Печінкова кома
- б. Гіпоглікемічна кома**
- с. Тиреотоксична кома
- д. Уремична кома
- е. Анафілактичний шок

788. Жінка 68-ми років скаржиться на свербіж, печіння зовнішніх статевих органів. При огляді визначається сухість шкіри зовнішніх статевих органів, атрофія статевих губ. Який попередній діагноз?

- а. Вульвіт
- б. Рак зовнішніх статевих органів
- с. Крауроз**
- д. Кольпіт
- е. Лейкоплакія

789. Пацієнтка скаржиться на схуднення (10 кг за останній місяць), відрижку тухлими яйцями, постійний біль в епігастрії, відразу до м'яса. Аналіз калу на приховану кров, реакція - позитивна; при езофагогастродуоденоскопії з біопсією виявлено атипові клітини. Про яке захворювання може йти мова?

- а. Хронічний гастрит

- b. Хронічний гепатит
- c. Виразкову хворобу шлунка

d. Рак шлунка

- e. Виразкову хворобу 12-палої кишки

790. До акушерки ФАПу звернулася мати дівчинки 8-ми років зі скаргами на погіршення загального стану дитини, відмову від їжі, одноразове блювання, часті випорожнення. Об'єктивно: підвищення температури тіла до 38,5°C; біль у животі, зі слів матері, випорожнення рідинні, з домішками слизу, з прожилками крові. При пальпації живота: сигмоподібна кишка болюча і спазмована. Який препарат слід підготувати за призначенням лікаря?

- a. Еуфілін
- b. Пеніцилін
- c. Димедрол
- d. Лактобактерин

e. Ніфуроксазид

791. Вкажіть інтервали між вакцинаціями проти поліомієліту:

- a. 3 місяці
- b. 2 місяці**
- c. 1 тиждень
- d. 10 днів
- e. 1 місяць

792. У жінки 55-ти років при огляді діагностували повне випадіння матки. Виберіть тактику ведення:

- a. Оперативне лікування**
- b. Тільки диспансерний нагляд
- c. Застосування піхвових тампонів
- d. Лікувальна гімнастика
- e. Рекомендувати піхвовий песарій

793. Пацієнтка 30-ти років скаржиться на інтенсивний нападоподібний біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праве плече та лопатку, нудоту, повторне блювання. З анамнезу відомо, що протягом 2-х років хворіє на жовчнокам'яну хворобу. Яке ускладнення виникло?

- a. Печінкова недостатність
- b. Гостра ниркова недостатність

c. Печінкова коліка

- d. Хронічна ниркова недостатність
- e. Ниркова коліка

794. У 26-річної породіллі на 4-ту добу після пологів почалась маткова кровотеча, яка склала 400 мл. Загальний стан погіршується: температура тіла - 36,7°C, Рґ- 94/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Матка болюча, дно її на рівні пупка. При піхвовому дослідженні: шийка матки розкрита до 4 см, за внутрішнім вічком визначається м'яка тканина, згортки крові. При огляді кровотеча посилилась. Яка подальша тактика?

a. Інструментальна ревізія порожнини матки

- b. Введення препаратів, що скорочують матку
- c. Ручне обстеження порожнини матки та видалення часток плаценти, що затрималась
- d. Надпіхвова ампутація матки
- e. Зовнішній масаж матки після спорожнення сечового міхура

795. У роділлі 30-ти років, пологи II термінові, серцебиття плода - 140/хв. Голівка в порожнині малого тазу, розкриття шийки матки повне. Плодовий міхур відсутній. Який період пологів?

- a. Післяпологовий період
- b. III період
- c. Прелімінальний період
- d. II період**

е. І період

796. Пацієнтка 65-ти років після вживання жирної та гострої їжі звернулась на ФАП зі скаргами на гострий біль в епігастральній та лівій підреберній ділянках оперізуючого характеру багаторазове блювання. Об'єктивно: РР- 120/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., язик сухий, обкладений. Живіт під час пальпації болючий в епігастрії, відсутня пульсація черевної аорти. Який попередній діагноз?

- а. Загострення виразкової хвороби шлунка
- б. Гострий апендицит
- с. Гострий холецистит
- д. Гострий панкреатит**
- е. Гострий гастрит

797. Хвора 24-х років скаржиться на біль по ходу 6-7 ребер, зліва. У ділянці на тілі невеликої еритеми групами розміщені везикули. Для якого захворювання характерні дані симптоми?

- а. Оперізуючий лишай**
- б. Дерматит
- с. Герпетичний дерматит
- д. Імпетиго
- е. -

798. Ви акушерка ФАПу. З'явилися за викликом до вагітної. Вагітна 22-х років. Термін вагітності 7-8 тижнів. Скарги на блювання до 10-12 раз на добу, постійну нудоту, виділення слини сягає 1,0 л за добу. Вагітна виснажена, помітно схудла. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. Язик сухий, запах ацетону з рота. Пульс - 120/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧД- 30/хв., температура тіла - 37,8°C, зменшення виділення сечі. Ваші дії:

- а. Звернутись в жіночу консультацію
- б. Негайна госпіталізація до гінекологічного стаціонару**
- с. Призначити амбулаторне лікування
- д. Негайна госпіталізація до інфекційного відділення
- е. Призначити жарознижувачі засоби

799. Після народження посліду у породіллі було виявлено дефект часточки плаценти. Яку маніпуляцію необхідно виконати за відсутності лікаря?

- а. Ввести утеротоніки
- б. Ввести спазмолітики
- с. Ручне обстеження стінок порожнини матки**
- д. Накласти шов на шийку матки
- е. Провести ампутацію матки

800. Ранній післяпологовий період у породіллі 26-ти років, ускладнився матковою кровотечею. Пологові шляхи при огляді цілі. Матка м'яка, погано реагує на зовнішній масаж. Послід цілий. Що є причиною післяпологової кровотечі?

- а. Гіпотонія матки**
- б. Розрив матки
- с. Розрив промежини
- д. Гематома пологових шляхів
- е. Порушення згортання крові

801. Огляд шийки матки за допомогою гінекологічних дзеркал дозволяє визначити:

- а. Внутрішньоепітеліальний рак шийки матки
- б. Консистенцію, рухомість шийки матки
- с. Величину, форму шийки матки, колір слизової оболонки, характер виділень**
- д. Патологічні зміни в параметрі, ендометрії
- е. Стан внутрішнього вічка шийки матки

802. Хворий 39-ти років госпіталізований в інфекційне відділення на 3-й день захворювання зі скаргами на переймоподібний біль у лівій половині живота, несправжні позиви до дефекації,

домішки слизу та крові в калі. Захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла до 38,2°C, болю в животі, водянистих випорожнень. З епіданамнезу: вживання сирого молока напередодні. Об'єктивно: температура тіла - 38.4°C, спазмована, болюча сигмоподібна кишка. Яку хворобу можна запідозрити?

- a. Холера
- b. Сальмонельоз
- c. Амебіаз
- d. Дизентерія**
- e. Черевний тиф

803. У пацієнтки після внутрішньом'язового введення цефтриаксону виникла різка слабкість, відчуття нестачі повітря, запаморочення. Жінка бліда, дихання поверх-неве, пульс - 100/хв., АТ-80/50 мм рт.ст. Який препарат необхідно застосувати в першу чергу?

- a. Строфантин
- b. Димедрол
- c. Кофеїн
- d. Адреналін**
- e. Еуфілін

804. Акушерка за призначенням лікаря бере мазок у хворої на ступінь чистоти піхви. З якого місця береться мазок?

- a. Передньо-бокового склепіння піхви
- b. Заднього склепіння піхви**
- c. З уретри
- d. Будь-якої стінки піхви
- e. Цервікального каналу

805. Пацієнтка прооперована з приводу субсерозної лейоміоми матки. Протягом яко-го терміну жінка повинна знаходитись під диспансерним наглядом після оперативного лікування?

- a. 2 роки
- b. 10 місяців
- c. 2 місяці
- d. 6 місяців**
- e. 12 місяців

806. В стаціонар поступила жінка з інтенсивним оперізуючим болем у надчеребній ділянці, нудотою, блюванням. Погіршення стану пов'язує з вживанням алкоголю та жирної, гострої їжі. В сечі підвищена діастаза. Який препарат слід підготувати за призначенням лікаря?

- a. Ціанокобаламін
- b. Контрикал**
- c. Сульфат магнію
- d. Альмагель
- e. Лазикс

807. Жінці 42-х років, хворій на гострий аднексит, лікарем-гінекологом було при-значено в/м введення цефтріаксону по 1 г два рази на день. Перед введенням ан-тибіотика акушеркою була проведена в/ш проба на чутливість до лікарського засобу. Через який час потрібно оцінити результат даної проби?

- a. Через 30 хвилин
- b. Через 3 години
- c. Через добу
- d. Через 20 хвилин**
- e. Через 1 годину

808. У пацієнтки, яка знаходиться в реанімаційному відділенні у коматозному стані, відмічається рідке (6-8 дихальних рухів за хв.), шумне, глибоке дихання. Визначте патологічний тип дихання:

- a. Брадипное

b. Дихання Чейн-Стокса

c. Дихання Біота

d. Дихання Куссмауля

e. Тахіпное

809. Дитині 5 років. При огляді на долонях спостерігається пластинчатє лущення. Яке захворювання слід діагностувати?

a. Кір

b. Вітряна віспа

c. Скарлатина

d. Паротитна інфекція

e. Краснуха

810. До акушерки ФАПу звернувся хлопець 14-ти років, який впав з велосипеда. Скаржиться на виражений біль в ділянці нижньої третини правого передпліччя. При огляді виявлено крововилив, припухлість тканин в місці травми, наявна деформація передпліччя. Що з травмованим?

a. Перелом кісток

b. Травматичний вивих

c. Розтягнення зв'язок

d. Забій м'яких тканин

e. Розрив сухожилків

811. Ви акушерка пологового відділення. Породілля 28-ми років, III період пологів. Активна тактика. Ви проводите огляд посліду на цілість. Вами встановлено: розміри плаценти: 15x20 см, товщина зменшена, маса - 750,0 г, пуповина тонка, в наявності ділянки петрифікатів і жирового переродження, є вогнища некрозу. Це свідчить про:

a. Дистрес плода під час вагітності

b. Невиношування вагітності

c. Нормальну доношену вагітність

d. Дистрес плода під час пологів

e. Переношену вагітність

812. До акушерки ФАПу звернулась жінка 33-х років зі скаргами на ниючий біль у правому підребер'ї з іррадіацією під праву лопатку, гіркий присмак у роті. При дослідженні дуоденального вмісту у порції В - лейкоцити, бактерії. Найімовірніший діагноз:

a. Хронічний гастрит

b. Жовчнокам'яна хвороба

c. Хронічний гепатит

d. Хронічний холецистит

e. Цироз печінки

813. Породілля народила доношеного хлопчика вагою 4000 г. Плацента відділилась самостійно, з усіма оболонками і часточками. Розривів м'яких тканин пологових шляхів немає. Матка періодично розслабляється, із статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яку допомогу має надати акушерка?

a. Введення кровоспинних препаратів

b. Зовнішній масаж матки

c. Ручна ревізія порожнини матки

d. Введення знеболюючих

e. Введення кровозамінників

814. До акушерки звернулась жінка 28-ми років, яка скаржиться на загальну слаб-кість, кровотечі з ясен, крововиливи на шкірі. Хворіє 8 років. Об'єктивно: шкіра бліда. На шкірі грудної клітки крововиливи різного розміру та кольору (темно- червоного, синього, зеленого, жовтого). Лімфатичні вузли не збільшені. Печінка, селезінка не збільшені. Який найімовірніший попередній діагноз?

a. Гемофілія

- b. Хронічний лімфолейкоз
- c. Хронічний мієлолейкоз
- d. Тромбоцитопенічна пурпура**
- e. Геморагічний васкуліт

815. Пацієнту встановлено попередній діагноз: хронічний панкреатит. Яке обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- a. Аналіз сечі на діастазу**
- b. Холецистографію
- c. Дуоденальне зондування
- d. Фіброгастроскопію
- e. Колоноскопію

816. Через 10 годин від початку пологів при повному розкритті маткового вічка відійшли світлі навколоплідні води. Після цього пологова діяльність різко ослабла: потуги короткі, нерегулярні, слабкі, голівка плода не просувається. Який характер пологової діяльності?

- a. Первинна слабкість пологової діяльності
- b. Вторинна слабкість пологової діяльності**
- c. Первинна і вторинна слабкість пологової діяльності
- d. Дискоординована пологова діяльність
- e. Тетанія матки

817. Ви акушерка жіночої консультації. Проводите заняття з питань статевого здоров'я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, Ви повідомите про зміни, що відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

- a. Створення умов для імплантації
- b. Продукування прогестерону
- c. Утворення жовтого тіла вагітності
- d. Утворення жовтого тіла менструації
- e. Розрив фолікула і вихід яйцеклітини**

818. Під час приймання їжі потерпілий раптово перервав енергійну розмову на пів-слові, схопився на ноги, руки судомно охоплюють шию, на обличчі страх, обличчя синіє і набрякає на очах. Ви повинні в першу чергу виконати:

- a. Прийом Геймліха**
- b. Непрямий масаж серця
- c. Трахеотомію
- d. Конікотомію
- e. Штучну вентиляцію легень

819. В жіночу консультацію звернулася жінка в терміні вагітності 6 тижнів, вагітність не бажана. До якого терміну вагітності можна провести медичний аборт?

- a. До 20 тижнів вагітності
- b. До 16 тижнів вагітності
- c. До 18 тижнів вагітності
- d. До 14 тижнів вагітності
- e. До 12 тижнів вагітності**

820. Породілля звернулася до акушерки ФАПу зі скаргами на підвищення t° до 39- 40 $^{\circ}$ C, біль внизу живота, головний біль, спрагу, слабкість. Пологи відбулися ти-ждень тому, розриви на шийці матки. При піхвовому дослідженні визначається ін-фільтрат зліва від матки. Попередній діагноз:

- a. Пельвіоперитоніт
- b. Сальпінгоофорит
- c. Метроендометрит
- d. Параметрит**
- e. Ендоетрит

821. Відбулися перші термінові стрімкі пологи на дому. Народився живий доношений хлопчик масою 3220 г, довжиною 50 см, без дихання. ЧСС- 40/хв. Ціаноз шкіри. Рухи дитини відсутні. Атонія м'язів. Яка невідкладна допомога?

- a. Закритий масаж серця, внутрішньовенно адреналін, глюкоза
- b. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно глюкозу
- c. Закритий масаж серця, внутрішньовенно гідрокарбонат натрію
- d. ШВЛ, закритий масаж серця, внутрішньовенно адреналін**
- e. ШВЛ, внутрішньовенно глюкозу, адреналін, гідрокарбонат натрію

822. До жіночої консультації звернулася жінка зі скаргами на безплідність. В анамнезі гонорейний сальпінгіт. Під час обстеження виявлено непрохідність маткових труб. За допомогою якого методу діагностики можна з'ясувати збереження функції яєчників?

- a. Пертубація
- b. Гістеросальпінгографія
- c. Гідротубація
- d. Тести функціональної діагностики**
- e. Кольпоскопія

823. За призначенням лікаря акушерка гінекологічного відділення повинна взяти у вагітної кров на коагулограму. У градуйовану пробірку конусоподібної форми вона набрала 1 мл 3,8% розчину лимоннокислого натрію. Яку кількість крові необхідно набрати у пробірку?

- a. 9 мл**
- b. 7 мл
- c. 5 мл
- d. 2 мл
- e. 3 мл

824. Ви стали випадковим свідком бійки, в результаті якої один із учасників отримав різану рану передпліччя з пошкодженням артерії. Який спосіб тимчасової зупинки кровотечі Ви застосуєте першочергово?

- a. Припідняте положення
- b. Пальцьове притискання**
- c. Асептична пов'язка
- d. Тампонада рани
- e. Стискальна пов'язка

825. Хвора 48-ми років скаржиться на загальну слабкість, різке схуднення, збільшення живота в об'ємі, болі внизу живота. Клініка виникла півроку тому. Менструація не порушена, вагітностей не було. Живіт збільшений в розмірах. Вагінально: шийка матки чиста. Матку пропальпувати неможливо. З обох боків від матки ви-значаються щільні, горбисті, нерухомі пухлини, які заповнюють порожнину малого таза. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Рак тіла матки
- b. Міома матки
- c. Рак яєчників**
- d. Кістома яєчників
- e. Кісти яєчників

826. У пацієнтки 19-ти років при проведенні огляду виявлено в правому кутику рота на гіперемованому набряклому фоні фліктени з серозно-гнійним вмістом, жовті кірки. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Мікробна екзема
- b. Кандидозний стоматит
- c. Простий лишай
- d. Простий герпес
- e. Стрептококова заїда**

827. Хвора 23 роки. Після штучного абортів в терміні 6 тижнів, через 4 тижні з'явилися кров'янисті виділення на тлі переймоподібних болів внизу живота протягом останнього дня.

При піхвовому дослідженні матка розмірами 9-10 тижнів, придатки без особливостей. Виділення рясні, кров'яністі, темного кольору, посилились під час дослідження. Ваш діагноз:

- a. Вагітність, що розвивається
- b. Швидкозростаюча міома матки
- c. Міхурцевий занесок**
- d. Позаматкова вагітність
- e. Постабортний метроендометрит

828. Хвора 31-го року звернулася до ФАПу зі скаргами на сильний біль в лівій половині попереку з іррадіацією в пахвинну ділянку, відмічає часті позиви до се-човипускання. Хвора збуджена, симптом Пастернацького зліва різко позитивний. Який стан розвинувся у пацієнтки?

- a. Хронічний пієлонефрит
- b. Хронічний гломерулонефрит
- c. Гострий гломерулонефрит
- d. Гострий пієлонефрит
- e. Ниркова колька**

829. Пацієнт 60-ти років переніс два інфаркти міокарда. За відсутності фельдшера він звернувся у ФАП до акушерки зі скаргами на погіршення свого стану: поступово наростала втомлюваність, з'явилася задишка, спочатку при звичайному, а згодом навіть при невеликому фізичному навантаженні, серцебиття, у другій половині дня почали набрякати кисточки. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

- a. Хронічна серцева недостатність**
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Вада серця
- d. Гіпертонічний криз
- e. Гостра судинна недостатність

830. Пацієнтка 22-х років, звернулася в жіночу консультацію з скаргами на зеленувато-жовті виділення з піхви з неприємним запахом, свербіж в ділянці піхви, біль при сечоспусканні. Про яке захворювання йде мова?

- a. Бактеріальний вагіноз
- b. Хламідіоз
- c. Кандидоз
- d. Трихомоніаз**
- e. Гонорея

831. Під час ін'єкції медична сестра вкололася інфікованою голкою. Як слід класифікувати зазначений випадок з точки зору охорони праці?

- a. Катастрофа
- b. Нещасний випадок
- c. Аварія**
- d. Надзвичайна подія
- e. Шкідливий фактор

832. У дитини віком 7 місяців підвищилась температура тіла до 39°C, двічі було блювання та тричі рідкі випорожнення зеленувато-сірого кольору з великою кількістю слизу. Об'єктивно: стан дитини тяжкий. Шкіра суха бліда. Велике тім'ячко запале. Живіт здутий, болючий при пальпації. Для якої кишкової інфекції характерні дані симптоми?

- a. Черевний тиф
- b. Сальмонельоз**
- c. Поліомієліт
- d. Шигельоз
- e. Ешерихіоз

833. В яку фазу менструального циклу шийковий слиз при висушуванні має характерну картину у вигляді листка папороті (товсті стебла, від яких відходять чіткі листочки під кутом +90°) у здорової жінки?

- a. Одразу після менструації
- b. В другу половину циклу 16-28 день
- c. В першу фазу до 12-13 дня

d. Середина циклу 14-15 день (період овуляції)

- e. Впродовж всього циклу

834. Пацієнтка 20-ти років заміжня впродовж 1,5 років. Вагітність при регулярному статевому житті без використання засобів контрацепції не настає. З анамнезу: чоловік здоровий, у самої пацієнтки вагітностей не було. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Відносне безпліддя
- b. Яєникове безпліддя
- c. Абсолютне безпліддя
- d. Вторинне безпліддя

e. Первинне безпліддя

835. Вагітна скаржиться на задишку, різке збільшення живота. Термін вагітності 29- 30 тижнів. Обвід живота - 120 см. Висота стояння дна матки - 38 см. Матка напружена. Частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода приглушене до 140/хв. Про яке ускладнення йде мова?

a. Багатоводдя

- b. Дистрес плода
- c. Прееклампсія
- d. Багатопліддя
- e. Бронхіальна астма

836. Дівчинка 14-ти років скаржиться на болі в животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: жовтушність шкірних покривів, збільшення печінки, ахолічні випорожнення, сеча кольору "пива". Ваш діагноз:

- a. Жовчнокам'яна хвороба
- b. Інфекційний моноклеоз
- c. Гострий холецистит
- d. Гострий гастрит

e. Вірусний гепатит

837. До акушерки ФАПу звернулася пацієнтка 54-х років зі скаргами на загальну слабкість, лихоманку, головний біль. St. localis: права гомілка набрякла, почерво-ніння шкіри з чіткими межами, місцями пухирі різної величини, наповнені серозним ексудатом. Яке захворювання слід запідозрити?

a. Бульозна форма бешихи

- b. Еритематозна форма бешихи
- c. Еризипеліод
- d. Некротична форма бешихи
- e. Флебін

838. Під час профілактичного огляду у жінки 36-ти років при пальпації молочних залоз виявлено ущільнення у правій молочній залозі. З анамнезу відомо, що пацієнтка періодично відчуває біль у зазначеній ділянці (частіше перед менструацією). Яке додаткове дослідження Ви запропонуєте жінці?

- a. УЗД органів малого тазу
- b. Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі
- c. Бактеріологічне дослідження

d. УЗД молочних залоз

- e. Флюорографія органів грудної клітки

839. У роділлі при веденні послідового періоду акушерка визначила, що затискач, який був накладений на пуповину біля статевої щілини, опустився приблизно на 10 см. Якій ознаці відокремлення плаценти це відповідає?

- a. Мікуліча

- b. Шредера
- c. Довженко
- d. Альфреда**
- e. Клейна

840. До акушерки ФАПу звернулася мати дитини віком 6-ти років, у якої спостерігається підвищення температури тіла до 38,6°C, вологий кашель. Тиждень тому дитина перехворіла на грип. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, шкіра бліда. Перкуторно: вкорочення перкуторного звуку. Аускультативно: дихання ослаблене, крепітація в нижніх відділах грудної клітки справа. Вкажіть захворювання, для якого найбільш характерні дані симптоми:

- a. Гострий бронхіт
- b. Плеврит

c. Пневмонія

- d. Бронхіальна астма
- e. Хронічний бронхіт

841. В пологовій палаті перебуває впершенароджуюча 25-ти років. Після вилиття навколоплідних вод акушерка провела внутрішнє акушерське обстеження і встановила передньоголовне передлежання. Вкажіть провідну точку при цьому передлежанні:

- a. Підборіддя
- b. Ніс
- c. Мале тім'ячко

d. Велике тім'ячко

- e. Середина лобного шва

842. Пацієнтка пологового будинку знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні, скаржиться на частий кашель із зригуванням пінистою кров'ю яскраво-червоного кольору, задишку слабкість. Об'єктивно: шкіра обличчя бліда, температура тіла - 39,2°C, зригування пінистою кров'ю, що посилюється при кашлі. Для якого ускладнення це характерно:

- a. Кровотеча виразки шлунка

b. Легенева кровотеча

- c. Синдром Ранд-Ослера
- d. Пухлина кардії
- e. Синдром Меллорі-Вейса

843. Під час приймання пологів, акушерці у око потрапила навколоплідна вода. Вкажіть подальші дії акушерки:

- a. Промити око блідо-рожевим розчином калію перманганату
- b. Закапати око 30% розчином сульфацил-натрію
- c. Промити око водопровідною водою з милом
- d. Закапати око 2% розчином борної кислоти

e. Промити око водою або фізрочином

844. Ви працюєте у пологовій залі. У роділлі в II періоді пологів припинилось просування голівки плода, яка вже опустилась на тазове дно. Серцебиття плода на потугу - 100/хв., аритмічне. Ваша тактика:

a. Епізіотомія

- b. Краніотомія
- c. Клейдотомія
- d. Амніотомія
- e. Перінеотомія

845. До акушерки звернулася мати з 1,5-річною дитиною, зі скаргами на незвичайні зміни в кінцівках, неспокій дитини. Об'єктивно: дитина неспокійна, плаче. Нижні кінцівки зігнуті в колінних та кульшових суглобах, стопи в стані різкого плантарного згинання, пальці кистей рук тонічно напружені, рука нагадує "руку акушера". Про яке захворювання треба думати?

a. Спазмофілія, карпопедальний спазм

- b. Рахіт, період розпалу

- с. Спазмофілія, еклампсія
- d. Спазмофілія, ларингоспазм
- е. Латентна форма спазмофілії

846. Пацієнтці 24 роки, була виконана операція кесаревого розтину. На третю добу після операції відчула важкість в животі, здуття його, гази не відходять. Які дії акушерки в даному випадку?

- a. Поставити газовідвідну трубку**
- b. Покласти вантаж на живіт
- с. Поставити лікувальну клізму
- d. Поставити сифонну клізму
- е. Покласти холод на живіт

847. Акушерку ФАПу викликали до дитини 1,5 років, яка хворіє другу добу. У дитини гавкаючий кашель, голос захриплий, дихання чутне на відстані, утруднений вдих, блідість шкіри, пероральний ціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий бронхіт
- b. Стенозуючий ларинготрахеїт**
- с. Вогнищева пневмонія
- d. Обструктивний бронхіт
- е. Плеврит

848. Хлопчик 12-ти років скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слаб-кість. В загальному аналізі крові: бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?

- a. Ревматоїдний артрит
- b. Гострий лейкоз**
- с. Геморагічний васкуліт
- d. Туберкульоз
- е. Системний червоний вовчак

849. Ви акушерка пологового відділення. Породілля 25-ти років. Проводите огляд пологових шляхів на цілість. Встановлено: шийка матки ціла, є пошкодження задньої стінки піхви, шкіри та м'язів промежини. М'яз, що стискає задньопрохідний отвір і слизова оболонка прямої кишки не пошкоджені. Встановіть діагноз:

- a. Розрив промежини III ст.
- b. Розрив промежини I ст.
- с. Розрив піхви
- d. Розрив промежини II ст.**
- е. Розрив промежини IV ст.

850. Роділля поступає у пологове відділення у активній фазі пологів зі скаргами на сильний біль в животі після періоду інтенсивної пологової діяльності, незначну кровотечу із вагіни. Стан тяжкий, шкіра бліда, свідомість сплутана, АТ-80/40 мм рт.ст. Матку при зовнішньому обстеженні пальпувати не вдається. Контуруються частини плода в животі. В анамнезі: кесарів розтин. ЧСС плода - 60/хв. Який діагноз є найвірогіднішим?

- a. Передлежання плаценти
- b. Передлежання пуповини
- с. Передчасні пологи
- d. Розрив матки**
- е. Відшарування плаценти

851. Ви працюєте акушеркою у гінекологічному відділенні. Хвора після операції з приводу фіброміоми матки, скаржиться на здуття живота, невідходження газів. Про що можна думати?

- a. Механічна кишкова непрохідність
- b. Виразкова хвороба шлунка
- с. Хвороба Крона
- d. Гострий коліт
- е. Парез кишківника**

852. У пацієнтки 37-ми років, під час огляду при проведенні проби Шиллера виявлені світлі ділянки на шийці матки. На який метод дослідження необхідно направити пацієнтку?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. Лапароскопію
- c. Діагностичне вишкрібання
- d. Кольпоскопію**
- e. Біопсію

853. Акушерці пологового відділення необхідно пояснити молодшій медичній сестрі умови генерального прибирання в маніпуляційному кабінеті даного відділення. Вкажіть періодичність генерального прибирання в маніпуляційному кабінеті:

- a. На початку і в кінці зміни
- b. Кожну зміну
- c. Один раз на місяць
- d. Один раз на тиждень**
- e. Щоденно

854. Акушерка проводить плановий огляд дівчинки 6-ти місяців. У дитини майже зникла підшкірна жирова клітковина на животі, кінцівках, маса тіла знизилась на 24%. На що вказують ці симптоми?

- a. Хронічний гастрит
- b. Гіпотрофія III ступеня
- c. Простий гастроентерит
- d. Гіпотрофія II ступеня**
- e. Гіпотрофія I ступеня

855. Ви акушерка ФАПу. Звернулась пацієнтка 49-ти років зі скаргами на рясні менструації. При обстеженні встановлено: тіло матки збільшене до 10-12 тижнів вагітності, нерівної поверхні, рухоме, безболісне, шийка матки циліндрична, чиста. Склепіння глибокі. Придатки не визначаються, безболісні. Встановіть попередній діагноз:

- a. Вагітність 14-15 тижнів
- b. Саркома тіла матки
- c. Рак ендометрію
- d. Фіброміома матки**
- e. Хоріонепітеліома

856. У хворого 45-ти років, ножове поранення грудної клітки. Стан важкий. АТ- 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв., задишка, ціаноз, підшкірна емфізема в лівій половині грудної клітки, повітря входить і виходить через рану. Які повинні бути першочергові дії при наданні медичної допомоги?

- a. Накласти кровоупинний джгут
- b. Ввести кровозамінники
- c. Накласти оклюзійну пов'язку**
- d. Накласти іммобілізуючу пов'язку
- e. Накласти стерильну пов'язку

857. До акушерки ФАПу звернувся чоловік 76-ти років зі скаргами на постійний біль в дистальних відділах нижніх кінцівок, який посилюється вночі, оніміння пальців стоп. Шкіра бліда, холодна, суха, виражена гіпотрофія м'язів обох гомілок, відсутня пульсація на підколінних артеріях. Яке захворювання слід запідозрити?

- a. Варикозна хвороба
- b. Облітеруючий атеросклероз**
- c. Хвороба Рейно
- d. Облітеруючий ендартеріїт
- e. Посттромбофлебітичний синдром

858. При прийомі на роботу акушерки у відділення патології вагітності проводиться первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. Хто проводить даний інструктаж?

a. Завідувач відділенням

- b. Головна акушерка
- c. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи
- d. Головний лікар
- e. Інженер з охорони праці

859. У пацієнтки гінекологічного відділення виникло загострення хронічного холециститу. При об'єктивному обстеженні симптоми подразнення очеревини відсутні. Вкажіть, який метод найпростішої фізіотерапії доцільно використати в даному випадку для зняття болю:

- a. Міхур з льодом
- b. Холодний компрес

c. Грілку

- d. Холодну примочку
- e. Зігріваючий компрес

860. Назвіть захворювання алергійного генезу, яке характеризується швидким виникненням на шкірі висипу пухирцевого характеру, який при огляді нагадує "географічну карту" та супроводжується свербіжем:

- a. Сінна лихоманка
- b. Сироваткова хвороба
- c. Анафілактичний шок
- d. набряк Квінке

e. Кропив'янка

861. На диспансерному обліку в ЖК знаходиться жінка впродовж 5-ти років. Матка збільшена до 8 тижнів. На останньому прийомі відмічено швидке зростання пу-хлини до 13-14 тижнів. Яке показане лікування?

a. Консервативне

b. Оперативне

- c. Комбіноване лікування
- d. Гормональне
- e. Променева терапія

862. При зовнішньому акушерському обстеженні першовагітної жінки встановлено: дно матки розміщено посередині між пупком і мечоподібним відростком, ВСДМ- 28 см, ОЖ- 80 см. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 140/хв., справа нижче пупка. Ваш діагноз:

a. Вагітність 1,18 тижнів

b. Вагітність I, 32 тижні

- c. Вагітність I, 20 тижнів
- d. Вагітність 1,24 тижні
- e. Вагітність I, 30 тижнів

863. До акушерки ФАПу у відсутність фельдшера звернулася пацієнтка 22-х років. Скаржиться на напади експіраторної задухи, які виникають під час роботи в архіві бібліотеки. Під час нападу пацієнтка вимушена сідати, спираючись на руки, така поза полегшує видих. Який діагноз можна припустити?

- a. Хронічний бронхіт
- b. Туберкульоз легень
- c. Ексудативний плеврит

d. Бронхіальна астма

e. Негоспітальна пневмонія

864. Формула Зайцевої використовується для розрахунку:

- a. Артеріального тиску
- b. Добового діурезу
- c. Зросту дитини
- d. Ваги дитини

e. Добового об'єму молока

865. Дитина народилася від першої вагітності з вагою 2900 г. При народженні виявлені множинні вади розвитку: мікроцефалія, катаракта, глухота, вроджена вада серця. Матері 18 років. В перші три тижні вагітності перенесла гостре інфекційне захворювання. Яке інфекційне захворювання матері стало найбільш ймовірною причиною даної патології новонародженої дитини?

- a. Менінгококова інфекція
- b. Кір
- c. Вітряна віспа

d. Краснуха

- e. Скарлатина

866. Акушерка ФАПу запідозрила у дівчинки 5-ти років гострий пієлонефрит. Зі слів матері у дитини температура - 38,5°C, загальна слабкість, млявість, погіршення апетиту, сеча каламутна. Який аналіз вказує на підвищення кількості формених елементів в 1 мл сечі?

a. Аналіз сечі за Нечипоренком

- b. Аналіз сечі за Зимницьким
- c. Загальний аналіз сечі
- d. Добовий діурез
- e. Аналіз сечі за Амбурже

867. При висипному тифі висипка з'являється на:

- a. 5-9 день
- b. 1-3 день
- c. 7-10 день

d. 4-5 день

- e. 8-10 день

868. Під час огляду жінки 40-ка років акушерка ФАПу виявила, що тіло матки щільної консистенції, горбисте, збільшене в розмірах до 7-8 тижнів вагітності, рухоме при зміщенні, чутливе. Придатки без патологічних змін. Параметри вільні. Жінка скаржиться на підвищену крововтрату під час менструацій, кровотечу, загальну слабкість. Шкірні покриви і видимі слизові бліді. Який найбільш ймовірний діагноз?

- a. Гормонпродукуюча пухлина яєчника
- b. Рак ендометрію
- c. Дисфункціональна маткова кровотеча

d. Симптомна міома матки

- e. Кіста обох яєчників

869. Пацієнтка 48-ми років, поступила в хірургічне відділення зі скаргами на нудоту, блювання, переймоподібний біль у животі, невідходження газів. Об'єктивно: живіт здутий, при пальпації болісний, перистальтика кишечника відсутня, визначається позитивний симптом Склярова. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані ознаки:

- a. Гострий апендицит
- b. Гострий холецистит
- c. Перфоративна виразка шлунка

d. Кишкова непрохідність

- e. Гострий панкреатит

870. Вагітній жінці введено периферійний катетер для проведення інфузійної терапії. За призначенням лікаря, акушерці необхідно здійснити забір венозної крові для біо-хімічного дослідження. Вкажіть розчин, яким необхідно попередньо промити катетер:

- a. 0,9% розчином натрію хлориду
- b. 2% розчином натрію гідрокарбонату
- c. 3 % розчином пероксиду водню

d. 1 % розчином гепарину

- e. Розчином фурациліну 1:5000

871. До якої діагностичної процедури слід підготувати дитину, якщо у неї сильний головний

біль, блювання, ригідність потиличних м'язів, позитивний симптом Керніга?

a. Люмбальна пункція

b. ЕКГ

c. Лабораторні методи дослідження

d. МРТ голови

e. Офтальмоскопія

872. У першороділлі у послідовому періоді через 15 хвилин ознаки відокремлення плаценти позитивні. При потужуванні послід не виділяється. Який із способів виділення посліду зовнішніми прийомами може бути найбільш фізіологічним і досить ефективним?

a. Креде-Лазаревича

b. Епштейна

c. Гентера

d. Абуладзе

e. Креде-Лазаревича під наркозом

873. Акушерка пояснює пацієнтці, як правильно збирати сечу за методом Нечипоренко:

a. Ранкову порцію сечі у стерильну посудину

b. Вранці одномоментно всю сечу

c. Сечу, зібрану протягом 3 годин

d. Середню порцію сечі, в будь-який час

e. Сечу, виділену за добу

874. Пацієнтка 45-ти років, поступила у приймальне відділення з такими проблемами: сильний біль у ділянці серця стискаючого характеру, який віддає в ліву руку тривалість більше 30 хвилин. Застосування нітрогліцерину ефекту не дало. Яке захворювання слід запідозрити?

a. Пневмонію

b. Інфаркт міокарда

c. набряк легень

d. Стенокардію

e. Остеохондроз

875. До акушерки ФАПу звернулася хвора 28-ми років зі скаргами на висипку і свербіж, який посилюється ввечері і вночі. Об'єктивно: на шкірі бокових поверхонь пальців кистей рук, живота і стегон виявляється велика кількість точкових, попарного розташованих, червоного кольору папул, розчухи. Який найбільш імовірний діагноз?

a. Мікроспорія

b. Кропив'янка

c. Короста

d. Дерматит

e. Червоний вовчак

876. До Вас на ФАП звернулася жінка зі скаргами на біль, відчуття жару в лівій го-мілці, підвищення t° тіла до $38,3^{\circ}\text{C}$. Хворіє два дні. При огляді Ви виявили на передній поверхні гомілки набряк, почервоніння з чіткими краями, пухирці, заповнені жовтуватим вмістом. Вкажіть імовірний діагноз:

a. Бешиха

b. Опік

c. Правець

d. Сибірка

e. Газова гангрена

877. До акушерки звернулася жінка 42-х років зі скаргами на рясні, тривалі мен-струації. Як називається це порушення?

a. Гіперполіменорея

b. Алігодисменорея

c. Метрорагія

d. Фізіологічний стан під час менструації

е. Аменорея

878. У першовагітної при дослідженні зовнішніх розмірів нормального тазу гудзики тазоміра були присутні між найвіддаленішими точками гребнів клубових кісток і визначена найбільша відстань. Чому в середньому дорівнює ця відстань?

- а. 28-29 см**
- б. 20-21 см
- в. 30-31 см
- г. 12,5-13 см
- е. 25-26 см

879. Ви акушерка ФАПу. Проводите зовнішнє акушерське обстеження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності:

- а. 16 тижнів**
- б. 36 тижнів
- в. 30 тижнів
- г. 12 тижнів
- е. 20 тижнів

880. Хвора 29-ти років доставлена бригадою швидкої допомоги в стаціонар зі скаргами на гострі болі внизу живота, блювання, часте сечовипускання. При огляді: живіт помірно здутий, симптом Щоткіна-Блюмберга - позитивний. Пульс - 88/хв., температура - 37°C. При бімануальному дослідженні: тіло матки щільне, не збільшене, рухоме, не болюче, справа та спереду від матки пальпується утворення 6х6 см, тугоеластичної консистенції, різко болюче при зміщенні, зліва додатки не визначаються, виділення слизові. Який найімовірніший діагноз?

- а. Кишкова непрохідність
- б. Гостре запалення придатків матки
- в. Апоплексія яєчника
- г. Ниркова колька

е. Перекрут ніжки пухлини яєчника

881. Вагітна, що знаходиться в палаті інтенсивної терапії з діагнозом: вагітність 1, 35 тижнів. Прееклампсія важкого ступеня, поскаржилась на різкий біль в животі, появу згустків крові з піхви. Про виникнення якого ускладнення свідчать дані симптоми?

- а. Передлежання плаценти
- б. Початок передчасних пологів
- в. Гіпотонія матки
- г. Передчасне відшарування плаценти**
- е. Коагулопатична кровотеча

882. В гінекологічне відділення госпіталізована вагітна в терміні 11-12 тижнів зі скаргами на тягнучий біль в нижніх відділах живота, кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Під час огляду у дзеркалах: частини плідного яйця у цервікальному каналі, кров'янисті виділення у великій кількості. До якої маніпуляції слід підготувати пацієнтку?

- а. Накладання циркулярного шва на шийку матки
- б. Роздільне діагностичне вишкрібання матки
- в. Зондування матки
- г. Взяття мазків на "гормональне дзеркало"

е. Кюретаж стінок порожнини матки

883. Вагітна - I вагітність 36 тижнів поступає в пологовий будинок у відділення патології вагітних з ознаками пізнього гестозу. Який документ повинна мати при собі вагітна?

- а. Історію пологів
- б. Карту диспансерного спостереження
- в. Індивідуальну карту вагітної та породіллі
- г. Обмінну карту**
- е. Контрольну карту спостереження

884. При внутрішньому акушерському дослідженні у роділлі визначили повне розкриття шийки матки. Вкажіть на скільки сантиметрів розкриття шийки матки вважається повним:

- a. 5-7 см
- b. 9-10 см
- c. 8-10 см
- d. 6-7 см
- e. 0.10-12 см**

885. Під час пологів акушерка за призначенням лікаря використала препарат для профілактики кровотечі у третьому періоді пологів. Який це препарат?

- a. Вікасол
- b. Но-шпа
- c. Хлорид кальцію
- d. Еуфілін
- e. Окситоцин**

886. Лікар ж/к попередив акушерку, щоб вона приготувала все необхідне для розширеної проби Шиллера. Які розчини повинна підготувати акушерка?

- a. 20% розчин сульфасаліцилової кислоти
- b. 3% розчин оцтової кислоти, 3% розчин Люголя**
- c. 3% розчин перекису водню
- d. 2% розчин новокаїну, 3% розчин Люголя
- e. 1% діамантовий зелений

887. У акушерки, що працювала протягом 2-х років з лікарськими препаратами, виник дерматит. Який фактор вплинув на організм?

- a. Хімічний**
- b. Механічний
- c. Фізичний
- d. Біологічний
- e. Психофізіологічний

888. Пацієнтка скаржиться на біль в епігастральній ділянці, який виникає через 15 хвилин після вживання їжі, блювання, після якого відмічається полегшення. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Хронічний холецистит
- b. Цироз печінки
- c. Виразкова хвороба 12-ти палої кишки
- d. Хронічний гепатит
- e. Виразкова хвороба шлунка**

889. Пацієнт 60-ти років звернувся зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, періодично - біль і домішки крові під час дефекації. При пальцевому дослідженні прямої кишки виявлено три варикозні вузли, які розміщені біля задньопрохідного отвору. З чим пов'язані проблеми пацієнта?

- a. Тріщина заднього проходу
- b. Гострий парапроктит
- c. Геморой**
- d. Поліпи прямої кишки
- e. Рак прямої кишки