

1. Пацієнту віком 39 років встановлено діагноз: ехінококова кіста печінки. Яка лікувальна тактика вважається більш прийнятною та гарантує задовільні найближчі й віддалені результати лікування в разі цього захворювання?

- a. Хірургічне лікування у вигляді радикальної операції
- b. Хірургічне лікування без застосування хіміотерапії
- c. Хірургічне лікування після двотижневого курсу хіміотерапії
- d. Три курси хіміотерапії по 28 днів із перервою між курсами 14 днів
- e. Хірургічне лікування у вигляді паліативної операції

2. Дорослій пацієнтці планується виконання лапароскопічної холецистектомії. Яке покоління цефалоспоринів необхідно використати для проведення антибіотикопрофілактики в цьому разі?

- a. Перше
- b. Четверте
- c. Друге
- d. П'яте
- e. Третє

3. Пацієнт віком 55 років скаржиться на гострий біль у животі, що почався раптово 3 год тому, блювання та відсутність відходження газів і випорожнень. Об'єктивно спостерігається: живіт здутий, болючий під час пальпації у всіх відділах, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який найімовірніший діагноз?

- a. Перфоративна виразка шлунка
- b. Гостра кишкова непрохідність
- c. Гострий апендицит
- d. Гострий холецистит
- e. Гострий панкреатит

4. Що є відносним протипоказанням до виконання транскатетерної імплантації аортального клапана (TAVI)?

- a. Активний бактеріальний ендокардит
- b. Очікувана тривалість життя пацієнта менше 1 року
- c. Критичний стеноз мітрального клапана
- d. Двостулковий аортальний клапан
- e. Наявність тромба в лівому шлуночку

5. Пацієнта віком 70 років шпиталізовано зі скаргами на біль у черевній порожнині, вздуття живота, блювання, невідходження газів, підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що хворіє 5 місяців, коли з'явився біль у лівій половині черевної порожнини. В аналізі крові: гемоглобін - 110 г/л, лейкоцити - $11,4 \cdot 10^9/\text{л}$, глюкоза - 5,2 ммоль/л. Загальний аналіз сечі без патологічних змін. α -амілаза - 64 Од. За результатами рентгенографії виявлено: чаші Клойбера. Який найімовірніший діагноз?

- a. Заворот товстої кишки. Гостра кишкова непрохідність
- b. Лівобічна пахова грижа. Гостра кишкова непрохідність
- c. Жовчнокам'яна хвороба. Печінкова коліка
- d. Рак товстої кишки. Гостра кишкова непрохідність
- e. Гострий панкреатит. Гостра печінкова недостатність

6. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на симптоми кишкового дискомфорту, які з'явилися в неї місяць тому (постійний тупий біль у лівій пахвинній ділянці, що чергувався з гострим переймоподібним, були затримки випорожнень до 3-4 днів). Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, живіт помірно здутий у лівій половині, пальпаторно в проєкції сигмоподібної кишки визначається щільно-еластичне, помірно болюче рухоме утворення. У випорожненнях - прожилки крові, слизу, гною. Пальцеве дослідження прямої кишки без особливостей. За результатами ректороманоскопії виявлено: на висоті 20 см від анусу - звуження стінки кишки лінійної форми до 3-4 см, згустки крові та гній. Який найімовірніший діагноз?

- a. Виразковий коліт

b. Рак сигмоподібної кишки

c. Хвороба Крона

d. Дивертикуліт сигмоподібної кишки

e. Псевдомембранозний коліт

7. Під час огляду пацієнтки віком 68 років виявлено: на обох ногах шкіра ціанотична з мармуровими та сірими відтінками зі значними пухирями, які заповнені геморагічної рідиною, під час натискання на них відсутня чутливість, наявний некроз шкіри з переходом на підшкірну жирову клітковину. Больовий синдром виражений досить сильно, супроводжується свербіжем, поколюванням та онімінням. Який найімовірніший діагноз?

a. III ступінь обмороження

b. Переохолодження

c. II ступінь обмороження

d. I ступінь обмороження

e. IV ступінь обмороження

8. Який метод швидкого гемостазу при пошкодженні печінки III-IV ступеня за шкалою тяжкості пошкоджень Американської асоціації хірургів травми (AAST) є доцільним для застосування в рамках тактики Damage Control Surgery?

a. Анатомічна резекція печінки

b. Електрокоагуляція печінки

c. Тампонада печінки

d. Перев'язка воротної вени

e. Атипова резекція печінки

9. Пацієнт віком 46 років після трансатлантичного перельоту раптово відчув різкий біль у правій гомілці. Із анамнезу відомо, що періодично турбують судоми та відчуття тяжкості у правій гомілці. Об'єктивно спостерігається: шкіра гомілки та стопи звичайного кольору, набряк правої гомілки на рівні щиколотки та у середній третині гомілки +3 см порівняно з лівою, пульсація на стегновій артерії та підколінній збережена. Позитивний симптом Хоменса та Мозеса на правій нижній кінцівці. Який найімовірніший діагноз?

a. Гострий тромбоз глибоких вен

b. Облітеруючий ендартеріт

c. Артрит гомілковостопного суглоба

d. Гострий тромбоз підколінної артерії

e. Хвороба Рейно

10. Пацієнтку віком 25 років шпиталізовано зі скаргами на гострий біль у животі, який з'явився раптово 7 год тому. Біль локалізується в нижній правій частині живота, постійний, посилюється під час рухів. Вона також відзначає нудоту, одноразове блювання та підвищення температури тіла до $37,5^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно спостерігається: живіт помірно напружений, болючий під час пальпації в правій здухвинній ділянці. Симптоми подразнення очеревини позитивні. Проте під час пальпації живота також визначається незначне збільшення та болючість сигмовидної кишки. В аналізі крові: лейкоцитоз $12 \cdot 10^9/\text{л}$ зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Біохімічний аналіз крові: незначне підвищення рівня С-реактивного білка. У чому полягає правило Коупа в цій ситуації?

a. У призначенні антибактеріальних препаратів

b. У виконанні хірургічного втручання

c. У динамічному спостереженні

d. У консультації суміжних фахівців

e. У виконанні інструментальної діагностики

11. Укажіть тріаду Мондора під час гострого панкреатиту.

a. Гіпертермія, діарея, відсутність печінкової тупості

b. Міграція болю з епігастральної ділянки у всі відділи живота, вільна рідина в животі, інфільтрат в епігастральній ділянці

c. Одноразове блювання, кинджальний біль в епігастрії, жовчнокам'яна хвороба в анамнезі

d. Біль в епігастрії, блювання багаторазове (нудота), метеоризм

е. Біль в епігастральній ділянці, вільне повітря в животі, лейкопенія

12. За критеріями якої шкали оцінюється ступінь печінкової недостатності при захворюваннях печінки?

- a. SOFA
- b. Ренсон
- c. Маршала
- d. APACH II

е. Чайлд-П'ю

13. Який розчин використовують з метою склеротерапії порожнин звичайних кіст паренхіматозних органів?

a. Діоксидину 1% (для промивання порожнин)

b. Етанолу 96%

c. Бетадину у співвідношенні 1:10

d. Формаліну 40%

е. Декасану

14. Які види оперативного лікування показані при IV стадії гемороїдальної хвороби?

a. Гемороїдектомія, мукопексія, латексне лігування гемороїдальних вузлів

b. Гемороїдектомія, мукопексія, лазерна гемороїдопластика

c. Гемороїдектомія, лазерна гемороїдопластика, склеротерапія гемороїдальних вузлів

d. Латексне лігування гемороїдальних вузлів, лазерна гемороїдопластика, інфрачервона коагуляція гемороїдальних вузлів

е. Гемороїдектомія, мукопексія, степлерна гемороїдопексія

15. Пацієнт віком 26 років скаржиться на біль у верхній частині живота, який з'явився миттєво 2 год тому. В анамнезі: виразкова хвороба. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, під час зміни положення тіла біль підсилюється, АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 90/хв, язик сухий, живіт не бере участі в акті дихання. Під час пальпації живіт різко болючий і напружений в епігастрії. Симптом Щоткіна-Блумберга позитивний. Який найімовірніший діагноз?

a. Стеноз пілоруса

b. Перфоративна виразка

c. Гострий гастрит

d. Гострий холецистит

е. Гострий панкреатит

16. Який метод гемостазу при ушкодженні селезінки III-IV ступеня за шкалою тяжкості ушкоджень Американської асоціації хірургів травми (AAST) є доцільним у рамках тактики Damage Control Surgery?

a. Спленорафія

b. Перев'язка селезінкової артерії

c. Тампонування селезінки

d. Спленектомія

е. Консервативне ведення

17. Пацієнту віком 44 роки з приводу вентральної грижі з гризовими воротами 15x18 см виконано герніотомію з аутопластикою. Після операції пацієнт скаржиться на задишку, слабкість, запаморочення. Об'єктивно спостерігається: живіт болісний у ділянці післяопераційної рани, симптоми подразнення очеревини негативні, аускультативно: у легенях дихання везикулярне, проводиться у всі відділи, екскурсія зменшена ЧД - 36/хв, серцеві тони глухі, ЧСС - 120/хв, АТ - 90/50 мм рт. ст. Під час проведення комп'ютерної томографії грудної клітки в ангіорежимі патології не виявлено. Per rectum без патології. Яка найімовірніша причина появи скарг у пацієнта?

a. Післяопераційний перитоніт

b. Масивна тромбоемболія легеневих артерій

c. Гостра шлунково-кишкова кровотеча

d. Післяопераційна пневмонія

е. Синдром малої черевної порожнини

18. Пацієнт віком 27 років після падіння з висоти 2-х метрів скаржиться на біль у верхній половині живота, більше ліворуч. Об'єктивно спостерігається: положення - напівсидяче, шкірні покриви бліді, пульс - 112/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., живіт не бере участі в акті дихання, під час пальпації напружений, болючий у всіх ділянках. По лівому фланку перкуторно відзначається скорочення звуку. Позитивні симптоми подразнення очеревини. Розрив якого органа, найімовірніше, стався в пацієнта?

а. Селезінки

- b. Діафрагми
- c. Кишки
- d. Печінки
- e. Сечового міхура

19. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на гострий пульсуючий біль у правій грудній залозі, високу температуру тіла. Із анамнезу відомо, що 3 тижні тому в неї були пологи. Об'єктивно спостерігається: права грудна залоза збільшена в об'ємі, у верхньо-зовнішньому квадранті визначається інфільтрат 4х5х6 см, шкіра над ним гіперемована, з ділянкою флуктуації. Який найімовірніший дігано́з?

- a. Лактостаз
- b. Рак грудної залози
- c. Фіброзно-кістозна мастопатія
- d. Фіброаденома

е. Гострий гнійний мастит

20. Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на загальну слабкість, дискомфорт в епігастральній ділянці, наростаючу іктеричність шкіри, свербіж. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 3-х місяців. Об'єктивно спостерігається: печінка збільшена, щільна, пальпується збільшений, неболючий жовчний міхур. Ахолічний кал. Який найімовірніший діагноз?

а. Рак головки підшлункової залози

- b. Хронічний гепатит
- c. Перфоративна виразка ДПК
- d. Позаматкова вагітність
- e. Гострий аднексит

21. Яке оперативне втручання на органах черевної порожнини має найбільший ризик ятрогенного ушкодження селезінки?

а. Панкреатектомія

- b. Резекція шлунка
- c. Лівобічна гемігепатектомія
- d. Лівобічна нефректomia
- e. Лівобічна геміколектомія

22. Пацієнтці віком 48 років виконано типову лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозного холециститу, дренування підпечінкового простору не використовувалося. Через 24 год у неї виник інтенсивний біль у правому підребер'ї, що іррадіював у надключичну ділянку. Об'єктивно спостерігається: біль у правому підребер'ї і по правому фланку, незначна резистентність черевної стінки, слабо-позитивні симптоми подразнення очеревини, ослаблення перистальтичних шумів, АТ - 120/70 мм рт. ст., ЧСС - 92/хв. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло в пацієнтки?

- a. Інтраабдомінальна кровотеча
- b. Гострий гнійний холангіт
- c. Гострий правобічний пієлонефрит
- d. Перфорація виразки дванадцятипалої кишки

е. Жовчний перитоніт

23. Укажіть доцільний спосіб оброблення вогнепальної рани через 2 год після поранення.

- a. Зшити краї рани

b. Висікти нежиттєздатні тканини, накласти провізорні шви на рану

- c. Промити рану, накласти на неї асептичну пов'язку
- d. Висікти нежиттєздатні тканини, зшити краї рани
- e. Накласти провізорні шви на рану

24. Пацієнт віком 46 років у зоні бойових дій отримав закриту тупу травму живота. На етапах лікування діагностовано травму селезінки IV-V ступеня. Проведена операція - спленектомія. У ранньому післяопераційному періоді виникли такі симптоми: головний біль, слабкість, озноб, підвищення температури тіла до 39°C , задишка, тахікардія, холодний липкий піт. Ознак кровотечі клінічно та лабораторно немає. Здуття живота немає. Аускультативно: перистальтика нормальна. Яке ускладнення характерне для описаних клінічних проявів?

a. Постспленектомічний сепсис (OPSI-синдром)

- b. Піддіафрагмальний абсцес
- c. Рання післяопераційна кишкова непрохідність
- d. ТЕЛА
- e. Госпітальна пневмонія

25. Пацієнт віком 58 років скаржиться на інтенсивний постійний біль по всьому животу, нудоту, блювання шлунковим вмістом, вздуття живота, затримку випорожнень та газів, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість, запаморочення. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 4-х днів. Встановлено діагноз: гострий деструктивний апендицит, розлитий перитоніт, токсична стадія. Яка лікувальна тактика доцільна в цьому разі?

- a. Лапароскопічна апендектомія
- b. Інтенсивна інфузійна антибактеріальна терапія
- c. Апендектомія з доступу МакБерні
- d. Екстрене оперативне лікування без передопераційної підготовки

e. Екстрене оперативне лікування після передопераційної підготовки: лапаротомія, апендектомія, санація, дренування черевної порожнини

26. Пацієнта віком 68 років шпиталізовано зі скаргами на почорніння шкіри та набряк правої стопи й гомілки, втрату рухів стопи та пальців, біль у ділянці правої нижньої кінцівки, підвищення температури тіла до 38°C , загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що протягом 15-ти років хворіє на цукровий діабет 2-го типу. Об'єктивно спостерігається: маса тіла - 98 кг, зріст - 165 см, набряк до рівня середньої третини правої гомілки. В аналізі крові: глюкоза - 22,8 ммоль/л. Встановлено діагноз: волога гангрена правої стопи. Яка хірургічна тактика доцільна в цьому разі?

a. Ампутація на рівні стегна

- b. Некректомія з антибіотикотерапією широкого спектра дії
- c. Ампутація на рівні гомілки в межах здорових тканин
- d. Антибіотикотерапія та корекція рівня глікемії
- e. Судинна реконструкція із подальшим спостереженням

27. Який метод візуальної діагностики є найбільш інформативним для встановлення джерела шлунково-кишкової кровотечі?

a. Езофагогастродуоденоскопія

- b. Ультразвукове дослідження
- c. Рентгенографія органів черевної порожнини
- d. Комп'ютерна томографія
- e. Магнітно-резонансна томографія

28. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Із анамнезу відомо, що захворів 2 місяці тому, з'явилося підвищення температури до 39°C , через 2 тижні - наростаюча жовтяниця. Об'єктивно спостерігається: значна жовтяниця, печінка не пальпується, жовчний міхур збільшений, не болючий. Білірубін крові - 180 мкмоль/л, за рахунок прямого. Кал ахолічний. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гемолітична жовтяниця
- b. Синдром Жільбера
- c. Вірусний гепатит В

d. Механічна жовтяниця

e. Паренхіматозна жовтяниця

29. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано після ДТП з політравмою. Об'єктивно спостерігається: пульс - 118/хв, ЧД - 22/хв, АТ - 80/40 мм рт. ст., SpO₂ - 95% Який лікарський засіб доцільно застосувати для індукції в анестезію в цьому разі?

a. Кетамін

b. Фентаніл

c. Оксibuтират натрію

d. Тіопентал натрію

e. Пропофол

30. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на біль та почервоніння шкіри дистальної фаланги п'ятого пальця правої кисті. Із анамнезу відомо, що 12 год тому пацієнтка перенесла лапароскопічну холецистектомію, і ці скарги виникли після операції. Об'єктивно спостерігається: набряк та почервоніння шкіри дистальної фаланги п'ятого пальця, пухирець із прозорою рідиною. Яка коагуляція застосовувалася під час оперативного втручання?

a. Лазерна

b. Ультразвукова

c. Монополярна

d. Аргонна

e. Біполярна

31. Пацієнт віком 25 років під час дорожньо-транспортної пригоди отримав перелом стегнової кістки в нижній третині зі значним зміщенням фрагментів. Розвиток якого ускладнення варто передбачити під час транспортування та подальшого лікування пацієнта?

a. Компресію судинно-нервового пучка

b. Гемартроз колінного суглоба

c. Зрощення перелому в поперечному положенні

d. Контрактуру колінного суглоба

e. Посттравматичний неврит сідничного нерва

32. Пацієнтку віком 65 років прооперовано з приводу гострої кишкової непрохідності, спричиненої спайками. На 3-тю добу після операції в пацієнтки з'явилися сильний біль у животі, здуття, відсутність відходження газів і випорожнень. Температура тіла підвищилася до 38,5^oC. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло в пацієнтки?

a. Неспроможність анастомозу

b. Тромбоемболія легеневої артерії

c. Сепсис

d. Кровотеча з лінії шва

e. Парез кишечника

33. Пацієнту віком 40 років із паховою грижею виконується лапароскопічна герніопластика. Накладання швів та скоб при фіксації сітки під час операції в ділянці "трикутника болю" може призвести до післяопераційних ускладнень - хронічного болю або порушення чутливості. Із пошкодженням яких анатомічних структур це пов'язано?

a. Клубово-паховий нерв

b. Бічний шкірний нерв стегна, статеві та стегова гілки статево-стегового нерва

c. Нижні епігастральні судини

d. Клубово-підчеревний та клубово-паховий нерви

e. Сім'яний канатик

34. Пацієнта віком 27 років шпиталізовано зі скаргами на біль у животі. За результатами рентгенографії ОЧП виявлено: симптом множинних чаш Клойберга, "ширина" яких виразно перевищує "висоту". На якому рівні кишечника з найбільшою ймовірністю утворилася обструкція просвіту кишки?

a. У початкових відділах ободової кишки

b. У поперечному відділі ободової кишки

- c. У сигмоподібній кишці
- d. На рівні дванадцятипалої кишки
- e. У початкових відділах тонкої кишки

35. Яке першочергове лікування доцільно призначити пацієнту віком 63 роки з гістологічно підтвердженою локалізованою MALT-лімфомою шлунка низького ступеня злоякісності?

- a. Хіміотерапія
- b. Гастротомія
- c. Гастректомія
- d. Ерадикаційна терапія *H. pylori*
- e. Інгібітори протонної помпи

36. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на біль, почервоніння та набряк у ділянці лівого стегна, які з'явилися 4 дні тому. Об'єктивно спостерігається: на шкірі передньої поверхні лівого стегна визначається запальний інфільтрат розміром 3,5х3 см із центральним гнійним стрижнем чорного кольору, шкіра над ураженою ділянкою напружена, гіперемована, пальпація болісна, загальний стан задовільний, температура тіла - 37,3^oC) Який найімовірніший діагноз?

- a. Лімфаденіт лівої пахвинної ділянки
- b. Гідраденіт лівого стегна
- c. Фурункул лівого стегна в стадії нагноєння
- d. Абсцес лівого стегна
- e. Карбункул правого стегна

37. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль у верхніх відділах живота, потемніння сечі, пожовтіння склер. Хворіє дві доби. В анамнезі: два планових кесаревих розтини. За даними сонографії в жовчному міхурі наявні множинні гіперехогенні включення розміром від 3 до 6 мм, з ехотінню. Аналогічне гіперехогенне включення розміром 5 мм візуалізується в ампулі великого дуоденального соска. Загальна жовчна протока розміром 12 мм, вірсунгова протока - 4 мм. Пацієнтці виконано успішне транспапілярне ендоскопічне втручання. Яке ускладнення після вказаної операції найбільш імовірне в цієї пацієнтки?

- a. Гострий холецистит
- b. Кишкова непрохідність
- c. Гострий пост-ЕРХГ панкреатит
- d. Гострий висхідний холангіт
- e. Гостра ниркова недостатність

38. Пацієнтці віком 72 роки виконано радикальну мастектомію за Мадденом праворуч з приводу раку центрального квадранта правої грудної залози pT2pNoMo pG3 IIA ступеня, III клінічна група. За даними імуногістохімічного дослідження встановлено люмінальний А тип пухлини. Який препарат показаний для проведення гормонотерапії пацієнтці в цьому разі?

- a. L-тироксин
- b. Дидрогестерон
- c. Дексаметазон
- d. Преднізолон
- e. Тамоксифен

39. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на багаторазове блювання, появу крові у блювотних масах. Із анамнезу відомо, що наявність виразкової хвороби у себе він заперечує. За даними фіброезофагогастродуоденоскопії в кардіальному відділі шлунка виявлено: множинні, поздовжні, кровоточиві тріщини довжиною 1,0-2,5 см та шириною 0,5-0,7 см, краї слизової оболонки навколо тріщини набряклі, покриті фібрином. Який найімовірніший діагноз?

- a. Виразка кардіального відділу шлунка
- b. Хвороба Менетріє
- c. Хвороба Крона
- d. Синдром Меллорі-Вейса
- e. Хвороба Рендю-Ослера-Вебера

40. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на болючі випинання в ділянці прямої кишки. В

анамнезі: пологи 1,5 року тому. Планує наступну вагітність. За результатами обстеження встановлено діагноз: хронічний комбінований геморої IV ступеня. Яка тактика лікування найбільш доцільна в цьому разі?

а. Місцева медикаментозна терапія із застосуванням супозиторіїв та мазей

б. Гемороїдектомія

с. Латексне лігування внутрішніх гемороїдальних вузлів

д. Дезартеризація внутрішніх гемороїдальних вузлів та мукопексія

е. Системна медикаментозна терапія із застосуванням пігулок на тлі місцевої медикаментозної терапії із застосуванням супозиторіїв та мазей

41. Пацієнта віком 28 років шпиталізовано зі скаргами на слабкість, запаморочення. Із анамнезу відомо, що годину тому тричі відзначалося блювання "кавовою" гущею, упродовж 10-ти років хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, холодний липкий піт, АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 110/хв. В аналізі крові: гемоглобін - 90 г/л. Який найімовірніший діагноз?

а. Гострий панкреатит

б. Синдром Меллорі-Вейса

с. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

д. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу

е. Шлунково-кишкова кровотеча

42. Пацієнт віком 30 років скаржиться на різкий біль у грудній клітці, який виник раптово під час фізичного навантаження. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, артеріальна гіпотензія, тахікардія. На ЕКГ: елементи гострого інфаркту міокарда. Яка лікувальна тактика в цьому разі?

а. Коронарографія з можливим стентуванням

б. Спостереження

с. Консервативне лікування

д. Аортокоронарне шунтування

е. Тромболітична терапія

43. У десятимісячної дитини під час обстеження виявлено: блідість шкірних покривів, виникнення ціанозу під час неспокою. Перкуторно: розширення меж серця в поперечному напрямку. Аускультативно: ліворуч від груднини у 3-4 міжребер'ї вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця та на спину. Який найімовірніший діагноз?

а. Тетрада Фалло

б. Стеноз легеневої артерії

с. Дефект міжпередсердної перегородки

д. Дефект міжзлукової перегородки

е. Коарктація аорти

44. Тромбоз (тромбоемболія) якої судини призводить до найпоширенішого ураження кишечника?

а. Верхньої брижової артерії

б. Ворітної вени

с. Черевного стовбура

д. Нижньої брижової артерії

е. Верхньої брижової вени

45. При защемленій грижі живота пацієнт відзначає, що сильний біль, який виник на початку захворювання, змінився на менш інтенсивний, тупий (розпираючий). При цьому ніякі лікарські препарати не вводилися. Про що з найбільшою ймовірністю свідчить подібна зміна характеру болю?

а. -

б. Про розвиток флегмони грижового мішка

с. Про охоронне гальмування рефлексорної дуги больових рецепторів

д. Про перехід грижі з форми защемленої у форму невправимої

е. Про некроз гризового вмісту

46. Пацієнт віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла, різку слабкість, пітливість, кашель із виділенням гнійного мокротиння з неприємним гнильним запахом, біль у грудях. Із анамнезу відомо, що захворів тиждень тому. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: порожниста тінь з інфільтрацією та рівнем рідини в середньому легеновому полі праворуч, корінь легені та праве склепіння діафрагми підтягнуті до порожнини. Який найімовірніший діагноз?

- a. Ехінококова кіста
- b. Периферичний рак

с. Гострий абсцес легені

- d. Пневмонія
- e. Кавернозний туберкульоз

47. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на постійний біль у животі протягом 6-ти днів, підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Під час пальпації в правій клубовій ділянці визначається еластичне, болюче, округлої форми утворення. Симптоми подразнення очеревини негативні. У загальному аналізі крові: лейкоцитоз - $11,5 \cdot 10^9/\text{л}$, формула незмінена. Загальний аналіз сечі без змін. Який найімовірніший діагноз?

- a. Правобічний піосальпінкс
- b. Пухлина сліпої кишки
- c. Позаматкова трубна вагітність

d. Апендикулярний інфільтрат

- e. Правобічний паранефрит

48. У пацієнта віком 48 років на тлі задовільного самопочуття виникло короткочасне запаморочення та відразу втрата свідомості, а за цим - генералізовані судоми без прикусування язика та мимовільне сечовипускання із дефекацією. Після швидкого надання допомоги перехожими: удару по груднині та початку дихання "рот у рот" і зовнішнього масажу серця - свідомість швидко відновилося з ретроградною амнезією. На ЕКГ: рідкі комплекси QRS (до 40/хв) та не пов'язані з ним зубці Р (до 70/хв), інтервали Р-Р та R-R рівні. Яка тактика лікування доцільна в цьому разі?

- a. Систематична протисудомна терапія
- b. Стентування коронарних судин
- c. Трансплантація серця

d. Встановлення штучного водія ритму серця

- e. Аорто-коронарне шунтування

49. Пацієнтку віком 39 років 14 днів тому прооперовано з приводу перфоративного апендициту, поширеного фібринозно-гнійного перитоніту. Післяопераційний період протікав без ускладнень. На 9-ту добу в неї з'явилася субфебрильна температура тіла, біль у животі, часті рідкі випорожнення. За результатами УЗД органів черевної порожнини виявлено: у лівій мезогастральній ділянці визначається рідинне утворення розміром 9×10 см. В аналізі крові: лейкоцитоз - $12 \cdot 10^9/\text{л}$ із зсувом лейкоцитарної формули вліво. Який найімовірніший діагноз?

- a. Абсцес селезінки
- b. Пухлина черевної порожнини
- c. Кіста лівої нирки
- d. Абсцес печінки

е. Міжпетельний абсцес

50. Пацієнт віком 45 років скаржиться на слабкість, багаторазове блювання свіжою кров'ю, запаморочення, холодний піт. В анамнезі: хронічний гастрит, періодично приймає НПЗП через біль у спині. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, ЧСС - 120/хв, АТ - 85/50 мм рт. ст. Пацієнту виконано езофагогастродуоденоскопію, під час якої виявлено виразку в ділянці антрального відділу шлунка з ознаками кровотечі ІА ступеня за класифікацією Фореста. Проведено ендоскопічний гемостаз, проте зупинити кровотечу не вдалося. Яка подальша тактика лікування є найбільш доцільною в цьому разі?

a. Невідкладне хірургічне втручання

- b. Повторна спроба ендоскопічного гемостазу
- c. Внутрішньовенна інфузія ІПП у високих дозах
- d. Динамічне спостереження стану пацієнта
- e. Трансартеріальна емболізація

51. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на здуття кишечника, закрепи, різку слабкість, схуднення. Із анамнезу відомо, що впродовж останнього місяця випорожнення лише після прийому проносних. Під час пальпації живота спостерігається щільне утворення в лівій здухвинній ділянці. Який найімовірніший діагноз?

- a. Рак сліпої кишки
- b. Перфоративна виразка прямої кишки
- c. Гостра кишкова непрохідність
- d. Рак підшлункової залози
- e. Рак сигмоподібної кишки**

52. Який показник крові повинен бути врахований лікарем-хірургом обов'язково перед виконанням хірургічного втручання пункційно-дренажним способом у пацієнтів із кістами та абсцесами паренхіматозних органів, щоб попереджити виникнення післяопераційних ускладнень?

- a. Креатинін
- b. С-реактивний білок
- c. Гематокрит
- d. Час згортання крові**
- e. Прокальцитонін

53. Що, за даними ВООЗ є найпоширенішим чинником, який викликає гостру фульмінантну печінкову недостатність, яка буде потребувати невідкладної трансплантації печінки?

- a. Отруєння блідою поганкою
- b. Отруєння наркотиками (DILI-синдром)
- c. Отруєння парацетамолом з метою суїциду**
- d. Фульмінантна форма гепатиту В
- e. Отруєння алкоголем

54. Пацієнтка віком 47 років скаржиться на розпираючий біль у ділянці лівої гомілки, підвищення температури тіла до 38^oC. Із анамнезу відомо, що вона хворіє протягом 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: шкіра лівої стопи та гомілки помірно ціанотична, блищить, ліва ступня та гомілка помітно збільшені в об'ємі, окружність лівої гомілки більша, ніж окружність правої, на 4 см. Пальпація литкового м'яза болюча. Симптом Хоманса позитивний. Пульсація на дистальних артеріях лівої стопи ослаблена. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий тромбоз вен лівої гомілки**
- b. Гострий лімфангоїт правої нижньої кінцівки
- c. Варикозне розширення вен кінцівки
- d. Гострий артеріальний тромбоз підколінної артерії
- e. Артеріальна оклюзія

55. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на блювання кров'ю, загальну слабкість, потемніння в очах. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися 7 год тому, хворіла на вірусний гепатит С. Об'єктивно спостерігається: загальний стан середнього ступеня тяжкості, шкіра бліда, пульс - 110/хв, АТ - 100/60 мм рт. ст., живіт дещо збільшений у розмірах, на шкірі передньої черевної стінки - венозна сітка, печінка виступає на 4 см з-під краю реберної дуги, перкуторно - притуплення звуку по фланках. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гостра печінкова недостатність
- b. Синдром Золлінгера-Еллісона
- c. Кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу**
- d. Шлунково-кишкова кровотеча
- e. Легенева кровотеча

56. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано з відмороженням стоп у пізньому реактивному

періоді. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, обидві стопи набряклі, різкий ціаноз шкіри, чутливість повністю відсутня, по лінії демаркації - пухирі з гнійним вмістом, шкіра на гомілках гіперемована, температура тіла - 38°C . Яка лікувальна тактика доцільна в цьому разі?

- a. Інфузійна терапія. Операція - декомпресійна некротомія
- b. Первинний туалет ран. Пов'язки з антисептиками. Операція - ксенопластика
- c. Інфузійна терапія. Операція - некротомія з одномоментною аутодермопластикой
- d. Первинна хірургічна обробка ран. Перев'язки
- e. Інфузійна детоксикаційна терапія, комплексне антибактеріальне лікування, знеболення. Оперативне лікування - некротомія**

57. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано з клінічною картиною апендикулярного інфільтрату. Після проведеного консервативного лікування інфільтрат розсмоктався. Яку подальшу тактику в лікуванні пацієнта потрібно застосувати?

- a. Апендектомія показана після чергового загострення
- b. Виконати апендектомію через 3 місяці**
- c. Апендектомія не показана
- d. Виконати апендектомію, не виписуючи пацієнта
- e. Апендектомія показана через 2 тижні

58. Який метод візуальної діагностики є найбільш інформативним для підтвердження діагнозу гострої кишкової непрохідності?

- a. Магнітно-резонансна томографія
- b. Ультразвукове дослідження
- c. Фіброколоноскопія
- d. Комп'ютерна томографія**
- e. -

59. Яке ускладнення є найбільш типовим після лапароскопічної герніопластики пахової грижі, зокрема після методу TAPP?

- a. Хронічний больовий синдром у ділянці паха**
- b. Інфекція місця хірургічного втручання
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Рецидив грижі
- e. Підшкірна емфізема черевної стінки

60. Пацієнт віком 68 років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопи. Із анамнезу відомо, що хворіє на миготливу аритмію, упродовж останнього тижня пацієнт не дотримувався призначеної антикоагулянтної терапії, двічі пропустив прийом медикаментів. Об'єктивно спостерігається: шкіра гомілки та стопи бліда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливість збережені. Пальпаторно пульсація на стегновій артерії збережена, на підколінній і судинах стопи не визначається. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий варикотромбофлебіт
- b. Артрит гомілковостопного суглоба
- c. Гострий тромбоз підколінної вени
- d. Хвороба Рейно
- e. Тромбоемболія підколінної артерії**

61. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на постійний біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, слабкість. Із анамнезу відомо, що біль виник у верхній половині живота 7 днів тому, на тлі повного здоров'я, через 3 год перемістився у праву здухвинну ділянку, була одноразова блювота. За медичною допомогою не зверталася. За тиждень стан не поліпшився - зберігається підвищена температура тіла до $37,8^{\circ}\text{C}$, нудота, загальна слабкість, що і змусило пацієнтку звернутися до лікаря. Об'єктивно спостерігається: загальний стан середньої тяжкості, температура тіла - $37,6^{\circ}\text{C}$, пульс - 92/хв, язик вологий, обкладений. Під час пальпації живіт м'який, помірно болючий у правій здухвинній ділянці, де нечітко пальпується щільне пухлиноподібне утворення, розміром 7x8 см, помірно болюче, мало рухоме. Перитонеальні симптоми не визначаються. За результатами УЗД виявлено: наявність апендикулярного інфільтрату. Яка тактика лікування пацієнтки доцільна в цьому разі?

- a. Консервативне лікування в денному стаціонарі
- b. Відеоендоскопічна апендектомія
- c. Апендектомія із доступу Волковича-Дьяконова

d. Консервативне лікування в хірургічному стаціонарі

- e. Лапаротомія, санація, дренування черевної порожнини

62. Пацієнта віком 25 років прооперовано з приводу гострого апендициту 2 дні тому.

Скаржиться на підвищення температури тіла до $38,2^{\circ}\text{C}$, біль у рані, загальну слабкість. Яке ускладнення післяопераційної рани виникло в пацієнта?

- a. Тромбоз глибоких вен
- b. Гостра кишкова непрохідність
- c. Геморагія
- d. Інфільтрат

e. Нагноєння післяопераційної рани

63. Пацієнт віком 67 років скаржиться на оперізувальний біль у верхній половині живота, більше праворуч, порушення відходження газів, випорожнень. Біль з'явився після вживання жирної гострої їжі. Об'єктивно спостерігається: пульс - 110/хв, язик покритий білим нашаруванням, сухий, живіт у верхній половині трохи здутий, під час пальпації м'який, відзначається значна болючість в епігастрії. α -амілаза крові - 200 г/л·год. Який найімовірніший діагноз?

- a. Виразкова хвороба
- b. Гострий холецистит

c. Гострий панкреатит

- d. Гострий апендицит
- e. Гостра кишкова непрохідність

64. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано зі скаргами на ниючий біль в епігастрії, нудоту, блювання вмістом чорного кольору, зниження апетиту та відрижку повітрям. В аналізі крові: гемоглобін - 102 г/л, ШОЕ - 31 мм/год. Під час езофагогастроскопії в ділянці малої кривини шлунка виявлено виразку діаметром 3 см з інфільтративними навислими краями. Який спосіб лікування доцільно застосувати в цьому разі?

- a. Хіміотерапію
- b. Висічення виразки
- c. Операцію "на виключення"
- d. Проксимальну резекцію шлунка

e. Гастректомію

65. Пацієнт віком 65 років скаржиться на жовтушність шкіри, видимих слизових оболонок, знебарвлений кал, потемніння сечі. Із анамнезу відомо, що жовтяниця спостерігається протягом тижня. В аналізі крові: білірубін - 230,0 мкмоль/л (прямий - 150 мкмоль/л, непрямий - 80 мкмоль/л), лейкоцитоз - $9 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 15 мм/год, HBs та HCV антигени - негативні. Амілаза сечі - 32 ОД. За даними УЗД: печінка не збільшена, жовчний міхур - 80х35 мм, стінка - 3 мм, у просвіті множинні конкременти 5-10 мм, загальна жовчна протока - 18 мм. Який метод обстеження необхідно провести для діагностики біліарної гіпертензії?

- a. Спіральну комп'ютерну томографію
- b. Фіброгастодуоденоскопію
- c. Лапароскопію

d. Ендоскопічну ретроградну холангіо-панкреатографію

- e. Черезшкірну черезпечінкову холангіографію

66. Пацієнт віком 52 роки скаржиться на сильний біль за грудниною, печію, блювання, після якого біль і печія зменшуються, дисфагію, зниження маси тіла. За результатами рентгенографії стравоходу виявлено: "ніша" діаметром 2,5 см. Укажіть доцільну лікувальну тактику в цьому разі.

a. Оперативне втручання

- b. Консервативне ведення пацієнта, призначення анальгетиків
- c. Тест на гелікобактерну інфекцію

- d. Призначення антисекреторних препаратів
- e. Проведення спазмолітичної терапії

67. Пацієнтка віком 37 років скаржиться на нудоту, блювання з домішками жовчі, біль у ділянці серця, що триває 4 год, але слабшає після вживання нітрогліцерину. Об'єктивно спостерігається: позитивні симптоми Кера, Мерфі, Ортнера-Грекова, АТ - 90/60 мм рт. ст., пульс - 100/хв. В анамнезі: калькульозний холецистит, напередодні вживала жирну їжу. На ЕКГ патологічних змін не виявлено. Який найімовірніший діагноз?

- a. Інфаркт міокарда
- b. Стенокардія Принцметала
- c. Напад жовчної коліки
- d. Виразка шлунка
- e. Панкреонекроз

68. У п'ятирічної дитини раптово з'явився сильний біль у животі, який локалізується навколо пупка. Об'єктивно спостерігається: бліда, занепокоєна, відмовляється від їжі, живіт втягнутий, м'який, болючий під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- a. Кишкова інфекція
- b. Аліментарна токсикація
- c. Ниркова коліка
- d. Гострий апендицит
- e. Інвагінація кишок

69. Пацієнт віком 46 років скаржиться на різкий біль у ділянці ануса та незначне виділення крові під час та після походу до туалету протягом декількох тижнів. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 38^oC, пульсуючий постійний біль в анальному каналі. Під час ректального обстеження виявлено: болючий інфільтрат на 11 год умовного циферблата на 2 см від анального каналу. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий геморой. Аноректальний тромбоз
- b. Хронічний геморой у стадії загострення
- c. Аноректальний абсцес
- d. Хронічна передня анальна тріщина
- e. Гостра передня анальна тріщина

70. Пацієнт віком 40 років скаржиться на біль у животі, нудоту, одноразове блювання. Із анамнезу відомо, що захворів 3 год тому, коли в животі з'явився "кинджальний" біль. Об'єктивно спостерігається: загальний стан середньої тяжкості, пульс - 96/хв, АТ - 110/80 мм рт. ст., шкіра та склери бліді, живіт не здутий, передня черевна стінка у верхніх відділах відстає в акті дихання. Під час пальпації живіт болючий та напружений у верхніх відділах. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини під правим куполом діафрагми визначається серповидне просвітлення. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий панкреатит
- b. Перфорація порожнистого органа
- c. Гострий холецистит
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Гострий апендицит

71. Пацієнту віком 47 років встановлено діагноз: хронічна хвороба нирок V стадії, термінальна ниркова недостатність. Його здоровий брат, який є одноплямцем близнюком пацієнта, запропонував для пересадки свою нирку. Визначте вид трансплантації.

- a. Ортотопічна трансплантація
- b. Аутоотрансплантація
- c. Гетеротрансплантація
- d. Ізотрансплантація
- e. Ксенотрансплантація

72. Пацієнт віком 45 років перебуває на стаціонарному лікуванні протягом 10-ти днів з діагнозом: гострий абсцес нижньої частки правої легені. Раптово виник різкий біль у правій

половині грудної клітки, відчуття "нестачі повітря", задишка до 30/хв. Об'єктивно спостерігається: ціаноз обличчя, дихання поверхневе, часте. Аускультативно: дихання різко ослаблене на всьому протязі правої легені. Перкуторно праворуч - коробковий звук у верхніх відділах, притуплення перкуторного звуку нижче VII ребра. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

a. Піопневмоторакс

b. Перфорація стравоходу

c. Пневмоторакс

d. Плевропневмонія

e. Гострий медіастеніт

73. Пацієнт віком 68 років скаржиться на раптовий біль у правій гомілці, з'явилося значне зменшення об'єму рухів у кінцівці. В анамнезі: миготлива анемія. Об'єктивно спостерігається: права стопа бліда, холодна, чутливість на гомілці та стопі знижена, пульсація на стегновій артерії збережена, дистальніше - відсутня. Активні рухи різко обмежені. Який найімовірніший діагноз?

a. Емболія правої стегнової артерії

b. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен

c. Тромбоз стегнової артерії

d. Попереково-крижовий остеохондроз

e. Гострий тромбофлебіт глибоких вен

74. Пацієнт віком 66 років скаржиться на відчуття оніміння, похолодання та затерпання в лівій нижній кінцівці, появу болю в лівій гомілці під час проходження дистанції 150 м, останні 2 дні - біль у спокої. Ультрасонографічно верифіковано стеноз лівого стегново-підколінно-гомілкового сегмента, оклюзію задньої великогомілкової артерії. Який рівень хронічної ішемії за Фонтейном у пацієнта?

a. III

b. II а

c. II б

d. IV

e. I

75. У пацієнта віком 50 років раптово виник біль у животі. Об'єктивно спостерігається: живіт збільшений в об'ємі, перистальтичні шуми посилені, позитивний симптом Спасокукоцького. Який першочерговий вид діагностики потрібно застосувати в цьому разі?

a. Ультрасонографію органів черевної порожнини

b. Діагностичну лапаротомію

c. Комп'ютерну томографію органів черевної порожнини

d. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини

e. Рентгенографію органів черевної порожнини з контрастуванням

76. Дорослому пацієнту виконується відеоасистоване торакоскопічне втручання. З метою антибіотикопрофілактики введено цефазолін 2 г в/в. За якої тривалості операції дозу цефазоліну потрібно повторити?

a. Більше 5 год

b. Більше 4 год

c. Більше 3 год

d. Більше 1 год

e. Більше 2 год

77. У пацієнта діагностовано хронічний комбінований геморої III стадії з рецидивними кровотечами після дефекації та епізодами випадіння вузлів, що потребують мануального вправлення. Який метод лікування є найбільш доцільним у цьому разі?

a. Гемороїдектомія за Мілліганом-Морганом

b. Консервативне лікування із застосуванням системних венотонічних засобів та місцевих кровоспинних і судинозвужувальних препаратів

c. Склеротерапія гемороїдальних вузлів

- d. Латексне лігування гемороїдальних вузлів
- e. Лазерна вапоризація гемороїдальних вузлів

78. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на дискомфорт у ділянці шиї, утруднене ковтання, легке відчуття задишки, яке посилюється вночі. Об'єктивно спостерігається: щитоподібна залоза збільшена, пальпаторно - ущільнення правої частки щитоподібної залози розміром 2,5x2,0 см, нерухоме під час ковтання. Лабораторно: рівень тиреотропного гормону (ТТГ) у межах норми. УЗД: вузлове утворення з чіткими контурами, гіпоехогенне. Який найімовірніший діагноз?

- a. Фолікулярний аденоматозний зоб
- b. Ендемічний зоб
- c. Вузловий колоїдний зоб
- d. Кіста правої частки
- e. Папілярний рак щитоподібної залози**

79. Пацієнтка віком 56 років скаржиться на періодичний біль у поперековій ділянці праворуч. На УЗД: пухлина лівої нирки 39 мм у діаметрі, за даними СКТ - пухлина лівої нирки розміром 39x29x32 мм, розташована у верхньому полюсі, уростазу немає, даних про метастази немає. Встановлено клінічний діагноз: рак правої нирки, I стадія, T1N0M0 II клінічна група. Яка доцільна тактика лікування в цьому разі?

- a. Хіміотерапія
- b. Резекція правої нирки**
- c. Імунотерапія
- d. Променева терапія
- e. Нефректомія праворуч

80. Пацієнта віком 46 років шпиталізовано зі встановленим діагнозом: защемлена пахова грижа праворуч. Початок захворювання - 12 год тому. Під час виконання невідкладної операції при ревізії за всіма макроскопічними ознаками встановлено нежиттєздатність (некроз) ділянки защемленої тонкої кишки, яка була вмістом грижового міхура. Яка тактика лікування найбільш доцільна в цьому разі?

- a. Резекція тонкої кишки в межах - проксимально 20-25 см, дистально 10-15 см
- b. Накладання ентеростоми
- c. Резекція тонкої кишки по 20 см з обох боків
- d. Закрита назоінтестинальна інтубація
- e. Резекція тонкої кишки в межах - проксимально 35-40 см, дистально 15-20 см**

81. Укажіть хірургічний доступ вибору при підозрі на поранення серця в гемодинамічно нестабільних пацієнтів.

- a. Торакотомія за типом "відкритої мушлі"
- b. Правобічна передньобокова торакотомія
- c. Лівобічна бокова торакотомія
- d. Лівобічна передньобокова торакотомія**
- e. Поздовжня стернотомія

82. Пацієнт віком 37 років скаржиться на різкий біль, обмеження пасивних рухів, активні рухи в плечовому суглобі неможливі. Із анамнезу відомо, що він нещодавно впав з упором на правий плечовий суглоб. Об'єктивно спостерігається: відведена та зігнута в плечовому суглобі травмовану руку підтримує здоровою, у ділянці дельтоподібного м'яза - западиння, під шкірою різко випинається акроміальний відросток лопатки, голівка плечової кістки пальпується під дзьобоподібним відростком. Який найімовірніший діагноз?

- a. Перелом діафіза плеча
- b. Перелом анатомічної шийки плеча
- c. Вивих плеча**
- d. Перелом шийки плеча
- e. Перелом великогомілкової кістки

83. Пацієнта віком 21 рік шпиталізовано без свідомості з ознаками побиття. Об'єктивно

спостерігається: психомоторне збудження, на подразники не реагує, АТ - 110/70 мм рт. ст., пульс - 100/хв, задовільного наповнення та напруження, парез правої половини тулуба, анізокорія праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- a. Субдуральна гематома праворуч
- b. Епідуральна гематома ліворуч
- c. Субдуральна гематома ліворуч
- d. Епідуральна гематома праворуч

e. Забій головного мозку

84. Пацієнтка віком 39 років скаржиться на затримку менструації, нудоту та загрубіння молочних залоз. За результатами гінекологічного огляду патології не виявлено. Яке лабораторне обстеження доцільно призначити для виключення позаматкової вагітності в пацієнтки?

- a. Пролактин
- b. alpha-фетопротейн
- c. Фолікулстимулюючий гормон
- d. Лютеїнізуючий гормон

e. beta-хоріонічний гонадотропін

85. Які хірургічні втручання повинен виконувати лікар-хірург в амбулаторних умовах?

a. Виконання хірургічного втручання при правосторонній пахвинній грижі під спиномозковою анестезією

b. Розкриття та дренивання фурункула нижньої третини правого передпліччя під місцевим знеболенням

c. Висічення карбункула в ділянці носогубного трикутника в гнійно-некротичній стадії під місцевим знеболенням

d. Виконання хірургічного втручання при гострому флегмонозно-гангренозному апендициті під загальним знеболенням

e. Виконання лапароскопічної холецистектомії та дренивання підпечінкового простору під ендотрахеальним наркозом

86. Пацієнтка віком 59 років скаржиться на різкий біль у лівій половині грудної клітки та задишку, що виникли після кашлю. В анамнезі: хронічне обструктивне захворювання легень. Об'єктивно спостерігається: дифузний ціаноз, поверхнєве дихання частотою 33-35/хв, ЧСС - 110/хв, АТ - 80/40 мм рт. ст., перкуторно над легеньми - тимпанічний звук, аускультативно - відсутність дихальних шумів над лівою половиною грудної клітки. Зміщення правої межі серця до середньоключичної лінії. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло в пацієнтки?

a. Напружений пневмоторакс

b. Інфаркт міокарда

c. Пневмонія

d. набряк легень

e. Тромбоемболія легеневої артерії

87. Пацієнтку віком 40 років прооперовано з приводу вузлового тиреотоксичного зоба, виконано субтотальну тиреоїдектомію. Операція виконана без особливостей. Через 3 дні стан пацієнтки погіршився: з'явилася задишка, неприємні відчуття в ділянці серця, гіперемія шкіри, пітливість, тахікардія до 130/хв, підвищилася температура тіла. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

a. Тромбоемболія легеневої артерії

b. Тиреотоксичний криз

c. Порушення мозкового кровообігу

d. Гіпотиреодний криз

e. Ішемічна хвороба серця

88. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано зі скаргами на слабкість, рідкий чорний стілець, блювання за типом "кавової гущі". В анамнезі: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. За результатами ЕФГДС виявлено: виразка постпілоричного відділу дванадцятипалої кишки до 1 см в діаметрі, на дні якої судина з рихлим тромбом. За допомогою яких показників можна

встановити ступінь геморагічного шоку?

a. Систолічного АТ та пульсу

b. Гемоглобіну та еритроцитів

c. Гемоглобіну та гематокриту

d. Маса тіла та гематокриту

e. Гематокриту, гемоглобіну, еритроцитів, ШОЕ

89. Пацієнтку віком 40 років прооперовано з приводу гострого гангренозного перфоративного апендициту, дифузного гнійного перитоніту. Через 10 днів після операції в неї підвищилася температура тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, виник біль унизу живота, тенезми. В аналізі крові: лейкоцитоз - $17,5 \cdot 10^9/\text{л}$, зсув лейкоцитарної формули вліво. Під час пальцевого дослідження прямої кишки визначається болючість та нависання передньої стінки прямої кишки. Яке ускладнення розвинулося в пацієнтки?

a. Абсцес простору Дугласа

b. Заочеревинна флегмона

c. Гостра кишкова непрохідність

d. Рак прямої кишки

e. Гострий панкреатит

90. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано з опіком III ступеня правого передпліччя. Який метод лікування є найефективнішим для відновлення шкірного покриву в цьому разі?

a. Лазерне лікування

b. Консервативне лікування мазями

c. Пересадка ксенодерми

d. Гіпербарична оксигенація

e. Аутодермопластика

91. При компенсованому цирозі печінки з варикозно розширеними венами стравоходу та рецидивами кровотечі з них, при зниженні загального об'єму крові, що протікає через печінку, показано оперативне втручання. Укажіть це оперативне втручання.

a. Спленектомія

b. Накладання порто-кавального анастомозу

c. Оментопексія

d. Накладання артеріо-венозного анастомозу

e. Дренування черевної порожнини

92. Пацієнт віком 48 років скаржиться на різкий, оперізуючий біль у верхній половині живота, збільшення живота в об'ємі, задишку, нудоту, блювання, затримку стільця та газів. Із анамнезу відомо, що захворів дві доби тому після вживання алкоголю. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, пульс - 120/хв, ЧД - 26/хв, АТ - 90/50 мм рт. ст., ціаноз обличчя, живіт здутий, ліва половина відстає в акті дихання, під час пальпації - напружений, болючий в епігастрії та лівому підребер'ї, позитивні симптоми Кьорте, Воскресенського. Аускультативно - перистальтичні шуми послаблені. Який найімовірніший діагноз?

a. Гостра кишкова странгуляційна непрохідність

b. Тромбоз мезентеріальних судин

c. Гострий деструктивний холецистит

d. Перфоративна виразка дванадцятипалої кишки

e. Гострий панкреатит

93. Який основний принцип надання першої допомоги при термічних опіках?

a. Охолодити уражену ділянку 70%-им розчином спирту

b. Змастити уражену ділянку олією

c. Знеболити

d. Нанести крем з антибіотиком

e. Охолодити уражену ділянку холодною водою

94. Під час операції з приводу защемленої грижі виявлено нежиттєздатну петлю кишечника. Які подальші дії потрібно виконати в цьому разі?

a. Резекція нежиттєздатної ділянки кишки, накладання анастомозу, пластика гризових воріт

b. Продовжити операцію, спробувати вправити кишку

c. Відкласти операцію, призначити консервативне лікування

d. Вивести ентеростому

e. Закрити рану без пластики гризових воріт

95. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано з різано-рваною раною по медіальній поверхні лівого стегна, у рані візуалізується металеве стороннє тіло. За результатами рентгенологічного обстеження виявлено: стороннє тіло перебуває в проєкції привідного каналу. За даними артеріографії кінцівки: дефект контрастування судини нижче стороннього тіла. На операції виявлено повне пересічення поверхневої стегнової артерії з дефектом протяжністю 3 см. Яким способом найкраще відновити прохідність артерії цьому пацієнту?

a. Протезування артерії за допомогою вставки із судинного протеза з політетрафторетилену

b. Протезування артерії за допомогою вставки із судинного протеза з дакрону

c. Протезування артерії фрагментом великої підшкірної вени зі здорової кінцівки

d. Зшивання мобілізованих кінців артерії шляхом "кінець у кінець"

e. Протезування артерії фрагментом великої підшкірної вени з ураженої кінцівки

96. Пацієнта віком 29 років шпиталізовано з проникаючим пораненням грудної клітки ліворуч. Об'єктивно спостерігається: стан середньої тяжкості, шкіра бліда, АТ - 100/60 мм рт. ст., пульс - 120/хв. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: ліворуч малий гемоторакс, межі серця розширені, талія серця відсутня. В аналізі крові: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/л$. Який найімовірніший діагноз?

a. Поранення легень

b. Поранення серця

c. Пневмоторакс ліворуч

d. Гідроторакс ліворуч

e. Геморагічний шок

97. У пацієнта після черепно-мозкової травми розвинувся підвищений внутрішньочерепний тиск. Яке невідкладне лікування необхідно провести в цьому разі?

a. Консервативне лікування (спокій, холод на голову)

b. Введення глюкокортикоїдів

c. Хірургічне лікування (декомпресія)

d. Проведення люмбальної пункції

e. Призначення сечогінних препаратів

98. Пацієнт віком 22 роки скаржиться на сильний ("кинджальний") біль в епігастрії. Виразковий анамнез відсутній. Об'єктивно спостерігається: дефанс м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга, блідість шкіри і слизових оболонок, відсутність печінкової тупості, ЧСС - 58/хв, АТ - 80/50 мм рт. ст. Який патологічний стан виник у пацієнта?

a. Шлункова кровотеча

b. Пенетруюча виразка

c. Перфоративна виразка

d. Тромбоз ворітної вени

e. Гостра печінкова недостатність

99. Пацієнтка віком 70 років скаржиться на раптовий інтенсивний головний біль та нудоту. Із анамнезу відомо, що останні пів року в неї спостерігалася легка диплопія, яка посилювалася під час фізичного навантаження, протягом багатьох років хворіє на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу. Об'єктивно спостерігається: АТ - 180/90 мм рт. ст., ЧСС - 86/хв, правосторонній птоз, легка анізокорія та ригідність потиличних м'язів. Атаксія не спостерігається. Який найімовірніший діагноз?

a. Гіпертонічний криз

b. Пухлина головного мозку

c. Лакунарний інсульт

d. Судинна енцефалопатія

e. Субарахноїдальний крововилив

100. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на гострий біль у нижніх відділах живота, з іррадіацією в пряму кишку, запаморочення, нудоту, кров'янисті виділення з піхви, затримку менструації на 4 тижні. Тест на вагітність позитивний. Аналіз крові на beta-ХГЛ не проводився. Статеве життя регулярне. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, тахікардія, визначається болючість під час пальпації в нижніх відділах живота, симптом Щоткіна-Блумберга позитивний. Вагінальне дослідження провести не можливо через виражений больовий синдром. За результатами УЗД плідне яйце в порожнині матки не візуалізується. Який найімовірніший діагноз?

а. Загрозливий аборт

б. Позаматкова вагітність

с. Гострий сальпінгоофорит

д. Гострий апендицит

е. Апоплексія лівого яєчника

101. У пацієнта з відмороженням III ступеня пальців ніг лівої кінцівки спостерігається чітка демаркаційна лінія між здоровими і некротичними тканинами. Яке лікування показано в цьому разі?

а. Консервативне лікування

б. Хірургічне видалення некротичних тканин

с. Фізіотерапія

д. Пересадка шкіри

е. Гіпербарична оксигенація

102. Пацієнтка віком 39 років у результаті ДТП отримала удар по правій плечовій кістці дверима, відчула хрускіт та сильний біль. Об'єктивно спостерігається: припухлість, деформація, патологічна рухливість на межі середньої та нижньої третини плеча, анатомічне вкорочення, кисть у положенні долоневого згинання, розгинання її та відведення 1 пальця неможливі, відсутня чутливість у ділянці "анатомічної табакерки". За результатами рентгенографії встановлено діагноз: закритий перелом правої плечової кістки на межі с/3 та н/3 зі зміщенням та пошкодженням променевого нерва. Яка тактика лікування доцільна в цьому разі?

а. Консервативне лікування - закрита репозиція, гіпсова іммобілізація

б. Лікування скелетним витягінням

с. Консервативне лікування - антибіотикотерапія, анальгетики

д. Оперативне лікування - накладання апарата зовнішньої фіксації

е. Оперативне лікування - відкрита репозиція, остеометалосинтез, ревізія променевого нерва

103. У пацієнта віком 35 років під час індукції в анестезію внутрішньовенним введенням діазепаму раптово з'явилася задишка. Об'єктивно спостерігається: шкіра обличчя з ціанозом, сухі свистячі дистанційні хрипи, ЧД - 30/хв, АТ - 70/40 мм рт. ст., ЧСС - 138/хв. Який патологічний стан виник у пацієнта?

а. Гостра надниркова недостатність

б. Гостра серцево-судинна недостатність

с. Напад бронхіальної астми

д. Анафілактичний шок

е. Гостра дихальна недостатність

104. Під час лапароскопічних операцій створення пневмоперитонеуму (заповнення черевної порожнини газом) є необхідним етапом для формування оперативного простору та забезпечення візуалізації. Проте важливо підтримувати оптимальний тиск у черевній порожнині, щоб уникнути негативного впливу на пацієнта. Укажіть оптимальний тиск у черевній порожнині під час проведення інсуфляції.

а. 6-8 мм рт. ст.

б. 19-21 мм рт. ст.

с. 16-18 мм рт. ст.

д. 9-11 мм рт. ст.

е. 12-15 мм рт. ст.

105. Пацієнтка віком 65 років скаржиться на постійний ниючий біль в епігастральній ділянці з іррадіацією у спину протягом 4-х місяців, втрату маси тіла. Під час УЗД: у проєкції тіла-хвоста підшлункової залози визначається кістозне утворення діаметром до 60 мм з перетинками, солідним пристінковим компонентом. Який діагностичний метод доцільно використати для верифікації діагнозу в цьому разі?

- a. Спіральна комп'ютерна томографія
- b. Цитологічне дослідження аспірату з утворювання**
- c. МРТ
- d. Ретроградна холангіопанкреатографія
- e. Визначення рівня панкреатичних ферментів у крові

106. Пацієнта віком 45 років у шоковому стані шпиталізовано з діагнозом: закрита травма органів черевної порожнини. Під час УЗД виявлено: одномоментний розрив селезінки. Який вид лікування найбільш доцільний у цьому разі?

- a. Діагностична лапароскопія
- b. Переливання однокрупної крові
- c. Лапаротомія з ушиванням розриву селезінки
- d. Лапаротомія зі спленектомією**
- e. Інтенсивна інфузійна терапія

107. Пацієнт віком 45 років скаржиться на наявність більше одного року утворень у ділянці анального отвору, які самостійно не вправляються в анальний канал, а під час вправлення їх рукою знову випадають назовні. Під час акту дефекації виділяється свіжа кров, відчувається незначна болючість та дискомфорт у періанальній ділянці. Під час огляду в ділянці ануса виявлено збільшені до 2-х см кожний зовнішні та внутрішні гемороїдальні вузли в типових місцях, незначна болючість їх при пальпації та свіжа кров на рукавичці. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- b. Хронічний комбінований геморой I стадії
- c. Хронічний комбінований геморой III стадії
- d. Хронічний комбінований геморой II стадії
- e. Хронічний комбінований геморой IV стадії**

108. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на біль, нудоту, блювання, відчуття розпирання в лівому підребер'ї. В анамнезі: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. За результатами рентгенологічного дослідження виявлено: затримка контрастної рідини в шлунку до 24 год. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

- a. Декомпенсований стеноз воротаря**
- b. Пенетрація виразки
- c. Перфорація виразки
- d. Малігнізація виразки
- e. Кровотеча

109. Який метод гемостазу є провідним при гострих кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту?

- a. Ендоскопічний гемостаз**
- b. Медикаментозний гемостаз
- c. Ангіоемболізація судини, що кровоточить
- d. Невідкладне операційне втручання з метою гемостазу
- e. Переливання компонентів крові

110. Пацієнт віком 62 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 38°C , біль у ділянці лівої сідниці, гіперемію шкіри. В анамнезі: внутрішньом'язові ін'єкції вітаміну B₁₂. Об'єктивно спостерігається: на лівій сідниці визначається зона набряку та гіперемії 5х8 см з флюктуацією в центрі. В аналізі крові: лейкоцити - $12,4 \cdot 10^9/\text{л}$, паличкоядерні нейтрофіли - 11%. Яка лікувальна тактика є найбільш доцільною в цьому разі?

- a. Амбулаторне спостереження
- b. Антибіотикотерапія**

с. Розкриття та дренивання абсцесу

- d. Консервативне лікування
- e. Електрофорез

111. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на постійний біль унизу живота, який посилюється під час фізичного навантаження, а також на набряклість нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігається: набряк у ділянці паха праворуч, болючість під час пальпації в цій же ділянці, симптоми порушення венозного відтоку. Який найімовірніший діагноз?

a. Пахова грижа

- b. Пухлина прямої кишки
- c. Ілеофemorальний тромбоз
- d. Варикозна хвороба нижніх кінцівок
- e. Міома

112. Пацієнтку віком 55 років шпиталізовано зі скаргами на біль у пупковій ділянці, який виник 6-8 год тому. Об'єктивно спостерігається: наявність утворення (випинання) черевної стінки без чітких меж, напружене, малорухоме, болісне під час пальпації, шкіра над ним дещо ціанотична. Симптоми подразнення очеревини та "кашльового поштовху" негативні. Який найімовірніший діагноз?

- a. Невправима пупкова грижа
- b. Ліпома передньої черевної стінки

с. Защемлена пупкова грижа

- d. Пухлина органів черевної порожнини
- e. Підшкірна евертація

113. У пацієнтки віком 42 роки після апендектомії з приводу гострого гангренозного апендициту з'явився тупий біль унизу живота, тенезми, біль під час дефекації, помірний біль при сечовипусканні. Підвищилася температура тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$. Яке ускладнення післяопераційного періоду виникло в пацієнтки?

- a. Гострий геморой

b. Тазовий абсцес

- c. Гострий цистит
- d. Гострий дифузний перитоніт
- e. Гострий проктит

114. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на постійний розпираючий біль у поперековій ділянці, загальне нездужання та відчуття слабкості, високу температуру тіла. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом тижня, протягом 5-ти років хворіє на цукровий діабет 2-го типу. Об'єктивно спостерігається: загальний стан середньої тяжкості, температура тіла - 39°C , у поперековій ділянці визначається гіперемія шкіри, болючий інфільтрат 10×8 см зі стрижнем і некрозом шкіри в центрі та з множинними отворами по периферії, з яких виділяється густий гній. Який найімовірніший діагноз?

a. Карбункул поперекової ділянки, стадія абсцедування

- b. Фурункул поперекової ділянки, у стадії абсцедування
- c. Фурункульоз поперекової ділянки
- d. Флегмона поперекової ділянки
- e. Абсцес поперекової ділянки

115. Пацієнт віком 43 роки скаржиться на раптовий сильний біль у правій паховій ділянці, що супроводжується нудотою та блюванням. Під час огляду виявлено: напружене, болюче утворення в правій паховій ділянці, яке не вправляється. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий апендицит
- b. Перфорація порожнистого органа
- c. Ниркова коліка
- d. Невправима пахова грижа

e. Защемлена пахова грижа

116. Пацієнт після операції з приводу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки скаржиться

на біль у верхній частині живота, блювання "кавовою гущею". Яке ускладнення, найімовірніше, виникло в пацієнта?

- a. Панкреатит
- b. Рецидив виразки
- c. Післяопераційна кровотеча**
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Післяопераційна інфільтрація

117. Пацієнт віком 85 років скаржиться на пожовтіння шкіри та слизових оболонок, наявність ахолічного калу, темної сечі. Результати лабораторних досліджень: гіпербілірубінемія за рахунок підвищення прямого білірубіна, підвищення рівня лужної фосфатази, збільшення рівня креатиніну сироватки крові. Під час УЗД жовчних протоків виявлено: дилатація загальної печінкової протоки - до 12 мм, внутрішньопечінкових протоків - до 5 мм, загальна жовчна протока не візуалізується. Який метод інструментальної діагностики необхідно обрати для верифікації діагнозу цьому пацієнту?

- a. МРХПГ**
- b. Діагностичну лапароскопію
- c. ЕРХПГ
- d. Спіральну комп'ютерну томографію ОЧП
- e. ЕФГДС

118. Пацієнтці проведено алотрансплантацію нирки. Через 10 днів з'явилися скарги на підвищення температури тіла до 38,5^oC, зменшення діурезу, розпираючий біль у ділянці трансплантованої нирки. В аналізі крові: підвищення рівня креатиніну та сечовини. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хронічне відторгнення трансплантата
- b. Лімфоцел
- c. Гостре відторгнення трансплантата**
- d. Розрив трансплантованої нирки
- e. Інфекція сечовивідних шляхів

119. Пацієнт віком 58 років скаржиться на біль у попереку праворуч, що поширювався на праву половину живота, з іррадіацією у промежину, нудоту, блювання. Після прийому спазмолітиків стало краще. В аналізі сечі: велика кількість свіжих еритроцитів. На УЗД нирок виявлено конкремент у правій нирці - 4 мм. Який найімовірніший діагноз?

- a. Сечокам'яна хвороба**
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Гострий цистит
- d. Пухлина нирки
- e. Гострий гломерулонефрит

120. Пацієнт віком 68 років скаржиться на спастичний біль у животі, нудоту та блювання, затримку відходження випорожнень і газів, здуття живота. Періодично відзначає здуття живота протягом 3-х місяців. Об'єктивно спостерігається: живіт рівномірно здутий, м'який. В аналізі крові: гемоглобін - 106 г/л. Під час пальцевого дослідження прямої кишки ампула її порожня. При ФКС на 20 см від ануса пухлина, яка повністю обтурає просвіт кишки. Який обсяг оперативного втручання є найбільш доцільним у цьому разі?

- a. Лівобічна геміколектомія
- b. Накладення колостоми проксимальніше обтурації
- c. Операція Гартмана**
- d. Черевно-анальна резекція прямої кишки
- e. Обхідний трансверзо-ректоанастомоз

121. Пацієнтка віком 52 роки скаржиться на сильний біль у правій половині живота, який іррадіює в праву надключичну ділянку, підвищення температури тіла, сухість та гіркоту в роті. Було неодноразове блювання, яке не приносило полегшення. Біль пов'язує із вживанням жирної їжі. Об'єктивно спостерігається: положення - лежить на правому боці, бліда, тахікардія, язик сухий. Живіт під час пальпації болючий у правій половині та дещо напружений у правому

підребер'ї. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Гострий холецистит**
- c. Перфоративна виразка
- d. Гострий апендицит
- e. Правобічна ниркова коліка

122. У пацієнта віком 28 років діагностовано клінічні ознаки напруженого пневмотораксу. Для надання допомоги призначено плевральну пункцію. У якій ділянці потрібно провести плевральну пункцію пацієнту?

- a. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на боці ураження**
- b. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на здоровому боці
- c. V-VI міжребер'ї по середній аксиллярній лінії на боці ураження
- d. VIII-IX міжребер'ї по задній аксиллярній лінії на здоровому боці
- e. VIII-IX міжребер'ї по задній аксиллярній лінії на боці ураження

123. Пацієнтку віком 19 років шпиталізовано зі скаргами на біль унизу живота, більше праворуч, з іррадіацією у пряму кишку. Із анамнезу відомо, що остання менструація була два тижні тому. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс - 98/хв, температура тіла - 36,5[°]С, АТ - 90/60 мм рт. ст., живіт дещо напружений, незначно болючий у нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабкопозитивні. В аналізі крові: гемоглобін - 90 г/л. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий апендицит
- b. Порушена позаматкова вагітність
- c. Ниркова коліка
- d. Гострий панкреатит
- e. Апоплексія яєчника**

124. Пацієнта віком 33 роки шпиталізовано зі скаргами на нудоту, блювання нещодавно з'їденою їжею, а надалі - кров'ю темно-вишневого кольору. Із анамнезу відомо, що напередодні вживав велику кількість алкоголю. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта середньої тяжкості, шкірні покрови бліді, чоло вкрите холодним потом, АТ - 80/40 мм рт. ст., живіт м'який, безболісний, збільшений у розмірах. Спостерігається позитивний симптом ундуляції. Виявлено розширення вен передньої черевної стінки за типом Caput Medusae, мелена. Який найімовірніший діагноз?

- a. Кровотеча з варикозно-розширених вен стравоходу**
- b. Синдром Меллорі-Вейсса. Активна кровотеча
- c. Гостра кровотеча, що викликана гострою поліорганною недостатністю після вживання сурогатів алкоголю
- d. Кровотеча з гострих ерозій стравоходу, що викликані хімічним опіком
- e. Кровоточива виразка шлунка

125. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на часті рідкі випорожнення з домішками крові до 20-ти разів на добу, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що протягом останнього року вона помічала появу рідких випорожнень до 5-ти разів на добу з домішками слизу та крові. Чотири дні тому різко погіршився стан здоров'я, з'явився біль у прямій кишці під час дефекації. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, температура тіла - 38,9[°]С, пульс - 105/хв, АТ - 95/60 мм рт. ст., живіт роздутий, болючий під час пальпації у всіх відділах. В аналізі крові: анемія, лейкоцитоз. Фіброколоноскопія: слизова оболонка товстої кишки у всіх відділах покрита фібринозно-гнійними плівками з численними виразками різної глибини та форми, у просвіті кишки гній та кров. Який найімовірніший діагноз?

- a. Хвороба Крона
- b. Гострий панкреатит
- c. Шигельоз
- d. Виразковий коліт**
- e. Псевдомембранозний коліт

126. Укажіть найчастіше ускладнення, яке виникає під час дренування кісти селезінки під

контролем УЗД.

- a. Підтікання вмісту кісти в плевральну порожнину з розвитком плевриту
- b. Підтікання вмісту кісти у вільну черевну порожнину з розвитком перитоніту
- c. Нагноєння залишкової порожнини кісти
- d. Больовий синдром

e. Кровотеча в порожнину кісти

127. Пацієнт віком 45 років звернувся до приймального відділення через 4,5 год від моменту початку захворювання із клінічною картиною защемлення правобічної пахової грижі. Під час огляду черговим лікарем-хірургом грижа самовільно вправилася. Укажіть доцільну тактику лікування пацієнта в цьому разі.

a. Шпиталізація пацієнта, динамічне спостереження, планове операційне втручання

- b. Відпустити пацієнта додому з рекомендацією про планове операційне лікування
- c. Шпиталізація пацієнта, діагностична відеолапароскопія
- d. Шпиталізація пацієнта, ургентне операційне втручання - серединна лапаротомія, ревізія кишок, герніопластика
- e. Шпиталізація пацієнта, ургентне операційне втручання - герніотомія, герніопластика

128. Пацієнт віком 27 років скаржиться на біль та сильне здуття по всьому животу, рідкі випорожнення з домішками крові, слизу та гною до 6-8 разів на добу. З анамнезу відомо, що впродовж останнього місяця схуд на 5 кг, з'явилася сильна загальна слабкість, зниження працездатності. Проведено очисну клізму. Під час обстеження прямої кишки пальцем виявлено кров. За результатами ректороманоскопії виявлено: на висоті 14 см слизова оболонка кишки пухка, суцільно вкрита ерозіями та дрібними виразками до 0,5 см у діаметрі, контактено кровоточить. Який найімовірніший діагноз?

a. Псевдомембранозний коліт

b. Виразковий коліт

- c. Гострий ішіоректальний парапроктит
- d. Рак прямої кишки
- e. Хвороба Крона

129. У пацієнтки віком 35 років під час менструації раптово з'явився сильний біль у нижніх відділах живота, запаморочення, слабкість. Об'єктивно спостерігається: блідість шкірних покривів, пульс частішає, артеріальний тиск знижений. Який найімовірніший діагноз?

- a. Рак ендометрія
- b. Фіброміома матки
- c. Міома матки
- d. Ендометрит

e. Розрив кісти яєчника

130. Пацієнт віком 65 років скаржиться на біль у черевній порожнині, вздуття живота, блювання, невідходження газів, підвищення температури тіла до $37,2^{\circ}\text{C}$, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 8-ми год, коли з'явився біль у мезогастральній ділянці черевної порожнини. В анамнезі крові: гемоглобін - 130 г/л, лейкоцити - $11,5 \cdot 10^9/\text{л}$, глюкоза - 5,1 ммоль/л. Загальний аналіз сечі - без патологічних змін. На рентгенограмі ОЧП: чаші Клойбера. На УЗД виявлено: розширення просвіту тонкої кишки - більше 30 мм, феномен "секвестрації рідини", наявність маятникоподібних рухів хімусу, потовщення стінки товстої кишки - більше 4 мм, збільшення висоти складок Керкрінга - більше 10 мм і збільшення відстані між ними - більше 8 мм, гіперпневматизація кишечника в привідному відділі. Який найімовірніший діагноз?

- a. Спастична гостра кишкова непрохідність
- b. Паралітична гостра кишкова непрохідність

c. Механічна гостра кишкова непрохідність

- d. Динамічна гостра кишкова непрохідність
- e. Гострий панкреатит. Гостра кишкова непрохідність

131. Пацієнтка віком 67 років скаржиться на біль в епігастральній ділянці, у правому підребер'ї з іррадіацією в праву лопатку, задишку, посилення болю на вдиху. Було блювання жовчю.

Об'єктивно спостерігається: температура тіла - $38,1^{\circ}\text{C}$, живіт помірно здутий, напружений і болісний у правому підребер'ї. За результатами УЗД: конкрементів у жовчному міхурі не виявлено, стінка міхура 6-8 мм, контур подвійний, гепатикохоledох - 0,6 см у діаметрі, просвіт його гомогенний. На оглядовій рентгенограмі ОГК: ознаки гіповентиляції легень, більше праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- a. Гострий холецистит
- b. Гострий панкреатит
- c. Жовчно-міхурова коліка
- d. Хоledохолітіаз, холангіт
- e. Сечокам'яна хвороба

132. Пацієнта віком 24 роки шпиталізовано зі скаргами на різкий інтенсивний біль в епігастрії, який виник близько доби тому, одноразове блювання, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що він працює на будівництві, харчується нерегулярно, курить, хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Після обстеження встановлено діагноз: перфоративна виразка дванадцятипалої кишки, розлитий перитоніт, токсична стадія. Які основні етапи лікування пацієнта в цьому разі?

- a. Лапаротомія, резекція шлунка за Більрот-2, санація, дренування черевної порожнини
- b. Невідкладне оперативне втручання після передопераційної підготовки: лапаротомія, ушивання перфоративної виразки, санація, дренування черевної порожнини, антибактеріальна, противиразкова терапія
- c. Консервативна інтенсивна інфузійна антибактеріальна противиразкова терапія
- d. Лапароскопічне висічення виразки, дуоденопластика
- e. Ендоскопічне ушивання перфоративної виразки, противиразкова терапія

133. Пацієнт віком 64 роки скаржиться на біль та здуття живота, нудоту. В анамнезі: ішемічна хвороба серця, постінфарктний та дифузний кардіосклероз. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, живіт здутий, черевна стінка слабо бере участь в акті дихання. За результатами лапароскопії виявлено: у черевній порожнині невелика кількість мутного випоту, одна з петель тонкої кишки темно-ціанотичного кольору. Який найімовірніший діагноз?

- a. Абдомінальний ішемічний синдром
- b. Гострий панкреатит
- c. Хвороба Гіршпрунга
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Тромбоз мезентеріальних судин

134. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праву лопатку. Із анамнезу відомо, що захворіла дві доби тому після вживання жирної їжі, тричі було блювання, яке не принесло полегшення. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - $37,6^{\circ}\text{C}$, живіт помірно напружений і болісний у правому підребер'ї. Відзначається помірна напруга м'язів черевної стінки у правому підребер'ї, тут же пальпується щільне болісне утворення. Симптоми Ортнера та Мерфі позитивні. Які сонографічні симптоми будуть найважливішими для визначення лікувальної тактики в цієї пацієнтки?

- a. Скупчення рідини навколо жовчного міхура та розшарування його стінки
- b. Наявність конкрементів з акустичною тінню в жовчному міхурі
- c. Збільшення розмірів жовчного міхура
- d. Подвійний контур та потовщення стінок жовчного міхура
- e. Наявність густої жовчі в жовчному міхурі

135. Пацієнту віком 43 роки із стенозом стравоходу вирішено провести черезшкірну ендоскопічну гастростомію для встановлення гастростоми. Він має алергію на цефалоспорины. Який лікарський засіб доцільно використати для периопераційної антибіотикопрофілактики цього пацієнта?

- a. Цефазолін
- b. Кліндаміцин
- c. Ципрофлоксацин
- d. Меропенем

е. Метронідазол

136. Пацієнт віком 47 років скаржиться на порушення сечовипускання при наявності покликів. Із анамнезу відомо, що 5 год тому отримав травму промежини після падіння з другого поверху. Об'єктивно спостерігається: виділення крові з зовнішнього отвору сечівника, виражена гематома промежини, перелом великогомілкової кістки зі зміщенням. Яка подальша лікувальна тактика для цього пацієнта?

- а. Відкрите накладення цистостоми
- б. Встановлення катетера Фолея
- с. Стимуляція діурезу
- д. Лапаротомія

е. Пункційна цистостомія

137. Пацієнт віком 45 років скаржиться на болісну припухлість обох сідниць, труднощі під час сечовипускання, відсутність випорожнень протягом 4-х днів, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що хворіє впродовж 7-ми днів. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний, температура тіла - $38,5^{\circ}\text{C}$, навколо анального отвору є гіперемія, набряк м'яких тканин, флюктуція. Під час пальцевого дослідження прямої кишки виявлено: на задній стінці анального каналу болісна ямка, нависання слизової оболонки по задній і правій стінках. Який найімовірніший діагноз?

- а. Гострий проктит
- б. Защемлений геморой
- с. Аноректальний тромбоз
- д. Гострий простатит

е. Гострий парапроктит

138. Пацієнт віком 78 років скаржиться на поклики до сечовипускання, відсутність сечі протягом останніх 8 год. Над лобком пальпується болюче утворення, верхній край якого сягає пупка. Під час ректального дослідження виявлено: передміхурова залоза збільшена, безболісна, щільної консистенції. Рівень простатспецифічного антигену в крові - 3,4 нг/мл. Який найімовірніший діагноз?

- а. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, хронічна затримка сечі
- б. Хронічний парапроктит, гостра затримка сечі
- с. Рак передміхурової залози, гостра затримка сечі
- д. Склероз передміхурової залози, хронічна затримка сечі

е. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози, гостра затримка сечі

139. Пацієнтці віком 45 років рік тому виконано лапароскопічну холецистектомію з приводу хронічного калькульозного холециститу. Через пів року періодично почали з'являтися напади печінкової коліки. Яка найімовірніша причина такої симптоматики?

а. Резидуальний холедохолітіаз

- б. Папіліт
- с. Рубцева стриктура холедоха
- д. Спайкова хвороба
- е. Хронічний панкреатит

140. У пацієнта віком 73 роки діагностовано рак передньої стінки прямої кишки на відстані 2 см від анального отвору. Комп'ютерна томографія грудної клітки, черевної порожнини і таза не виявила ознак метастазів. МРТ таза: наявність пухлини, яка прилягає до передміхурової залози, пухлина була радіологічно визначена як рак стадії T3N1M0. Який наступний етап лікування є найбільш доцільним?

- а. Черевно-промежинна екстирпація
- б. Тотальна мезоректумектомія

с. Хіміопроменева терапія

- д. Паліативна хіміотерапія
- е. Короткий курс променевої терапії

141. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано після ДТП зі скаргами на сильний біль у лівій

частині грудної клітки, задишку, слабкість. Об'єктивно спостерігається: ЧСС - 110/хв, ЧД - 26/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст. Під час огляду лівої половини грудної клітки визначається зменшення дихальних шумів, притуплення перкуторного звуку. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: затемнення в нижніх відділах лівої легені. Який найімовірніший діагноз?

- a. Перелом ребер
- b. Контузія легень

c. Гемоторакс

- d. Пневмоторакс
- e. Плевральний випіт

142. Добу тому потерпілий отримав опік від одягу, що спалахнув. Під час обстеження виявлено, що в нижній та середній третині обох гомілок є опікові рани, що циркулярно охоплюють кінцівки. У цих ділянках епідерміс відсутній, тканини темного кольору, позбавлені больової чутливості. Стопи не обпечені, але вони набряклі, ціанотичного кольору. Яке оперативне втручання необхідно виконати негайно?

- a. Рання некректомія
- b. Некректомія, ксенопластика

c. Невідкладна декомпресійна некротомія

- d. Етапна некректомія
- e. Некректомія, аутодермопластика

143. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на біль у правому підребер'ї, що посилюється після вживання їжі. За результатами обстеження встановлено наявність каменю в жовчному міхурі. Який із нижченаведених методів лікування є найбільш доцільним для цього пацієнта?

- a. Консервативне лікування з використанням жовчогінних препаратів
- b. Антибіотикотерапія
- c. Дренування загальної жовчної протоки

d. Лапароскопічна холецистектомія

- e. Операція відкритим доступом

144. У пацієнта віком 45 років після надмірного вживання алкоголю та калорійної їжі з'явилися гострий біль у верхній частині живота, блювання без домішок жовчі, здуття, підвищилася температура тіла до 38,2^оС. Поступово наростає метеоризм, розвинулася затримка газів і випорожнень. Під час аускультції кишкові шуми не вислуховуються. Який найімовірніший діагноз?

a. Гострий панкреатит із явищами парезу кишечника

- b. Гострий холецистит
- c. Панкреонекроз
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Виразкова хвороба шлунка

145. Пацієнтку віком 63 роки прооперовано з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба великих розмірів. З технічними труднощами вимушено виконана субтотальна резекція обох часток щитоподібної залози. На 4-й день після операції з'явилися судоми м'язів обличчя і верхніх кінцівок, біль у животі. Позитивні симптоми Хвостека і Труссо. Який патологічний стан виник у пацієнтки?

- a. Пошкодження зворотного нерва

b. Недостатність паращитоподібних залоз

- c. Гостра кишкова непрохідність
- d. Післяопераційний гіпотиреоз
- e. Тиреотоксичний криз

146. Пацієнт віком 35 років скаржиться на гострий біль у правій клубовій ділянці, який почався 8 год тому. Біль посилюється під час рухів, іррадіює в попереk. Двічі було блювання. Об'єктивно спостерігається: позитивний симптом Щоткіна-Блумберга в правій клубовій ділянці, температура тіла - 37,5^оС) Який найімовірніший діагноз?

- a. Ниркова коліка
- b. Гостра кишкова непрохідність

с. Гострий холецистит

d. Гострий апендицит

е. Гострий панкреатит

147. Пацієнта віком 69 років шпиталізовано з нападами судом, блюванням. В анамнезі: виразка дванадцятипалої кишки, протягом останнього місяця - щоденне блювання, схуд на 20 кг. Об'єктивно спостерігається: виснажений, в епігастральній ділянці визначається "шум плескоту", нижня межа шлунка на рівні гребінцевої лінії. В аналізі крові: загальний білок - 42 г/л, К - 2,1 ммоль/л, Na - 153 ммоль/л, Ca - 1,7 ммоль/л, хлориди - 84 ммоль/л, гематокрит - 66%. Який найімовірніший діагноз?

а. Рак великого дуоденального сосочка

b. Декомпенсований стеноз ворота

с. Рак жовчного міхура

d. Синдром Золлінгера-Еллісона

е. Рак тіла шлунка

148. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано зі шлунково-кишковою кровотечею зі скаргами на загальну слабкість, короточасну втрату свідомості. Об'єктивно спостерігається: виражена блідість шкіри, гіпотонія, тахікардія, гемоглобін - 80 г/л, біохімічні показники в межах норми, печінка не збільшена. Під час ректального дослідження виявлено дьогтеподібний кал. В анамнезі: часті болі в епігастрії, печія. Яка найімовірніша причина кровотечі в пацієнтки?

а. Пухлина ободової кишки

b. Виразка дванадцятипалої кишки

с. Пухлина шлунка

d. Внутрішній геморой

е. Варикозні вени стравоходу

149. У породіллі на 4-ту добу після пологів виник сильний розпираючий біль у правій нозі. Поступово з'явився набряк кінцівки та підвищення температури тіла до 38,2^oC. Біль поширився на попереково-крижову ділянку та нижні відділи живота. Об'єктивно спостерігається: шкіра правої ноги з плямистим ціанозом синюшного забарвлення, набряк правої кінцівки та пахової ділянки. В аналізі крові: лейкоцитоз - $11 \cdot 10^9$ /л. Який найімовірніший діагноз?

а. Гострий тромбофлебіт правої нижньої кінцівки

b. Гострий лімфостаз правої нижньої кінцівки

с. Післяпологовий тазовий флеботромбоз

d. Ілеофеморальний флеботромбоз

е. Гостра емболія стегнової артерії праворуч

150. Пацієнта віком 34 роки шпиталізовано після ДТП зі скаргами на різкий біль у ділянці промежини, виділення крові з ануса та неможливість дефекації. Об'єктивно спостерігається: гематома в ділянці промежини, зовнішній сфінктер прямої кишки спазмований, пальцеве ректальне дослідження болісне, визначається розрив стінки прямої кишки. Яка першочергова лікувальна тактика в цьому разі?

а. Призначення антибактеріальної та спазмолітичної терапії

b. Формування колостоми з наступним ушиванням розриву прямої кишки

с. Проктектомія з формуванням anus praeter naturalis

d. Проведення лапаротомії з ушиванням розриву прямої кишки без накладання колостоми

е. Первинне ушивання розриву через промежину