

1. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 16 років із дванадцятирічного віку змінився в поведінці, ста
 - a. Біполярного афективного розладу
 - b. Параноїдної шизофренії
 - c. Кататонічної шизофренії
 - d. Шизоафективного розладу
 - e. Гебефренної шизофренії
2. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 16 років із дванадцятирічного віку змінився в поведінці, ста
 - a. Кататонічної шизофренії
 - b. Гебефренної шизофренії
 - c. Шизоафективного розладу
 - d. Біполярного афективного розладу
 - e. Параноїдної шизофренії
3. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 33 роки працював в іншій країні кухарем, проживав у досить с
 - a. Органічний маячний розлад
 - b. Шизоафективний розлад
 - c. Параноїдна шизофренія
 - d. Кататонічна шизофренія
 - e. Шизотиповий розлад
4. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 33 роки працював в іншій країні кухарем, проживав у досить с
 - a. Шизоафективний розлад
 - b. Параноїдна шизофренія
 - c. Органічний маячний розлад
 - d. Кататонічна шизофренія
 - e. Шизотиповий розлад
5. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 35 років протягом життя був тривожним з приводу власного здо
 - a. Панічний розлад
 - b. Астенічний невроз
 - c. Соціальна фобія
 - d. Іпохондричний розлад
 - e. Депресія
6. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 35 років протягом життя був тривожним з приводу власного здо
 - a. Соціальна фобія
 - b. Депресія
 - c. Іпохондричний розлад
 - d. Астенічний невроз
 - e. Панічний розлад
7. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 35 років протягом кількох годин поводить себе неадекватно, бі
 - a. Призначення консультації психіатра
 - b. Призначення амбулаторного лікування
 - c. Шпиталізація до хірургічного відділення
 - d. Амбулаторна психотерапія
 - e. Шпиталізація до психіатричного відділення
8. Із анамнезу відомо, що пацієнт віком 35 років протягом кількох годин поводить себе неадекватно, бі
 - a. Шпиталізація до хірургічного відділення
 - b. Призначення амбулаторного лікування
 - c. Амбулаторна психотерапія
 - d. Призначення консультації психіатра
 - e. Шпиталізація до психіатричного відділення
9. Визначте черговість (послідовність) хворобливих змін у різних психічних процесах у динаміці форму
 - a. Емоційні, ментальні, ефекторні (рухові)
 - b. Ментальні, ефекторні (рухові), емоційні
 - c. Ментальні, емоційні, ефекторні (рухові)
 - d. Емоційні, ефекторні (рухові), ментальні
 - e. Ефекторні (рухові), ментальні, емоційні
10. Визначте черговість (послідовність) хворобливих змін у різних психічних процесах у динаміці форм

- a. Емоційні, ефекторні (рухові), ментальні
- b. Ментальні, емоційні, ефекторні (рухові)
- c. Ефекторні (рухові), ментальні, емоційні
- d. Емоційні, ментальні, ефекторні (рухові)**
- e. Ментальні, ефекторні (рухові), емоційні

11. Військовослужбовець, у якого діагностовано посттравматичний стресовий розлад, звернувся зі скарг

- a. Дебрифінг
- b. Гіпнотерапію**

- c. Арт-терапію
- d. Логотерапію
- e. Екзистенційну терапію

12. Військовослужбовець, у якого діагностовано посттравматичний стресовий розлад, звернувся зі скарг

- a. Логотерапію
- b. Екзистенційну терапію

- c. Гіпнотерапію**
- d. Арт-терапію
- e. Дебрифінг

13. Група з шести підлітків курять цигарки. Через 10 хв стають веселими, голосно сміються, незважаючи

- a. Марихуану**
- b. Амфетамін

- c. Крек
- d. ЛСД
- e. Екстазі

14. Група з шести підлітків курять цигарки. Через 10 хв стають веселими, голосно сміються, незважаючи

- a. Марихуану**
- b. Крек

- c. Екстазі
- d. ЛСД
- e. Амфетамін

15. Дев'ятирічний хлопчик направлений до психіатра через низьку успішність та неслухняність у школі.

- a. Генералізований тривожний розлад
- b. Розлад відсутній, вікова норма

- c. Гіперкінетичний розлад**
- d. Специфічні порушення розвитку шкільних навичок
- e. Дитячий аутизм

16. Дев'ятирічний хлопчик направлений до психіатра через низьку успішність та неслухняність у школі.

- a. Дитячий аутизм
- b. Гіперкінетичний розлад**
- c. Специфічні порушення розвитку шкільних навичок
- d. Розлад відсутній, вікова норма
- e. Генералізований тривожний розлад

17. Для якого психічного розладу характерна розірваність мислення?

- a. Біполярного афективного розладу
- b. Шизофренії**

- c. Епілепсії
- d. Неврозів
- e. Посттравматичного стресового розладу

18. Для якого психічного розладу характерна розірваність мислення?

- a. Неврозів
- b. Шизофренії**

- c. Біполярного афективного розладу
- d. Епілепсії
- e. Посттравматичного стресового розладу

19. Дівчинка з легкою формою ДЦП у присутності матері, яка весь час робить їй зауваження, розгублює

- a. Безпорадність**

- b. Переоцінка своїх можливостей
- c. Впевненість
- d. Рішучість
- e. Почуття власної гідності

20. Дівчинка з легкою формою ДЦП у присутності матері, яка весь час робить їй зауваження, розгублює

- a. Безпорадність
- b. Почуття власної гідності
- c. Рішучість
- d. Впевненість
- e. Переоцінка своїх можливостей

21. Жінку віком 54 роки у супроводі родичів шпиталізовано до психіатричного стаціонару. Скарги самоос

- a. Гіпоманіакальний
- b. Апат-абулічний
- c. Психопатоподібний
- d. Паранояльний
- e. Астенічний

22. Жінку віком 54 роки у супроводі родичів шпиталізовано до психіатричного стаціонару. Скарги самоос

- a. Психопатоподібний
- b. Гіпоманіакальний
- c. Паранояльний
- d. Апат-абулічний
- e. Астенічний

23. Жінку віком 72 роки виявлено у своєму помешканні у стані виснаження. Близьких родичів немає, з і

- a. Поміщення у будинок-інтернат для хронічних пацієнтів
- b. Виклик поліції та передача пацієнтки під опіку соціальних служб
- c. Шпиталізація до відділення інтенсивної терапії
- d. Примусова шпиталізація до психіатричного стаціонару
- e. -

24. Жінку віком 72 роки виявлено у своєму помешканні у стані виснаження. Близьких родичів немає, з і

- a. Шпиталізація до відділення інтенсивної терапії
- b. Поміщення у будинок-інтернат для хронічних пацієнтів
- c. Виклик поліції та передача пацієнтки під опіку соціальних служб
- d. Примусова шпиталізація до психіатричного стаціонару
- e. -

25. Мати звернулася до дитячого психіатра через стереотипну поведінку та регрес мовлення свого ше

- a. Рисперидон
- b. Зипразидон
- c. Оланзапін
- d. Каріпразин
- e. Брекспипразол

26. Мати звернулася до дитячого психіатра через стереотипну поведінку та регрес мовлення свого ше

- a. Рисперидон
- b. Оланзапін
- c. Зипразидон
- d. Каріпразин
- e. Брекспипразол

27. П'ятирічного хлопчика привели до лікаря-психіатра через те, що він неухвильний у школі, метушиться

- a. Розлад дефіциту уваги з гіперактивністю
- b. Первазивне порушення розвитку
- c. Легка розумова відсталість
- d. Опозиційний зухвалий розлад
- e. Тривожний розлад розлуки

28. П'ятирічного хлопчика привели до лікаря-психіатра через те, що він неухвильний у школі, метушиться

- a. Первазивне порушення розвитку
- b. Тривожний розлад розлуки

с. Легка розумова відсталість

d. Розлад дефіциту уваги з гіперактивністю

е. Опозиційний зухвалий розлад

29. Під час обстрілу в зоні бойових дій у військовослужбовця з'явилися такі симптоми: став тривожним

a. Контузія

b. Гострий поліморфний психотичний розлад

с. Розлад адаптації

d. Посттравматичний стресовий розлад

е. Гостра реакція на стрес

30. Під час обстрілу в зоні бойових дій у військовослужбовця з'явилися такі симптоми: став тривожним

a. Посттравматичний стресовий розлад

b. Розлад адаптації

с. Гостра реакція на стрес

d. Гострий поліморфний психотичний розлад

е. Контузія

31. Пацієнт віком 42 роки перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, а

a. Параноїдна реакція

b. Конверсійна реакція

с. Тривожна реакція

d. Іпохондричний невроз

е. Гостра реакція на стрес

32. Пацієнт віком 42 роки перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, а

a. Тривожна реакція

b. Конверсійна реакція

с. Іпохондричний невроз

d. Параноїдна реакція

е. Гостра реакція на стрес

33. Пацієнт віком 14 років не засвоює шкільну програму, особливо з математики. Мовлення фразове - у

a. Розумова відсталість

b. Розлад спектра аутизму

с. Затримка розвитку

d. Шизофренія

е. Депресивний розлад

34. Пацієнт віком 14 років не засвоює шкільну програму, особливо з математики. Мовлення фразове - у

a. Депресивний розлад

b. Затримка розвитку

с. Шизофренія

d. Розлад спектра аутизму

е. Розумова відсталість

35. Пацієнт віком 14 років скаржиться на нічні страхи та ходіння уві сні протягом 2-х років. В анамн

a. Дромоманія

b. Нічний енурез

с. Фобії

d. Епілептичні нічні пароксизми

е. Бруксизм

36. Пацієнт віком 14 років скаржиться на нічні страхи та ходіння уві сні протягом 2-х років. В анамн

a. Дромоманія

b. Фобії

с. Епілептичні нічні пароксизми

d. Бруксизм

е. Нічний енурез

37. Пацієнт віком 14 років, звернувся по допомогу у супроводі батька у зв'язку із нав'язливим страхом

a. Біполярний афективний розлад

b. Генералізований тривожний розлад

с. Посттравматичний стресовий розлад

d. Гіперкінетичний розлад

e. Обсесивно-компульсивний розлад

38. Пацієнт віком 14 років, звернувся по допомогу у супроводі батька у зв'язку із нав'язливим страхом

a. Біполярний афективний розлад

b. Гіперкінетичний розлад

c. Обсесивно-компульсивний розлад

d. Генералізований тривожний розлад

e. Посттравматичний стресовий розлад

39. Пацієнт віком 16 років направлений на експертизу з військкомату. З дитинства відставав у розумовому розвитку

a. Дитячий аутизм

b. Розумова відсталість легкого ступеня

c. Розумова відсталість помірна

d. Органічний розлад особистості

e. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності

40. Пацієнт віком 16 років направлений на експертизу з військкомату. З дитинства відставав у розумовому розвитку

a. Розумова відсталість помірна

b. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності

c. Органічний розлад особистості

d. Дитячий аутизм

e. Розумова відсталість легкого ступеня

41. Пацієнт віком 22 роки протягом останніх 6-ти місяців став замкнутим, почав розмовляти сам із собою

a. Дерееалізація

b. Ілюзії

c. Псевдогалюцинації

d. Справжні галюцинації

e. Метаморфопсії

42. Пацієнт віком 22 роки протягом останніх 6-ти місяців став замкнутим, почав розмовляти сам із собою

a. Метаморфопсії

b. Дерееалізація

c. Псевдогалюцинації

d. Справжні галюцинації

e. Ілюзії

43. Пацієнт віком 24 роки малодоступний до мовного контакту, увага привертається складно. Не знає, що відбувається

a. Свідомості

b. Сприйняття

c. Мислення

d. Настрою

e. Немає ознак психічного розладу

44. Пацієнт віком 24 роки малодоступний до мовного контакту, увага привертається складно. Не знає, що відбувається

a. Сприйняття

b. Настрою

c. Мислення

d. Свідомості

e. Немає ознак психічного розладу

45. Пацієнт віком 25 років звернувся до лікаря-психіатра у супроводі сестри. Пацієнт заходив неохоче до лікаря

a. Шизотиповий

b. -

c. Антисоціальний

d. Параноїдний

e. Межовий

46. Пацієнт віком 25 років звернувся до лікаря-психіатра у супроводі сестри. Пацієнт заходив неохоче до лікаря

a. Параноїдний

b. Шизотиповий

c. -

d. Антисоціальний

е. Межовий

47. Пацієнт віком 26 років скаржиться на порушення функції пам'яті - не може згадати, що робив ввечері

а. Конверсійний розлад

б. Дисоціативний розлад ідентичності

с. Межовий розлад особистості

д. Розлад деперсоналізації/дереалізації

е. Судинна деменція

48. Пацієнт віком 26 років скаржиться на порушення функції пам'яті - не може згадати, що робив ввечері

а. Межовий розлад особистості

б. Дисоціативний розлад ідентичності

с. Конверсійний розлад

д. Судинна деменція

е. Розлад деперсоналізації/дереалізації

49. Пацієнт віком 26 років, який знаходиться на наркологічному обліку, з діагнозом: ППРВВ (синдром з

а. Довготривале медикаментозне лікування агоністами опіоїдів (ПТАО)

б. Рекомендація для пацієнта відмовитись від прийому опіоїдів

с. Введення анксиолітиків

д. Детоксикація

е. Введення аміназину

50. Пацієнт віком 26 років, який знаходиться на наркологічному обліку, з діагнозом: ППРВВ (синдром з

а. Введення анксиолітиків

б. Рекомендація для пацієнта відмовитись від прийому опіоїдів

с. Довготривале медикаментозне лікування агоністами опіоїдів (ПТАО)

д. Детоксикація

е. Введення аміназину

51. Пацієнт віком 27 років скаржиться на головний біль, біль у суглобах, слабкість, катаральні явища

а. Шпиталізація до інфекційного стаціонару

б. Шпиталізація до реанімаційного відділення

с. Шпиталізація до неврологічного відділення

д. Шпиталізація до психіатричного стаціонару

е. Шпиталізація до терапевтичного відділення

52. Пацієнт віком 27 років скаржиться на головний біль, біль у суглобах, слабкість, катаральні явища

а. Шпиталізація до інфекційного стаціонару

б. Шпиталізація до психіатричного стаціонару

с. Шпиталізація до терапевтичного відділення

д. Шпиталізація до реанімаційного відділення

е. Шпиталізація до неврологічного відділення

53. Пацієнт віком 27 років із шизофренією скаржиться, що періодично відчуває "голоси" представників

а. Ажитована депресія

б. Маніакальне збудження

с. Амбулаторний автоматизм

д. Деліріозний стан

е. Синдром психічного автоматизму

54. Пацієнт віком 27 років із шизофренією скаржиться, що періодично відчуває "голоси" представників

а. Ажитована депресія

б. Маніакальне збудження

с. Деліріозний стан

д. Амбулаторний автоматизм

е. Синдром психічного автоматизму

55. Пацієнт віком 28 років скаржиться на безсоння, нудоту, блювання та страх. Об'єктивно спостерігає

а. Галоперидол + форсований діурез

б. Діазепам + детоксикація

с. Антидепресанти + препарати літію

д. Анксиолітики + психотерапія

е. Електроконвульсивна терапія

56. Пацієнт віком 28 років скаржиться на безсоння, нудоту, блювання та страх. Об'єктивно спостерігає

- a. Електроконвульсивна терапія
- b. Галоперидол + форсований діурез
- c. Анксіолітики + психотерапія
- d. Діазепам + детоксикація
- e. Антидепресанти + препарати літію

57. Пацієнт віком 28 років скаржиться на порушення сну, зниження настрою, небажання спілкуватися з

- a. Біполярний афективний розлад
- b. Нервова анорексія
- c. Нервова булімія
- d. Розлад компульсивного переїдання
- e. Депресивний розлад

58. Пацієнт віком 28 років скаржиться на порушення сну, зниження настрою, небажання спілкуватися з

- a. Депресивний розлад
- b. Розлад компульсивного переїдання
- c. Нервова булімія
- d. Біполярний афективний розлад
- e. Нервова анорексія

59. Пацієнт віком 28 років, спілкуючись із лікарем, безперервно щось говорить у дуже швидкому темпі.

- a. Епілепсії
- b. Психогенного психозу
- c. Панічного розладу
- d. Шизофренії
- e. Біполярного афективного розладу

60. Пацієнт віком 28 років, спілкуючись із лікарем, безперервно щось говорить у дуже швидкому темпі.

- a. Панічного розладу
- b. Психогенного психозу
- c. Шизофренії
- d. Епілепсії
- e. Біполярного афективного розладу

61. Пацієнт віком 30 років звернувся до лікаря-психіатра через те, що його звільнили за постійні зап

- a. Дофамін
- b. Норадреналін
- c. Ацетилхолін
- d. Гістамін
- e. Серотонін

62. Пацієнт віком 30 років звернувся до лікаря-психіатра через те, що його звільнили за постійні зап

- a. Норадреналін
- b. Ацетилхолін
- c. Гістамін
- d. Дофамін
- e. Серотонін

63. Пацієнт віком 30 років із шизофренією скоїв тяжке кримінальне правопорушення під впливом хворо

- a. Дієздатності чи недієздатності
- b. Встановлення опікунства
- c. Осудності чи неосудності
- d. Призначення нейролептиків та їх дозування
- e. Визначення групи інвалідності

64. Пацієнт віком 30 років із шизофренією скоїв тяжке кримінальне правопорушення під впливом хворо

- a. Дієздатності чи недієздатності
- b. Призначення нейролептиків та їх дозування
- c. Встановлення опікунства
- d. Визначення групи інвалідності
- e. Осудності чи неосудності

65. Пацієнт віком 32 роки стверджує, що всі перехожі на вулиці спостерігають за ним, перешіптуються

a. Параноїдної шизофренії

b. -

c. Маячного розладу

d. Шизотипового розладу

e. Шизоїдного розладу особистості

66. Пацієнт віком 32 роки стверджує, що всі перехожі на вулиці спостерігають за ним, перешіптуються

a. Маячного розладу

b. Параноїдної шизофренії

c. Шизоїдного розладу особистості

d. -

e. Шизотипового розладу

67. Пацієнт віком 33 роки, стоячи у кутку палати, без будь-якої причини починає стереотипно присідати

a. Кататонічне збудження

b. Гебефренічне збудження

c. Істеричне збудження

d. Маніакальне збудження

e. Ажитована депресія

68. Пацієнт віком 33 роки, стоячи у кутку палати, без будь-якої причини починає стереотипно присідати

a. Кататонічне збудження

b. Маніакальне збудження

c. Істеричне збудження

d. Ажитована депресія

e. Гебефренічне збудження

69. Пацієнт віком 35 років занепокоєний щодо втрати контролю над частотою та кількістю вживання нікотину

a. Дипсоманія

b. Абстиненція

c. Дисфорія

d. Делірій

e. Неврастенія

70. Пацієнт віком 35 років занепокоєний щодо втрати контролю над частотою та кількістю вживання нікотину

a. Дипсоманія

b. Неврастенія

c. Делірій

d. Абстиненція

e. Дисфорія

71. Пацієнт віком 35 років на скаржиться на те, що не може контролювати кількість вжитої їжі. На фоні

a. Компульсивне переїдання

b. Булемія

c. Розлад адаптації, пов'язаний зі стресом

d. Орторексія

e. Анорексія

72. Пацієнт віком 35 років на скаржиться на те, що не може контролювати кількість вжитої їжі. На фоні

a. Булемія

b. Розлад адаптації, пов'язаний зі стресом

c. Орторексія

d. Компульсивне переїдання

e. Анорексія

73. Пацієнт віком 36 років вперше звернувся до лікаря-психіатра через наполягання родичів. Адже впродовж

a. Легка розумова відсталість

b. Біполярний афективний розлад

c. Лудоманія

d. Тривожний розлад

e. Межовий розлад особистості

74. Пацієнт віком 36 років вперше звернувся до лікаря-психіатра через наполягання родичів. Адже впродовж

a. Межовий розлад особистості

b. Легка розумова відсталість

c. Лудоманія

d. Біполярний афективний розлад

e. Тривожний розлад

75. Пацієнт віком 36 років щоденно багато разів на день миє руки, навіть якщо вони вочевидь чисті. Р

a. Без будь-якої мети

b. З метою протидії болісним переживанням

c. Пацієнт відчуває себе керованим, стверджує, що дії виконує мимовільно, під зовнішнім впливом

d. З метою запобігання якимось маловірогідним подіям, що зашкодять пацієнту, захисту від будь-якого

e. З метою відвернення уваги від власних переживань

76. Пацієнт віком 36 років щоденно багато разів на день миє руки, навіть якщо вони вочевидь чисті. Р

a. З метою протидії болісним переживанням

b. З метою відвернення уваги від власних переживань

c. Без будь-якої мети

d. З метою запобігання якимось маловірогідним подіям, що зашкодять пацієнту, захисту від будь-якого

e. Пацієнт відчуває себе керованим, стверджує, що дії виконує мимовільно, під зовнішнім впливом

77. Пацієнт віком 38 років упродовж року брав участь у бойових діях. Після повернення додому вночі с

a. Кветіапін

b. Прегабалін

c. Вальпроат натрію

d. Сертралін

e. Сульпірид

78. Пацієнт віком 38 років упродовж року брав участь у бойових діях. Після повернення додому вночі с

a. Сульпірид

b. Кветіапін

c. Сертралін

d. Прегабалін

e. Вальпроат натрію

79. Пацієнт віком 39 років скаржиться на нав'язливі думки щодо розміру взуття (не може визначити, як

a. Дисоціативний розлад

b. Генералізований тривожний розлад

c. Синдром Аспергера

d. Обсесивно-компульсивний розлад

e. Шизоїдний розлад особистості

80. Пацієнт віком 39 років скаржиться на нав'язливі думки щодо розміру взуття (не може визначити, як

a. Шизоїдний розлад особистості

b. Дисоціативний розлад

c. Генералізований тривожний розлад

d. Обсесивно-компульсивний розлад

e. Синдром Аспергера

81. Пацієнт віком 40 років скаржиться на порушення сну з кошмарними сновидіннями, поганий настрій,

a. Порушення адаптації

b. -

c. Посттравматичний стресовий розлад

d. Гостра реакція на стрес

e. Реакція на тяжкий стрес

82. Пацієнт віком 40 років скаржиться на порушення сну з кошмарними сновидіннями, поганий настрій,

a. Реакція на тяжкий стрес

b. -

c. Посттравматичний стресовий розлад

d. Порушення адаптації

e. Гостра реакція на стрес

83. Пацієнт віком 45 років, директор, приймав пароксетин 40 мг/добу протягом 6-ти місяців від депрес

a. Синдром відміни СИЗС

b. Серотоніновий синдром

- с. Реакція на зміну часових поясів
- д. Рецидив його великої депресії
- е. Маніакальний епізод

84. Пацієнт віком 45 років, директор, приймав пароксетин 40 мг/добу протягом 6-ти місяців від депресії

- а. Серотоніновий синдром
- б. Маніакальний епізод

с. Синдром відміни СИЗЗС

- д. Рецидив його великої депресії
- е. Реакція на зміну часових поясів

85. Пацієнт віком 56 років, інвалід II групи безстроково, через неефективність попередньої фармакотерапії

а. Щотижня

- б. Щодвотижні
- с. Щокварталу
- д. Щопівроку
- е. Щомісяця

86. Пацієнт віком 56 років, інвалід II групи безстроково, через неефективність попередньої фармакотерапії

- а. Щомісяця
- б. Щопівроку
- с. Щодвотижні

д. Щотижня

е. Щокварталу

87. Пацієнт віком 58 років скаржиться на головний біль, дратівливість, безсоння, зниження пам'яті та

а. Делірій. Сифіліс мозку

- б. Реактивний параноїд
- с. Тривожно-депресивний розлад
- д. Алкогольний делірій
- е. Дисоціативно-конверсійний розлад

88. Пацієнт віком 58 років скаржиться на головний біль, дратівливість, безсоння, зниження пам'яті та

- а. Тривожно-депресивний розлад
- б. Алкогольний делірій

с. Делірій. Сифіліс мозку

- д. Реактивний параноїд
- е. Дисоціативно-конверсійний розлад

89. Пацієнт віком 62 роки до кабінету зайшов невпевненою човгаючою ходою. Висловлює скарги на біль

а. Фронтально-темпоральне ушкодження

б. Хвороба Паркінсона

- с. Черепно-мозкова травма
- д. Хвороба Гентінгтона
- е. Тільця Леві

90. Пацієнт віком 62 роки до кабінету зайшов невпевненою човгаючою ходою. Висловлює скарги на біль

- а. Хвороба Гентінгтона
- б. Тільця Леві
- с. Черепно-мозкова травма

д. Хвороба Паркінсона

е. Фронтально-темпоральне ушкодження

91. Пацієнт віком 68 років скаржиться на зниження пам'яті, складність запам'ятовування нової інформації

а. Хвороба Гентінгтона

б. Хвороба Альцгеймера

- с. Епілепсія
- д. Деменція з тільцями Леві
- е. Хвороба Паркінсона

92. Пацієнт віком 68 років скаржиться на зниження пам'яті, складність запам'ятовування нової інформації

а. Хвороба Паркінсона

б. Хвороба Альцгеймера

с. Епілепсія

- d. Хвороба Гентінгтона
- e. Деменція з тільцями Леві

93. Пацієнт, віком 52 роки, наркологічного стаціонару звинувачує дружину у постійних зрадах. З її сл

- a. Галюциноз
- b. Психоорганічний**

- c. Корсаковський
- d. Делірій
- e. Маячний

94. Пацієнт, віком 52 роки, наркологічного стаціонару звинувачує дружину у постійних зрадах. З її сл

- a. Маячний
- b. Психоорганічний**

- c. Корсаковський
- d. Галюциноз
- e. Делірій

95. Пацієнта віком 19 років привели до лікаря його батьки після того, як він подзвонив їм з універси

- a. Шизофренічний розлад**
- b. Інтоксикація фенциклідіном (PCP)
- c. Шизоафективний розлад
- d. Шизофренія
- e. Маячний розлад

96. Пацієнта віком 19 років привели до лікаря його батьки після того, як він подзвонив їм з універси

- a. Маячний розлад
- b. Шизоафективний розлад
- c. Шизофренічний розлад**

- d. Шизофренія
- e. Інтоксикація фенциклідіном (PCP)

97. Пацієнта віком 19 років шпиталізовано в стані різкого психомоторного збудження. Об'єктивно спост

- a. Антипсихотичні засоби**
- b. Антидепресанти
- c. Снодійні засоби
- d. Ноотропні засоби
- e. Стабілізатори настрою

98. Пацієнта віком 19 років шпиталізовано в стані різкого психомоторного збудження. Об'єктивно спост

- a. Снодійні засоби
- b. Антипсихотичні засоби**
- c. Антидепресанти
- d. Ноотропні засоби
- e. Стабілізатори настрою

99. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано після того, як він був надзвичайно стурбований у своїй кімн

- a. Барбітурати
- b. Бензодіазепіни
- c. Героїн
- d. Амфетаміни**

- e. MDMA (екстазі)

100. Пацієнта віком 22 роки шпиталізовано після того, як він був надзвичайно стурбований у своїй кім

- a. Бензодіазепіни
- b. Барбітурати
- c. Героїн
- d. Амфетаміни**

- e. MDMA (екстазі)

101. Пацієнта віком 23 роки шпиталізовано до психіатричного відділення з приводу параноїдної шизофр

- a. Додатково призначити антидепресант
- b. Додатково призначити стабілізатор настрою
- c. Додатково призначити ще один антипсихотичний засіб
- d. Додатково призначити тригексифенідил**

е. Підвищити дозу галоперидолу

102. Пацієнта віком 23 роки шпиталізовано до психіатричного відділення з приводу параноїдної шизофренії.

а. Додатково призначити стабілізатор настрою

б. Додатково призначити антидепресант

с. Підвищити дозу галоперидолу

д. Додатково призначити ще один антипсихотичний засіб

е. Додатково призначити тригексифенідил

103. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на безсоння, бачить "як по стінах лазять паву

а. Алкогольний абстинентний делірій

б. Психотичний розлад, спричинений алкоголем

с. Психоз Верніке

д. Алкогольна ідіосинкратична інтоксикація

е. Алкогольне сп'яніння

104. Пацієнта віком 35 років шпиталізовано зі скаргами на безсоння, бачить "як по стінах лазять паву

а. Алкогольна ідіосинкратична інтоксикація

б. Психоз Верніке

с. Алкогольне сп'яніння

д. Алкогольний абстинентний делірій

е. Психотичний розлад, спричинений алкоголем

105. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано до психіатричного стаціонару. Під час лікування став дост

а. Онейроїдний

б. Сутінковий

с. Розгубленості

д. Деліріозний

е. Аментивний

106. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано до психіатричного стаціонару. Під час лікування став дост

а. Розгубленості

б. Сутінковий

с. Аментивний

д. Онейроїдний

е. Деліріозний

107. Пацієнта віком 52 роки направили до лікаря-психіатра після отримання дисциплінарного стягнення

а. -

б. Обсесивно-компульсивний розлад особистості

с. Емоційно нестабільний розлад особистості

д. Тривожний розлад, не уточнений іншим чином

е. Біполярний розлад, змішаний стан

108. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, який с

а. Діазепам

б. Тіамін

с. Рисперидон

д. Галоперидол

е. Гідазепам

109. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, який с

а. Гідазепам

б. Рисперидон

с. Діазепам

д. Тіамін

е. Галоперидол

110. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано з приводу інфаркту міокарда. Через два дні після шпиталіза

а. Галюцинації

б. Ілюзії

с. Проекція

д. Деменція

е. Омана

111. Пацієнта віком 56 років шпиталізовано з приводу інфаркту міокарда. Через два дні після шпиталіза-

а. Проекція

b. Ілюзія

с. Омана

d. Деменція

е. Галюцинації

112. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, який

а. Алкогольний галюциноз

b. Стан відміни алкоголю без делірію

с. Транзиторна ішемічна атака

d. Стан відміни алкоголю з делірієм

е. Стан відміни опіатів з делірієм

113. Пацієнта віком 58 років шпиталізовано до травматологічного відділення з переломом стегна, який

а. Стан відміни алкоголю без делірію

b. Транзиторна ішемічна атака

с. Стан відміни алкоголю з делірієм

d. Алкогольний галюциноз

е. Стан відміни опіатів з делірієм

114. Пацієнта віком 65 років, який у минулому часто зловживав алкоголем, шпиталізовано до психіатри-

а. -

b. Дереклізація

с. Часткова амнезія

d. Дезорієнтація

е. Деперсоналізація

115. Пацієнта віком 65 років, який у минулому часто зловживав алкоголем, шпиталізовано до психіатри-

а. Деперсоналізація

b. Часткова амнезія

с. Дереклізація

d. -

е. Дезорієнтація

116. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано до психіатричної лікарні родичами у зв'язку із суїцидальн-

a. Синдром Кандинського-Клерамбо

b. Синдром Фреголі

с. Паранояльний синдром

d. Корсаковський синдром

е. Парафренний синдром

117. Пацієнта віком 66 років шпиталізовано до психіатричної лікарні родичами у зв'язку із суїцидальн-

а. Парафренний синдром

b. Паранояльний синдром

с. Синдром Кандинського-Клерамбо

d. Синдром Фреголі

е. Корсаковський синдром

118. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на страшні картини в голові. Наприклад, яскраво бачить, що

а. Марення

b. Ілюзії

с. Обсесії

d. Галюцинації

е. Псевдогалюцинації

119. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на страшні картини в голові. Наприклад, яскраво бачить, що

а. Марення

b. Галюцинації

с. Обсесії

d. Ілюзії

е. Псевдогалюцинації

120. Пацієнтка віком 17 років під час огляду пасивна, інтересу до бесіди не виявляє, на запитання ві-

a. Проста шизофренія

b. Параноїдна шизофренія

c. Маніакальний епізод

d. Депресивний епізод

e. Шизотиповий розлад

121. Пацієнтка віком 17 років під час огляду пасивна, інтересу до бесіди не виявляє, на запитання ві

a. Параноїдна шизофренія

b. Маніакальний епізод

c. Проста шизофренія

d. Шизотиповий розлад

e. Депресивний епізод

122. Пацієнтка віком 18 років має постійне відчуття порожнечі всередині, часто мінливий настрій. Емо

a. Біполярний афективний розлад

b. Шизотиповий розлад

c. Межовий розлад особистості

d. Нарцистична травма

e. Депресивний розлад

123. Пацієнтка віком 18 років має постійне відчуття порожнечі всередині, часто мінливий настрій. Емо

a. Нарцистична травма

b. Шизотиповий розлад

c. Депресивний розлад

d. Біполярний афективний розлад

e. Межовий розлад особистості

124. Пацієнтка віком 19 років з ІМТ - 19,5 кг/м² скаржиться на епізоди переїдання, які відбуваються

a. Флуоксетин

b. Пароксетин

c. Оланзапін

d. Амітриптилін

e. Міртазапін

125. Пацієнтка віком 19 років з ІМТ - 19,5 кг/м² скаржиться на епізоди переїдання, які відбуваються

a. Пароксетин

b. Амітриптилін

c. Міртазапін

d. Оланзапін

e. Флуоксетин

126. Пацієнтка віком 19 років у супроводі матері звернулася до лікаря-психіатра з приводу потягу до

a. Електросудомна терапія

b. Призначення N-ацетилцистеїну

c. Когнітивно-поведінкова терапія, спрямована на зміну звичок

d. Призначення оланзапіну

e. Призначення селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну

127. Пацієнтка віком 19 років у супроводі матері звернулася до лікаря-психіатра з приводу потягу до

a. Призначення N-ацетилцистеїну

b. Когнітивно-поведінкова терапія, спрямована на зміну звичок

c. Електросудомна терапія

d. Призначення оланзапіну

e. Призначення селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну

128. Пацієнтка віком 19 років, у супроводі матері вперше в житті звернулася до лікаря-психіатра, амб

a. Біполярний афективний розлад

b. Розлад харчової поведінки

c. Межовий розлад особистості

d. Депресивний епізод

e. Дисморфофобічний розлад

129. Пацієнтка віком 19 років, у супроводі матері вперше в житті звернулася до лікаря-психіатра, амб

a. Межовий розлад особистості

b. Розлад харчової поведінки

c. Дисморфофобічний розлад

d. Депресивний епізод

e. Біполярний афективний розлад

130. Пацієнтка віком 22 роки звернулася по амбулаторну психіатричну допомогу. Під час бесіди спостер

a. Кататонічний

b. Гебефренічний

c. Парафренний

d. Параноїдний

e. Маніакальний

131. Пацієнтка віком 22 роки звернулася по амбулаторну психіатричну допомогу. Під час бесіди спостер

a. Кататонічний

b. Параноїдний

c. Гебефренічний

d. Маніакальний

e. Парафренний

132. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на постійну тривогу, пригнічення настрою через неконтрольов

a. Генералізований тривожний розлад

b. Компульсивне переїдання

c. Нервова анорексія

d. Obsесивно-компульсивний розлад

e. Нервова булімія

133. Пацієнтка віком 22 роки скаржиться на постійну тривогу, пригнічення настрою через неконтрольов

a. Obsесивно-компульсивний розлад

b. Компульсивне переїдання

c. Генералізований тривожний розлад

d. Нервова анорексія

e. Нервова булімія

134. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на неефективність призначеного лікування. Пацієнтку турбую

a. Залишити препарат, пояснити механізм дії C133C

b. -

c. Підвищити дозування препарату удвічі

d. Призначити препарат із похідних бензодіазепінів

e. Замінити на препарат групи I33CH

135. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на неефективність призначеного лікування. Пацієнтку турбую

a. -

b. Призначити препарат із похідних бензодіазепінів

c. Залишити препарат, пояснити механізм дії C133C

d. Підвищити дозування препарату удвічі

e. Замінити на препарат групи I33CH

136. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на часті епізоди переїдання, після яких вона викликає блюван

a. Нервова анорексія

b. Психогенне переїдання

c. Нервова булімія

d. Орторексія

e. Компульсивне переїдання

137. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на часті епізоди переїдання, після яких вона викликає блюван

a. Орторексія

b. Нервова булімія

c. Психогенне переїдання

d. Компульсивне переїдання

e. Нервова анорексія

138. Пацієнтка віком 24 роки починає психотерапію, стверджуючи, що вона водночас у відчаї та нудьзі,

a. Гістріонний розлад особистості

b. Дистимія

с. Емоційно нестабільний розлад особистості

d. Розлад контролю над імпульсами, не уточнений іншим чином

e. Антисоціальний розлад особистості

139. Пацієнтка віком 24 роки починає психотерапію, стверджуючи, що вона водночас у відчаї та нудьзі,

a. Розлад контролю над імпульсами, не уточнений іншим чином

b. Антисоціальний розлад особистості

c. Гістрійонний розлад особистості

d. Емоційно нестабільний розлад особистості

e. Дистимія

140. Пацієнтка віком 25 років, раніше вже зверталася до психіатра з приводу епізодів біполярного афе

a. Тяжка депресія без психотичних симптомів

b. Змішаний

с. Тяжка депресія з психотичними симптомами

d. Маніакальний із психотичними симптомами

e. Помірна депресія

141. Пацієнтка віком 25 років, раніше вже зверталася до психіатра з приводу епізодів біполярного афе

a. Тяжка депресія без психотичних симптомів

b. Змішаний

c. Помірна депресія

d. Тяжка депресія з психотичними симптомами

e. Маніакальний із психотичними симптомами

142. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на депресію, тривогу, порушення сну, періодичну булімію, як

a. Межовий розлад особистості

b. Ананкастний розлад особистості

c. Істеричний розлад особистості

d. Антисоціальний розлад особистості

e. Залежний розлад особистості

143. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на депресію, тривогу, порушення сну, періодичну булімію, як

a. Ананкастний розлад особистості

b. Залежний розлад особистості

с. Межовий розлад особистості

d. Істеричний розлад особистості

e. Антисоціальний розлад особистості

144. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на напади пришвидшеного серцебиття, підвищення АТ, зади

a. Емоційно-нестійкий розлад особистості, імпульсивний тип

b. Панічний розлад

c. Посттравматичний стресовий розлад

d. Соматоформний розлад

e. Фобічний розлад

145. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на напади пришвидшеного серцебиття, підвищення АТ, зади

a. Фобічний розлад

b. Панічний розлад

c. Посттравматичний стресовий розлад

d. Соматоформний розлад

e. Емоційно-нестійкий розлад особистості, імпульсивний тип

146. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на появу неприємних відчуттів у внутрішніх органах, описує

a. Сенестопатії

b. Синестезії

c. -

d. Парестезії

e. Вісцеральні галюцинації

147. Пацієнтка віком 26 років скаржиться на появу неприємних відчуттів у внутрішніх органах, описує

a. Вісцеральні галюцинації

b. -

c. Парестезії

d. Сенестопатії

e. Синестезії

148. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на тривогу, очікування катастрофи, переживання про майбутнє

a. Буспірон

b. Сертралін

c. Кветіапін

d. Прегабалін

e. Амітриптілін

149. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на тривогу, очікування катастрофи, переживання про майбутнє

a. Кветіапін

b. Сертралін

c. Прегабалін

d. Буспірон

e. Амітриптілін

150. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на нестабільність настрою, відчуття порожнечі та невпевненості

a. Демонстративний

b. Шизоїдний

c. Параноїдний

d. Межовий

e. Унікаючий

151. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на нестабільність настрою, відчуття порожнечі та невпевненості

a. Унікаючий

b. Шизоїдний

c. Демонстративний

d. Параноїдний

e. Межовий

152. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на постійне відчуття тривоги, яке виникає майже одразу після

a. Генералізований тривожний розлад

b. Панічний розлад

c. Неврастенія

d. Агорафобія

e. Обсесивно-компульсивний розлад

153. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на постійне відчуття тривоги, яке виникає майже одразу після

a. Обсесивно-компульсивний розлад

b. Неврастенія

c. Агорафобія

d. Панічний розлад

e. Генералізований тривожний розлад

154. Пацієнтка віком 28 років, внутрішньо переміщена зі Сходу України, скаржиться на складність проц...

a. Інсомнія

b. Посттравматичний стресовий розлад

c. Панічний розлад

d. Специфічна фобія

e. Розлад адаптації пов'язаний зі стресом, у вигляді тривожно-фобічного синдрому

155. Пацієнтка віком 28 років, внутрішньо переміщена зі Сходу України, скаржиться на складність проц...

a. Панічний розлад

b. Специфічна фобія

c. Розлад адаптації пов'язаний зі стресом, у вигляді тривожно-фобічного синдрому

d. Інсомнія

e. Посттравматичний стресовий розлад

156. Пацієнтка віком 32 роки звернулася вперше до лікаря-психіатра зі скаргою на "провал у пам'яті",

a. Антероретроградна амнезія

b. Фіксаційна амнезія

c. Дисоціативна амнезія

d. Ретардована амнезія

е. Посттравматична амнезія

157. Пацієнтка віком 32 роки звернулася вперше до лікаря-психіатра зі скаргою на "провал у пам'яті",

а. Посттравматична амнезія

б. Ретардована амнезія

с. Антероретроградна амнезія

д. Фіксаційна амнезія

е. Дисоціативна амнезія

158. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря-психіатра у супроводі матері. Під час бесіди повод

а. Біполярний афективний розлад

б. Шизоафективний розлад

с. Маніакальний епізод

д. Емоційно нестабільний розлад особистості

е. Дистимія

159. Пацієнтка віком 32 роки звернулася до лікаря-психіатра у супроводі матері. Під час бесіди повод

а. Маніакальний епізод

б. Біполярний афективний розлад

с. Шизоафективний розлад

д. Дистимія

е. Емоційно нестабільний розлад особистості

160. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на страх їхати самій за кермом в автомобілі, уникає поїздки

а. Панічний розлад

б. Генералізований тривожний розлад

с. Тривожно-депресивний розлад

д. Специфічна фобія

е. Посттравматичний стресовий розлад

161. Пацієнтка віком 32 роки скаржиться на страх їхати самій за кермом в автомобілі, уникає поїздки

а. Тривожно-депресивний розлад

б. Панічний розлад

с. Посттравматичний стресовий розлад

д. Специфічна фобія

е. Генералізований тривожний розлад

162. Пацієнтка віком 33 роки прибула до приймального пункту психіатричної лікарні у супроводі матері

а. 1 раз на півроку

б. 1 раз на місяць

с. 1 раз на добу

д. 1 раз на тиждень

е. -

163. Пацієнтка віком 33 роки прибула до приймального пункту психіатричної лікарні у супроводі матері

а. 1 раз на тиждень

б. 1 раз на півроку

с. 1 раз на добу

д. -

е. 1 раз на місяць

164. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на біль у грудях. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка пиль

а. Кокаїн

б. Фенциклідин (PCP)

с. Героїн

д. Дієтиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

е. Риталін

165. Пацієнтка віком 33 роки скаржиться на біль у грудях. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка пиль

а. Дієтиламід лізергінової кислоти (ЛСД)

б. Риталін

с. Кокаїн

д. Героїн

е. Фенциклідин (PCP)

166. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на непереборне прагнення до викрадення різних предметів, н

a. Клептоманія

b. Трихотиломанія

c. Піроманія

d. Дромоманія

e. Дипсоманія

167. Пацієнтка віком 34 роки скаржиться на непереборне прагнення до викрадення різних предметів, н

a. Трихотиломанія

b. Піроманія

c. Дипсоманія

d. Дромоманія

e. Клептоманія

168. Пацієнтка віком 35 років звернулася до лікаря з проханням виписати рецепт на діазепам. Розповід

a. Істеричний невроз

b. Залежність від стимуляторів

c. Вегетосудинна дистонія

d. Залежність від транквілізаторів

e. Маскована депресія

169. Пацієнтка віком 35 років звернулася до лікаря з проханням виписати рецепт на діазепам. Розповід

a. Маскована депресія

b. Залежність від стимуляторів

c. Істеричний невроз

d. Залежність від транквілізаторів

e. Вегетосудинна дистонія

170. Пацієнтка віком 35 років повідомляє, що раніше двічі перебувала в депресивних станах тривалістю

a. Ажитованої

b. Депресії з маячними ідеями самозвинувачення

c. Тривожної

d. Анестетичної

e. Депресії з обсесіями

171. Пацієнтка віком 35 років повідомляє, що раніше двічі перебувала в депресивних станах тривалістю

a. Ажитованої

b. Тривожної

c. Депресії з обсесіями

d. Депресії з маячними ідеями самозвинувачення

e. Анестетичної

172. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на страх вийти з дому, переходити вулиці, відвідувати парк,

a. Інгібітори моноамінооксидази

b. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну

c. Бензодіазепіни

d. \beta-блокатори

e. Селективні інгібітори зворотного захоплення норадреналіну

173. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на страх вийти з дому, переходити вулиці, відвідувати парк,

a. Інгібітори моноамінооксидази

b. \beta-блокатори

c. Селективні інгібітори зворотного захоплення норадреналіну

d. Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну

e. Бензодіазепіни

174. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 10-ти років перебувала в державній психіатричній лік

a. Біполярний розлад, маніакальна фаза

b. Шизофренія

c. Маячний розлад

d. Шизоафективний розлад

e. Шизофренний розлад

175. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 10-ти років перебувала в державній психіатричній лік

а. Шизоафективний розлад

б. Шизофренний розлад

в. Шизофренія

г. Біполярний розлад, маніакальна фаза

д. Маячний розлад

176. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 8-ми місяців відмовлялася виходити з дому, вважаючи,

а. Велика депресія з психотичними ознаками

б. Шизофренія

в. Шизоафективний розлад

г. Маячний розлад

д. Шизофренний розлад

177. Пацієнтка віком 36 років протягом останніх 8-ми місяців відмовлялася виходити з дому, вважаючи,

а. Шизофренний розлад

б. Шизоафективний розлад

в. Велика депресія з психотичними ознаками

г. Маячний розлад

д. Шизофренія

178. Пацієнтка віком 37 років, яка перший раз звернулася до лікаря-психіатра, скаржиться на загальну

а. Депресивний розлад

б. Шизофренія

в. Неврастенія

г. Тривожно-депресивний розлад

д. Біполярний афективний розлад

179. Пацієнтка віком 37 років, яка перший раз звернулася до лікаря-психіатра, скаржиться на загальну

а. Біполярний афективний розлад

б. Шизофренія

в. Тривожно-депресивний розлад

г. Неврастенія

д. Депресивний розлад

180. Пацієнтка віком 38 років не висловлює скарг, вважає себе здоровою. Об'єктивно спостерігається:

а. Відмова пацієнта від амбулаторного лікування

б. Обсесивно-компульсивний

в. Загальмованість

г. Депресивний зі стійкими суїцидальними висловлюваннями

д. Відсутність спілкування з родичами

181. Пацієнтка віком 38 років не висловлює скарг, вважає себе здоровою. Об'єктивно спостерігається:

а. Обсесивно-компульсивний

б. Депресивний зі стійкими суїцидальними висловлюваннями

в. Загальмованість

г. Відсутність спілкування з родичами

д. Відмова пацієнта від амбулаторного лікування

182. Пацієнтка віком 38 років скаржиться, на те що протягом останнього року в неї виникло почуття су

а. Кататонічний

б. Депресивний

в. Дементний

г. Психоорганічний

д. Маніакальний

183. Пацієнтка віком 38 років скаржиться, на те що протягом останнього року в неї виникло почуття су

а. Кататонічний

б. Дементний

в. Депресивний

г. Психоорганічний

д. Маніакальний

184. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на поганий сон, часте тремтіння, запаморочення, нудоту, пітл

а. Змішаний тривожний і депресивний розлад

- b. Клімактеричний синдром
- c. Агорафобія з панічним розладом
- d. Панічний розлад

e. Генералізований тривожний розлад

185. Пацієнтка віком 43 роки скаржиться на поганий сон, часте тремтіння, запаморочення, нудоту, пітливість.

- a. Клімактеричний синдром
- b. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- c. Панічний розлад

d. Генералізований тривожний розлад

e. Агорафобія з панічним розладом

186. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на знижений настрій, страх, тривогу, безсоння, песимістичні думки.

a. Рекурентного депресивного розладу

- b. Маніакального епізоду
- c. Шизофренії
- d. Депресивного епізоду помірного ступеня
- e. Депресивного розладу із психотичними симптомами

187. Пацієнтка віком 53 роки скаржиться на знижений настрій, страх, тривогу, безсоння, песимістичні думки.

a. Депресивного розладу із психотичними симптомами

b. Рекурентного депресивного розладу

- c. Маніакального епізоду
- d. Шизофренії
- e. Депресивного епізоду помірного ступеня

188. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на слинотечу, порушення ковтання, м'язові спазми, порушення координації рухів.

- a. Злоякісна гіпертермія
- b. Центральний антихолінергічний синдром

c. Злоякісний нейролептичний синдром

- d. Летальна кататонія
- e. Серотоніновий синдром

189. Пацієнтка віком 55 років скаржиться на слинотечу, порушення ковтання, м'язові спазми, порушення координації рухів.

- a. Центральний антихолінергічний синдром
- b. Серотоніновий синдром

c. Злоякісний нейролептичний синдром

- d. Летальна кататонія
- e. Злоякісна гіпертермія

190. Пацієнтка віком 68 років послизнулася на кризі та вдарилася головою. Протягом наступних 3-х тижнів з'явилися головні болі, нудота, блювота.

a. Епідуральна гематома

b. Субдуральна гематома

- c. Менінгіома лобової частки
- d. Хвороба Корсакова
- e. Мультиінфарктна деменція

191. Пацієнтка віком 68 років послизнулася на кризі та вдарилася головою. Протягом наступних 3-х тижнів з'явилися головні болі, нудота, блювота.

- a. Мультиінфарктна деменція
- b. Хвороба Корсакова
- c. Менінгіома лобової частки
- d. Епідуральна гематома

e. Субдуральна гематома

192. Пацієнтка віком 72 роки повідомляє, що її чоловік останнім часом зраджує їй. Незважаючи на те, що вона знає, що це неправда.

a. Органічний маячний розлад

- b. Деменція при хворобі Альцгеймера
- c. Параноїдна шизофренія
- d. Депресивний епізод із психотичними симптомами
- e. Органічний афективний розлад

193. Пацієнтка віком 72 роки повідомляє, що її чоловік останнім часом зраджує їй. Незважаючи на те, що вона знає, що це неправда.

- a. Депресивний епізод із психотичними симптомами
- b. Деменція при хворобі Альцгеймера

с. Органічний афективний розлад

d. Органічний маячний розлад

е. Параноїдна шизофренія

194. Пацієнтка віком 86 років останній рік спостерігається у психіатра з діагнозом: деменція при хво

а. Аміназин

b. Рисперидон

с. Левомепромазин

d. Амісультрид

е. Клозапін

195. Пацієнтка віком 86 років останній рік спостерігається у психіатра з діагнозом: деменція при хво

а. Амісультрид

b. Аміназин

с. Клозапін

d. Рисперидон

е. Левомепромазин

196. Пацієнтку віком 16 років направлено на консультацію до лікаря-психіатра у зв'язку з аменореєю т

а. Обсесивно-компульсивний розлад

b. Посттравматичний стресовий розлад

с. Нервова анорексія

d. Шизофренія

е. Розлад відсутній, вікова норма

197. Пацієнтку віком 16 років направлено на консультацію до лікаря-психіатра у зв'язку з аменореєю т

а. Посттравматичний стресовий розлад

b. Шизофренія

с. Обсесивно-компульсивний розлад

d. Нервова анорексія

е. Розлад відсутній, вікова норма

198. Пацієнтку віком 16 років шпиталізовано у тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: АТ - 75/50

а. Зловживання алкоголем

b. Крадіжки в магазині

с. Статева розбещеність

d. Носіння тісного одягу

е. Самоіндукована блювота

199. Пацієнтку віком 16 років шпиталізовано у тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: АТ - 75/50

а. Статева розбещеність

b. Самоіндукована блювота

с. Носіння тісного одягу

d. Крадіжки в магазині

е. Зловживання алкоголем

200. Пацієнтку віком 20 років, яка раніше не мала серйозних проблем зі здоров'ям, шпиталізовано до в

а. Гідазепам

b. Тіамін

с. Діазепам

d. Галоперидол

е. Рисперидон

201. Пацієнтку віком 20 років, яка раніше не мала серйозних проблем зі здоров'ям, шпиталізовано до в

а. Діазепам

b. Галоперидол

с. Тіамін

d. Гідазепам

е. Рисперидон

202. Пацієнтку віком 23 роки шпиталізовано з депресією, тривогою, маячними ідеями самоприпинення,

а. Астенічна

b. Ажитована

с. Анестетична

- d. Адинамічна
- e. Гнівлива

203. Пацієнтку віком 23 роки шпиталізовано з депресією, тривогою, маячними ідеями самоприниження,

- a. Астенічна
- b. Анестетична
- c. Гнівлива
- d. Адинамічна

e. Ажитована

204. Пацієнтку віком 24 роки шпиталізовано в стані збудження. Об'єктивно спостерігається: стогне, кр

- a. Істеричного нападу
- b. Суїцидальної спроби**
- c. Патологічного афекту
- d. Аменції
- e. Дисфорії

205. Пацієнтку віком 24 роки шпиталізовано в стані збудження. Об'єктивно спостерігається: стогне, кр

- a. Дисфорії
- b. Патологічного афекту
- c. Суїцидальної спроби**
- d. Аменції
- e. Істеричного нападу

206. Пацієнтку віком 26 років чоловік привіз до лікарні після того, як вона почала кричати, що їй дз

- a. Делірій
- b. Короткий психотичний розлад**

- c. Велика депресія з психотичними ознаками
- d. Посттравматичний стресовий розлад
- e. Шизофренний розлад

207. Пацієнтку віком 26 років чоловік привіз до лікарні після того, як вона почала кричати, що їй дз

- a. Делірій
- b. Посттравматичний стресовий розлад
- c. Шизофренний розлад
- d. Велика депресія з психотичними ознаками
- e. Короткий психотичний розлад**

208. Пацієнтку віком 70 років шпиталізовано до опікового відділення з опіками третього ступеня 35% т

- a. Короткочасний реактивний психоз
- b. Делірій**

- c. Гострий стресовий розлад
- d. Поява основної деменції
- e. Гострий маніакальний епізод

209. Пацієнтку віком 70 років шпиталізовано до опікового відділення з опіками третього ступеня 35% т

- a. Поява основної деменції
- b. Короткочасний реактивний психоз
- c. Делірій**

- d. Гострий стресовий розлад
- e. Гострий маніакальний епізод

210. Пацієнтці віком 28 років вперше діагностовано тяжку депресію. Призначено групову когнітивно-по

- a. Переконатися, що пацієнтка приймає препарат регулярно та у відповідності до призначеної дози**
- b. Призначити інший антидепресант, якщо присутні побічні ефекти
- c. Розглянути можливість поєднання антидепресанту з іншим антидепресантом
- d. Призначити інший антидепресант за бажанням пацієнтки

e. Збільшити дози відповідно до інструкції для медичного застосування препарату, за умови відсутност

211. Пацієнтці віком 28 років вперше діагностовано тяжку депресію. Призначено групову когнітивно-по

- a. Збільшити дози відповідно до інструкції для медичного застосування препарату, за умови відсутност
- b. Призначити інший антидепресант за бажанням пацієнтки
- c. Призначити інший антидепресант, якщо присутні побічні ефекти
- d. Розглянути можливість поєднання антидепресанту з іншим антидепресантом

е. Переконатися, що пацієнтка приймає препарат регулярно та у відповідності до призначеної дози

212. Пацієнтці на фоні резистентності до інших нейролептиків призначили клозапін. Психічний стан пок

- a. Еритроцитоз
- b. Дефіцит вітаміну С
- c. Еозинофілія
- d. Тромбоцитоз

е. Агранулоцитоз

213. Пацієнтці на фоні резистентності до інших нейролептиків призначили клозапін. Психічний стан пок

- a. Тромбоцитоз
- b. Еозинофілія

с. Агранулоцитоз

- d. Еритроцитоз
- е. Дефіцит вітаміну С

214. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, лається, заявляє, що все це робит

- a. Брекспипразол
- b. Оланзапін
- c. Каріпразин

d. Рисперидон

е. Зипразидон

215. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, лається, заявляє, що все це робит

- a. Оланзапін
- b. Каріпразин

с. Рисперидон

- d. Брекспипразол
- е. Зипразидон

216. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, лається, заявляє, що все це робит

a. Гострий поліморфний психотичний розлад

- b. Реактивний параноїд
- c. Дитяча шизофренія
- d. Органічний маячний розлад
- е. -

217. Під час огляду десятирічної дитини виявлено: кричить, танцює, лається, заявляє, що все це робит

a. Реактивний параноїд

b. Гострий поліморфний психотичний розлад

- c. Органічний маячний розлад
- d. Дитяча шизофренія
- е. -

218. Під час огляду пацієнта віком 28 років спостерігається: ейфорія, неспокій, гіперактивність, лег

a. Оланзапін + вальпроєва кислота

- b. Ламотриджин
- c. Оланзапін + флуоксетин
- d. Карбамазепін
- е. Сертралін

219. Під час огляду пацієнта віком 28 років спостерігається: ейфорія, неспокій, гіперактивність, лег

a. Оланзапін + вальпроєва кислота

- b. Сертралін
- c. Ламотриджин
- d. Карбамазепін
- е. Оланзапін + флуоксетин

220. Під час огляду пацієнта віком 36 років виявлено: неспокійний, напружений, до чогось приглядаєтьс

- a. 3-тя стадія алкогольного делірію
- b. Реактивний психоз
- c. Патологічне сп'яніння
- d. 2-га стадія алкогольного делірію
- е. 1-ша стадія алкогольного делірію

221. Під час огляду пацієнта віком 36 років виявлено: неспокійний, напружений, до чогось приглядається

a. Патологічне сп'яніння

b. 2-га стадія алкогольного делірію

c. 1-ша стадія алкогольного делірію

d. 3-тя стадія алкогольного делірію

e. Реактивний психоз

222. Під час огляду пацієнта віком 50 років виявлено: свідомість збережена, скарг не висловлює, ім'я

a. Хвороба Гентінгтона

b. Енцефалопатія Гайє-Верніке

c. Амнестичний синдром Корсакова

d. Хвороба Альцгеймера

e. Хвороба Піка

223. Під час огляду пацієнта віком 50 років виявлено: свідомість збережена, скарг не висловлює, ім'я

a. Хвороба Піка

b. Хвороба Гентінгтона

c. Енцефалопатія Гайє-Верніке

d. Амнестичний синдром Корсакова

e. Хвороба Альцгеймера

224. Під час огляду пацієнтки віком 25 років спостерігається: знерухомлена, вираз обличчя мінливий,

a. Аменція

b. Онейроїд

c. Конфабуляція

d. Псевдоремінісценція

e. Делірій

225. Під час огляду пацієнтки віком 25 років спостерігається: знерухомлена, вираз обличчя мінливий,

a. Делірій

b. Псевдоремінісценція

c. Онейроїд

d. Конфабуляція

e. Аменція

226. Під час огляду пацієнтки віком 67 років спостерігається: охайно одягнута та зачесана, на привіт

a. Деменція при хворобі Піка

b. Делірій, заподіяний деменцією

c. Деменція при хворобі Альцгеймера

d. Помірні (когнітивні) порушення пізнавальної функції органічного генезу

e. Деменція при хворобі Гентінгтона

227. Під час огляду пацієнтки віком 67 років спостерігається: охайно одягнута та зачесана, на привіт

a. Деменція при хворобі Піка

b. Помірні (когнітивні) порушення пізнавальної функції органічного генезу

c. Деменція при хворобі Гентінгтона

d. Деменція при хворобі Альцгеймера

e. Делірій, заподіяний деменцією

228. Під час огляду трирічної дитини виявлено: відсутність експресивного мовлення, нерозуміння зверн

a. Дитячий аутизм

b. Нервова анорексія

c. Посттравматичний стресовий розлад

d. Гіперкінетичний розлад

e. Розлад відсутній, вікова норма

229. Під час огляду трирічної дитини виявлено: відсутність експресивного мовлення, нерозуміння зверн

a. Посттравматичний стресовий розлад

b. Розлад відсутній, вікова норма

c. Дитячий аутизм

d. Нервова анорексія

e. Гіперкінетичний розлад

230. Після вживання 200 мл сурогатного алкоголю у чоловіка віком 34 роки з'явилися симптоми сп'янін

- a. Введення розчину етанолу
- b. Введення атропіну сульфату
- c. Введення унітіолу
- d. Проведення плазмаферезу
- e. Викликання блювання

231. Після вживання 200 мл сурогатного алкоголю у чоловіка віком 34 роки з'явилися симптоми сп'яніння

- a. Введення унітіолу
- b. Введення розчину етанолу
- c. Введення атропіну сульфату
- d. Викликання блювання
- e. Проведення плазмаферезу

232. Семирічний хлопчик під час занять у школі постійно розмовляє, відволікає інших учнів і не може

- a. Атомоксетин
- b. Гопантенова кислота
- c. Дексамфетамін
- d. Гідазепам
- e. Арипіпразол

233. Семирічний хлопчик під час занять у школі постійно розмовляє, відволікає інших учнів і не може

- a. Гопантенова кислота
- b. Атомоксетин
- c. Гідазепам
- d. Дексамфетамін
- e. Арипіпразол

234. Семирічному хлопчику діагностовано розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та рекомендовано

- a. Метилфенідат
- b. Рисперидон
- c. Флуфеназин
- d. Прегабалін
- e. Гідроксизин

235. Семирічному хлопчику діагностовано розлад дефіциту уваги з гіперактивністю та рекомендовано

- a. Гідроксизин
- b. Прегабалін
- c. Рисперидон
- d. Флуфеназин
- e. Метилфенідат

236. У молодого чоловіка віком 21 рік через 1 рік після вживання наркотичної речовини розвинувся так

- a. Героїном

- b. ЛСД
- c. Канабіноїдами
- d. Барбітуратами
- e. Кокаїном

237. У молодого чоловіка віком 21 рік через 1 рік після вживання наркотичної речовини розвинувся так

- a. Героїном
- b. Кокаїном
- c. Барбітуратами
- d. ЛСД

- e. Канабіноїдами

238. У пацієнта віком 28 років упродовж останніх 2-х тижнів наростали такі симптоми: значне зниження

- a. Кататонічної шизофренії
- b. Шизотипового розладу
- c. Гострого поліморфного психотичного розладу
- d. Депресивного ступору
- e. Параноїдної шизофренії

239. У пацієнта віком 28 років упродовж останніх 2-х тижнів наростали такі симптоми: значне зниження

- a. Шизотипового розладу

b. Кататонічної шизофренії

- c. Параноїдної шизофренії
- d. Депресивного ступору
- e. Гострого поліморфного психотичного розладу

240. У пацієнта віком 32 роки у стані абстиненції послідовно виникли такі симптоми: погіршення настрою

- a. Барбітуратової
- b. Канабіноїдної

c. Опійної

- d. Ефедренової
- e. Кокаїнової

241. У пацієнта віком 32 роки у стані абстиненції послідовно виникли такі симптоми: погіршення настрою

- a. Кокаїнової
- b. Канабіноїдної
- c. Ефедренової

d. Опійної

- e. Барбітуратової

242. У пацієнта віком 34 роки діагностовано: тяжка депресія. Він і його лікар-психіатр обговорюють план лікування

a. Флуоксетин

- b. Іміпрамін
- c. Кломіпрамін
- d. Фенелзин
- e. Дезипрамін

243. У пацієнта віком 34 роки діагностовано: тяжка депресія. Він і його лікар-психіатр обговорюють план лікування

a. Флуоксетин

- b. Фенелзин
- c. Дезипрамін
- d. Іміпрамін
- e. Кломіпрамін

244. У пацієнта віком 38 років спостерігається швидка зміна симптоматики у вигляді афективних коливань

a. Біполярний афективний розлад, депресивний епізод

b. Біполярний афективний розлад, змішаний епізод

- c. Депресивний епізод помірного ступеня
- d. Рекурентний депресивний розлад
- e. Маніакальний епізод

245. У пацієнта віком 38 років спостерігається швидка зміна симптоматики у вигляді афективних коливань

- a. Рекурентний депресивний розлад
- b. Біполярний афективний розлад, депресивний епізод
- c. Маніакальний епізод
- d. Депресивний епізод помірного ступеня

e. Біполярний афективний розлад, змішаний епізод

246. У пацієнта віком 50 років, мисливця, після укусу лисиці з'явилися слабкість, головний біль, підрапання

a. Енцефаліт

b. Сказ

- c. Патологічний афект
- d. Грип
- e. Інволюційний вік

247. У пацієнта віком 50 років, мисливця, після укусу лисиці з'явилися слабкість, головний біль, підрапання

- a. Патологічний афект
- b. Енцефаліт

c. Сказ

- d. Грип
- e. Інволюційний вік

248. У пацієнта віком 59 років спостерігається прогресуюче погіршення пам'яті, безсоння. Почав помилково

- a. Синдром Ганзера
- b. Корсаківський амнестичний синдром

с. Хвороба Альцгеймера

d. Дромоманія

е. Тривожно-депресивний розлад

249. У пацієнта віком 59 років спостерігається прогресуюче погіршення пам'яті, безсоння. Почав помил

a. Синдром Ганзера

b. Тривожно-депресивний розлад

с. Хвороба Альцгеймера

d. Дромоманія

е. Корсаківський амнестичний синдром

250. У пацієнта інфекційного стаціонару розвинулося психомоторне збудження з порушенням орієнтації

a. Еретичне

b. Аментивне

с. Делірійне

d. Маніакальне

е. Гебефренічне

251. У пацієнта інфекційного стаціонару розвинулося психомоторне збудження з порушенням орієнтації

a. Маніакальне

b. Еретичне

с. Делірійне

d. Аментивне

е. Гебефренічне

252. У пацієнтки віком 25 років діагностований БАР, поточний епізод помірної депресії. Який стабіліз

a. Ламотриджин

b. Топірамат

с. Вальпроат натрію

d. Прегабалін

е. Карбамазепін

253. У пацієнтки віком 25 років діагностований БАР, поточний епізод помірної депресії. Який стабіліз

a. Вальпроат натрію

b. Ламотриджин

с. Топірамат

d. Карбамазепін

е. Прегабалін

254. У пацієнтки віком 29 років раптово підвищилася температура тіла, погіршилося самопочуття, стала

a. Менінгококова інфекція

b. Розсіяний склероз

с. Сифіліс

d. Генералізований тривожний розлад

е. Епідемічний енцефаліт

255. У пацієнтки віком 29 років раптово підвищилася температура тіла, погіршилося самопочуття, стала

a. Менінгококова інфекція

b. Сифіліс

с. Розсіяний склероз

d. Епідемічний енцефаліт

е. Генералізований тривожний розлад

256. У пацієнтки віком 32 роки впродовж останніх 3-х тижнів виникли та наростали відчуття відкритості

a. Депресивного епізоду

b. Гострого поліморфного психотичного розладу з симптомами шизофренії

с. Шизоафективного розладу

d. Маніакального епізоду

е. Обсесивно-компульсивного розладу

257. У пацієнтки віком 32 роки впродовж останніх 3-х тижнів виникли та наростали відчуття відкритості

a. Обсесивно-компульсивного розладу

b. Гострого поліморфного психотичного розладу з симптомами шизофренії

с. Депресивного епізоду

d. Маніакального епізоду

e. Шизоафективного розладу

258. У пацієнтки віком 75 років протягом останніх 10-ти років прогресивно погіршилася пам'ять. Остан

a. Хвороба Альцгеймера

b. Мультиінфарктна деменція

c. Хвороба Гентінгтона

d. Хвороба Вільсона

e. Хвороба Кройтцфельдта-Якоба

259. У пацієнтки віком 75 років протягом останніх 10-ти років прогресивно погіршилася пам'ять. Остан

a. Хвороба Кройтцфельдта-Якоба

b. Мультиінфарктна деменція

c. Хвороба Альцгеймера

d. Хвороба Вільсона

e. Хвороба Гентінгтона

260. У породіллі виникла післяпологова депресія з психотичними ознаками. Вона постійно сумна, задум

a. Суїцидальні думки та дії

b. Виникнення пролежнів

c. Анорексію

d. Авітаміноз

e. Розвиток пневмонії

261. У породіллі виникла післяпологова депресія з психотичними ознаками. Вона постійно сумна, задум

a. Виникнення пролежнів

b. Авітаміноз

c. Анорексію

d. Суїцидальні думки та дії

e. Розвиток пневмонії

262. Укажіть емоційний прояв, який не є типовим для циркулярної депресії.

a. Тривога

b. Безнадійність

c. Відчай

d. Печаль

e. Туга

263. Укажіть емоційний прояв, який не є типовим для циркулярної депресії.

a. Безнадійність

b. Туга

c. Печаль

d. Тривога

e. Відчай

264. Укажіть принцип, за яким в Україні не надається психіатрична допомога під час планової шпиталіза

a. Недобровільності

b. Додержання прав людини та громадянина

c. Доступності до сучасного рівня наукових знань

d. Необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації,

e. Гуманності

265. Укажіть принцип, за яким в Україні не надається психіатрична допомога під час планової шпиталіза

a. Недобровільності

b. Необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації,

c. Доступності до сучасного рівня наукових знань

d. Гуманності

e. Додержання прав людини та громадянина

266. Укажіть симптоми, які не пов'язані з нейрокогнітивними розладами.

a. Делірій

b. Гіпоманія

c. Короткочасна втрата пам'яті

d. Дратівливість

е. Атрофія кори головного мозку

267. Укажіть симптоми, які не пов'язані з нейрокогнітивними розладами.

а. Делірій

б. Дратівливість

с. Короткочасна втрата пам'яті

д. Атрофія кори головного мозку

е. Гіпоманія

268. Укажіть специфічний симптом, що характерний для отруєння метиловим спиртом.

а. Тахікардія

б. Порушення дихання

с. Сп'яніння від менших доз алкоголю

д. Порушення зору

е. Блювання

269. Укажіть специфічний симптом, що характерний для отруєння метиловим спиртом.

а. Тахікардія

б. Сп'яніння від менших доз алкоголю

с. Порушення зору

д. Порушення дихання

е. Блювання

270. Через два місяці після ДТП пацієнт скаржиться на появу "видінь" у вигляді яскравого образу пере

а. Деперсоналізація

б. Галюцинація

с. Дереклізація

д. Криптомнезія

е. Флешбек

271. Через два місяці після ДТП пацієнт скаржиться на появу "видінь" у вигляді яскравого образу пере

а. Дереклізація

б. Галюцинація

с. Флешбек

д. Криптомнезія

е. Деперсоналізація

272. Чоловік віком 35 років чує "голос" усередині голови, схожий на голос робота, який коментує усе,

а. Афективна ілюзія

б. Функціональна галюцинація

с. Істинна галюцинація

д. Парейдолія

е. Псевдогалюцинація

273. Чоловік віком 35 років чує "голос" усередині голови, схожий на голос робота, який коментує усе,

а. Парейдолія

б. Істинна галюцинація

с. Функціональна галюцинація

д. Афективна ілюзія

е. Псевдогалюцинація

274. Чоловіка віком 41 рік шпиталізовано до психіатричного стаціонару з виправного закладу через пог

а. Епілепія

б. Нейролептичний синдром

с. Хвороба Гентінгтона

д. Хвороба Паркінсона

е. Шизоафективний розлад

275. Чоловіка віком 41 рік шпиталізовано до психіатричного стаціонару з виправного закладу через пог

а. Епілепія

б. Хвороба Паркінсона

с. Хвороба Гентінгтона

д. Шизоафективний розлад

е. Нейролептичний синдром

276. Чоловікові, який намагався накласти на себе руки, стрибнувши з даху, завадили працівники поліції

a. Стаття 14, так

b. Стаття 14, ні

c. Стаття 3, так

d. Стаття 18, ні

e. Стаття 18, так

277. Чоловікові, який намагався накласти на себе руки, стрибнувши з даху, завадили працівники поліції

a. Стаття 14, так

b. Стаття 18, ні

c. Стаття 18, так

d. Стаття 3, так

e. Стаття 14, ні

278. Шестирічну дівчинку мама привела до лікаря зі скаргами на те, що дитина відстає в навчанні, неу

a. Електроенцефалограма

b. Люмбальна пункція

c. Тестування IQ

d. Загальний аналіз крові

e. Перевірка слуху

279. Шестирічну дівчинку мама привела до лікаря зі скаргами на те, що дитина відстає в навчанні, неу

a. Перевірка слуху

b. Загальний аналіз крові

c. Люмбальна пункція

d. Електроенцефалограма

e. Тестування IQ

280. Що є підставою для шпиталізації особи до психіатричного стаціонару у примусовому порядку?

a. Наявність тяжкого психічного розладу, що зумовлює небезпеку пацієнта для себе або довкілля

b. Наявність психічного розладу у особи, яка не становить небезпеки для себе або довкілля

c. Необхідність обстеження в стаціонарних умовах

d. Наявність хронічного психічного розладу

e. Наявність тяжкого хронічного психічного розладу (слабоумство)

281. Що є підставою для шпиталізації особи до психіатричного стаціонару у примусовому порядку?

a. Наявність хронічного психічного розладу

b. Необхідність обстеження в стаціонарних умовах

c. Наявність тяжкого психічного розладу, що зумовлює небезпеку пацієнта для себе або довкілля

d. Наявність психічного розладу у особи, яка не становить небезпеки для себе або довкілля

e. Наявність тяжкого хронічного психічного розладу (слабоумство)

282. Щоранку, коли треба йти до школи, восьмирічна дівчинка стає плаксивою і засмученою, стверджує

a. Розлад сепараційної тривоги

b. Генералізований тривожний розлад

c. Розлад прихильності

d. Велика депресія

e. Розлад соматизації

283. Щоранку, коли треба йти до школи, восьмирічна дівчинка стає плаксивою і засмученою, стверджує

a. Велика депресія

b. Генералізований тривожний розлад

c. Розлад сепараційної тривоги

d. Розлад соматизації

e. Розлад прихильності

284. Яке з нижченаведених захворювань може розвиватися внаслідок довготривалого вживання алкоголю?

a. Грип

b. Цироз печінки

c. ПТСР

d. Цукровий діабет

e. Астма

285. Яке з нижченаведених захворювань може розвиватися внаслідок довготривалого вживання алкоголю?

- a. Цукровий діабет
- b. Астма
- c. ПТСР

d. Цироз печінки

- e. Грип

286. Яке з нижченаведених тверджень є характеристикою викликаних вживанням кокаїну розладів психіки?

- a. Коагулопатія
- b. Покращення сну

c. Параноя

- d. Збільшення апетиту
- e. Підвищена розумова активність

287. Яке з нижченаведених тверджень є характеристикою викликаних вживанням кокаїну розладів психіки?

- a. Покращення сну
- b. Збільшення апетиту

c. Параноя

- d. Підвищена розумова активність
- e. Коагулопатія

288. Який критерій не відповідає вимогам депресивного епізоду за МКХ-10?

- a. Ідеаторна загальмованість
- b. Моторна загальмованість

c. Підвищений настрій

- d. Ангедонія
- e. Пригнічений настрій

289. Який критерій не відповідає вимогам депресивного епізоду за МКХ-10?

- a. Моторна загальмованість
- b. Пригнічений настрій

c. Підвищений настрій

- d. Ангедонія
- e. Ідеаторна загальмованість

290. Який основний елемент лікування отруєння метиловим спиртом?

a. Введення етилового спирту

- b. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- c. Детоксикація
- d. Підтримання серцевої діяльності
- e. Форсований діурез

291. Який основний елемент лікування отруєння метиловим спиртом?

a. Введення етилового спирту

- b. Форсований діурез
- c. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- d. Детоксикація
- e. Підтримання серцевої діяльності

292. Який розлад не належить до дисоціативних розладів?

- a. Розлад множинної особистості
- b. Амнезія

c. Іпохондрія

- d. Одержимість
- e. Фуга

293. Який розлад не належить до дисоціативних розладів?

- a. Розлад множинної особистості
- b. Одержимість

c. Іпохондрія

- d. Амнезія
- e. Фуга

294. Який синдром не характерний для шизофренії?

- a. Галюцинаторно-параноїдний

b. Судомний

c. Апато-абулічний

d. Кататонічний

e. Гебефренічний

295. Який синдром не характерний для шизофренії?

a. Гебефренічний

b. Судомний

c. Апато-абулічний

d. Кататонічний

e. Галюцинаторно-параноїдний

296. Який із нижченаведених варіантів депресії не належить до тих, що можуть бути асоційовані з COVID-19?

a. Органічна

b. Біполярна

c. Рекурентна

d. Постшизофренічна

e. Короткотривала депресивна реакція

297. Який із нижченаведених варіантів депресії не належить до тих, що можуть бути асоційовані з COVID-19?

a. Органічна

b. Рекурентна

c. Постшизофренічна

d. Біполярна

e. Короткотривала депресивна реакція

298. Який із нижченаведених лікарських засобів є блокатором опіатних рецепторів?

a. Налоксон

b. Морфін

c. Апоморфін

d. Амфетамін

e. Бупренорфін

299. Який із нижченаведених лікарських засобів є блокатором опіатних рецепторів?

a. Амфетамін

b. Морфін

c. Налоксон

d. Бупренорфін

e. Апоморфін