

1. Пацієнт з ознаками гострого нападу глаукоми: нестерпний біль голови, широка зіниця не реагує на світло, око тверде при пальпації. Яке обстеження необхідно провести для підтвердження діагнозу?

- a. Виміряти поле зору
- b. Виміряти артеріальний тиск
- c. Виміряти внутрішньоочний тиск**
- d. Виміряти температуру тіла
- e. Виміряти гостроту зору

2. До офтальмологічного відділення звертається пацієнт, який повернувся з відрядження до африканської країни з підозрою на трахому. Яке обстеження необхідно провести лаборанту для підтвердження діагнозу?

- a. Взяти кров на загальний аналіз
- b. Взяти зіскряб з кон'юнктиви**
- c. Взяти кров на стерильність
- d. Взяти мазок з кон'юнктиви на BL
- e. Взяти кров на RW

3. В поліклініку звернувся лаборант, який при проведенні досліджень отримав опік очей кислотою. Скарги на набряк, гіперемію повік, біль при кліпанні, погіршення зору. Яке долікарське обстеження проводиться для виключення ушкодження рогівки?

- a. -
- b. Провести колларголову пробу**
- c. Провести вимірювання внутрішньоочного тиску
- d. Визначити поле зору
- e. Визначити гостроту зору

4. До офтальмолога звернувся пацієнт з ознаками дифтерійного кон'юнктивіту: сіра плівка на слизовій, при намаганні зняти - кровить. Як необхідно лаборанту провести забір матеріалу для дослідження?

- a. Взяти мазок на межі здорової і ушкодженої тканини**
- b. Взяти зіскряб зі слизової
- c. -
- d. Взяти мазок з кон'юнктивальної складки
- e. Взяти кров з вени на стерильність