

1. Під час промивання одноразових шприців та голок 0,15% неофлором незначна кількість його випадково потрапила в очі медичному працівнику. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

- a. Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря
- b. Накласти на око асептичну пов'язку
- c. Промити очі перекип'яченою водою, витерти насухо
- d. Промити очі розчином фурациліну
- e. Промити очі струменем води, закапати сульфацилом натрію**

2. Пацієнту з діагнозом "Пневмонія" призначено 500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі. У флаконі міститься 1000000 ОД медикаменту. Скільки потрібно взяти розчинника і скільки ввести розчину антибіотику пацієнтові?

- a. 3 мл розчинника і ввести 2 мл
- b. 2 мл розчинника і ввести 1 мл
- c. 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл**
- d. 4 мл розчинника і ввести 3 мл
- e. 10 мл розчинника і ввести 10 мл

3. Пацієнтка з цукровим діабетом самостійно вводить собі інсулін. На зовнішній поверхні лівого плеча у неї спостерігається зникнення підшкірної жирової клітковини (ліподистрофія). Для попередження даного ускладнення необхідно:

- a. -
- b. Змінювати місця введення інсуліну**
- c. Накладати зігрівальний компрес
- d. Вводити підігрітий інсулін
- e. Дотримуватись правил антисептики

4. У пацієнтки хронічна серцева недостатність. Їй призначено вимірювати водний баланс. Що потрібно враховувати, виконуючи це призначення?

- a. Співвідношення між спожитою рідиною та виділеною за добу**
- b. Кількість рідини, введеної за добу
- c. Співвідношення між денним та нічним діурезом
- d. Кількість сечі, виділеної за добу
- e. Різницю між масою тіла вранці та ввечері

5. У приймальне відділення поступив хворий з інтенсивними болями в ділянці серця. На ЕКГ - ознаки інфаркту міокарда. Який вид транспортування необхідно застосувати?

- a. На кріслі-каталиці
- b. На каталиці**
- c. На руках трьома санітарами
- d. Пішки у супроводі медсестри
- e. На руках двома санітарами

6. Пацієнту з хронічним холециститом призначено дуоденальне зондування. Після введення ентерального подразника виділилось 50 мл рідини темно-оливкового кольору. Яка порція отримана?

- a. Порція В**
- b. Порція С
- c. Порція А1
- d. Підшлунковий сік
- e. Порція А

7. У пацієнта перший період гарячки. Він скаржиться на озноб, слабкість, біль голови. Який догляд необхідно здійснити в першу чергу?

- a. Застосувати міхур із льодом до голови
- b. -
- c. Обтерти тіло холодною водою
- d. Застосувати холодні примочки до голови

**е. Зігріти пацієнта**

8. Пацієнту з гіпертонічною хворобою призначено внутрішньом'язове введення розчину 5 мл 25% магнія сульфату. Яку анатомічну ділянку необхідно використати для ін'єкцій?

- а. Зовнішню поверхню плеча
- б. Нижньо-зовнішній квадрант сідниці

**с. Верхньо-зовнішній квадрант сідниці**

- д. Зовнішню поверхню стегна
- е. Латеральну поверхню живота

9. Тяжкохворому проводять догляд за носовою порожниною. Для видалення кірочок приготували ватні турунди. Для їх змочування слід використати:

а. Розчин пероксиду водню

**б. Вазелінову олію**

- с. Воду для ін'єкцій
- д. Етиловий спирт
- е. Розчин камфорного спирту

10. Хворий посупив в приймальне відділення лікарні з гострим алкогольним отруєнням. Лікар призначив промивання шлунка. Що слід використати для виконання даної процедури?

**а. Товстий шлунковий зонд**

- б. Дуоденальний зонд
- с. -
- д. Газовивідну трубку
- е. Кишечний зонд